НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ВИТАМИНА D У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Поваляева А.А., Богданов В.П., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К., Катамадзе Н.Н., Малышева Н.М., Йоутси В.А., Никанкина Л.В., Рожинская Л.Я., Мокрышева Н.Г.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, Москва

ЦЕЛЬ: выявление изменений метаболизма витамина D у стационарных пациентов с COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: мы обследовали 119 взрослых пациентов, госпитализированных для лечения COVID-19, и 44 практически здоровых взрослых лиц с аналогичными уровнями 25ОН-D₃ в сыворотке крови. Обследование включало биохимические параметры сыворотки (общий кальций, альбумин, фосфор, креатинин), паратиреоидный гормон (ПТГ), витамин D-связывающий белок (DBP), метаболиты витамина D (25ОН-D₃, 25ОН-D₂, 1,25(ОН)₂D₃, 3-epi-25ОН-D₃, 24,25(ОН)₂D₃ и D₃) и свободный 25ОН-D. Часть пациентов с COVID-19 (52%) в ходе стационарного лечения были обследованы повторно с оценкой метаболитов витамина D, DBP и свободного 25ОН-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ: у пациентов с COVID-19 отмечены в целом очень низкие уровни витамина D (медиана концентрации 25ОН-D₃ 10,8 нг/мл), сопровождающиеся повышенной активностью 1α-гидроксилазы (оцененной как соотношение 25ОН-D₃/1,25(ОН)₂D₃, 175 [112; 260] vs. 272 [200; 433], p<0,001) и, как следствие, более высокими уровнями циркулирующего активного метаболита витамина D — 1,25(ОН)₂D₃ (61 [44; 81] vs. 40 [35; 50] пг/мл, p<0,001), предположительно, направленными на предотвращение развития гипокальциемии. Пациенты с COVID-19 также имели более высокие уровни DBP по сравнению с контрольной группой (450 [386; 515] vs. 392 [311; 433] мг/л, p<0,001) и, следовательно, низкие уровни свободного 25ОН-D (0,3 [0,2; 0,8] vs. 3,9 [3,2; 4,4] пг/мл, p<0,001). При динамическом обследовании пациентов с COVID-19 наблюдалось восстановление отмеченных исходно изменений — снижение активности 1α-гидроксилазы и продукции 1,25(ОН)₂D₃, а также снижение уровней DBP и соответствующее увеличение уровней свободного 25ОН-D.

ВЫВОДЫ: госпитализированные пациенты с острым течением COVID-19 имеют не только очень низкие уровни 25ОН-D, но и значимые отклонения в метаболизме витамина D, которые потенциально способны усугубить существующий дефицит витамина D и его негативные последствия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19; SARS-CoV-2; витамин D; витамин D-связывающий белок.