ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИИ РЯДА БИОМАРКЕРОВ С ТЕЧЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

¹Карамуллина Р.А., ¹Гольдшмид А.Е., ²Павлов В.Г., ¹Фадеев В.В., ¹Полубояринова И.В., ²Будзинская М.В.

¹ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

²ФГБНУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней»

Диабетическая ретинопатия (ДР) — это хроническое, прогрессирующее заболевание, поражающее сосуды сетчатки и развивающееся у пациентов, страдающих сахарным диабетом. ДР является распространенной причиной слепоты и ухудшения зрения. Основной причиной снижения остроты зрения у пациентов с сахарным диабетом является диабетический макулярный отек (ДМО). Он может возникать на любой стадии диабетической ретинопатии. По данным исследований можно сказать, что раннее устранение ДМО приводит к сохранению более высоких зрительных функций. Таким образом, своевременное выявление и назначение эффективного лечения может положительно повлиять на остроту зрения. В связи с этим, целесообразным является проведение скрининга пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД-1) с использованием широкого спектра биомаркеров для выявления патологии на ранней стадии развития заболевания.

ЦЕЛЬ: оценить потенциальное прогностическое значение биомаркеров, влияющих на течение и развитие диабетической ретинопатии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен скрининг пациентов с СД 1 типа. Для анализа отобрано 100 пациентов с СД 1 типа. Из них 64 без признаков ДР, 16 с начальной непролиферативной ДР (НПДР), 10 с тяжелой НПДР и 10 с пролиферативной ДР (ПДР). Минимальный стаж СД был 1 месяц, максимальный 40 лет, и в среднем составил $12,72 \pm 9,36$ лет. Уровень гликированного гемоглобина (HbA_{1c}) в среднем составил $8,38 \pm 1,90\%$. Значимая (длина ≥ 120 мкм) отслойка нейроретинита (оНЭ) наблюдалась у 5 пациентов.

В рамках скрининга всем пациентам выполняли определение максимальной скорректированной остроты зрения (МКОЗ) по таблицам ETDRS, оптическую когерентную томографию (ОКТ) и оптическую когерентную томографию в ангиорежиме (ОКТ-А) на приборе Spectralis HRA + ОСТ с модулем ОСТ-А «Heidelberg Engineering» (Германия), фотографирование глазного дна и ОКТ на приборе Topcon 3D ОСТ-2000FA (Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ: по результатам статистического анализа, прослеживается четкая положительная корреляция между стадией ДР, стажем СД и центральной толщиной сетчатки (ЦТС) ($p < 0,0001$ и $p = 0,003$ соответственно), и отрицательная корреляция между стадией ДР и МКОЗ ($p < 0,0001$), а также стажем СД и МКОЗ ($p < 0,0001$). Столь же значимая корреляция была замечена между толщиной хориоидеи и HbA_{1c} ($r = -0,299$, $p = 0,004$), а также между показателями толщины слоя нервных волокон сетчатки с наличием оНЭ ($r = -0,278$, $p = 0,005$) и толщиной хориоидеи ($r = -0,288$, $p = 0,004$). Менее значимая корреляция была замечена между ЦТС с толщиной хориоидеи ($r = -0,226$, $p = 0,025$) и наличием оНЭ ($r = -0,223$, $p = 0,026$).

ВЫВОДЫ: исходя из результатов проведенного исследования, были сделаны выводы:

1. Увеличение длительности СД способствует прогрессированию ДР.
2. ДМО развивается в результате прогрессирования ДР и проявляется в увеличении ЦТС и уменьшении МКОЗ.
3. Корреляция HbA_{1c} с толщиной хориоидеи может указывать на гемодинамические нарушения у пациентов с плохим гликемическим контролем.