ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В Г. НОВОСИБИРСКЕ

Сидоренко О.А., Ахмерова Е.В., Цыганкова О.В.

ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16», г. Новосибирск

ЦЕЛЬ: исследовать встречаемость различных видов злокачественных опухолей щитовидной железы среди жителей г. Новосибирска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ амбулаторных карт пациентов, наблюдавшихся в Городском эндокринологическом центре в период с 2009 по 2019 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ: в период с 2009 по 2019 гг. в ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №16», специализированном отделении «Городской эндокринологический центр» г. Новосибирска наблюдались 319 пациентов с раком щитовидной железы. Во всех случаях было проведено оперативное лечение (гемитиреоидэктомия с перешейком — 27 человек (8%), тиреоидэктомия — 196 пациентов (61%), тиреоидэктомия + центральная лимфодиссекция клетчатки шеи — 96 человек (31%). Пациентам с дифференцированным раком щитовидной железы высокой и умеренной групп клинического риска — 112 пациентов (35%) проведена радиойодтерапия, причем в 73% в данной подгруппе верифицирован папиллярный рак и в 27% — фолликулярный. По результатам гистологического исследования папиллярный рак диагностирован у 249 человек (232 женщины (93%), 17 мужчин (7%)), фолликулярный — у 59 человек (56 женщин (95%), 3 мужчин (5%)), медуллярный — обнаружен у 11 человек (9 женщин (81%), 2 мужчин (19%)). На амбулаторном этапе в 5 случаях медуллярный рак был диагностирован по результатам биопсии щитовидной железы и повышению уровня кальцитонина, у 1 пациента только по повышенному уровню кальцитонина (биопсия не проводилась), и в 5 случаях диагноз был установлен уже на основании гистологического материала (при цитологическом исследовании у всех 5 пациентов Bethesda 4). Таким образом, папиллярный рак выявлялся максимально часто — в 78% случаев, фолликулярный — в 18,5% случаев, а медуллярный закономерно наиболее редко — в 3,5% случаев.

По данным отечественной и зарубежной литературы, на долю папиллярного рака приходится 60–80% всех злокачественных опухолей щитовидной железы, тогда как фолликулярный составляет около 10–30%. Медуллярный рак встречается в 2–10% случаев. Подавляющее число пациентов — женщины (60–81%).

ВЫВОДЫ: встречаемость различных видов рака щитовидной железы в г. Новосибирске в целом соответствует данным мировой статистики, отражая значимое превалирование папиллярных неоплазий и выраженные гендерные отличия: 93% пациенток с различными вариантами рака щитовидной железы — женщины и лишь 7% — мужчины. Соотношение женщины/мужчины составило 13:1 соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: злокачественные опухоли щитовидной железы; папиллярный рак; фолликулярный рак; медуллярный рак.