EBMA를 이용한 CMIP 대기대순환모형의 일평균기온 앙상블 산출

김광진¹·하경자²·이양원¹

¹부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공·²부산대학교 대기환경과학과
(2017년 3월 10일 접수, 2017년 4월 3일 수정, 2017년 4월 3일 게재 확정)

Production of Daily Mean Temperature Ensemble from the CMIP GCM Using EBMA

Kwangjin Kim¹ · Kyung-Ja Ha² · Yang-Won Lee¹

¹Department of Spatial Information Engineering, Pukyong National University

²Department of Atmospheric Sciences, Pusan National University

(Received 10 Marh 2017, Revised 3 April 2017, Accepted 3 April 2017)

Abstract : Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) provides various prospects of future climate change under the Representative Concentration Pathways (RCP) scenarios using General Circulation Models (GCMs) of Coupled Model Intercomparison Project (CMIP). This paper describes a modified application of Ensemble Bayesian Model Averaging (EBMA) to produce daily mean temperature ensembles using 19 GCMs provided by CMIP. We proposed two types of approach: (1) monthly weighting scheme for a whole area (EBMA.v1) and (2) monthly weighting for each grid point (EBMA.v2), which can take into account the spatially heterogeneous pattern of GCM. For the training period of 1979-2005 for East Asia, 9,855 sets of daily temperature ensembles (27 years × 365 days) were produced and compared to the ERA-Interim reanalysis data of European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), which showed better validation statistics than the general mean and median ensembles. In particular, EBMA.v2 outperformed EBMA.v1 by diminishing the large errors of inland areas where the surface heterogeneity is larger than the ocean. The EBMA.v2 was able to handle the problem of spatial variability by employing monthly and spatially varying weighting scheme. We finally produced daily mean temperature ensembles for the period of 2006-2100 by using the EBMA.v2 under the RCP 6.0 scenario, which are going to be provided on the web.

Key Words : EBMA, EM algorithm, GCM, daily mean temperature

주요어 : 앙상블베이저언모형평균화, EM알고리즘, 대기대순환모형, 일평균기온

1. 서론

대기대순환모형(General Circulation Model,

GCM)은 지구 대기와 해양의 대순환에 관한 수학적 모형으로 구성되며, 전 지구적 기후예측에 사용되어 전지구기후모형(Global Climate Model,

GCM)이라고도 불린다. 최근 기후변화에 관한 정부간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)에서는 CMIP5(Coupled Model Intercomparison Project Phase5)의 GCM을 이용하여 다양한 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오 하에서 미래기후를 예측 및 전망하고 있다(IPCC, 2014).

다양한 GCM은 서로 다른 물리과정에 기반하므로 그 예측치는 상당한 차이를 나타내기도 하는데(Kim *et al.*, 2014) 이는 모형의 차이에 따른 불확실성이라고 할 수 있을 것이다. 이러한 불확실성을 줄이기 위하여 앙상블기법이 널리 사용되는데, 이는 하나의 모형에서 변수 초기치를 변화시키면서 여러 차례 구동시켜 나온 결과를 평균화하거나, 혹은 물리과정이 상이한 여러 모형의 결과를 평균화하는 것이다(Leith, 1974; Deser *et al.*, 2012). 이러한 평균화가 산술평균(mean)이나 중위수(median)와 같은 단순한 방식이라고 해도 일정 정도의 정확도 향상 효과가 있기는 하지만, 불확실성의 근원이 되는 모형간 차이가 고려되지 않는다는 한계가 존재한다(Giorgi and Mearns, 2002; Bae *et al.*, 2013).

Raftery *et al.*(2005)은 모형간 차이를 반영한 가중평균을 통해 다중모형 앙상블의 예측력을 보다 더 향상시키기 위하여 EBMA(Ensemble Bayesian Model Averaging)를 제안하였다. EBMA는 각 모형의 훈련과정에서 도출된 사후확률밀도함수에 기반한 가중평균을 취함으로써, 확률론적 예측을 통하여 불확실성을 줄일 수 있는 방법이다(Raftery *et al.*, 2005; Duan *et al.*, 2007; Vrugt *et al.*, 2008; Slougher *et al.*, 2013). 선행연구들에서는 복수의 GCM을 사용하여 EBMA의 정확도 향상 효과를 실험하였으나(Raftery *et al.*, 2005; Min *et al.*, 2007), 가용한 모든 GCM을 장기시계열로 구성하여 앙상블을 산출함에 있어 월별 및 격자점별로 가

중치 체계를 구성하여 서로 비교함으로써 어떻게 성능 향상을 극대화할 수 있는가에 대한 연구는 보고된 바 없다.

이에 본 연구에서는 CMIP5의 GCM 19종을 이용하여 1979~2005년 동아시아 영역에 대한 일평균기온의 EBMA 훈련을 수행하고 검증통계를 평가하며, 각 모델에 대한 월별 및 격자점별 가중치를 이용하여 2006~2100년의 일평균기온 앙상블을 산출하고자 한다. 이를 위하여 두 가지 접근법으로 EBMA를 수행하였는데, 첫 번째는 계절성을 고려하여 월별로 가중치체계를 구성하였고, 두 번째는 계절성 및 공간적인 특성을 함께 고려하기 위하여 월별 및 격자점별로 가중치체계를 구성하여 EBMA 앙상블을 산출하였다. 이를 통하여 훈련기간 중 EBMA의 정확도 향상 효과와 함께 계절별 및 지역별 오차 특성을 살펴보고자 한다.

2. 이론적 배경

BMA(Bayesian Model Averaging)은 사후확률(posterior probability)을 가중치로 하여 각 앙상블 멤버의 기여도를 설정함으로써 불확실성 문제를 해결하고자 하는 비교적 새로운 통계법이다(Hoeting *et al.*, 1999). 베이지언 통계학에서 불확실한 정보의 사후확률은, 참값으로 가정할 수 있는 자료를 고려하여 부여된 조건부확률이다. 앙상블 멤버의 사후확률은 상당한 기간에 걸쳐 현장자료 혹은 재분석자료를 이용한 트레이닝 과정에 의해 결정될 수 있다. 즉, 사후확률은 각 멤버에 기대되는 예측 적합도를 확률로 나타낸 것이며(Raftery *et al.*, 2005), 이는 앙상블 멤버 간 불확실성의 차이에 대한 고려라고 할 수 있다. 그러나 사후확률을 PDF(Probability Density Function) 형태로 활용하는 이론적인 BMA보다는, 이를 간소화 및 최적화

한 EBMA가 연구자들에게 실제로 선호되고 있다 (Kim *et al.*, 2016). EBMA는 멤버들의 PDF 결합을 통해 도출된 가중평균을 이용하는 일종의 혼합 모형이다(Claeskens and Hjort, 2008).

EBMA를 이용하여 y 라는 대상변수에 대한 앙상블을 구하는데 있어, k 개의 모델이 존재하며 각 멤버의 예측치를 f_k 라 하고, 편이보정된 예측치를 $\tilde{f}_k$ 라고 한다면, EBMA는 식(1)과 같이 표현할 수 있다.

$$p(y|f_1, \dots, f_k) = \sum_{k=1}^K w_k g_k(y|\tilde{f}_k) \quad (1)$$

여기에서 $g_k(y|\tilde{f}_k)$ 는 예측치의 사후확률밀도함수를 의미한다. w_k 는 EM(Expectation-Maximization) 알고리즘을 통해 구해지는 각 멤버의 가중치이며, 편이보정된 예측치 $\tilde{f}_k$ 는 식(2)와 같이 정규분포를 따른다고 가정할 수 있으므로 EM 알고리즘을 통하여 각 멤버의 가중치와 분산(σ^2)을 도출하는 것이다(Raftery *et al.*, 2005).

$$y|f_k \sim N(\tilde{f}_k, \sigma^2) \quad (2)$$

이때 EM 알고리즘은 훈련자료를 이용하여 식(3)과 같이 최대우도추정을 수행한다.

$$\mathcal{L}(\theta) = \ln\left(\sum_{k=1}^K w_k g_k(y|\tilde{f}_k)\right) \quad (3)$$

여기에서 θ 는 로그 우도함수를 최대화시키는 멤버별 가중치와 분산의 파라미터 벡터를 나타내는데, 우도함수 최대화를 구현하기 위하여 Newton-Raphson 등의 비선형 방법을 직접 사용하는 것은 수치적 복잡성이 크기 때문에(Raftery *et al.*, 2005; Duan *et al.*, 2007) 실제로는 EM 알고리즘이 대안적으로 사용되는 것이다(Dempster *et al.*, 1977). EM 알고리즘은 알려지지 않은 파라미터가 포함된 상태에서 최대우도추정을 계산하는 효율적인 반복 수행 기법이다(Dellaert, 2002). E스텝(expectation)과 M스텝(maximization)을 번갈아 수행하면서 반

복하게 되는데, E스텝에서는 현재의 추정으로부터 기대치의 로그 우도함수를 만들고, M스텝에서는 로그 우도를 최대화시키는 파라미터를 도출하여 다음 E스텝으로 넘겨준다. 이 과정에서 이전 스텝과의 로그 우도 차이가 임계치 이하가 되면 최대우도에 수렴한 것으로 간주한다.

이렇게 하여 도출된 각 멤버의 가중치를 이용하면 대상변수의 기대치는 식(4)와 같이 가중평균으로 표현된다.

$$E[y|f_1, \dots, f_k] = \sum_{k=1}^K w_k \tilde{f}_k \quad (4)$$

본 연구에서는 27년간의 19개 멤버로 구성된 일평균기온의 매치업 DB를 구성한 후, 편이보정을 수행하고 EM 알고리즘으로 멤버별 가중치를 도출하여 가중평균을 취하는 방식으로 EBMA 앙상블을 산출하였다.

3. 실험자료 및 방법

CMIP5에 포함된 21개 모형 중 다른 모형과의 상관도가 현저하게 떨어지는 모형 1개와, 1년을 360일로 구성된 모형 1개를 제외하고 19종의 GCM을 사용하였으며, EBMA 훈련을 위한 참조 기준자료로는 ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)의 재분석장을 사용하였다. 이 때, GCM의 베이스라인 기간과 ECMWF 재분석장의 시기상 교집합인 1979~2005년을 훈련기간으로 설정하였으며, 27년간의 일평균기온에서 윤년의 2월 29일 자료는 제외하고 매치업을 구성하여 실험을 수행하였다. 훈련 결과로 도출된 모델별 가중치는 2006~2100년 기간의 RCP6.0 시나리오 기반의 일평균기온에 적용하여 앙상블을 산출하였다.

앙상블 대상변수로는 가장 널리 사용되는 기후

Table 1. GCMs used in this study.

Model name	Row	Column	Organization (Country)
bcc-csm1-1	64	128	Beijing Climate Center (China)
bcc-csm1-1-m	160	320	Beijing Climate Center (China)
BNU-ESM	64	128	Beijing Normal University (China)
CanESM2	64	128	Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (Canada)
CCSM4	192	288	National Center for Atmospheric Research (USA)
CNRM-CM5	128	256	Centre National de Recherches Météorologiques, Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (France)
CSIRO-Mk3-6-0	96	192	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization/ Bureau of Meteorology (Australia)
EC-EARTH	160	320	EC-EARTH consortium published at Irish Centre for High-End Computing (Netherlands/Ireland)
GFDL-CM3	90	144	Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (USA)
GFDL-ESM2G	90	144	Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (USA)
GFDL-ESM2M	90	144	Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (USA)
IPSL-CM5A-LR	96	96	Institut Pierre Simon Laplace (France)
IPSL-CM5A-MR	143	144	Institut Pierre Simon Laplace (France)
MIROC5	128	256	Atmosphere and Ocean Research Institute (Japan)
MIROC-ESM-CHEM	64	128	Atmosphere and Ocean Research Institute (Japan)
MPI-ESM-LR	96	192	Max Planck Institute for Meteorology (Germany)
MPI-ESM-MR	96	192	Max Planck Institute for Meteorology (Germany)
MRI-CGCM3/	160	320	Meteorological Research Institute (Japan)
NorESM1-M	96	144	Bjerknes Centre for Climate Research (Norway)

요소인 일평균기온을 선정하였으며, 1979~2005년의 훈련기간 동안 멤버로 사용된 GCM은 Table 1과 같다. 이들은 IPCC 5차 보고서의 실험에 사용되어진 모델로서 CMIP5에서 자료를 제공하고 있다. 참조기준값으로 사용한 ECMWF 재분석장은 ERA-Interim으로서 4차원 변분법의 자료동화를 통해 하루 4회, 6시간 간격으로 자료가 생산된다. 본 연구에서는 일평균기온을 계산하기 위해서 4개 시간대(0시, 6시, 12시, 18시) 기온값의 산술평균을 취하였다.

연구지역은 동아시아 영역으로 북위 20~50도, 동경 100~150도의 범위로 하였고, 앙상블 격자의 크기는 1°로 하여 세로 31개, 가로 51개의 1,581

개 격자점을 구성하였다. GCM마다 상이한 격자 크기를 가지고 있으므로, 각 멤버의 격자점과 앙상블 격자점은 최소거리 기준으로 매칭하였다. 이로써 19개 GCM 및 ECMWF 분석장에 대하여 15,580,755개(27년×365일×1,581지점)의 매치업이 구성되어 EBMA 훈련에 사용되었다.

본 연구에서 EBMA는 크게 두 가지 방법으로 수행되었는데, 첫 번째는 전체 훈련자료를 월별로 나누어 모델별 편이보정 및 가중치를 도출하는 방법이다. 즉, 27년간의 일평균기온 자료를 12개의 월별 그룹으로 나누어 19종의 GCM별로 선형회귀식을 이용한 편이보정을 수행하고, 편이보정된 GCM 예측치로부터 EM 알고리즘을 통하여 가중

치를 도출하여 가중평균 앙상블을 산출하는 것으로서, 이는 일평균기온이 계절별 혹은 월별로 패턴을 달리할 수 있기 때문이다. 두 번째는 12개의 월별 그룹을 다시 공간적으로 세분화하여 모델별 편이보정 및 가중치를 도출하는 방법이다. 즉, 월별 그룹 내에서 1,581개 격자점별로 EBMA를 수행하는 것으로서, 이는 일평균기온에 대한 각 모델의 모의결과가 계절적 패턴과 함께 공간적 패턴을 가질 수 있기 때문에 필요하다.

본 연구에서는 편의상 이러한 월별 접근법을 EBMA.v1이라 표기하고, 월별-격자점별 접근법을 EBMA.v2라 표기하기로 한다. 두 방법 모두 많은 양의 계산을 필요로 하므로, R 통계패키지의 병렬처리를 기능을 이용하여 27년간의 일평균기온 자료의 EBMA 훈련을 수행하고 검증통계를 도출하였으며, 훈련결과 가중치를 적용하여 2006~

2100년의 일평균기온 앙상블을 산출하였다.

4. 결과 및 고찰

1) 월별 EBMA.v1

1979~2005년 기간의 EBMA.v1 훈련에 있어 일평균기온의 계절성을 반영하기 위하여, 월별 및 멤버별로 ECMWF 재분석장을 기준으로 선형회귀식을 적용하여 편이보정을 수행한 후 EM 알고리즘을 통해 도출한 가중치체계는 Table 2 및 Figure 1과 같다. 멤버별로 가중치 편차가 크게 나타났는데, 이는 산술평균이나 중위수처럼 가중치를 고려하지 않는 앙상블에 비해 EBMA.v1이 효과적일 수 있음을 의미하는 것이다. 또한 각 앙상블 멤버에 대한 월별 가중치 편차도 크게 나타나

Table 2. Weighting scheme of EBMA.v1 (weighted by month) for each month.

Model name	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
bcc.csm1.1	0.021	0.023	0.036	0.121	0.179	0.118	0.096	0.093	0.091	0.058	0.025	0.020
bcc.csm1.1,m	0.011	0.024	0.063	0.105	0.110	0.145	0.157	0.123	0.065	0.063	0.044	0.025
BNU,ESM	0.098	0.082	0.105	0.061	0.039	0.030	0.021	0.044	0.068	0.078	0.067	0.090
CanESM2	0.006	0.007	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.005	0.007	0.012	0.009
CCSM4	0.016	0.006	0.012	0.003	0.002	0.004	0.008	0.013	0.011	0.009	0.021	0.027
CNRM,CM5	0.093	0.121	0.073	0.049	0.066	0.058	0.035	0.024	0.044	0.092	0.073	0.097
CSIRO,MK3.6.0	0.100	0.129	0.161	0.151	0.147	0.111	0.070	0.037	0.048	0.080	0.109	0.122
EC,EARTH	0.051	0.052	0.044	0.040	0.026	0.089	0.156	0.126	0.077	0.041	0.035	0.028
GFDL,CM3	0.077	0.060	0.046	0.057	0.048	0.098	0.132	0.135	0.118	0.129	0.081	0.097
GFDL,ESM2G	0.065	0.082	0.070	0.080	0.058	0.056	0.066	0.091	0.111	0.085	0.082	0.081
GFDL,ESM2M	0.076	0.058	0.061	0.048	0.056	0.051	0.072	0.085	0.070	0.085	0.055	0.057
IPSL,CM5A,LR	0.039	0.026	0.037	0.005	0.004	0.004	0.001	0.004	0.016	0.046	0.043	0.049
IPSL,CM5A,MR	0.032	0.025	0.014	0.006	0.003	0.001	0.000	0.000	0.003	0.006	0.018	0.007
MIROC5	0.123	0.110	0.120	0.137	0.117	0.031	0.007	0.014	0.013	0.032	0.123	0.115
MIROC5,ESM,CHEM	0.021	0.037	0.027	0.009	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.019	0.033
MPI,ESM,LR	0.069	0.064	0.048	0.065	0.042	0.076	0.069	0.064	0.085	0.055	0.059	0.046
MPI,ESM,MR	0.036	0.043	0.046	0.033	0.034	0.049	0.041	0.045	0.050	0.046	0.037	0.041
MRI,CGCM3	0.047	0.035	0.021	0.022	0.042	0.045	0.028	0.068	0.102	0.076	0.076	0.044
NorESM1,M	0.020	0.016	0.014	0.007	0.023	0.032	0.041	0.034	0.024	0.011	0.020	0.014

EBMA.v1 훈련을 월별로 수행한 것이 적절했음을 보여준다.

이러한 월별 및 멤버별 가중치를 적용하여 훈련

기간에 대한 일평균기온 앙상블을 산출하여 9,855 세트(27년×365일)의 자료에 대하여 ECMWF 재분석장과의 오차를 계산하였다. 또한 일반적으

Figure 1. Weighting scheme of EBMA.v1 (weighted by month) for each member.

Figure 2. Validation statistics of ensemble mean, ensemble median, and EBMA.v1 (weighted by month) for the period of 1979-2005 ($^{\circ}\text{C}$).

로 사용되는 산술평균 앙상블 및 중위수 앙상블을 추가적으로 산출하여 오차특성을 비교해 보았다. 훈련기간 동안의 EBMA.v1의 정확도 향상 효과 및 계절별 특성을 살펴보기 위하여, Figure 2에서 ECMWF 재분석장과의 상관계수, 평균편이, MAE(Mean Absolute Error), RMSE(Root-Mean-Square-Error) 등을 월별로 나타내었다.

상관계수는 산술평균과 중위수가 0.919에서 0.952 사이, EBMA.v1이 0.931에서 0.954 사이의 값을 보였으며, 여름철보다 겨울철의 상관계수가 높게 나타났다. 평균편이는 EBMA.v1에서는 거의 0으로 나타나 편이보정이 잘 이루어졌음을 알 수 있다. 산술평균과 중위수에서는 겨울철에는 평균 편이가 -0.5 이하로 양호했으나 여름철에는 음의

Figure 3. RMSE of EBMA.v1 (weighted by month) for the period of 1979-2005 ($^{\circ}\text{C}$).

오차가 커져 -1.5 가까이 이르는 것으로 나타났다. 이는 대부분의 GCM들이 여름 기온을 과소추정 한다는 것이며, 바꾸어 말하면 GCM들이 예상한 것보다 1979~2005년 기간 중의 실제 여름 기온이 더 높았다는 것을 의미한다. MAE와 RMSE를 비교했을 때에도 EBMA.v1이 대체로 가장 낮은 오차를 보였으며 특히 여름철에 개선효과를 뚜렷한 것을 확인할 수 있다.

또한 Figure 3에는 훈련기간 중 EBMA.v1의 RMSE 공간분포를 나타내었는데, 전반적으로 북서쪽 내륙에서 오차가 크고 남동쪽 해양에서는 오차로 작은 것으로 나타났다. 특히 북서쪽 내륙의 오차가 겨울철에 매우 크게 나타났는데, 이는 GCM들 대부분이 겨울철의 동아시아 내륙에서 정확도가 높지 않다면 EBMA.v1을 적용한다고 해도 어느 정도 이상의 효과를 거두기는 힘들다는 것을 의미한다. EBMA.v1은 계절성을 고려하여 월별

가중치를 사용하기는 했으나, 내륙-해양에 따라 그리고 위도에 따라 다르게 나타나는 기온 분포의 특성을 반영하지는 못하는 한계가 있으며, 이러한 기온에 대한 각 모델 모의결과의 이질성에 대처하기 위해서는 월별뿐 아니라 격자점별로 가중치체계를 구성할 필요가 있다.

2) 월별-격자점별 EBMA.v2

기온분포의 공간적 이질성을 반영하기 위하여 EBMA.v2에서는 월별-격자점별로 편이보정을 수행하고 가중치체계를 구성하여 앙상블을 산출하였다. 9,855세트(27년 $\times$ 365일)의 일평균기온 앙상블에 대하여 ECMWF 재분석장과의 오차를 계산한 결과, EBMA.v2가 EBMA.v1보다 일관적으로 더 좋은 성능을 나타냈음을 알 수 있다(Figure 4). EBMA.v1에서 정확도 향상 효과가 미약했던 겨울철에도 EBMA.v2에서 상당한 개선효과를 보

Figure 4. Validation statistics of ensemble mean, ensemble median, EBMA.v1 (weighted by month), and EBMA.v2 (weighted by month and by grid point) for the period of 1979-2005 (°C).

Figure 5. RMSE of EBMA.v2 (weighted by month and by grid point) for the period of 1979-2005 ($^{\circ}\text{C}$).

였다.

Figure 5에는 훈련기간에 대한 월별-격자점별 EBMA.v2의 RMSE 공간분포를 나타내었는데, Figure 3의 월별 EBMA.v1에 비해 전반적으로 모든 격자점에서 RMSE가 줄어든 것을 확인할 수 있다. Figure 6은 월별 EBMA.v1 RMSE에서 월별-격자점별 EBMA.v2 RMSE를 뺀 값, 즉 정확도의

향상분을 나타낸 것으로서, 동아시아 전역에 걸쳐 정확도가 향상되었음이 확인되었다. 특히 EBMA.v1에서 문제시되었던 북서쪽 내륙에서 그 개선의 효과가 큰 것을 알 수 있으며, 이는 공간 세분화를 통하여 앙상블을 산출한 것이 유효했음을 보여준다고 할 수 있다. 하지만 여전히 연구지역의 북서쪽인 몽골지역에서 큰 오차가 발생하는 것을 확인

Figure 6. RMSE improvement by EBMA.v2 (weighted by month and by grid point) against EBMA.v1 (weighted by month) for the period of 1979-2005 (°C).

할 수 있다. Figure 7은 훈련기간인 27년 동안 19개 GCM 일자로 표준편차의 월평균을 나타내는데, Figure 3과 5의 오차분포와 유사한 양상이 나타났다. 즉 연구지역 북서쪽에서 앙상블 후에도 겨울철 오차가 상당히 발생하는 이유는 각 모델의 예측값이 겨울철에 매우 상이하게 모의되었기 때

문인 것으로 사료된다.

Figure 8과 9에서는 앙상블 멤버인 19종의 GCM, 산술평균 및 중위수 앙상블, 월별 EBMA, v1, 월별-격자점별 EBMA.v2의 오차통계를 비교하기 위하여 테일러 다이어그램을 도식하였다. 참조기준자료인 ECMWF 재분석장에 대하여, 각

Figure 7. Standard deviation of 19 GCMs for the period of 1979-2005 (°C).

멤버들은 0.9 정도의 상관도를 보이지만, 앙상블을 통하여 상관도가 0.95 정도로 향상됨을 확인하였다. 이때 산술평균 및 중위수 앙상블이나 월별 EBMA.v1에 비해 월별-격자점별 EBMA.v2의 표준편차 분포가 참고기준자료에 더 근사하게 나타났음을 알 수 있다.

5. 결론

본 연구에서는 CMIP5에서 제공하는 19종의 GCM으로부터 일평균기온 앙상블을 산출함에 있어, 일반적인 산술평균 및 중위수, 월별 EBMA.v1 이외에도 월별-격자점별 EBMA.v2를 이용하여 앙상블 성능을 비교평가 하였다. 많은 멤버 및

Figure 8. Taylor diagram for 19 GCMs (in gray), ensemble mean (in blue), ensemble median (in green), EBMA.v1 (in yellow), and EBMA.v2 (in red) from January to June, 1979-2005.

Figure 9. Taylor diagram for 19 GCMs (in gray), ensemble mean (in blue), ensemble median (in green), EBMA.v1 (in yellow), and EBMA.v2 (in red) from July to December, 1979-2005.

장기간의 자료로 앙상블을 산출하고 분석한 결과, 산술평균 및 중위수 앙상블에 비해 월별 EBMA.v1에서 정확도가 개선되었으며, 또한 월별-격자점별 EBMA.v2에서 개선효과가 더욱 큰 것으로 나타났다. 월별 EBMA.v1는 여름철에 개선효과가 있었으나, 월별-격자점별 EBMA.v2는 여름철뿐 아니라 겨울철에도 개선효과가 상당히 나타났다.

또한 연구지역에 오차의 공간분포를 살펴보았을 때, 위도에 따른 차이뿐만 아니라 내륙-해양의 차이가 상대적으로 크게 나타났는데, 이는 해양보다 육지에서 표면의 비균질성이 크기 때문에 그만큼 복잡한 물리과정을 모델링할 때 난점이 존재하기 때문인 것으로 사료된다. 이에 대한 추가적인 고려로 연구지역을 격자점별로 세분화하여 적용한 EBMA.v2에서 이러한 문제점이 상당히 극복됨을 확인하였다. 이는 월별-격자점별 가중치체계를 통해 계절적 변동뿐 아니라 지역적 변동에 대처할 수 있기 때문이다.

최종적으로 이러한 월별-격자점별 가중치체계를 RCP6.0 시나리오에 적용하여 동아시아의 2006~2100년 일평균기온 앙상블을 산출하였으며, 이 자료는 인터넷을 통해 제공할 예정으로 있다. 향후 연구에서는 여러 RCP 시나리오(2.6, 4.5, 6.0, 8.5)에 월별 EBMA.v1 및 월별-격자점별 EBMA.v2를 적용하여 산출된 결과의 시계열 패턴을 분석해보고, 2005년 이후의 재분석자료를 이용하여 CRPS(Continuous Ranked Probability Score) 등의 통계량을 이용한 평가를 수행하고자 한다.

사사

본 연구는 기상청 국가기상위성센터 “정지궤도 기상위성 지상국 개발(NMSC-2017-01)” 사업의 일환으로 ETRI에서 추진하는 “융합분야 활용기술 개발” 과제의 지원으로 수행되었습니다.

References

- Bae, D.-H., Jung, I.-W., Lee, B.-J., and Lee, M.-H., 2011, Future Korean Water Resources Projection Considering Uncertainty of GCMs and Hydrological Models. *Journal of Korea Water Resources Association*, 44(5), 389-406 (in Korean).
- Claeskens, G. and Hjort, N. L., 2008, *Model Selection and Model Averaging*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dellaert, F., 2002, *The expectation maximization algorithm*, Georgia Institute of Technology, Technical Report Number GIT-GVU-02-20.
- Dempster, A. P., Laird, N. M., and Rubin, D. B., 1977, Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm, *Journal of the royal statistical society, Series B (methodological)*, 39(1), 1-38.
- Deser, C., Phillips, A., Bourdette, V., and Teng, H., 2012, Uncertainty in climate change projections: the role of internal variability, *Climate Dynamics*, 38(3-4), 527-546.
- Duan, Q., Ajami, N. K., Gao, X., and Sorooshian, S., 2007, Multi-model ensemble hydrologic prediction using Bayesian model averaging, *Advances in Water Resources*, 30(5), 1371-1386.
- Giorgi, F. and Mearns, L. O., 2002, Calculation of average, uncertainty range, and reliability of regional climate changes from AOGCM simulations via the “Reliability Ensemble Averaging” (REA) method. *Journal of Climate*, 15(10), 1141-1158.
- Hoeting, J. A., Madigan, D., Raftery, A. E., and Volinsky, C. T., 1999, Bayesian model averaging: a tutorial, *Statistical science*, 14(4), 382-401.
- IPCC, 2014, *Climate Change 2014: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, Pachauri, R. K. and Meyer, L. A. (eds.)], IPCC, Geneva, Switzerland, 151pp.

- Kim, K., Yoon, M., Cho, J., Hong, S., Yoon, H., Mo, H., and Lee, Y.-W., 2016, Blending of satellite SST products using ensemble Bayesian model averaging (EBMA), *Remote Sensing Letters*, 7(9), 827-836.
- Kim, T.-J., Kwon, H.-H., Lee, D.-R. and Yoon, S.-K., 2014, Development of Stochastic Downscaling Method for Rainfall Data Using GCM, *Journal of Korea Water Resources Association*, 47(9), 825-838 (in Korean).
- Leith, C. E., 1974, Theoretical skill of Monte-Carlo forecasts, *Monthly Weather Review*, 102(6), 409-418.
- Min, S.-K., Simonis, D., and Hense A., 2007, Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 365(1857), 2103-2116.
- Raftery, A. E., Gneiting, T., Balabdaoui, F., and Polakowski, M., 2005, Using Bayesian model averaging to calibrate forecast ensembles, *Monthly Weather Review*, 133(5), 1155-1174.
- Sloughter, J. M., Gneiting, T., and Raftery, A. E., 2013, Probabilistic wind vector forecasting using ensembles and Bayesian model averaging, *Monthly Weather Review*, 141(6), 2107-2119.
- Vrugt, J. A., Diks, C. G., and Clark, M. P., 2008, Ensemble Bayesian model averaging using Markov chain Monte Carlo sampling, *Environmental fluid mechanics*, 8(5-6), 579-595.

책임편집: 박창용

영문교열: 이은걸