INVITED REVIEW

COVID-19'a karşı güncel klinik denemeler ve aşı geliştirme stratejileri ve gelecekteki salgın riskinin yönetilmesi (korunma, kontrol ve tedavi)

Bahattin Taylan Koç¹

¹Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Geliş:14.08.2020, Kabul: 20.10.2020

*btkoc@adu.edu.tr

Current clinical trials and vaccine development strategies COVID-19 infection and how to manage the risk of future outbreaks (prevention, control, and treatment)

Eurasian J Vet Sci, 2020, Covid-19 Special Issue, 91-98

DOI: 10.15312/EurasianJvetSci.2020.299

Öz

Bu makalenin temel amacı, COVID-19/SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı tedavi ve aşı çalışmalarına ait global ölçekte yürütülen klinik denemeler hakkında bilgi sunmaktır. Bu kapsamda dünyada iletişim ağı güçlü olan resmi firmalardan alınan günlük veriler ile daha yoğun çalışılan konular dikkate alınacaktır. Derlemenin ikinci amacı ise COVID-19/SARS-CoV2 veya gelecekte yaşanabilecek yeni salgınlara karşı uygulanabilecek tedavi ve korunma-kontrol ölçütlerini ele almaktır. Hem SARS-CoV2'de yaşanabilecek ikinci ve üçüncü dalgalar da daha ön plana çıkan terapötikler hem de diğer virus enfeksiyonlar da kullanılabilecek yeni nesil antiviral metotlar hakkında bilgi verilecektir. COVID-19/SARS-CoV2 için birçok terapötik ve aşı denemesi hızla devam etmektedir. Klinik çalışmaların yoğun bir şekilde yapılıp anında çevrimiçi platformlarda paylaşılması, tedavi ve aşı yöntemlerinin geliştirilmesini hızlandırmaktadır. Korunma-kontrol ise halen en önemli konu olup, hastalıklarla mücadelede halen en önemli ve basit ölçüttür. Bu ölçütü en üst düzeye taşımak için ise COVID-19/SARS-CoV2 gibi zoonoz potansiyele sahip olan her virus için "Tek Sağlık, Tek Tıp, Tek Viroloji" konsepti ile mücadele esas alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: COVID-19, SARS-CoV2, tek sağlık, viroloji, klinik denemeler

Abstract

The main purpose of this article is to provide information on the global clinical trials of treatment and vaccine studies against COVID-19 / SARS-CoV2 infection. In this context, daily data from official companies with strong communication networks in the world and more intensive issues will be considered. The second purpose of the review is to address the treatment and prevention-control criteria that can be applied against COVID-19 / SARS-CoV2 or new outbreaks that may occur in the future. Information will be given about the second and third waves that can be experienced in SARS-CoV2, the therapeutics that are more prominent, and the new generation antiviral methods that can be used in other virus infections. Many therapeutic and vaccine trials for COVID-19 / SARS-CoV2 are ongoing. Conducting intensive clinical studies and sharing them instantly on online platforms accelerates the development of treatment and vaccine methods. Prevention-control is still the most important issue, and combating diseases is still the most important and simple criterion. In order to maximize this criterion, struggle with the concept of "One Health, One Medicine, One Virology" should be taken as a basis for every virus with zoonotic potential such as COVID-19 / SARS-CoV2.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV2, one health, virology, clinical trials

Giriş

Coronavirus Hastalığı 19 (COVID-19) salgını Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. COVID-19'un etkeni daha önce 2000'li yılların başında "Şiddetli Akut Respiratorik Sendrom-Severe Acute Respiratory Syndrome" (SARS-CoV) olarak lokal salgınlara neden olan virusun zoonotik orijinli olan varyantı olduğu kabul edilmektedir (Maiti 2020). Bunun nedeni ise, gelişen yeni nesil sekanslama metotları ve hastalık hakkında sağlanan klinik verilerin online platformlarda hızlı bir şekilde paylaşılarak identifikasyonunun yapılmasıdır (Paden ve ark 2020). Önceleri "novel coronavirus" 2019 (nCoV-2019) olarak isimlendirilen bu virus söz konusu araştırmalar neticesinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Virus Taksonomi Komitesi (ICTV) tarafından SARS-CoV2 ismi kabul edilmiştir (Coronaviridae Study Group of the ICTV 2020).

Coronavirus, genom olarak tek sarmallı, pozitif polariteli ve segmentsiz RNA'ya sahiptir. Viral genom yaklaşık 27 kb uzunluğundadır. *Coronaviridae* ailesi iki alt aileye ayrılır ve bunlardan biri olan *Orthocoronavirinae*, çoğunlukla insanları enfekte eden virusları içerir. *Orthocoronavirinae* alt ailesinin *Alfa*-, *Beta*-, *Gamma*-, *Deltacoronavirus* olmak üzere dört genusu vardır. Bu dört genus ayrıca alt genuslara da ayrılır. Taksonomi kurulu tarafından yapılan sınıflandırma ile, SARS ve SARS-CoV2, *Betacoronavirus* genusunda yer alan *Sarbecovirus* alt genusunda bulunmaktadır (ICTV 2019).

SARS-CoV2, 11 Ağustos 2020 WHO verilerine göre yaklaşık 20 milyona varan vakaya ve 750.000'e yakın ölüme neden oldu. Bu rakamlar, dünyanın tüm bölgelerinden gelen günlük raporlarla sürekli olarak değişmektedir (WHO COVID-19 2020). Öte yandan, bu duruma karşı COVID-19'un yayılmasını engelleyen akademik ve klinik çalışmalar artmaktadır (NIH Clinical Trials 2020a).

SARS-CoV2 temel olarak insanların solunum yollarını ve akciğerlerini etkilemektedir. En sık görülen klinik bulgu insanlarda şiddetli pnömonidir. Bununla birlikte, vakaların büyük bir çoğunluğu, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi asemptomatik veya hafif semptomlarla seyretmektedir (Zhang ve ark 2020). Nadiren, son raporlara göre, böbrek, karaciğer ve lenfatik sistemler gibi bazı hayati organlar da bazı durumlarda etkilenmiştir. Bugün hem klinik hem de özel laboratuvar SARS-CoV2'nin mekanizması ve patogenezi hakkında birçok çözülmemiş karmaşık soru vardır (Maiti 2020, Zhang ve ark 2020).

Bu kapsamda, derlemede aşı ve antiviral geliştirilmesi için devam eden klinik çalışmalar ve ilgili stratejiler dikkate alınacaktır. SARS-CoV2 tarafından gelecekteki olası salgınlar için yönetim stratejileri ve potansiyel varyantlar tartışılacaktır. Ayrıca, yeni nesil ilaçların ve aşıların geliştirilmesinin önemi de vurgulanacaktır.

Klinik denemeler

Klinik çalışmalar genel olarak "aşı geliştirme" ve "antiviral geliştirme" olmak üzere iki ana araştırma bölümü olmuştur. Dünya genelinde neredeyse tüm klinik araştırmalar WHO web sitesinde ve Amerikan Ulusal Biyoteknoloji Enformasyon Merkezi /Ulusal Sağlık Enstitüsü (NCBI/NIH) veritabanlarında mevcuttur (NCBI, WHO). 10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla toplamda 2935 tamamlanmış ve devam eden çalışma bu veri tabanında sunulmuştur. Klinik deneme olan çalışma sayısı ise 1645'tir (Şekil 1). Klinik denemeler dört faz olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Bu çalışmaların 382'si Faz 3, 77'si Faz 4 seviyesindedir (NIH Clinical Trials 2020a). Ülkemizde ise, Favipiravir ve hidroksiklorokin ile deneysel tedavi temelli çalışma tek Faz 3 çalışması olup, Faz 4 seviyesinde yürütülen herhangi bir çalışma henüz bulunmamaktadır. NCBI ve WHO'nun kayıtlarına göre aşı geliştirilmesine ait kli-

Tablo 1. İlaç ve aşı çalışmaları sırasında uygulanan klinik deneme fazları

Aşamalar	Uygulamalar	Dozaj	Katılımcı	Başarı oranı	Açıklama
Faz I	Güvenlik için sağlıklı gönüllüler üzerinde doz-aralığı belirleme	Genellikle terapötik düzeyin altı, ancak artan dozlarda	20-100 normal sağlıklı gönüllü	Yaklaşık %70	İlaç etkinliğini kontrol etmek için güvenli olup olmadığını belirler.
Faz II	Etkinliğini ve yan etkilerini değerlendirmek için katılımcılar üzerinde ilaç testi	Terapötik doz	Belirli bir hastalığı olan 100-300 katılımcı	Yaklaşık olarak %33	İlacın herhangi bir etkinliği olup olmadığını belirler. Bu noktada, ilacın herhangi bir terapötik etkisi olduğu öngörülemez.
Faz III	Etkinliğini, etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için katılımcılar üzerinde uyandırıcı testi	Terapötik doz	Belirli bir hastalığı olan 300-3000 kişi	%25-30	Bir ilacın terapötik etkisini belirler. Bu noktada, ilacın bazı etkileri olduğu öngörülebilir.
Faz IV	Kamu pazarlama (gözetim sonrası)	Terapötik doz	Bir hekimden tedavi almak isteyen herkes	Yok	Uzun vadeli etkileri izleme

Şekil 1. 10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye ve Dünya'da devam eden gözlemsel ve girişimsel klinik deneme sayıları (NIH Clinical Trials 2020a)

nik denemelerde Faz 4'te henüz bir çalışma mevcut değildir. Aşı ile ilgili çalışmalardan en çok aşama kaydeden çalışmalar Faz 3'te yer almaktadır (NIH Clinical Trials 2020b).

Farklı ülkelerden çeşitli laboratuvarlarda in vitro çalışmalar yeni antiviral gelişim devam etmektedir. Bununla birlikte, aşı geliştirme ve üretimi hala ulaşılması gereken ana hedeftir. Birçok ülke antiviral ve aşı geliştirilmesi üzerine çeşitli klinik çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte, diğerlerine kıyasla daha ileri faz denemelerinde olan bazı çalışmalar öne çıkmaktadır (NIH Clinical Trials 2020b). Bu çalışmalar COVID-19'un mümkün olan en kısa sürede önlenmesini teşvik etmektedir. Bu çalışmalar ayrıca çevrimiçi platformlarda başta WHO ve NIH olmak üzere çok sayıda sağlık kuruluşu tarafından günden günbegün geçirilmekte ve güncellenmektedir (Tablo 2).

COVID-19 ile ilgili klinik denemelerin hemen hepsi WHO ve NIH'in online platformlarından takip edilebilmektedir. Klinik denemeler kapsamında en çok ilerleme kaydedilen ilaç ve aşı tipleri aşağıda sunulmuştur.

İlaçlar

Favipiravir

Favipiravir RNA'ya bağımlı RNA polimeraz aktivitesini engelleyerek veya inhibe ederek virusun replikasyonunu engeller. Favipiravir özellikle influenza virusa karşı çok başarılı olmasından ötürü ön plana çıkmıştır. RNA viruslarının genel replikasyon stratejini engelleme potansiyeli olan farmakodinamiği ile bu tür salgınlarda da akla gelen ilk antivirallerden birisidir. Favipiravir, 8 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla dünya genelinde 32 klinik çalışmada denetlenmektedir. Bu çalışmalardan biri de Türkiye'de olup Hacettepe Tıp Fakültesi'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve birçok kurumun katıldığı Faz 3 seviyesinde devam eden bir projedir (NIH Clinical Trials 2020c).

Remdesivir

Remdesivir RNA viruslarına karşı geliştirilmiş geniş spektrumlu bir antiviraldir. Özellikle replikasyon sırasında RNA'ya bağımlı RNA polimeraz aktivitesini inhibe ederek etki eder. Remdesivir COVID-19 salgının etkeni SARS-CoV2 olduğu

Tablo 2. SARS-CoV2'ye karşı yapılan klinik denemeleri çevrimiçi paylaşan siteler

Organizasyon	İnternet linkleri	Orijin ülke
WHO	https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov	-
NIH	https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19	ABD
EU (Avrupa Birliği)	https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=covid-19	-
ChiCTR	http://www.chictr.org.cn/searchproj.aspx	Çin
Materia Medica	https://materiamedica.ru/en/specialists/clinical-trials/	Rusya
Kanada Resmi Sayfası	https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-clinical-trials/list-authorized-trials.html	Kanada

identifiye edildiği ilk anda gündeme gelmiş ve o günden bu yana klinik denemeler yapılmaktadır. Akla gelen ilk antiviral-lerden olmasının sebebi ise daha önce SARS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ve Ebola virus salgınlarında da kullanılan ilaçların başında gelmesidir (Holshue ve ark 2020, NIH Clinical Trials 2020b).

8 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla dünyada Remdesivir ile yapılan klinik deneme sayısı 44'tür. Faz 3 seviyesinde yapılan deneme sayısı ise 19'dur. Bu çalışmalardan üçü tamamlanmıştır. Elde edilen verilere göre her ne kadar yüksek bir uyum sağlamasa da Remdesivir diğer terapötiklere göre ön plana çıkan bir antiviraldir. Özellikle yan etkisinin diğer antiviral-lere göre düşük olması ve bu yüzden daha güvenilir olması bu duruma katkı sağlamaktadır (Holshue ve ark 2020). Nitekim Avrupa Birliği 29 Temmuz 2020'de yayınladığı raporda Remdesivir'in COVID-19 tedavisinde güvenli bir şekilde kullanılabilceğini üye ülkelere tavsiye etmiştir (EU EC 2020).

Ritonavir/Lopinavir

Ritonavir/Lopinavir proteaz inhibitörü antiviral maddelerdir. Temel olarak retroviral enfeksiyonlarda replikasyon aşamasında *pol* geni tarafından kodlanan proteaz enzimini inhibe ederler. Bu sayede başta HIV olmak üzere replikasyonunda proteaz enzimi kodlayabilen her virusa karşı kullanılmış veya denenmiştir. COVID-19 salgınında coronavirusların çeşitli proteaz kodlamasından dolayı deneysel tedavide kullanılan terapötiklerden biri olmuştur. Bu iki antiviral ile bazı çalışmalarda interferon (INF) kombine verilerek etkinliğini artırıp artmadığı araştırılmaktadır. Klinik denemelerde şu ana kadar somut bir veri ortaya konamamıştır. Bu doğrultuda WHO bu antiviral maddeler COVID-19'a karşı önerilen ilaçlar listesinden çıkarmıştır (WHO 2020).

Hidroksiklorokin

Hidroksiklorokin iyi bilinen ve sıtma tedavisinde kullanılan bir antiparaziterdir. Hidroksiklorokin COVID-19 salgını sırasında ilk olarak Fransa'da klinik olarak çalışılmıştır. Bunun nedeni ise, füzyon yolu ile konakçı hücreye penetre olan virüslerin hücre içinde oluşan endozomların içinde bulunan virus partiküllerinin pH'ı yükselterek serbest kalmasını engeller, dolaylı olarak virus replikasyonunu inhibe eder. Hidroksiklorokin daha önce Fransa'da Ebola virusuna karşı denenmiş bazı olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu bilgiler ışığında SARS-CoV2'ye karşı da etkili olabileceği düşünülüp klinik denemelerde kullanılmıştır. Klinik denemelerde bazı elde edilen pozitif geri dönüşler ile dünyada da ilgi uyandırmış ve Faz-4 düzeyinde en çok çalışılan terapötiklerden olmuştur. WHO ritonavir/lopinavir deki gibi önerilen ilaçlar listesinden çıkarmış olsa da 10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla dünyada hidroksiklorokin hakkında tamamlanmış ve devam eden 247 adet klinik çalışma kaydedilmiştir. Faz-4 düzeyinde ise 21 adet çalışma mevcuttur (NIH Clinical Trials 2020a).

Türkiye'de hidroksiklorokin ile yürütülen iki çalışma mevcuttur, 10 Ağustos 2020 tarihi ile biri sonlandırılmış diğeri ise halen aktiftir. Aktif çalışma favipiravir ile klinik denemesi ile aynı çalışma olup COVID-19'a karşı iki terapötik kombine olarak denenmektedir (NIH Clinical Trials 2020d).

Aşılar

10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla, dünyada kayıtlı 139 adet aşı adayına ait klinik deneme mevcuttur (NIH Clinical Trials 2020a). Ancak bu çalışmaların içinden, halen Faz-4 seviyeye ulaşan herhangi bir aşı adayı bulunmamaktadır. Buna karşın Faz-3 klinik denemelere ulaşabilen ve diğer aşı adaylarına nazaran daha önde ve umut veren bazı aşı adayları ve denemeleri mevcuttur. 10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Faz-3 klinik deneme aşamasında olan aşı adayı sayısı 4'tür. Bu aşı-lardan 3'ü yeni nesil metotlara dayanılarak geliştirilmiş aşı adayları olması bakımından da önemlidir. Söz konusu aşılar aşağıda vurgulanmıştır.

mRNA-1273 (Moderna)

COVID-19 salgının küresel olarak yayılım göstermeye başladığı zaman dilimi başlarında ilk aşı adayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere mRNA bazlı dizayn edilmiş bir aşıdır. Aşı, moleküller olarak komple genom dizini elde edilen SARS-CoV2'nin spike (S) proteinini kodlayan genlerin sentetik olarak elde edilmesi ile oluşturulmuştur. Laboratuvar ortamında dizayn edilip ve üretilen bu aşının güvenilirliği oldukça yüksektir. mRNA-1273 aşısı ABD orijinli Moderna firması tarafından tasarlanmış ve klinik denemelerine devam etmektedir. Faz-1 ve -2 denemeleri oldukça hızlı geçen ve başarılı sonuçlar veren bu aşı 10 Ağustos 2020 tarihinde Faz-3 düzeyindedir (NIH Clinical Trials 2020e). Bu aşı adayının klinik denemelerinin tamamlanıp piyasaya sürülme zamanı ise çalışma ekibi tarafından 2022'nin ikinci yarısı olarak öngörülmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre bu tarihlerin öne çekilmesinin mümkün olabileceği araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır.

CoronaVac (Sinovac)

COVID-19'a karşı oluşturulan ve ileri klinik denemede olan bir diğer aşı adayı Çinli Sinovac firması ve Brezilya'daki Butantan Enstitüsü tarafından çalışılmaktadır. Faz-3 klinik aşamasında olan söz konusu aşı klasik inaktive hücre kültürü aşısı olarak üretilmiştir. Aşı Faz-1 ve Faz-2 klinik çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak 21 Temmuz 2020'de Faz-3 klinik çalışmasına geçilmiştir. Söz konusu çalışmanın sonuçları ve aşının piyasaya sürülebilme zamanının 2021 yılının ikinci yarısı olarak öngörülmektedir (NIH Clinical Trials 2020f).

ChAdOx1 (Oxford)

ChAdOx1 replikasyon defektif simian adenoviral vektöre

SARS-CoV2'nin komple S genini insert ederek üretilen bir rekombinant aşıdır. Söz konusu aşı adayı için klinik denemeler, Oxford üniversitesi öncülüğünde toplamda İngiltere'de bulunan 18 farklı enstitü tarafından yürütülmektedir. ChAdOx1 10 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Faz-2/3 seviyesinde klinik denemelerdedir. Farklı yaş gruplarında toplamda 10560 kişilik gönüllü grubuna aşı adayının denemesi yapılacaktır. Çalışmanın tamamlanması Ağustos 2020 tarihi olarak yürütücü kuruluşlar tarafından bildirilmiştir. Ayrıca söz konusu aşı adayı Güney Afrika'da ayrı bir Faz-2/3 çalışması olarak HIV'li ve sağlıklı bireylerde klinik olarak denetlenmektedir (NIH Clinical Trials 2020g).

BT162b1/BT162b2 BioNTech,(Pfizer)

Pfizer firması ve Almanya menşeli BioNTech firmasının ortaklaşa yaptığı aşı çalışması da Faz-3 klinik seviyededir. Söz konusu aşı adayları BT162b1 ve BT162b2, Moderna tarafından üretilen aşıya benzer şekilde mRNA bazlı bir aşı adayıdır. Farklı olarak nükleozin modifiyeli mRNA aşı adayı olarak isimlendirilmiştir. Bu aşı çalışma prensibi olarak; SARS-CoV2'nin Spike proteininin RBD antijenini kodlayan modifiye mRNA'ların rekombine olarak üretilmesine dayanmaktadır. Aşının Faz-3 klinik çalışmalarının sonlanıp, Faz-4 klinik denemeleri başlama ve aşının piyasaya sürülme tarihi 2022 yılı olarak öngörülmektedir (NIH Clinical Trials 2020h).

Türkiye'de de aşı çalışmaları laboratuvar ortamlarında halen devam etmektedir. 9 Ağustos 2020'de resmi makamların yaptığı açıklamaya göre; Türkiye'de laboratuvar ve deneme hayvanı çalışmalarını bitirmiş klinik çalışmalara geçmeye hazır olan 2 aşı adayı olduğu vurgulanmıştır (Haberler.com 2020). Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen aşı çalışmasındaki bir aday ise klinik denemelere ulaşabilmiştir. Yakın zaman içinde klinik denemelere başlayacağı duyurulmuştur (TRT Haber 2020).

Direkt etkene yönelik aşı denemeleri yanısıra immün sistemi non-spesifik olarak uyararak bir bağışıklık oluşturmayı hedefleyen çalışmalar da mevcuttur. Tüberküloz aşısı (BCG), Karma aşı (KKK: Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık) gibi bazı aşılarda immünomodulator etkilerinden dolayı SARS-CoV2'ye karşı bağışıklık oluşturup oluşturmadığı klinik denemelerle takip edilmektedir (NIH Clinical Trials 2020a).

Gelecek salgınları yönetim ölçütleri (korunma, kontrol ve tedavi)

Tedavi

SARS-CoV2 gibi gelecekte ortaya çıkabilecek olası salgınlarda en temel konu korunma ve kontrol programıdır. Tedavi başlığı da ikincil olarak önem arz eden konudur. Özellikle virusların neden olduğu salgınlarda tedavi virusu hedefleyen, çabuk etki eden ve %100 etkinlik sağlayan herhangi bir ilaç mev-

cut değildir. Genellikle, bazı virus türlerine etkili antiviraller (ki yan etkisi yüksek veya etkinliği düşük) dışında, önerilen tedavi destekleyici, semptomatik tedavidir. SARS-CoV2'nin tedavisinde en çok kullanılan yöntem solunum (oksijen) desteğidir. Bunun yanında en önemli semptomlardan birinin ateş olması sebebiyle antipiretikler (parasetamol, ibuprofen) yoğun olarak kullanılmaktadır. Yangı durumuna karşı çeşitli antienflamatuvar ilaçlar (glukokortikosteroidler) da sıklıkla hastaların duruma göre kullanılmaktadır (Fragkou ve ark 2020).

En temel ve erişilebilir bu tedavi seçenekleri yanı sıra SARS-CoV2'ye karşı deneysel tedavi seçenekleri gündemde olup halen araştırmaları devam etmektedir. Nükleotit analogu ve viral enzimlerin aktivitesini bloke eden çeşitli antiviraller (Remdesivir, Ribavirin, Favipiravir, Ritonavir/lopinavir), plazma tedavisi, hidroksiklorokin, interferon, ivermectin (antiparaziter) ve bunlara benzer birçok farklı tedavi seçeneği denenmeye devam edilmektedir (Fragkou ve ark 2020) (Şekil 2).

Şekil 2. Dünya çapında yürütülen COVID-19 için tedavide kullanılması olası terapötiklerin klinik çalışmalarda orantısal diagramı (Fragkou ve ark 2020)

Ancak bu çalışmalar, direkt hasta insanlar üzerinde denendiği için normal protokollere oranla daha dikkatli ve yavaş ilerletilmektedir. Nitekim salgının ilk zamanlarından WHO tarafından SARS-CoV2'nin tedavisinde kullanılması uygun görülen hidroksiklorokin, devam eden araştırmalar sırasında elde edilen sonuçlara göre tedavide kullanılmaması gerektiği belirtilmiş ve listesinden çıkarılmıştır (WHO 2020).

Tedavi için kullanılan bu yöntemlerden en hızlı ve diğerlerine nazaran başarı oranı yüksek olanı immün-plazma tedavisi denilebilir. İmmün-plazma tedavisinde yöntemin özü hastalığı atlatan yetişkin bireylerde var olan nötralizan antikorların alınıp hasta olan bireylere verilmesidir (Verma ve ark 2020). İmmün-plazma ya da genel adıyla immünoterapi uygulanmasında bazı dezavantajlar mevcuttur. Düşük oranda olsa alerjik reaksiyonlara bağlı anafilaktik şok, koma ve ölüm riski mevcuttur (Verma ve ark 2020). Bunların dışında daha sıklıkla görülen yan etkiler antikora bağlı enfeksiyon

artışı (ADE) veya transfüzyona bağlı bozukluklardır (ani akciğer hasarı-TRALI ve sirkülasyona aşırı yüklenme-TACO). Plazma tedavisi direkt uygulamanın bu gibi ciddi riskleri bulunmasından ötürü araştırmacıların birçoğu plazmada yer alan spesifik nötralizan antikorların ve immunglobulinlerin purifiye elde edilerek kullanılmasını hedeflemektedir. Ayrıca laboratuvar ortamında elde edilebilecek yüksek spesifikite ve hacimde antikorlar, hastalığa acil müdahale şansını da arttıracaktır (Duan ve ark 2020, Joyner ve ark 2020, Verma ve ark 2020). Böylece elde edilebilecek antikorlar profilaktik amaçla da kullanılabilir. Yani kısa süreli pasif immunité için aşı olarak da değerlendirilebilir. Bu konu üzerine dünyada birçok araştırma yürütülmektedir (Duan ve ark 2020, Joyner ve ark 2020, Verma ve ark 2020).

Nano ilaçlar, akıllı moleküller ve virus spesifik terapi metotları (Teranostik metotlar) da son 10 yılda geliştirilmeye çalışılan antiviral alternatiflerdir. SARS-CoV2 ile beraber yeni nesil antivirallere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda yeni nesil antivirallerin sağlık sektöründe yaygınlaşması ve daha başarılı olma potansiyeli oldukça yüksektir. O yüzden gelecekte meydana gelebilecek pandemi durumlarında daha kesin tedavi imkanı sağlanması bu ilaçların başarılı bir şekilde geliştirilmesine bağlıdır. Akıllı nanomoleküller organik, inorganik ve virus benzeri partiküller olmak üzere genel olarak 3 sınıfa ayrılmıştır (Şekil 3). Genellikle bu sistemler antivirallerin daha güçlü etkilemesi için taşıyıcı platform olarak kullanılmaktadır. Ancak son yapılan bazı çalışmalarda bu partiküllere virus replikasyonunu engellemesi sağlayan özellikler de kazandırılmaktadır (Itani ve ark 2020). SARS-CoV2'nin genel solunum yolu viral enfeksiyonlarına model olarak belirlendiği çalışmalarda intranasal antiviral

taşıma modeli ile birçok nanopartikül denenebileceği belirtilmiştir. Bu da enjeksiyon bazlı yerine hedef dokuya hızlı etki edeceğinden daha yüksek bir terapi oranı sağlayabileceği in-silico olarak tasarlanmıştır (Şekil 4). Nanopartiküller ile zırhlandırılmış ve spesifikite kazandırılmış CD8+ T hücreleri (armed CD8+ T), small interfering RNA'lar (siRNA), crispr RNA (crRNA) gibi transkripsiyonel ve translasyonel aşamada yeni nesil tedaviler de geliştirilmeyi bekleyen önemli antiviral tedavi metotlarındandır (Itani ve ark 2020, Lombardo 2019).

Gelecekte olası virusa bağlı salgın veya pandemi durumunda, diğer terapötik araçlara oranla en ivedi şekilde adapte edilip kullanıma sokulabilecek olan terapi metodu immün-plazma yöntemi olarak görülmektedir. Bu yüzden herhangi bir virusa karşı bir kişide oluşan antikorların hızlı, spesifik ve güvenilir şekilde en purifiye haliyle elde edilmesini sağlayacak laboratuvar alt yapıları oluşturulmalıdır. Ayrıca bu tür çalışmaların hayvan modellemesi yapılarak daha geniş bazlı sonuçların elde edilmesi hedeflenmelidir. Böylece sadece SARS-CoV2 değil tüm virus salgınları ile mücadele gücü artacaktır.

Korunma-kontrol

SARS-CoV2 /COVID19 salgınında en önemli başlık korunma ve kontroldür. Korunma ve kontrol konusunda özellikle veteriner virolog ve veteriner epidemiyologların sağladığı veriler ve öneriler büyük önem arz etmektedir. SARS-CoV2 pandemisinde tüm dünya ülkelerinde bilim ya da danışma kurulları oluşturulmuştur. Bu kurulların ana hedefi hastalığın kontrol altına alınabilmesi ve vatandaşların hastalıktan korunmasıdır. Pandeminin ilk zamanlarında, ülkelerde farklı yayılım pe-

Şekil 3. Antiviral platform olarak kullanılan yeni nesil nanopartiküllerin sınıflandırılması (Itani ve ark 2020)

Şekil 4. Yeni nesil nanopartikül bazlı antiviral maddeler ve genel soğuk algınlığı-gripte uygulama yolları (Itani ve ark 2020)

riyetleri olsa da hemen her ülke sokağa çıkma yasakları veya kısıtlamaları getirmiştir (BBC 2020). İçinde bulunduğumuz zaman diliminde (Ağustos 2020) olası "ikinci dalga" durumundan ötürü bu kısıtlamaları kaldıran birçok ülke tekrar uygulamaya başlamıştır (Euronews 2020).

Virus salgınlarında korunma temel olarak hastalığın çıktığı mihrakın izole edilerek sağlıklı bireylerin bu odaklardan uzak tutulmasıdır. İmkan varsa, bu sağlıklı bireylerin aşılanması veya profilaktik desteklenmesi gereklidir. Zorunlu durumlarda topluluk içinde sosyal mesafe ve maske kuralı da çok önemli fiziksel korunma yöntemleridir. Ayrıca genel temizlik ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyulması diğer fiziksel ana kriterlerdir. Yalnız bu uygulamalar her ne kadar hastalığın yayılmasının engellenmesinde ana uygulamalar gibi görünse de aslında koruma-kontrol programının son halkasıdır (WHO COVID-19 2020).

İlk halka ise hastalığın asıl çıkış noktasının önceden saptanabilmesini ve daha o kaynak noktasında virusun veya etkenin bertaraf edilmesidir. Bu eğer bir insan kaynağıysa acilen izolasyon yapılmalıdır. Fakat bir hayvan kaynaklı virus ise takibinin uzun süreler boyu yapılması ve gerekli önlemlerin alınarak her türlü araştırmanın yapılması esastır. Örneğin; SARS-CoV2 salgını öncesi Wuhan'da bulunan Viroloji Enstitüsü'nde yarasaların virus rezervuarlığı ve yaydıkları viruslar hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu enstitü tarafından 2005 yılından bu yana yapılan çalışmaların birçoğunda yarasaların birçok coronavirus alt tipine rezervuarlık yaptığı vurgulanmıştır (Ge X-Y ve ark 2013, Li ve ark 2005, Shi Z-L ve ark 2016, Yang ve ark 2015). Araştırmacıların o günkü destek fonu düşüklüğü ve disiplinlerarası çalışılması bu araştırmaların daha ileri gitmesini engellemiştir. Ayrıca global anlamda da ilgi gösterilmemesi de çalışmaların akıbetini negatif etkilemiştir. Söz konusu o çalışmalar günümüzde en çok okunan ve atıf alan çalışmalardır (Ge X-Y ve ark 2013, Li ve ark 2005, Shi Z-L ve ark 2016, Yang ve ark 2015).

Bu araştırmalar tüm dünya ülkeleri ve ülkemiz için bir zorunluluğu göstermiştir. Ülke habitatını topyekün ele alıp çevresel koşullarda canlı-cansız kaynaklarda ne gibi salgın tehdidi yaratabilecek virusların olduğu ortaya konmalıdır. Özellikle ülkemizde daha önce varlığı birçok kez ortaya konan vektör ya da rezervuar aracılı virusların dinamik olarak takibi ve bunlara karşı alınabilecek önlemler aktif olarak çalışılmalıdır. Özellikle virus rezervuarlığı açısından yarasalarla ilgili ülkemizde sadece bir çalışma bulunmaktadır (Tunçman ve ark 1959). Ülkemizde yer alan virus habitatına paralel olarak taşıdıkları viruslar ve olası salgın tehditleri de araştırılmalıdır.

Ülkeye giriş-çıkışlar sıkı denetlenmeli, özellikle hastalıkların ari olduğu bölgelere kontrollü giriş-çıkış yapılmalıdır. Virusların dinamik mutasyonel mekanizmaları olmasından ötürü mesafeli ve kontrollü yaşam büyük önem arz etmektedir.

Öneriler

SARS-CoV2 / COVID-19 salgını her ne kadar olumsuz olsa da günümüzde gerçekleri somut bir şekilde ortaya koyması açısından araştırmacılar için önemli bir dönüm noktası olmuştur. 1800'lü yılların sonu ve 1900'lü yılların başından bu yana birebir hastalık ve enfeksiyöz ajanlarla birebir mücadele sağlık/tıp alanında güçlü bir kalkınma sağlamıştır. O dönemlerde hastalıkların yoğun olması ve ilaçların çabuk geliştirilmeye çalışılması aslında itici bir güç sağlamıştır. Özellikle son 30 yılda moleküler tıbbın gelişmesi ile ex vivo ya da in vitro ortamda birçok modelleme yapılmıştır. Ancak bu modellemelerin birçoğu gerek etik açıdan gerekse uygulanabilirliği düşük olmasından dolayı sonuçlanamamıştır. COVID-19 salgını artık elde biriken teorik bilginin pratiğe dönmesinin gerekli olduğunu ortaya koymuştur.

Sağlık alanında çalışan bilim insanları, hastalıkların tedavisi ve önlenmesindeki gerçek duruma kıyasla tıbbın daha fazla ilerlediğini düşünse de, COVID-19, aslında yapılması gereken çok fazla araştırmanın olduğunu ortaya koymuştur. Potansiyel salgınları veya pandemileri, özellikle virus enfeksiyonlarını önlemek için iyileştirilebilir ve düzenlenebilir esnek yeni ilaç stratejilerinin tedavi ve önleme için tasarlanması gerekmektedir.

Dünya çapında araştırmacıların hazır araştırma konuları ve sistemleri buna entegre edilerek çözüm aranmaktadır. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan durum göstermiştir ki; hazırda olan veri veya uygulamalar bu tür ani çıkabilecek zoonoz kökenli virus salgınlarına karşı yetersiz kalmaktadır. Bilim dünyası artık bu tür modellemeleri ön görüp bunlara yönelik somut veri ve ürünler ortaya koymak ya da en azından hazır olan sistemsel donanımı-akışı hazır etmek zorundadır. Bu kapsamda üniversiteler-araştırma merkezleri, devlet kurumları tarafından desteklenmeli ve multidisipliner çalışma teşvik edilmelidir.

Günümüzde insan hekimliği, veteriner hekimliği, biyoloji, ekoloji, nanoteknoloji, enformatik gibi disiplinleri kapsayan geniş bir çatının oluşturduğu "Tek Sağlık" konseptine geçilmesiyle dünyada ve ülkemizde COVID-19 benzeri olağanüstü sağlık problemlerinin hızla aşılabilmesi mümkün kılacaktır.

Kaynaklar

- BBC 2020. British Broadcasting Company. <https://www.bbc.com/news/world-52103747> Erişim Tarihi: 18.07.2020.
- Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses, 2020. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. *Nat Microbiol*, 5(4), 536-544.

- Duan K, Liu B, Li C, Zhang H ve ark., 2020. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. *Proc Natl Acad Sci USA*, 117(17), 9490-9496.
- EU EC 2020. European Union European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1416 Erişim Tarihi: 08.08.2020.
- Euronews 2020. Euronews. <https://www.euronews.com/2020/07/28/coronavirus-germany-and-austria-battle-local-outbreaks-as-italy-sets-1-000-face-mask-fine> Erişim Tarihi: 08.08.2020.
- Fragkou PC, Belhadi D, Peiffer-Smadja N, Moschopoulos CD ve ark., 2020 Review of trials currently testing treatment and prevention of COVID-19. *Clin Microbiol Infect*, 26(8), 988-998.
- Ge X-Y, Li J-L, Yang X-L, Chmura AA ve ark., 2013. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. *Nature*, 503(7477), 535-538.
- Haberler.com 2020. Haberler.com Haber Sitesi. <https://www.haberler.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-iki-13492294-haberi/> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH ve ark., 2020. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. *N Engl J Med*, 382, 929-936.
- ICTV 2019. International Committee on Taxonomy of Viruses. https://talk.ictvonline.org/taxonomy/p/taxonomy-history?taxnode_id=201901846 Erişim Tarihi: 20.07.2020.
- Itani R, Tobaiqy M, Al Faraj A, 2020. Optimizing use of therapeutic nanoparticles as a life-saving strategy for treating COVID-19 patients. *Theranostics*, 10(13), 5932-5942.
- Joyner MJ, Bruno KA, Klassen SA, Stephen A ve ark., 2020. Safety update: COVID-19 convalescent plasma in 20,000 hospitalized patients. *Mayo Clin Proc*, 95(9), 1888-1897.
- Li W, Shi Z, Yu M, Ren W ve ark., 2005. Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses. *Science*, 310(5748), 676-679.
- Lombardo D, Kiselev MA, Caccamo MT, 2019. Smart nanoparticles for drug delivery application: Development of versatile nanocarrier platforms in biotechnology and nanomedicine. *J Nanomater*, 2019, 702518.
- Maiti AK, 2020. On the origin of SARS-COV2 virus. SSRN, (Basım Aşamasında)
- NIH Clinical Trials 2020a. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19> Erişim Tarihi: 11.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020b. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/results?pg=1&load=cart&id=NCT04400838+OR+NCT04368728+OR+NCT04470427+OR+NCT04456595> Erişim Tarihi: 07.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020c. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04411433?term=hydroxychloroquine&cond=covid&cntry=TR&draw=2&rank=1> Erişim Tarihi: 08.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020d. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04411433?term=hydroxychloroquine&cond=covid&cntry=TR&draw=2&rank=1> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020e. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=mRNA1273&cntry=&state=&city=&dist=> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020f. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04456595?term=sinovac&cond=Covid19&draw=2&rank=1> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020g. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Covid19&term=chAdOx1&cntry=&state=&city=&dist=> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- NIH Clinical Trials 2020h. National Institute of Health Clinical Trials. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=biontech&cond=Covid19&draw=2&rank=2> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- Paden CR, Tao Y, Queen K, Zhang J ve ark., 2020. Rapid, sensitive, full-genome sequencing of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2. *Emerg Infect Dis*, 26(10), 2401-2405.
- Shi Z-L, Guo D, Rottier PJM, 2016. Coronavirus: epidemiology, genome replication and the interactions with their hosts. *Virol Sin*, 31(1), 1-2.
- TRT Haber 2020. TRT Haber Sitesi. <https://www.trthaber.com/haber/saglik/yerli-covid-19-asisinin-takvimi-507628.html> Erişim Tarihi: 10.08.2020.
- Tuncman ZM, 1959. Rabies epidemiology and prevention. *Türk Tip Cemiy Mecm*, 25, 313-320.
- Verma HK, Farran B, Bhaskar LVKS, 2020. Convalescent plasma transfusion a promising therapy for coronavirus diseases 2019 (COVID-19): current updates. *Antib Ther*, 3(2), 115-125.
- WHO 2020. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19> Erişim Tarihi: 04.07.2020.
- WHO COVID-19 2020. World Health Organization COVID-19 Database. <https://covid19.who.int/> Erişim Tarihi: 11.08.2020.
- Yang X-L, Hu B, Wang B, Zhang Q ve ark., 2015. Isolation and characterization of a novel bat Coronavirus closely related to the direct progenitor of severe acute respiratory syndrome Coronavirus. *J Virol*, 90(6), 3253-3256.
- Zhang X, Cai H, Hu J, Lian J ve ark., 2020. Epidemiological, clinical characteristics of cases of SARS-CoV-2 infection with abnormal imaging findings. *Int J Infect Dis*, 94, 81-87.

Yazar Katkıları

Fikir/Kavram: Bahattin Taylan Koç

Tasarım: Bahattin Taylan Koç

Denetleme/Danışmanlık: Bahattin Taylan Koç

Veri Toplama ve/veya İşleme: Bahattin Taylan Koç

Analiz ve/veya Yorum: Bahattin Taylan Koç

Kaynak Taraması: Bahattin Taylan Koç

Makalenin Yazımı: Bahattin Taylan Koç

Eleştirel İnceleme: Bahattin Taylan Koç

CITE THIS ARTICLE: Koç BT, 2020. COVID-19'a karşı güncel klinik denemeler ve aşı geliştirme stratejileri ve gelecekteki salgın riskinin yönetilmesi (korunma, kontrol ve tedavi). *Eurasian J Vet Sci, Covid-19 Special Issue*, 91-98