Bolesnici s nefropatijom aristolohične kiseline na dijalizi u Slavanskom Brodu i arterijska hipertenzija

Patients with aristolochic acid nephropathy undergoing dialysis and arterial hypertension

Marijana Sarić*,
Ninoslav Leko

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod, Hrvatska

General Hospital „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod, Croatia

KLJUČNE RIJEČI: nefropatija aristolohične kiseline, arterijska hipertenzija, program kronične hemodijalize.

KEYWORDS: endemic nephropathy, arterial hypertension, chronic hemodialysis.

CITATION: Cardiol Croat. 2017;12(3):95. | **DOI:** <http://dx.doi.org/10.15836/ccar2017.95>

***ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:** Marijana Sarić, Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Štampareva 42, HR-35000 Slavonski Brod / Phone: 385-95-5880-268 / E-mail: majasarić03@gmail.com

ORCID: Marijana Sarić, <http://orcid.org/0000-0002-4598-2699> • Ninoslav Leko, <http://orcid.org/0000-0002-2650-4405>

Uvod: U kliničkoj slici nefropatije aristolohične kiseline (NAK) arterijska hipertenzija nije bila u kliničkoj slici te su bolesnici s NAK bili normotenzivni i na kroničnoj dijalizi. Kako se klinička slika bolesti mijenja, htjeli smo utvrditi mijenja li se i učestalost arterijske hipertenzije kod bolesnika na programu kronične hemodijalize.

Pacijenti i metode: Ukupan broj bolesnika na programu kronične dijalize Opće bolnice Slavonski Brod u siječnju 2017. godine bio je 91, a 14 bolesnika je kao razlog terminalne uremije imalo NAK. Komparirali smo učestalost arterijske hipertenzije bolesnika s NAK i ostalih bolesnika.

Rezultati: Broj bolesnika s NAK je 14. Od njih 7 (50 %) ima arterijsku hipertenziju i to 1 muškarac (15 %) te 6 žena (85 %). U ostalih 77 bolesnika 30% je hipertenzivnih.

Zaključak: Bolesnici s NAK na programu kronične hemodijalize imaju arterijsku hipertenziju u visokom postotku, kao i ostali bolesnici na hemodijalizi,

RECEIVED:
February 20 2017

ACCEPTED:
February 28 2017