DOI: 10.17117/na.2016.04.02.285

<http://ucom.ru/doc/na.2016.04.02.285.pdf>

Поступила (Received): 27.04.2016

Спиридонов Е.А., Воробьев О.Н. Функциональная готовность и стрессоустойчивость

Spiridonov EA., Vorobyov O.N.
Theoretical aspects and justification restorative stage of
employment and recreational

В статье рассматриваются вопросы, связанные с аспектами реабилитации, восстановления, здоровьесбережения и рекреации, с учетом индивидуальных особенностей организма и психологических характеристик человека

Ключевые слова: индивидуальные особенности, реабилитация, восстановление, функциональная готовность, здоровьесбережение, рекреация

The article discusses issues related to aspects of rehabilitation, recovery, health preservation and recreation, taking into account the individual characteristics of the organism and the psychological characteristics of man

Key words: individual characteristics, rehabilitation, recovery, functional fitness, health preservation, recreation

Спиридонов Евгений Анатольевич

Доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический университет
г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1

Spiridonov Evgeniy Anatolievich

Doctor of Pedagogic Sciences, Professor
Moscow pedagogical university
Moscow, Malaya Pirogovskaya st., 1

Воробьев Олег Николаевич

Генеральный директор
Центр восстановительной медицины "Синяя
Птица"
г. Москва, ул. Старокачаловская, 6

Vorobyov Oleg Nikolaevich

CEO
Center for restorative medicine "Blue Bird"
Moscow, Starokachalovskaya st., 6

Введение. Связующим звеном между понятиями «здоровье» и «среда жизнедеятельности» являются знания об адаптации как совокупности особенностей – морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других, которые обеспечивают особый образ жизни при определённых условиях внешней среды [1]. Способы использования ресурсов внешней среды, особенности образа жизни показывают биологическую и социальную сущность не только здоровья человека, но и возможности возникновения болезни. Рассматривая вопрос шире, следует отметить, что общее понижением адаптационных возможностей организма, прямой путь к снижению способности проявлять и переносить напряжение всей многоуровневой системы организма. С этой точки зрения, экстремальными могут стать самые простые процессы жизнедеятельности, а не только прямая угроза жизни [2].

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния показателей функциональной подготовки на стрессоустойчивость, у лиц не занимающихся спортом.

Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие (практически) здоровые добровольцы, ведущие активный социальный образ жизни, не имеющие хронических патологий (прошедших физикальное обследование в районных поликлиниках), разного возраста и пола, всего 30 человек. Участники были разбиты на две группы: 1 группа (1Г) – лица, имеющие хорошие физические кондиции, но находящиеся в стрессовом состоянии (депрессии), или пережившие событие, связанное с высоким стрессовым переживанием (до 10 дней); 2 группа (2Г) – лица, имеющие низкий уровень физического и функционального состояния, не испытывающих стрессовое воздействие. Исследование проходило в два этапа: 1 этап – определение исходного уровня показателей функционального состояния (ФС) [3], сенсомоторной реакции на основе теста сложной зрительно-моторной реакции (СЗРМ), показателя адаптационно-ресурсного состояния (ПАРС) [4], на основе вариабельности кардиоритма (ВКР), составляющих жизнестойкости (ЖС) [5]; 2 этап – определение показателей ФС, СЗРМ, ПАРС, ЖС после цикла занятий физической культурой, у лиц имеющих низкие показатели ФС. Статистическая обработка данных заключалась в вычислении стандартного отклонения от средних значений, коэффициента вариации и проведении однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), с последующим применением метода множественных сравнений [6].

Результаты и их обсуждение (таблицы 1-5).

Таблица 1. Анализ распределения результатов функционального состояния и составляющих жизнестойкости до- и после исследования

Показатели УФС	Показатели ЖС									
	Σn		вовлечен- ность ($\bar{x}$)		контроль ($\bar{x}$)		принятие риска ($\bar{x}$)		сумма ЖС	
	1Г	2Г	1Г	2Г	1Г	2Г	1Г	2Г	1Г	2Г
Хорошее (25 б. и менее)	10	-	38,4	-	32,6	-	19,7	-	91,5	-
Удовлетворительное (26–50 б.)	5	5	38,1	37,8	32,1	31,7	19,3	19,4	89,7	89,2
Плохое (51 б. и более, о/з)	-	10	36,0	35,7	31,2	31,4	18,7	18,8	86,2	86,2

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; ($\bar{x}$) – среднее значение; б. – баллов; Σn – количество от общего числа участников исследования; о/з – отрицательные значения

Из таблицы 1 видно, что количество участников обследования 1Г, имеют лучшие показатели УФС, чем во 2Г. Показатели ЖС в обеих группах имеют достоверные различия ($P > 0,05$). Проведенное первоначальное обследование, позволяет сделать вывод, что участники 1Г, имеют лучшие функциональные показатели, т.е. хороший уровень физического состояния организма. Показатели ЖС позволяют сделать вывод, о равно низком уровне психологического состояния.

Таблица 2. Анализ результатов после занятий психологической направленности

Показатели УФС	Показатели ЖС			
	вовлеченность (max-546.)	контроль (max-516.)	принятие риска (max- 306.)	сумма ЖС (max-1356.)
1 группа	40,2	41,7	22,6	104,5
2 группа	43,1	40,1	19,7	103,3

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; max – максимально возможное количество баллов

Из таблицы 2 видно, что комплекс занятий психологической направленности, оказал положительное влияние на участников в обеих группах, показатели теста ЖС повысился ($P < 0,05$). Показатели теста в ЖС в 1Г выше, чем в 2Г. ($P < 0,05$). Проведенный анализ результатов, позволяет сделать вывод о целесообразности занятий психологической направленности, как для лиц, находящихся в стрессовом состоянии, так и для лиц, имеющих низкий уровень физического состояния.

Таблица 3. Анализ результатов после занятий физической направленности

Показатели УФС	Показатели ЖС			
	вовлеченность (max-546.)	контроль (max-516.)	принятие риска (max- 306.)	сумма ЖС (max-1356.)
1 группа	43,1	44,6	22,8	110,6
2 группа	39,2	37,4	18,3	95,3

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; max – максимально возможное количество баллов

Из таблицы 3 видно, что комплекс занятий физической направленности, оказал положительное влияние на участников в 1 группе, показатели теста ЖС повысился ($P < 0,05$). Показатели теста в ЖС в 2гр снизился, чем при занятиях психологической направленности ($P < 0,05$). Проведенный анализ результатов, позволяет предположить, что физическая нагрузка, для лиц с низким уровнем функционального состояния, является стрессообразующим фактором, отрицательно сказывающимся на психоэмоциональную сферу, снижая стрессоустойчивость. Для лиц, имеющих хорошее функциональное состояние, физическая нагрузка является средством повышения стрессоустойчивости.

Для определения влияния физического состояния на повышение стрессоустойчивости, проводился эксперимент, с участниками 2 группы, имеющие низкий показатели функционального состояния. Суть эксперимента, заключалась в повышении физических кондиций организма и в проведении сравнительного анализа с показателями ЖС. Эксперимент проходил в два этапа, цель первого этапа – повысить УФС всей группы. Цель второго этапа – повышение адаптационных возможностей организма.

Таблица 4. Анализ результатов исследования 2 группы, 1-ого этапа

Показатели УФС	Показатели ЖС									
	Σn		вовлечен- ность ($\bar{x}$)		контроль ($\bar{x}$)		принятие риска ($\bar{x}$)		сумма ЖС	
	дЭ	пЭ	дЭ	пЭ	дЭ	пЭ	дЭ	пЭ	дЭ	пЭ
Хорошее (25 б. и менее)	-	15	-	39,4	-	34,8	-	19,9	-	94,1
Удовлетворительное (26–50 б.)	5	-	38,3	-	32,1	-	19,2	-	89,6	-
Плохое (51 б. и более)	10	-	36,0	-	31,3	-	18,9	-	86,2	-

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; ($\bar{x}$) – среднее значение; б. – баллов; Σn – количество от общего числа участников исследования; дЭ – до эксперимента; пЭ – после эксперимента

Из таблицы 4 видно, что все участники 2 группы, имеют высокие показатели УФС ($P < 0,05$).

Таблица 5. Анализ результатов исследования 2 группы, 2-ого этапа

Показатели УФС	Показатели ЖС					
	ПАРС (в у/б)	СЗРМ (СВР)	вовлечен- ность (max- 54б.)	контроль (max- 51б.)	принятие риска (max- 30б.)	сумма ЖС (max- 135б.)
1 этап	8,2	390,4	39,3	34,7	19,5	94,2
2 этап	5,6	370,6	44,2	41,1	21,3	107,1

Примечание: УФС – уровень функционального состояния; ПАРС – показатель адаптационно-ресурсного состояния; у/б – условно в баллах; СЗРМ – сложная зрительно-моторная реакция; СВР – среднее время реакции

Из таблицы 5 видно, что показатели ПАРС и СЗРМ увеличились ($P < 0,05$), это свидетельствует о повышении адаптационных возможностей организма. Показатели ЖС на 2 этапе выше, чем показатели 1 этапа ($P < 0,05$).

Выводы.

1. Проведенные исследования показали, что лица находящиеся в стрессовом состоянии и лица с низкими физическими кондициями, имеют одинаковые характеристики психоэмоционального состояния.

2. Реабилитационно-восстановительные занятия психологической направленности, при низком физическом уровне, имеют нестабильный результат и продолжительность.

3. Повышение стрессоустойчивости организма проходит эффективней если, все организационно-методические мероприятия планируются, исходя из первичности повышения функционального состояния, что особенно актуально, для лиц не занимающихся физической культурой и спортом, а также лиц с ослабленным здоровьем и после перенесенных болезней.

Список используемых источников:

1. Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу. М.: Горизонт, 1998. С. 268.
2. Тель Л.З. Валеология: Учение о здоровье, болезни и выздоровлении. М.: Астрель, 2001. Т. 1.
3. Сидоров С.П. Значение корректного выполнения методики функциональной пробы с 20 приседаниями при оценке состояния сердечно-сосудистой системы юных спортсменов // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. 2009. №2 (29). С. 39-44.
4. Институт внедрения новых медицинских технологий «РАМЕНА». URL: <http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/general/application/>
5. Леонтьев Д.А. и др. Тест жизнестойкости. М.: Смысл, 2006. 63 с.
6. Орехов Л.И. и др. Управление, контроль, измерение, статистические и экспериментальные методы в педагогике, психологии и физической культуре. Алматы: КазАСТ, 2004. 169 с.

© 2016, Спиридонов Е.А., Воробьев О.Н.
Функциональная готовность и
стрессоустойчивость

© 2016, Spiridonov EA., Vorobyov O.N.
Theoretical aspects and justification restorative stage
of employment and recreational