И. А. Положенцева (асп.) ^{1а}, А. В. Ковальская (к.х.н., н.с.) ², Д. О. Цыпышев (студ.) ³,
А. Н. Лобов (к.х.н., с.н.с.) ², А. М. Назаров (д.х.н., проф.) ⁴,
К. В. Данилко (к.б.н., доц.) ^{1б}, В. А. Катаев (д.фарм.н., проф.) ^{1а}

СИНТЕЗ И ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАГИДРОИНДОЛА

¹ Башкирский государственный медицинский университет,

^а кафедра фармации ИДПО, ^б кафедра биологии

450008, г. Уфа, ул. Ленина, 3, e-mail: polozhentseva93@gmail.com

² Уфимский Институт химии УФИЦ РАН, лаборатория биоорганической химии и катализа

450054, г. Уфа, пр. Октября, 71, e-mail: Alenakovalsky@gmail.com

³ Башкирский государственный университет, химический факультет

450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, e-mail: tsipisheva@anrb.ru

⁴ Уфимский государственный нефтяной технический университет,

кафедра охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, e-mail: nazarov.alexey.m@gmail.com

I. A. Polozhentseva ¹, A. V. Koval'skaya ², D. O. Tsypyshev ³,
A. N. Lobov ², A. M. Nazarov ⁴, K. V. Danilko ¹, V. A. Kataev ¹

SYNTHESIS AND CYTOTOXICITY OF SOME TETRAHYDROINDOLE DERIVATIVES

¹ Bashkir State Medical University

3, Lenina Str., 450008, Ufa, Russia, e-mail: polozhentseva93@gmail.com

² Institute of Chemistry - Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences

71, Prospect Oktyabrya Str., 450054, Ufa, Russia, e-mail: Alenakovalsky@gmail.com

³ Bashkir State University

32, Zaki Validi Str., 450076, Ufa, Russia, e-mail: tsipisheva@anrb.ru

⁴ Ufa State Petroleum Technological University

1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia, e-mail: nazarov.alexey.m@gmail.com

С целью поиска новых производных тетрагидроиндола с потенциальной цитотоксической/цитостатической активностью, исходя из доступных предшественников — димедона, бром-ацетофенона и ароматических аминов синтезированы 1-замещенные 6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4H-индол-4-оны с гидроксип-этильным, бензильным, 4-гидрокси-4-бром- и 4-феноксип-, 2-метил-, 3,4-дифтор-, 3-хлорфенильным и пиколильным заместителями у атома азота. *In vitro* изучена цитотоксичность полученных соединений, найден лидирующий образец, ингибирующий жизнеспособность условно нормальных клеток почки человека (линия HEK293, МТТ-тест) в концентрации 12.13 мМ/мл. Дополнительно для синтезированных тетрагидроиндолов с помощью демонстрационной версии программы BioSolveIT SeeSAR 7.2 рассчитаны величины параметров BBBlog и параметры logP и logS@pH 7.4, характеризующие способность прохождения через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), липофильность и водорастворимость синтезированных соединений.

For the purpose of search of novel tetrahydroindole derivatives with potential cytotoxic activity the 1-substituted-6,6-dimethyl-2-phenyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-ones with hydroxyethyl, benzyl, 4-hydroxy-, 4-bromo-, 4-phenoxy-, 2-methyl-, 3,4-difluoro-, 3-chlorophenyl and picolyl substitutions at the nitrogen atom on the base of accessible precursors — dimedone, bromoacetophenone and aromatic amines are synthesised. The cytotoxicity of the obtained compounds *in vitro* using standard MTT-test was studied. The leading compound with ability to inhibit the growth of HEK293 cells line (embryonic kidney cells) in concentration 12.13 μM/ml was found. In addition the pharmacokinetic parameters such as BBBlog (ability of compounds to cross the blood-brain barrier), logP (lipophilicity and absorption) and logS@pH 7.4 (solubility in water) of synthesized tetrahydroindoles were calculated by means of the demonstration version of program BioSolveIT SeeSAR 7.2.

Дата поступления 28.01.18

Ключевые слова: ароматические амины; библиотеки соединений; гетероциклические соединения; индол; МТТ-тест; параметры ADME; спектроскопия ЯМР; тетрагидроиндолон; цитотоксическая активность.

Key words: ADME parameters; aromatic amines; cytotoxic activity; heterocyclic compounds; indol; library of compounds; MTT-test; NMR spectroscopy; tetrahydroindolones.

Работа выполнена в рамках государственного задания Уфимского Института химии – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, тема №АААА-А17-117011910025-6.

The work was carried out under state assignment №АААА-А17-117011910025-6 (Institute of Chemistry – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences).

Согласно статистическим данным число диагностируемых онкологических заболеваний ежегодно увеличивается и, в соответствии с прогнозами, темпы роста этого показателя не будут снижаться¹. Одним из основных компонентов лечения пациентов со злокачественными новообразованиями является химиотерапия, применяемая на всех этапах развития патологии. Основным недостатком используемых в клинике противоопухолевых средств является невысокая специфичность действия, ряд серьезных побочных и токсических эффектов² и так называемый процесс «привыкания», замедление которого достигается путем комбинированного применения препаратов, отличных по своей химической структуре и различающихся по механизму действия. В связи с этим поиск и разработка новых противоопухолевых агентов – более совершенных и лишенных перечисленных выше недостатков, остается актуальной задачей медицинской и органической химии.

Современная стратегия создания лекарственных средств, направленная на эффективный отбор новых биологически активных веществ, базируется на трех основных этапах – синтезе библиотек химических соединений с

последующими этапами *in vitro* и *in vivo* скрининга. Кроме того, интенсивное внедрение методов предварительного *in silico* анализа в значительной степени облегчает задачу рационального дизайна новых потенциальных терапевтических агентов³. Огромное число гетероциклических соединений (как синтетических, так и природного происхождения) используется химиками-синтетиками в качестве исходных матриц в направленном синтезе фармакологически ценных веществ, и производные индола занимают в этом ряду отдельное место. Так, в последнее десятилетие среди них найдены соединения с выраженными цитостатическими и цитотоксическими свойствами, о чем свидетельствует высокая публикационная активность в этой области^{4–10}.

Целью настоящего исследования является синтез производных ряда тетрагидроиндол-4-она, полученных в две стадии¹¹ из доступных исходных соединений: димедона, бромацетифенона и ароматических аминов (схема 1) с последующей *in vitro* оценкой цитотоксических свойств и *in silico* расчетом первичных фармакокинетических параметров синтезированных соединений.

Реагенты и условия: а – K_2CO_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{Br}$, CHCl_3 , 20 °С; б – амин, AcOH , кипячение 12 ч.
Схема 1. Синтез тетрагидроиндол-4-онов 3–12

Предшественник целевых тетрагидроиндолонов трикетон **2** получали реакцией димедона **1** с бромацетофеноном, которую вели в хлороформе при комнатной температуре в присутствии K_2CO_3 . Выход продукта конденсации **2** после колоночной хроматографии (КХ) составил 65%.

Следующую стадию, позволяющую генерировать индолоновый цикл, осуществляли кипячением трикетона **2** с эквимольными количествами соответствующих аминов (моноэаноламина, анилина, бензиламина, аллиламина, 4-гидрокси-, 4-бром- и 4-феноксанилина, а также 2-метил-, 3,4-дифтор-, 3-хлоранилина и пиколиламина) в течение 12 ч в уксусной кислоте. Тетрагидроиндол-4-оны **3–12** (схема 1) были выделены методом КХ на SiO_2 с выходами от 33 до 80 %. Строение полученных соединений установлено на основании данных спектроскопии ЯМР 1H и ^{13}C .

Первичную оценку цитотоксических свойств синтезированных веществ проводили с помощью МТТ-теста, используя клетки линии HEK293 (условно-нормальные клетки эмбриональной почки человека), в соответствии с методикой, описанной в ¹². Параллельно с помощью демонстрационной версии BioSolveIT SeeSAR 7.2 ¹³ провели оценку фармакокинетических параметров ADME (абсорбция, распределение, метаболизм и выделение). Были рассчитаны значения коэффициентов BBBlog, logP и logS, характеризующих способность к прохождению ГЭБ при пероральном введении веществ, липофильность (абсорбцию) и водорастворимость. Результаты изучения цитотоксичности и расчетов указанных фармакокинетических параметров приведены в табл. 1.

Согласно полученным результатам, соединения **4**, **5**, **8** и **10–12** обладают выраженными цитотоксическими свойствами (табл. 1). Все они активны в микромолярном диапазоне ингибирующих концентраций (IC_{50}): для индолонов **4** и **5** значения IC_{50} составляют 124.30 и 56.06 $\mu M/мл$, а для соединений **8** и **10–12** соответственно 12.13, 97.93, 46.81 и 151.4 $\mu M/мл$. Для соединений **6** и **7** значения IC_{50} рассчитать не удалось, так как в низких концентрациях они стимулировали размножение клеток HEK293, а в более высоких ингибировали их жизнеспособность. Соединение **9**, содержащее в качестве заместителя у атома азота 2-метилфенильный фрагмент (табл. 1), в условиях теста в отличие от остальных представителей библиотеки активно стимулировало деление клеток HEK293 в концентрации EC_{50} , равной 21.79 $\mu M/мл$. Тетрагидроиндолон **3** с

гидроксиэтильным заместителем оказался единственным неактивным по отношению к клеткам HEK293, что может быть связано с проявлением эффекта тканеспецифичности действия, и его цитотоксические свойства могут проявиться в отношении клеток другого генеза, в том числе и опухолевого происхождения.

Необходимо отметить, что в ряду протестированных соединений тетрагидроиндолон **8** (где R – это феноксильный заместитель) угнетает жизнеспособность клеток HEK293 на 50% относительно контроля в наименьшей концентрации 12.13 $\mu M/мл$ (рис. 1). Полученный результат является основанием для выделения этого соединения в разряд лидирующих и/или использования его в качестве скаффолда для дальнейшей оптимизации его цитотоксических свойств путем направленных химических трансформаций.

Рис. 1. Влияние соединения **8** на метаболическую активность клеток HEK293

Согласно данным расчета параметров ADME, потенциальная способность синтезированных соединений преодолевать ГЭБ является удовлетворительной — рассчитанные для **3–12** значения BBBlog больше пороговой величины 0.523 ^{14, 15} и лежат в интервале от 0.467 до 0.517 (табл. 1). Абсорбция тетрагидроиндолонов **3–12** согласно значениям коэффициента липофильности logP, которые находятся в интервале от 4.316 до 6.287, может считаться удовлетворительной (они незначительно превышают критическое значение $\log P = 5$ ¹⁴). Также необходимо отметить, что на основании рассчитанных величин коэффициента $\log S@pH 7.4$ (все они более 1.22) можно предположить, что соединения **3–12** могут обладать хорошей растворимостью в воде ¹⁴.

Анализ значений коэффициентов logP и $\log S@pH 7.4$, рассчитанных для **3–12**, позволяет сделать вывод, что «аномальная» зависящая от концентрации активность индолонов **6** и **7** в отношении клеток HEK293, зафиксированная в эксперименте, может быть связана с их повышенной липофильностью — параметр

Цитотоксические характеристики соединений 3–12 в отношении клеточной линии почки человека HEK293 и показатели фармакокинетических параметров ADME

№	R	IC ₅₀ ^a , μM/мл	BBB log ^b	log P ^c	log S@pH 7.4 ^г
3	HOCH ₂ CH ₂ -	NA ^a	0.397	5.072	-0.089
4	Ph-	IC ₅₀ =124.3	0.517	5.381	-0.341
5	Bn-	IC ₅₀ =56.06	0.445	4.316	1.070
6	4-HO-Ph-	-	0.405	5.783	-0.645
7	4-Br-Ph-	-	0.214	6.287	-1.995
8	4-Ph-O-Ph-	IC ₅₀ =12.13	0.419	5.500	-0.434
9	2-Me-Ph-	EC ₅₀ =21.79	0.325	5.103	-0.887
10	3,4-ди-F-Ph-	IC ₅₀ =97.93	0.395	5.620	-0.684
11	3-Cl-Ph-	IC ₅₀ =46.81	0.307	4.324	-0.117
12	2-Пиколинил-	IC ₅₀ =151.4	0.397	5.072	-0.089

Примечание: а – концентрация полумаксимального ингибирования метаболической активности клеток HEK293 в МТТ-тесте; б – коэффициент, характеризующий проницаемость вещества через ГЭБ при пероральном введении ¹⁴, ¹⁵; в – коэффициент липофильности ¹⁴; г – коэффициент растворимости в водной среде, рассчитанный при pH = 7.4 ¹⁴; д – неактивно.

logP для них самый высокий и составляет 5.783 и 6.287 соответственно (табл. 1).

Таким образом, из доступных предшественников – димедона, бромацетофенона и ароматических аминов синтезированы 1-замещенные-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-оны, с гидроксипропиловым, бензиловым, фениловым, 4-гидрокси- 4-бром- и 4-фенокси-, 2-метил-, 3,4-дифтор-, 3-хлор-фениловым и пиколиновым заместителями у атома азота. В культуре клеток линии HEK293 с помощью МТТ-теста проведена оценка цитотоксичности соединений, найдено лидирующее производное **8**, на 50% ингибирующее жизнеспособность клеток указанной линии в концентрации 12.13 μM/мл. Дополнительно для синтезированных индолонов **3–12** с помощью демонстрационной версии программы BioSolve IT SeeSAR 7.2 рассчитаны величины параметров BBBlog (способность к прохождению ГЭБ) и параметры logP и logS@pH 7.4, характеризующие липофильность и водорастворимость синтезированных соединений.

Экспериментальная часть

Контроль за ходом реакций осуществлялся методом ТСХ на пластинах ALUGRAM®. Колоночная хроматография (КХ) выполнялась на стандартном силикагеле 60 (0.05–0.1 мм) (MACHEREY-NAGEL, Germany).

Спектры ЯМР ¹H и ¹³C записаны на импульсном спектрометре BrukerAvance III с рабочей частотой 500.13 МГц (¹H) и 125.47 МГц (¹³C) с использованием 5-миллиметрового датчика с Z-градиентом PABBO при постоянной температуре образца 298 К. Химические сдвиги в спектрах ЯМР ¹³C, ¹H приведены в м.д.

относительно сигнала внутреннего стандарта тетраметилсилана (ТМС).

Синтез 5,5-Диметил-2-(2-оксо-2-фенилэтил)циклогексан-1,3-диона (2). К раствору 1.4 г (10 ммоль) димедона **1** в 50 мл хлороформа добавили 1.4 г (10 ммоль) K₂CO₃ и 2.0 г (10 ммоль) бромацетофенона, реакционную массу перемешивали при комнатной температуре в течение 48 ч, контроль за ходом реакции осуществляли методом ТСХ. После окончания реакции выпавший осадок отфильтровали, осадок растворили в воде (30 мл) и подкислили концентрированной HCl до pH = 6. Выпавший осадок вновь отфильтровали, промыли водой (10 мл) и кристаллизовали из этилового спирта. Получили 1.68 г (6.9 ммоль, 65%) продукта **2**. Физико-химические константы **2** соответствовали литературным ¹⁶.

Общая методика синтеза тетрагидроиндолонов 3–12.

К суспензии 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** в 5 мл CH₃COOH добавили 1.5 ммоль соответствующего амина и перемешивали на магнитной мешалке в токе аргона при 60 °C до полного исчезновения исходного (контроль по ТСХ). Затем реакционную массу охладили до комнатной температуры и вылили на лед. Полученный раствор осторожно нейтрализовали безводным Na₂CO₃ и экстрагировали AcOEt (3×10 мл). Объединенные органические слои высушили над безводным Na₂SO₄ и сконцентрировали. Остаток хроматографировали на SiO₂.

1-(2-Гидроксиэтил)-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (3). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.1 мл (1.5 ммоль) моноэтаноламина 0.21 г (0.74 ммоль, 72%) продукта **3**. Реакционную массу хроматографировали на SiO₂ (элюент

$\text{CHCl}_3:\text{MeOH} = 99:1$). Физико-химические константы **3** соответствовали литературным ¹⁶.

6,6-Диметил-1,2-дифенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (4). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.13 мл (1.5 ммоль) анилина 0.25 г (0.79 ммоль, 77%) продукта **4**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент CHCl_3). Физико-химические константы **4** соответствовали литературным ¹⁷.

1-Бензил-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (5). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.16 мл (1.5 ммоль) бензиламина 0.18 г (0.55 ммоль, 54%) продукта **5**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{C}_6\text{H}_6:\text{MeOH} = 99:1$). Физико-химические константы **5** соответствовали литературным ¹⁸.

1-(4-Гидроксифенил)-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (6). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.17 г (1.5 ммоль) 4-аминофенола 0.11 г (0.34 ммоль, 33%) продукта **6**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{CHCl}_3:\text{MeOH} = 97:3$). Физико-химические константы **6** соответствовали литературным ¹⁹.

1-(4-Бромфенил)-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (7). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.26 г (1.5 ммоль) 4-броманилина 0.24 г (0.61 ммоль, 60%) продукта **7**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{C}_6\text{H}_6:\text{MeOH} = 98:2$). Физико-химические константы **7** соответствовали литературным ²⁰.

6,6-Диметил-1-(4-феноксифенил)-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (8). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.28 г (1.5 ммоль) 4-феноксанилина 0.23 г (0.57 ммоль, 56%) продукта **8**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{CHCl}_3:\text{MeOH} = 98:2$).

Спектр ^{13}C (CDCl_3 , м.д.): 28.64 (C8(9)); 35.55 (C6); 37.00 (C7); 51.98 (C5); 105.53 (C3); 118.64 (C2'(6'')); 119.59 (C2''(6'')); 119.74 (C3a); 124.20 (C4''); 126.94 (C_{para}); 128.17 (C_{meta}); 128.20 (C_{ortho}); 129.01 (C3'(5'')); 129.98 (C3''(5'')); 131.84 (C_{ipso}); 132.21 (C1'); 136.45 (C2); 145.01 (C7a); 156.04 (C1''); 157.40 (C4'); 194.00 (C4). Спектр ^{15}N (CDCl_3 , δ м.д.): 170.44 (N1). Спектр ^1H (CDCl_3 , δ м.д., J Гц): 1.11 (s, 6H, H-8(9)); 2.42 (s, 2H, H-5); 2.54 (s, 2H, H-7); 6.78 (s, 1H, H-3); 6.99 (d, 2H, $^3J_{2'(6'')-3'(5'')} = 8.8$, H-2'(6'')); 7.06 (d, 2H, $^3J_{2''(6'')-3''(5'')} = 7.7$, H-2''(6'')); 7.08 (d, 2H, $^3J_{3'(5'')-2'(6'')} = 8.8$, H-3'(5'')); 7.10 (d, 2H, $^3J = 7.9$, H_{ortho}-Ph); 7.17 (t, 1H, $^3J_{4''-3''(5'')} = 7.7$, H-4''); 7.17 (t, 1H, $^3J = 7.9$, H_{para}-Ph); 7.20 (t,

2H, $^3J = 7.9$, H_{meta}-Ph); 7.38 (t, 2H, $^3J_{3''(5'')-2''(6'')} = 7.7$, $^3J_{3''(5'')-4''} = 7.7$, H-3''(5'')).

Для $\text{C}_{28}\text{H}_{25}\text{NO}_2$ найдено: C, 82.46%; H, 6.07%; N, 3.34%; вычислено: C, 82.53%; H, 6.18%; N, 3.44%.

6,6-Диметил-1-(2-метилфенил)-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (9). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.16 мл (1.5 ммоль) орто-толуидина 0.16 г (0.48 ммоль, 47%) продукта **9**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{CHCl}_3:\text{MeOH} = 99:1$). Физико-химические константы **9** соответствовали литературным ²⁰.

1-(3,4-Дифторфенил)-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (10). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.16 мл (1.5 ммоль) 3,4-дифторанилина 0.25 г (0.71 ммоль, 70%) продукта **10**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{CHCl}_3:\text{MeOH} = 99:1$).

Спектр ^{13}C (CDCl_3 , δ м.д.): 28.60 (C8(9)); 35.56 (C6); 36.96 (C7); 51.96 (C5); 105.93 (C3); 117.32 (d, $^2J_{\text{C}2'-\text{F}3'} = 18.7$, C2'); 117.92 (d, $^2J_{\text{C}5'-\text{F}4'} = 18.4$, C5'); 120.18 (C3a); 124.27 (dd, $^3J_{\text{C}6'-\text{F}4'} = 6.5$, $^4J_{\text{C}6'-\text{F}3'} = 3.9$, C6'); 127.32 (C_{para}); 128.22 (C_{ortho}); 128.40 (C_{meta}); 131.39 (C_{ipso}); 133.90 (dd, $^3J_{\text{C}1'-\text{F}3'} = 7.4$, $^4J_{\text{C}1'-\text{F}4'} = 3.7$, C1'); 136.36 (C2); 144.61 (C7a); 150.04 (dd, $^1J = 251.8$, $^2J_{\text{C}3'-\text{F}4'} = 9.6$, C3'); 150.15 (dd, $^1J = 251.8$, $^2J_{\text{C}4'-\text{F}3'} = 10.4$, C4'); 193.88 (C4). Спектр ^{15}N (CDCl_3 , δ м.д.): 168.45 (N1). Спектр ^{19}F (CDCl_3 , δ м.д., J Гц): -136.35 (dddd, 1F, $^3J_{\text{F}4'-\text{F}3'} = 21.2$, $^3J_{\text{F}4'-5'} = 10.1$, $^4J_{\text{F}4'-2'} = 6.9$, $^4J_{\text{F}4'-6'} = 4.0$, F-4'); -133.88 (dddd, 1F, $^3J_{\text{F}4'-\text{F}3'} = 21.2$, $^3J_{\text{F}3'-2'} = 10.1$, $^4J_{\text{F}3'-5'} = 8.7$, $^4J_{\text{F}3'-6'} = 1.6$, F-3'). Спектр ^1H (CDCl_3 , δ м.д., J Гц): 1.11 (с, 6H, H-8(9)); 2.39 (с, 2H, H-5); 2.52 (с, 2H, H-7); 6.75 (с, 1H, H-3); 6.93 (дддд, 1H, $^3J_{6'-5'} = 8.7$, $^4J_{6'-\text{F}4'} = 4.0$, $^4J_{6'-2'} = 2.4$, $^5J_{6'-\text{F}3'} = 1.6$, H-6'); 7.01 (ддд, 1H, $^3J_{2'-\text{F}3'} = 10.1$, $^4J_{2'-\text{F}4'} = 6.9$, $^4J_{2'-6'} = 2.4$, H-2'); 7.07 (д, 2H, $^3J = 7.9$, H_{ortho}-Ph); 7.17-7.23 (м, 3H, H_{para}-Ph, H_{meta}-Ph); 7.20 (дт, 1H, $^3J_{5'-\text{F}4'} = 10.1$, $^3J_{5'-6'} = 8.7$, $^4J_{5'-\text{F}3'} = 8.7$, H-5').

Для $\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{F}_2\text{NO}$ найдено: C, 75.13%; H, 5.38%; F, 10.61%; N, 3.78%; вычислено: C, 75.20%; H, 5.45%; F, 10.8%; N, 3.99%.

1-(3-Хлорофенил)-6,6-диметил-2-фенил-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (11). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона **2** и 0.16 мл (1.5 ммоль) 3-хлоранилина 0.21 г (0.6 ммоль, 58%) продукта **11**. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $\text{C}_6\text{H}_6:\text{MeOH} = 99:1$).

Спектр ^{13}C (CDCl_3 , δ м.д.): 35.56 (C6); 36.99 (C7); 52.02 (C5); 28.60 (C8(9)); 105.93 (C3); 120.18 (C3a); 126.13 (C6'); 127.13

(C_{para}); 127.81 ($C2'$); 128.16 (C_{ortho}); 128.28 (C_{meta}); 128.57 ($C4'$); 130.32 ($C5'$); 131.49 (C_{ipso}); 134.86 ($C3'$); 136.24 ($C2$); 138.77 ($C1'$); 144.45 ($C7a$); 193.86 ($C4$). Спектр 1H ($CDCl_3$, δ м.д., J Гц): 1.11 (с, 6H, H-8(9)); 2.41 (с, 2H, H-5); 2.52 (с, 2H, H-7); 6.77 (с, 1H, H-3); 7.01 (д, 1H, $^3J_{6'-5'} = 7.7$, H-6'); 7.06 (д, 2H, $^3J = 7.9$, H-ortho-Ph); 7.16-7.20 (м, 4H, H-para-Ph, H-meta-Ph, H-2'); 7.32 (дд, 1H, $^3J_{5'-4'} = 8.2$, $^3J_{5'-6'} = 7.7$, H-5'); 7.37 (д, 1H, $^3J_{4'-5'} = 8.2$, H-4').

Для $C_{22}H_{20}ClNO$ найдено: С, 75.47%; Н, 5.65%; Cl, 10.08%; N, 4.12%; вычислено: С, 75.53%; Н, 5.76%; Cl, 10.13%; N, 4.00%.

6,6-Диметил-2-фенил-(1-пиридин-2-илметил)-1,5,6,7-тетрагидро-4Н-индол-4-он (12). Получили из 0.26 г (1 ммоль) трикетона 2 и 0.16 мл (1.5 ммоль) 2-пиколиламина 0.17 г (0.53 ммоль, 52%) продукта 12. Реакционную массу хроматографировали на SiO_2 (элюент $CHCl_3:MeOH = 98:2$).

Спектр ^{13}C ($CDCl_3$, δ м.д.): 28.60 ($C8(9)$); 35.49 ($C6$); 36.19 ($C7$); 49.55 ($C1'$); 52.00 ($C5$); 105.50 ($C3$); 119.89 ($C3a$); 120.26 ($C3''$); 122.68 ($C5''$); 127.92 (C_{para}); 128.63 (C_{meta}); 128.98 (C_{ortho}); 131.83 (C_{ipso}); 136.65 ($C2$); 137.58 ($C4''$); 144.09 ($C7a$); 149.26 ($C6''$); 156.87 ($C2''$); 193.61 ($C4$). Спектр ^{15}N ($CDCl_3$, δ м.д.): 156.47 ($N1$); 303.62 ($N1''$). Спектр 1H ($CDCl_3$, δ м.д., J Гц): 1.07 (с, 6H, H-8(9)); 2.38 (с, 2H, H-5); 2.53 (с, 2H, H-7); 5.25 (с, 2H, H-1'); 6.67 (с, 1H, H-3); 6.69 (дт, 1H, $^3J_{3''-4''} = 7.7$, $^4J_{3''-5''} = 1.0$, $^5J_{3''-6''} = 1.0$, H-3''); 7.23 (ддд, 1H, $^3J_{5''-4''} = 7.7$, $^3J_{5''-6''} = 4.8$, $^4J_{5''-3''} = 1.0$, H-5''); 7.28-7.33 (м, 5H, H-Ph); 7.66 (тд, 1H, $^3J_{4''-3''} = 7.7$, $^3J_{4''-5''} = 7.7$, $^4J_{4''-6''} = 1.6$, H-4''); 8.56 (ддд, 1H, $^3J_{6''-5''} = 4.8$, $^4J_{6''-4''} = 1.6$, $^5J_{6''-3''} = 1.0$, H-6'').

Для $C_{22}H_{22}N_2O$ найдено: С, 79.88%; Н, 6.67%; N, 8.34%; вычислено: С, 79.97%; Н, 6.71%; N, 8.48%.

Литература

1. Siegal R.L., Miller K. D., Jemal A. Cancer Statistics, 2017 // CA: Cancer Journal of Clinicians. — 2017. — V.67, №1. — Pp.7-30.
2. Remesh A. Toxicities of anticancer drugs and its management // International Journal of basic & Clinical Pharmacology. — 2012. — V.1, №1. — Pp.2-12.
3. Зефирова О.Н., Зефиров Н.С. Медицинская химия (Medicinal Chemistry). II. Методологические основы создания лекарственных препаратов // Вестник Московского университета. — 2000. — Т.41, №2. — С.103-108.
4. Kumar Kaushik N., Kaushik N., Attri P., Kumar N., Kim Ch.H., Kumar Verma A., Choi E.H. Biomedical Importance of Indoles // Molecules. — 2013. — V.18, №6. — Pp.6620-6662.

Изучение цитотоксических характеристик синтезированных соединений.

Оценку цитотоксических свойств синтезированных соединений проводили с помощью МТТ-теста (тиазолил синий тетразолий бромид, Диаэм, Россия). Для этого клетки линии НЕК293 (условно-нормальные клетки эмбриональной почки человека; Биолот, Россия) рассаживали ($2 \cdot 10^4$ клеток на лунку) в 96-луночные планшеты в 100 мкл среды культивирования (DMEM (Sigma, США), содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки (PAA Laboratories, Австрия)).

Вещества добавляли через 24 ч после посева и инкубировали 72 ч после последовательного растворения в 100% ДМСО (до конечной концентрации не более 1%) и в полной культуральной среде (100 мкл). За 4 ч до окончания времени инкубации с веществами добавляли 12 mM реагента МТТ (1/10 от объема культуральной среды), после чего отбирали среду и добавляли по 100 мкл 100% ДМСО в каждую лунку.

Абсорбцию измеряли через 60 мин при длине волны 530 нм и длине волны фонового поглощения 620 нм, используя мультипланшетный анализатор Spark 10M (Tecan, Швейцария). Находили среднее арифметическое значение для 3 измерений уровня адсорбции для каждой концентрации веществ. Вычисление значения IC50, характеризующего параметры цитотоксичности (концентрация соединения, необходимая для 50 % ингибирования жизнеспособности клеток *in vitro*), проводили в программе GraphPadPrism.5.0 (Graph Pad Software Inc., USA). Расчеты фармакокинетических параметров выполнены с использованием демонстрационной версии программы BioSolveIT SeeSAR 7.2.

Reference

1. Siegal R.L., Miller K. D., Jemal A. [Cancer Statistics, 2017]. CA: Cancer Journal of Clinicians, 2017, vol.67, no.1, pp.7-30.
2. Remesh A. [Toxicities of anticancer drugs and its management]. International Journal of basic & Clinical Pharmacology, 2012, vol.1, no.1, pp.2-12.
3. Zefirova O.N., Zefirov N.S. Meditsinskaya khimiya (Medicinal Chemistry). II. Metodologicheskiye osnovy sozdaniya preparatov [Medical Chemistry (Medicinal Chemistry). II. Methodological foundations for the development of drugs]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], 2000, vol.41, no.2, pp.103-108.
4. Kumar Kaushik N., Kaushik N., Attri P., Kumar N., Kim Ch.H., Kumar Verma A., Choi E.H. [Biomedical Importance of Indoles]. Molecules, 2013, vol.18, no.6, pp.6620-6662.

5. Wu W., Cao S., Mao B., Liao J., Li Z., Song H., Xu X. Synthesis and Antiproliferative Evaluation of Hybrids of Indolin-2-one and Quinazoline-4(3H)-one Linked via Imine Bond // *Letters in Drug Design & Discovery*.— 2013.— V.10, №1.— Pp.61-66.
6. Chitra G., Franklin D.S., Sudarsan S., Sakthivel M., Guhanathan S. Indole-3-acetic acid/diol based pH-sensitive biological macromolecule for antibacterial, antifungal and antioxidant applications // *International Journal of Biological Macromolecules*.— 2017.— V.95.— Pp.363-375.
7. Eldehna W.M., Fares M., Ibrahim H.S., Alsherbiny M.A., Aly M.H., Ghabbour H.A., Abdel-Aziz H. Synthesis and cytotoxic activity of biphenylurea derivatives containing indolin-2-one moieties // *Molecules*.— 2016.— V.21, №6.— Pp.762/1-762/11.
8. Faraj F.L., Khaledi H., Karimian H., Ali H.M. Indole-Fused Epoxy-1,5-Diazocines as Cancer-Selective Cytotoxic Agents // *Journal of Heterocyclic Chemistry*.— 2017.— V.54, №3.— Pp.2071-2074.
9. Ho H.K., Chua B.T., Wong W., Lim K.S., Teo V., Ong H., Chen X., Zhang W., Hui K.M., Go M.L., Ullrich A. Benzylidene-indolinones are effective as multi-targeted kinase inhibitor therapeutics against hepatocellular carcinoma // *Molecular Oncology*.— 2014.— V.8, №7.— Pp.1266-1277.
10. Manvar A., Bavishi A., Loria R., Jaggi M., Shan A. In vitro cytotoxicity evaluation of diversely substituted N-aryl-2-oxindoles // *Medicinal Chemistry Research*.— 2013.— V.22, №7.— Pp.3076-3084.
11. Martinez R., Arzate M.M., Ramirez-Apan T. Synthesis and cytotoxic activity of new azepino[3',4':4,5]pyrrolo[2,1-a]isoquinolin-12-ones // *Bioorganic & Medical Chemistry*.— 2009.— V.17.— Pp.1849-1856.
12. Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays // *Journal of Immunological Methods*.— 1983.— V.65.— Pp.55-63.
13. <https://www.biosolveit.de/SeeSAR/>
14. Kerns E.H., Di L. *Drug-Like Properties: Concept, Structure, Design and Method from ADME to Toxicity Optimization*.— New York, London, Oxford, Boston, San Diego: Academic Press, 2016.— 580 p.
15. Gloor S.M., Wachtel M., Bolliger M.F., Ishihara H., Landmann R., Frei K. Molecular and cellular permeability control at the blood-brain barrier // *Brain Res Rev*.— 2001.— V.36.— Pp.258-264.
16. Menes-Arzate M., Marti'nez R., Cruz-Almanza R., Muchowski J.M., Osornio Y.M., Miranda L.D. Efficient, «Tin-Free» Radical Cyclization to Aromatic Systems. Synthesis of 5,6,8,9,10,11-Hexahydroindolo[2,1-a]isoquinolines // *J. Org. Chem.*— 2004.— V.69.— Pp.4001-4004.
17. Ramadas S.R., Padmanabban S. A Contradistinction in the Magnetic (¹³C NMR Spectroscopy) and Chemical Behaviour of 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole Derivatives // *Organic Magnetic Resonance*.— 1978.— V.11, №9.— Pp.471-474.
5. Wu W., Cao S., Mao B., Liao J., Li Z., Song H., Xu X. [Synthesis and Antiproliferative Evaluation of Hybrids of Indolin-2-one and Quinazoline-4(3H)-one Linked via Imine Bond] *Letters in Drug Design & Discovery*, 2013, vol.10, no.1, pp.61-66.
6. Chitra G., Franklin D.S., Sudarsan S., Sakthivel M., Guhanathan S. [Indole-3-acetic acid/diol based pH-sensitive biological macromolecule for antibacterial, antifungal and antioxidant applications]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2017, vol.95, pp. 363-375.
7. Eldehna W.M., Fares M., Ibrahim H.S., Alsherbiny M.A., Aly M.H., Ghabbour H.A., Abdel-Aziz H. [Synthesis and cytotoxic activity of biphenylurea derivatives containing indolin-2-one moieties]. *Molecules*, 2016, vol.21, no.6, pp. 762/1-762/11.
8. Faraj F.L., Khaledi H., Karimian H., Ali H.M. [Indole-Fused Epoxy-1,5-Diazocines as Cancer-Selective Cytotoxic Agents]. *Journal of Heterocyclic Chemistry*, 2017, vol.54, no.3, pp. 2071-2074.
9. Ho H.K., Chua B.T., Wong W., Lim K.S., Teo V., Ong H., Chen X., Zhang W., Hui K.M., Go M.L., Ullrich A. [Benzylidene-indolinones are effective as multi-targeted kinase inhibitor therapeutics against hepatocellular carcinoma]. *Molecular Oncology*, 2014, vol.8, no.7, pp. 1266-1277.
10. Manvar A., Bavishi A., Loria R., Jaggi M., Shan A. [*In vitro* cytotoxicity evaluation of diversely substituted N-aryl-2-oxindoles]. *Medicinal Chemistry Research*, 2013, vol.22, no.7, pp. 3076-3084.
11. Martinez R., Arzate M.M., Ramirez-Apan T. [Synthesis and cytotoxic activity of new azepino[3',4':4,5]pyrrolo[2,1-a]isoquinolin-12-ones]. *Bioorganic & Medical Chemistry*, 2009, vol.17, pp. 1849-1856.
12. Mosmann T. [Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays]. *Journal of Immunological Methods*, 1983, vol.65, pp. 55-63.
13. <https://www.biosolveit.de/SeeSAR/>
14. Kerns E.H., Di L. [Drug-Like Properties: Concept, Structure, Design and Method from ADME to Toxicity Optimization]. New York, London, Oxford, Boston, San Diego, Academic Press, 2016, 580 p.
15. Gloor S.M., Wachtel M., Bolliger M.F., Ishihara H., Landmann R., Frei K. [Molecular and cellular permeability control at the blood-brain barrier]. *Brain Res Rev*, 2001, vol.36, pp.258-264.
16. Menes-Arzate M., Marti'nez R., Cruz-Almanza R., Muchowski J.M., Osornio Y.M., Miranda L.D. [Efficient, «Tin-Free» Radical Cyclization to Aromatic Systems. Synthesis of 5,6,8,9,10,11-Hexahydroindolo[2,1-a]isoquinolines]. *J. Org. Chem.*, 2004, vol.69, pp. 4001-4004.
17. Ramadas S.R., Padmanabban S. A [Contradistinction in the Magnetic (¹³C NMR Spectroscopy) and Chemical Behavior of 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole Derivatives]. *Organic Magnetic Resonance*, 1978, vol.11, no.9, pp.471-474.

18. Ramadas S.R., Padmanab S. Studies on Synthesis, Chemical and Spectroscopic Properties of 4-Ketotetrahydroindole Derivatives // *Journal f. prakt. Chemie.*— 1978.— B.320, №5.— S.863-872.
19. Nagarajan K., Talwalker P.K., Shah R.K., Mehta S.R., Nayak G.V. [Antiimplantation agents: part III — 1,2-diaryl-4,5-polymethylenepyrroles and 1,2-diaryl-4-oxo- and 1,2-diaryl-4-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydroindoles]. *Indian Journal of Chemistry, Section B: Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry*, 1985, vol.24B, pp.98-111.
20. Dagher C., Hanna R., Terentiev P.V., Boundel Y.G., Kost A.N., Maksimov B.I. [Synthesis and Mass Spectrometry of 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole and 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran Derivatives]. *J. Heterocyclic Chemistry*, 1982, vol.19, pp.645-647.
18. Ramadas S.R., Padmanab S. [Studies on Synthesis, Chemical and Spectroscopic Properties of 4-Ketotetrahydroindole Derivatives]. *Journal f. prakt. Chemie*, 1978, vol.320, pp.863-872.
19. Nagarajan K., Talwalker P.K., Shah R.K., Mehta S.R., Nayak G.V. [Antiimplantation agents: part III — 1,2-diaryl-4,5-polymethylenepyrroles and 1,2-diaryl-4-oxo- and 1,2-diaryl-4-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydroindoles]. *Indian Journal of Chemistry, Section B: Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry*, 1985, vol.24B, pp.98-111.
20. Dagher C., Hanna R., Terentiev P.V., Boundel Y.G., Kost A.N., Maksimov B.I. [Synthesis and Mass Spectrometry of 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole and 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran Derivatives]. *J. Heterocyclic Chemistry*, 1982, vol.19, pp. 645-647.