И. Р. Тлямова (магистрант), А. Т. Зайнашев (к.х.н., доц.),
А. В. Зорин (к.х.н., в.н.с.), Л. Н. Зорина (к.х.н., доц.)*

СИНТЕЗ РАЦЕМИЧЕСКИХ α,α -ДИМЕТИЛЗАМЕЩЕННЫХ ЭФИРОВ β -ОКСИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра биохимии и технологии микробиологических производств,

*кафедра общей, аналитической и прикладной химии

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; тел. (347) 2431935, e-mail: z.albert.t@mail.ru

I. R. Tlyamova, A. T. Zaynashev, A. V. Zorin, L. N. Zorina

SYNTHESIS OF RACEMIC α,α -DIMETHYL-SUBSTITUTED ETHERS OF β -OXYCARBOXYLIC ACIDS

Ufa State Petroleum Technological University

1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. (347)2431935, e-mail: z.albert.t@mail.ru

Взаимодействие алкил-2-бромцинк-2-метилпропаноатов, полученных из пропил- или бутил-2-бром-2-метилпропаноата под действием цинка, с 2-метилпропанойл-, бутанойл-, гептанойл- и бензойлхлоридом при кипячении в смеси абсолютизированных бензола и толуола в течение 3 ч приводит к образованию пропил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноата, пропил-2,2-диметил-3-оксогексаноата, пропил-2,2-диметил-3-оксонаноата, бутил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноата и бутил-2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноата, соответственно, с выходами 40–94 %. Полученные β -оксоэфиры были восстановлены с помощью борогидрида натрия в этаноле при нормальных условиях (20–25 °С) в течение 1 ч в соответствующие рацемические β -оксиэфиры с выходами 50–91 %.

Ключевые слова: алкил-2-бромцинк-2-метилпропаноаты; борогидрид натрия; металлирование; рацемические эфиры β -оксикарбонновых кислот; хлорангидриды кислот; цинк; эфиры β -оксокарбонновых кислот.

The interaction of alkyl-2-bromozinc-2-methylpropanoates, obtained from propyl or butyl 2-bromo-2-methylpropanoate by zinc, with 2-methylpropanoyl-, butanoyl-, heptanoyl- and benzoyl chloride while boiling in a mixture of absolutized benzene and toluene for 3 hours resulted in the formation of propyl 2,2,4-trimethyl-3-oxopentanoate, propyl 2,2-dimethyl-3-oxohexanoate, propyl 2,2-dimethyl-3-oxononanoate, butyl 2,2,4-trimethyl-3-oxopentanoate and butyl 2,2-dimethyl-3-oxo-3-phenylpropanoate, respectively, with 40–94 % yields. The resulting β -oxoesters were reduced with sodium borohydride in ethanol under normal conditions (20–25 °C) for 1 hour into corresponding racemic β -hydroxyethers with 50–91 % yields.

Key words: acid chlorides; alkyl-2-bromozinc-2-methylpropanoates; esters of β -oxocarboxylic acids; metallation; racemic esters of β -hydroxycarboxylic acids; sodium borohydride; zinc.

Оксикарбонные кислоты и их эфиры широко используются в органическом синтезе практически ценных соединений ^{1–7}. Особый интерес представляют энантиомерно чистые оксикарбонные кислоты и их эфиры, используемые для получения фармакозначимых соединений со строго определенной конфигурацией заместителей при хиральном атоме углерода.

Например, эфиры α -оксикарбонных кислот применяют в качестве увлажнителей в косметических и фармацевтических препаратах ¹,

они также входят в состав смесей, обладающих дезинфицирующим и антимикробным действием ².

Из энантиомерно чистых β -оксикарбонных кислот и их эфиров получают фармакозначимые соединения (такие как β -аминокислоты ³, β -лактамы ⁴, β -лактоны ⁵), противовоспалительные препараты ⁶, феромоны насекомых ⁷, а также продукты, применяемые в пищевой промышленности, и др.

Разработаны различные подходы к синтезу α - и β -оксикарбонных кислот и их эфиров. Синтез первых базируется на взаимодействии галогенкарбонных кислот с щелочами, превращениях альдегидов или кетонов в соответ-

Дата поступления 21.01.18

ствующие циангидрины с последующим кислотным гидролизом цианогруппы, восстановлении α -оксокарбоновых кислот и др.^{8,9}

При получении оптически активных β -оксифиров ценными промежуточными продуктами являются β -оксоэфиры. Получение β -оксокарбоновых кислот и их эфиров основано на конденсации Клайзена и реакции Реформатского, которые освещены в оригинальных и обзорных статьях^{10–15}. Однако даже такие хорошо изученные реакции, как конденсация Клайзена, являющаяся общим подходом к синтезу β -оксоэфиров, далеко не всегда приводят к удовлетворительным выходам целевых продуктов.

Среди множества упомянутых выше реакций наиболее эффективно протекает взаимодействие галогенангидридов кислот с α -галогидированными эфирами в присутствии цинка. Эта реакция до сих пор была изучена лишь на примере взаимодействия хлорангидридов бензойных кислот с этил-2-бромцинк-2-метилпропаноатом¹¹.

С целью расширения синтетического потенциала данного подхода нами исследована возможность его использования для синтеза β -кетоефиров на основе хлорангидридов алифатических кислот с пропил- или бутил-2-бром-2-метилпропаноатом в присутствии цинка.

Установлено, что при взаимодействии алкил-2-бромцинк-2-метилпропаноатов **1a**, **2a**, полученных действием цинка на пропил- (**1**) или бутил-2-бром-2-метилпропаноат (**2**), с 2-метилпропаноил- (**3**), бутаноил- (**4**), гептаноил- (**5**) и бензоилхлоридом (**6**) при кипячении с обратным холодильником в смеси абсолютизированных бензола и толуола образуются пропил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноат (**7**), пропил-2,2-диметил-3-оксгексаноат (**8**), пропил-2,2-диметил-3-оксононаноат (**9**), бутил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноат (**10**) и бутил-2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноат (**11**), соответственно (схема 1), с выходами 40–94 % (табл. 1).

Эфиры β -оксокарбоновых кислот **7–11** были выделены из реакционной смеси экстрак-

цией серным эфиром и идентифицированы с использованием методов ЯМР ^1H -, ^{13}C -спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии.

Таким образом, в условиях получения α -бензоилированных α,α -диметилзамещенных эфиров карбоновых кислот¹¹ удается осуществить синтез алифатических β -кетоефиров с удовлетворительными выходами.

Из сопоставления выходов продуктов реакции хлорангидридов кислот с алкил-2-бромцинк-2-метилпропаноатами (табл. 1) следует, что в ряду хлорангидридов алифатических кислот нормального строения выходы β -кетоефиров монотонно возрастают с увеличением длины углеводородной цепи хлорангидрида. С наибольшим выходом образуется бутил-2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноат (**11**).

Полученные эфиры β -оксокарбоновых кислот **7–11** были восстановлены с помощью борогидрида натрия. При подборе растворителя для восстановления кетоефиров было обнаружено, что наиболее эффективно реакция протекает в этаноле в течение 1 часа.

Так, при взаимодействии пропил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноата (**7**), пропил-2,2-диметил-3-оксгексаноата (**8**), пропил-2,2-диметил-3-оксононаноата (**9**), бутил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноата (**10**) и бутил-2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноата (**11**) с NaBH_4 (**12**) в этаноле при нормальных условиях (20–25 °C) в течение 1 ч образуются соответствующие рацемические смеси пропил-2,2,4-триметил-3-оксипентаноата (**13**), пропил-2,2-диметил-3-оксигексаноата (**14**), пропил-2,2-диметил-3-оксинонаноата (**15**), бутил-2,2,4-триметил-3-оксипентаноата (**16**) и бутил-2,2-диметил-3-окси-3-фенилпропаноата (**17**) (схема 2) с выходами 50–91 % (табл. 2).

Полученные β -оксифиры **13–17** были выделены из реакционной смеси экстракцией диэтиловым эфиром и идентифицированы с использованием методов ЯМР ^1H -, ^{13}C -спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии.

$\text{R}^1 = n\text{-Pr}$ (**1**, **1a**), $\text{R}^2 = n\text{-Bu}$ (**2**, **2a**); $\text{R}^1 = n\text{-Pr}$, $\text{R}^2 = i\text{-Pr}$ (**3**, **7**), $n\text{-Pr}$ (**4**, **8**), $n\text{-Hx}$ (**5**, **9**);

$\text{R}^1 = n\text{-Bu}$, $\text{R}^2 = i\text{-Pr}$ (**10**), Ph (**6**, **11**).

Схема 1

**Выходы α, α -диметилзамещенных β -оксоэфиров 7–11 в реакции^a
хлорангидридов кислот с алкил-2-бромцинк-2-метилпропаноатами**

Алкил-2-бромцинк-2-метилпропаноат	Хлорангидрид кислоты	β -Оксоэфир	Выход, % от теоретического
 (1)	 (3)	 (7)	40
 (1)	 (4)	 (8)	40
 (1)	 (5)	 (9)	54
 (2)	 (3)	 (10)	59
 (2)	 (6)	 (11)	94

Примечание: ^a — кипячение, растворитель — бензол+толуол, инертная атмосфера (Ar), $\tau = 3$ ч, мольное соотношение (1, 2):(3-6) = 1:1.

$\text{R}^1 = n\text{-Pr}, \text{R}^2 = i\text{-Pr}$ (**13**), $n\text{-Pr}$ (**14**), $n\text{-Hx}$ (**15**); $\text{R}^1 = n\text{-Bu}, \text{R}^2 = i\text{-Pr}$ (**16**), Ph (**17**).

Схема 2

Полученные результаты (табл. 2) показывают, что с наибольшим выходом образуется бутил-2,2-диметил-3-окси-3-фенилпропаноат (**17**). Выходы бутиловых эфиров β -оксикарбоновых кислот **16** и **17** несколько выше, чем пропиловых эфиров ^{13–15}.

Таким образом, показана возможность использования условий синтеза α -бензоилированных эфиров карбоновых кислот для получения α, α -диметилзамещенных алифатических β -оксоэфиров в реакции алкил-2-бром-цинк-2-метилпропаноатов с хлорангидридами алифа-

тических карбоновых кислот нормального и разветвленного строения, а также подобраны условия для эффективного восстановления эфиров β -оксикарбоновых кислот в рацемические β -оксиэфиры в присутствии борогидрида натрия.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C записаны в $((\text{CD}_3)_2\text{SO})$ на приборе Bruker AM-500 (рабочая частота 500.13 и 125.76 МГц соответственно), внутренний стандарт — ТМС. Хромато-

**Выходы α,α -диметилзамещенных β -оксизэфиров в реакции восстановления^a
 β -оксозэфиров 7–11 борогидридом натрия**

β -Оксозэфир	β -Оксизэфир	Выход, % от теоретического
 (7)	 (13)	50
 (8)	 (14)	77
 (9)	 (15)	79
 (10)	 (16)	84
 (11)	 (17)	91

Примечание ^a: $t = 20\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$, растворитель – этанол, инертная атмосфера (Ar), $\tau = 1\text{ ч}$, мольное соотношение (7–11):(12) = 1:1.

графический и масс-спектральный анализы проводили на хроматомасс-спектрометре GCMS-QP2010S Shimadzu (электронная ионизация при 70 эВ, диапазон детектируемых масс 33–350 Да). Использовали капиллярную колонку HP-1MS (30 м $\times$ 0.25 мм $\times$ 0.25 мкм), температура испарителя 280 $^{\circ}\text{C}$, температура ионизационной камеры 200 $^{\circ}\text{C}$. Анализ проводили в режиме программирования температуры от 50 до 300 $^{\circ}\text{C}$ со скоростью 10 $^{\circ}\text{C}/\text{мин}$, газ-носитель – гелий (1.1 мл/мин).

Методика синтеза α,α -диметилзамещенных β -оксозэфиров.

В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, хлоркальциевой трубкой и капельной воронкой, к 0.02 г-ат цинковой пыли в смеси абсолютных растворителей (3 мл бензола и 5 мл толуола) прикапывали при перемешивании смесь 0.02

моль хлорангидрида кислоты **3–6** и 0.02 моль алкил-2-бром-2-метилпропаноата **1, 2**, растворенных в 7 мл бензола и 10 мл толуола. Смесь кипятили при перемешивании в течение 3 часов, пока весь цинк не прореагирует. Затем к охлажденной реакционной смеси при перемешивании прибавляли 20%-ный раствор серной кислоты со льдом. К полученной массе добавляли 30 мл диэтилового эфира и встряхивали. Водный слой промывали 30 мл эфира. Эфирный экстракт объединяли с органической фазой, последовательно промывали насыщенным раствором бикарбоната натрия и водой, сушили Na_2SO_4 и концентрировали. После упаривания эфира получали маслообразные продукты **7–11**, которые анализировали методами газожидкостной хроматографии, хроматомасс-спектрометрии, а также ЯМР ^1H - и ^{13}C -спектроскопии.

Методика восстановления β -оксоэфиров борогидридом натрия

К раствору 1 ммоль β -оксоэфиров **7–11** в 2 мл этанола в течение 5 мин при перемешивании прибавляли 1 ммоль борогидрида натрия, перемешивали в течение 1 ч при температуре 20–25 °С, после чего в реакционную смесь добавляли 5 мл дистиллированной воды и экстрагировали диэтиловым эфиром (3×10 мл). Объединенные эфирные экстракты промывали насыщенным раствором NaCl, сушили Na_2SO_4 и концентрировали. После упаривания эфира получали маслообразные продукты **13–17**, которые анализировали методами газожидкостной хроматографии, хроматомасс-спектрометрии, а также ЯМР ^1H - и ^{13}C -спектроскопии.

Пропил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноат (7).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.84 т (3H, CH_3 , J 7.2 Гц), 0.96 д (6H, CH_3 , J 6.5 Гц), 1.27 с (6H, CH_3), 1.51–1.59 м (2H, CH_2), 2.82–2.90 м (1H, CH), 4.00 т (2H, OCH_2 , J 6.5 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 10.53 (1C, CH_3), 20.44 (2C, CH_3), 21.80 (1C, CH_2), 21.84 (2C, CH_3), 36.19 (1C, CH), 55.88 (1C, C), 66.72 (1C, OCH_2), 173.35 (1C, C=O), 212.53 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{отн.}}$, %): 141 (7), 130 (17), 88 (33), 73 (8), 71 (64), 70 (14), 59 (7), 44 (6), 43 (100), 42 (9), 41 (23), 39 (6).

Пропил-2,2-диметил-3-оксогексаноат (8).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.79 т (3H, CH_3 , J 7.5 Гц), 0.83 т (3H, CH_3 , J 7.5 Гц), 1.25 с (6H, CH_3), 1.41–1.49 м (2H, CH_2), 1.50–1.57 м (2H, CH_2), 2.43 т (2H, CH_2 , J 7 Гц), 3.99 т (2H, OCH_2 , J 6.6 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 10.52 (1C, CH_3), 13.70 (1C, CH_3), 17.11 (1C, CH_3), 21.92 (2C, CH_3), 21.77 (1C, CH_2), 39.34 (1C, CH_2), 55.36 (1C, C), 66.65 (1C, OCH_2), 173.47 (1C, C=O), 208.15 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{отн.}}$, %): 141 (13), 130 (53), 88 (92), 73 (12), 71 (100), 70 (23), 43 (97), 42 (13), 41 (32), 39 (8).

Пропил-2,2-диметил-3-оксоноаноат (9).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.84 т (3H, CH_3 , J 7 Гц), 0.85 т (3H, CH_3 , J 6.4 Гц), 1.20–1.26 м (6H, CH_2), 1.26 с (6H, CH_3), 1.44–1.52 м (2H, CH_2), 1.53–1.59 м (2H, CH_2), 2.46 т (2H, CH_2 , J 7.2 Гц), 4.00 т (2H, OCH_2 , J 6.4 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 10.53 (1C, CH_3), 14.23 (1C, CH_3), 21.77 (1C, CH_2), 21.93 (2C, CH_3), 22.38 (1C, CH_2), 23.66 (1C, CH_2), 28.44 (1C, CH_2), 31.47 (1C, CH_2), 37.45 (1C, CH_2), 55.38 (1C, C), 66.65 (1C, OCH_2), 173.44 (1C, C=O), 208.14 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{отн.}}$, %): 130 (61), 113

(59), 88 (59), 85 (34), 70 (20), 57 (20), 55 (10), 43 (100), 42 (12), 41 (29).

Бутил-2,2,4-триметил-3-оксопентаноат (10).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.85 т (3H, CH_3 , J 7.2 Гц), 0.96 д (6H, CH_3 , J 6.8 Гц), 1.26 с (6H, CH_3), 1.24–1.32 м (2H, CH_2), 1.49–1.55 м (2H, CH_2), 2.82–2.90 м (1H, CH), 4.04 т (2H, OCH_2 , J 6.5 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 13.86 (1C, CH_3), 18.94 (1C, CH_2), 20.43 (2C, CH_3), 21.83 (2C, CH_3), 30.42 (1C, CH_2), 36.19 (1C, CH), 55.86 (1C, C), 64.97 (1C, OCH_2), 173.33 (1C, C=O), 212.48 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{отн.}}$, %): 144 (23), 141 (6), 88 (47), 73 (8), 71 (82), 70 (18), 59 (7), 57 (5), 44 (10), 43 (100), 42 (9), 41 (24), 39 (5).

Бутил-2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноат (11).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.66 т (3H, CH_3 , J 7.2 Гц), 0.94–1.02 м (2H, CH_2), 1.30–1.36 м (2H, CH_2), 1.43 с (6H, CH_3), 4.00 т (2H, OCH_2 , J 6.41 Гц), 7.48–7.74 м (5H, CH_{Ar}). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 13.65 (1C, CH_3), 18.65 (1C, CH_2), 23.95 (2C, CH_3), 30.09 (1C, CH_2), 53.15 (1C, C), 65.14 (1C, OCH_2), 128.52 (2C, CH_{Ar}), 129.18 (2C, CH_{Ar}), 133.41 (1C, CH_{Ar}), 135.03 (1C, C_{Ar}), 174.57 (1C, C=O), 197.68 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{отн.}}$, %): 175 (1), 106 (8), 105 (100), 91 (1), 78 (2), 77 (20), 70 (3), 51 (3), 44 (4), 42 (2), 41 (4), 39 (1).

Пропил-2,2,4-триметил-3-оксипентаноат (13).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.77 д (3H, CH_3 , J 6.7 Гц), 0.88 т (6H, CH_3 , J 6.7 Гц), 1.01 с (3H, CH_3), 1.09 с (3H, CH_3), 1.53–1.58 м (2H, CH_2), 1.97 с (1H, CH), 2.50 с (1H, OH), 3.36–3.39 м (1H, CH_{OH}), 3.92 т (2H, OCH_2 , J 6.4 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 10.48 (1C, CH_3), 18.57 (1C, CH_3), 19.22 (1C, CH_3), 21.02 (1C, CH_3), 21.56 (1C, CH_2), 23.56 (1C, CH_3), 28.58 (1C, CH), 46.97 (1C, C), 65.34 (1C, OCH_2), 78.49 (1C, CH), 177.21 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{отн.}}$, %): 159 (11), 143 (11), 130 (29), 117 (27), 99 (39), 88 (100), 73 (30), 71 (33), 70 (31), 57 (10), 55 (15), 43 (60), 42 (10), 41 (28).

Пропил-2,2-диметил-3-оксигексаноат (14).

Спектр ЯМР ^1H (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ , м. д.): 0.85 т (3H, CH_3 , J 7.6 Гц), 0.88 т (3H, CH_3 , J 7.7 Гц), 0.97 с (3H, CH_3), 1.06 с (3H, CH_3), 1.41–1.62 м (6H, CH_2), 2.50 с (1H, OH), 3.48–3.61 м (1H, CH_{OH}), 3.95 т (2H, OCH_2 , J 6.7 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (в $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$, δ_{C} , м. д.): 10.70 (1C, CH_3), 14.30 (1C, CH_3), 19.79 (1C, CH_3), 19.82 (1C, CH_2), 21.94 (1C, CH_2), 22.03 (1C, CH_2), 34.32 (1C, CH_2), 47.70 (1C, C),

65.55 (1C, OCH₂), 74.52 (1C, CH), 176.91 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{омн.}}$, %): 130 (29), 99 (11), 88 (100), 71 (15), 70 (36), 59 (11), 57 (11), 45 (12), 43 (64), 42 (18), 41 (48), 39 (13).

Пропил-2,2-диметил-3-оксинаноат (15).

Спектр ЯМР ¹H (в (CD₃)₂SO, δ , м. д.): 0.84 т (3H, CH₃, J 7.3 Гц), 0.87 т (3H, CH₃, J 7.6 Гц), 0.97 с (3H, CH₃), 1.06 с (3H, CH₃), 1.17-1.49 м (2H, CH₂), 1.17-1.26 м (6H, CH₂), 1.42-1.49 м (2H, CH₂), 1.51-1.58 м (2H, CH₂), 2.50 с (1H, OH), 3.37-3.42 м (1H, CH₂OH), 3.92 т (2H, CH₂, J 6.5 Гц). Спектр ЯМР ¹³C (в (CD₃)₂SO, δ , м. д.): 10.46 (1C, CH₃), 14.09 (1C, CH₃), 19.41 (1C, CH₃), 21.69 (1C, CH₂), 21.92 (1C, CH₃), 22.24 (1C, CH₂), 26.37 (1C, CH₂), 28.80 (1C, CH₂), 31.44 (1C, CH₂), 31.84 (1C, CH₂), 47.50 (1C, C), 65.34 (1C, OCH₂), 74.57 (1C, CH), 176.72 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{омн.}}$, %): 130 (39), 88 (100), 73 (19), 71 (11), 70 (33), 69 (12), 57 (16), 55 (23), 44 (15), 43 (70), 42 (17), 41 (56), 39 (12).

Бутил-2,2,4-триметил-3-оксипентаноат (16).

Спектр ЯМР ¹H (в (CD₃)₂SO, δ , м. д.): 0.76 д (3H, CH₃, J 7.0 Гц), 0.87 т (3H, CH₃, J 6.4 Гц), 0.88 д (3H, CH₃, J 7.3 Гц), 1.00 с (3H, CH₃), 1.09 с (3H, CH₃), 1.29-1.36 м (2H, CH₂), 1.50-1.59 м (2H, CH₂), 1.53 с (1H, CH),

2.49 с (1H, OH), 3.37 т (1H, CH₂OH, J 6.4 Гц), 3.93-3.98 м (2H, OCH₂). Спектр ЯМР ¹³C (в (CD₃)₂SO, δ , м. д.): 13.93 (1C, CH₃), 18.83 (1C, CH₃), 19.13 (1C, CH₂), 19.49 (1C, CH₃), 21.29 (1C, CH₃), 25.00 (1C, CH₃), 30.48 (1C, CH₂), 31.13 (1C, CH), 47.24 (1C, C), 63.82 (1C, OCH₂), 78.76 (1C, CH), 177.45 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{омн.}}$, %): 144 (16), 117 (24), 99 (31), 88 (100), 73 (29), 71 (27), 70 (32), 57 (34), 55 (24), 45 (10), 43 (59), 42 (16), 41 (65), 39 (16).

Бутил-2,2-диметил-3-окси-3-фенилпропаноат (17).

Спектр ЯМР ¹H (в (CD₃)₂SO, δ , м. д.): 0.86 т (3H, CH₃, J 7.5 Гц), 0.90 с (3H, CH₃), 1.03 с (3H, CH₃), 1.27-1.34 м (2H, CH₂), 1.50-1.55 м (2H, CH₂), 2.49 с (1H, OH), 3.98 т (2H, OCH₂, J 6.4 Гц), 4.80-4.81 м (1H, CH₂OH), 7.21-7.30 м (5H, CH_{Ar}). Спектр ЯМР ¹³C (в (CD₃)₂SO, δ , м. д.): 14.03 (1C, CH₃), 19.11 (1C, CH₃), 20.13 (1C, CH₂), 21.74 (1C, CH₃), 30.61 (1C, CH₂), 48.16 (1C, C), 64.01 (1C, OCH₂), 77.17 (1C, CH), 127.53 (1C, CH_{Ar}), 127.79 (2C, CH_{Ar}), 127.89 (2C, CH_{Ar}), 142.21 (1C, C_{Ar}), 176.47 (1C, C=O). Масс-спектр, m/z ($I_{\text{омн.}}$, %): 144 (35), 107 (17), 88 (100), 79 (21), 77 (17), 73 (17), 70 (17), 57 (8), 43 (14), 41 (16).

Литература

1. Torres C., Otero C. Part I. Enzymatic synthesis of lactate and glycolate esters of fatty alcohols // *Enzyme and Microbial Technology*.— 1999.— V.25.— Pp.745-752.
2. Kavcic S., Knez Z., Leitgeb M. Antimicrobial activity of *n*-butyl lactate obtained via enzymatic esterification of lactic acid with *n*-butanol in supercritical trifluoromethane // *J. of Supercritical Fluids*.— 2014.— V.85.— Pp.143-150.
3. Thaisrivongs S., Schostarez H. J., Pals D. T., Turner S. R. α,α -Difluoro- β -aminodeoxystatine-containing renin-inhibitory peptides // *J. Med. Chem.*— 1987.— V.30.— Pp.1837-1842.
4. Schostarez H. J. A stereospecific synthesis of 3-aminodeoxystatine // *J. Org. Chem.*— 1988.— V.53.— Pp.3628-3631.
5. Capozzi G., Roelens S., Talami S. A protocol for the efficient synthesis of enantiopure β -substituted β -lactones // *J. Org. Chem.*— 1993.— V.58.— Pp.7932-7936.
6. Oertle K. A Facile Synthesis of Optically Pure (–)-(S)-Ipsenol Using a Chiral Titanium Complex // *Helv. Chim. Acta*.— 1990.— V.73.— Pp.353-358.
7. Abdel-Rahman H. M., Hussein M. A. Synthesis of *beta*-hydroxypropanoic acid derivatives as potential *anti*-inflammatory, analgesic and antimicrobial agents // *Arch. Pharm.*— 2006.— V.339.— Pp.378-387.
8. Бартон Д., Оллис У. Д. Общая органическая химия. Т. 4. Карбоновые кислоты и их производные.

References

1. Torres C., Otero C. [Part I. Enzymatic synthesis of lactate and glycolate esters of fatty alcohols]. *Enzyme and Microbial Technology*, 1999, vol.25, pp.745-752. doi:10.1016/S0141-0229(99)00117-9.
2. Kavcic S., Knez Z., Leitgeb M. [Antimicrobial activity of *n*-butyl lactate obtained via enzymatic esterification of lactic acid with *n*-butanol in supercritical trifluoromethane]. *J. of Supercritical Fluids*, 2014, vol.85, pp.143-150. doi:10.1016/j.supflu.2013.11.003
3. Thaisrivongs S., Schostarez H. J., Pals D. T., Turner S. R. [α,α -Difluoro- β -aminodeoxystatine-containing renin-inhibitory peptides]. *J. Med. Chem.*, 1987, vol.30, pp.1837-1842. doi: 10.1021/jm00393a026.
4. Schostarez H. J. [A stereospecific synthesis of 3-aminodeoxystatine]. *J. Org. Chem.*, 1988, v.53, pp.3628-3631. doi: 10.1021/jo00250a046.
5. Capozzi G., Roelens S., Talami S. [A protocol for the efficient synthesis of enantiopure β -substituted β -lactones]. *J. Org. Chem.*, 1993, v.58, p.7932-7936. doi: 10.1021/jo00079a049.
6. Oertle K. [A Facile Synthesis of Optically Pure (–)-(S)-Ipsenol Using a Chiral Titanium Complex]. *Helv. Chim. Acta*, 1990, v.73, pp.353-358. doi: 10.1002/hlca.19900730215.
7. Abdel-Rahman H. M., Hussein M. A. [Synthesis of *beta*-hydroxypropanoic acid derivatives as potential *anti*-inflammatory, analgesic and antimicrobial agents]. *Arch. Pharm*, 2006, v.339, pp.378-387. doi: 10.1002/ardp.200600016.

- водные. Соединения фосфора.— М.: Химия, 1983.— С. 160.
9. Ленкова А. О., Зорин А. В., Чанышева А. Р., Зорин В. В. Взаимодействие α -карбаниона бутирата лития с *трет*-бутилгипохлоритом // Баш. хим. ж.— 2017.— Т.24, №2.— С.33-35.
10. Хайзер Ч., Хадсон Б. Конденсация сложных эфиров и смежные реакции / Органические реакции. Сборник 1.— М.: Госиноиздат.— 1948.— С.345-398.
11. Bayless P. L., Hauser Ch. R. A Reformatsky Type Condensation of Aroyl Chlorides with Ethyl α -Bromoisobutyrate by Means of Zinc to Form β -Keto Esters // J. Am. Chem. Soc.— 1954.— V.76, no.9.— Pp.2306-2308.
12. Дашкевич Б. Н., Цмур Ю. Ю. Синтез метил- β -кетокислот // ЖОХ.— 1955.— Т.25.— С.932-934.
13. Luniak A. Uber die Einwirkung von Bromesigsäure-ethylester und Zink auf die Anhydride der einbasischen Säuren // Berichte.— 1909.— V.42, no.4.— Pp.4808-4811.
14. Fittig R., Daimler G. Ueber die Einwirkung von Chloressigsäureäther und Zink auf Oxaläther // Berichte.— 1887.— V.20, no.2.— Pp. 202-203.
15. Bloom M. S., Hauser C. R. The Use of Certain Phenyl Esters in the Reformatsky Reaction // J. Am. Chem. Soc.— 1944.— V.66, no.1.— Pp. 152-153.
8. Barton D., Ollis U. D. *Obshchaya organicheskaya khimiya. V. 4. Karbovoye kisloty i ikh proizvodnye. Soedineniya fosfora* [General organic chemistry. Vol. 4. Carboxylic acids and their derivatives. Phosphorus compounds]. Moscow, Khimiya Publ., 1983, p. 160.
9. Lenkova A. O., Zorin A. V., Chanysheva A. R., Zorin V. V. *Vzaimodeistvie α -karbaniona butirata litiya s tret-butilgipokhloritom* [Interaction of butyrate lithium α -carbanion with *tert*-butyl hypochlorite]. *Bashkirskii khimicheskii zhurnal* [Bashkir Chemical Journal], 2017, v.24, no.2, pp.33-35.
10. Khaizer Ch., Khadson B. *Kondensatsiya slozhnykh efirov i smezhnye reaksii*. Organicheskie reaksii. Sbornik 1 [Condensation of esters and related reactions. Organic reactions. Col.1]. Moscow, Gosinoizdat Publ., 1948, pp.345-398.
11. Bayless P. L., Hauser Ch. R. [A Reformatsky Type Condensation of Aroyl Chlorides with Ethyl α -Bromoisobutyrate by Means of Zinc to Form β -Keto Esters]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1954, v.76, no.9, pp.2306-2308. doi: 10.1021/ja01638a007.
12. Dashkevich B. N., Tsmur Yu. Yu. *Sintez metil- β -ketokislot* [Synthesis of methyl- β -ketoacids] *Zhurnal obshchei khimii* [Journal of General Chemistry], 1955, v.25, pp.932-934.
13. Luniak A. [Uber die Einwirkung von Bromesigsäure-ethylester und Zink auf die Anhydride der einbasischen Säuren]. *Berichte*, 1909, vol.42, no.4, pp.4808-4811. doi: 10.1002/cber.19090420499.
14. Fittig R., Daimler G. [Ueber die Einwirkung von Chloressigsäureäther und Zink auf Oxaläther]. *Berichte*, 1887, vol.20, no.2, pp.202-203. doi: 10.1002/cber.18870200152.
15. Bloom M. S., Hauser C. R. [The Use of Certain Phenyl Esters in the Reformatsky Reaction]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1944, vol.66, no.1, pp.152-153. doi: 10.1021/ja01229a044.