REVISTA ESPAÑOLA DE

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

The Spanish Journal of Gastroenterology

www.reed.es
(Open Access)

NOVIEMBRE 2019 · VOLUMEN 111
Suplemento 2· Págs.: 1-78

Factor de Impacto (2018):
JCR: 1,858 (Q4) / SJR: 0,52 (Q2)

Órgano de expresión científica de:

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED)

Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED)

41 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Alicante, 14-16 de noviembre de 2019

ARÁN Ediciones, S.L.

code: READBN
ISSN: 1130-0108

CO-20. ESTUDIO MULTICÉNTRO INTERNACIONAL SOBRE EL MANEJO DE PACIENTES DESPUÉS DE UN POEM FALLIDO

Eduardo Albéniz, Diego Martínez-Acitores de la Mata, Fermín Estremera, Ignacio Fernández-Urién, Laura Uribarri, Mathieu Pioche, Amol Bapaye, Daniella Assis, Mouen Khashab, Juan José Vila

Introducción y objetivos: La miotomía endoscópica o POEM es un tratamiento primario de diversos trastornos motores esofágicos. Aunque las tasas de éxito del procedimiento son muy altas (en general > 90%), pueden ocurrir fallos de tratamiento, desconociéndose el manejo posterior de estos pacientes. Los objetivos fueron valorar las tasas de éxito clínico y seguridad del Redo-POEM (POEM tras POEM fallido), frente a la dilatación neumática (DN), la miotomía de Heller (MH) o la toxina botulínica (TB).

Métodos: Estudio multicéntrico internacional, retrospectivo en 19 centros terciarios (enero 2012-agosto 2018). Se incluyeron todos los pacientes con POEM fallido para el tratamiento de la acalasia u otros trastornos motores (Eckardt > 3 durante el seguimiento).

Resultados: Se realizaron 3251 POEM y 110 (3,38%) experimentaron fracaso clínico (46,46% mujeres, edad media 51 años). El principal trastorno de motilidad fue la acalasia (82,72%). La presión media de relajación integrada (IRP) después del POEM fallido fue de $15,28 \pm 11,97$ mmHg. Treinta y ocho pacientes (34,5%) fueron sometidos a Redo-POEM, 32 (29,1%) a DN, 8 (7,3%) MH, 2 (1,8%) TB y 30 (27,3%) fueron tratados de forma conservadora. Se logró el éxito clínico en 40/80 (50%) pacientes que se sometieron a un retratamiento durante un seguimiento medio de 265,76 días: 74,20% en Redo-POEM, 60% en DN y 20% en MH ($p = 0,01$ entre Redo-POEM y Heller). Eckardt medio postratamiento en Redo-POEM de 1 (0-8), 3 (0-9) en DN y 4 (0-8 en MH) ($p = 0,053$). Dos pacientes (5,2%) tuvieron eventos adversos por el Redo-POEM (una mucosotomía (EA leve), una fuga esofágica (EA moderado)).

Conclusiones: El fallo clínico tras el POEM no es frecuente. En este estudio retrospectivo, el POEM y la dilatación neumática son buenas opciones de tratamiento, sin embargo, se precisa individualizar el tratamiento según el trastorno motor de base.