REVISTA ESPAÑOLA DE

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

The Spanish Journal of Gastroenterology

www.reed.es
(Open Access)

NOVIEMBRE 2019 · VOLUMEN 111
Suplemento 2· Págs.: 1-78

Factor de Impacto (2018):
JCR: 1,858 (Q4) / SJR: 0,52 (Q2)

Órgano de expresión científica de:

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED)

Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED)

41 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Alicante, 14-16 de noviembre de 2019

ARÁN Ediciones, S.L.

code: READBN
ISSN: 1130-0108

P-065. COAGULACIÓN CON ARGÓN PLASMA: UN TRATAMIENTO EFICAZ EN LA PROCTITIS ACTÍNICA

Ana Gómez Rodríguez, Carolina del Hierro Galindo, David Nogueira Sentíes, Ignacio Martín-Granizo Barrrenechea, Alfonso Martínez Turnes, José Ignacio Rodríguez Prada

Introducción: La proctitis actínica afecta al 5-20% de los pacientes que han recibido radioterapia pélvica. Existe una forma aguda autolimitada y otra crónica que aparece meses o años después de manejo más complejo. La radiación induce la formación de neovasos en la mucosa rectal, siendo la clínica más frecuente la rectorragia y el diagnóstico clínico-endoscópico. No existen ensayos clínicos aleatorizados que evalúen el tratamiento de la proctitis rádica, tradicionalmente se ha utilizado la coagulación con argón plasma de las lesiones vasculares como tratamiento de primera línea.

Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con argón plasma en pacientes con proctitis actínica en nuestro centro.

Material y método: Estudio retrospectivo observacional en el que se recogen y analizan los pacientes con proctitis actínica tratados con argón plasma en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo entre los años 2016-2018.

Resultados: Se han tratado un total de 13 pacientes, 12 de ellos varones, con antecedentes de neoplasia de próstata (92.3%) y 1 mujer con antecedente de neoplasia de cérvix (7.7%). La dosis de radiación media recibida fue 61.8 Gy, siendo la mayor 79 Gy y la menor 45 Gy. Todos recibieron como tratamiento inicial electrocoagulación con argón plasma con una eficacia del 92.8% (12 pacientes). La media de sesiones necesarias fue 2 y la mediana 2.5. Los pacientes con una proctitis moderada-severa necesitaron 3 sesiones (6 pacientes, 46%) y las formas leves 1 sesión (5 pacientes, 38.4%). En la mayoría de los pacientes (11, 84.6%) la técnica fue bien tolerada y no presentó complicaciones, 2 casos (15.4%) presentaron úlceras rectales que se resolvieron con tratamiento conservador.

Conclusiones: En el tratamiento de la proctitis actínica la electrocoagulación con argón plasma es una técnica eficaz y segura.