REVISTA ESPAÑOLA DE

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

The Spanish Journal of Gastroenterology

www.reed.es
(Open Access)

NOVIEMBRE 2018 · VOLUMEN 110
Suplemento 3

Factor de Impacto (2017):
JCR: 1,632 (Q4) / SJR: 0,417 (Q3)

Órgano de expresión científica de:

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED)
Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED)

40 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Zaragoza, 14-17 de noviembre de 2018

CO-29. IMPACTO DE LAS LESIONES DETECTADAS EN CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN Y ENTERORM SIN LESIONES

Castro-Poceiro, Jesús¹; Fernández-Clotet, Agnés¹; Ricart, Elena¹; Ordás, Ingrid¹; Rodríguez, Sonia¹; Pleskow, Douglas²; Llach, Josep¹; Panés, Juliá¹; Moss, Alan C.²; González-Suárez, Begoña¹

¹Hospital Clínic. Barcelona, España. ²Harvard University. Boston, Estados Unidos

Introducción: La enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, la localización proximal ha demostrado ser un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Estudios recientes han demostrado una mayor rentabilidad diagnóstica de la Cápsula endoscópica (CE) frente a la Enterioresonancia magnética (RMN) a la hora de valorar las lesiones proximales de los pacientes con EC, que en ocasiones son poco específicas.

Objetivo: Valorar si las lesiones diagnosticadas por CE que la RMN no identifica tienen alguna implicación en el pronóstico de los pacientes con EC.

Material y método: Seleccionamos una cohorte de 120 pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de EC a los cuales se les practicó un estudio mediante RMN y CE en un periodo inferior a 6 meses. La RMN detectó lesiones en un 29,2% de los pacientes frente a un 54,2% mediante CE. Se seleccionó al subgrupo de 21 pacientes con EC y estudio mediante RMN negativa, y se comparó su evolución en base al resultado de la CE.

Resultados: Tras un seguimiento medio de $40,4 \pm 26,7$ meses se observó que los pacientes con cápsula positiva presentaban mayor recidiva en el seguimiento (40% frente a 36%), mayor necesidad de ingreso hospitalario (20% frente a 0%) y mayor necesidad de cirugía (20% frente a 9,09%) que aquellos con CE negativa.

Conclusiones: La valoración mediante CE detecta lesiones que podrían impactar de forma negativa en el pronóstico de los pacientes con EC y, por tanto, sugerimos que debería formar parte de la valoración inicial de estos pacientes.