REVISTA ESPAÑOLA DE

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

The Spanish Journal of Gastroenterology

www.reed.es
(Open Access)

NOVIEMBRE 2018 · VOLUMEN 110
Suplemento 3

Factor de Impacto (2017):
JCR: 1,632 (Q4) / SJR: 0,417 (Q3)

Órgano de expresión científica de:

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED)
Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED)

40 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Zaragoza, 14-17 de noviembre de 2018

P-006. PREVALENCIA DE METAPLASIA Y DISPLASIA GÁSTRICA EN PACIENTES CON GASTRITIS VERRUCOSA: ESTUDIO RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO CON CORRELACIÓN ENDOSCÓPICA E HISTOLÓGICA

Albert, Marc¹; Busquets, David¹; Torrealba, Leyanira¹; Espinos, Jorge²; Mata, Alfredo²; Rosinach, Mercé²; Termino, Rocío²; Piñol, Virginia¹; Aldeguer, Xavier¹; Uchima, Hugo¹

¹Hospital Universitari Josep Trueta. Girona. ²Centro Médico Teknon. Barcelona

Introducción: La gastritis verrucosa (también denominada gastritis erosiva crónica o gastritis varioliforme) se trata de una entidad de diagnóstico endoscópico con prevalencia alrededor de 0,3-2,8%, sin una sintomatología clínica específica, que se basa en la presencia de lesiones nodulares, habitualmente múltiples, presentando una erosión o depresión central. Inicialmente descrita en 1947 por Moutier y Martin, se ha relacionado con la infección por *Helicobacter pylori*, enfermedad celíaca, linfoma, enfermedad de Ménétrier, atopia y hepatopatía crónica. En 1960, Muñoz Monteavaro observó el desarrollo de carcinomatosis "in situ" en un paciente con VG, desde entonces varios estudios han sugerido su asociación con la neoplasia gástrica, sin poder establecerse de forma clara.

Objetivo: Estudio de las características histológicas de gastritis verrucosa por la presencia de displasia, metaplasia o tan solo gastritis, así como la presencia de *H. pylori* o antecedentes familiares de neoplasia gástrica.

Material y método: Análisis retrospectivo del total de gastroscopias realizadas en 2 centros en período comprendido entre enero 2014 y junio 2018 llevadas a cabo por endoscopista con experiencia en el reconocimiento de lesiones gástricas, recogiendo datos demográficos, clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos, incluyendo las endoscopias de seguimiento.

Resultados: Serie de 67 pacientes con una edad media de 60,48 años (DE 11,36) siendo el 49,25% del género masculino. Se evidencia metaplasia intestinal (al menos en 1 ocasión) en el 74.2% de los pacientes, y la presencia de displasia (al menos en 1 ocasión) en el 24.2% de los pacientes.

Conclusiones: La gastritis verrucosa permitiría la identificación de una mucosa gástrica de riesgo, pudiendo ser de utilidad para la detección de lesiones displásicas gástricas. Son necesarios estudios de mayor tamaño para poder establecer más asociaciones al respecto.