REVISTA ESPAÑOLA DE

ENFERMEDADES DIGESTIVAS

The Spanish Journal of Gastroenterology

www.reed.es
(Open Access)

NOVIEMBRE 2018 · VOLUMEN 110
Suplemento 3

Factor de Impacto (2017):
JCR: 1,632 (Q4) / SJR: 0,417 (Q3)

Órgano de expresión científica de:

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED)
Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED)

40 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Zaragoza, 14-17 de noviembre de 2018

P-025. ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Kheiri Vázquez, Sandra; Igualada Escribano, Laura; García Gallego, María Teresa; Golmayo Flethes, Carmen; Castellano López, Amelia; García Centeno, Pilar; Gala Moreno, Irene; Navajas Serena, Sara; Higuera Fernández, María Isabel; Poves Martínez, Elvira

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

Introducción: La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria mediada inmunológicamente por la exposición antigénica. Se trata de una patología cada vez más prevalente (1/1800), siendo la segunda causa de esofagitis crónica tras la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la principal causa de impactación en adultos jóvenes y niños.

Objetivo: Analizar qué tipo de población es la más afectada por esta patología, qué síntomas digestivos y alérgicos presentan estos pacientes y qué hallazgos endoscópicos podemos encontrar.

Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo que analiza todos los pacientes diagnosticados de esofagitis eosinofílica con criterios clínicos, endoscópicos e histológicos (> 15 eosinófilos por campo de gran aumento) sin tener en cuenta la respuesta a IBP como criterio diagnóstico según apuntan los últimos trabajos.

Resultados: En el periodo comprendido entre enero/2016 y junio/2018 se diagnosticaron 49 casos de esofagitis eosinofílica. 37 (75,5%) eran varones con una edad media de 37 años (rango 8-66).

El síntoma principal fue la disfagia con un 98% (48) seguido de pirosis en el 36,7% (18). Los vómitos y el dolor torácico se presentaron en un 12% (6) en cada caso, situándose la impactación al mismo nivel con un 12%.

En cuanto a los síntomas alérgicos el 34,6% (17) no presentaron ningún síntoma. De los que presentaron componente alérgico la rinitis fue el síntoma más prevalente 46,9% (23), presentándose la alergia alimentaria en un 36,73% de los pacientes. Se objetivó de manera llamativa una elevación de la IgE por encima del valor normal en el 44,89% (22).

Los hallazgos endoscópicos más frecuente se recogen en la tabla 1, siendo el más prevalente la traquealización esofágica.

Conclusiones: Se confirma que la esofagitis eosinofílica es más prevalente en varones jóvenes siendo frecuente la asociación a síntoma alérgicos. En nuestra revisión el síntoma principal ha sido la disfagia siendo llamativo el hallazgo de traquealización en la endoscopia.

Tabla 1

Hallazgos endoscópicos	
Traquealización	29 (59%)
Surcos longitudinales	24 (49%)
Exudados blanquecinos	7 (14,3%)
Anillos	6 (12,2%)
Estenosis esofágica	4 (8,2%)
Palidez mucosa	2 (4,1%)
Mucosa friable	2 (4,1%)