АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ СЕВЕРА

Я.Л. ВОЛЬПЕРТ
Е.Г. ШАДРИНА

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРИ

НОВОСИБИРСК
"НАУКА"
2002

Вольперт Я.Л., Шадрина Е.Г. Мелкие млекопитающие северо-востока Сибири. — Новосибирск: Наука, 2002. — 246 с.
ISBN 5—02—031489—7.

На основе оригинальных данных, собранных в долинах среднего и нижнего течения рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы, рассмотрены популяционные показатели 17 видов мелких млекопитающих. Приводятся сведения о морфометрических характеристиках, распространении по региону, ландшафтной и биотопической приуроченности, питании, размножении, половозрастной структуре популяций. Проведен анализ изменчивости показателей в географическом плане, что позволило выявить особенности северных популяций, являющиеся результатом адаптации к специфическим условиям существования на северном пределе распространения видов.

Книга представляет интерес для зоологов и экологов.
Табл. 59. Ил. 79. Библиогр.: 355 назв.

Рецензенты

доктор биологических наук Л.Г. Варпанетов
доктор биологических наук В.Г. Дегтярев
кандидат биологических наук В.Н. Винокуров

Утверждено к печати Ученым советом
Института прикладной экологии Севера АН РС(Я)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Глава 1	
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	8
Глава 2	
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ	12
Глава 3	
БИОЛОГИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ	27
3.1. Крошечная бурозубка — <i>Sorex minutissimus</i> Zimmermann, 1780	27
3.2. Крупнозубая бурозубка — <i>Sorex daphaenodon</i> Thomas, 1907	31
3.3. Равнозубая бурозубка — <i>Sorex isodon</i> Turov, 1924	38
3.4. Бурая бурозубка — <i>Sorex roboratus</i> Hollister, 1913	43
3.5. Тундряная бурозубка — <i>Sorex tundrensis</i> Merriam, 1900	48
3.6. Средняя бурозубка — <i>Sorex caecutiens</i> Laxmann, 1788	62
3.7. Восточноазиатская мышь — <i>Apodemus peninsulae</i> Thomas, 1907	81
3.8. Мышь-малютка — <i>Micromys minutus</i> Pallas, 1758	85
3.9. Красно-серая полевка — <i>Clethrionomys rufocanus</i> Sundervall, 1846–1847	88
3.10. Красная полевка — <i>Clethrionomys rutilus</i> Pallas, 1779	107
3.11. Сибирский лемминг — <i>Lemmus sibiricus</i> Kerr, 1792	128
3.12. Лесной лемминг — <i>Myopus schisticolor</i> Lilljeborg, 1844	136
3.13. Водяная полевка — <i>Arvicola terrestris</i> Linnaeus, 1758	156
3.14. Узкочерепная полевка — <i>Microtus gregalis</i> Pallas, 1779	161
3.15. Северосибирская полевка — <i>Microtus hyperboreus</i> Vinogradov, 1933	165
3.16. Полевка Миддендорфа — <i>Microtus middendorffi</i> Poljakov, 1881	170
3.17. Полевка-экономка — <i>Microtus oeconomus</i> Pallas, 1776	173
Глава 4	
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕВЕРНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ	191
4.1. Морфометрическая характеристика мелких млекопитающих	191
4.2. Рационы мелких млекопитающих	202
4.3. Репродуктивные параметры	210
4.4. Движение численности	218
4.5. Возрастная структура популяций	224
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	228

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основой настоящей работы послужили многолетние исследования авторов в бассейнах Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Указанная территория характеризуется экстремальными климатическими условиями, что накладывает отпечаток как на фауну, так и на основные экологические параметры популяций млекопитающих, обитающих в этом регионе.

Мелкие млекопитающие в силу своей многочисленности являются важнейшим элементом экосистем, а также массовыми потребителями растительности и насекомых. Относительная многочисленность, а также широкое распространение делают их удобной моделью для изучения вопросов популяционной экологии, в частности путей адаптации к специфическим условиям Севера.

Первые литературные сведения о млекопитающих Якутии приводятся в работах А.Ф. Миддендорфа [1869], И.С. Полякова [1873], Р.К. Маака [1886], Ф. Врангеля [1841], В.И. Иохельсона [1898], С.А. Бутурлина [1913]. Необходимо отметить, что в перечисленных публикациях основное внимание уделено охотничье-промысловым видам, сведения о фауне мелких млекопитающих носят фрагментарный характер.

Принципиально новый этап в изучении млекопитающих Якутии начался в результате деятельности Якутской комплексной экспедиции АН СССР, когда появился целый ряд работ, посвященных млекопитающим Якутии, в том числе и мелким [Тугаринов, 1927; Воробьева, 1928; Бианки, 1929; Ткаченко, 1929; и др.]. Вопросам систематики мелких млекопитающих, в основном по сборам указанной экспедиции, посвящены работы Б.С. Виноградова [1927а,б, 1933]. Наиболее полный первый обзор млекопитающих Якутии вышел в 1934 г. [Тугаринов и др., 1934].

Материал по мелким млекопитающим, собранный указанными авторами, был использован С.И. Огневым для написания его известных трудов, посвященных фауне СССР в целом [Огнев, 1926, 1928, 1940, 1944, 1947, 1948, 1950]. Сведения по фауне грызунов Централь-

ной Якутии приводятся в работах В.Н. Скалона [1949] и П.Д. Ларионова [1954]. Вопросы систематического положения якутских бурозубок рассмотрены С.У. Строгоновым [1957], им в фауну Якутии включены 9 видов землероек: помимо видов, входящих в состав фауны по современным представлениям, приводится еще трансарктическая бурозубка *Sorex cinereus* Kerr (1872), что в дальнейшем не подтвердилось [Юдин, 1972, 1973].

Начиная с 1960 г., объем опубликованных работ, посвященных мелким млекопитающим Якутии, резко возрос, причем внимание исследователей привлекали уже не только вопросы фауны, но в основном экологические аспекты. Большое количество публикаций этого плана посвящено экологическим характеристикам и распространению отдельных видов в различных частях Якутии. Наибольшее внимание исследователей привлекали лесные полевки [Зонов, Тугутов, 1963; Попов, 1964; Тугутов, 1966; Мордосов и др., 1975; Мордосов, 1984; Мордосов, Осипов, 1984; Мордосов, Андреев, 1991; Мордосов, 1991; Сафронов, 1974, 1977, 1978, 1983; и др.]. Последний автор посвятил свои исследования в основном зимней экологии этих видов как наименее изученной стороне жизни мелких млекопитающих.

Экологические характеристики одного из основных видов поймы — водяной полевки — рассматриваются Н.Г. Соломоновым [1958, 1960а—в, 1962]. Итоги исследования вида подведены в монографии этого автора [Соломонов, 1980].

Кроме указанной литературы, имеется широкий круг публикаций, охватывающих вопросы экологии других видов мелких млекопитающих [Капитонов, 1963; Кривошеев, 1963; Винокуров, Прокопьев, 1974; Седалищев, 1974; Прокопьев, 1976, 1982; Прокопьев, Винокуров, 1986; Винокуров, Белимов, 1991; Охлопков и др., 1991]. Синантропные виды мелких млекопитающих в течение длительного времени изучались Г.А. Романовой [1970, 1974а,б, 1984 и др.].

Вышеперечисленные работы посвящены чаще одному какому-либо виду, но есть статьи, рассматривающие все виды, входящие в териокомплекс конкретного региона. Среди таких работ необходимо назвать исследования по северо-востоку России [Кривошеев, 1964, 1981; Юдин и др., 1976; Чернявский, 1984], а также населению мелких млекопитающих бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы [Кривошеев, Попов, 1968; Лабутинов, 1975; Винокуров, Мордосов, 1980]. Сведения о населении и экологии мелких млекопитающих в тундровой зоне рассматриваемого региона приводятся в ряде публикаций [Перфильев, 1968; Меженный, 1974, 1975; Мордосов, 1992; Мордосов и др., 1992].

Имеется большое количество публикаций, посвященных мелким млекопитающим Центральной Якутии [Соломонов и др., 1968;

Винокуров, Седалишев, 1971; Соломонов, Мордосов, 1971; Гилева, 1972; Соломонов, 1973, 1976; Попов, 1964, 1966, 1975; Гилева и др., 1979; Сафронов, Ахременко, 1983]. Исследования эколого-фаунистического плана проведены в Южной Якутии [Ревин, 1964, 1968, 1971, 1972, 1975, 1990], итоги их были подведены в отдельной монографии [Ревин, 1989]. Фауна и экология мелких млекопитающих, обитающих в северо-западной Якутии, рассмотрены в серии работ И.И. Мордосова [Мордосов, 1974, 1976, 1980; Мордосов, Винокуров, 1980]. Как и в предыдущем случае, в результате появилась монография, посвященная млекопитающим этого региона [Мордосов, 1997]. Кроме того, экологические показатели мелких млекопитающих данного региона приводятся другими авторами [Ревин, Гермогенов, 1979; Прокопьев, Боесков, 1984].

В 1970-х годах появился большой и оправданный интерес к вопросам адаптации мышевидных в условиях Севера, в том числе к эколого-физиологическому аспекту этой проблемы [Соломонов, 1970, 1973, 1977; Кривошеев, 1975].

Результатом исследований териофауны Якутии является издание монографии "Млекопитающие Якутии" [1971] коллективом авторов под руководством В.А. Тавровского. Эта работа написана на основании многолетних исследований фауны, систематики и экологии млекопитающих Якутии и является заметным этапом в исследованиях териофауны не только Якутии, но и Советского Союза [Юдин, Швецов, 1972]. Следующим крупным итогом изучения массовых видов млекопитающих являются монография Н.Г. Соломонова [1973] и "Определитель млекопитающих Якутии" [Попов, 1977].

Несмотря на высокую интенсивность изучения, наряду с хорошо изученными видами — красной, водяной, узкочерепной полевками и в меньшей степени красно-серой и полевкой-экономкой, имеются виды, экология которых до сих пор изучена слабо. Среди мышевидных это, в первую очередь, лесной лемминг, северосибирская полевка, полевка Миддендорфа, темная полевка, мышь-малютка и восточноазиатская мышь.

Еще ниже уровень изученности всех бурозубок. Строго говоря, изучение насекомоядных в Якутии находится еще на начальных этапах. Сведения по экологии бурозубок на настоящий момент приводятся всего в нескольких работах [Кривошеев, 1964; Ревин, 1968, 1989; Млекопитающие Якутии, 1971; Юдин и др., 1976; Мордосов, 1980, 1997]. Вопросы фауны и распространения по биотопам насекомоядных, помимо перечисленных выше работ, рассматриваются еще в нескольких публикациях [Попов, 1966, 1975, 1977; Перфильев, 1968; Ревин, 1975; Чернявский и др., 1978]. Из исследований, посвященных экологии бурозубок, обитающих в близком регионе, необходимо отметить работы Н.Е. Докучаева [1979–1981, 1983, 1990, 1998].

Вопросам зоогеографического районирования территории Якутии уделено значительно меньше внимания, чем проблемам экологии. Это работы В.Г. Кривошеева [1973, 1979], Ф.Б. Чернявского [1978, 1984], Ю.В. Ревина [1990], статья, посвященная зоогеографическому районированию северо-западной Якутии [Мордосов, Винокуров, 1980; Мордосов, 1997, 2001].

Если изученность мелких млекопитающих в пределах Якутии анализировать в географическом плане, то отчетливо проявляется неравномерность распределения исследований. До последнего времени были весьма ограничены материалы по биологии видов, полученных в нижнем течении Лены, в долинах Яны [Кривошеев, Попов, 1968], Индигирки [Винокуров, Мордосов, 1980] и Колымы [Кривошеев, 1964].

Слабая изученность мелких млекопитающих региона, его эколого-географическое своеобразие послужили основной причиной создания этой работы.

В сборе материала для представленной монографии оказывали содействие и товарищескую помощь большое число специалистов, которые в разное время работали вместе с авторами. Необходимо отметить к.б.н. Ю.С. Луковцева, к.б.н. В.М. Сафронова, Ф.Г. Яковлева, Г.В. Сапожникова, А.Л. Попова. Много лет в экспедиционных работах авторам помогали: А.С. Хмелева, О.С. Находкина, к.б.н. Г.А. Плеснивецкая, В.А. Однокурцев, А.А. Сосин, к.б.н. З.З. Борисов и многие другие. При анализе рациона бурозубок определение систематического положения беспозвоночных проведено к.б.н. А.И. Аверенским, к.б.н. А.К. Багычановой, Е.Л. Каймук. Большая помощь при определении видовой принадлежности серых полевок оказана к.б.н. Л.И. Галкиной, бурозубок — к.б.н. Б.С. Юдиным. Большую помощь советами в течение ряда лет оказывали член.-кор. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.б.н. Н.Г. Соломонов, д.б.н. Ю.В. Ревин. Авторы получали столь необходимую поддержку со стороны Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, д.б.н. Д.Д. Саввинова.

Всем перечисленным коллегам авторы высказывают свою искреннюю благодарность. Особо хочется отметить вклад к.б.н. **Б.С. Юдина**, который стоял у истоков наших исследований.

Материал для работы собирался в 1979–1995 гг. в бесснежный период в долинах Лены, Яны, Индигирки и Колымы (рис. 1.1). В долине Лены отработано несколько точек:

- “Якутск” (1993 и 1995 гг.), отлов проводился в непосредственной близости от г. Якутска;
- “Лепписке” (1979–1980, 1984 гг.) — стационар лаборатории зоологии ИБПК СО АН РАН, расположен в долине Лены, в 50 км ниже устья р. Вилюй;
- “Бесюке” (1984 г.), отлов приурочен к устью одноименной речки правого притока Лены;
- “Дельта” (1993–1995 гг.), под этим названием в работе рассматривается территория дельты Лены, где расположен заповедник “Усть-Ленский”.

В пределах бассейна Яны материал собирали в двух точках: в 1983 г. в долине Адычи в районе устья р. Тиректях, расположенного в 400 км от устья Адычи и непосредственно в месте впадения последней в Яну. Кроме того, в бассейне этой же реки исследования проводились в районе п. Кулар (1994–1995 гг.).

В долине Индигирки отработано четыре точки. Основной материал собирался в нижнем течении реки в т. “Шаманово” (1987–1990 гг.), расположенной в 100 км выше по течению от п. Чокурдах. Кроме того, отработано три точки в среднем течении реки.

В 1982 г. проведены работы в т. “Белая Гора”, находящейся в 20 км ниже одноименного поселка, а в 1990 г. отработаны две точки:

- в месте, где р. Индигирка пересекает Момский хребт (т. “Мом”);
- при выходе реки на равнину (т. “Кебергене”).

В долине Колымы исследования проводились в трех точках:

- “Жирково”, расположена в 20 км ниже устья р. Березовки (1981–1982 гг.);
- “Мангазейка” (1983 г.) в 50 км ниже п. Зырянка,
- “Поповка” в районе устья одноименной речки.

Рис. 1.1. Места проведения полевых работ.

1 — точки многолетних наблюдений, 2 — точки разовых наблюдений.

Основным методом сбора материала являлся отлов мелких млекопитающих канавками длиной 20 м и глубиной 12–15 см [Кучерук, 1952], в которых устанавливались по два конуса с водой, что увеличивает попадаемость и снижает повреждаемость отловленных зверьков [Юдин, 1962; Ермаков, Шаповалов, 1972]. В отдельных случаях в биотопах переувлажненного типа (мари, алы) устанавливались ловчие заборчики из полиэтиленовой пленки длиной 25 м, уловистость таких заборчиков близка к уловистости канавок с конусами [Кучерук, 1963; Охотина, Костенко, 1974].

Кроме ловчих канавок, нами применялись давилки Геро, приманкой служил хлеб, смоченный растительным маслом. Давилки устанавливались через 5 м, как правило, линиями по 50 шт., которые стояли 3 сут. Всего за указанный период отработано 34 000 конусо-сут, 52 000 давилко-сут, отловлено 14 000 мелких млекопитающих.

В точках “Лепписке” (в 1984 г.) и “Шаманово” (1988–1989 гг.) проведен абсолютный учет на огороженных площадках. В долине Лены площадки были оборудованы на участке высокой поймы в березняке и в равнинно-таежном ландшафте в лиственничнике мохо-

Как уже указывалось, нашими исследованиями охвачены долины нескольких крупных рек, протекающих по территории Якутии в северном и северо-восточном направлениях, — это долины Лены, Яны, Индигирки и Колымы

Долина Лены

В долине нами обловлено несколько точек, характеризующихся разным географическим положением, климатом, геоморфологическим строением и т.д. Районы наших исследований в долине Лены относятся к среднему и нижнему течению реки.

Точка “Якутск” расположена на территории Центрально-Якутской низменности. Река Лена в пределах Центральной Якутии имеет широкую сложно террасированную долину с многочисленными протоками и островами. В районе г. Якутска имеются две пойменные и несколько аллювиальных надпойменных террас. Пойма лучше выражена на левобережье. Общая ширина долины составляет 20–25 км. В пойме реки имеются многочисленные озера старичного происхождения, а на надпойменных террасах — термокарстовые [Коржуев, 1965].

Центральная Якутия характеризуется континентальным климатом и коротким летом. Продолжительность безморозного периода на широте г. Якутска составляет около 95 дней [Справочник..., 1973], однако заморозки могут быть в течение всех летних месяцев. Общее годовое количество осадков не превышает 300 мм, из них более 50 % приходится на летние месяцы. Весна и первая половина лета обычно засушливые — в мае выпадает 16–23 мм, в июне — 29–40 мм осадков. В первой половине мая нередко кратковременные похолодания, иногда — снег или смешанные осадки. Устойчивый снежный покров устанавливается примерно 10 октября, наиболее ранние даты — 23–25 сентября, самые поздние — в конце октября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте — около 28–30 см.

Значительная часть территории Центральной Якутии покрыта тайгой, ее общая площадь составляет около 70 % территории равнины. Наиболее распространены лиственничные леса, остальные типы леса (сосновые, березовые, еловые) составляют менее 10 % лесопокрытой территории. Почти 14 % территории занято гарями разного возраста. Кроме того, на надпойменных террасах относительно большие площади занимают остепненные участки с островками березовых и сосновых лесов [Караваев, 1965].

В пойме высокие участки покрыты в основном зарослями ивняка и куртинами березы. В низкой пойме открытые пространства занимают разнотравно-злаковые луга, по берегам водоемов встречаются осоковые и злаково-осоковые ассоциации [Караваев, 1965].

Точка “Лепписке”. В представленной работе под этим названием подразумевается район сбора материала на правобережье Лены в 50 км ниже устья Вилюя (66° с.ш.). Строго говоря, участок Лены с момента впадения в нее Вилюя принято считать нижней Леной [Мастахов, 1972], но в зоологической литературе материал, собранный на стационаре “Лепписке”, принято относить к средней Лене [Сафронов, 1977; Попов и др., 1978; Ревин и др., 1982; и др.]. Во избежание путаницы мы оставили за этой точкой традиционную привязку региона.

Долина Лены в указанном районе врезана в аллювиальную равнину Центральной Якутии, лежащую в едином Предверхоанском мезозойском краевом прогибе [Зольников, 1954; Пушаровский, 1960]. Правобережная часть долины в районе исследований относительно узкая. Ближе к руслу реки рельеф ровный, а к горам — приобретает увалистый характер. Ограничивает равнину Усть-Вилюйский хребет (максимальная высота 998 м).

Пойменная часть на правобережье практически не выражена, берег реки высокий, обрывистый, в отличие от левого берега, который имеет низкий пойменный характер, ширина поймы в районе исследований доходит до 30 км. Гидросеть очень сложная, большое количество озер как пойменного, так и термокарстового происхождения. Широкая пойма при обилии островов создает условия для образования постоянных заторов льда, что способствует высоким паводкам — подъем уровня воды в весенний период достигает 8,5 м (многолетний средний — 7,2 м). Острова Лены в указанном районе имеют двойственное происхождение: это может быть часть надпойменной террасы, впоследствии отделенная протокой, или острова, образованные аллювиальной деятельностью реки.

Характерной чертой климата района является частая повторяемость ветров [Олехник, 1960]. Кроме того, в районе исследований выпадает относительно большое количество осадков, среднегодовая их сумма, по наблюдениям на стационаре “Лепписке”, равна 359 мм

(247,2–452,7 мм), что намного больше, чем по Центральной Якутии в целом (250–300 мм). Высокая норма осадков объясняется близостью юго-западных отрогов Верхоянского хребта [Гаврилова, 1973]. Основное количество осадков приходится на летний период, который составляет в описываемом районе 77–100 дней (если принять за лето период, когда среднесуточная температура переходит +10 °С).

Формирование устойчивого снежного покрова происходит, как правило, в конце сентября — начале октября, но в отдельные годы снежный покров может устанавливаться значительно раньше: с 16.09, как было в 1977 г., или позже — с 16.10, что наблюдалось в 1975 и 1984 гг. Несомненно, что сроки установления снежного покрова имеют большое значение для выживания млекопитающих: при позднем выпадении снега в сочетании с низкими температурами в октябре (до –35 °С) наблюдается резкое снижение численности исследуемой группы, переживание зимнего периода которой неразрывно связано с наличием снежного покрова [Формозов, 1946, 1961; Пантелеев, 1983]. Высота снежного покрова в указанном регионе достигает в среднем 60–70 см (максимальная — 95 см). Представление о температурной характеристике климата в указанном районе дает среднегодовая температура, которая, по многолетним наблюдениям на стационаре “Лепписке”, равняется –10,5 °С. Самым холодным месяцем года является январь (–38,8 °С), а самым теплым — июль (+16,6 °С).

Растительный покров в районе исследований весьма своеобразен вследствие географического расположения указанной территории. Тут сходятся четыре лесорастительных округа — северо-западный, северотаяжский, западный вилуйский среднетаяжский, северо-восточный горно-таяжский и центрально-якутский аласно-среднетаяжский [Щербаков, 1967, 1975]. В результате, несмотря на относительную близость полярного круга, тут произрастает довольно пышная растительность, в которой встречаются элементы всех указанных растительных округов.

Основную лесопокрытую площадь занимают светлохвойные лиственничные леса, преобладают лиственничники мохово-брусничные, мохово-голубичные и мохово-багульниковые. Небольшие площади сосняков толокнянковых приурочены к холмистым предгорьям, а также к склонам южной экспозиции Усть-Вилуйского хребта. Ельники имеют характерное приручейное распределение. В горно-таяжной части района исследований встречается кедровый стланник, в некоторых случаях образующий на склонах густые заросли. Леса в горах приурочены к склонам и распадкам, большую площадь здесь, как и на равнине, занимают гари, сильно захлащенные остатками древесной растительности, восстановление на которых идет лиственницей. Территория от подножия гор и до русла Лены почти полностью занята марями с небольшими участками угнетенных ли-

ственничников, весь теплый период залитыми водой. Высокоствольный лес приурочен к берегам Лены и Лепписке. Для поймы последней характерны ивняки, а галечные косы занимают тополево-чозе-ниевые леса.

В пойме Лены нами обследованы только острова. Большую часть обследованных островов занимает низкая пойма, наиболее распространенным элементом которой являются ивняковые заросли. Наземный покров в насаждениях этого типа представлен разнотравьем, в переувлажненных местах в большом количестве произрастает хвощ полевой. Луга для обследованных островов нехарактерны, они, как правило, встречаются небольшими участками по берегам протоков. Высокую часть островов занимают лиственничники-зеленомошники или смешанные березово-еловые леса, последние, как правило, приурочены к песчаным буграм, протянувшимся вдоль протоков гривам, для которых характерно широкое распространение различных кустарников, образующих здесь труднопроходимые заросли. Помимо указанных растительных ассоциаций, на островах встречаются ельники, на очень небольших площадях — сосняки и густые заросли ивняков вне зоны регулярного затопления. В отличие от ивняков низкой поймы, травянистый покров тут развит слабо, но характерно обилие ягодников. В целом в наземном покрове района исследований в древесных насаждениях господствуют мох и брусника.

Для оценки кормовой базы насекомоядных нами в 1980 г. брались пробы на запасы беспозвоночных в доступных для землероек горизонтах. Как выяснилось, биомасса указанной группы распределялась по биотопам неравномерно, кроме того, данный показатель существенно варьирует по сезонам. Из материалов, представленных в табл. 2.1, видно, что в начале лета наиболее благополучными в этом отношении являются березняки, произрастающие как на речных островах, так и на надпойменных террасах. Такая особенность, по-видимому, связана с относительно ранним оттаиванием грунта, который здесь доступен прямому воздействию солнечных лучей. В биотопах, где почва прикрыта изо-

Таблица 2.1

Распределение биомассы беспозвоночных по биотопам в долине средней Лены

Биотоп	Биомасса беспозвоночных, г/м ²	
	Июнь	Июль
<i>Пойма (острова)</i>		
Смешанные хвойно-лиственные леса на гриве	8,7	0,3
Ельники	21,2	0,1
Березняки	24,1	0,3
<i>Равнинно-таяжный ландшафт</i>		
Смешанные хвойно-лиственные леса	4,9	10,3
Молодые лиственничники	7,7	15,9
Средневозрастные лиственничники	6,4	33,3
Березняки	15,9	24,4

лирующим слоем — мохово-лишайниковой дерновиной, достаточно глубокое оттаивание ее происходит лишь в середине лета. Очевидно, этим обстоятельством и можно объяснить значительное увеличение биомассы беспозвоночных в листовенничниках на надпойменных террасах к концу июля. По-видимому, в дождливые годы сходные запасы беспозвоночных сохраняются в листовенничных лесах в течение всего последующего теплого времени года, чего не наблюдалось в 1980 г. из-за засухи. Укажем, что в районе исследований запасы беспозвоночных несколько уступают западно-сибирским [Юдин, 1962].

Точка "Бесюке". Этим названием в дальнейшем обозначается район работ, приуроченный к устью р. Бесюке (70 км выше п. Кюсюр). На исследованном участке долины Лены, в отличие от вышеописанного, река собирается в одно русло. Пойма тут неразработанная, острова для исследованного участка не характерны. Пойма представлена участками ивняков на правом и левом берегах Лены, в наземном покрове которых превалирует хвощ полевой, а также заливными лугами, где часто встречается пушица, являющаяся характерным элементом растительности тундровой зоны.

На надпойменной террасе основные площади заняты разреженными листовенничниками моховыми. Относительно часто встречаются брусничники, в переувлажненных листовенничниках — морошка, подрост представлен в основном ерником. По лесорастительному районированию Якутии [Щербаков, 1975] район наших исследований приурочен к северной границе северо-западного северотаяжного округа. Летний период тут короче, чем в долине средней Лены, снежный покров устанавливается в начале — середине сентября, а сходит в конце мая — июне. Самый теплый месяц, по данным ГМС п. Жиганск, как и на средней Лене, — июль (+16,1 °C), самый холодный — январь (–39 °C), длительность бесснежного периода 74 дня.

Точка "Дельта Лены". Усть-Ленский регион занимает обширные пространства дельты Лены и прилегающие к ее самому нижнему течению части Хараулахских гор и кряжа Чекановского. Основная площадь приходится на дельту, которая состоит почти из 1500 больших и малых островов [Самойлов, 1952].

В строении дельты выделяют низкую (2–3 м) и высокую (4–5 м) поймы и комплекс надпойменных террас: первая высотой 6–8 м, вторая — 12–14 м и третья — 18–20 м [Егорова, 1965]. Территория характеризуется высокой степенью обводненности [Залогин, Родионов, 1969]. В основном исследованиями была охвачена северо-западная часть дельты и в меньшей степени — южная. Эта часть дельты Лены древнее и выше восточной, представляет собой слабо расчлененный речной сетью останец верхнечетвертичной морской террасы, в ее строении принимают участие вторая и третья надпойменные террасы [Егорова, 1965].

Климат в районе дельты Лены характеризуется как морской и полярный. Среднегодовая температура воздуха составляет около 14 °C. Самый холодный месяц — январь (–32,6 ...–34 °C), самый теплый период — вторая половина июля — первая половина августа (+7,3 ...+7,5 °C). В дельте Лены осадков выпадает больше, чем в Центральной Якутии, из них почти 75 % в теплое время года. Снежный покров устанавливается в последней декаде сентября. Продолжительность снежного периода — 240–250 дней [Растительность..., 1985]. На существование млекопитающих в дельте большое влияние оказывает весенний паводок. Весенний ледоход проходит в конце мая — начале июня, он сопровождается мощными заторами и связанными с этим катастрофическими уровнями подъема воды — до 27 м [Залогин, Родионов, 1969].

Обследованный участок дельты лежит частично в пределах подзоны южных арктических тундр, а основная часть — в подзоне северных субарктических тундр, которая по Туматской протоке доходит до морского побережья. На большей части территории преобладают комплексы с тетрагональной системой трещин, полигоны частично заполнены водой.

Прилегающие к дельте северные отрезки Хараулахского хребта и кряжа Чекановского лежат в подзоне северных субарктических тундр. Это сказывается на характере растительности нижнего пояса, сложенного в основном травяными тундрами без выраженного яруса кустарников [Растительность..., 1985].

Долина Яны

Точка "Адыча". Река Адыча является основным притоком Яны, обеспечивая 2/3 стока последней. Обследованный нами участок долины расположен в пределах Верхоянской впадины, характеризующейся относительно ровным рельефом. В пределах обследованной территории от п. Лазо до устья реки характер долины меняется: если на участке от п. Лазо до р. Тиректях это типично горная река с узкой поймой, ограниченной с двух сторон выходами горных пород, то начиная с р. Тиректях и до устья р. Туостях река приобретает равнинный характер, а ниже устья р. Туостях и почти до устья Адычи — опять горный.

По климатическим характеристикам бассейн Адычи входит в субарктическую зону [Витвицкий, 1965]. Средняя температура в июле, по многолетним наблюдениям ГМС "Усть-Чаркы", равна +14,5 °C, а абсолютная максимальная +30,2 °C. В январе средняя температура равна –39,9 °C, а абсолютная минимальная –60 °C.

Для этого региона характерна очень низкая норма осадков — 110–140 мм, причем 75 % указанной нормы приходится на летний период, в результате снежный покров маломощный (23–25 см), что в

сочетании с низкими температурами создает очень неблагоприятные условия для существования мелких млекопитающих. Снежный период длится 205–223 дня. Безморозный период составляет 60–70 дней, но заморозки и выпадение снега возможны и в середине лета.

По схеме лесорастительного районирования долина Адычи входит в северо-восточный северотаежный Яно-Индибирский округ [Щербаков, 1975]. Основной лесообразующей породой является лиственница. На исследованной территории лесопокрытые площади заняты лиственничниками мертвопокровными, мохово-брусничными и мохово-лишайниковыми. Общая залесенность территории не превышает 40 %. Подлесок представлен в основном ольхой, которая местами образует чистые насаждения высокой сомкнутости [Шелудякова, 1948]. По долинам рек на галечных косах произрастают тополево-чозениевые, иногда с примесью лиственницы, леса. В пойме реки, в особенности на островах, основные площади заняты ивняками, сильно захламленными, с обильным травянистым покровом. Луга занимают не менее 35 % долины реки [Андреев и др., 1974]. Период исследований совпал с хорошим урожаем грибов, в то время как урожай ягод был очень низкий.

Точка “Кулар”. Территория, на которой проводились исследования, относится к северной части хр. Улахан-Сис, отрога Куларского хребта. Это — горная страна с характерным горно-долинным рельефом, возвышается до 1200 м над ур. м. Преобладающие отметки водоразделов 400–500 м, относительные превышения 120–460 м. В северной части территории развит равнинный рельеф с абсолютными отметками 60–80 м. Полого-холмистая поверхность кое-где нарушается изолированными останками древнего рельефа [Коржув, 1965].

Для современного рельефа района исследований характерна типичная криогенная термокарстовая и бугристая морфоскульптура, представленная термокарстовыми просадочными формами (провальными озерами), связанными с вытаиванием льда, и разнообразными буграми пучения.

В климатическом отношении область занимает промежуточное положение между Новосибирскими островами с их морским климатом и внутренними районами Восточной Якутии, где господствует резко континентальный климат. Зима снежная, метельная, в прибрежной зоне морозная, во внутренней — очень морозная, преобладают дни без солнца. Температура зимних месяцев понижается от побережья в глубь материка. Лето короткое (2–2,5 мес), холодное на побережье и несколько более теплое к югу.

В течение всего лета могут быть заморозки и снегопады. Продолжительность безморозного периода равна 40–60 дням, а в отдельные годы сокращается до 30 и более. Сумма температур выше 10 °С составляет 400–1000°. За год выпадает 128–199 мм осадков, причем

наибольшее количество приходится на лето. Снежный покров держится в течение 8–9 мес, высота его колеблется от 25 до 30 см [Витвицкий, 1965].

Район исследований находится в подзоне лесотундры. Характерно сочетание тундровых и лесных флористических элементов. К северу преобладают тундровые группировки с кустарниками, по которым разбросаны отдельные экземпляры лиственницы. В южной части лесотундра на равнинах переходит в редкостойные северотаежные леса [Жадринская, 1960].

В северной части лесотундры редколесье занимает 10–20 % площади, в южной — 40–50 %. В южной части лесотундры отдельные экземпляры лиственницы высотой 2–4 м растут на расстоянии 2–3 м друг от друга. Подлесок состоит из карликовой ольхи и зарослей березки Миддендорфа. Бедный кустарничковый покров представлен голубикой, реже брусничником и морошкой. Среди этого покрова развиваются пятна ягельников, местами занимающие значительные площади. Среди ягельников растут голубика, багульник и брусника. На вершинах грив развиты мохово-лишайниковые лиственничники, где преобладает почти сплошной моховый покров [Караваяев, 1965]. Также имеет место развитие болотных и луговых ассоциаций [Жадринская, 1960].

Долина Индигирки

Согласно геоморфологическому районированию, район исследований входит в область плоскогорий и низменностей Северо-Восточной Якутии. Юго-западная ее часть относится к горной области Северо-Восточной Якутии и представляет собой обширную горную страну, рассеченную глубокими долинами [Агапитов, 1960]. В пределах долины Индигирки нами обследованы горный участок в верхнем течении и равнинные участки среднего и нижнего течения.

Точки “Мома” и “Кебергене”. В горной части исследования проводили в месте пересечения рекой Момского хребта, юго-восточная, более древняя его часть характеризуется высокогорным рельефом, а в северо-восточной части высокий (до 2500 м) гребень с альпийскими формами рельефа выражен на всем протяжении, но на склонах преобладает среднегорный рельеф с куполообразными вершинами. Северный конец хребта расчленен долинами небольших рек, здесь высокогорный рельеф сменяется средне- и низкогорным. В тектонических межгорных впадинах реки выработали глубокие долины [Агапитов, 1960]. В пункте исследований в районе устья р. Колядин (т. “Мома”) поймы практически нет — река течет между высокими гористыми берегами, острова немногочисленны.

Ниже по течению располагается предгорье, которое переходит к низменностям заметным уступом высотой 100–150 м. В этой части

долины, относящейся к подобласти Индигирской низменности, также проведены маршрутные исследования ("Кебергене").

Индигирская низменность представляет собой глубокую межгорную впадину, тянущуюся вдоль Индигирки и соединяющуюся с одной стороны с Приморской низменностью, с другой — с Колымской. В этой части долины оба берега Индигирки низкие, заболоченные, здесь многочисленны округлые или овальные озера до 3–6 км в поперечнике, нередко их разделяют невысокие (10–12 м) узкие гряды, именуемые "тумулами".

В районе Момского хребта основные черты лесного покрова примерно те же, что и в других точках в долине реки, но травянистый покров гораздо богаче в видовом отношении. Основные площади заняты лишайниковым лиственничником, более густым и влажным на склонах, обращенных к реке. Встречаются разнотравные луга альпийского типа и однородные заросли кедрового стланика. Понижения рельефа заболочены, наземный покров в них моховый. Пойма здесь выражена узкими полосками ольховника вдоль берега, которые ввиду малой площади не могут рассматриваться как самостоятельные биотопы. Острова немногочисленны, поросли ивняком или редкостойным лиственничником.

В точке "Кебергене" берега сильно заболочены и заняты редкостойным угнетенным лиственничником мохово-лишайниковым, кустарниковый ярус в зависимости от степени увлажненности составляют ольха, ерниковая березка, кедровый стланик. Прирусловые леса отличаются более высокой сомкнутостью крон и очень густым подлеском из ольхи. От берегов тянутся гривы, поросшие относительно сухим и густым лиственничником, пространства между ними сильно заболочены. Наиболее сухие, относительно возвышенные места покрыты зарослями кедрового стланика. Пойма хорошо разработана, представлена на коренных берегах ивовыми и ольховыми зарослями, а на островах, кроме того, встречаются тополевики и лиственничники.

Точка "Белая Гора". Индигирка в своем среднем и нижнем течении пересекает Индигирскую низменность, правый берег ее образован Алазейским плоскогорьем, выходящим к реке в виде небольших сглаженных возвышенностей. Левая часть долины Индигирки характеризуется большим количеством озер и небольших рек височного типа. Гидрорежим Индигирки по всем показателям близок к колымскому до зарегулирования последней.

Согласно растительному районированию, район исследований относится к северо-восточному горному северотаежному округу [Щербаков, 1975]. Основные лесопокрытые площади заняты редкостойными лиственничниками, в пределах озерно-таежного ландшафта это лиственничники мохово-брусничные или голубичные,

причем леса расположены, как правило, по берегам рек. В удалении от последних лиственничники занимают узкие полосы по берегам озер и гривы, вытянутые параллельно руслу реки. Пространство между гривами занято марями, весь летний период залитыми водой и поросшими редким ерником и угнетенной лиственницей.

Основные площади Алазейского плоскогорья заняты редкостойными лиственничниками лишайниковыми, подрост в которых образован ерником. В понижениях рельефа лишайниковый покров заменяется зелеными мхами с густым голубичником, среди подроста появляются ольха и кедровый стланик.

Точка "Шаманово". Основная точка исследований в долине Индигирки расположена в районе 69° с.ш. в местности Шаманово, здесь правобережье представлено Кондаковским плоскогорьем, левобережье — заболоченной равниной на стыке Индигирской и Приморской низменностей. Кондаковское плоскогорье сложено юрскими сланцами и песчаниками, рельеф низкогорный (300–350 м), долинно-увалистый, ближе к Индигирке преобладают горы с высотами от 200 до 480 м. Для левобережья характерно обилие озер, соединяющихся между собой узкими извилистыми протоками.

Гидрорежим. Условия жизни млекопитающих, обитающих в долинах рек, во многом зависят от гидрорежима. Индигирка — одна из самых крупных рек бассейна Восточно-Сибирского моря, горный характер она имеет только в самой южной точке наших исследований — в районе Момских гор. Вскрытие реки сопровождается половодьем, достигающим в отдельные годы 2–3 м над предыдущим низким уровнем, а в течение лета происходит ряд дождевых паводков, по высоте часто превышающих весеннее половодье. В районе ГМС Воронцово (60 км выше пункта исследований) весенний паводок достигает 7–8 м, ледоход проходит в I декаде июня; весеннее половодье обычно сливается с довольно длительным дождевым паводком, пики которого бывают в июле — августе, а с сентября уровень воды начинает падать, достигая минимума в конце апреля — начале мая, ледостав наступает в начале октября. Абсолютная амплитуда колебаний уровня у ГМС Воронцово составляет около 11,5 м [Доронина, 1960]. В период наших исследований отмечался весенний подъем воды существенно ниже среднестатистического, а летний паводок был наивысшим в сезоны с большим количеством летних осадков и с более теплой погодой в начале лета 1989 и 1990 гг.

Исследованная территория относится к району резко континентального климата внутренних частей Северной Якутии [Кручинин, 1960], климат его отличается очень холодной длительной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом [Кручинин, 1960].

Установление снежного покрова происходит в конце сентября, сход — в начале мая — первых числах июня, средняя температура ян-

варя в районе п. Чокурдах составляет -38°C [Агроклиматический справочник по Якутской АССР, 1963]. Лето в долине Индигирки отличается высоким уровнем получаемой солнечной радиации и высокими дневными температурами, тем не менее здесь нередки заморозки и снег даже в июле. В низовьях Индигирки осадков выпадает в среднем 125 мм в год, причем до 75 % приходится на теплое время года [Агроклиматический справочник..., 1963].

Поскольку колебания температуры и увлажненности могут играть большую роль в жизни мелких млекопитающих, мы подробно рассматриваем погодные условия каждого сезона исследований. В этот период каждый год характеризовался своими особенностями. В 1987 и 1988 гг. температуры мая — июня были ниже среднемноголетних, июль значительно теплее, в августе отмечалось похолодание, причем в 1987 г. в среднем этот месяц был теплее, чем по многолетним данным, но зато сентябрь — существенно холоднее, а в 1988, наоборот, август был на $1,6^{\circ}$ холоднее средних данных, а сентябрь — на $2,2^{\circ}$ теплее. В 1989 г. средние температуры мая-июня были немного выше, чем в предыдущие годы и в среднем по статистике, но при этом надо отметить, что погода в июне четко разделялась на три периода: примерно до 7 июня было очень тепло, затем с 7-го по 20-е наблюдалось резкое похолодание, сопровождавшееся обильными осадками, а в 20-х числах — столь же резкое потепление. Июль и август в этом году были умеренно теплыми, а сентябрь — на 2° теплее, чем по среднестатистическим данным.

Различалось и количество осадков в разные годы: 1987 г. был самым сухим, в течение всего теплого времени года осадки были незначительными. В 1988 г. дождей выпало в 1,5 раза больше, что существенно превышает годовую норму осадков, основное их количество пришлось на конец июля — август. В 1989 г. осадков также было больше нормы, но их основная масса пришлась на июнь, в основном на первые две декады. В 1990 г. отмечалось раннее потепление и большое количество осадков в июне — начале июля, теплые июль и август, относительно холодный сентябрь, в течение которого снова участились дожди.

По И.П. Щербакову [1975], район исследований относится к северо-восточному горному северотаяжному округу. Северная граница лесной зоны проходит в долине Индигирки по 70° с.ш., немного севернее точки основных исследований. В низовьях основные площади заняты редкостойным лиственничником, высота деревьев 10–12 м, диаметр редко превышает 15–25 см. Относительно более высокобонитетные леса распределены полосой вдоль рек и проток, в этих прирусловых лиственничниках разнообразнее и лучше развит кустарниковый ярус [Жадринская, 1960]. Основные площади озерно-таяжного ландшафта заняты моховыми лиственничниками высо-

кой степени увлажненности, кустарничковый ярус представлен голубикой, брусникой, багульником, кустарниковый — ольхой или ивой. Для этого ландшафта характерны чередование редкостойных заболоченных лесов с более сухими гривами, а также обилие озер и проток.

В горно-таяжном ландшафте основные площади заняты сухими лишайниковыми лиственничниками с кустарниковым ярусом из ерниковой березки, кустарничковым — из брусники, шикши; кроме того, в понижениях рельефа встречаются более влажные лиственничники моховые с подростом ивы, голубикой, багульником. Относительно большую площадь занимают мари — открытые заболоченные пространства, поросшие редким брусничником, осоками и мхами.

Пойма в низовьях Индигирки хорошо разработана, но биотопы в ней однообразны: на высоких участках кустарниковые заросли ивняка и лиственничники, тянущиеся в виде узких грив вдоль островов, на низких — ивняки и заливные луга, поросшие хвощом полевым.

Таким образом, несмотря на широтные различия, для трех точек долины Индигирки можно отметить общие черты. Равнинные редколесья занимают большие площади низменностей. Ландшафт этой территории резко отличается от других районов северотаяжной зоны. В ботаническом отношении это своеобразный комплекс лиственничных лесов, редколесий с зарослями кустарников и болот с приозерными травяными сообществами. Вся равнина покрыта многочисленными озерами. Лес угнетен, средняя высота деревьев достигает 8–12 м при среднем возрасте около 200 лет [Жадринская, 1960]. Подлесок составляют 5–6 видов ив, ерниковая березка и ольха, ягодные кустарнички и немногие виды трав. Склоны гор повсеместно покрыты довольно однообразным лиственничным редколесьем, обычно с обильным напочвенным покровом из ягеля или мхов.

Долина Колымы

Точка "Поповка". Расположена в районе устья рек Поповка и Шаманиха. Правый берег реки образован отрогами хр. Черского и занят горно-таяжным ландшафтом, основные площади покрыты лиственничниками мохово-брусничными, часто встречаются заросли кедрового стланика, которые выше к вершине становятся основной формой лесонасаждений. Левый берег низкий, сильно обводненный, как повсеместно в долине Колымы, основные площади заняты лиственничными лесами.

Острова покрыты зарослями тополя и чозении, характерен обильный кустарниковый ярус, представленный ольхой, шиповни-

ком и охтой. Открытые места в низкой пойме зарастают хвощом полевым, повсеместно встречаются ивняки, образующие труднопроходимые заросли. В период исследований отмечен очень большой урожай охты и шиповника, другие ягодники плодоносили слабо, так же как и кедровый стланик.

На указанном отрезке гидрорежим Колымы имеет горный характер, т.е. периодически происходят резкие поднятия уровня воды, что отрицательно сказывается на существовании пойменных видов.

Точка "Мангазейка". Исследования проводились в районе устья Мангазейки — 50 км ниже п. Зырянка. Климат здесь близок к описанному для т. "Жирково". Основные площади тут заняты лиственничником моховым, но, в отличие от среднеколымской тайги, значительно чаще встречается береза, образующая небольшие колки, а также ольха, образующая чистые заросли. Здесь шире видовое разнообразие смородины, в лесах подрост представлен в основном ольхой.

Пойменные луга, как и в долине Индигирки, зарастают почти исключительно одним хвощом полевым, но площади лугов весьма ограничены, как правило, занимают узкие полосы вдоль берегов. Оба берега реки на обследованном участке высокие и находятся вне зоны паводка, за исключением уже упомянутых лугов. Урожай ягод, за исключением охты, в период наших исследований был очень низким, а грибов — высоким.

Точка "Жирково". Среднее течение Колымы проходит по обширной Колымской низменности, правый берег реки образуется Юкагирским нагорьем, которое в непосредственной близости от реки представлено небольшими увалами. Для левобережья характерен равнинный ландшафт, чрезвычайно насыщенный озерами термокарстового и, в меньшей степени, пойменного происхождения, которые соединяются между собой и Колымой многочисленными сильно меандрирующими висками, часто глубоко врезаемыми в равнину.

Русло Колымы на определенных участках распадается на целый ряд протоков, но в целом она течет практически единым руслом. Для гидрорежима реки до последнего времени были характерны очень высокие весенние паводки, в период которых заливалась значительная территория. Подъем воды в районе г. Среднеколымска достигал 10–14 м. Кроме того, для реки были характерны летние и осенние паводки, которые значительно уступали весенним [Коржув, 1965]. Но в последнее время, в связи с регулированием гидрорежима Верхнеколымской ГЭС, указанная закономерность паводков нарушается в зависимости от потребностей энергетики и водного транспорта.

Климат северо-востока Якутии в целом отличается резкой континентальностью, но зимние температуры в пределах Колымской низменности несколько выше, чем по указанному региону, благодаря влиянию Тихого океана [Витвицкий, 1965]. По данным Среднеколымской ГМС, среднесуточная температура в январе равняется -38°C , а в июле $+14^{\circ}\text{C}$. Для климата долины Колымы характерно относительно большое количество осадков, основной объем которых приходится на теплый период. По многолетним наблюдениям, за май — сентябрь выпадает 105 мм осадков [Витвицкий, 1965]. Период наших исследований в долине Колымы был относительно засушливым: за летний период 1982 г., по данным Среднеколымской ГМС, выпало всего 40,1 мм осадков, что не могло не отразиться на условиях существования в первую очередь полевки-экономки как наиболее гидрофильного вида в районе исследований, а также всех видов бурозубок, кормовая база которых существенно варьирует при изменении влажности почвы [Вольперт, Аверенский, 1983].

Летний период в долине Колымы очень короток — 78 дней в районе г. Среднеколымска.

Территория долины средней Колымы относится к северо-восточному горному северотаежному округу [Щербаков, 1975]. Основные лесопокрываемые площади заняты редкостойными лиственничниками, в пределах озерно-таежного ландшафта это лиственничники мохово-брусничные или голубичные, причем леса расположены, как правило, по берегам рек. В удалении от последних лиственничники занимают узкие полосы по берегам озер в виде грив, вытянутых параллельно руслу реки. Пространство между гривами занято марями, весь летний период залитыми водой и поросшими редким ерником и угнетенной лиственницей. Кроме того, эти пространства в условиях долины Колымы занимают своеобразные образования — алы, представляющие собой сочетание заболоченных сфагновых редиц с травяно-гипновыми болотами [Скрябин, Караваев, 1991]. Часть грив занята густыми зарослями ивняков, тут же широко представлены и другие кустарники, в частности шиповник. Основные площади Алазейского плоскогогорья заняты редкостойными лиственничниками, лишайнико-

Таблица 2.2

Распределение биомассы беспозвоночных по биотопам в долине средней Колымы

Биотоп	Биомасса беспозвоночных, г/м ²
<i>Пойма</i>	
Лиственничники на гриве	6,93
Регулярно затопляемые ивняки	10,13
Незатопляемые ивняки	7,2
<i>Озерно-таежный ландшафт</i>	
Незатопляемые ивняки	0,56
<i>Горно-таежный ландшафт</i>	
Лиственничники лишайниковые	4,89
Лиственничники мохово-голубичные	0,99

выми, подрост в которых образован ерником. В понижениях рельефа лишайниковый покров заменяется зелеными мхами с голубичником, среди подростка появляются ольха и кедровый стланик.

В пойме Колымы большие площади заняты ивняками, лугов значительно меньше, последние, как правило, приурочены к правому гористому берегу. Луга на обследованной территории встречаются двух типов —вейниковые и хвощовые. Участки высокой поймы на островах заняты ивняками или лиственничными лесами, последние расположены в виде узких грив, вытянутых вдоль острова. Наземный покров на гривах, представленный зелеными мхами, угнетен, мхи занимают не более 50 % поверхности. Из литературных источников [Кривошеев, 1964; Юдин и др., 1976] известно, что в долине Колымы в отдельные годы наблюдается обилие грибов, значение которых в питании мышевидных широко известно, но в период наших исследований, по-видимому, из-за засухи, урожай грибов в 1981 г. был очень низкий, а в 1982 г. шляпочные грибы нами не отмечены. Также была очень низкой урожайность ягодников — красной смородины, голубики, брусники, княженики.

Запасы беспозвоночных, как и следовало ожидать, распределены по биотопам крайне неравномерно: наилучшая обеспеченность кормами у бурозубок была в пойме, а наихудшая — в озерно-таежном ландшафте, правда, в последнем пробы брались только в одном биотопе (табл. 2.2).

Глава 3

БИОЛОГИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Рассматриваются основные биологические показатели популяций мелких млекопитающих (насекомоядных и мышевидных грызунов), обитающих в районе исследований, за исключением одного вида — большеухой (сибирская горная) полевки *Alticola macrotis* Radde, 1861. Здесь известны находки этого вида в низовьях Лены [Тугаринов и др., 1934; Капитонов, 1963] и в пределах Верхоянской горной системы [Грязнухин, 1963; Яковлев и др., 1995]. В наших сборах, приуроченных к долинам рек, этого типичного обитателя горных ландшафтов не было.

В главе отсутствует раздел, посвященный копытному леммингу (*Dicrostonyx torquatus* Pallas, 1779), который отлавливался нами в очень ограниченных количествах только в тундрах дельты Лены.

3.1. Крошечная бурозубка — *Sorex minutissimus* Zimmermann, 1780

Морфометрическая характеристика. Крошечная бурозубка — самый мелкий представитель рода *Sorex*. От других землероек этого рода отличается не только мелкими размерами, но и рядом ярко выраженных габитуальных черт: широкая крупная голова (29,6 % относительно длины тела) с относительно коротким рострумом, короткий или средних размеров хвост [Юдин, 1989]. Отношение ширины рострума к кондилобазальной длине характеризуется высокими значениями (9,7 %), а длина рострума — низкими (24,8 %), мозговой отдел черепа удлиннен (57,8 % [Юдин, 1989]). Для вида характерны не только самые меньшие показатели длины зубного ряда, но и его относительные величины.

Для крошечной бурозубки характерна высокая географическая изменчивость размеров тела, но четко выраженной клинальной изменчивости не обнаружено [Юдин, 1989]. В северном направлении

уменьшается относительная длина хвоста крошечной бурозубки. Наибольшие относительные размеры черепа отмечены для самой северной популяции вида — на Таймыре [Юдин, 1989].

Малый объем наших выборок не позволяет делать выводы о характере изменений размеров тела в пределах рассмотренной территории, но можно отметить, что размеры особей, отловленных в долине Лены, близки к нижним пределам, указанным для вида Б.С. Юдиным, а в долинах Индигирки и Яны — к верхним (табл. 3.1). Относительная длина хвоста уменьшается к северу, и в целом отмечается обратная зависимость этого показателя от длины тела. Аналогичные тенденции прослеживаются в изменениях относительной длины плюсны.

Распространение. По характеру распространения по территории вид ближе к транспалеарктическому типу. Крошечная бурозубка встречается в Якутии довольно широко, нами она обнаружена во всех обследованных долинах (рис. 3.1). На севере этот вид крайне малочислен: он не отловлен нами на нижней Лене (т. “Бесюке”) и в ее дельте; в устье Колымы вид также не обнаружен [Кривошеев, 1964; Млекопитающие Якутии, 1971]. В нижнем течении Индигирки отловлено всего 2 крошечные бурозубки из 4300 коллектированных животных, на настоящий момент это самая северная точка отлова данного вида в Якутии. Не проникает далеко на север этот вид и на Таймыре, он, как и в Якутии, крайне редок уже в подзоне лесотундры [Юдин, 1980].

Ландшафтное и биотопическое распределение. В долине средней Лены в т. “Якутск” в период наших исследований вид был крайне редок, отловлен всего один экземпляр в лиственничнике с большой примесью березы на II надпойменной террасе. В районе устья р. Лепписке в равнинно-таежном ландшафте крошечная бурозубка встречается во всех типах обследованных биотопов, но нигде не достигает даже средней численности. В горно-таежном ландшафте и в пойме этот вид не обнаружен (рис. 3.2).

В долине Адычи наблюдается та же картина: в пойме крошечная бурозубка не обнаружена, а в аласно-таежном ландшафте была относительно многочисленна, в особенности на аласах. Один экземпляр отловлен в горно-таежном ландшафте на остепненном склоне.

В долине верхней Колымы крошечная бурозубка зарегистрирована нами в пойме на хвощатнике, но необходимо учесть, что эти участки непосредственно примыкают к надпойменной террасе, и их население во многом определяется населением последней [Вольперт, 1983]. В озерно-таежном ландшафте крошечная бурозубка отловлена в березняке.

В долине средней Колымы этот вид отлавливался только в озерно-таежном ландшафте в ивовых зарослях. Такая же картина наблю-

Таблица 3.1

Морфометрические показатели крошечной бурозубки долины рек Северной Якутии (перезимовавшие и прибылые особи)

Промеры	Долина Лены			Долина Яны			Долина Индигирки		Долина Колымы		
	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M	M ± m	limit	
Масса тела, г Длина тела, мм Длина хвоста, мм Длина плюсны, мм	2	2,0 ± 0,20	1,8–2,2	4	1,9 ± 0,05	1,8–2,0	2	1,9	2,0 ± 0,12	1,8–2,3	
	5	42,5 ± 2,53	37,1–51,2	4	47,3 ± 0,89	45,1–49,2	2	46,9	44,8 ± 1,77	38,3–48,6	
	5	20,6 ± 1,40	18,5–26,1	4	17,7 ± 0,72	16,0–19,5	2	17,9	18,2 ± 0,72	15,9–20,0	
	5	8,0 ± 0,17	7,5–8,3	4	8,2 ± 0,18	7,7–8,5	2	8,3	8,0 ± 0,31	7,1–8,5	
	Промеры черепа, мм:										
общая длина кондилобазальная длина межглазничная ширина длина верхнего зубного ряда длина промежуточного ряда зубов	5	13,4 ± 0,20	12,6–13,7	—	—	—	2	14,0	—	—	
	5	12,8 ± 0,19	12,1–13,1	—	—	—	2	13,7	—	—	
	5	2,7 ± 0,12	2,3–3,0	—	—	—	2	2,7	2,5 ± 0,03	2,5–2,6	
	5	5,7 ± 0,15	5,2–6,0	4	5,3 ± 0,10	5,0–5,4	2	5,3	5,2 ± 0,07	5,0–5,3	
	5	1,5 ± 0,13	1,2–1,9	4	1,9 ± 0,08	1,7–2,0	2	1,5	1,7 ± 0,22	1,4–2,1	
высота черепа длина роstrума ширина роstrума	5	3,8 ± 0,19	3,2–4,3	—	—	—	—	—	—	—	
	5	3,5 ± 0,10	3,3–3,8	4	3,2 ± 0,05	3,2–3,2	2	3,4	3,3 ± 0,07	3,1–3,4	
	5	1,5 ± 0,12	1,2–1,8	4	1,4 ± 0,05	1,3–1,5	2	1,4	1,3 ± 0,05	1,2–1,4

Рис. 3.1. Места отлова крошечной бурозубки в районе исследований
1 — наши данные, 2 — литературные данные.

далась и в долине средней Индигирки (т. “Белая Гора”). В целом для крошечной бурозубки характерны избегание пойменного комплекса и очень высокая степень эвритопности при распределении в равнинно-таежном ландшафте. Этот вид является наиболее политопным из землероек фауны СССР.

Питание. Из-за крайне низкой численности вида материал по питанию собран очень небольшой: всего проанализировано содержимое четырех желудков. Чаще других видов кормов крошечной бурозубкой поедаются насекомые и паукообразные (табл. 3.2).

Размножение. Судя по отлову сеголсток в июне, начало периода размножения приходится на ко-

Таблица 3.2

Встречаемость разных видов кормов в
желудках крошечной бурозубки,
% к числу исследованных

Вид корма	Встречаемость
Насекомые:	100
ближе не определены	50,0
жесткокрылые имаго	25,0
личинки	25,0
двукрылые (личинки)	25,0
чешуекрылые (личинки)	25,0
Паукообразные	100
Растительные остатки	25,0
Количество исследованных желудков	4

Рис. 3.2. Пространственное распределение крошечной бурозубки в т. “Лепписке”.

Биотопы: **низкая пойма:** 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; **высокая пойма:** 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; **равнинно-таежный ландшафт:** 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; **горно-таежный ландшафт:** 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

нец апреля — начало мая. Воспроизводство продолжается, по крайней мере, до сентября, а возможно и до конца этого месяца. Перезимовавшие особи активно размножаются весь период, прибылые вступают в размножение в июне — июле. В начале июля нами была отловлена молодая самка, имеющая 8 эмбрионов. Судить о половозрастной структуре популяций трудно из-за крайней малочисленности выборки.

3.2. Крупнозубая бурозубка — *Sorex daphaenodon* Thomas, 1907

Морфометрическая характеристика. Б.С. Юдин [1989] характеризует этот вид как бурозубку средних размеров с относительно крупной головой (кондилобазальная длина черепа составляет 29,7 % от длины тела), а также отмечает, что крупнозубые бурозубки из Северо-Восточной Якутии отличаются небольшими размерами и относительно коротким хвостом, относя их к подвиду *S. daphaenodon sanguinidens* (Allen, 1914). В наших сборах в большинстве точек относительная длина черепа у крупнозубых бурозубок существенно больше, варьируя от 29,6 в долине средней Лены до 35,2 в бассейне Яны (табл. 3.3). По мнению Б.С. Юдина [1989], наибольший индекс длины черепа преимущественно у мелких форм бурозубок, с этим утверждением согла-

Таблица 3.3
Морфометрические показатели крупнозубой бурозубки долин рек Северной Якутии (перезимовавшие и прибылые особи)

Промеры	Долина Лены			Долина Яны			Долина Индигирки			Долина Колымы		
	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit
Масса тела, г	19	6,3 ± 0,35	5,0–0,35	3	5,7 ± 0,12	5,5–5,9	11	5,7 ± 0,27	4,9–8,1	32	5,3 ± 0,07	4,4–6,4
Длина тела, мм	20	60,7 ± 1,32	50,9–73,1	3	52,8 ± 7,25	38,4–61,5	20	59,8 ± 0,63	54,9–69,5	31	56,9 ± 0,46	52,6–62,7
Длина хвоста, мм	20	28,3 ± 0,43	24,4–31,9	3	24,3 ± 0,30	24,0–24,9	20	26,6 ± 0,34	23,8–28,8	31	26,8 ± 0,49	22,5–30,7
Длина плюсны, мм	20	11,3 ± 0,17	9,8–12,8	3	10,8 ± 0,09	10,6–10,9	20	11,1 ± 0,08	10,6–12,3	29	11,2 ± 0,21	9,4–12,1
Промеры черепа, мм:												
общая длина	9	19,0 ± 0,13	18,4–19,6	3	19,2 ± 0,12	19,0–19,4	17	18,9 ± 0,05	18,5–19,3	16	18,9 ± 0,12	18,1–19,8
кондилобазальная длина	9	18,0 ± 0,15	17,5–18,7	3	18,6 ± 0,06	18,5–18,7	17	18,1 ± 0,04	17,9–18,5	17	18,1 ± 0,08	17,3–18,6
межглазничная ширина	19	3,8 ± 0,15	3,5–4,0	3	3,8 ± 0,09	3,6–3,9	20	3,7 ± 0,06	2,7–4,0	31	3,7 ± 0,02	3,5–3,8
длина верхнего зубного ряда	18	7,7 ± 0,08	7,1–8,3	3	7,6 ± 0,17	7,4–7,9	20	7,1 ± 0,33	6,9–7,9	28	7,7 ± 0,06	6,8–8,3
длина промежуточного ряда зубов	18	2,4 ± 0,07	2,1–2,8	3	3,0 ± 0,03	2,9–3,0	20	2,4 ± 0,03	2,1–2,7	26	2,6 ± 0,06	2,0–3,0
высота черепа	8	5,9 ± 0,09	5,5–6,2	3	5,8 ± 0,20	5,6–6,0	–	–	–	14	6,1 ± 0,08	5,4–6,4
длина рострума	19	5,0 ± 0,06	4,6–5,7	3	4,7 ± 0,06	4,6–4,8	20	4,7 ± 0,04	4,1–5,0	31	4,6 ± 0,04	4,0–4,9
ширина рострума	19	1,8 ± 0,07	1,5–2,9	3	1,8 ± 0,07	1,7–1,9	20	1,7 ± 0,07	1,6–1,8	31	1,5 ± 0,01	1,4–1,7

суются наши данные: особи с северо-востока Якутии по размерам существенно мельче, чем в среднем по ареалу.

Относительные размеры плюсны варьируют с сохранением той же тенденции — относительно крупные отмечены у более мелких особей, тогда как изменения длины хвоста, по-видимому, подчиняются иной закономерности: наименьший индекс хвоста (44,5 %) отмечен в самой северной точке исследования — в низовьях Индигирки.

Поскольку выраженного полового диморфизма в промерах тела и черепа у крупнозубых бурозубок не обнаружено, мы рассматриваем суммарные данные для самцов и самок (табл. 3.3). В целом пропорции черепа у крупнозубых бурозубок на территории Северной Якутии те же, что характерны для вида в целом: высокая мозговая капсула (самая большая среди бурозубок относительная высота, составляющая около 34 % от кондилобазальной длины), относительно короткий рострум, а также небольшая величина межглазничного сужения.

Распространение. По характеру распространения эта бурозубка — типичный восточный палеаркт [Юдин, 1971; Юдин и др., 1976], ее ареал охватывает территорию к востоку от Урала до Тихого океана. В Якутии распространена до арктического побережья, крайние северные находки относятся к дельте Индигирки [Михель, 1938] и низовьям Колымы [Млекопитающие Якутии, 1971]. Однако нами крупнозубая бурозубка не обнаружена в низовьях Лены, в устье р. Бесюке (рис. 3.3), где в 1983–1984 гг. отработано 370 конусо-суд. Возможно, что северная граница распространения вида по Лене сдвигается к югу. В среднем течении Лены, в окрестностях стационара “Лепписке” это вполне обычный вид [Ревин и др., 1982; Вольперт, Юдин, 1986]. По-видимому, граница ареала крупнозубой бурозубки находится между указанными точками.

Ландшафтное и биотопическое распределение. В долине Лены на широте г. Якутска этот вид был крайне малочислен. Отловлено всего два экземпляра на III надпойменной террасе в разнотравном березняке. В т. “Лепписке” крупнозубая бурозубка постоянно встречается в пойме Лены, но не достигает высокой численности, предпочитая участки высокой поймы и явно избегая открытых задернованных пространств (рис. 3.4). На надпойменной террасе она часто отлавливалась в молодых лиственничниках и значительно реже — в зрелых формациях, в частности в лиственничнике мохово-брусничном. Чаще всего попадалась в березняках; предпочтение этим видом указанной формации отмечено для Барабы [Глотов и др., 1978]. В горно-таежном ландшафте крупнозубая бурозубка нами не отловлена, в то же время в бассейне оз. Байкал она встречается на всех хребтах [Швецов и др., 1984].

При проведении абсолютного учета в пойме крупнозубой бурозубки не отловлено, тогда как на надпойменной террасе (листвен-

Рис. 3.3. Места отлова крупнозубой бурозубки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

ничник мохово-брусничный) плотность вида равнялась 6 особям на 1 га.

В долине Адычи крупнозубая бурозубка, хотя и малочисленна, но встречается довольно постоянно. Здесь, как и в долине Лены, нами не зарегистрировано обитание этих зверьков в горах. Отсутствие вида в горном ландшафте Верхоянья отмечалось В.Г. Кривошеевым и М.В. Поповым [1968], не обнаружен он и в горных системах Алтая [Юдин и др., 1979].

В долине верхней Колымы крупнозубая бурозубка, как и везде, многочисленный, но постоянно встречающийся вид, чаще отлавливающийся в таежно-озерном ландшафте, явно предпочитая березняки. В долине средней Колымы, где березняки практически отсутствуют, вид с более высокой плотностью заселял мохово-брусничные лиственничники и ивовые заросли, в то время как в литературе имеются указания на предпочтение этим видом лугов Колымо-Индигирской низменности [Кривошеев, 1964]. В долине Омолона (приток Колымы) этот вид широко распространен и достигает относительно высоких показателей численности, но исключительно в пределах поймы [Докучаев, 1990].

Рис. 3.4. Пространственное распределение крупнозубой бурозубки в т. "Лепписке".

Биотопы: **низкая пойма**: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; **высокая пойма**: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; **равнинно-таежный ландшафт**: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; **горно-таежный ландшафт**: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

В долине Индигирки в период наших исследований вид был немногочислен. Нами отловлено 20 особей крупнозубой бурозубки из низовьев и 3 — из среднего течения реки. В нижнем течении во время общей депрессии насекомоядных (1987 г.) ее численность была настолько низка, что не поймано ни одной особи, а в последующие годы составила соответственно 0,2, 0,3 и 0,8 экз. на 100 конусо-сут.

Естественно, что при столь низкой плотности населения большую роль при отлове животных играет элемент случайности, поэтому трудно судить о биотопических предпочтениях вида. Тем не менее отметим, что крупнозубая бурозубка распределена по ландшафтам очень неравномерно: поймано всего 2 особи в правобережной горной тайге, ни одной — в примыкающей к ней притеррасной пойме и на островах.

В левобережной равнинной тайге вид заселял один из двух типов леса — менее увлажненный лиственничник мохово-голубичный, а на примыкающих участках поймы численность составила 1 экз./100 конусо-сут и была заметно выше в хвощатнике. По данным отлова канавками, крупнозубая бурозубка в горно-таежном ландшафте не отмечена, тогда как, по данным абсолютного учета, проводившегося в 1988 г. в сухом мохово-лишайниковом лиственничнике, плотность населения составила 1 экз./га, это показывает, что при очень низких

уровнях численности видов результаты разных методов отлова могут давать разную картину состава сообщества.

В среднем течении реки (т. "Кебергене") все три экземпляра отловлены в биотопах озеро-таежного ландшафта.

Питание. Материал по питанию собирался в долине средней Лены в 1979–1980 гг. Исследовано 36 желудков, из них 21 (58,3 %) оказался наполненным. В составе питания крупнозубых бурозубок наиболее значительная доля принадлежит различным представителям класса насекомых (табл. 3.4). На втором месте по встречаемости стоят дождевые черви, а представители паукообразных и пища растительного происхождения очень редки. Из насекомых в желудках преобладали жесткокрылые, при этом личинкам отдается явное

Таблица 3.4
Встречаемость различных видов кормов в содержимом желудков крупнозубых бурозубок, % к числу исследованных

Вид корма	Встречаемость (n = 21)
Малоштитковые черви	19,0
Многоножки	4,8
Паукообразные	9,5
Насекомые	85,7
В том числе:	
насекомые, ближе не определены	33,3
жесткокрылые:	42,9
имаго	19,0
личинки	33,3
шелкуны (личинки)	9,5
жуки (личинки)	4,8
жуки, ближе не определены	
имаго	28,6
личинки	23,8
Двукрылые	42,9
В том числе:	
комары	14,8
двукрылые, ближе не определены,	
имаго	28,6
личинки	9,5
чешуекрылые	19,0
В том числе:	
совки (гусеницы)	9,5
чешуекрылые, ближе не определены, гусеницы	14,3
перепончатокрылые	4,8
ручейники (имаго)	9,5
Растительные остатки	4,8
Другие неопределенные остатки	28,6

предпочтение по сравнению с имаго; также велика доля двукрылых, скорее всего, это многочисленные в районе исследований представители семейства Tipulidae. Представители чешуекрылых (главным образом, в стадии гусениц) встречены в 20 % исследованных желудков.

В долине нижней Индигирки нами просмотрено содержимое трех желудков крупнозубой бурозубки, в них отмечены три группы кормов: в двух желудках насекомые (двукрылые) и паукообразные, в одном — семена.

Литературные данные позволяют сравнить характер питания крупнозубых бурозубок с двух участков ареала вида из Западного Предверхоянья (табл. 3.5). Во всех сравниваемых районах интенсивность потребления представителей класса насекомых сходна. Имеются лишь различия по поедаемости представителей разных отрядов. Так, на северо-востоке ареала в питании значительна доля двукрылых. В бассейне Колымы в питании отмечена

Таблица 3.5
Географическая изменчивость в питании крупнозубой бурозубки, % встречаемости кормов в желудках

Вид корма	Западная Сибирь [Юдин, 1962] (n = 111)	Бассейн р. Колымы [Докучаев, 1981] (n = 67)	Центральная Якутия (наши данные) (n = 21)
Насекомые	82,9	74,6	85,7
В том числе:			
жесткокрылые	37,8	40,3	42,9
двукрылые	2,7	22,4	42,9
чешуекрылые	1,8	4,5	19,0
перепончатокрылые	1,8	10,4	4,8
Паукообразные	2,7	1,5	9,5
Многоножки	6,3	25,4	4,8
Малоштитковые черви	15,3	20,9	19,0
Растительные остатки	?	47,8	4,8

высокая встречаемость растительных кормов, что косвенно указывает на возможность частого поедания их в других частях ареала.

Размножение. Первые сеголетки в долине средней Лены отлавливались в последней декаде июня. Таким образом, их размножение начинается, как и у других видов, в начале мая. Для Якутии имеются данные, что размножение может начаться в апреле [Млекопитающие Якутии, 1971]. Последние самцы в состоянии гона (масса семенников 63–71 мг) отлавливались в долине средней Лены в сентябре, так же как и в других частях северо-востока Сибири [Докучаев, 1979], т.е. сезон размножения занимает 4–4,5 мес. За этот период перезимовавшие самки дают, как правило, два помета, причем вполне вероятно наличие третьего у некоторых из них.

Интенсивность размножения довольно существенно меняется в течение сезона. В 1980 г. масса семенников перезимовавших самцов нарастала с июня к июлю, а в августе стала гораздо меньше, в предыдущем сезоне нами наблюдалась та же закономерность. Пик поедаемости прибылых зверьков приходится на конец августа [Вольперт, 1986]. Таким образом, наивысшая напряженность процесса воспроизводства приходится на май-июнь, хотя беременных самок в это время и не отловлено, что объясняется, скорее всего, скрытым образом жизни последних.

Как и у других видов бурозубок, прибылые зверьки участвуют в размножении в год рождения. В районе устья р. Лепписке в августе 1979 г. и в июле 1980 и 1984 гг. нами отлавливались прибылые самцы с крупными семенниками, не уступавшими по массе таковым у перезимовавших, а по объему даже превосходящими последние, но в августе процент участия в размножении молодых был незначительным.

Прибылые беременные самки на средней Лене отлавливались только в августе по одной в 1979 и 1980 гг., а на Колыме единственная за три года исследований беременная прибылая была отмечена в 1981 г. Немногочисленность вида в годы исследований, в особенности на территории Колымо-Индигоирской низменности, лишает возможности определенно говорить о степени и причинах варьирования интенсивности участия молодых в воспроизводстве, но можно определенно сказать, что размножение сеголеток является обычным у крупнозубых бурозубок и играет существенную роль в регулировании численности популяции.

В долине средней Лены плодовитость вида относительно низка ($6,5 \pm 0,67$, $n = 6$), значительно ниже, чем на Колыме ($7,7$, $n = 16$) и на Омолоне ($7,9 \pm 0,38$, $n = 10$) [Кривошеев, 1964; Докучаев, 1990]. Возможно, что такой низкий показатель плодовитости в долине средней Лены объясняется малочисленностью нашей выборки. За весь период исследований отмечен один случай резорбции эмбрионов, причем резорбировало четыре из семи.

Возрастная и половая структура. Как и у других видов, прибылые особи крупнозубой бурозубки появляются в июне, уступая по численности перезимовавшим особям, к июлю соотношение двух возрастных групп приблизительно 1:1, а в августе процент прибылых явно ниже, чем у других видов мелких млекопитающих. Причина такого явления на настоящий момент неясна, можно согласиться с Н.Е. Докучаевым [1979], что среди прибылых крупнозубых бурозубок возможна более высокая смертность вследствие конкуренции с доминирующей средней бурозубкой. Напряженность конкурентных отношений между двумя этими видами в районе исследований весьма велика [Вольперт, 1984].

Как и у других полигамов, в период размножения у крупнозубой бурозубки среди активно размножающихся перезимовавших зверьков в уловах преобладают самцы. Среди прибылых во все годы исследований самцы чаще самок попадались в июле, т.е. во время относительно активного размножения сеголеток, а в августе и сентябре соотношение полов постепенно выравнивается и становится близким к 1:1.

3.3. Равнозубая бурозубка — *Sorex isodon Turov, 1924*

Морфометрическая характеристика. Одна из наиболее крупных бурозубок характеризуется средней длиной хвоста (63 % относительно длины тела) и черепом средних размеров (28,7 % [Юдин, 1989]). Б.С. Юдин [1989] считает, что географическая изменчивость у вида выражена слабо, и это позволяет говорить о его мономорфности.

Таблица 3.6

Морфометрические показатели равнозубой бурозубки в долине средней Лены (перезимовавшие и прибылые особи)

Промеры	n	$M \pm m$	σ	limit
Масса тела, г	23	$7,9 \pm 0,13$	0,61	6,5–8,8
Длина тела, мм	21	$65,1 \pm 0,63$	2,90	60,7–71,6
Длина хвоста, мм	20	$38,6 \pm 0,76$	3,38	36,2–46,3
Длина плюсны, мм	21	$12,5 \pm 0,14$	0,62	11,2–13,8
Промеры черепа, мм:				
общая длина	19	$20,3 \pm 0,08$	0,33	19,7–21,0
кондилобазальная длина	22	$19,5 \pm 0,07$	0,32	18,9–20,0
межглазничная ширина	25	$3,9 \pm 0,03$	0,16	3,7–4,2
длина верхнего зубного ряда	20	$8,3 \pm 0,06$	0,25	7,8–8,7
длина промежуточного ряда зубов	23	$3,1 \pm 0,08$	0,36	2,6–3,6
высота черепа	19	$6,3 \pm 0,07$	0,28	5,7–6,6
длина роострума	25	$5,6 \pm 0,05$	0,24	5,2–6,0
ширина роострума	24	$1,8 \pm 0,02$	0,10	1,6–2,1

В наших материалах вид представлен одной выборкой (табл. 3.6). Размеры тела у зверьков из долины средней Лены существенно меньше, чем указанные для вида Б.С. Юдиным, хвост немного короче (59,3 %), а относительные размеры головы — крупнее (29,9 % от длины тела). Однако при рассмотрении пропорций черепа выясняется, что они полностью тождественны указанным Б.С. Юдиным [1989].

Распространение. По характеру распространения вид — преимущественно восточный палеаркт [Юдин и др., 1979]. На территории Якутии он имеет весьма ограниченный ареал, до недавнего времени северной границей его считалась широта г. Якутска [Млекопитающие Якутии, 1971]. В результате наших исследований установлено обитание этого вида ниже устья р. Виллой на правобережье Лены (рис. 3.5), причем равнозубая бурозубка проникает по долине р. Лепписке в Верхоянские горы как минимум на 150 км [Ревин и др., 1988]. В то же время она не обнаружена в долине Яны [Кривошеев, Попов, 1968; Ревин, Вольперт, 1985], в долинах Индигирки [Винокуров, Мордосов, 1980] и Колымы [Кривошеев, 1964]. Не зарегистрирован вид на северо-востоке Якутии и в процессе наших исследований [Вольперт, Юдин, 1986; Вольперт, Шадрин, 2001]. Не отмечено обитание равнозубой бурозубки в долине среднего течения Омолона [Чернявский и др., 1978], хотя она отлавливалась в долине притока Омолона — р. Кегали [Юдин и др., 1976]. На удивительно малое проникновение этой бурозубки на север Якутии указывает В.А. Долгов [1967]. Исследования, проведенные нами в устье р. Бесюке [Вольперт и др., 1988], не выявили обитания этого вида; вероятно, северная граница ареала по долине Лены проходит южнее указанного места.

Рис. 3.5. Места отлова равнозубой бурозубки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

Ландшафтное и биотопическое распределение. В долине Лены на широте г. Якутска этот вид крайне редок. Нами отловлен всего один экземпляр на берегу озера на опушке смешанного леса. М.В. Попов [1975] отловил одну равнозубую бурозубку в редкостойном травянистом березняке в долине р. Кенкеме (50 км западнее г. Якутска). В долине средней Лены (т. "Лепписке") равнозубая бурозубка отлавливалась только на надпойменной террасе. Наиболее многочисленным этот вид был в 1979 г., предпочитая всем биотопам березняки и смешанные хвойно-лиственные леса (рис. 3.6). В 1984 г. вид чаще всего отлавливался в мохово-брусничном лиственничнике. По данным абсолютного учета, проведенного в этом биотопе, плотность населения равнозубой бурозубки была очень велика — 30 особей на 1 га, т.е. вид по численности занимает второе место среди бурозубок (после средней), что является неожиданностью. В Южной Якутии этот вид предпочитает леса смешанного типа с участием березы [Ревин, 1968], на северо-востоке Сибири ее чаще отлавливали в ивовых зарослях с примесью лиственницы [Юдин и др., 1976], в Карелии она предпочитает спелые лиственные леса [Ивантер, Макаров, 2001]. В целом ареал вида тесно связан с таежными ландшафтами [Юдин, 1971], в условиях Якутии на краю ареала также отмечается предпоч-

Рис. 3.6. Пространственное распределение равнозубой бурозубки в т. "Лепписке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; равнинно-таежный ландшафт: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; горно-таежный ландшафт: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

тение широколиственных насаждений или лиственничных лесов с широким участием березы.

Питание. Из-за малочисленности вида в районе исследований проанализировано содержимое только девяти желудков. Основу питания равнозубой бурозубки составляли представители класса насекомых, которые содержались в желудках у всех осмотренных зверьков (табл. 3.7). Относительно велико также значение дождевых червей.

Из-за ограниченности нашей выборки мы воздержимся от сравнения аспектов питания вида в нашем регионе с другими участками ареала. Укажем только, что с обитающими в Карелии равнозубыми бурозубками [Ивантер и др., 1973; Ивантер, Макаров, 2001] по крупным таксонам (насекомые, паукообразные, малощетинковые черви) питание сходно. Различаются соотношения встречаемости отдельных представителей класса насекомых. Так, в Карелии в рационах животных чаще попадаются представители чешуекрылых, а в Предверхоянье — двукрылых.

Размножение. Сведения по размножению этого вида весьма отрывочны. Начало его, судя по отлову сеголеток, приходится на май, т.е. в те же сроки, что и у других бурозубок. Продолжается сезон воспроизводства до конца сентября: в 1984 г. две беременные самки были отловлены во второй декаде месяца, хотя в этот период у других видов бурозубок беременных самок не зарегистрировано. На поздние сроки размножения равнозубых бурозубок указывает

Таблица 3.7
Встречаемость различных видов кормов в содержимом желудков равнозубой бурозубки, % к числу исследованных

Вид корма	Встречаемость (n = 9)
Насекомые	100
В том числе:	
имаго	11,3
личинки	33,3
Жесткокрылые	55,6
В том числе:	
имаго	22,2
личинки	33,3
Двукрылые	44,4
двукрылые, ближе не определены	44,4
имаго	33,3
коконы	11,1
личинки	11,1
комар-долгоножка (личинки)	11,1
Перепончатокрылые	11,1
Чешуекрылые	22,2
Паукообразные	11,1
Малощетинковые	55,6
Растительные остатки	11,1
Семена	11,1

момента появления первой генерации сеголеток они составляют большинство популяции. Небольшие отклонения от типичной картины, как это наблюдалось в июле 1984 г. (табл. 3.8), можно объяснить недостаточной репрезентативностью выборки и особенностями размножения в этом году.

Половая структура популяции (табл. 3.9) несколько отличается от типичной для других видов бурозубок: не наблюдается безусловного преобладания самцов, в особенности среди молодых животных.

Б.С. Юдин [1971]. У обеих самок наблюдалась резорбция: у одной 4 из 7, у другой 1 из 7 эмбрионов. Как и у других представителей насекомоядных, перезимовавшие особи активно размножаются. Прибылые включаются в размножение с июля; участие молодых самок в размножении у этого вида в Западной Сибири — обычное явление [Юдин, 1971; Юдин и др., 1979]. В наших материалах процент участия у обоих полов был максимальным в 1984 г.

Сведения по плодовитости вида в Якутии очень ограничены. В долине р. Кенкеме отловлена самка с 9 эмбрионами [Млекопитающие Якутии, 1971], нами в долине средней Лены отловлены беременные молодая и перезимовавшие самки, каждая имела по 7 эмбрионов. На Алтае этот показатель равняется 7,6 [Юдин и др., 1979], в Карелии — 5 [Ивантер и др., 1974].

Возрастная структура популяции равнозубой бурозубки типична для мелких млекопитающих: с

Таблица 3.8
Возрастная структура популяции равнозубой бурозубки в долине средней Лены

Год	Месяц	Всего добыто	Перезимовавшие, %	Сеголетки, %
1979	Июнь	8	0,0	100
	Сентябрь	2	0,0	100
1980	Июль	3	0,0	100
	Август	5	20,0	80,0
1984	Июнь	2	0,0	100
	Июль	7	42,9	57,1
	Август	31	9,7	90,3

Таблица 3.9
Половая структура популяции равнозубой бурозубки в долине средней Лены

Год	Месяц	Перезимовавшие			Сеголетки		
		Всего добыто	Самки, %	Самцы, %	Всего добыто	Самки, %	Самцы, %
1979	Июль	—	—	—	8	37,5	62,5
	Сентябрь	—	—	—	2	50,0	50,0
1980	Июль	—	—	—	3	0,0	100
	Август	1	0,0	100	4	25,0	75,0
1984	Июнь	—	—	—	2	100	0,0
	Июль	3	0,0	100	4	0,0	100
	Сентябрь	3	66,7	33,3	28	67,9	32,1

3.4. Бурая бурозубка — *Sorex roboratus* Hollister, 1913

Морфометрическая характеристика. Крупная бурозубка тяжелого телосложения. Череп вытянут в длину (28,2 % от длины тела), относительно узкий в мозговой части и широкий — в ростральной [Юдин, 1989].

Б.С. Юдин [1989] отмечает, что длина хвоста у бурой бурозубки немногим более половины тела, и при этом подвержена значительной географической изменчивости: наиболее короткий хвост характерен для якутских популяций вида. Наши данные служат этому подтверждением: в долинах рек Северной Якутии индекс длины хвоста бурой бурозубки составляет всего 43–46 % от длины тела (табл. 3.10).

Длина тела бурых бурозубок в долинах Яны, Индигирки и Колымы варьирует в пределах 70,6–74,8 мм. Ранее на территории Якутии была описана еще более крупная форма из долины Колымы, выделенная Б.С. Юдиным в отдельный подвид, — якутская бурая бурозубка (*S. roboratus vir*). В целом пропорции черепа вполне типичны для вида.

Распространение. По типу своего распространения вид является типичным восточным палеарктом [Юдин, 1971]. В Якутии он широко распространен по всей территории, включая и тундровую зону [Млекопитающие Якутии, 1971]. Нам не удалось отловить бурую бурозубку в среднем течении Индигирки и в долине Лены на широте г. Якутска, что можно объяснить низкой численностью вида в период исследований (рис. 3.7).

Ландшафтное и биотопическое распределение. В долине средней Лены (т. “Лепписке”) численность бурой бурозубки можно охарактеризовать как низкую. В пойменном комплексе к наиболее благоприятным биотопам относятся, в первую очередь, березняки, приуроченные к участкам высокой поймы (рис. 3.8), где этот вид в 1979 г. составил 22 % населения при максимальной для нашей вы-

Рис. 3.8. Пространственное распределение бурой бурозубки в т. "Лепписке".

Биотопы: **низкая пойма**: 1 — затапливаемые ивняки, 2 — заливные луга; **высокая пойма**: 3 — незатапливаемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; **равнинно-таежный ландшафт**: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; **горно-таежный ландшафт**: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

нялась 10 особям на 1 га, в то время как в пойме — только 3 особи на 1 га.

В долине нижней Лены бурая бурозубка в пойменном комплексе предпочитает ивовые заросли, в равнинно-таежном ландшафте не отловлена.

В долине Адычи описываемый вид отмечался только в аласно-таежном ландшафте в лиственничнике мохово-брусничном. В этом же регионе другие исследователи отлавливали бурую бурозубку в пойменных осоковых лугах с ивняковыми зарослями и на пойменных лиственничных гарях [Кривошеев, Попов, 1968].

В долине верхней Колымы в пойменном комплексе рассматриваемый вид отлавливался в регулярно затапливаемых ивовых зарослях; на надпойменной террасе — в лиственных лесонасаждениях — ольховниках и березняках.

В долине средней Колымы в пойменном комплексе максимальный индекс доминирования зарегистрирован в регулярно затапливаемых ивняках в 1981 г., а в следующем сезоне в этом местообитании данный вид не отловлен. В озерно-таежном ландшафте чаще, чем в других биотопах, бурая бурозубка отлавливалась в ивняках, хотя численность тут была ниже, чем в пойме. В горно-таежном ландшафте бурозубки этого вида в годы исследований не попадались. В целом численность вида в долине Колымы в период наших исследований можно охарактеризовать как низкую. По данным В.Г. Кривошеева [1964], этот вид на Колыме был самым многочис-

ленным в ландшафтах низменной тайги, предпочитая лиственничные зеленомошники.

В целом по Якутии этот вид предпочитает на надпойменной террасе лиственничные насаждения, особенно хорошо увлажненные, а в пойме — ивовые заросли, где он находит достаточное количество излюбленного корма — насекомых и червей [Вольперт, Аверенский, 1983].

Питание. Объем собранного материала по этому виду небольшой: разобрано содержимое 14 желудков животных, отловленных в долине средней Лены. Из материалов, представленных в табл. 3.11, видно, что в питании вида существенное значение имеют две группы кормов — представители таксонов насекомых и червей, причем встречаемость последних на 20 % выше. Из насекомых чаще других групп поедались жесткокрылые, главным образом на имагинальной стадии развития. Являясь самой крупной бурозубкой в районе исследования, бурая бурозубка, как видно, поедает разнообразных по размерам беспозвоночных, которых находит в верхнем слое почвы или в опаде. Характер наружных покровов кормовых объектов (твердые или мягкие) для нее значения, по-видимому, не имеет.

Сходное соотношение пищевых компонентов в рационе данного вида наблюдалось на севере ареала — Гыданском п-ове, но было иным в центральной части Западной Сибири (табл. 3.12). Основываясь на этих данных, по-видимому, можно указать на увеличение доли дождевых червей в питании вида по направлению к северу. Кроме того, на северных участках ареала становится более значительной роль представителей отряда двукрылых, что характерно и для других бурозубок.

Размножение. Сроки размножения этого вида не отличаются от таковых у других бурозубок. Первые сеголетки отлавливались нами в июне, размножение шло, как минимум, до августа, отдельные перезимовавшие самцы сохраняли большую массу семенников и в сентябре.

Прибылые самцы и самки принимали участие в размножении практически во все годы исследований. Об изменениях интенсивности размножения молодых по годам трудно су-

Таблица 3.11

Встречаемость различных видов кормов в содержимом желудков бурой бурозубки, % к числу исследованных

Вид корма	Частота встречаемости (n = 14)
Малошетинковые черви	85,7
Паукообразные	7,1
Насекомые	57,1
В том числе:	
насекомые ближе не определены, имаго	7,1
личинки	7,1
Низшие насекомые	7,1
Жесткокрылые (имаго)	35,7
Двукрылые (имаго)	28,6
Перепончатокрылые (имаго)	14,3
Равнокрылые хоботные	7,1
Цикадовые	
Растительные остатки	14,3

Таблица 3.12

Географическая изменчивость питания бурой бурозубки, % встречаемости

Вид корма	Западная Сибирь [Юдин, 1962] (n = 21)	Гыланский п-ов [Юдин, 1962] (n = 73)	Средняя Лена (наши данные; n = 14)
Малошетинковые черви	4,8	67,1	85,7
Паукообразные	—	—	7,1
Насекомые	85,7	24,6	57,1
В том числе:			
низшие насекомые	—	—	7,1
жесткокрылые	47,6	15,0	37,5
двукрылые	—	2,7	28,6
перепончатокрылые	9,5	—	14,3
Растительные корма	—	10,9	14,3

дить из-за малочисленности выборок, но необходимо отметить, что степень участия молодых самок в размножении в отдельные годы в июле — августе доходила до 100 %.

Плодовитость вида в целом по Якутии довольно высока: $9,1 \pm 0,98$ ($n = 16$), в бассейне Колымы этот показатель равен 9–12, в бассейне Олекмы — 6,5 ($n = 2$). По нашим данным, плодовитость среднеленских бурых бурозубок ближе к олекминской — 6,3 ($n = 2$), хотя даже в Западной Сибири и на Алтае этот показатель выше: соответственно 7,5 ($n = 4$) и 7,5 ($n = 14$) [Юдин, 1962; Кривошеев, 1964; Ревин, 1968; Млекопитающие Якутии, 1971; Юдин и др., 1979].

Возрастная структура популяции бурой бурозубки характерна для животных этого вида: к августу в популяции преобладают прибылые зверьки, в отдельные годы преобладание сеголеток наблюдается уже с июня — июля.

Половая структура популяции бурой бурозубки отражает ход процесса размножения. Среди перезимовавших устойчиво преобладают самцы, та же закономерность прослеживается и у прибылых в период их активного участия в размножении; вне периода размножения соотношение полов в уловах сеголеток близко к 1:1.

3.5. Тундрная бурозубка — *Sorex tundrensis* Merriam, 1900

Морфометрическая характеристика. Б.С. Юдин [1989] описывает тундрную бурозубку как землеройку средних размеров массивного телосложения с широкой мозговой коробкой и коротким широким хоботком.

Половой диморфизм в якутских популяциях тундрной бурозубки, как и в других популяциях вида, не обнаружен, поэтому мы приводим суммарные данные для самцов и самок (табл. 3.13). В Северной Якутии по размерам тела они достоверно меньше, чем в среднем по ареалу (табл. 3.13). Пропорции тела варьируют в значительных пределах, например, длина хвоста от 42 до 50 % от длины тела, но наиболее укороченный хвост характерен для бурозубок, отловленных в самой северной точке — низовьях Индигирки. Те же тенденции отмечены и в изменении пропорций плюсны.

У тундрной бурозубки в пределах ареала ярко выражена географическая изменчивость краниологических признаков. По данным Б.С. Юдина [1989], длина черепа, рострума и верхнего ряда зубов уменьшается от средней части ареала по направлению на север. Наши материалы вполне согласуются с этим утверждением (табл. 3.13). Кроме того, надо отметить, что, как и у крупнозубой бурозубки, экземпляры из долин рек Северной Якутии характеризуются при относительно небольших размерах тела довольно крупными размерами головы (29–31 % от длины тела). По всем показателям, кроме межглазничной ширины, они достоверно меньше указанных Б.С. Юдиным [1989] для Западной Сибири, но пропорции черепа в основном те же, разница в индексах основных промеров (наибольшие ширина, высота, длина рострума и т.д.) не превышает 0,5–0,6 %.

Распространение. По характеру распространения тундрная бурозубка является восточно-сибирским палеарктом. Ареал вида охватывает обширную территорию Палеарктики на восток от бассейна Печоры до побережья Тихого океана [Чернявский, 1984]. Это один из самых политопных видов землероек [Юдин и др., 1976; Долгов, 1985]. В Якутии тундрная бурозубка заселяет всю территорию республики (рис. 3.9), встречаясь практически во всех ландшафтах, избегая только гольцовый пояс, но заселяя горные и равнинные тундры [Млекопитающие Якутии, 1971]. По нашим наблюдениям, это единственный вид бурозубок, который проник в тундру в дельте Лены, но непосредственно на побережье Ледовитого океана он не отмечен [Вольперт, Сапожников, 1996].

Ландшафтное и биотопическое распределение. Необходимо отметить высокую эвритопность, характерную для этого вида, который заселяет с различной плотностью все ландшафты в долине Лены [Млекопитающие Якутии, 1971; Ревин и др., 1982; Швецов и др., 1984].

Долина Лены. В долине средней Лены ярко выражено предпочтение видом пойменного комплекса. На широте г. Якутска тундрная бурозубка достигала максимальной численности в ивняках низкой поймы и с меньшей плотностью заселяла луга в низкой и высокой пойме. На надпойменных террасах вид был наиболее многочислен на берегу озера и в березняках различного типа.

Таблица 3.13
Морфометрические показатели тундрной бурозубки долин рек Северной Якутии (перезимовавшие и прибывшие особи)

Промеры	Долина Лены				Долина Индигирки				Долина Колымы			
	n	$M \pm m$	limit		n	$M \pm m$	limit		n	$M \pm m$	limit	
Масса тела, г	86	$5,3 \pm 0,05$	4,1–6,6		49	$4,9 \pm 0,09$	4,0–7,5		5	$5,1 \pm 0,28$	5,4–5,5	
Длина тела, мм	84	$58,8 \pm 0,32$	46,4–63,9		73	$59,3 \pm 0,34$	54,3–72,4		4	$56,3 \pm 1,13$	53,3–58,4	
Длина хвоста, мм	84	$29,9 \pm 0,24$	24,8–34,4		72	$25,1 \pm 0,24$	21,0–33,9		5	$25,9 \pm 1,31$	24,9–29,0	
Длина плюсны, мм	84	$11,3 \pm 0,06$	9,7–12,6		73	$10,6 \pm 0,05$	9,4–12,2		5	$10,5 \pm 0,25$	10,4–11,2	
Промеры черепа, мм:												
общая длина	66	$18,9 \pm 0,04$	18,0–19,4		70	$18,0 \pm 0,04$	16,7–18,6		4	$18,4 \pm 0,08$	18,2–18,5	
кондилобазальная длина	68	$18,0 \pm 0,05$	17,1–18,7		71	$17,2 \pm 0,04$	16,1–17,9		5	$17,5 \pm 0,15$	17,2–17,9	
межглазничная ширина	85	$3,7 \pm 0,02$	3,3–4,0		73	$3,4 \pm 0,01$	3,2–3,8		5	$3,3 \pm 0,06$	3,3–3,5	
длина верхнего зубного ряда	75	$7,8 \pm 0,02$	7,4–8,0		72	$7,1 \pm 0,02$	6,5–7,7		4	$7,7 \pm 0,24$	7,6–8,2	
длина промежуточного ряда зубов	82	$2,6 \pm 0,03$	2,0–3,0		73	$2,3 \pm 0,03$	1,8–2,6		5	$2,8 \pm 0,026$	2,1–3,3	
высота черепа	65	$5,6 \pm 0,03$	5,1–6,2		—	—	—		5	$5,5 \pm 0,05$	5,4–5,6	
длина роострума	79	$4,6 \pm 0,02$	4,0–4,9		73	$4,3 \pm 0,02$	4,0–4,8		5	$4,8 \pm 0,12$	4,7–5,2	
ширина роострума	86	$1,7 \pm 0,01$	1,5–2,0		73	$1,6 \pm 0,04$	1,5–1,9		5	$1,5 \pm 0,05$	1,5–1,6

Рис. 3.9. Места отлова тундрной бурозубки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

Ниже по течению, в районе устья Вилюя, также характерно предпочтение биотопов низкой поймы. В условиях Якутии это — регулярно затопляемые ивовые заросли, где тундрная бурозубка достигает высоких уровней численности (рис. 3.10) и составляет около 50 % населения мелких млекопитающих.

Не менее охотно заселяет этот вид и среднеувлажненные пойменные луга с хорошим травостоем. В указанных биотопах процент беременных самок и перезимовавших животных выше, чем в березняках и ельниках. Если учесть, что в период паводка бурозубки, населяющие биотопы низкой поймы, как правило, гибнут [Сергеев, 1984], то высокий процент перезимовавших здесь объясняется эмиграцией зверьков с участков высокой поймы, что указывает на высокую привлекательность низкой поймы для вида из-за обилия предпочитаемых кормов [Вольперт, Аверенский, 1983].

С несколько меньшей плотностью заселяются участки высокой поймы, поросшие древесной растительностью, причем среди них в долине средней Лены тундрная бурозубка отдает предпочтение ельникам, расположенным на пойменных гривах (рис. 3.10). В 1979 г. в этом биотопе описываемый вид составил 76,4 % населения мелких млекопитающих при очень высокой численности — 48,3 особи на

Рис. 3.10. Пространственное распределение тундровой бурозубки в точках "Лепписке" (а) и "Бесюке" (б).

а — биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; равнинно-таежный ландшафт: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; горно-таежный ландшафт: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики; б — биотопы: низкая пойма: 1 — ивняки, 2 — луг; высокая пойма: 3 — кустарник; равнинно-таежный ландшафт: 4 — лиственничник лишайниковый, 5 — лиственничник моховой.

100 конусо-сут. В то же время в ельниках беременных самок не обнаружено, тогда как в незатопляемых ивняках зверьки, принимающие участие в размножении, составили в 1979 г. большинство, и процент перезимовавших был значительно выше, чем в ельниках.

В целом в пойменном комплексе на указанном участке долины тундряная бурозубка предпочитает низкую пойму, заселяя ее с высокой плотностью, несмотря на массовую элиминацию во время паводка.

В равнинно-таежном ландшафте наивысшая численность вида, по многолетним данным, отмечена в березняках (см. рис. 3.10). По годам распределение вида может варьировать. Так, в 1979 г. максимальное обилие зарегистрировано в молодых лиственничниках, приуроченных к старым гарям, а процент перезимовавших был выше в 1984 г. в лиственничниках мохово-брусничных при одинаковой встречаемости в обоих названных биотопах беременных самок. При этом тундряная бурозубка отлавливалась во всех биотопах указанного ландшафта, но нигде не входила в число доминантов.

В горно-таежном ландшафте тундряная бурозубка встречалась гораздо реже: она отлавливалась только в смешанном хвойно-лиственном лесу. На низкую численность тундряной бурозубки в высокогорье бассейна оз. Байкал указывает и Ю.Г. Швецов с соавторами [1984].

При проведении абсолютных учетов в 1984 г. в т. "Лепписке" плотность вида в лиственничнике мохово-брусничном (равнинно-таежный ландшафт) равнялась 21 особи на 1 га, тогда как в пойме — 56 особей на 1 га, т.е. в 2,7 раза больше, чем на надпойменной террасе. По данным относительного учета, проведенного в тех же биотопах, в пойме численность была выше в 3 раза.

В северотаежной подзоне в низовьях Лены мы наблюдали ту же картину, что и в подзоне средней тайги. Тундряная бурозубка была более многочисленна в пойме, в особенности на заливных лугах. В пределах равнинной тайги она заселяла лиственничники мохово-лишайниковые с большей плотностью, чем переувлажненные [Вольперт и др., 1988].

В тундровой части долины Лены (в дельте) этот вид достигал наибольшей численности на немногочисленных лугах, приуроченных к берегам реки. В чисто тундровых местообитаниях его численность была значительно ниже [Вольперт, Сапожников, 1996].

Анализ предпочтительности видом определенного ландшафта в долине Лены выявляет, как и в енисейской тайге [Шефтель, 1983, 1990], явное предпочтение тундряной бурозубкой поймы. В последней этот вид относится к числу содоминантов, или в отдельные годы доминирует в сообществе. Численность тундряной бурозубки тут значительно выше, чем на надпойменной террасе и в горно-таежном ландшафте.

В долинах Яны и Колымы исследования совпали с глубокой депрессией вида. В долине средней Колымы нами отловлено всего 5 экз. тундряной бурозубки, причем 4 из них в пойменных местообитаниях. Также очень низкие показатели обилия этого вида отмечены нами в период исследований в верхнем течении реки (в т. "Поповка"), где очень небольшое количество тундряных бурозубок отлавливалось в лиственничниках озерно-таежного ландшафта. В.Г. Криво-

шеев [1964], проводивший исследования во время более высокой численности вида, отмечает приверженность его пойменным местообитаниям, такой же характер распределения вида зарегистрирован в долине р. Омолон [Докучаев, 1990].

Для тундряной бурозубки в долине средней Лены характерны значительные колебания численности; то же можно сказать о динамике численности вида на Колыме, если сравнивать наши данные и имеющиеся в литературе [Кривошеев, 1964]. Изменения численности вида в т. "Лепписке" в пойме по годам характеризуются высокой амплитудой колебаний — до 52 раз, а на надпойменной террасе флуктуации не превышали 5,5 раза. На наш взгляд, столь значительная разница объясняется наличием в пойме дополнительного фактора — паводка, являющегося основным для обитателей поймы [Максимов, 1974].

Мощные весенние паводки, характерные для Лены, сопровождающиеся заморозками, приводят к массовой элиминации зверьков, в то же время благоприятные условия, в особенности хорошая кормовая база [Вольперт, Аверенский, 1983], позволяют виду достигать высокой численности в годы "пика", которые чередуются глубокими депрессиями. Для популяций, обитающих вне поймы, не наблюдаются подобные всплески численности, но нет и столь глубоких депрессий. Интересно отметить, что направления изменения численности в обоих ландшафтах (равнинно-таежном и пойме) в годы наблюдений совпадали.

В долине Индигирки в ходе наших исследований тундряная бурозубка не отловлена в районе Момского хребта. В равнинной части среднего течения пойманы две особи — в лиственничнике на гриве озерно-таежного ландшафта и в островном ивняке. В низовьях реки тундряная бурозубка в годы исследований была немногочисленна: показатели обилия колебались от 0,1 экз. на 100 конусо-сут в 1987 г. до 1,8 в 1990 г. Этот вид отловлен в большинстве обследованных биотопов, но его распределение по территории крайне неравномерно (рис. 3.11). Ни в одной станции не отмечено попадание тундряной бурозубки в течение всех четырех лет, в таежных ландшафтах она встречена в пяти станциях из восьми обследованных, а в год депрессии обнаружена всего в одном биотопе — левобережном хвощатнике.

При этом тундряная бурозубка не просто менее широко расселена в таежных комплексах, но и численность ее там ниже, чем на притеррасных участках поймы. Единственным биотопом, где отловлены перезимовавшие размножавшиеся животные, был пойменный хвощатник, здесь же отмечен единственный вступивший в репродукцию прибылой самец. Таким образом, сопоставление демографической структуры, показателей обилия и биотопического распределе-

Рис. 3.11. Пространственное распределение тундряной бурозубки в т. "Шаманово".

Биотопы: озерно-таежный ландшафт: 1 — лиственничник мохово-голубичный, 2 — лиственничник бруснично-моховый; пойма левого берега: 3 — регулярно затопляемые ивняки; острова: 4 — хвощатники, 5 — лиственничник мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; пойма правого берега: 7 — хвощатники, 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; горно-таежный ландшафт: 10 — осыпь, 11 — лиственничник мохово-лишайниковый, 12 — лиственничник голубично-моховый, 13 — лиственничник моховый переувлажненный.

ния говорит о том, что здесь тундряная бурозубка также охотнее селится в увлажненных пойменных местообитаниях.

Обращает на себя внимание явное предпочтение притеррасных участков островным (в последних вид отловлен только в год максимальной численности), по-видимому, это объясняется возможностью миграции с притеррасной поймы на коренные берега в случае паводков. Известно, что изменения уровня воды в реке оказывают на бурозубок отрицательное влияние [Сергеев, 1974, 1984].

Движения численности тундряной бурозубки на правом и левом берегах Индигирки происходили синхронно, но в горной тайге и на примыкающих участках поймы ее подъем в 1987 г. произошел более резко, чем на левом берегу в озерно-таежном ландшафте, и удерживался на более высоком уровне даже в следующем сезоне, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Последнее вполне объяснимо: обилие осадков в сочетании с высоким летним паводком сильнее сказалось на низком левом берегу с его более сырыми лиственничниками и отсутствием высокой поймы. Аналогично можно объяснить и разницу в скорости подъема численности. Нами для средней Лены отмечалось наличие прямой связи между количеством осадков и численностью почвенных беспозвоночных — основного корма землероек, что косвенно влияет на численность последних [Вольперт, Аверенский, 1983]. На основании наблюдений в низовьях Ин-

дигирки мы склонны уточнить, что в условиях вечной мерзлоты на численность бурозубок положительно влияет большое количество осадков в начале лета.

Анализируя распределение вида по обследованным долинам рек, необходимо отметить, что повсеместно тундряная бурозубка предпочитает открытые увлажненные задернованные местообитания, в первую очередь приуроченные к пойме. Возникает впечатление, что значимость этого вида повышается в северном направлении, как наблюдается и на Таймыре [Литвинов, 1995], и снижается в восточном направлении. По крайней мере мы не отмечали столь глубоких депрессий численности вида в долине Лены, несмотря на высокую амплитуду флуктуаций, как это отмечено в долине Колымы.

Питание. Материал по питанию собирали на стационаре "Лепписке" в 1979–1980 гг. и в нижнем течении Индигирки. Качественный анализ состава пищи тундряной бурозубки в летний период показан в табл. 3.14. Как видно, основу питания вида составляют насекомые и дождевые черви. Значительно меньшая роль отведена представителям класса паукообразных. Необходимо принять во внимание высокую скорость эвакуации мягких кормов из желудка, что приводит к занижению показателей по сравнению с более твердыми кормами. Остатки кормов растительного происхождения в желудках обнаружены у 12,5 % зверьков.

Из насекомых чаще других поедаются жесткокрылые, причем в равной степени имагинальные и личиночные формы. Значительная роль принадлежит также имагинальным формам двукрылых. Роль других таксономических групп насекомых не выходит за пределы второстепенного корма.

Сравнение материалов, характеризующих питание бурозубок в пойме и на надпойменной террасе, показывает, что по многим компонентам оно сходно. Близка встречаемость насекомых в целом и, в частности, жесткокрылых и чешуекрылых. В желудках бурозубок, отловленных на надпойменных террасах, не отмечены остатки клопов, ручейников, ногохвосток, но это можно объяснить недостаточной репрезентативностью выборки. Если сравнить соотношение встречаемости разных кормовых объектов в природе (на надпойменных террасах насекомых в верхних слоях почвы больше, а дождевых червей — меньше, чем на островах), то сходство состава питания в разных формах ландшафта следует рассматривать как следствие определенной избирательности в выборе кормов.

Кроме того, обнаруживаются и некоторые биотопические различия в питании вида. Они хорошо заметны при сравнении рационов у зверьков, обитающих в пойменных ельниках и регулярно затапливаемых полыми водами ивняковых зарослях. Известно, что дожде-

Таблица 3.14

Встречаемость разных видов корма в содержимом желудков тундряной бурозубки, % к числу исследованных

Вид корма	Долина средней Лены			Долина нижней Индигирки		
	В целом (n = 70)	Пойма (n = 45)	Надпой- менная терраса (n = 16)	В целом (n = 17)	Пойма (n = 6)	Надпой- менная терраса (n = 8)
Беспозвоночные (ближе не определены)	2,9	2,2	25,0	—	—	—
Малощетинковые черви	67,1	58,9	68,8	23,5	33,3	12,5
Многоножки	2,9	2,2	6,3	—	—	—
Паукообразные	24,3	17,8	31,3	35,3	16,7	62,5
Высшие насекомые	84,3	68,9	81,3	94,1	100	87,5
В том числе:						
полужесткокрылые	5,7	11,0	—	—	—	—
жесткокрылые, всего	55,7	57,7	68,8	47,0	100	12,5
имаго	34,3	35,6	25,0	47,0	100	12,5
личинки	30,0	26,7	37,5	—	—	—
жужелицы, имаго	5,7	8,9	—	29,4	66,7	12,5
жужелицы, личинки	1,4	4,5	—	—	—	—
ручейники	2,9	2,2	—	—	—	—
чешуекрылые, гусеницы	5,7	6,7	12,5	41,2	—	50,0
перепончатокрылые, имаго	—	—	—	5,9	—	12,5
двукрылые, всего	27,1	33,3	31,3	58,8	66,7	50,0
имаго	25,0	26,7	25,0	35,3	16,7	50,0
личинки	4,3	4,5	6,3	29,4	50,0	12,5
Растительные остатки	12,9	—	31,3	—	—	—

вые черви чаще выходят в верхние слои почвы и более многочисленны во влажных травянистых местах, обычно около воды [Белимов и др., 1981]. В нашем районе такие условия складываются в ивняковых зарослях на наносных аллювиальных почвах. Гораздо меньше червей в верхнем слое почвы в смешанных хвойных лесах, произрастающих на сухих гривах и гривах с разреженным наземным покровом. Соответственно различается и частота поедания дождевых червей в данных биотопах [Вольперт, Аверенский, 1983].

По-видимому, эти организмы, относящиеся к предпочитаемым кормам бурозубок, могут полностью удовлетворять пищевую потребность тундряных бурозубок, и их преимущественное поедание отражает трофическую специализацию вида. Вместе с тем при малочисленности и недоступности червей тундряная бурозубка поедает и разнообразных насекомых. В целом, видимо, справедливо замечание Н.Е. Докучаева [1981, 1990] о том, что биотопические различия в питании бурозубок целиком зависят от обилия видов-жертв. Однако из наших материалов следует, что запасы дождевых червей в верхних слоях почвы — это тот лимитированный ресурс, который может влиять на распределение и численность тундряной бурозубки.

Основу питания тундряной бурозубки в нижнем течении Индигирки составляют насекомые, они отмечены в 94 % исследованных желудков. Наиболее предпочитаемые корма — это жесткокрылые (исключительно на имагинальной стадии развития), гусеницы бабочек и двукрылые. Из других групп беспозвоночных наиболее часто встречаются паукообразные и дождевые черви. При сравнении рациона бурозубок, обитающих в мохово-лишайниковом лиственничнике и в пойменном хвощатнике, выявлен ряд различий. Так, в пойме тундряные бурозубки заметно чаще поедают дождевых червей и жуков, а в лиственничнике выше частота встречаемости в их желудках пауков и гусениц, а также отмечены муравьи, не поедавшиеся в пойме. Двукрылые поедаются примерно с одинаковой частотой в пойме и на надпойменной террасе (табл. 3.14), но при этом в лесу чаще отмечены имаго, а в хвощатнике — личинки. Однако из всех перечисленных различий достоверна лишь разница в частоте поедания жуков (по критерию χ^2 Пирсона $p < 0,02$).

На наш взгляд, многие из вышеуказанных различий объясняются особенностями стационального распределения беспозвоночных. Легко объяснимо, что в хвощатнике дождевые черви поедаются почти в 3 раза чаще, чем в сухом лиственничнике. Из чешуекрылых в нашем регионе наиболее широко распространены представители подотряда Microlepidoptera, предпочитающие биотопы с хорошо развитыми кустарниковым и кустарничковым ярусами, а не открытые хвощатники.

При сравнении характера питания тундряных бурозубок из наших сборов с материалами из других точек ареала (табл. 3.15) замечено, что в Западной Сибири для рациона наиболее характерен один вид корма — жесткокрылые, потребляемые в 7–50 раз чаще, чем представители других групп беспозвоночных, роль которых крайне незначительна [Юдин, 1962]. В долине средней Лены практически с той же частотой, что и жуки, поедаются дождевые черви, кроме того, заметную роль начинают играть пауки и двукрылые [Вольперт, Аверенский, 1983]. Частота встречаемости в желудках бурозубок представителей класса насекомых практически одинакова в Западной Сибири и на средней Лене, но черви и паукообразные в Якутии поедались значительно чаще (разница статистически достоверна, $p < 0,01$). Соотношение в рационах различных представителей насекомых в сравниваемых регионах неодинаково, в Якутии бурозубками много чаще поедались двукрылые (район исследований отличается их обилием), ручейники и низшие насекомые, но зато не обнаружены прямокрылые, обычные в питании бурозубок Западной Сибири.

В низовьях Индигирки рацион вида наиболее разнообразен: в группу первостепенных можно отнести пять видов корма: двукры-

Таблица 3.15
Географическая изменчивость рациона тундряной бурозубки (встречаемость кормов, % к числу наполненных желудков)

Вид корма	Западная Сибирь [Юдин, 1962] (n = 105)	Средняя Лена (наши данные; n = 70)	Нижняя Индигирка (наши данные; n = 17)
Дождевые черви	7,6	67,1	23,5
Многоножки	3,8	1,4	—
Паукообразные	2,9	24,3	35,3
Высшие насекомые	81,0	84,3	94,1
В том числе:			
прямокрылые	7,6	—	—
полужесткокрылые	1,0	5,7	—
жесткокрылые	51,4	64,3	47,0
ручейники	—	2,9	—
перепончатокрылые	1,0	2,9	5,9
чешуекрылые	2,9	5,7	41,2
двукрылые	7,6	27,1	58,8

лые, жесткокрылые, чешуекрылые, паукообразные и дождевые черви. Таким образом, для трех рассмотренных точек общим является пищевое предпочтение жесткокрылых, при этом по мере продвижения к северо-востоку ареала рацион становится более разнообразным. По-видимому, ограниченность пищевых ресурсов способствует взаимозаменяемости кормов.

Размножение. В долине средней Лены первые сеголетки отлавливались в июне, что позволяет предположить начало размножения в начале мая; на Колыме первые беременные самки зарегистрированы в апреле [Млекопитающие Якутии, 1971], по-видимому, это наиболее ранние сроки начала воспроизводства. Самцы в состоянии гона и беременные самки встречались до конца августа, т.е. период репродукции укладывается в 4–4,5 мес. В низовьях Индигирки первые сеголетки отлавливались нами в начале июля, исходя из чего можно сделать вывод о более позднем начале репродукции, что, кстати, характерно для большинства обитающих здесь мелких млекопитающих. К сожалению, ограниченность материала не дает оснований для категорических выводов, но надо отметить, что единственная пойманная в августе взрослая самка была рожающей, а самец в этом же месяце — еще в состоянии гона.

На средней Лене все перезимовавшие животные активно участвуют в размножении (табл. 3.16), одна беременная перезимовавшая самка была отловлена в августе 1980 г., т.е. во время второй, а возможно, и третьей беременности. Масса семенников перезимовавших самцов равномерно убывает от июня к августу, когда у отдельных особей уже наблюдается явный регресс [Вольперт, 1986].

Таблица 3.16

Интенсивность участия в размножении тундряных бурозубок
в долине средней Лены, %

Месяц	Перезимовавшие					Сеголетки					
	Самки			Самцы		Самки				Самцы	
	n	рожав- шие	беремен- ные	n	размно- жавшиеся	n	рожав- шие	беремен- ные	яловые	n	размно- жавшиеся
Июнь	1	100	0,0	14	100	1	0,0	0,0	100	5	100
Июль	6	66,6	33,4	45	100	46	23,9	4,3	71,8	45	24,4
Август	4	75,0	25,0	25	100	58	18,9	12,0	69,1	91	7,7
Сентябрь	10	100	0,0	7	100	21	4,8	0,0	95,2	36	8,3

Вопрос об участии в размножении сеголеток сложнее. Первые беременные прибылые самки были отловлены в долине средней Лены в июле. В 1979 г. они составляли 40 % отловленных молодых самок, в 1984 г. — еще меньше, а в 1980 г. — все 100 %. Рожавшие самки-сеголетки начали попадаться в августе, что подтверждает вступление молодых самок в размножение в июле. Процент самок и самцов, участвующих в размножении, значительно колеблется по годам.

При анализе графика подвижности тундряной бурозубки четко выделяются два пика в первой и последней декадах августа [Вольперт, 1986]. Поскольку период беременности у бурозубок составляет 18–20 дней, и примерно такое же количество времени требуется на выкармливание потомства, наличие второй волны можно объяснить массовым участием в размножении прибылых.

Степень участия в размножении молодых была наибольшей в 1980 г., тогда как численность вида была значительно выше в предыдущем сезоне, когда наблюдалась вспышка численности в пойменных местообитаниях [Ревин и др., 1982]. Весенняя численность тундряной бурозубки в 1980 г. составляла 0,1 особи на 100 конусо-сут, а в 1979 г. — 10,3 особи. На обратную связь исходной численности популяции и степени участия в размножении молодых указывают многие авторы [Попов, 1960; Шварц, 1963; Долгов и др., 1968; Докучаев, 1979, 1983, 1990, 1998]. Без всякого сомнения, можно согласиться с выводом Н.Е. Докучаева о том, что включение в размножение различной доли прибылых является важным механизмом регуляции численности популяции, но он указывает, что благодаря описанному явлению осенняя численность вида находится на одном уровне. В нашем случае подобного явления не наблюдается.

В нижнем течении Индигирки среди прибылых особей сексуальная активность была крайне низкой. За четыре года не поймано ни одной размножавшейся самки, а среди самцов участвовавшие в размножении отмечены только в 1989 г., и то лишь небольшое число особей (2,4 %).

Плодовитость тундряной бурозубки в долине средней Лены можно охарактеризовать как высокую, она уступает только северо-восточным популяциям вида (табл. 3.17). Налицо та же закономерность, что и у других видов, — плодовитость повышается в северо-восточном направлении.

Индивидуальная плодовитость молодых самок в долине средней Лены варьирует в довольно широких пределах — от 4 до 14 детенышей в выводке, средняя плодовитость за три года исследований составила $8,9 \pm 0,61$ ($n = 15$). У перезимовавших самок этот показатель несколько выше — $10,7 \pm 0,72$ ($n = 7$), но разница не достигает статистически значимого уровня. Некоторые исследователи отмечают еще большую разницу в плодовитости перезимовавших и прибылых самок [Ивантер, 1975; Юдин и др., 1976; Докучаев, 1979].

Возрастная структура популяции тундряной бурозубки типична для животных с ежегодной сменой состава популяции. В июне перезимовавшие зверьки составляют, в зависимости от сроков размножения, большинство или половину популяции. Начиная с июля, в уловах преобладают прибылые особи, а в августе и сентябре они уже составляют большинство по данным отлова конусами (табл. 3.18).

При анализе половой структуры популяции обращает на себя внимание устойчивое преобладание в уловах перезимовавших самцов в период размножения, что объясняется высокой подвижностью их в это время [Хляп, 1980; Моралева, 1983].

Таким образом, тундряная бурозубка весьма распространена по территории Якутии, при этом ее роль выше в долине Лены, и по мере продвижения в восточном направлении значимость вида снижается, а в северном — в пределах долины Лены повышается, как и на Таймыре [Литвинов, 1995]. Наибольшего обилия этот вид достигает в пойменном комплексе, где находит приемлемые условия для существования, в частности предпочитаемые корма, к которым относятся, в первую очередь, дождевые черви.

Таблица 3.17

Географическая изменчивость величины выводка тундряной бурозубки

Место сбора материала, источник	n	M	m
Нижняя Лена (наши данные)	1	11	—
Север Дальнего Востока СССР [Юдин и др., 1976]	11	10,7	?
Средняя Лена (наши данные)	22	9,4	0,51
Долина Колымы [Кривошеев, 1964]	1	9	—
Якутия в целом [Млекопитающие Якутии, 1971]	22	8,14	0,2
Алтай [Юдин и др., 1979]	?	7,4	?
Западная Сибирь [Юдин, 1971]	?	5–11	?
Южная Якутия [Ревин, 1968]	2	6	?

Таблица 3.18

Половозрастная структура популяций тундрной бурозубки

Месяц	n	Перезимовавшие, %	Прибылые, %	Перезимовавшие		Прибылые	
				n	из них самцов	n	из них самцов
Низовья Индигирки							
Июль	4	25,0	75,0	1	100	3	66,7
Август	49	8,2	91,8	4	75,0	45	57,8
Сентябрь	27	0	100	-	—	27	74,1
В целом	80	6,2	93,8	5	80,0	75	64,0
Долина средней Лены							
Июль	142	35,9	64,1	51	88,2	91	49,4
Август	178	16,3	83,7	29	86,2	149	59,7
Сентябрь	74	23,0	77,0	17	41,2	57	61,4
В целом	394	24,6	75,4	97	79,4	297	56,9

3.6. Средняя бурозубка —

Sorex caecutiens Laxmann, 1788

Морфометрическая характеристика. Промеры тела и черепа средней бурозубки из долин рек Северной Якутии в целом укладываются в пределы, указанные для данного вида Б.С. Юдиным [1989], но все метрические показатели и масса тела достоверно меньше, чем средние для вида, приведенные этим автором.

Эта землеройка средних размеров, с относительно длинным хвостом (65,6 % от длины тела) и относительно крупной головой (кондилобазальная длина черепа составляет около 28,7 % от длины тела).

Череп довольно массивный, роstralная часть его умеренно вытянута и составляет примерно 26–27 % кондилобазальной длины, мозговая часть относительно широкая (49–50 %). В наших сборах пропорции черепа у средней бурозубки сходны с описанными Б.С. Юдиным, а пропорции тела отличаются от среднесибирских популяций вида — хвост значительно короче, его индекс составляет всего 48–55 %, а голова — крупнее (30–31 %).

Ярко выраженного полового диморфизма в размерах тела у средней бурозубки нами не отмечено, но самцы несколько крупнее самок.

Географические различия размеров и пропорций в пределах Северной Якутии у этого вида, наиболее широко распространенного и эвритопного из исследованных землероек, выражены слабее всего, но в низовьях Индигирки относительные размеры выступающих частей тела несколько меньше, чем в других обследованных нами точках (табл. 3.19).

Таблица 3.19

Морфометрические показатели средней бурозубки долин рек Северной Якутии (перезимовавшие и прибылые особи)

Промеры	Долина Лены			Долина Яны			Долина Индигирки			Долина Колымы		
	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit
Масса тела, г	66	4,6 ± 0,07	3,5–6,2	11	4,4 ± 0,21	3,4–6,0	59	4,3 ± 0,09	3,2–8,6	120	4,5 ± 0,07	3,4–9,4
Длина тела, мм	63	56,6 ± 0,36	49,7–64,5	12	56,7 ± 0,76	51,5–61,2	101	56,3 ± 0,29	48,6–71,2	111	54,5 ± 0,19	51,1–70,8
Длина хвоста, мм	63	31,2 ± 0,52	26,0–36,0	12	27,5 ± 0,52	24,3–28,8	101	26,9 ± 0,18	22,2–31,6	111	27,3 ± 0,04	21,4–33,6
Длина плюсны, мм	63	11,0 ± 0,07	10,2–13,7	12	10,7 ± 0,15	10,0–11,5	101	10,6 ± 0,03	9,9–11,9	111	10,7 ± 0,05	7,7–11,9
Промеры черепа, мм:												
общая длина	43	18,3 ± 0,07	17,7–19,7	4	18,0 ± 0,16	17,7–18,4	90	17,6 ± 0,03	16,5–18,4	54	17,8 ± 0,05	17,1–18,9
кондилобазальная длина	43	17,4 ± 0,06	16,8–18,5	4	17,3 ± 0,14	17,1–17,7	94	16,9 ± 0,03	16,0–17,6	60	17,2 ± 0,04	16,5–18,1
межглазничная ширина	64	3,5 ± 0,02	3,1–4,0	12	3,6 ± 0,04	3,5–3,7	103	3,3 ± 0,01	3,0–3,7	113	3,2 ± 0,02	2,7–3,8
длина верхнего зубного ряда	64	7,4 ± 0,03	7,0–8,0	12	7,2 ± 0,05	6,9–7,4	98	7,2 ± 0,02	6,4–7,7	97	7,3 ± 0,03	6,6–7,9
длина промежуточного ряда зубов	65	2,6 ± 0,03	2,1–3,0	12	3,0 ± 0,02	2,9–3,1	103	2,5 ± 0,02	1,9–3,0	98	2,5 ± 0,03	1,7–3,4
высота черепа	31	5,5 ± 0,04	5,0–6,0	4	5,2 ± 0,05	5,1–5,3	—	—	—	53	5,5 ± 0,04	4,7–6,1
длина роstrума	64	4,6 ± 0,02	4,0–4,9	12	4,5 ± 0,03	4,3–4,6	103	4,5 ± 0,01	4,1–4,9	112	4,6 ± 0,02	3,9–5,5
ширина роstrума	65	1,7 ± 0,02	1,4–1,9	12	1,6 ± 0,02	1,6–1,8	103	1,6 ± 0,02	1,4–1,8	111	1,4 ± 0,01	1,3–1,7

Распространение. По типу распространения вид — типичный палеаркт. В Якутии заселяет всю территорию, проникая в тундру вплоть до побережья Северного Ледовитого океана [Млекопитающие Якутии, 1971]. Нами вид обнаружен на всей обследованной территории (рис. 3.12), за исключением дельты Лены, где он не проникал даже в зону субарктических тундр [Вольперт, Сапожников, 1996].

Ландшафтное и биотопическое распределение. Долина Лены. Средняя бурозубка среди разнообразия биотопов явно предпочитает лесные угодья. На широте г. Якутска максимальная численность вида зарегистрирована нами в березняках, приуроченных к III надпойменной террасе. При этом гораздо шире она была распространена в местообитаниях II террасы (рис. 3.13).

В долине средней Лены в районе устья р. Вилюй наибольшего обилия вид достигал в лиственничниках мохово-брусничных (рис. 3.14), где составлял в 1980 г. до 62,5 % населения мелких млекопитающих, в то время как в пойме доля средних бурозубок не превышала 14 %. При анализе возрастного состава населения вида по биотопам обнаруживается, что разные типы лиственничников, особенно мохово-брусничные и мохово-голубичные, являются для средней

Рис. 3.12. Места отлова средней бурозубки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

Рис. 3.13. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Якутск".
Биотопы: низкая пойма: 1 — луг; 2 — кустарник; высокая пойма: 3 — луг, 4 — кустарник; II надпойменная терраса: 5 — луг на берегу озера, 6 — смешанный лес на берегу озера, 7 — березняк, 8 — смешанный лес на склоне, 9 — сосняк, 10 — остепненный склон; III надпойменная терраса: 11 — березняк разнотравный, 12 — березняк брусничный, 13 — сосново-лиственный лес.

Рис. 3.14. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Лепписке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки; 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; равнинно-таежный ландшафт: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; горно-таежный ландшафт: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

бурозубки стадиями размножения и переживания зимнего периода. Встречаемость перезимовавших и принимающих участие в размножении животных тут значительно выше, чем в пойменных биотопах.

При этом в пойменных местообитаниях во всех перечисленных случаях численность этого вида была низкой. Об уровне численности средней бурозубки в разных ландшафтах позволяют судить данные абсолютных учетов, проведенных в 1984 г. параллельно в равнинно-таежном и пойменном ландшафтах в т. "Лепписке". Если плотность населения вида в лиственничнике мохово-брусничном равнялась 217 особям на 1 га, то на участке высокой поймы — 6 особям на 1 га, хотя численность вида в год проведения учетов была для поймы выше средней.

При анализе половозрастного состава популяции вида, полученного в результате полного вылова, отчетливо проявляется та же тенденция предпочтения лесных местообитаний. Население равнинно-таежного ландшафта отличается от пойменного высоким процентом перезимовавших и размножающихся животных, что объективно отражает условия существования вида в рассматриваемых ландшафтах.

В горно-таежном ландшафте численность средней бурозубки была ниже, чем в равнинно-таежном, но процент доминирования вида был значительно выше. Средняя бурозубка отлавливалась нами в основных типах биотопов горно-таежного ландшафта, составляя значительную долю обитающих там мелких млекопитающих.

Сходный характер распределения сохраняется в северотаежной подзоне. В нижнем течении Лены максимального обилия средняя бурозубка достигала в лиственничнике моховом переувлажненном равнинно-таежного ландшафта. Относительно высокой численностью характеризовались также биотопы высокой поймы, примыкающей к надпойменным террасам (рис. 3.15).

В бассейне Яны средняя бурозубка, как и в долине Лены, предпочитает чисто таежные местообитания. В период наших исследований наибольшей численности этот вид достигал в лиственничниках аласно-таежного ландшафта.

Долина Индигирки. Средняя бурозубка — самый многочисленный вид землероек. В низовьях реки четырехлетние исследования охватили периоды депрессии и подъема численности вида. В целом по результатам 4-летних наблюдений наиболее высокие показатели численности отмечены в притеррасной пойме (в основном за счет хвощатников), а из таежных биотопов — в лиственничниках мохово-голубичном (левый берег) и мохово-лишайниковом (правый берег), наиболее сухих для каждого из таежных ландшафтов (рис. 3.16). Демографическая структура поселений в разных местообитаниях подтверждает это предпочтение: только в трех указанных биотопах

Рис. 3.15. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Бесюке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — ивняки; 2 — луг; высокая пойма: 3 — кустарник; равнинно-таежный ландшафт: 4 — лиственничник лишайниковый, 5 — лиственничник моховый.

Рис. 3.16. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Шаманово".

Биотопы: озерно-таежный ландшафт: 1 — лиственничник мохово-голубичный, 2 — лиственничник бруснично-моховый; пойма левого берега: 3 — регулярно затопляемые ивняки; острова: 4 — хвощатники, 5 — лиственничник мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; пойма правого берега: 7 — хвощатники, 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; горно-таежный ландшафт: 10 — осыпь, 11 — лиственничник мохово-лишайниковый, 12 — лиственничник голубично-моховый, 13 — лиственничник моховый переувлажненный.

отловлены перезимовавшие самки, а также относительно активно размножались сеголетки.

В ходе работ в среднем течении Индигирки в районе Момского хребта в 1990 г. зарегистрирована редкая для северо-востока Азии ситуация — средняя бурозубка здесь не только достигала высоких показателей численности (до 100 экз. на 100 конусо-сут), но и абсолютно доминировала во всех биотопах горно-таежного ландшафта, а также была многочисленна в островном лиственничнике, хотя в последнем доминировала красная полевка. В целом численность средней бурозубки в верхнем течении составила 59,5 экз./100 конусо-сут, при этом она заселяла все обследованные биотопы, а наибольшие показатели обилия отмечены в относительно сухих лиственничниках на склонах гор (рис. 3.17). Летом того же года в равнинной части среднего течения реки численность вида была в 12 раз ниже, отловлен он только в двух биотопах — моховом лиственничнике озерно-таежного ландшафта и островном ольховнике, причем в лесу показатели были относительно выше.

Таким образом, для популяций средней бурозубки в долине Индигирки характерны резкие колебания численности, в периоды депрессии попадаемость может снижаться до 0,6–0,9 экз./100 конусо-сут. Тем не менее вид является самым многочисленным и распространенным из насекомоядных в указанной долине и способен к резкому повышению численности при наступлении благоприятных условий, чего не отмечено для других обитающих здесь бурозубок.

Рис. 3.17. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Мома".

Биотопы: **правый берег**: 1 — лиственничник бруснично-моховый, 2 — лиственничник лишайниковый; **левый берег**: 3 — кедровый стланик, 4 — разнотравный луг, 5 — лиственничник мохово-лишайниковый; **острова**: 6 — лиственничник моховый.

Основной чертой, способствующей этому преимуществу, является экологическая пластичность, благодаря которой средняя бурозубка в разные сезоны меняет места локализации: в засушливые годы это увлажненные биотопы, в дождливые — более возвышенные и сухие.

При повышении численности средняя бурозубка осваивает все возможные местообитания, широко заселяя как таежные, так и пойменные биотопы, среди первых предпочитая сухие типы лиственничников, а в пойме — хвощатники притеррасной поймы, значение которых для нее, по-видимому, объясняется обилием корма — прежде всего, дождевых червей. Стациями переживания неблагоприятных периодов и размножения для средней бурозубки служат среднеувлажненные таежные биотопы, именно в них отлавливались перезимовавшие животные, кроме того, в периоды высокой численности и относительно активного размножения сеголетки способны размножаться даже в пойменных стациях, особенно в хвощатниках.

Долина Колымы. Исследования в 1981–1983 гг. совпали с глубокой депрессией численности вида. В результате численность средней бурозубки в этой долине характеризуется очень невысокими показателями (рис. 3.18). Более высокие показатели обилия вида здесь фиксировались В.Г. Кривошеевым [1964] и нами в т. "Поповка" в 1991–1992 гг. Как и в других рассмотренных долинах, этот вид бурозубок устойчиво предпочитает таежные местообитания, достигая максимальных показателей численности в лиственничниках различного типа и смешанных лесах с участием лиственных пород.

Рис. 3.18. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Жирково".

Биотопы: **низкая пойма**: 1 — ивняки, 2 — веяниковые луга; **высокая пойма**: 3 — лиственничник, 4 — ивняки; **озерно-таежный ландшафт**: 5 — лиственничники на грибах, 6 — лиственничники мохово-брусничные, 7 — ивняки; **горно-таежный ландшафт**: 8 — лиственничники лишайниковые, 9 — лиственничники мохово-голубичные.

В верхнем течении реки в т. "Мангазейка" средняя бурозубка наибольшего обилия достигала в березняках, занимающих в данном регионе очень незначительные площади, и в лиственничниках. В пойме этот вид регистрировался только в незатапливаемых ивниках.

В т. "Поповка" на момент исследований средняя бурозубка являлась массовым видом. При этом максимальной численности достигала, являясь доминантом сообщества, в лиственничнике мохово-брусничном, в котором она доминировала среди мелких млекопитающих. Также достаточно высокие показатели вида отмечены в других типах леса, а в пределах высокой поймы — в ивняковых зарослях (рис. 3.19). Обитание средней бурозубки в пойме, по нашим наблюдениям, отмечается только в периоды повышения численности, когда отдельные особи вида проникают на притеррасную пойму, но не достигают тут высоких уровней обилия. Население средней бурозубки в таких местообитаниях представлено исключительно молодыми неполовозрелыми особями.

На явное предпочтение средней бурозубкой лиственничников указывают: для Южной Якутии Ю.В. Ревин [1968], для Центральной Якутии М.В. Попов [1975], для бассейна Омолона Ф.Б. Чернявский с соавт. [1978]. В то же время В.Г. Кривошеев [1964] отмечает для долины Колымы, что средняя бурозубка чаще всего отлавливалась на осоково-травянистых участках по берегам озер и проток, чего в годы наших исследований не наблюдалось. Скорее всего, причина это-

Рис. 3.19. Пространственное распределение средней бурозубки в т. "Поповка".

Биотопы: низкая пойма: 1 — хвощатник, 2 — ивняки; высокая пойма: 3 — ивняки, 4 — тополевики; равнинно-таежный ландшафт: 5 — смешанные леса, 6 — лиственничник моховый переувлажненный; горно-таежный ландшафт: 7 — лиственничник редкостойный, 8 — лиственничник мохово-брусничный, 9 — осыпь.

го — разные уровни численности в годы исследований: в период проведения работ В.Г. Кривошеевым она была значительно выше. Предпочтение средней бурозубкой лесных формаций наблюдается по всему северу Дальнего Востока, на что указывают Б.С. Юдин с соавт. [1976]; на Алтае этот вид заселяет всю лесотаежную зону [Юдин и др., 1979], то же самое отмечается для окрестностей оз. Байкал [Швецов, 1977]. В Барабе вид также встречается в лесных насаждениях, избегая открытых биотопов [Готов и др., 1978].

Несмотря на явное предпочтение таежных формаций, необходимо отметить высокую степень эвритопности вида, который в годы высокой численности регулярно отмечается в различных типах кустарниковых зарослей, но и в этот период средняя бурозубка избегает открытых задернованных пространств. Нами не отловлено ни одного экземпляра на заливных лугах в долине Лены, и вид был крайне малочисленным на вейниковых лугах в бассейне Колымы.

При анализе встречаемости средней бурозубки в разных ландшафтах выявляется явное предпочтение видом таежных ландшафтов, где он устойчиво занимает доминирующее или содоминирующее положение, уступая только в годы глубокой депрессии численности, как это отмечено в 1981–1982 гг. в долине средней Колымы. Во всех исследуемых нами ситуациях средняя бурозубка была немногочисленна в пойме, особенно в низкой, где население представлено, как правило, молодыми неполовозрелыми животными, что позволяет предположительно отнести их к мигрантам.

Питание. Материалы по питанию собирались в долинах Лены и Индигирки. При анализе встречаемости в рационе вида различных групп беспозвоночных животных в долине Лены (табл. 3.20) обращает на себя внимание частое поедание насекомых и паукообразных и редкое — червей.

Среди насекомых явно преобладают представители жесткокрылых и двукрылых, причем особи в личиночной стадии развития поедаются чаще, чем в имагинальной, т.е. выявляется предпочтение жертв с мягкими покровами. Если учесть высокую скорость переваривания личинок по сравнению с имаго, то становится ясным, что значение их в питании средних бурозубок выше, чем это следует из приведенных в табл. 3.20 данных.

Из-за недостатка материала мы не имеем возможности проследить изменения характера питания у бурозубок, обитающих в разных ландшафтах в долине Лены. Почти все исследованные бурозубки отловлены на надпойменной террасе. Предварительный анализ встречаемости разных групп кормов в рационе вида в зависимости от типа местообитаний в пределах ландшафта не дал статистически достоверных различий, хотя в других точках ареала такие различия отмечаются [Ивантер и др., 1973; Докучаев, 1981; Ивантер, Макаров, 2001].

Таблица 3.20

Встречаемость разных видов корма в содержимом желудков средней бурозубки,
% к числу исследованных

Вид корма	Долина средней Лены (n = 56)	Долина средней Индикирки (n = 62)	Долина нижней Индикирки (n = 81)
Малоштитковые черви	10,7	8,1	17,3
Многоножки	3,6	1,6	1,2
Паукообразные	37,5	40,3	51,8
Низшие насекомые	1,8	1,6	1,2
Высшие насекомые	100	80,6	92,6
В том числе:	—	—	1,2
равнокрылые	—	—	—
полужесткокрылые	1,8	—	—
жесткокрылые, всего	55,4	17,7	54,3
имаго	17,9	11,3	45,7
личинки	41,0	8,1	13,6
жуелицы, имаго	1,8	—	16,0
жуелицы, личинки	—	1,6	1,2
ручейники	5,4	—	—
чешуекрылые, гусеницы	25,0	53,2	33,3
перепончатокрылые, имаго	7,1	1,6	6,2
двукрылые, всего	41,1	22,6	54,3
имаго	17,8	19,4	38,8
личинки	21,4	4,8	25,9
Растительные остатки	7,1	6,4	1,2

В долине Индикирки исследовано 62 наполненных желудка средних бурозубок из района Момского хребта и 81 — из редколесной подзоны низовьев Индикирки. В целом питание вида в обоих пунктах имеет много общего: к основным пищевым объектам можно отнести паукообразных и два отряда насекомых — чешуекрылых и двукрылых, а в низовьях, кроме того, — жесткокрылых, по трем из четырех указанных групп существуют достоверные различия в частоте поедания (табл. 3.21), что можно объяснить как разницей в географическом положении, так и особенностями рельефа этих пунктов.

В районе Момского хребта слабая разработанность поймы явилась причиной более редкого поедания дождевых червей. На встречаемости в желудках двукрылых сказываются не только особенности рельефа, но и различия в географическом положении мест сбора материала: общеизвестно, что тундровая и лесотундровая зоны Северо-Восточной Якутии отличаются обилием гноса, и естественно, что в низовьях Индикирки очень высок процент встречаемости остатков комаров.

Биотопические различия рациона в верховьях реки не обнаружены прежде всего из-за однообразия местообитаний, в основном это лиственничники разной степени увлажненности, а горные луга и заросли кедрового стланика занимают небольшие площади и по составу кормов от них не отличаются. Несколько иные условия здесь име-

Таблица 3.21

Географическая изменчивость рациона средней бурозубки (встречаемость видов корма в желудках, %)

Вид корма	Карелия [Ивантер, 1975] (n=56)	Западная Сибирь [Юдин, 1962] (n=453)	Южная Якутия [Ревин, 1989] (n=298)	Долина средней Лены (n=56)	Долина средней Индикирки (n=62)	Долина нижней Индикирки (n=81)	Бассейн р. Омогон [Докучаев, 1990] (n=365)
Дождевые черви	10,7	4,4	2,3	10,7	8,1	17,3	5,8
Многоножки	7,1	4,6	8,4	3,6	1,6	1,2	42,2
Паукообразные	8,9	1,7	52,0	37,5	40,3	51,8	2,5
Высшие насекомые	85,7	77,7	88,3	100	80,6	92,6	90,7
В том числе:	—	—	1,7	1,8	—	—	1,4
полужесткокрылые	—	—	27,9	55,4	17,7	54,3	36,7
жесткокрылые, всего	71,4	?	10,4	17,9	11,3	45,7	16,7
имаго	10,7	?	19,1	41,0	8,1	13,6	24,4
личинки	—	1,3	0,3	5,4	—	—	0,8
ручейники	5,3	2,6	14,4	7,1	1,6	6,2	11,0
перепончатокрылые	5,3	1,1	53,7	25,0	53,2	33,3	11,8
чешуекрылые, гусеницы	8,9	5,7	26,5	41,1	22,6	54,3	32,6
двукрылые, всего	?	?	18,5	17,8	19,4	38,3	27,7
имаго	?	?	9,4	21,4	4,8	25,9	6,3
личинки	7,1	—	—	—	—	—	2,2
Остатки млекопитающих	3,6	—	10,7	5,4	6,4	1,2	37,8
Остатки растений	—	—	—	—	—	—	—

ются только в одном биотопе — это заболоченный луг на месте старого поселения Зашиверска, покинутого людьми более 300 лет назад. На месте большой по площади старой вырубке среди лишайникового листовничника не произошло лесовозобновления, а благодаря протайкам на месте разрушившихся строений образовались многочисленные мочажины, поросшие по краям разнотравной растительностью. Здесь несколько выше, чем в других биотопах, частота встречаемости жуков, дождевых червей, двукрылых, а бабочки поедаются реже. К сожалению, выборки по биотопам невелики, статистические различия достоверны только для двукрылых (по критерию Пирсона $p < 0,02$, в том числе для имаго комаров $p < 0,01$) и жесткокрылых ($p < 0,1$).

В низовьях реки основной материал собран в трех типах биотопов: хвощатниках, листовничниках мохово-лишайниковом и моховом переувлажненном, различия в потреблении разных групп беспозвоночных между ними весьма существенны (табл. 3.22). Хвощатники далеко отстоят от обоих типов леса, здесь в желудках бурозубок реже встречаются паукообразные, гусеницы бабочек и личинки жесткокрылых, не отмечены муравьи, зато гораздо выше уровень потребления дождевых червей (входящих в группу первостепенных кормов только в этом биотопе) и жесткокрылых на имагинальной стадии развития. Двукрылые охотно поедаются бурозубками повсеместно.

В таежных биотопах увлажненность заметно влияет на численность разных групп беспозвоночных и, как следствие, на рацион землероек: в переувлажненных листовничниках бурозубки чаще поедали дождевых червей, имаго жуков и гусениц, а в сухих мохово-лишайниковых — пауков и личинок жуков.

Таким образом, в питании средней бурозубки в долине Индигирки большую роль играют насекомые (главным образом, три отряда — чешуекрылые, двукрылые и жесткокрылые) и паукообразные. Встречаемость представителей этих групп в желудках и их соотношение варьируют в зависимости от местообитания: в лесных стациях чаще поедаются пауки, гусеницы бабочек, муравьи, в пойме — имаго жесткокрылых и дождевые черви. Двукрылые чаще поедаются на имагинальной стадии развития, поэтому их потребление не имеет биотопической приуроченности.

Поскольку характер питания средней бурозубки в пределах ареала изучался довольно широко, мы имеем возможность проанализировать географическую изменчивость рациона. Как видно из сравнения материалов разных авторов (табл. 3.21), рацион вида в разных пунктах имеет свои особенности. Тем не менее можно отметить группы пищевых объектов, крайне неохотно поедаемых средней бу-

Таблица 3.22

Биотопическая изменчивость питания средней бурозубки в низовьях Индигирки, % к числу исследованных желудков

Вид корма	Листовничник мохово-лишайниковый (n = 35)	Листовничник моховый переувлажненный (n = 15)	Хвощовый луг в пойме (n = 24)
Дождевые черви	5,7	13,3	33,3
Энхитреиды	2,9	—	8,3
Многоножки	—	6,7	—
Паукообразные	71,4	46,7	33,3
Низшие насекомые	—	6,7	—
Высшие насекомые	88,6	100	100
В том числе:			
жесткокрылые, всего	31,4	46,7	91,7
имаго	17,1	33,3	91,7
личинки	20,0	13,3	8,3
жувелицы, имаго	5,7	13,3	33,3
жувелицы, личинки	2,9	—	—
чешуекрылые, гусеницы	34,3	53,3	20,8
перепончатокрылые	8,6	13,3	—
двукрылые, всего	51,4	53,3	66,7
имаго	34,3	33,3	50,0
личинки	28,6	20,0	29,2
Комары, имаго	22,9	13,3	12,5
Комары, личинки	8,6	13,3	12,5

розубкой во всех выборках, — это низшие насекомые, полужесткокрылые, равнокрылые и ручейники.

Расположив места сбора по порядку с запада ареала на восток и северо-восток, можно заметить, что крайние западные и южные точки (Карелия и Западная Сибирь), отличающиеся большим видовым разнообразием и обилием беспозвоночных, характеризуются, несмотря на это, мономорфной диетой. Хотя в рацион входят разные группы кормов, единственный первостепенный вид корма здесь — жесткокрылые, причем ярко выражено предпочтение особей на имагинальной стадии развития. Значение всех остальных видов корма не выходит за пределы второстепенных, их встречаемость более чем в 6 раз ниже основного корма.

Во всех пунктах, где проводились подобные исследования, отмечен высокий уровень поедаемости насекомых, но в долине средней Лены роль этого корма достигает максимального значения (100 % встречаемости). При продвижении на северо-восток группа первостепенных видов корма расширяется до 4–5 таксонов за счет включения паукообразных и чешуекрылых (якутские популяции) или многоножек и семян (север Дальнего Востока). Кроме того, во всех пунктах северо-восточной части ареала в группу часто поедаемых кормов входят представители отряда двукрылых, в основном имаго комаров.

Интересны материалы по роли в питании вида паукообразных, последний таксон составляет значительную долю в рационе практически во всех точках, кроме Западной Сибири.

При этом значение жуков в питании вида повсеместно остается весьма существенным: в двух из пяти выборок они на первом месте по частоте поедания, в двух — на третьем, и лишь в одной — на четвертом. Имеются достоверные различия в частоте поедания жесткокрылых в целом, но, по нашему мнению, они не носят принципиального характера. Гораздо существеннее различия в частоте поедания личиночных и имагинальных форм. В северо-восточной части ареала бурозубки вдвое-втрое чаще поедали личинок по сравнению со взрослыми формами, тогда как в Карелии наблюдалось обратное соотношение.

Как упоминалось, рацион средней бурозубки в двух точках долины Индигирки существенно различается по порядку значимости кормов. Оказалось, что особи, отловленные в районе Момского хребта, по пищевым предпочтениям близки к землеройкам из другого горного региона — верховьев Алдана, а данные по редколесью низовьев Индигирки при общем сходстве с тремя другими якутскими популяциями по порядку доминирования основных кормов ближе всего к среднененской популяции (табл. 3.22). В целом по типу питания индигирские средние бурозубки близки к другим якутским популяциям вида, от которых отличаются самым высоким потреблением двукрылых, прежде всего комаров.

В июне — июле средние бурозубки долин средней Лены и Индигирки растительные корма поедают в малом объеме. Возможно, в другое время года их роль в питании вида более значительна, как это неоднократно отмечалось в литературе [Заболоцкая, 1955, 1957; Охотина, 1974; Лукьянова, 1974; Докучаев, 1981; Griddle, 1973]. Скорее всего, растительные корма (из них наиболее часто поедаются семена — концентраты питательных веществ) являются важной добавкой к рациону, но вряд ли они могут полностью удовлетворить пищевую потребность бурозубок.

Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют о том, что средняя бурозубка при поиске корма отдает предпочтение разным представителям жесткокрылых, а в более жестких кормовых условиях дополняет их доступными кормами, включая как животные, так и растительные объекты, что свидетельствует о высокой экологической пластичности вида.

Размножение. У отловленных в долине средней Лены в начале апреля животных развитие гениталиев только начиналось, а первые прибылые зверьки отлавливались в июне. Таким образом, наиболее вероятные сроки начала размножения для этого вида — конец апреля — начало мая. Беременные самки в отловах встречались до конца

августа, а самцы в состоянии гона — до середины сентября, но основная масса заканчивает размножение в августе. В целом период воспроизводства продолжается 4–4,5 мес. Практически те же сроки указываются и для других районов Якутии [Млекопитающие Якутии, 1971] и сопредельных районов [Докучаев, 1979; Юдин и др., 1976].

В низовьях Индигирки первые прибылые зверьки отловлены нами в начале июля, это можно объяснить или крайне низкой весенней численностью вида, или более поздними по сравнению с другими частями ареала сроками их рождения. Судя по срокам начала размножения у других видов мелких млекопитающих и продолжительности этого периода [Шадрина, Вольперт, 1995а], мы склонны считать более верным второе предположение.

За период размножения перезимовавшая самка успевает дать, как правило, два помета, причем наличие третьего весьма вероятно, косвенным доказательством реального существования последнего служит отлов беременных перезимовавших самок в августе. Кроме того, широко известен факт, что массовый выход молодых сопровождается их повышенной подвижностью, и как следствие, увеличением попадаемости в конуса [Дунаева, 1955; Ивантер и др., 1974; Куприянова, 1984].

В нашем случае наблюдается три четко выраженных пика подвижности [Вольперт, 1986], что позволяет предположить три массовых выплода. Как в 1979, так и в 1980 г. массовое расселение молодых приходилось на последнюю декаду июня, июль и август. На северо-востоке Азии самки могут давать до 4 поместов в год [Докучаев, 1998].

Все перезимовавшие особи, как самцы, так и самки, принимают участие в размножении вплоть до сентября (табл. 3.23), хотя с августа у некоторых самцов уже наблюдается регресс семенников. Гораздо сложнее вопрос об участии в размножении в год своего рождения молодых самок. Практически во всех работах, затрагивающих размножение бурозубок в Якутии, до недавнего времени утверждалось, что прибылые в год своего рождения участия в размножении не принимают [Кривошеев, 1964; Ревин, 1968; Млекопитающие Якутии, 1971]. В то же время в других регионах, в частности на северо-востоке России, это обычное явление [Дунаева, 1955; Попов, 1960; Юдин, 1962; Долгов и др., 1968; Докучаев, 1979; Русек, 1960; и др.]. Нами зарегистрированы случаи размножения прибылых самок во всех районах исследований, причем процент участия молодых менялся по годам [Вольперт, 1986].

Изменение степени участия в размножении прибылых самок по годам отмечено многими авторами [Дунаева, 1955; Докучаев, 1979, 1983; Русек, 1960]. Все они отмечают отрицательную зависимость

Таблица 3.23

Степень участия в размножении средних бурозубок, %

Месяц	Перезимовавшие					Сеголетки					
	Самки			Самцы		Самки				Самцы	
	n	рожав- шие	беремен- ные	n	размно- жавшиеся	n	рожав- шие	беремен- ные	яловые	n	размно- жавшиеся
Долина Индигирки											
Июль	1	100	100	1	100	12	8,3	16,6	75,1	16	6,3
Август	4	1000	25,0	5	100	76	13,2	1,0	85,8	107	1,0
Сентябрь	—	—	—	—	—	39	0,0	0,0	100	51	3,9
Долина средней Лены											
Июнь	3	33,3	66,7	4	100	7	0	28,6	71,4	15	26,6
Июль	3	66,7	33,3	22	100	41	17,0	9,8	75,7	62	0,0
Август	2	50,0	50,0	13	92,3	34	0,0	14,7	85,3	87	2,3
Сентябрь	4	0	100	3	100	98	3,0	1,0	96,0	107	0,0

степени участия в размножении самок-сеголеток от исходной (весенней) численности популяций. Та же закономерность наблюдается и в наших материалах, но, на наш взгляд, интенсивность размножения прибылых зависит не только от вышеуказанного фактора, но и от фазы популяционного цикла [Вольперт, 1986].

Вопрос об участии в размножении молодых самцов в год своего рождения до сих пор остается неясным. Некоторые исследователи признают возможность достижения половозрелости самцами-сеголетками [Долгов и др., 1968; Лямкин и др., 1985], другие придерживаются противоположного мнения [Ивантер, 1975; Юдин и др., 1976; Докучаев, 1979]. Мы неоднократно отмечали самцов-сеголеток с хорошо развитыми придатками, полностью сформированным пенисом и с объемом и массой семенника, не уступающими таковым перезимовавших особей, а в отдельных случаях даже превосходящими их, причем процент участия, как и у самок, колебался по годам [Вольперт, 1986].

Таким образом, можно считать установленным, что в условиях Якутии прибылые самцы, так же как и самки, принимают участие в размножении, причем степень участия в размножении изменяется синхронно у зверьков обоих полов.

Плодовитость средних бурозубок в долине средней Лены довольно высокая (табл. 3.24). Она выше, чем по Якутии в целом, в Западной Сибири, на Алтае, в окрестностях оз. Байкал, в Карелии, в бассейне Омолона. В целом весьма четко наблюдается повышение плодовитости в северо-восточном направлении. В долине Индигирки данные по плодовитости вида носят фрагментарный характер: за 4 года поймано всего 2 самки с хорошо различимыми эмбрионами, у

Таблица 3.24

Географическая изменчивость величины выводка средней бурозубки

Место сбора материала, источник	n	M	m
Север Дальнего Востока СССР [Юдин и др., 1976]	8	9,5	?
Бассейн Омолона [Докучаев, 1990], перезимовавшие	54	8,6	0,3
Долина средней Лены (наши данные)	13	8,5	0,4
Восточное Прибайкалье [Матурова, 1982]	22	7,6	?
Бассейн р. Челомджа [Докучаев, 1990], прибылые	52	7,6	0,16
перезимовавшие	44	7,5	0,28
Карелия [Ивантер, 1975]	10	7,5	?
Западная Сибирь [Юдин, 1971]	25	7,0	?
Долина средней Колымы [Кривошеев, 1964; наши данные]	3	7,0	—
Якутия в целом [Млекопитающие Якутии, 1971]	10	6,6	0,69
Южная Якутия [Ревин, 1989]	22	5,68	1,46
Алтай [Юдин и др., 1979]	20	5,4	?
Урал [Большаков и др., 1996]	10	5,0	0,21

перезимовавшей их было 8, у прибылой — 2 (один из которых был частично резорбирован).

Возрастная структура популяции средней бурозубки в долине средней Лены является типичной для животных этого типа (табл. 3.25). В июне, после выхода первых молодых, они в наиболее типичные годы сразу начинают преобладать в уловах (1979–1980 гг.) и к сентябрю составляют абсолютное большинство популяции. Таким образом, популяция бурозубок полностью обновляется в течение года. Незначительные различия возрастного состава по годам в июне скорее всего объясняются климатическими особенностями [Докучаев, 1979]. Темпы изменения соотношения возрастных групп в течение сезона размножения во все годы исследования были примерно одинаковыми, увеличение доли перезимовавших зверьков в июле можно объяснить повышенной подвижностью самцов, связанной с массовым вступлением в размножение прибылых самок.

Таблица 3.25

Половозрастная структура популяции средней бурозубки

Месяц	Всего добыто	Перезимовавшие			Сеголетки		
		n	Самцы	Самки	n	Самцы	Самки
Долина средней Лены							
Июнь	29	7	71,4	28,6	22	68,2	31,8
Июль	131	25	96,0	4,0	106	70,8	29,2
Август	136	15	93,3	6,7	121	69,5	30,5
Сентябрь	223	7	71,4	28,6	216	56,0	44,0
Долина нижней Индигирки							
Июль	15	2	100	0,0	13	61,5	38,5
Август	210	9	55,5	44,5	183	58,5	41,5
Сентябрь	90	—	—	—	90	56,7	43,3

Половозрастная структура популяции средней бурозубки в низовьях Индигирки характеризуется очень быстрой сменой поколений (табл. 3.25). Как упоминалось выше, отсутствие в июньских уловах бурозубок можно рассматривать как следствие двух факторов: крайне низкой весенней численности перезимовавших особей и полного отсутствия прибылых из-за позднего вступления в размножение, а в сентябре за 4 года не отловлено ни одного перезимовавшего зверька, следовательно, за три летних месяца (июнь — август) доля этой возрастной группы падает от 0 до 100 %.

В южных частях ареала эта смена происходит более плавно: зачастую уже в июне в популяции присутствуют сеголетки, а перезимовавшие особи отлавливаются по сентябрь включительно. Обращает на себя внимание также очень низкий процент перезимовавших животных в нижеиндигирской популяции — их почти в 3 раза меньше, чем в Карелии и Предверхоянье, в 4 раза — по сравнению с бассейном Олекмы и в 6 раз — с Омолоном. Возможно, такой сверхбыстрый отход перезимовавших особей объясняется напряженностью репродуктивных процессов на северных пределах ареала.

В течение репродуктивного периода среди перезимовавших, как правило, преобладают самцы (табл. 3.25), только в 1984 г. в сентябре перезимовавших самок было отловлено больше, чем самцов.

Такое же явление отмечалось в бассейне Омолон Н.Е. Докучаевым [1979], который объясняет изменение соотношения полов повышенной смертностью самцов. Соглашаясь с этим, необходимо также учитывать возросшую подвижность самок по окончании периода размножения. В принципе, соотношение полов у бурозубок варьирует по годам [Снигиревская, 1967].

Среди молодых животных, как правило, в отловах также преобладают самцы в годы активного участия молодых в размножении, а в период низкой сексуальной активности прибылых соотношение полов близко к типичному для млекопитающих (1:1), с небольшим преобладанием самцов.

Таким образом, средняя бурозубка чрезвычайно широко распространена в таежной части северо-востока Сибири. Она периодически достигает высокой численности в таежных ландшафтах, доминируя среди мелких млекопитающих. Основу ее рациона составляют насекомые, в первую очередь жесткокрылые, но в случае недостатка последних она способна значительно расширить свой рацион за счет других отрядов насекомых и паукообразных. Доминирующего положения в сообществе этот вид достигает благодаря высокой экологической пластичности, в частности способности размножаться с высокой эффективностью в благоприятные годы.

3.7. Восточноазиатская мышь — *Apodemus peninsulae* Thomas, 1907

Морфометрическая характеристика. Имеет средние для представителей семейства Muridae размеры. Характеризуется относительно крупными размерами выступающих частей тела: длина плюсны составляет около 23,5 % длины тела, высота ушной раковины примерно 16 %, а длина хвоста почти равна длине тела (табл. 3.26). Череп характеризуется удлинённой носовой частью, слабыми скуловыми дугами и относительно крупной мозговой коробкой [Попов, 1977]. Половой диморфизм в размерах тела и черепа не выражен.

Распространение. Восточноазиатская лесная мышь по характеру распространения может быть отнесена к восточным палеарктам. На территории Якутии этот вид отмечается от верхней Лены до полярного круга, последняя точка [Тугаринов и др., 1934] является, по-видимому, северной границей ареала (рис. 3.20), в районе устья р. Бесюке нами этот вид не обнаружен.

Имеются данные, что один экземпляр добыт в долине Яны в сентябре 1934 г. (коллекция ЗИН РАН). До настоящего времени эта находка не подтвердилась [Кривошеев, Попов, 1964; Лабутинов, 1975; Попов, 1977; Ревин, Вольперт, 1985]. Возможно, произошла путаница в географических названиях при хранении материала.

Восточноазиатская мышь по долине р. Лепписке встречается до самых верховьев [Ревин и др., 1988], но, по-видимому, в бассейн Яны не проникает. Скорее всего, необходимо согласиться с мнением других исследователей, что этот вид не заселяет территорию Якутии

Таблица 3.26
Морфометрические показатели восточноазиатской мыши Центральной Якутии
[Млекопитающие Якутии, 1971]

Промеры	n	M	m	σ	limit
Масса тела, г	10	26,1	0,79	2,39	22,5–29,5
Длина тела, мм	11	90,9	1,77	5,61	81,6–101,0
Длина хвоста, мм	10	88,7	1,82	5,46	77,2–97,3
Длина плюсны, мм	11	21,4	0,16	0,52	20,5–22,0
Высота ушной раковины, мм	11	15,0	0,29	0,91	13,1–16,0
Промеры черепа, мм:					
основная длина	7	20,4	0,25	0,61	19,8–21,2
кондилобазальная длина	7	23,9	0,24	0,60	23,1–24,6
скуловая ширина	9	13,0	0,15	0,42	12,4–13,6
межглазничная ширина	11	4,7	0,04	0,12	4,5–4,9
длина верхнего зубного ряда	11	4,2	0,04	0,12	4,0–4,4
верхняя диастема	11	7,4	0,05	0,17	7,1–7,6
высота в области слуховых барабанов	5	9,4	0,20	0,41	8,8–9,8

Рис. 3.20. Места отлова восточноазиатской мыши в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

восточнее осевого Верхоянского хребта [Млекопитающие Якутии, 1971; Кривошеев, 1973].

Ландшафтное и биотопическое распределение. В окрестностях г. Якутска этот вид нами не отловлен, хотя известны его находки в долине р. Кенкеме, 50 км западнее г. Якутска и он есть в сборах И.И. Мордосова [1997] в Центральной Якутии.

В долине средней Лены в устье р. Лепписке вид фиксировался постоянно, хотя и был в течение всего периода исследований малочисленным [Ревин и др., 1988]. Из-за последнего обстоятельства сведения по его распространению носят фрагментарный характер. В пойменном комплексе этот вид отмечен не был, хотя в бассейне Вилюя он отлавливался в основном в пойме [Карасева и др., 1960]. В равнинно-таежном ландшафте встречался в отловах, хотя и редко, но постоянно (рис. 3.21). Наибольшая численность вида зарегистрирована в березняках, приуроченных к прирусловому валу. Этот вид отлавливался также по опушкам приуроченных к прирусловому валу лиственничников мохово-брусничных. В частности, восточноазиатская мышь регулярно отмечалась нами на площадке мечения [Попов и др., 1978], расположенной в указанном биотопе, не дальше 30–40 м

Рис. 3.21. Пространственное распределение восточноазиатской мыши в т. "Лепписке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; равнинно-таежный ландшафт: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; горно-таежный ландшафт: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

от берега в полосе, представляющей собой опушку перестойного лиственничного леса. Опушка характеризовалась густыми кустарниками и хорошо развитым травянистым покровом, который исчезал в глубине лиственничника, за счет прируслового поднятия почва здесь хорошо дренирована. На предпочтение этой мышью местообитаний со среднеувлажненными почвами указывает ряд авторов [Снигиревская, 1964; Реймерс, 1966; Млекопитающие Якутии, 1971; Попов, 1975]. В Южной Якутии [Ревин, 1968, 1989] вид охотнее селится в березняках и тальниках. Нами наибольшее количество восточно-азиатских мышей отловлено в жилых постройках как летом, так и зимой. Высокая склонность этого вида к синантропизму указывается для Центральной Якутии [Ларионов, 1954], Западной Якутии [Мордосов, 1980, 1997], Средней Сибири [Реймерс, Воронов, 1963; Реймерс, 1966].

На средней Лене в горно-таежном ландшафте восточноазиатская мышь была еще более малочисленна, чем в равнинно-таежном, причем она здесь придерживалась берегов рек и ручьев, не удаляясь от последних в горы. Схожую картину наблюдал в Южной Якутии Ю.В. Ревин [1968, 1975, 1989]. В Прибайкалье этот зверек доходит до гольцового пояса, но селится преимущественно в разреженных лесонасаждениях с хорошо развитым кустарниковым ярусом [Швецов и др., 1984]. На обязательное наличие хорошо развитого травянистого

покрова и кустарникового яруса в местообитаниях этого вида указывается для Алтая [Юдин и др., 1979].

Необходимо отметить, что восточноазиатская мышь по всей Сибири предпочитает однотипные местообитания, включая северные границы ареала, где этот вид находит как необходимые гнездозащитные условия, так и предпочитаемые корма.

Питание. В целом по ареалу основу питания восточноазиатской мыши составляют семена [Реймерс, 1966]. В нашем случае они встречаются в 26,8 % желудков, уступая по предпочтительности только зеленым частям растений, которые были представлены в 63,6 % просмотренных желудков. Встречаемость грибов и корневищ значительно ниже — 2,4 %. В Южной Якутии основной вид корма — семена, в особенности лиственницы и ели. Зеленые корма поедались реже, чем на средней Лене, чаще встречаясь в июле, кроме того, в последний период отмечена высокая встречаемость животных кормов [Ревин, 1968, 1989].

На активное поедание восточноазиатской мышью животных кормов указывается для Прибайкалья [Швецов и др., 1984]. В наших материалах остатки насекомых были отмечены всего один раз. Относительно часто в желудках рассматриваемого вида насекомые отмечались в Южной Сибири (14,0 %) и намного чаще, чем в нашем случае, — семена [Реймерс, Воронов, 1963]. Даже в мае и июле встречаемость зеленых кормов на юге Средней Сибири [Реймерс, 1966] была ниже, чем в районе наших исследований. На настоящий момент можно определенно сказать, что у восточноазиатской мыши на северном пределе ареала возрастает роль зеленых кормов, что указывает на недостаточную обеспеченность семенами.

Размножение. Начало размножения восточноазиатской мыши в долине средней Лены приходится на конец апреля — начало мая и длится по крайней мере до конца сентября. Средняя плодовитость вида составляет $5,46 \pm 0,39$ [Ревин и др., 1988], что близко к показателям по Южной Якутии [Ревин, 1968], но меньше, чем в южных частях ареала. Так, в верховьях Лены этот показатель составляет 6,1 [Реймерс, Воронов, 1963], на Амурско-Зейском плато — 6,4 [Снигиревская, 1964], в восточном Прибайкалье — 7,7 [Матурова, 1982], на Алтае — 7,4 [Юдин и др., 1979], в бассейне р. Томь — 7,4 [Шубин, 1972].

Таким образом, показатели плодовитости животных северных популяций несколько ниже, чем на юге ареала. Последнее обстоятельство несколько необычно, так как чаще наблюдается обратная картина [Шварц, 1963; Шадрина, Вольперт, 1995а, б]. Не исключено, что уменьшение плодовитости происходит из-за перехода на питание менее калорийными зелеными кормами.

В популяции, уже начиная с июля, преобладают сеголетки, к октябрю происходит полная смена поколений.

3.8. Мышь-малютка —

Micromys minutus Pallas, 1758

Морфометрическая характеристика. Мышь-малютка — самый мелкий палеарктический представитель подсемейства Murinae (длина тела до 70 мм). Хвост примерно равен длине тела, плюсна очень крупная, до 24 % длины тела (табл. 3.27). Голова относительно крупная: кондильбазальная длина черепа составляет около 26 % длины тела. Череп характеризуется сильно укороченной лицевой частью, мозговая коробка крупная и вздутая, лобно-теменных гребней нет. Скуловые дуги расставлены нешироко. Из-за низкой численности на территории Якутии данные по морфометрической характеристике вида, как наши, так и литературные, весьма ограничены, но можно предположить, что половой диморфизм в размерах тела и черепа отсутствует.

Распространение. Мышь-малютка по характеру распространения относится к транспалеарктическим видам. На территории Якутии на настоящий момент обнаружена лишь в нескольких точках (рис. 3.22). Наши исследования в долине средней Лены позволили несколько продвинуть северную границу распространения вида по Лене [Луковцев и др., 1979; Ревин и др., 1988]. Кроме того, вид обнаружен в окрестностях оз. Эйк [Мордосов, 1976, 1997], последний пункт является самой северной точкой отлова мыши-малютки в Якутии. На восток мышь-малютка не проникает дальше Верхоянского хребта, в долинах Яны, Индигирки и Колымы не обнаружена [Кривошеев, Попов, 1968; Кривошеев, 1964, 1973; Лабути, 1975; Винокуров, Мордосов, 1980], отсутствовал этот вид в долинах указанных рек и в наших сборах.

Ландшафтное и биотопическое распределение. В окрестностях г. Якутска мышь-малютка отлавливалась в пойменных местообитаниях, в частности на лугах и в ивняках, но показатели численности

Таблица 3.27

Морфометрические показатели мыши-малютки Центральной Якутии
(по [Млекопитающие Якутии, 1971])

Промеры	n	M	m	σ	limit
Масса тела, г	14	4,38	0,15	0,56	3,5–5,5
Длина тела, мм	14	51,6	1,54	5,58	44,0–65,0
Длина хвоста, мм	14	39,7	1,19	4,31	35,0–50,0
Длина плюсны, мм	14	12,5	0,18	0,66	11,0–13,3
Промеры черепа, мм:					
общая длина	7	16,5	0,24	0,58	16,1–17,9
кондильбазальная длина	7	15,1	0,30	0,74	14,4–16,8
скуловая ширина	7	8,3	0,14	0,33	7,8–8,8
межглазничная ширина	10	3,0	0,02	0,04	3,0–3,1
длина верхнего зубного ряда	9	2,6	0,09	0,22	2,5–3,1
верхняя диастема	9	3,7	0,39	0,95	3,3–4,2
высота в области слуховых барабанов	6	6,8	0,01	0,10	6,8–7,0

Рис. 3.22. Места отлова мыши-малютки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

были очень низкими — 0,6–1,6 на 100 конусо-сут. При этом из четырех обловленных пойменных местообитаний малютка регистрировалась в трех. Несколько выше были показатели попадаемости на надпойменных террасах, но в пределах последних она отмечена только в одном биотопе из девяти обловленных — луг на берегу озера (5 на 100 конусо-сут), недалеко от опушки леса (рис. 3.23). В долине р. Кенкеме вид также был крайне малочисленным и отлавливался в кустарниках [Млекопитающие Якутии, 1971].

На средней Лене в районе устья Вилюя одна мышь-малютка была отловлена в елово-березовом лесу на острове. На площадке абсолютного учета, расположенной в высокой пойме, отловлено 5 зверьков этого вида. В равнинно-таежном ландшафте большинство особей добыты на опушке лиственничника мохово-брусничного, причем в стандартную канавку с конусами отловлен в 1984 г. только один зверек, а на площадке абсолютного учета, расположенной в том же местообитании, в том же году отловлено 6 экз. этого вида. Последнее обстоятельство позволяет предположить, что достаточно редкий в нашем регионе вид плохо отлавливается стандартными методами (канавками и давилками), что приводит к занижению его численности при относительных учетах.

Рис. 3.23. Пространственное распределение мыши-малютки в т. "Якутск".
Биотопы: низкая пойма: 1 — луг, 2 — кустарник; высокая пойма: 3 — луг, 4 — кустарник; II надпойменная терраса: 5 — луг на берегу озера, 6 — смешанный лес на берегу озера, 7 — березняк, 8 — смешанный лес на склоне, 9 — сосняк, 10 — остепненный склон; III надпойменная терраса: 11 — березняк разнотравный, 12 — березняк брусничный, 13 — сосново-лиственный лес.

В долине верхней Лены мышь-малютка встречается в лесах и на лугах [Реймерс, Воронов, 1963]. Н.Ф. Реймерс считает, что этот вид типичен для лесополья и связывает его появление в таежной зоне с развитием земледелия. Действительно, зверек тяготеет к окраинам пашен, такой тип распределения отмечен для Лено-Алданского междуречья [Ларионов, 1954] и Южной Якутии [Ревин, 1968]. В Южной и Западной Сибири, как и в европейской части России, малютка тяготеет к агроландшафтам, а в природных она предпочитает биотопы с высокотравным покровом [Попов, 1960; Ивантер, 1975; Юдин и др., 1976; Глотов и др., 1978; Швецов и др., 1984]. В то же время находки этого вида в устье р. Лепписке и окрестностях оз. Эйк не укладываются в представленную схему, так как удалены на сотни километров от сельскохозяйственных районов. Вполне вероятно, что численность этого вида повышается при агротехническом освоении территории.

Питание. Основу питания мыши-малютки в устье р. Лепписке составляют семена. Зеленые части растений отмечены только в 8,3 % наполненных желудков ($n = 12$). Возможно, что такая высокая встречаемость дефицитных для региона кормов объясняется тем, что все особи вида отлавливались в августе — сентябре. В Южной и Центральной Якутии мышь-малютка также в основном питается семенами [Млекопитающие Якутии, 1971], как и в долине верхней Лены, где семена встречались в 86,1 % просмотренных желудков. Семеноданным этот вид является по всему ареалу, кроме того, относительно часто в желудках фиксируют остатки насекомых. Так, на Алтае доля

насекомых составляла 36,3 % [Юдин и др., 1976], а в Карелии — 23,8 % [Ивантер, 1975].

Размножение. Материалы по репродукции данного вида у нас весьма ограничены. В августе нами отлавливались самцы с семенником массой 66 мг, в сентябре — 3 самца с семенником массой 22–30 мг, по-видимому, в это время размножение уже заканчивается. В окрестностях оз. Эйк в середине июля отловлена беременная самка, ловились молодые особи [Мордосов, 1980]. Возможно, что в Якутии размножение начинается в мае, как и на верхней Лене [Реймерс, Воронов, 1963]. Перезимовавшие самки дают как минимум два помета, величина помета в северо-западной Якутии равна 7 (по трем самкам [Мордосов, 1980]). На верхней Лене этот показатель составил 5,6 [Реймерс, Воронов, 1963], в Карелии — 7 [Ивантер, 1975], в Барабе — 6,75–7,0 [Глотов и др., 1978].

В августе — сентябре все отловленные нами животные были се-голетками, из них самцы составляли 47,3 %.

3.9. Красно-серая полевка —

Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846–1847

Морфометрическая характеристика. Размеры тела средние для полевок (табл. 3.28). Ушная раковина и хвост средних размеров (их длина составляет соответственно 11,7 и 22,2 % относительно длины тела). Череп с укороченным лицевым отделом, межглазничное сужение слабо выражено, лобно-теменных и затылочных гребней нет, мозговая коробка широкая и несколько уплощенная [Соколов, 1977].

У обитающих в Якутии красно-серых полевок отмечен половой диморфизм по ряду морфологических признаков: самки имеют меньшую длину тела и более длинный хвост, чем самцы, а также отличаются значительно большей высотой черепа [Млекопитающие Якутии, 1971], но достоверны лишь различия по последнему показателю. В наших сборах половые различия в размерах тела перезимовавших особей недостоверны, высота черепа у самцов и самок одинакова, а относительная длина хвоста у самок также существенно больше, чем у самцов.

При сравнении красно-серых полевок из долин Индигирки и Колымы с особями из более южной точки ареала — бассейна р. Олекмы (табл. 3.28) — обнаруживается, что по краниологическим показателям они существенно крупнее, чем в Южной Якутии. При этом прослеживается соответствие правилам Бергмана и Аллена: размеры тела особей к северу возрастают, а относительная длина хвоста — уменьшается.

Таблица 3.28

Морфометрические показатели красно-серой полевки долин рек Северной Якутии в сравнении с южно-якутской популяцией (перезимовавшие и прибылые особи)

Промеры	Бассейн Олекмы*			Долина Индигирки			Долина Колымы		
	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit
Масса тела, г	32	32,7 ± 1,01	21,8–43,0	30	45,2 ± 1,07	37,2–65,5	36	43,6 ± 0,40	37,0–50,5
Длина тела, мм	30	108,8 ± 1,19	97,5–120,0	30	118,5 ± 1,18	103,5–135,0	36	115,7 ± 0,81	105,5–124,0
Длина хвоста, мм	43	33,2 ± 0,82	24,5–44,0	27	26,3 ± 0,53	21,9–33,2	36	29,9 ± 0,55	20,2–36,0
Длина плюсны, мм	—	—	—	30	17,5 ± 0,14	15,8–18,8	33	17,6 ± 0,13	16,1–18,9
Высота ушной раковины, мм	—	—	—	27	13,9 ± 0,17	12,4–16,1	33	14,4 ± 0,22	11,2–16,4
Промеры черепа, мм:									
кондилобазальная длина	40	26,0 ± 0,16	24,4–27,7	24	26,9 ± 0,19	24,8–28,8	41	26,6 ± 0,70	24,9–30,1
длина носовых костей	—	—	—	28	7,8 ± 0,06	7,1–8,6	37	7,6 ± 0,08	6,1–8,4
длина верхнего зубного ряда	44	6,4 ± 0,03	6,1–6,8	26	6,4 ± 0,05	6,0–7,1	43	6,5 ± 0,35	5,9–7,2
длина диафемы	44	7,3 ± 0,05	6,8–7,9	28	8,0 ± 0,11	6,7–9,0	43	7,8 ± 0,34	7,4–9,0
скуловая ширина	38	14,6 ± 0,09	13,7–15,8	25	15,2 ± 0,12	13,5–16,4	41	15,1 ± 0,4	14,5–16,0
межглазничная ширина	43	3,8 ± 0,03	3,3–4,3	29	3,7 ± 0,04	3,1–4,1	43	3,9 ± 0,03	3,6–4,3
высота в области слуховых барабанов	—	—	—	24	10,1 ± 0,06	9,3–10,7	37	10,2 ± 0,04	9,7–10,7

* По [Млекопитающие Якутии, 1971].

Распространение. По характеру распространения красно-серая полевка относится к восточно-палеарктическим видам. В Якутии она широко распространена по всей таежной зоне [Млекопитающие Якутии, 1971]. Нами обнаружена почти во всех пунктах сбора материала, в частности в районе устья р. Бесюке, что значительно севернее известных ранее находок в долине Лены (рис. 3.24). В то же время этот вид не отловлен нами, как и предыдущими исследователями [Млекопитающие Якутии, 1971; Попов, 1975, 1977], в районе г. Якутска.

Ландшафтное и биотопическое распределение. Долина Лены. Красно-серая полевка — типичный обитатель таежных ландшафтов. В долине средней Лены в районе устья Вилюя одной из характерных черт биотопического распределения вида является неравномерность освоения территории таежных ландшафтов. В горно-таежном ландшафте красно-серая полевка в отдельные периоды достигает высокой численности. Так, в 1973 г. численность вида в осенний период равнялась 25,6 попаданий на 100 ловушко-сут [Луковцев и др., 1979]. Необходимо отметить, что по данным отлова давилками в указанном регионе в горной тайге периодически происходит смена доми-

Рис. 3.24. Места отлова красно-серой полевки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

нантов среди лесных полевков: если в 1974–1975 и 1978–1979 гг. доминировала красно-серая полевка, то в 1973–1977 гг. и весной 1980 г. — красная полевка, тогда как в равнинно-таежном ландшафте красно-серая полевка во все годы исследований была малочисленнее красной.

По данным отлова конусами (рис. 3.25) в горно-таежном ландшафте красно-серая полевка наиболее многочисленна в смешанных хвойно-лиственных лесах и на каменистых осыпях. Среди биотопов, охваченных отловом давилками, наибольший коэффициент верности биотопу (КВБ) этот вид имеет в лиственничниках мохово-багульниковых как весной, так и осенью. Именно в таком биотопе больше всего процент перезимовавших самок, которые здесь активно размножаются.

В равнинно-таежном ландшафте численность красно-серой полевки ниже, чем в горно-таежном, но значительно выше, чем в пойме, и она встречается во всех обловленных биотопах. Индекс доминирования был наиболее высоким в смешанных лесах и березняках, в последнем биотопе зарегистрирована и максимальная численность (рис. 3.25). Судя по КВБ, в весенний период в равнинно-таежном ландшафте наиболее благоприятны для обитания вида переувлажненные старые гари, смешанные леса и березняки. По данным осенних отловов, к наиболее благоприятным биотопам относятся, в первую очередь, лиственничники мохово-голубичные и уже упомянутые старые гари. Анализ популяционной структуры населения красно-серой полевки показывает, что количество перезимовавших осо-

Рис. 3.25. Пространственное распределение красно-серой полевки в т. "Леппиксе".

Биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; равнинно-таежный ландшафт: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; горно-таежный ландшафт: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

бей выше всего в березняках. В этом биотопе, а также в молодых лиственничниках размножение идет наиболее интенсивно в основном за счет перезимовавших самок. Доминирования красно-серой полевки в равнинно-таежном ландшафте не наблюдалось. По данным абсолютного учета, плотность вида в лиственничнике мохово-брусничном равнялась в 1984 г. 11 особям на 1 га.

В пойме долины средней Лены эта полевка была крайне малочисленна и отлавливалась исключительно на гривах, поросших лесом с кустарниковым подростом (рис. 3.25). На площадке абсолютного учета площадью 1 га, расположенной в высокой пойме, отловлено 8 особей этого вида.

В целом в долине средней Лены красно-серая полевка явно предпочитает горно-таежный ландшафт, заселяя его с высокой плотностью. В этом ландшафте вид имеет хорошо выраженные флуктуации численности, во время фазы пика он доминирует среди полевок в горной тайге, в периоды депрессий уступает по численности красной полевке.

В долине нижней Лены (т. "Бесюке") красно-серая полевка отлавливалась в пойме только на высоких участках, в равнинно-таежном ландшафте — в переувлажненных лиственничниках-зеленомошниках и не отсутствовала в сухих лишайниковых лиственничниках.

В долине Адычи в период исследований численность красно-серой полевки была крайне низкой: конусами отловлен всего один экземпляр в лиственничнике мохово-лишайниковом, давилками отработано 1560 ловушко-сут, но ни одного экземпляра этого вида не поймано. Исследователи, проводившие отлов мелких млекопитающих в данном регионе в другие годы, также указывают на низкую численность этого вида [Кривошеев, Попов, 1968; Лабутин, 1975].

Долина Индигирки. В среднем течении реки, в районе Момского хребта красно-серая полевка нами не отловлена, а несколько ниже по течению в т. "Кебергене" пойманы единичные экземпляры в ольховнике и моховом прирусловом лиственничнике озерно-таежного ландшафта.

В момент исследований в т. "Белая Гора" численность вида можно охарактеризовать как высокую, причем красно-серая полевка относительно часто отлавливалась в биотопах низкой поймы, достигая тут высокой численности, чего не наблюдалось в рассмотренных выше долинах. На наш взгляд, эта аномалия объясняется тем, что указанные участки низкой поймы непосредственно примыкали к выходам к реке Алазейского плоскогорья, где численность вида была высокой. В подобных случаях, по нашим наблюдениям, мигранты из других ландшафтов могут достигать в пойменных биотопах высокой

численности [Вольперт, 1983]. В таких же пойменных биотопах, прилегающих к равнинному левому берегу, красно-серая полевка не отлавливалась.

Население мигрантов в пойме на 95 % состояло из сеголеток, тогда как в лиственничнике лишайниковом на момент отлова они составляли всего 60 % населения биотопа. Необходимо отметить, что красно-серые полевки, населяющие хвощатники, размножались. Таким образом, этот вид в долине средней Индигирки использует биотопы низкой поймы не только как места выселения наиболее подвижной части популяции — сеголеток, но и как станции размножения.

Численность красно-серой полевки в озерно-таежном ландшафте в период исследований была низкой. Она отлавливалась только в непосредственной близости от реки, численность в долинном лиственничнике равнялась 0,3 на 100 ловушко-сут, уже на расстоянии 50 км от русла реки этот вид не был отловлен конусами, а давилками поймана всего одна особь на 855 ловушко-сут.

В горно-таежном ландшафте численность вида была значительно выше: по данным отлова давилками в целом по ландшафту она равнялась 4,2 особи на 100 ловушко-сут, а в распадках была значительно выше — 9,3 на 100 ловушко-сут. В последнем биотопе 100 % прибылых самок в августе принимали участие в размножении, а в лиственничнике лишайниковом — только 66,7.

В низовьях Индигирки в период наших исследований численность вида была низкой (рис. 3.26), за исключением небольшого подъема в 1987 г., когда красно-серая полевка заселяла самые разные биотопы на коренных берегах реки и на притеррасной пойме, достигая наиболее высоких показателей во влажных типах лиственничников — моховом переувлажненном и бруснично-моховом. В следующем году численность вида снизилась примерно в 3 раза и в дальнейшем уже не поднималась сколько-нибудь заметно.

Естественно, что в периоды депрессии круг заселяемых видом биотопов заметно сужается, причем в дождливые сезоны возрастает роль более сухих типов леса — мохово-голубичного и мохово-лишайникового. Надо сказать, что в целом в жизни красно-серой полевки в районе исследований эти лиственничники играют заметную роль: средняя многолетняя численность в них была в 1,5 раза ниже, чем во влажных стациях, но демографическая структура поселений показывает, что первые наиболее активно используются в качестве стаций размножения. По данным отлова конусами, в лиственничнике мохово-голубичном озерно-таежного ландшафта доля перезимовавших особей была в 4 раза выше, чем в бруснично-моховом, причем в первом пойманы самцы и самки, а во втором — только самцы.

Рис. 3.26. Пространственное распределение красно-серой полевки в т. "Шаманово".

Биотопы: озерно-таежный ландшафт: 1 — лиственный мохово-голубичный, 2 — лиственный бруснично-моховый; пойма левого берега: 3 — регулярно затопляемые ивняки, 4 — хвощатники; острова: 5 — лиственный мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; пойма правого берега: 7 — хвощатники, 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; горно-таежный ландшафт: 10 — осыпь, 11 — лиственный мохово-лишайниковый, 12 — лиственный голубично-моховый, 13 — лиственный моховый переувлажненный.

Интенсивность размножения прибылых особей также существенно выше в мохово-голубичном лесу.

В горно-таежном ландшафте единственная перезимовавшая самка отловлена на каменистой осыпи недалеко от лиственного мохово-лишайникового. Самцы этой возрастной группы отмечены только в указанном выше лиственном, здесь же встречены размножавшиеся прибылые самцы и самки, хотя доля последних выше в переувлажненном лиственном. В таежных ландшафтах при зарегистрированных уровнях численности вид явно избегает селиться на открытых заболоченных пространствах — на мари отловлены исключительно прибылые неразмножавшиеся особи и только в 1987 г.

В пойменных биотопах красно-серая полевка встречалась примерно с середины июля, т.е. в период выселения молодняка. В ивняках притеррасной поймы пойман всего один перезимовавший самец и относительно высок процент размножавшихся сеголеток, на хвощовых лугах численность вида выше, но население представлено почти исключительно прибылыми неполовозрелыми особями.

Интересно, что за 4 года исследований не отловлено ни одной красно-серой полевки на островах, но поскольку на притеррасных участках поймы вид может достигать высоких показателей обилия, а прибылые даже размножаются, мы склонны объяснить отсутствие в уловах этого вида низкими показателями численности, а не невозможностью обитания в условиях островной поймы.

По данным абсолютного учета, проведенного в мохово-лишайниковом лиственном горно-таежном ландшафте в 1988 г., на 1 га леса обитало 48 особей красно-серой полевки, а в 1989 г. — 4, что составило 12-кратное снижение попадаемости. По данным отловов конусами, в аналогичном биотопе показатели обилия снизились менее чем в 2 раза — с 1,1 до 0,6 экз./100 конусо-сут. По-видимому, такая существенная разница в результатах разных способов отлова объясняется разной подвижностью вида в эти годы. В 1988 г. при относительно более высокой численности доля красно-серой полевки в уловах конусами составила 27,3 % мелких млекопитающих, а по данным абсолютного учета — 11,4 %, в 1989 г. эти цифры составили соответственно 4,0 и 7,9 %, т.е. можно предположить, что в год резкого снижения численности вида произошло повышение его подвижности.

Несмотря на отмеченные колебания численности красно-серой полевки по ландшафтам в последней точке, весь период наблюдений численность красно-серой полевки в горно-таежном ландшафте была ниже, чем в озерно-таежном ландшафте, т.е. наблюдалась картина, обратная зарегистрированной в 1982 г. в т. "Белая Гора", когда численность вида была значительно выше в горно-таежном ландшафте. Таким образом, в долине Индигирки красно-серая полевка, в отличие от долины Лены, не столь строго предпочитает горно-таежный ландшафт, достигая высокой численности в отдельные годы и в озерно-таежном ландшафте.

Долина Колымы. В т. "Поповка" в период исследований красно-серая полевка отлавливалась только в пойме и горно-таежном ландшафте. В пределах последнего наибольшей численности вид достигал в лиственном лишайниковом. В значительно меньшем количестве он отлавливался в лиственном мохово-голубичном и в пределах каменистой осыпи.

В пойме красно-серая полевка отмечена на хвощатниках и в очень небольшом количестве в затопляемых ивняках. В озерно-таежном ландшафте в указанной точке красно-серых полевок не отловлено.

В долине Колымы в т. "Мангазейка" в период исследований красно-серая полевка регулярно встречалась в пойме. Наибольшая численность вида зарегистрирована в незатопляемых ивняках на острове, причем полевки размножались в этом биотопе, но перезимовавших особей не отловлено. В озерно-таежном ландшафте красно-серая полевка отлавливалась во всех биотопах, наиболее многочисленной была в лиственных мохово-брусничных, только в этом биотопе отловлены перезимовавшие особи, в том числе размножающиеся самки. В березняках размножение также проходило

активно, но за счет прибылых, которые размножались здесь интенсивнее, чем в других биотопах.

В среднем течении Колымы в озерно-таежном ландшафте в период исследований численность вида была крайне низкой, эти полевки постоянно отлавливались только в лиственничниках (рис. 3.27), тогда как в 1960–1962 гг. в долине средней Колымы в период относительно высокой численности они заселяли широкий круг местообитаний [Кривошеев, 1964]. По-видимому, лиственничники являются наиболее оптимальным биотопом для этого вида, в них красно-серая полевка переживает периоды депрессий, а в периоды высокой численности расселяется в другие местообитания.

В горно-таежном ландшафте в период исследований популяция красно-серой полевки была очень высокой, в особенности в 1981 г., когда наблюдалась вспышка численности вида. В период фазы пика наиболее многочисленной красно-серая полевка была в лиственничнике мохово-голубичном, а в следующем году — в лиственничнике лишайниковом. Оба этих биотопа являются станциями размножения красно-серой полевки, причем в первом процент беременных самок был выше (рис. 3.28).

В пойме красно-серая полевка была наиболее многочисленной на веяниковых лугах, которые непосредственно примыкали к подошве гор (рис. 3.27). Скорее всего, обитатели лугов являются мигрантами, так как среди них не обнаружено перезимовавших особей, а процент размножавшихся был очень низок (рис. 3.28), в пойме перезимовавшие самки обнаружены только в лиственничниках. Отлов перезимовавших самцов на веяниковых лугах примыкающей поймы объясняется шириной их передвижения в период гона [Никитина,

Рис. 3.27. Пространственное распределение красно-серой полевки в т. "Жирково".

Биотопы: низкая пойма: 1 — ивняки, 2 — веяниковые луга; высокая пойма: 3 — лиственничник, 4 — ивняки; озерно-таежный ландшафт: 5 — лиственничники на грибах, 6 — лиственничники мохово-брусничные, 7 — ивняки; горно-таежный ландшафт: 8 — лиственничники лишайниковые, 9 — лиственничники мохово-голубичные.

Веяниковые луга

Лиственничник мохово-голубичный

Лиственничник лишайниковый

Рис. 3.28. Демографическая структура населения красно-серой полевки по биотопам.

1971; Хляп и др., 1977]. Массовое размножение сеголеток зарегистрировано в незатапливаемых ивовых зарослях, т.е. на участках, наименее подверженных паводкам.

В целом по долине средней Колымы можно отметить на момент исследований явное предпочтение красно-серой полевкой горно-таежного ландшафта. Относительное ее обилие на участках поймы, прилегающих к выходам Юкагирского нагорья, объясняется миграцией молодых особей из биотопов горно-таежного ландшафта. В озерно-таежном ландшафте отмечена глубокая депрессия численности. В 1960–1962 гг. наблюдалась обратная картина: численность была выше в озерно-таежном ландшафте [Кривошеев, 1964], что дает нам основание сделать вывод о несовпадении фаз динамики численности в разных ландшафтах.

Таким образом, как и в долине Индигирки, красно-серая полевка периодически достигает высоких уровней численности в таежных ландшафтах. В биотопическом плане она предпочитает селиться в различного типа лиственничниках, в последнюю очередь заселяя открытые местообитания.

Анализируя ландшафтно-биотопическое предпочтение красно-серой полевки, необходимо отметить что по отношению к горно-таежному ландшафту оно ослабевает в северо-восточном направлении, где этот вид способен достигать высоких уровней численности и в других таежных ландшафтах. При этом он повсеместно предпочитает лесные биотопы с хорошими защитными условиями и наличием ягодников.

Питание. В рационе красно-серой полевки большое место занимают зеленые корма, причем это свойственно виду по всему ареалу [Мичурина, 1974], его можно рассматривать как специализированный зеленоядный вид, что подтверждается морфологическими данными [Воронцов, 1961]. По наблюдениям в долине средней Лены, отмечены изменения состава кормов в течение бесснежного периода. В июне и сентябре основу питания вида составляют вегетативные части брусники, семена и кора деревьев и кустарников (табл. 3.29), т.е. рацион очень близок по составу к зимнему [Сафронов, 1983]. Поедание красно-серой полевкой коры деревьев и кустарников известно и в других частях ареала [Кошкина, 1957; Большаков, 1970; Бромлей, Костенко, 1970; Литвинов, Васильев, 1973]. В июле и августе в рационе преобладают зеленые части растений, на предпочтение этим видом сочных кормов указывает Л.Р. Мичурина [1974]. В этот же период в рационе возрастает значение ягод.

В долине Колымы просматривается та же закономерность, что и в долине Лены: в июне основу рациона составляют кусты брусники, в июле и августе их значение резко снижается, но возрастает роль травянистых растений, которые, в отличие от долины Лены, часто поедаются и в сентябре. Для долины Колымы характерна относительно высокая встречаемость ягод в желудках красно-серых полевок, на их важную роль в питании вида указывают В.Г. Кривошеев [1964], Ф.Р. Штильмарк [1965], Ю.В. Ревин [1968]. Не исключено, что ягоды относятся к наиболее предпочитаемым кормам для этого вида, но их потребление лимитируется колебаниями урожая основных ягодных культур севера — брусники и голубики.

В долине Индигирки качественный состав и соотношение кормов в рационе вида значительно варьируют по годам и в течение летнего периода (табл. 3.29). В общих чертах изменения летнего рациона таковы: в июне относительно велика доля лишайников, а также коры деревьев и кустарников, которые являются в основном компонентами зимнего питания, но уже в этом месяце заметную роль на-

Таблица 3.29
Встречаемость разных кормов в желудках красно-серой полевки, % к числу наполненных

Вид корма	Долина средней Лены (n = 296)				Долина средней Колымы (n = 211)				Долина нижней Индигирки (n = 211)			
	VI	VII	VIII	IX	VI	VII	VIII	IX	VI	VII	VIII	IX
Зеленые части растений	9,3	74,7	84,2	29,0	22,9	54,2	43,4	44,0	62,5	42,4	19,2	15,2
Ягоды голубики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	20,8	10,7	0,0	3,4	42,3	50,0
Ягоды брусники	5,2	3,4	10,5	3,2	14,3	6,3	15,1	22,7	0,0	11,9	11,5	19,7
Другие ягоды	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	2,1	7,5	0,0	0,0	3,4	2,6	0,0
Листья брусники	77,3	6,9	0,0	54,8	48,6	10,4	3,8	22,7	0,0	1,7	1,3	10,6
Грибы	0,0	1,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,5
Хвоши	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	6,3	7,5	0,0	0,0	16,9	10,3	1,5
Зеленые мхи	8,2	1,1	0,0	0,0	8,6	4,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Семена	0,0	1,1	5,3	3,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Лишайники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,9	0,0	25	15,2	0,0	0,0
Кора деревьев и кустарников	0,0	0,0	0,0	7,5	5,7	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0

чинают играть вегетативные части травянистых растений, встречаясь в 10–100 % обследованных желудков. В июле доля этих кормов снижается благодаря массовому созреванию ягод голубики и брусники, составляющих около 18 % поедаемых кормов, а в августе их доля доходит до 53 %, в отдельные годы в конце лета существенную роль играют грибы. Кроме того, в июле — августе отмечено частое потребление красно-серой полевкой хвоща полевого, что объясняется выселением молодняка в пойменные стации, где он является одним из наиболее распространенных растений; в течение этих двух месяцев рацион вида отличается наибольшим разнообразием. В начале сентября ягоды по-прежнему играют большую роль, но потребление зелени и хвоща снижается, отмечено более частое поедание листьев брусники, что отражает начало перехода к зимнему типу питания. Известно, что побеги ягодных кустарничков играют большую роль в зимнем питании лесных полевок [Кошкина, 1957; Сафронов, 1983; Ревин, 1989].

Сравнение состава поедаемых кормов в разные годы показывает, что основную роль в летнем питании красно-серой полевки в нижней Индигирке играют зеленые части травянистых растений, ягоды голубики и брусники: они встречаются в 72 % наполненных желудков, при этом потребление зелени как корма, более доступного и менее зависящего от погодных условий, варьирует в меньших пределах. Частота поедания ягод голубики в зависимости от урожайности может колебаться в пределах 2,5 крат, причем эти различия достоверны (по критерию Пирсона $p < 0,05$). Также достоверны различия в частоте поедания грибов ($p < 0,1$), что объясняется

различиями в их урожайности в разные сезоны, и хвоща ($p < 0,1$), его потребление выше в годы активного выселения в пойму. Встречаемость в желудках лишайников также сильно варьирует, но это можно объяснить неоднородностью выборок: в 1987 и 1988 гг. их поедаемость была значительно выше, чем в 1989-м, но по последнему нет июньских материалов, а именно в этом месяце лишайники поедались чаще всего.

Сравнение характера питания красно-серых полевых из низовьев Индигирки и полевых из других точек ареала показало много общего с другими якутскими популяциями. На северо-востоке Сибири [Млекопитающие Якутии, 1971; Юдин и др., 1976] и в Южной Якутии [Ревин, 1968] тип питания сходен с индигирским: в июне — июле относительно высока доля зеленых кормов, в августе и сентябре она снижается за счет увеличения доли ягод. В целом же значение вегетативных частей травянистых растений в этих регионах выше, чем в районе наших исследований. Кроме того, только в низовьях Индигирки заметную роль в питании красно-серой полевки играет хвощ полевой, причем суммарное потребление хвоща и вегетативных частей травянистых растений здесь дает величину, близкую к летней доле зелени в других частях ареала.

Основными кормами вида в обследованном регионе являются вегетативные части растений, поскольку ягодники плодоносят спорадически. В летний период — это травянистые растения, а до начала вегетации сохраняется в основном зимний характер питания, который снова начинает преобладать уже в сентябре, с окончанием вегетативного периода травянистой растительности.

Размножение. В долине средней Лены может начинаться довольно рано — в апреле (17 мая 1981 г. отловлены уже рожавшие самки). Но чаще массовое размножение начинается в мае, как было в 1979–1980 гг. Заканчивается размножение, как правило, в августе, так, в 1979 г. последняя беременная самка отловлена седьмого, в 1980 г. — 28 августа, а самец с явными признаками деградации семенников — 10 сентября, т.е. размножение идет с апреля — мая по август — начало сентября.

В долине Колымы первый выход сеголеток отмечен 1 июня, а в 1983 г. — 12 июня, т.е. размножение начинается в мае. Последние беременные самки отловлены 22–27 августа. У самцов, принимавших участие в гоне, в начале сентября был замечен явный регресс семенников, т.е. размножение идет с мая — начала июня по начало сентября, как и в других частях ареала [Кошкина, 1957; Реймерс, Воронов, 1963; Очиров, Башанов, 1975; Швецов, 1977; Чернявский и др., 1978; Юдин и др., 1979].

В зоне северного редколесья низовьев Индигирки эти сроки значительно сокращены: начало репродуктивного периода прихо-

дится на конец мая — начало июня, продолжительность колеблется от 2,5 до 3,5 мес. Прибылые зверьки появляются в уловах с первой декады июля, и в течение этого месяца идет наиболее активное размножение. К началу августа интенсивность репродуктивного процесса спадает, а к концу месяца полностью затухает [Шадрина, Вольперт, 1995а]. В 1987 г. последняя беременная самка была отловлена 1 августа (судя по степени развития эмбрионов, роды пришлись бы на 11–12 августа), в 1988 г. — на 20 дней позже, родить она могла примерно 30–31 августа. 29 августа 1989 г. поймана самка, родившая около 2–3 дней назад. У перезимовавших самцов гон продолжается до середины августа.

Таким образом, сокращение сроков размножения происходит по мере продвижения на Север. В результате срок репродукции лесотундровых популяций значительно меньше, чем у населяющих остальную таежную зону.

За период размножения перезимовавшие самки могут принести по три помета, но основная масса дает только два, как и прибылые самки первых генераций.

Плодовитость красно-серой полевки изменяется по годам, но статистически достоверных отличий в долине Лены (т. "Лепписке") не отмечено ни для отдельных возрастных групп, ни в целом по сезонам [Ревин и др., 1988]. В долине Колымы в 1981 г. плодовитость молодых самок была ниже, чем у перезимовавших ($p < 0,05$), как и за весь период исследований ($p < 0,01$). По годам плодовитость также изменялась на достоверном уровне. В 1983 г. плодовитость была выше ($p < 0,05$), чем в год пика численности — 1981 г. По данным В.Г. Кривошеева [1964], плодовитость колымских красно-серых полевых несколько ниже — $6,66 \pm 0,19$ ($n = 85$), но разница с нашими данными статистически не достоверна.

В низовьях Индигирки также существуют достоверные различия в величине помета между перезимовавшими и прибылыми самками, внутри этих возрастных групп плодовитость по годам меняется несущественно, а различия между сезонами объясняются в основном разным соотношением взрослых и прибылых самок в выборках разных лет.

Из обследованных нами долин рек наибольшая средняя величина выводка была в наиболее северо-восточных точках — лесотундровой подзоне низовьев Индигирки и в среднем течении Колымы, она достоверно выше плодовитости красно-серых полевых в верхнем течении Колымы, среднем течении Лены ($p < 0,01$) и среднем течении Индигирки ($p < 0,05$). Также существенны различия при сравнении с показателями Южной Якутии, верхней Лены, Колымского нагорья, Прибайкалья и т.д. (табл. 3.30). В целом плодовитость красно-серых полевых на обследованной территории очень высока и близка пло-

Таблица 3.30

Географическая изменчивость плодовитости красно-серых полевков

Место сбора материала, источник	n	M	m
Чаунская низменность [Юдин и др., 1976]	6	7,5	0,47
Среднее течение р. Анадарь [Юдин и др., 1976]	5	7,6	0,67
Долина средней Колымы (наши данные)	37	7,2	0,27
Долина нижней Индигирки (наши данные)	36	6,83	0,36
Долина средней Лены (наши данные)	96	6,8	0,16
Корякское нагорье [Портенко и др., 1963]	9	6,7	0,62
Долина средней Индигирки (наши данные)	11	6,2	0,35
Байкальская котловина [Швецов, 1977]	?	6,0	?
Восточное Прибайкалье [Матурова, 1982]	173	6,0	?
Зейский заповедник [Бромлей и др., 1984]	?	6,0	?
Алтай [Юдин и др., 1979]	?	6	?
Бассейн Омолона [Чернявский и др., 1978]	52	5,9	?
Долина верхней Колымы (наши данные)	23	5,7	0,28
Долина верхней Лены [Реймерс, Воронов, 1963]	17	5,65	0,68
Южная Якутия [Ревин, 1968]	208	5,45	0,09
Кольский полуостров [Кошкина, 1957]	430	5,09	0,06

витости полевков, обитающих на восточном пределе ареала (Чаунская низменность, Анадырь). На повышение плодовитости в направлении северных и северо-восточных границ ареала указывают для этого вида Б.С. Юдин с соавт. [1976].

Показатели интенсивности размножения перезимовавших особей практически не изменяются по годам, как и демографические параметры [Ревин и др., 1988], за исключением количества пометов, тогда как репродуктивная активность молодых подвержена существенным колебаниям.

Так, в долине средней Лены в июле 1979 г. (год высокой численности) полевки I возрастной группы вступили в размножение вяло, а в июле 1980 г. (спад численности) все отловленные прибылые самки были беременны.

В долине средней Колымы в 1981–1982 гг. значительных изменений в интенсивности размножения самок всех возрастных групп не наблюдалось. В долине средней Индигирки в августе степень участия молодых в воспроизводстве была очень высокой, они активно размножались, не только старшая, но и младшая возрастные группы, чего не наблюдалось в долине верхней Колымы, где с августа особи I возрастной группы не принимали участия в размножении (табл. 3.31).

В нижнем течении Индигирки, как и в предыдущих случаях, участие в репродукции перезимовавших особей по годам практически не изменялось. В то же время активность включения в размножение прибылых особей зависела от фазы численности, что довольно распространено [Schaffer, Tamarin, 1973]. Так, в 1997 г. при высо-

Таблица 3.31

Степень участия в размножении красно-серых полевков, %

Месяц	Перезимовавшие						Сеголетки					
	Самки			Самцы			Самки				Самцы	
	n	рожав- шие	беремен- ные	n	размно- жавши- ся	n	рожав- шие	беремен- ные	яловые	n	размно- жавши- ся	
Долина нижней Индигирки												
Июнь	3	33,3	100	6	100	—	—	—	—	—	—	
Июль	9	77,7	77,7	22	100	39	46,2	5,1	51,3	34	2,6	
Август	1	0,0	100	2	100	53	3,8	3,8	92,4	65	1,5	
Сентябрь	—	—	—	1	0,0	37	12,1	0,0	87,9	35	0,0	
Долина средней Колымы												
Июнь	19	31,6	68,4	34	100	—	—	—	—	—	—	
Июль	3	0,0	100	43	100	13	0,0	76,9	23,1	19	42,1	
Август	—	—	—	2	100	45	8,8	4,4	86,7	42	4,4	
Сентябрь	2	100	0,0	6	0,0	43	11,6	88,4	—	39	0,0	
Долина средней Лены												
Июнь	48	16,7	83,3	59	100	1	0,0	100	0,0	2	50,0	
Июль	13	84,6	15,4	14	100	16	6,3	37,5	62,5	34	32,3	
Август	1	0,0	100	1	100	9	55,5	0,0	44,5	7	14,3	
Сентябрь	7	100	0,0	3	0,0	45	4,4	0,0	95,6	54	0,0	

ких уровнях численности отмечались минимальное участие в размножении прибылых особей и укороченный период размножения. Напротив, при низкой исходной (весенней) численности наблюдалось более активное участие в воспроизводстве прибылых полевков [Шадрина, Вольперт, 1995а].

Возрастная структура. Среди прибылых зверьков красно-серой полевки нами выделяются две возрастные группы: I — особи 1–2-месячного возраста, II — особи 3–4-месячного возраста. Более точное определение возраста на основе развития зуба [Тупикова и др., 1970] у красно-серых полевков, обитающих в Якутии, по нашему мнению, невозможно без дополнительных специальных исследований темпов формирования зубов. Возрастная структура популяций этого вида типична для субарктических популяций мелких млекопитающих с полным обновлением состава за один период репродукции [Шварц, 1963]. В июне, а в отдельные годы даже в июле (рис. 3.29) в популяции преобладают перезимовавшие особи. Начиная с июля наблюдается численное превосходство прибылых, которое в августе — сентябре становится безусловным.

Как и следовало ожидать, в июле среди сеголеток встречаются особи только младшей группы, прибылые II группы отлавливаются с начала августа. Доля сеголеток II группы в предзимней популяции находится в прямой зависимости от степени интенсивности размножения прибылых. Как указывалось выше, первые генерации молодых активно участвуют в размножении, что требует от них больших

Рис. 3.29. Возрастная структура популяций красно-серой полевки.

энергозатрат [Пантелеев, 1983], вследствие чего размножающиеся особи к осени быстро элиминируют из популяции, которая в зимний период состоит практически только из неполовозрелых полевок [Сафронов, 1983].

В 1979 г. интенсивность размножения прибылых в долине средней Лены была относительно низкой, и в сентябре процент сеголеток II группы был выше, чем в 1980 г. [Ревин и др., 1988]. В период наших исследований характерной чертой для возрастной структуры популяций красно-серой полевки в долине средней Индигирки и верхней Колымы в августе был большой процент перезимовавших и

сеголеток II группы, что можно объяснить низкой весенней численностью вида, как наблюдалось в т. "Лепписке" в 1980 г.

В нижнем течении Индигирки в июне 100 % отловленных составляли перезимовавшие зверьки, в июле их доля колебалась от 17 до 39 %, в августе — сентябре она была крайне незначительна, в 1989 и 1990 гг. в эти месяцы они уже не отлавливались (рис. 3.29). Особенностью нижнеиндигирской популяции является крайне низкий процент прибылых II возрастной группы, а также их позднее появление в уловах, что объясняется более поздними сроками начала размножения по сравнению с другими точками ареала.

Половая структура популяции. На момент рождения в популяции красно-серой полевки самцов и самок появляется примерно поровну [Шляпникова, 1980], в то же время половой состав популяции вида является весьма лабильным показателем [Большаков, Кубанцев, 1984]. В наших сборах в долине средней Лены среди перезимовавших полевок не наблюдалось типичного для периода воспроизводства преобладания самцов (рис. 3.30), что часто бывает в популяциях красно-серой полевки [Бердюгин, 1978].

Анализ многолетних данных по ландшафтным особенностям половой структуры популяции красно-серой полевки показал, что в горно-таежном и равнинно-таежном ландшафтах среди перезимовавших преобладают самцы. При этом в год доминирования вида в горно-таежном ландшафте соотношение полов составило 1:1,4 с преобладанием самцов ($n = 78$), а в равнинно-таежном, где вид занимает подчиненное положение, в это же время самцов было незначительно меньше, чем самок — 1:0,8 ($n = 15$), отличия статистически недостоверны. На площадке мечения, расположенной в равнинно-таежном ландшафте, в 1984 г. большинство помеченных были самками, как и у других второстепенных видов, а среди красных полевок преобладали самцы [Попов и др., 1978].

В среднем течении Колымы и Индигирки среди перезимовавших численно преобладали самцы, при высокой численности вида в т. "Жирково" в 1981 г. соотношение в уловах между самками и самцами в июне и июле доходило до 1:21.

В низовьях Индигирки в период размножения среди перезимовавших преобладали самцы, но соотношение полов зависело от численности и хода репродукции. В 1987 г. при относительно высокой численности и высокой активности размножения численное преобладание самцов над самками (3:1) было статистически достоверным (по критерию хи-квадрат $p < 0,01$), а в год депрессии (1988) — паритетным. У прибылых в целом соотношение близко к паритетному, но в течение лета оно колеблется, отражая разницу в подвижности самцов и самок, связанную с участием в размножении. К концу репродуктивного периода соотношение полов среди сеголеток близко к 1:1 или

Рис. 3.30. Половая структура популяций красно-серой полевки.

преобладают самки, для II возрастной группы, наиболее активно участвующей в репродукции, это преобладание статистически значимо.

Таким образом, в периоды высокой численности красно-серой полевки в популяции соотношение полов сдвигается в сторону самцов. Возможно, что в годы депрессии численности повышается подвижность самок под давлением доминирующего вида [Кошкина, 1957], которое может выражаться как территориальное преследование со стороны доминирующего вида в репродуктивный период, когда агрессивность полевок повышается [Шилов, 1977].

В целом, характеризуя значимость красно-серой полевки, необходимо отметить ее приуроченность к горно-таежным ландшафтам, которая ослабевает в северо-восточном направлении, параллельно возрастает роль красно-серой полевки в сообществах разнообразных ландшафтов.

3.10. Красная полевка — *Clethrionomys rutilus* Pallas, 1779

Морфометрическая характеристика. Одна из наиболее мелких полевок Якутии. По пропорциям тела и особенностям строения черепа сходна с родственным видом — красно-серой полевкой.

М.В. Попов [Млекопитающие Якутии, 1971] отмечает наличие у красной полевки полового диморфизма по размерам тела (самки крупнее самцов), в наших материалах наблюдается та же тенденция, причем по ряду промеров различия статистически значимы. Морфометрические показатели красных полевок из северо-восточной Якутии близки к нижним пределам, указанным для вида С.И. Огневым [1950], но нижеиндигирские полевки отличаются достоверно более крупными размерами тела, по сравнению с колымскими, янскими и камчатскими [Млекопитающие Якутии, 1971; Чернявский, 1984]. Основные промеры черепа и их пропорции у красных полевок из долин Яны, Индигирки и Колымы не имеют принципиальных различий (табл. 3.32), что вполне соответствует выводам О.Л. Россолимо [1962], показавшей на примере 23 выборок из разных географических точек СССР, что диапазон изменчивости внутри отдельных популяций красной полевки часто гораздо больше, чем географической, т.е. вид характеризуется низкой популяционной изменчивостью размеров черепа и не обнаруживает по этим признакам четко выраженных географических закономерностей.

Распространение. Красная полевка — восточно-палеарктический вид, заселяет всю лесную и лесотундровую зоны Якутии [Млекопитающие Якутии, 1971], этот вид отловлен по всей обследованной территории, кроме дельты Лены (рис. 3.31).

Ландшафтное и биотопическое распределение. Долина Лены. В долине средней Лены на широте г. Якутска, как и в других точках ареала, красная полевка селилась в основном в таежных стациях. В пойме была немногочисленна, причем численность вида ниже в биотопах низкой поймы (рис. 3.32). В равнинно-таежном ландшафте, в пределах II надпойменной террасы, наиболее благоприятные условия для существования вид находит в смешанных лесах, где он являлся доминантом, как и в остальных местообитаниях этого выдела, за исключением луга на берегу озера.

Таблица 3.32
Морфометрические показатели красной полевки долин рек Северной Якутии (перезимовавшие особи)

Промеры	Бассейн Яны*			Долина Индигирки			Долина Колымы		
	n	$M \pm m$	limit	n	$M \pm m$	limit	n	$M \pm m$	limit
Масса тела, г	—	—	—	92	29,3 ± 0,34	27,0–36,9	4	24,8 ± 1,40	20,8–27,3
Длина тела, мм	12	98,5 ± 1,34	93,0–109,0	123	103,3 ± 0,46	87,0–115,3	5	93,1 ± 1,71	88,5–97,3
Длина хвоста, мм	11	27,3 ± 0,67	25,0–30,0	125	26,9 ± 0,29	19,0–35,8	5	23,9 ± 1,50	19,9–25,8
Длина плюсны, мм	—	—	—	125	16,3 ± 0,08	14,2–18,8	5	16,4 ± 0,14	16,0–16,8
Высота ушной раковины, мм	—	—	—	106	13,0 ± 0,13	8,8–16,3	5	13,1 ± 0,47	12,0–14,8
Промеры черепа, мм:									
кондилобазальная длина	12	23,0 ± 0,2	22,1–24,0	99	23,8 ± 0,06	22,5–25,2	4	22,4 ± 0,10	22,2–22,7
длина носовых костей	—	—	—	114	7,2 ± 0,03	6,2–8,1	5	6,7 ± 0,23	5,9–7,2
длина верхнего зубного ряда	18	5,0 ± 0,07	4,7–5,5	109	4,9 ± 0,02	4,5–5,5	7	5,0 ± 0,20	4,8–5,8
длина диастемы	17	6,6 ± 0,08	5,8–7,2	112	7,4 ± 0,03	6,2–8,5	7	7,0 ± 0,07	6,7–7,2
скуловая ширина	10	12,8 ± 0,1	12,1–13,3	99	13,4 ± 0,04	12,5–14,5	7	12,3 ± 0,22	11,1–13,0
межглазничная ширина	16	3,7 ± 0,1	3,4–3,9	121	3,7 ± 0,01	3,3–4,2	8	3,9 ± 0,05	3,7–4,2
высота в области слуховых барабанов	—	—	—	105	8,6 ± 0,02	7,3–9,5	7	8,6 ± 0,04	8,5–8,7

* По [Млекопитающие Якутии, 1971].

Рис. 3.31. Места отлова красной полевки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

На III надпойменной террасе максимальное обилие вида отмечено в березняках травянистых. В других местообитаниях выдела численность вида была значительно ниже, но во всех случаях красная полевка являлась доминантом сообщества [Вольперт и др., 1997].

В другой точке долины средней Лены — в районе устья Вилюя (т. «Лепписке») красная полевка также предпочитала таежные стации. По данным отлова конусами, в равнинно-таежном ландшафте она была наиболее многочисленной в смешанных хвойно-лиственных лесах (рис. 3.33), где у этого вида зарегистрирован максимальный индекс доминирования. Но в этом биотопе нами не отлавливались перезимовавшие самки, а основу населения составляли прибылые зверьки, причем среди последних процент размножавшихся был выше, чем в молодых лиственничниках и лиственничниках мохово-брусничных, где шло активное размножение перезимовавших животных.

По данным многолетнего отлова давилками, в весенний период численность вида была максимальной на старой гари, в лиственнично-еловом лесу и в лиственничнике мохово-брусничном. Коэффициент верности биотопу был выше для первого из перечисленных местообитаний, так как высокая захламенность создает хорошие

Рис. 3.32. Пространственное распределение красной полевки в т. "Якутск". Биотопы: низкая пойма: 1 — луг, 2 — кустарник; высокая пойма: 3 — луг, 4 — кустарник; II надпойменная терраса: 5 — луг на берегу озера, 6 — смешанный лес на берегу озера, 7 — березняк, 8 — смешанный лес на склоне, 9 — сосняк, 10 — оstepненный склон; III надпойменная терраса: 11 — березняк разнотравный, 12 — березняк брусничный, 13 — сосново-лиственный лес.

Рис. 3.33. Пространственное распределение красной полевки в т. "Лепписке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; равнинно-таежный ландшафт: 7 — молодые лиственные леса, 8 — лиственные леса мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; горно-таежный ландшафт: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

защитные условия и обеспечивает благоприятный газовый режим при подснежном существовании вида [Сафронов, 1983]. В предзимний период максимальная численность отмечалась в молодых лиственных лесах.

Если оценивать значение биотопов в жизнедеятельности вида по КВБ, то как стадия переживания зимнего периода выделяются четыре наиболее благоприятных местообитания, один индифферентный биотоп — молодой лиственный лес и три менее благоприятных. В предзимний период (осенний учет численности) также можно выделить четыре наиболее благоприятных биотопа, но состав их несколько изменяется: молодой лиственный лес попадает в наиболее благоприятные стадии, а мохово-брусничный переходит в класс индифферентных.

Таким образом, в равнинно-таежном ландшафте красная полевка находит наиболее благоприятные условия для существования в лиственных лесах разных типов. Для выживания вида в зимних условиях большое значение имеет захлаженность биотопа, поскольку запасы зимних кормов этого вида практически не лимитированы. По данным абсолютного учета, проведенного в лиственном лесу мохово-брусничном, плотность населения вида в 1984 г. равнялась 113 особей на 1 га.

В горно-таежном ландшафте к наиболее предпочитаемым как в весенний, так и в осенний период относятся старые гари и долины небольших ручьев.

К наиболее предпочитаемым местообитаниям красной полевки в пойме надо отнести, в первую очередь, редко затопляемые участки высокой поймы, поросшие смешанным лесом и незатопляемые ивняками (рис. 3.33). Эти биотопы являются для красной полевки не только местом переживания паводка, как для других видов, обитающих в пойме, но и стадиями размножения. Процент беременных молодых и перезимовавших самок тут был наиболее высоким, в особенности в лесных формациях, приуроченных к гривам (рис. 3.34). По-видимому, бурная кустарниковая растительность, характерная для грив, создает, с одной стороны, хорошие защитные условия, с другой — разнообразную кормовую базу. Ельники менее пригодны для существования вида, процент перезимовавших особей тут ниже, а размножавшихся самок не отмечено. Самая низкая численность красной полевки отмечена в зоне регулярного затопления, на заливных лугах и в ивняках. В указанных биотопах красная полевка практически не размножается, перезимовавшие особи представлены только очень небольшим количеством самок (рис. 3.34), которые в период гона активно перемещаются по территории. Абсолютный учет, проведенный в 1984 г. на участке высокой поймы, показал высокую плотность вида — 106 особей на 1 га.

Таким образом, в долине средней Лены красная полевка — один из основных видов равнинно-таежного и горно-таежного ландшафтов, являясь доминантом или содоминантом в подавляющем большинстве биотопов [Ревин и др., 1982], и явно менее многочисленна в пойменном комплексе, где поселения вида связаны с немногочисленными участками высокой поймы.

В долине нижней Лены (т. "Бесюке") численность вида в период наших исследований была довольно высокой. В равнинно-таежном

Рис. 3.34. Демографическая структура населения красной полевки в пойменных биотопах.

ландшафте к наиболее предпочитаемым биотопам относятся лиственничники мохово-лишайниковые, где красная полевка является безусловным доминантом.

В пойменном комплексе наиболее многочисленна на участках высокой поймы, поросших кустарниками, но индекс доминирования даже в этом биотопе невелик [Вольперт и др., 1988]. Совсем не отлавливалась красная полевка на заливных лугах, что характерно для этого вида, избегающего открытых местообитаний [Попов, 1964, 1975]. Относительно высокая численность вида в регулярно затапливаемых ивняках объясняется миграцией из прилегающего лиственничника мохово-лишайникового; по нашим наблюдениям, это обычное явление [Вольперт, 1983].

В долине Яны в аласно-таежном ландшафте наибольшей численности вид достигал в ольховниках, где составлял более 50 % сообщества; менее многочисленной красная полевка была в лиственничниках-зеленомошниках.

В горно-таежном ландшафте, по данным отлова конусами, относительно высокая численность отмечена в лиственничнике лишайниковом. В пойме численность красной полевки в августе была невысокой. Наибольшая численность вида зарегистрирована в мертвопокровных лиственничниках, представляющих в данном случае высокую пойму.

Таким образом, в долине Адычи, как и в долине Лены, красная полевка предпочитает аласно-таежный и горно-таежный ландшафты, достигая высокой численности в лиственничниках и ольховнике, которые характеризуются хорошими защитными условиями.

Долина Индигирки. В т. "Шаманово", по усредненным результатам 4-летних наблюдений, показатели обилия красной полевки близки для большинства обследованных таежных биотопов (рис. 3.35). На площадке абсолютного учета площадью 1 га в мохово-лишайниковом лиственничнике в 1988 г. обитало 47 экз. данного вида, в 1989 г. плотность населения снизилась до 29 особей.

Помимо численности вида, существует другой объективный критерий оценки предпочтения местообитаний — демографическая структура поселений. Применение демографического анализа позволило выявить, что в биотопах притеррасной поймы обитают в основном прибылые красные полевки, среди них крайне низок процент размножающихся особей, а перезимовавшие представлены только самцами, т.е. имеет место структура, отражающая сугубо временный характер поселений (рис. 3.34). Несмотря на явное предпочтение красной полевкой таежных местообитаний, надо отметить, что они играют неодинаковую роль в жизни вида. В озерно-таежном ландшафте более сухой из двух обловленных типов леса — мохово-голубичный лиственничник — отличается относительно большей

Рис. 3.35. Пространственное распределение красной полевки в т. "Шаманово".

Биотопы: **озерно-таежный ландшафт**: 1 — лиственный мохово-голубичный, 2 — лиственный бруснично-моховый; **пойма левого берега**: 3 — регулярно затопляемые ивняки; **острова**: 4 — хвощатники, 5 — лиственный мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; **пойма правого берега**: 7 — хвощатники, 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; **горно-таежный ландшафт**: 10 — осыпь; 11 — лиственный мохово-лишайниковый; 12 — лиственный голубично-моховый; 13 — лиственный моховый переувлажненный.

долей перезимовавших животных, а также более активным участием в репродукции сеголеток. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, указывает на него как на стацию размножения вида.

В горно-таежном ландшафте структуру поселений, сходную с пойменной, имеют два биотопа — каменистая осыпь, являющаяся переходной стацией от гор к пойме, и марь. Три типа лиственных биотопов близки по демографической структуре, но наиболее влажный (моховый переувлажненный) характеризуется наибольшей долей перезимовавших животных, в двух других активнее размножались сеголетки. В целом для всех лесных стаций отмечена обратная зависимость репродуктивной активности прибылых особей от процента перезимовавших самок в поселении. Аналогичное явление отмечено в литературе: известно, что созревание молодых самок родственного вида — красно-серой полевки — зависит от плотности населения, прежде всего взрослых половозрелых самок [Saitoh, 1981].

В целом красная полевка в долине нижней Индигирки отловлена во всех типах местообитаний, стациями переживания неблагоприятных периодов для нее служат лиственные биотопы на коренных берегах или аналогичные биотопы на островах высокой поймы.

В среднем течении реки, в т. "Белая Гора" в год исследований в озерно-таежном ландшафте наблюдалась глубокая депрессия численности вида. Поселения красной полевки сохранялись только в лиственных биотопах мохово-брусничных, причем численность в при-

брежных лиственных биотопах достигала 15 попаданий на 100 ловушко-сут, что значительно выше среднего уровня по ландшафту. В горно-таежном ландшафте численность, по данным отлова давилками, несколько выше, чем в равнинно-таежном, максимальной численности этот вид достигал в лиственных биотопах мохово-багульниковых.

В пойменном комплексе, по данным отлова конусами, численность была наибольшей в хвощатниках, но индекс доминирования выше в лиственных биотопах, так же как и численность по данным отлова давилками, т.е. наблюдается общее для всех долин явление — предпочтение красной полевкой высокой поймы.

Таким образом, красная полевка и здесь предпочитает озерно-таежный и горно-таежный ландшафты, достигая максимальной численности в среднеувлажненных лиственных биотопах, где и переживает периоды депрессии численности.

В двух других точках среднего течения реки численность существенно различалась, хотя исследования проводились в один и тот же сезон. В районе Момского хребта численность красной полевки, как и других мышевидных грызунов, была низкой — в среднем 6,5 экз./100 конусо-сут., наиболее высок этот показатель был в сыром островном лиственном биотопе. Ниже по течению, в равнинной части долины (т. "Кебергено") красная полевка была многочисленной во всех обследованных биотопах. На этом участке долины оба коренных берега реки представлены озерно-таежным ландшафтом, наиболее плотно зверьки заселяли прирусловые лиственные биотопы, это предпочтение подтверждается и демографической структурой поселений: здесь было отловлено больше взрослых особей, а также наиболее высок процент размножавшихся прибылых самок.

Таким образом, как и в предыдущих долинах, красная полевка устойчиво предпочитает таежные ландшафты. Предпочтение конкретных местообитаний может изменяться в зависимости от метеорологических условий года. При этом вид находит наиболее благоприятные условия в среднеувлажненных лиственных биотопах.

Долина Колымы. В т. "Поповка" в пределах равнинно-таежного ландшафта красная полевка отмечалась в лиственных биотопах высокой увлажненности, но нигде не доминировала, уступая по численности средней бурозубке. В горно-таежном ландшафте этот вид доминировал в мохово-голубичном лиственном биотопе и на осыпи и содоминировал в редкостойном лиственном биотопе. В пойме отлавливался исключительно в биотопах высокой поймы, максимальной численности достигая в незатопляемых ивняках.

В пойменном комплексе в т. "Мангазейка" численность вида была наиболее высокой в лиственных биотопах-зеленомошниках, приуроченных к высокой пойме. На высокую численность красной полевки в пойменных лиственных биотопах для этой долины указывает

В.Г. Кривошеев [1964]. В типично пойменных местообитаниях численность вида была очень низкой. В озерно-таежном ландшафте максимум зарегистрирован в лиственничниках мохово-брусничных, где у этого вида был наибольший индекс доминирования, и в березняках. Последний биотоп явно превосходит лиственничник по запасам летних кормов, которые, впрочем, в этот период весьма разнообразны [Попов, 1964]. В целом в долине верхней Колымы красная полевка активно использует озерно-таежный ландшафт и, кроме того, заселяет с высокой численностью ограниченные участки высокой поймы.

В долине средней Колымы красная полевка предпочитает таежные ландшафты, придерживаясь лиственничников-зеленомошников, которые являются станциями как переживания зимнего периода, так и размножения.

В озерно-таежном ландшафте к наиболее благоприятным биотопам можно отнести лиственничники, расположенные между заболоченными пространствами и, кроме того, лиственничники мохово-брусничные, приуроченные к берегам реки (рис. 3.36). Эти биотопы являются основными станциями размножения вида в указанном ландшафте.

В горно-таежном ландшафте численность красной полевки была очень низкой, в период исследований — выше в лиственничниках мохово-голубичных, где вид размножался гораздо интенсивнее, чем в лиственничниках лишайниковых; в первом биотопе чаще встречались перезимовавшие животные, что указывает на лиственничники мохово-голубичные как на одну из основных стадий переживания зимнего периода в горно-таежном ландшафте. Сезонные колебания численности при этом имели больший размах, чем годовые. Если В.Г. Кривошеев [1964] отмечает максимальный прирост численности за период репродукции в 8 раз, то в наших материалах этот показатель доходит до 20 раз.

Как и в рассмотренных выше долинах, красная полевка в пойме средней Колымы населяет с наибольшей плотностью участки высокой поймы, причем перезимовавшие особи чаще встречаются в незатапливаемых ивняках. Прибылые зверьки размножаются во всех биотопах поймы; за исключением регулярно затапливаемых ивовых зарослей (рис. 3.34).

Таким образом, по всей исследованной территории в пределах равнинно-таежного, аласно-таежного и горно-таежного ландшафтов красная полевка отдает предпочтение лиственничникам-зеленомошникам и старым гарям, поросшим молодым лиственничником. В периоды подъема численности красная полевка с высокой плотностью заселяет самый широкий круг биотопов, что указывает на ее высокую эвритопность. С наименьшей интенсивностью она

Рис. 3.36. Пространственное распределение красной полевки в т. "Жирково".

Биотопы: низкая пойма: 1 — ивняки, 2 — ветниковые луга; высокая пойма: 3 — лиственничник, 4 — ивняки; озерно-таежный ландшафт: 5 — лиственничники на грибах, 6 — лиственничники мохово-брусничные, 7 — ивняки; горно-таежный ландшафт: 8 — лиственничники лишайниковые, 9 — лиственничники мохово-голубичные.

заселяет пойму, особенно избегая низких, легко затапливаемых участков.

Питание красной полевки в Якутии изучено достаточно подробно [Кривошеев, 1964; Попов, 1964; Кривошеев, Попов, 1968; Ревин, 1968; Млекопитающие Якутии, 1971; Соломонов, 1973; Сафронов, 1983]. В европейской части ареала вид питается в основном семенами [Попов, 1960], в Якутии основными кормами являются зеленые части растений, ягоды голубики и брусники, а в подснежный период жизни — лишайники и мхи [Сафронов, 1983]. По нашим данным, лишайники могут играть существенную роль в питании красной полевки и в бесснежный период, что наблюдалось в июне 1979 г. в долине средней Лены (рис. 3.37).

Как правило, в июле основным объектом питания являлись зеленые части растений, которые, в зависимости от особенностей года, сохраняют свое значение иногда и в августе, как это было в долине средней Лены в 1980 г. и в долине средней Колымы в 1982 г. В отдельных случаях зеленые летние корма поедаются гораздо реже при возрастании роли грибов и семян. В сентябре увеличивается доля кормов, характерных для зимнего рациона вида, но в отдельные годы при высокой встречаемости в желудках семян подобного не наблюдалось, т.е. переход на зимний тип питания в случае обилия семян происходит позже.

В питании красной полевки в низовьях Индигирки имеются некоторые особенности. В июне в рационе вида неизменно большое

Рис. 3.37. Изменение рациона красной полевки в теплый период года.

Виды корма: 1 — лишайники, 2 — мхи, 3 — зеленые корма, 4 — ягоды, 5 — грибы, 6 — семена, 7 — прочие корма.

значение имеют лишайники, реже — прошлогодние ягоды брусники и мхи (рис. 3.37). Эти группы кормов относятся к зимним, и неудивительно, что в регионе, где снег сходит в конце мая — начале июня, они продолжают играть большую роль в начале теплого периода. Июль характеризуется повышением частоты поедания зеленых кормов, а также появлением в рационе ягод голубики, брусники, шикши и грибов. Строго говоря, только два месяца в нижнем течении Индигирки являются летними — июль и август. Именно в этот период отмечено наибольшее разнообразие поедаемых лесными полевками кормов, но, в отличие от красно-серой, красная полевка имеет гораздо более бедный рацион, значительно реже поедает ягоды, чаще — грибы.

Рацион красной полевки в низовьях Индигирки в течение первых трех лет исследований имел общие черты, но тем не менее отмечены и ярко выраженные годовые различия в частоте поедания некоторых групп кормов, обусловленные прежде всего погодными условиями в период исследований. Так, встречаемость грибов в желудках красных полевков колебалась от 6,3 (1987 г.) до 31,9 % (1988 г.), что отражает колебания урожайности этого вида корма, зависящие от количества осадков в конце лета. Частота поедания грибов в течение трех сезонов различалась на статистически значимом уровне (по критерию χ^2 $p < 0,001$). Кстати, достоверность различий в потреблении основных групп кормов — зелени, мхов, ягод, лишайников — различается по критерию Пирсона на уровне значимости $p < 0,01-0,02$.

В целом для нижеиндигирской популяции красной полевки можно отметить ряд особенностей питания: относительно высокая доля зеленых кормов и незначительный процент встречаемости в желудках ягод (сходство с питанием полевков в долине средней Лены), а также неизменно высокий процент лишайников (эта черта сближает с красными полевками из бассейна Яны, в рационе которых встречаемость лишайников не опускалась ниже 20,6 % даже в летние месяцы) [Попов, 1964]. Мы считаем, что более частое, чем в других частях ареала, поедание зелени и лишайников на северном пределе распространения говорит об ограниченности запасов других летних кормов и их зависимости от погодных условий, а высокая степень достоверности годовых различий в частоте поедания разных кормов свидетельствует о высокой трофической пластичности вида.

Перечисленные выше факты указывают на высокую трофическую пластичность красной полевки, благодаря которой вид питается теми кормами, которые в данный период имеются в изобилии. При этом важна способность переходить от питания высококалорийными кормами (семена) к низкокалорийным (зеленые части растений, лишайники). Если урожайность семян, грибов и ягод может

существенно колебаться по годам, то запасы зеленых частей растений, лишайников и мхов практически постоянны. По-видимому, полифагия является одной из причин широкого распространения и доминирования вида в различных ландшафтах.

Размножение. Период размножения красной полевки в Якутии длится до 5 мес (апрель — сентябрь), но в разных регионах эти сроки могут несколько варьировать [Млекопитающие Якутии, 1971]. На наш взгляд, сроки начала и окончания размножения меняются в зависимости не столько от региона, сколько от конкретной ситуации, сложившейся в том или ином году. Так, в долине средней Лены размножение, как правило, начинается во второй декаде мая, но в 1984 г. 3 мая была отловлена самка, беременная уже вторично, т.е. размножение началось в данном случае в середине апреля, задолго до схода снежного покрова. Заканчивается размножение в первых числах сентября, последняя беременная самка была отловлена 24 августа.

Уже в первой декаде сентября как у перезимовавших, так и у прибылых самцов, принимавших участие в размножении, семенники были с явными признаками деградации. В долине Колымы размножение в годы исследований начиналось в мае или в конце апреля (хотя на более ранние сроки для долины этой реки указывает В.Г. Кривошеев [1964]), заканчивалось воспроизводство в начале сентября.

Сроки окончания размножения зависят, на наш взгляд, не только от факторов абиотической среды, но и от плотности популяции и фазы динамики численности, на которой находится популяция. Так, в долине Адычи нами зарегистрировано прекращение размножения в июле, в первой половине августа была отловлена всего одна беременная самка, а основная масса самок были яловыми, несмотря на то что они достигли двухмесячного возраста; в норме двухмесячные самки в это время активно размножаются.

В низовьях Индигирки начало репродуктивного периода вида приходится на конец мая: 19 июня 1987 г. отловлена самка, родившая примерно за 5 дней до этого, т.е. спарившаяся примерно 23–24 мая. В 1988 г. размножение началось позднее: первые беременные самки, оплодотворенные 5–6 дней назад, были пойманы 9 июня; в 1989 г. 11 июня поймана самка, родившая более недели назад. Сроки окончания размножения, как и у других видов, здесь варьируют в зависимости от фазы численности и погодных условий года. В 1987 г. перезимовавшая самка, родившая 17 августа, поймана в день родов, а кормящие попадались вплоть до окончания отлова — 7 сентября. В 1988 г., характеризовавшемся ранним похолоданием и затяжными дождями в августе, основная волна размножения закончилась к третьей декаде июля (вплоть до 20-го попадались самки, сроки родов

которых пришлось бы на 25–29 июля), но и после этой волны 2 августа отловлена одна беременная самка. В 1989 г. размножение интенсивно шло вплоть до середины сентября: 3-го числа поймана беременная самка с эмбрионами недельного возраста. Самцы, способные к воспроизводству, отмечались вплоть до начала сентября (табл. 3.33).

Таким образом, у красной полевки на северном пределе ареала наблюдается сокращение периода репродукции примерно на месяц.

Репродуктивная активность перезимовавших зверьков практически не подвержена колебаниям по годам и относительно слабо изменяется в течение периода размножения. В мае и июне абсолютное большинство отловленных перезимовавших самок были беременными, причем в июне уже повторно, в августе они попадаются все реже, в сентябре беременных самок этой возрастной группы нами не отловлено. Перезимовавшие самцы, судя по массе семенников и развитию придатков, находятся в состоянии гона с апреля по конец августа [Ревин и др., 1988; Шадрина, Вольперт, 1995б].

Степень участия в размножении прибылых зверьков сильно изменялась как в течение сезона (табл. 3.33), так и по годам во всех точках многолетних наблюдений [Ревин и др., 1988; Шадрина, Вольперт, 1995а, б]. Первые массовые выходы молодых отмечались нами

Таблица 3.33
Степень участия в размножении прибылых особей красной полевки, %

Месяц	1 месяц				2 месяца				3–4 месяца			
	Самцы		Самки		Самцы		Самки		Самцы		Самки	
	<i>n</i>	размно- жавшие- ся	<i>n</i>	размно- жавшие- ся	<i>n</i>	размно- жавшие- ся	<i>n</i>	размно- жавшие- ся	<i>n</i>	размно- жавшие- ся	<i>n</i>	размно- жавшие- ся
<i>Долина средней Лены</i>												
Июнь	3	0,0	6	16,6	2	0,0	1	0,0	—	—	—	—
Июль	39	0,0	21	4,8	38	81,6	21	66,7	1	100	1	100
Август	54	1,9	24	12,5	56	28,6	21	45,8	5	100	14	100
Сентябрь	74	0,0	58	0,0	172	0,0	118	0,0	11	0,0	37	0,0
<i>Долина средней Колымы</i>												
Июнь	3	0,0	5	40,0	13	92,3	3	100	—	—	—	—
Июль	1	0,0	5	40,0	13	92,3	3	100	—	—	—	—
Август	24	0,0	19	0,0	28	0,0	24	0,0	4	50,0	8	100
Сентябрь	20	0,0	15	0,0	27	0,0	36	0,0	4	0,0	4	100
<i>Долина нижней Индигирки</i>												
Июнь	2	0,0	5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Июль	132	10,6	94	27,7	19	39,8	20	55,0	—	—	—	—
Август	156	1,3	95	2,1	47	23,4	31	25,8	3	100	18	100
Сентябрь	88	0,0	77	0,0	69	0,0	47	5,9	3	100	25	100

во все годы исследований в июне. Как правило, зверьки младше месячного возраста в этом же месяце еще не успевают приступить к размножению, но в отдельные годы у небольшой части самок этой возрастной группы в июне было зарегистрировано начало беременности. В июле двухмесячные самки массово приступают к размножению, одновозрастные самцы достигают половозрелости менее дружно. В августе первопометники, достигшие к этому времени трехмесячного возраста, как правило, представлены лактирующими самками и половозрелыми самцами, а степень участия в размножении 2-месячных зверьков значительно колеблется по сезонам. В сентябре, как указывалось выше, размножение затухает, в редких случаях, как наблюдалось в сентябре 1979 г. в долине средней Лены, отдельные прибылые самки 3–4-месячного возраста были беременны (табл. 3.33).

В нашу задачу не входит анализ механизмов, определяющих колебания численности мышевидных грызунов, которые, несмотря на активное изучение, во многом до сих пор неясны. Имеется несколько гипотез, в частности гипотеза стресса [Christian, Davis, 1964] и гипотеза генетического отбора [Chitty, 1960; Boonstra, Krebs, 1979]. В данном случае отметим только, что полевки обоих полов, достигшие в августе 3–4-месячного возраста, во все годы исследований активно участвовали в размножении. Наиболее вариабельна интенсивность репродукции зверьков, достигших к августу 2-месячного возраста, они могут активно размножаться в этом месяце, в особенности самки (как наблюдалось в 1980 г. в долине средней Лены, в 1982 г. в долине средней Индигирки), или практически не принимать участия в размножении в этот период (как это было в 1979 г. в долине средней Лены, в 1981–1982 гг. в долине средней Колымы, в 1983 г. в долинах верхней Колымы и Адычи, в 1983–1984 гг. в долине нижней Лены). Последнее обстоятельство ярко выражено в лесотундровой зоне, где участие этой возрастной группы в воспроизводстве колебалось от 0 до 75 %.

По мнению И. Андерсона и Р. Бунстра [Anderson, Boonstra, 1979], возраст полового созревания зависит от фазы популяционного цикла. Не исключено, что репродуктивная активность прибылых особей может регулироваться численностью другого вида. Так, в долине Индигирки в период подъема численности лесного лемминга в горно-таежном ландшафте репродуктивная активность прибылых красных полевок была крайне низкой — ни одного размножавшегося самца, а среди самок размножалось только 14 %. В то же время в озерно-таежном ландшафте, на фоне спада численности лесного лемминга, участие в воспроизводстве прибылых красных полевок составило 3,1 для самцов и 32 % для самок [Шадрина, Вольперт, 1995б].

Перезимовавшие самки за сезон приносят до трех пометов, а прибылые, рожденные в мае, — два помета. В 1979 г. в долине средней Лены нами была отловлена 4-месячная самка в начале третьей беременности, хотя ранее считалось, что самки-сеголетки в условиях Якутии успевают принести только два помета [Попов, 1964; Ревин, 1968].

Репродуктивная активность перезимовавших особей почти не подвержена годовым колебаниям и относительно слабо меняется в течение репродуктивного периода: все 100 % самцов способны к спариванию в течение июня — августа и отдельные особи — в сентябре, самки наиболее интенсивно размножаются в июне — августе. Основными регулирующими численность механизмами являются степень вовлечения в репродукцию прибылых особей, которая может варьировать в разные годы у самцов от 0 до 17,6 %, у самок — 12,3–64 %, а также длительность сезона размножения, изменяющаяся в пределах 3–4 мес в зависимости от погодных условий года и фазы популяционного цикла. Можно считать установленным, что степень участия прибылых в размножении зависит от численности перезимовавших прежде всего самок [Шадрина, Вольперт, 1995а].

Плодовитость. Показатели ее мы рассматриваем по эмбрионам и послеплодным пятнам, поскольку результаты, полученные путем подсчета по каждому показателю отдельно, практически не различались между собой. Максимальная индивидуальная плодовитость, зарегистрированная при многолетних наблюдениях, равнялась 13 (по эмбрионам), но доля самок, приносящих такое количество детенышей, невелика [Ревин, Вольперт, 1982]. Отмечается определенная зависимость величины выводка от возраста самки. Статистически достоверна разница по величине помета перезимовавших и 1-месячных самок, а начиная с 2-месячного возраста плодовитость прибылых сравнима с таковой перезимовавших [Шадрина, Вольперт, 1995а].

При сравнении географической изменчивости величины выводка красной полевки (табл. 3.34) обнаруживается, что в обследованных районах наименьшая плодовитость зарегистрирована в долине средней Лены, она достоверно ниже, чем в долине верхней ($p < 0,05$) и средней Колымы ($p < 0,01$). Высокая плодовитость характерна для Северо-Восточной, Северо-Западной и Центральной Якутии, а в более южных районах этот показатель существенно ниже, как и в западной части ареала. Таким образом, как и у других видов, у красной полевки наблюдается тенденция повышения плодовитости в северном и северо-восточном направлениях, что видно даже в пределах одной Якутии. В этом отношении надо согласиться с мнением И.И. Мордосова [1984] о том, что происходит повышение плодовитости вида на севере по сравнению с более южными районами республики.

Таблица 3.34

Географическая изменчивость величины выводка красной полевки

Место сбора материала	n	M	m	Источник
Долина средней Лены	153	6,9	0,11	Наши данные
Долина средней Индигирки	28	7,2	0,30	Наши данные
Долина верхней Колымы	32	7,6	0,28	Наши данные
Долина средней Колымы	39	7,9	0,32	Наши данные
Долина Адзичи	9	8,0	0,58	Наши данные
Долина нижней Индигирки	191	7,2	0,10	Наши данные
Долина Яны	44	7,8	0,33	Кривошеев, Попов, 1968
Табалахская впадина	29	8,3	0,44	Лабутин, 1975
Центральная Якутия	140	7,9	?	Млекопитающие Якутии, 1971
Юго-Западная Якутия	185	7,18	?	Мордосов, 1984
Окрестности с. Эйк	232	7,86	?	Мордосов, 1984
Среднее течение р. Оленек	113	6,96	?	Мордосов, 1984
Долина р. Мал. Куонамка	192	7,67	?	Мордосов, 1984
Южная Якутия	219	5,82	0,07	Ревин, 1968
Долина верхней Лены	?	5,8	?	Реймерс, 1966
Чаунская низменность	39	7,6	0,50	Юдин и др., 1976
Анадырский край	16	7,6	?	Кривошеев и др., 1978
Низовья Оби	??	9,8	?	Шварц, 1959
Байкальская котловина	?	6,0	?	Швецов и др., 1980
Восточное Прибайкалье	48	6,46	?	Матурова, 1982
Алтай — Саяны	108	6,4	?	Юдин и др., 1979
Зейский заповедник	?	6,1	?	Бромлей и др., 1984
Кольский полуостров	?	6,45	?	Кошкина, 1957
Татария	?	6,6	?	Попов, 1960

В то же время величина выводка у нижеиндигирских красных полевок хотя и является одной из наиболее высоких по ареалу, но немного уступает янским и колымским популяциям вида. У красной полевки, как и у многих других мелких млекопитающих, наблюдается повышение плодовитости по мере продвижения на север и северо-восток ареала. Указанная тенденция, по-видимому, действует лишь в пределах лесной зоны, а в лесотундровой подзоне, на непосредственном крае ареала, намечается снижение этого показателя.

Возрастная структура популяции практически полностью отражает ход размножения. В июне, когда основная масса прибылых еще не вышла на поверхность, абсолютное большинство популяции составляют перезимовавшие особи (рис. 3.38). Начиная с июля в популяции преобладают молодые зверьки, а процент перезимовавших убывает, достигая к осени минимального значения. В июне молодые зверьки, как правило, представлены одномесячными полевыми. Только в долине средней Лены в конце июня 1979 г. отловлено несколько 2-месячных особей, что указывает на успешное начало размножения в апреле. По-видимому, отдельные самки вступают в размножение несколько раньше основной массы, и в результате период

Рис. 3.38. Возрастная структура популяций красной полевки.

лактации у них совпадает с бурным таянием снега, что должно отрицательно сказаться на выживаемости потомства; немногие выжившие особи не играют существенной роли в жизни популяции.

В июле, по обобщенным данным, в таежной зоне долин средней Лены и средней Колымы резко увеличивается процентное содержание 2-месячных полевок. Последняя возрастная группа в августе уже преобладает в популяции в указанных точках. В этом месяце резко уменьшается встречаемость в уловах перезимовавших животных и несколько возрастает процент зверьков 3-месячного возраста. В сентябре продолжает снижаться доля перезимовавших животных и прибылых первых генераций.

Последнее обстоятельство особенно хорошо выражено в долине средней Лены и вызвано, с одной стороны, интенсивной элимина-

цией среди первопометников [Большаков, 1972; Амстиславская, Ба-
лахонов, 1974; Ивантер, 1975], с другой — активным пополнением
популяции. Напротив, процент 2-месячных зверьков возрастает и
они совместно с 1-месячными составляют основу предзимней сен-
тябрьской популяции.

В лесотундровой зоне возрастная структура популяции красной
полевки имеет характерные особенности. В первую очередь, в июле
и августе, в отличие от ранее рассмотренных регионов, в популяции
абсолютно преобладают 1-месячные зверьки. Роль 2-месячных поле-
вок повышается только в сентябре, но и в этом месяце они уступают
по обилию 1-месячным животным. Таким образом, в зиму лесотунд-
ровые популяции уходят в более молодом составе, что определяется
сжатыми сроками репродукционного периода на северном пределе
ареала.

Анализ возрастной структуры популяции по ландшафтам вы-
явил, что старшие возрастные группы прибылых составляют в пойме
меньшую часть по сравнению с надпойменной террасой. Не исклю-
чено, что последнее вызвано более высокой элиминацией этой воз-
растной группы, поскольку эмбриональный и начало постэмбрио-
нального периода их жизни совпадают с весенним паводком, что оп-
ределяет высокую степень элиминации.

Половая структура популяции. Среди перезимовавших животных
в начале периода активной репродукции (июнь—июль), как прави-
ло, преобладают самцы (рис. 3.39), в отдельные годы в сентябре на-
блюдается численный сдвиг в сторону самок, что объясняется повы-
шением подвижности последних после окончания размножения, а
также более высокой смертностью самцов. Во всех обследованных
долинах в сентябре в уловах среди старших возрастных групп сеголе-
ток преобладали самки, тогда как в июне и июле, когда эти генера-
ции были в возрасте 1–2 мес, чаще отлавливались самцы, т.е. за два
месяца изменялась половая структура этой возрастной группы. По
данным Ф.Б. Чернявского и Г.Е. Короленко [1979], среди молодняка
преобладание самцов выражено меньше, чем у перезимовавших. В
то же время в лесотундровой зоне среди старших возрастных групп в
конце сезона репродукции полностью преобладали самки, по-види-
мому, самцы к этому времени уже элиминируют из популяции.

Некоторые авторы отмечают существование связи между изме-
нением соотношения полов по годам и изменением численности: в
годы максимальной численности соотношение полов стремится к
1:1, в годы депрессий равновесие смещается в сторону самцов 2:1
[Тестов, 1983]. В наших материалах изменения полового состава по-
пуляции, которые связаны с активностью определенных возрастных
групп в процессе репродукции, можно отметить для долины средней
Лены и нижнего течения Индигирки. Так, если в 1979 и 1980 гг. сре-

Рис. 3.39. Половая структура популяций красной полевки по точкам.

ди прибылых полевок наблюдалось преобладание самцов вплоть до сентября, то в 1984 г. соотношение полов среди этих же возрастных групп было близким к 1:1. Известно, что в зимний период, когда популяция находится в репродукционном покое, в указанном регионе характерно соотношение полов, близкое к 1:1 [Сафронов, 1983].

Изменения половой структуры популяции красной полевки, происходящие в течение сезона репродукции, не носят регуляторного характера, а, скорее, являются отражением происходящих в популяции процессов, что позволяет предположить их компенсаторный характер и согласиться с исследователями, считающими, что половая структура популяции является саморегулирующейся системой [Большаков, Кубанцев, 1984].

Нами обнаружены существенные различия между материалами, полученными методом обычного отлова и абсолютного вылова: если по результатам отлова самцы преобладали среди перезимовавших особей и составляли половину отловленных 3- и 4-месячных полевок, то по результатам абсолютного вылова получается преобладание самок во всех этих возрастных группах. Таким образом, при обычном отлове процент встречаемости самцов получается завышенным даже после окончания сезона размножения.

Оценивая роль красной полевки в таежной части региона, необходимо отметить ее высокую значимость и эвритопность. Благодаря широкому распространению и способности к интенсивному размножению, этот вид способен достигать высокой численности в широком круге местообитаний.

3.11. Сибирский лемминг — *Lemmus sibiricus* Kerr, 1792

Морфометрическая характеристика. Среди перезимовавших особей сибирского лемминга в северотаежной подзоне нижнего течения Индигирки самки немного меньше самцов, имеют более длинный хвост и относительно более высокий и широкий череп, тем не менее значительных морфометрических различий по полу не прослеживается, поэтому мы рассматриваем суммарные данные по самцам и самкам (табл. 3.35). При сравнении с другими северо-восточными популяциями вида обнаружено, что сибирские лемминги из указанной точки существенно крупнее особей, обитающих в тайге Колымской низменности [Млекопитающие Якутии, 1971], но уступают по размерам особям из тундровых популяций. Эта тенденция к увеличению размеров тела у сибирского лемминга по направлению к северу отмечалась ранее [Млекопитающие Якутии, 1971]. Череп леммингов из лесотундры относительно широкий (скуловая ширина составляет

Таблица 3.35

Морфометрические показатели сибирского лемминга якутских популяций (перезимовавшие особи)

Промеры	Лесотундра в долине Индигирки			Тайга Колымской низменности*			Материковые тундры*		
	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit	n	M ± m	limit
Масса тела, г	17	63,0 ± 2,68	43,0–77,9	17	38,2 ± 3,88	20,5–70,0	342	79,5	51,4–108,1
Длина тела, мм	20	129,9 ± 2,48	110,3–148,0	17	105,7 ± 4,58	80,0–131,0	342	128,2	—
Длина хвоста, мм	18	11,3 ± 0,42	9,2–15,5	—	—	—	—	—	—
Длина плюсны, мм	20	15,6 ± 0,31	10,5–17,3	—	—	—	—	—	—
Высота ушной раковины, мм	17	8,9 ± 0,20	8,0–10,7	—	—	—	—	—	—
Промеры черепа, мм:									
кондилобазальная длина	18	29,7 ± 0,30	28,4–31,8	10	26,2 ± 0,29	23,3–30,8	110	30,4 ± 0,02	24,1–34,0
длина носовых костей	20	8,9 ± 0,15	7,4–10,0	—	—	—	—	—	—
длина верхнего зубного ряда	20	9,5 ± 0,11	8,5–10,9	14	7,7 ± 0,18	7,0–9,2	71	8,7 ± 0,08	7,0–9,7
длина диастемы	20	8,5 ± 0,12	7,4–9,3	15	8,0 ± 0,30	6,7–10,0	—	9,6 ± 0,11	6,5–11,3
скуловая ширина	19	20,5 ± 0,24	18,8–22,0	—	—	—	—	—	—
вежглазничная ширина	20	3,8 ± 0,06	3,3–4,2	—	—	—	—	—	—
высота в области слуховых барабанов	18	10,5 ± 0,08	10,0–11,4	—	—	—	36	10,3 ± 0,15	8,0–11,5

* По [Млекопитающие Якутии, 1971].

69 % кондилобазальной длины), высокий (35,4 %), межглазничное сужение выражено умеренно (12,8 % при колебаниях от 11,1 до 14,1 % в разных популяциях).

Распространение. Сибирский лемминг — типичный тундровый вид, ареал которого тянется сплошной полосой вдоль арктического побережья Азии, от Урала до устья Колымы [Громов, Поляков, 1977]. В Якутии заселяет тундру, лесотундру и частично проникает в северные пределы тайги по долинам рек и заболоченным пространствам [Млекопитающие Якутии, 1971]. Нами представители этого вида отлавливались в тундровой зоне в дельте Лены и в северотасжной подзоне долин Лены, Яны и Индигирки (рис. 3.40). В долине средней Колымы нами сибирский лемминг не отмечен, хотя имеются данные, что он отлавливался около 40 км выше по течению В.Г. Кривошеевым [1964].

Биотопическое и ландшафтное распределение. В дельте Лены это самый массовый вид мелких млекопитающих, который заселяет практически все биотопические разности, за исключением аazonальных элементов ландшафтов: булгунняхов и пойменных лугов, где высокого обилия достигали серые полевки [Вольперт, Сапожников, 1996].

Рис. 3.40. Места отлова сибирского лемминга в районе исследований.

Усл. обозн. см. рис. 3.1.

В годы наших исследований (1993–1995) численность вида была довольно низкой, постепенно возрастая от 0,5 до 2,9 на 100 конусо-сут. При этом сибирский лемминг весь период исследований являлся абсолютным доминантом сообщества. Максимальная численность вида зафиксирована в горных тундрах. Такие же низкие показатели обилия отмечены в притундровых лесах долины Яны в 1994–1995 гг. По опросным сведениям, низкая численность леммингов была в указанные годы в нижнем течении Колымы и Индигирки.

Если в тундровой зоне этот вид заселяет все основные местообитания, то в тасжной его распределение гораздо сложнее. В.Г. Кривошеев [Млекопитающие Якутии, 1971] указывает, что все известные находки сибирского лемминга в лесотундре и тасжной зоне приурочены к пойменным и долинным ландшафтам, открытым и заболоченным местообитаниям, в лесных массивах он обычно не селится. В то же время на севере Дальнего Востока в бассейне р. Кегали отмечено проникновение вида в тасжную зону, где сибирские лемминги обнаружены во всех обследованных биотопах, наибольшей плотности достигая в заболоченных лиственничниках и ерниках, а также в пойменных лиственничниках и ивняках [Юдин и др., 1976].

В северотасжной подзоне долины Лены (устье р. Бесюке) этот вид нами отлавливался только в одном местообитании — прирусловом лиственничнике мохово-брусничном с довольно высоким уровнем попадания — 12,5 экз. на 100 конусо-сут [Вольперт и др., 1988].

В лесотундровой подзоне в долине Индигирки по результатам четырех лет исследований можно говорить о невысокой численности вида (1 экз./100 конусо-сут, индекс доминирования 3,4 %). При этом следует отметить мозаичность его биотопического распределения: в горно-тасжном ландшафте сибирский лемминг отмечен на каменистой осыпи и в двух типах лиственничников — мохово-лишайниковом и моховом переувлажненном, в озерно-тасжном — в бруснично-моховом лиственничнике, на притеррасной пойме — в редко затопляемых ивняках (рис. 3.41). Во всех перечисленных биотопах отловлены единичные экземпляры, в четырех из них — только в год более высокой численности (1987), но и тогда показатели обилия составили 0,1–0,9 экз./100 конусо-сут. Основная масса особей этого вида отловлена в биотопах островной поймы: в лиственничнике мохово-брусничном его численность в среднем была 12,5 экз./100 конусо-сут (в 1987 г. — 29,6), в редко затопляемых ивняках — 5,5 (в 1987 г. — 16,0). Относительно высокая численность в течение первых двух лет исследований сменилась глубокой депрессией в 1989 и 1990 гг., когда не было поймано ни одного животного этого вида.

Судя по численности и демографической структуре поселений в островных биотопах, стадией размножения для вида является островной лиственничник: процент перезимовавших самцов в нем та-

Рис. 3.41. Пространственное распределение сибирского лемминга в т. "Шаманово".

Биотопы: озерно-таежный ландшафт: 1 — лиственничник мохово-голубичный, 2 — лиственничник бруснично-моховый; пойма левого берега: 3 — регулярно затопляемые ивняки; острова: 4 — хвощатники, 5 — лиственничник мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; пойма правого берега: 7 — хвощатники; 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; горно-таежный ландшафт: 10 — осыпь, 11 — лиственничник мохово-лишайниковый; 12 — лиственничник голубично-моховый; 13 — лиственничник моховый переувлажненный.

кой же, как и в ивняке, но репродуктивная активность прибылых и общая их численность значительно выше. Большой размах колебаний численности сибирского лемминга, его процветание в биотопе, самом малозаселенном другими представителями мелких млечопитающих как в количественном, так и в качественном отношении, указывают на сложность существования вида на южной периферии ареала.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что сибирский лемминг, в островной пойме предпочитающий лесные стадии, в лиственничниках на коренных берегах малочислен, причем отловленные там прибылые не размножались. Не исключено, что столь необычное расселение вида в районе исследований складывается под влиянием конкурентного исключения со стороны таежных доминантов — красной полевки и лесного лемминга.

Питание сибирского лемминга в тундре хорошо изучено. По материалам Т.Н. Дунаевой [1948], основным кормом вида служат осоки, К.И. Копеин [1958] к ним добавляет пушицы и хвощ, а С.П. и Т.В. Кирющенко [1979] указывают, прежде всего, осоки, пушицы и мхи.

При анализе содержимого желудков сибирского лемминга мы выделяли только три группы кормов — зелень, мхи и хвощ. Из них чаще всего отмечено поедание хвоща полевого (55,6 % наполненных желудков), зелень и мхи встречались реже — соответственно 24,4 и

20 % ($n = 67$; пустых желудков 32,8 %). По-видимому, такое необычное соотношение кормов можно объяснить нетипичными местообитаниями, в которых излюбленные корма (пушицы и осоки) представлены слабо, а хвощ произрастает в изобилии.

Размножение сибирского лемминга в тундровой зоне изучено достаточно полно. Многими исследователями показано, что для этого вида характерно наличие подснежного размножения, причем оно имеет решающее значение для достижения популяцией пика численности [Дунаева, 1948; Sutton, Hamilton, 1932; и др.]. Ф.Б. Чернявский и А.В. Ткачев [1982] на основе анализа многолетних данных по возрастному составу популяций сибирского лемминга в июне показали, что для него характерно ранневесеннее размножение под снегом на всех стадиях цикла численности, хотя интенсивность его сильно варьирует. Летнее размножение вида обычно начинается в первой декаде июня, а заканчиваться может в конце июля — середине августа [Чернявский, Ткачев, 1982; Чернявский и др., 1985], причем длительность репродуктивного периода зависит от фазы численности, многие авторы отмечают раннее окончание репродукции в фазе пика [Дунаева, Кучерук, 1941; Дунаева, 1948; Соколов и др., 1957], но иногда оно имеет место и в фазе спада численности [Krebs, 1964].

Начало летней репродукции у сибирского лемминга в низовьях Индигирки, по-видимому, приходится на конец мая — июнь. Так, 6 июля 1987 г. поймана вторично беременная взрослая самка с эмбрионами в возрасте 12–13 дней; в 1988 г. самка с эмбрионами такого же возраста отловлена 5 июля. Окончание размножения приходится на середину августа: в 1987 г. последняя беременная самка попала 12 августа, 20 августа 1988 г. — лактирующая, родившая примерно 2–5 дней назад. Последние самцы в состоянии гона пойманы 26 августа 1987 г.

Относительно роли подснежного размножения мы не можем делать категорических выводов из-за небольшого объема материала, собранного только в летнее время, но по весовой структуре популяции и краниологическим признакам условно разбили животных этого вида на три группы: перезимовавшие, зверьки весенних и летних генераций. Особей весенних генераций, по методике Т.В. Кошкиной и А.С. Халанского [1961], можно определить как 3–5-месячных, следовательно, их присутствие в июльской популяции говорит о наличии подснежного размножения. Эта возрастная группа составляла существенную долю в структуре вида в 1987 г. (при относительно высокой численности) и полностью отсутствовала в 1988 г., предшествовавшем глубокому спаду. Участие в размножении прибылых зверьков весенней генерации в 1987 г. составило для самок 100 %, для самцов — 83,3 %, среди особей, рожденных летом, эти показатели

были гораздо ниже — в репродукцию вступило 40 % самок и 17,4 % самцов; в среднем в течение этого репродуктивного сезона размножалось 76,9 % прибылых самок и 40 % самцов. В следующем сезоне в размножении участвовали 61,5 % самок и ни одного самца.

В период наших работ в дельте Лены в год минимальной численности в июле участие в размножении прибылых самок составило примерно 31 %, в 1995 г., когда численность была значительно выше, — 71 %.

Плодовитость сибирского лемминга в лесотундровой подзоне низовьев Индигирки в течение двух лет варьировала незначительно, но отмечены достоверные различия в плодовитости перезимовавших ($7,5 \pm 0,56$; $n = 6$) и прибылых самок ($5,0 \pm 0,64$; $n = 14$), т.е. последние приносят в среднем на 1,5–2 детеныша меньше (достоверность различий по Стьюденту $p < 0,01$). В целом этот показатель в таежной зоне несколько ниже, чем в тундре (табл. 3.36).

Половозрастная структура популяции. Возраст сибирских леммингов мы определяли по методике Т.В. Кошкиной и А.С. Халанского [1961], но ввиду малочисленности выборки разбили ее на три группы, как это делали Ф.Б. Чернявский и А.В. Ткачев [1982]: перезимовавшие, прибылые ранневесенних генераций и прибылые летних генераций. Все три группы хорошо различимы между собой по размерам тела и по степени развития черепных гребней.

В целом возрастная структура тундровых популяций сибирского лемминга отличается сложностью из-за наличия особей ранневесенних генераций, которые в зависимости от интенсивности подснеж-

ного и летнего размножения составляют в разные годы 28,7–40,7 % в летних уловах, доля перезимовавших и зверьков зимних генераций доходит до 37–53,3 %, а особей, рожденных летом, — 6–34,3 % [Чернявский и др., 1985]. Таким образом, в течение лета происходит почти полное обновление состава популяции. В лесотундровой подзоне в долине Индигирки в 1987 г. структура популяции была вполне типичной, за исключением очень малого процента перезимовавших животных (табл. 3.37), а в 1988 г. — была упрощенной в связи с отсутствием особей ранневесенних генераций, в июне этого года были отловлены только перезимовавшие особи. Сроки массового выхода молодых животных из гнезда косвенно отражает динамика попадания в летний период, в течение двух сезонов это происходило примерно в одни сроки: в I декаде июля, I декаде августа и в конце августа — начале сентября.

В дельте Лены в год минимальной численности ранневесенние зверьки составляли 34,5 % популяции, тогда как в 1995 г. на их долю пришлось только 6,7 %. При этом процент прибылых в целом практически не менялся — 86,0–86,6 % от всей выборки.

Половая структура популяции сибирского лемминга типична для мышевидных грызунов: соотношение полов паритетное, но во время репродуктивного сезона в уловах преобладают самцы [Чернявский, Ткачев, 1982]. Анализ пола эмбрионов сибирского лемминга показал, что в год нарастания численности самки составляли 47,7 % ($n = 176$), а в фазе пика — лишь 43,2 % ($n = 74$ [Чернявский и др., 1985]).

В лесотундре среди перезимовавших особей преобладали самцы, причем для 1988 г. это преобладание статистически значимо (по критерию Пирсона $p < 0,05$). Среди прибылых самцов отловлено боль-

Таблица 3.36
Географическая изменчивость величины выводка сибирского лемминга

Место сбора, источник, год	n	M	m
<i>Суммарная плодовитость (перезимовавшие и прибылые самки)</i>			
Колымская низменность [Чернявский и др., 1985], 1981 г.	20	6,8	0,3
1982 г.	120	6,7	0,2
1983 г.	138	7,0	0,2
Приколымская тундра [Млекопитающие Якутии, 1971], 1953 г.	?	7,45	0,2
1954 г.	?	5,92	0,31
Дельта Лены (наши данные)	8	5,5	0,53
Лесотундра в долине Индигирки (наши данные)	20	5,75	0,54
<i>Перезимовавшие самки</i>			
П-ов Таймыр [Куксов, 1975]	954	6,3	
П-ов Ямал [Дунаева, 1948]	94	6,5	
Долина Алазея [Соколов и др., 1957]	109	6,6	
Дельта Лены (наши данные)	4	6,7	
Лесотундра в долине Индигирки (наши данные)	6	7,5	0,56

Таблица 3.37
Половозрастная структура популяций сибирского лемминга в лесотундровой подзоне Индигирки

Год	Месяц	n	Соотношение возрастных групп, %			Перезимовавшие	Прибылые весенних генераций		Прибылые летних генераций	
			Перезимовавшие	Прибылые весенних генераций	Прибылые летних генераций		n	Из них самцов, %	n	Из них самцов, %
1987	Июль	9	22,2	66,7	11,1	2	50,0	6	100	100
	Август	41	4,9	34,1	61,0	2	100	14	42,9	25
	Сентябрь	3	33,3	0	66,7	1	0	—	—	2
	В целом	53	9,4	37,8	52,8	5	60	20	60	28
1988	Июнь	4	100	0	0	4	100	—	—	—
	Июль	17	41,2	0	58,8	7	85,7	—	—	10
	Август	21	4,8	0	95,2	1	0	—	—	20
	Сентябрь	1	0	0	100	—	—	—	—	1
	В целом	43	27,9	0	72,1	12	83,3	—	—	31

ше, но в 1987 г. разница была выражена ярче, чем в 1988-м, т.е. в год низкой сексуальной активности сеголеток соотношение полов в этой группе было ближе к паритетному (табл. 3.37).

В дельте Лены среди прибылых соотношения полов было близким к паритетному весь период исследований.

3.12. Лесной лемминг —

Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844

Морфометрическая характеристика. Характеризуется средними для полевковых грызунов размерами и относительно небольшой длиной выступающих частей тела: длина хвоста составляет примерно 13,5 % от длины тела, плюсны — 14, высота ушной раковины — 10 % (табл. 3.38). Массивный череп имеет сильно выраженное межглазничное сужение, скуловые дуги широко расставлены, гребни хорошо развиты. Мозговая капсула несколько сужена, а лицевой отдел укорочен по сравнению с черепом настоящих леммингов [Соколов, 1977].

Лесной лемминг, обитающий на северо-востоке Якутии, значительно крупнее особей из многих других частей ареала (табл. 3.38), при этом обращают на себя внимание размеры зверьков, отловленных нами в низовьях Индигирки и среднем течении Колымы. При сравнении пропорций тела и черепа лесных леммингов из разных точек ареала каких-либо закономерностей в изменении пропорций черепа не обнаружено, особи из низовьев Индигирки характеризуются умеренно высоким черепом со средней скуловой шириной и относительно длинным лицевым отделом (на что указывает большая длина резцової диастемы). В отношении промеров тела в литературе приводятся в основном данные по массе, длине тела и длине хвоста, при их рассмотрении заметно почти точное соответствие изменений относительной длины хвоста правилу Аллена: она уменьшается в направлении с юга на север.

Ранее в литературе указывалось на отсутствие у лесного лемминга полового диморфизма [Sidorovicz, 1960; цит. по: Млекопитающие Якутии, 1971]. В наших сборах достоверных различий по полу в размерах тела также не обнаружено, но среди взрослых особей самки неизменно крупнее самцов. Значения краниологических показателей у перезимовавших самок также несколько больше, чем у самцов, при этом у них различаются пропорции: череп самцов более узкий, чем у самок (скуловая ширина составляет соответственно 64,9 и 65,8 % относительно кондилобазальной длины), более высокий (37,0 и 36,5 %), с менее выраженным межглазничным сужением (13,2 и

Таблица 3.38

Морфометрические показатели лесного лемминга долин рек Северной Якутии
(перезимовавшие особи)

Промеры	Долина средней Лены			Долина Яны*		
	<i>n</i>	<i>M</i> ± <i>m</i>	limit	<i>n</i>	<i>M</i> ± <i>m</i>	limit
Масса тела, г	7	27,5 ± 0,93	24,0–30,3	5	21,4 ± 4,84	16,5–34,8
Длина тела, мм	8	100,7 ± 1,72	96,0–111,7	6	91,2 ± 3,37	84,6–106,0
Длина хвоста, мм	8	15,0 ± 1,02	11,7–19,6	7	13,6 ± 0,44	11,7–15,0
Длина плюсны, мм	8	14,5 ± 0,46	11,6–16,0	3	14,8 ± 0,54	14,0–15,5
Высота ушной раковины, мм	8	10,7 ± 0,42	9,2–11,9	—	—	—
Промеры черепа, мм:						
кондилобазальная длина	7	25,8 ± 0,27	25,2–26,8	3	24,5 ± 0,76	24,5–28,1
длина носовых костей	9	7,4 ± 0,10	7,0–7,9	—	—	—
длина верхнего зубного ряда	9	7,8 ± 0,17	7,1–8,8	7	7,0 ± 0,32	7,0–8,4
длина диастемы	9	7,1 ± 0,08	6,8–7,4	7	6,9 ± 0,17	7,0–9,5
скуловая ширина	9	16,4 ± 0,15	15,7–17,2	6	15,1 ± 0,43	7,8–9,1
межглазничная ширина	9	3,4 ± 0,05	3,2–3,6	—	—	—
высота в области слуховых барабанов	6	9,3 ± 0,13	8,9–9,7	3	8,9 ± 0,42	9,1–10,1

Промеры	Долина Индигирки			Долина Колымы		
	<i>n</i>	<i>M</i> ± <i>m</i>	limit	<i>n</i>	<i>M</i> ± <i>m</i>	limit
Масса тела, г	132	37,8 ± 0,34	27,7–46,4	33	37,5 ± 0,82	27,7–46,4
Длина тела, мм	223	109,0 ± 0,30	96,8–121,8	32	108,7 ± 1,20	96,8–121,8
Длина хвоста, мм	225	14,7 ± 0,11	10,7–20,9	32	15,4 ± 0,42	10,7–20,9
Длина плюсны, мм	225	15,6 ± 0,05	13,2–17,6	32	15,4 ± 0,09	13,2–17,6
Высота ушной раковины, мм	168	11,7 ± 0,07	8,3–14,6	—	—	—
Промеры черепа, мм:						
кондилобазальная длина	161	25,2 ± 0,12	24,5–28,1	32	25,2 ± 0,12	23,9–26,5
длина носовых костей	172	7,8 ± 0,03	6,6–8,8	—	—	—
длина верхнего зубного ряда	195	7,7 ± 0,02	7,0–8,4	33	7,8 ± 0,04	7,4–8,5
длина диастемы	196	8,0 ± 0,03	7,0–9,5	33	7,8 ± 0,05	7,3–8,5
скуловая ширина	202	17,3 ± 0,04	15,8–19,1	33	17,4 ± 0,07	16,6–18,4
межглазничная ширина	200	3,5 ± 0,02	2,8–4,0	—	—	—
высота в области слуховых барабанов	160	9,8 ± 0,03	9,0–11,0	28	9,8 ± 0,04	9,3–10,2

* По [Млекопитающие Якутии, 1971].

12,8 %). Однако все эти различия в промерах и пропорциях не достигают статистически значимых уровней.

Распространение. Лесной лемминг распространен по всей таежной зоне. В Якутии этот вид встречается по всей территории, нами отмечен во всех пунктах сбора материала кроме дельты Лены (рис. 3.42).

Ландшафтное и биотопическое распределение. Долина Лены. В долине средней Лены в районе г. Якутска этот вид был крайне малочислен: отловлен всего один экземпляр в березняке на III надпойменной террасе. В районе устья Вилюя в пойме вид встречался крайне редко: отловлены единичные экземпляры в редко затапливаемых ивняках в пойме и горно-таежном ландшафте (рис. 3.43). В равнинно-таежном ландшафте численность лемминга была несколько выше, но и здесь ее можно охарактеризовать как очень низкую. Наиболее многочисленным вид был в перестойном мохово-брусничном лиственничнике.

В целом в долине средней Лены лесной лемминг немногочислен и явно предпочитает равнинно-таежный ландшафт, наибольшего обилия достигая в лиственничных зеленомошниках, как правило,

Рис. 3.42. Места отлова лесного лемминга в районе исследований.

Усл. обозн. см. рис. 3.1.

Рис. 3.43. Пространственное распределение лесного лемминга в т. "Лепписке".

Биотопы: **низкая пойма**: 1 — затапливаемые ивняки, 2 — заливные луга; **высокая пойма**: 3 — незатапливаемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; **равнинно-таежный ландшафт**: 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; **горно-таежный ландшафт**: 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

сильно захламленных и характеризующихся высокой влажностью, но и здесь численность вида очень низка.

В низовьях Лены в пойменном комплексе этот вид отмечался в регулярно затапливаемых ивняках и кустарниках, но в обоих случаях он был крайне малочисленным. Несколько выше его обилие в равнинно-таежном ландшафте, в особенности в лиственничнике моховом переувлажненном, где этот вид не уступал по численности красной полевке.

В долине Адычи численность лесного лемминга в год исследований была невысокой. В таежных ландшафтах численность вида примерно одинаковая. В аласно-таежном ландшафте вид отмечен в ольховнике и лиственничнике-зеленомошнике, в горно-таежном — лемминги чаще всего попадались в лиственничнике мохово-лишайниковом. В пойме он отлавливался в ивняках, непосредственно прилегающих к границе горно-таежного ландшафта.

Низкие показатели численности лесного лемминга в долине Адычи фиксировались также в начале 1960-х годов [Кривошеев, Попов, 1968; Лабути, 1975]. В то же время имеются сведения, что в определенные периоды лесной лемминг способен весьма существенно увеличивать свою численность [Емельянова, 1994]. Таким образом, по сравнению с долиной Лены значимость лесного лемминга в долине Яны несколько возрастает.

Долина Индигирки. В среднем течении реки в районе Момского хребта лесной лемминг нами не обнаружен. Скорее всего, дело в специфике сезона, на который пришлось исследование. Известны находки этого вида выше по течению Индигирки [Винокуров, Мордосов, 1980] и в этом же сезоне он отловлен в 100 км ниже по реке (т. "Кебергене"). Здесь в пределах озерно-таежного ландшафта вид с одинаково невысокой численностью зарегистрирован в двух местообитаниях: в зарослях кедрового стланика и ольховнике грушанковом, где он значительно уступал по численности красной полевке, доминирующей в сообществе на момент исследований. В пойме на этом участке долины лесных леммингов не отловлено.

В другой точке долины средней Индигирки, в районе "Белая Гора", численность лесного лемминга была значительно выше, причем вид достигал высокой численности на правобережье — в биотопах горно-таежного ландшафта и примыкающей пойме, в частности в таких нехарактерных для него местообитаниях, как регулярно затопливаемые ивовые заросли и пойменные хвощатники, в случае если они примыкали к горно-таежному ландшафту (рис. 3.44). Причем анализ популяционной структуры лесного лемминга показал, что население хвощатников представлено не только молодыми размножавшимися зверьками, но и перезимовавшими беременными и рожавшими самками. При этом распределение вида по территории было крайне неравномерным. В озерно-таежном ландшафте, в пределах левобережной притеррасной поймы и на островах лесные лемминги или не отлавливались, или были крайне немногочисленными.

В долине нижней Индигирки нами также зарегистрирована высокая численность вида. Исключение составляли лишь островные станции, где за 4 года отловлен всего 1 зверек, что, кстати, является

Рис. 3.44. Пространственное распределение красной полевки в т. "Белая Гора".

косвенным доказательством неприспособленности этого вида к постоянному обитанию в пойме. Из других местообитаний малочисленностью лемминга отличаются затопляемые ивняки левого берега, где средняя многолетняя численность вида была 3,5 экз./100 конусо-сут (рис. 3.45), и он являлся одним из трех содоминантов полевки-экономки. В аналогичном биотопе на правом берегу показатель обилия был в 5 раз выше, но и здесь он значительно уступал доминанту — полевке-экономке. В четырех из пяти типов лиственничников, на осыпях и высокой притеррасной пойме лесной лемминг доминировал и был значительно многочисленнее остальных видов мелких млекопитающих, но при этом показатели обилия очень сильно варьировали, прежде всего из-за различий в фазах численности на разных берегах. Из общего ряда выделяются два левобережных биотопа — лиственничник бруснично-моховый озерно-таежного ландшафта и пойменный хвощатник, где попадаемость лесного лемминга превышала 40 экз./100 конусо-сут. Следующие за ними с относительно близкими показателями (около 15 экз./100 конусо-сут) два правобережных биотопа — хвощовые луга и ивняки высокой

Рис. 3.45. Пространственное распределение лесного лемминга в т. "Шаманово".

Биотопы: озерно-таежный ландшафт: 1 — лиственничник мохово-голубичный, 2 — лиственничник бруснично-моховый; пойма левого берега: 3 — регулярно затопляемые ивняки; острова: 4 — хвощатники, 5 — лиственничник мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; пойма правого берега: 7 — хвощатники; 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; горно-таежный ландшафт: 10 — осыпь, 11 — лиственничник мохово-лишайниковый, 12 — лиственничник голубично-моховый, 13 — лиственничник моховый переувлажненный.

поймы — уступают почти в 3 раза, во всех остальных местообитаниях численность вида не превышает 10 экз./100 конусо-сут (рис. 3.45).

При рассмотрении биотопического распределения лесного лемминга отмечены существенные различия в попадаемости этого вида в одних и тех же биотопах в разные годы. Наивысшие показатели обилия вида в районе исследований отмечены в 1987 г. в двух биотопах на левом берегу — в лиственничнике бруснично-моховом и на хвощовом лугу, в то же время попадаемость вида в правобережье была очень низкой, отдельные поселения с более высокой плотностью зверьков зарегистрированы только в понижениях рельефа в переувлажненных лиственничниках. Следующим летом (1988 г.) распределение вида по территории было более равномерным, наметился некоторый подъем численности в горно-таежном ландшафте при резком снижении ее в озерно-таежном и на примыкающих участках поймы [Вольперт, Шадрина, 2001]. В 1989 г. произошел спад численности, очень низкий уровень сохранился и в 1990 г. Общим для двух этих сезонов являлось большое количество осадков в начале лета, вследствие чего поселения вида, расположенные во влажных типах леса, пострадали более других.

Естественно, что при высоких показателях обилия и доминирования трудно определить значение тех или иных местообитаний в жизни вида. Изучение демографической структуры поселений в разных биотопах выявляет подлинную картину их предпочтительности. Как видно из рис. 3.46, лесной лемминг — несомненно, таежный вид и, за немногими исключениями, размножается только в лесных стациях, из которых предпочитает более влажные типы леса. Это предпочтение ярко выражено в горно-таежном ландшафте, где основные площади заняты сухими мохово-лишайниковыми лиственничниками, а численность вида, и особенно перезимовавших животных, наиболее высока в понижениях рельефа с моховым покровом. Максимальный процент перезимовавших животных в целом и самок, в частности, отмечен в лиственничнике голубично-багульниковом, а стацией переживания депрессии, по-видимому, является переувлажненный лиственничник, так как в 1987 г., отличавшемся невысокой численностью лесного лемминга в горно-таежном ландшафте, больше всего перезимовавших зверьков было поймано именно в этом типе леса.

В озерно-таежном ландшафте столь явного предпочтения какого-то одного типа леса нет, по-видимому, из-за высокой обводненности всей территории. Демографическая структура поселений в мохово-голубичном и бруснично-моховом лиственничниках сходная, но численность все же гораздо выше в последнем, более увлажненном местообитании (рис. 3.46).

Пойменные биотопы для лесного лемминга служат в основном местом выселения прибылых неполовозрелых особей. Аналогичные

Рис. 3.46. Демографическая структура населения лесного лемминга по биотопам в т. "Шаманово".

биотопы на разных берегах реки, несмотря на разницу в показателях численности, очень сходны по демографической структуре. Например, доля перезимовавших зверьков на хвощовых лугах левого берега составила 17,6, а на правом — 13,1 %, поэтому мы приводим суммарные данные по биотопам притеррасной поймы. Наиболее высокая численность лесного лемминга на хвощовых лугах, но анализ демографической структуры поселений вида в этом биотопе выявил самый низкий в районе исследований процент перезимовавших особей и очень низкую репродуктивную активность прибылых

(рис. 3.46). Это свидетельствует о том, что он служит в основном местом выселения мигрантов и кормовой стацией.

Ивняки высокой поймы, примыкающие к биотопам горно-таежного ландшафта, характеризовались самой высокой долей перезимовавших животных в уловах. Причем такое соотношение достигнуто в основном за счет 1988 г., когда численность вида в горно-таежном ландшафте нарастала. По-видимому, ввиду ограниченности увлаженных таежных местообитаний часть перезимовавших животных выселилась в наиболее подходящий из пойменных биотопов и активно размножалась там в течение всего репродуктивного периода.

Ранее мы указывали, что пойменные биотопы в долине Колымы заселяются в подавляющем большинстве прибылыми неполовозрелыми особями лесного лемминга [Вольперт, Шадрина, 1990], для долины Индигирки это справедливо лишь в отношении открытых биотопов — хвощовых лугов, где за все время поймано только две беременные самки, а ивняки высокой поймы, по-видимому, вполне удовлетворяют защитным и кормовым требованиям вида в летний период.

Оценивая распределение лесного лемминга в долине Индигирки, необходимо отметить, что численность вида здесь на 1–2 порядка отличалась от зарегистрированной нами и другими исследователями на территории Якутии [Млекопитающие Якутии, 1971; Попов, 1975; Лабути, 1975; Мордосов, 1980; Ревин, 1989; и др.]. Высокие уровни численности вида нами регистрировались в долине этой реки как в горно-таежном, так и в озерно-таежном ландшафтах. Причем и в среднем и в нижнем течении реки наблюдалась асинхронность движений численности на разных берегах.

Долина Колымы. В верхнем течении реки численность лесного лемминга была значительно ниже, чем в долине Индигирки. Максимум зарегистрирован здесь в регулярно затопляемых ивняках на острове, где лесной лемминг был значительно многочисленнее, чем в хвощатниках, примыкающих к надпойменной террасе. В обоих биотопах не зарегистрировано перезимовавших особей, а среди прибылых встречались беременные и рожающие самки. Перезимовавшая беременная самка отловлена в незатопляемых ивняках, а молодых размножавшихся самок в этом биотопе не отловлено.

Численность лесного лемминга в озерно-таежном ландшафте была незначительно выше, чем в пойме. К наиболее предпочитаемым биотопам в этом ландшафте относятся ольховник разнотравный и лиственничник-зеленомошник, причем только в последнем нами зарегистрировано наличие перезимовавших самок, одна из которых была беременной.

В среднем течении Колымы численность лесного лемминга можно охарактеризовать как очень высокую (рис. 3.47). Обилие вида

Рис. 3.47. Пространственное распределение лесного лемминга в т. "Жирково".

Биотопы: низкая пойма: 1 — ивняки, 2 — вейниковые луга; высокая пойма: 3 — лиственничник, 4 — ивняки; озерно-таежный ландшафт: 5 — лиственничники на гривах, 6 — лиственничники мохово-брусничные, 7 — ивняки; горно-таежный ландшафт: 8 — лиственничники лишайниковые, 9 — лиственничники мохово-голубичные.

в пойме было выше в 1981 г., когда наблюдалась массовая миграция [Вольперт, Шадрина, 1990]. Среди пойменных биотопов максимальная численность зарегистрирована на вейниковых лугах, приуроченных к правому берегу Колымы (горно-таежный ландшафт), перезимовавшие зверьки представлены в этом биотопе небольшим количеством самцов, среди молодых самок рожающих было очень мало, а беременных не было совсем (рис. 3.48). Индекс доминирования на лугах был очень высоким в оба года исследований. В других биотопах поймы попадаемость вида значительно ниже.

В озерно-таежном ландшафте вид был малочисленным, отдельные особи отлавливались только в лиственничнике мохово-брусничном и ивовых зарослях. В горно-таежном ландшафте численность лесного лемминга в 1981 г. была очень высокой, максимальные показатели зарегистрированы в лиственничнике лишайниковом, а процент перезимовавших зверьков был выше в лиственничнике мохово-голубичном (рис. 3.48). Последнее указывает, на наш взгляд, на лиственничник мохово-голубичный как основную стацию переживания видом зимнего периода. Размножавшихся прибылых особей в 1981 г. не отловлено в обоих типах лиственничников, т.е. наблюдается явление, типичное для тундровых леммингов [Кошкина, 1970], для которых характерна задержка полового созревания при высокой плотности вида.

Высокая численность лесного лемминга сопровождалась массовой миграцией зверьков, животные мигрировали из лиственничников горно-таежного ландшафта, спускаясь по распадкам на галеч-

Рис. 3.48. Демографическая структура населения лесного лемминга по биотопам в т. "Жирково".

ный бечевник, и в большом количестве пытались переплыть Колыму, только установленный нами с помощью опроса и обследования берегов фронт миграции составил около 700 км. По берегам реки в это время постоянно встречались трупы погибших леммингов. Так, на песчаном пляже длиной 800 м за сутки прибило к берегу 105 трупов лесных леммингов. К сожалению, резкое повышение уровня воды лишило возможности продолжить наблюдения.

Нами была установлена канавка с конусами по галечному бечевнику в непосредственной близости от воды напротив распадка, которая ловила, по-видимому, только мигрирующих особей, численность вида на этой линии с 12 августа по 6 сентября равнялась 300 особей на 100 конусо-сут. Миграция началась 4 августа, 12 августа она достигла максимума, а затем начался спад; у нас имеются данные только до 11 сентября, не исключено, что небольшое количество зверьков мигрировало и позже. Интересно отметить, что численность лесного лемминга на противоположном берегу, судя по отлову специально установленными канавками, не повышалась. Скорее

всего, практически все зверьки погибали при попытке переправиться через реку [Вольперт, Шадрина, 1990].

Нами получены опросные сведения от рыбака Г.И. Голикова о том, что массовая миграция "мышей", судя по описанию очень похожих на лесных леммингов, наблюдалась на Стадухинской протоке Колымы (лесотундровая подзона) в конце августа 1957 г., причем тысячи зверьков плыли с левого низинного берега (озерно-таежный ландшафт) на правый (горно-таежный ландшафт). В период наших исследований направление миграции было обратным.

Наличие миграций у лесного лемминга наблюдалось неоднократно [Огнев, 1948; Новиков, 1941] и в частности в Якутии [Кривошеев, 1964, 1981; Ревин, Гермогенов, 1979], но во всех указанных случаях миграция была выражена значительно слабее. По-видимому, близка по масштабу к зафиксированному явлению миграция, наблюдавшаяся в 1957 г. в Карелии [Ивантер, 1975] и Западной Якутии [Мордосов, 1997]. Повышение подвижности лесного лемминга в августе в меньших масштабах мы наблюдали также на Адыче, где регулярно в течение 4 дней отлавливали погибших животных в небольшом ручье. Судя по несоответствию встречаемости лесных леммингов в желудках ленка и тайменя, выловленных в р. Лепписке, и численности вида [Луковцев и др., 1979], у леммингов в долине средней Лены также повышается подвижность в августе. Наблюдалась активная миграция лесного лемминга через реку в среднем течении Вилюя в августе 1976 г. По-видимому, миграции разного масштаба — обычное явление для популяций лесного лемминга и являются своеобразным механизмом регулирования численности вида [Ревин, Вольперт, 1982].

Таким образом, можно считать достоверно установленным фактом, что в долинах Индигирки и Колымы лесной лемминг является многочисленным видом. Высоких уровней численности он достигает как в горно-, так и в озерно-таежном ландшафте, при этом движения численности вида по ландшафтам обычно не совпадают. Приведенные выше данные, а также работы других авторов [Ивантер, 1975; Рамазанова, 1983; Емельянова, 1994; Мордосов, 1997] позволяют предположить, что лесной лемминг является многочисленным (хотя бы в отдельные периоды) видом не только на северо-востоке Якутии, что не вызывает сомнения [Вольперт и др., 1990; Вольперт, Шадрина, 1990, 2001], но и в северотаежной подзоне Евразии в целом.

Питание. В литературе неоднократно подчеркивалось, что лесной лемминг — один из немногих узкоспециализированных видов мышевидных грызунов — бриофаг [Кривошеев, 1964; Ивантер, 1975; Тишков, 1975; Тишков и др., 1978]. Действительно, в долине средней Лены мох встречался в 53,3 % желудков ($n = 15$), в остальных обнаружены остатки вегетативных частей растений. Летний рацион вида

в Северо-Восточной Якутии отличается рядом особенностей. В долине Колымы лесной лемминг охотно поедает хвощ полевой, который в пойменных биотопах составляет до 60 % рациона (табл. 3.43). В таежных стациях с моховым покрытием и крайне низкой плотностью хвоща последний, тем не менее, встречается в желудках леммингов. Кроме того, в летнее время вид охотно потребляет зеленые части высших растений, но при этом в лиственничниках-зеленомошниках мхи составляют основную массу потребляемых леммингом кормов. По результатам четырех лет исследований в долине нижней Индигирки обнаружилась относительно редкая встречаемость в желудках лемминга мхов (14,6 %), хвощ встречен в 55,7, зелень — в 27,7 % наполненных желудков (табл. 3.39).

Результаты исследования содержимого желудков лесных леммингов в долине Индигирки в целом сходны с таковыми колымских. По-видимому, это можно объяснить высокой численностью выселявшихся в пойму животных в оба периода: в 1981–1983 гг. 64 % исследованных желудков леммингов, отловленных в пойме, в 1987–1990 гг. таких желудков было 60 %. Как видно из табл. 3.39, соотношения основных групп кормов очень близки для животных, отловленных на хвощовых лугах, иначе обстоит дело с обитателями таежных биотопов: в долине Колымы зеленые корма поедались вдвое чаще, а мхи и добавочные корма — вдвое реже, чем в долине Индигирки, и если по результатам облова хвощатников можно сделать вывод о главенствующей роли хвоща полевого в питании вида, то при рассмотрении рациона леммингов из более характерных биотопов складывается мнение, что основу его составляют зеленые мхи.

Последнее обстоятельство подтверждается результатами экспериментального кормления (табл. 3.40). Из трех предложенных групп кормов лемминги наиболее охотно поедали мхи, на втором месте была зелень злаков. Опыты по кормлению лесных леммингов, проведенные В.Г. Кривошеевым [1964] в долине Колымы, также показа-

Таблица 3.39

Рацион лесного лемминга в долинах Индигирки и Колымы

Биотоп	n	Встречаемость разных видов корма, % от наполненных желудков			
		Зеленые мхи	Хвощ	Травянистые растения	Ягоды, грибы и пр.
Долина Индигирки					
Лиственничники	164	40,2	25,6	23,8	10,9
Хвощовый луг	223	4,0	70,4	24,2	1,3
Долина Колымы					
Лиственничники	94	20,2	18,1	57,4	4,3
Хвощовый луг	359	1,4	73,0	23,7	1,9

Таблица 3.40

Результаты экспериментального кормления лесного лемминга

Рацион	Вид корма	n	M	m	δ	limit
Хвощ + мох	Хвощ	12	27,4	1,6	5,57	18,3–35,3
	Мох	12	28,5	2,7	9,3	11,3–45,7
	Всего за сутки	12	55,9	3,2	11,24	32,4–72,4
Хвощ + мох + злаки	Хвощ	3	14,6	5,1	8,89	9,5–24,9
	Мох	3	25,1	7,2	12,5	11,5–36,0
	Зелень злаков	3	18,4	2,6	4,51	13,3–21,9
	Всего за сутки	3	58,1	0,4	0,8	57,3–58,8

ли, что охотнее всего они поедают верхние части зеленых мхов, а также корни и листья осок. Известно, что при содержании лесных леммингов на рационе, состоящем только из зеленых мхов, их половое созревание задерживается по сравнению с особями, рацион которых более разнообразен [Ilmen, Lahti, 1968], но полное исключение их из питания, судя по нашим наблюдениям, приводило к гибели зверьков.

Таким образом, лесной лемминг может переключаться с питания зелеными мхами на более калорийные корма, каким является хвощ. Заселение хвощатников можно объяснить выселением леммингов из лиственничников-зеленомошников под давлением внутривидовой конкуренции, а поскольку в пойменных местообитаниях мхов, как правило, нет, лесной лемминг вынужден переключаться на питание хвощом. Возможно, что он активно использует хвощи только при высоких подъемах численности, когда заселяет нехарактерные для него биотопы. С другой стороны, поедание леммингом хвощей в лиственничниках-зеленомошниках при низкой плотности произрастания этих растений и изобилии мхов, а также то, что в пойме он с большой плотностью заселяет биотопы со значительными запасами хвоща, позволяет предположить наличие высокой привлекательности этого корма для вида.

Размножение. Данные по срокам размножения лесного лемминга в долине средней Лены практически отсутствуют. В Южной Якутии [Ревин, 1968] воспроизводство протекает с мая по начало сентября, как и в долине Колымы [Кривошеев, 1964], по-видимому, в эти же сроки начинается размножение в долине средней Лены. Размножение лесных леммингов в долинах Индигирки и Колымы, по нашим данным, совпадает со сроками, указанными В.Г. Кривошеевым [1964], причем заканчиваться оно может очень рано, в год пика численности последняя беременная самка была отловлена 24 июля.

В лесотундровой зоне размножение начинается, судя по косвенным признакам, в мае, т.е. до схода снежного покрова. Так, в 1987 г. с начала июля в уловах попадались вторично беременные самки, в том

числе с 15–16-дневными эмбрионами, что дает возможность предположить, исходя из срока беременности 20–21 день, что первое спаривание произошло не позднее 25 мая. В 1988 г. самка с 14–15-дневными эмбрионами и одновременно лактирующая отловлена еще раньше — 25 июня, следовательно, начало гона пришлось в этом сезоне на 15–20 мая. При этом, судя по массовому выходу молодых, основная волна размножения приходится на начало — середину июня.

Сроки окончания репродукции у лесного лемминга могут сильно варьировать в зависимости от фазы численности, приходится на конец июля — конец августа. Раньше всего размножение закончилось в 1988 г., следующем за подъемом численности, в этом сезоне последняя беременная самка отмечена 20 июля. Интересно, что репродуктивный период в таежных ландшафтах, приуроченных к разным берегам реки, может иметь разную продолжительность. В 1987 г. в озерно-таежном ландшафте, где численность была очень высокой, последняя беременная самка отмечена 24 июля, а в горно-таежном при низкой численности — 5 августа. В 1989 г. в период глубокой депрессии зарегистрированы наиболее поздние сроки окончания размножения — беременные самки попадались до 22 августа. В целом сезон размножения вида несколько укорочен по сравнению с таковым лесных полевых, обитающих в том же регионе.

Большинство перезимовавших самок дают, по-видимому, два помета, на северо-востоке редко три помета. Прибылые первой генерации — также два, в отдельные годы — один помет, на наличие только одного помета у прибылых самок в Приобье указывает Ф.Р. Рамазанова [1983]. Прохолодания перезимовавших самок нами не зарегистрировано (табл. 3.41). Самцы этой возрастной группы находятся в состоянии гона весь репродуктивный период. Молодые самки вступают в размножение с июля. Необходимо отметить, что интенсивность размножения молодых леммингов значительно ниже, чем у других видов мелких млекопитающих, обитающих в районе исследований, как и в Карелии [Ивантер, 1975].

В долине средней Лены доля размножающихся молодых самок в июле, по многолетним данным, равнялась всего 28,6 %. На северо-востоке Якутии максимум этого показателя не поднимался выше 37,5 % (табл. 3.40). Интенсивность включения в размножение молодых может существенно варьировать по годам в зависимости от фазы популяционного цикла. В периоды высокой численности в июле молодые самки активно участвуют в размножении, в период спада численности интенсивность репродукции резко падает [Вольперт, Шадрина, 1990]. В случае когда отмечены разнонаправленные движения численности на разных берегах реки, имеются достоверные различия по степени вовлечения в репродукцию прибылых самок. В пределах левобережья при высокой численности и начавшемся затем спаде

Таблица 3.41

Интенсивность участия в размножении лесного лемминга, %

Месяц	Перезимовавшие				Сеголетки					
	самки			самцы	самки				самцы	
	n	рожавшие	беременные		n	рожавшие	беременные	яловые	n	размножавшиеся

Долина нижней Индигирки

Июнь	4	100	100	25	100	0	0	0	0	0
Июль	94	91,4	25,8	95	100	112	5,4	2,7	91,9	42
Август	18	100	11,1	4	25,0	592	3,5	0,3	96,3	184
Сентябрь	0	0	0	3	0,0	59	3,4	0,0	96,6	18

Среднее течение Индигирки и Колымы

Июнь	0	0	0	15	100	0	0	0	0	0
Июль	8	100	100	19	100	47	17,0	12,8	70,2	28
Август	7	100	42,8	3	100	479	3,8	0,8	95,4	130
Сентябрь	0	0	0	0	0	113	2,6	0	97,4	19

Долина средней Лены

Июль	3	100	100	6	100	14	14,3	14,3	71,4	3
Август	0	0	0	1	100	11	18,2	0,0	81,8	3

популяция характеризовалась низким участием в размножении — 1,6 и 1,2 % соответственно, а на правом берегу при невысокой в указанные сезоны численности, но общей тенденции к небольшому подъему, эти цифры составили 10,5 и 7,4 % [Шадрина, Вольперт, 1995б].

Самцы-сеголетки, по нашим данным, участвуют в размножении в год своего рождения в очень небольшом количестве. Так, даже при самом интенсивном размножении оно не превышало в низовьях Индигирки 4,3 %, а в другие годы было еще ниже. Причем степень участия во все годы была меньше, чем у самок, тогда как в Карелии наблюдается обратная картина [Ивантер, 1975]. В долине средней Лены, где уровни численности значительно ниже, половозрелых прибылых самцов нами не отловлено.

Плодовитость лесного лемминга практически не меняется на разных фазах популяционного цикла, хотя в течение каждого репродуктивного сезона и разных возрастных групп варьирует в широких пределах [Шадрина, Вольперт, 1995а].

Ранее мы отмечали, что плодовитость перезимовавших самок лесного лемминга в долине Колымы и Индигирки немного выше, чем у прибылых, но разница статистически недостоверна [Вольперт, Шадрина, 1990]; по материалам 1987–1990 гг. и более репрезентативной выборке можно говорить о высоком уровне достоверности статистических различий этого показателя (по критерию Стьюдента $p < 0,001$). Причем основные различия заключаются в величине пер-

Таблица 3.42

Изменчивость величины помета у лесного лемминга

Возраст	Берменность	n	M	m	σ	limit
Перезимовавшие	1-я	84	5,99	0,22	2,04	1-11
	2-я	71	4,92	0,22	1,83	1-11
	3-я	6	4,33	0,71	1,75	2-7
Прибылые	1-я	36	4,55	0,25	1,52	1-7
	2-я	7	4,87	0,54	0,33	3-7

вого помета: у перезимовавших самок он достоверно больше, чем у прибылых ($p < 0,001$), а также достоверно больше второго и третьего выводков у самок данной возрастной группы (соответственно $p < 0,001$ и $p < 0,05$), тогда как у прибылых намечается повышение среднего показателя плодовитости от первого ко второму помету (но различия статистически недостоверны). Величина второго выводка у перезимовавших и прибылых самок практически одинакова (табл. 3.42). Изменения плодовитости перезимовавших самок по эмбрионам в течение лета отражают изменения в величине первого и последующих пометов: в июне этот показатель выше, чем в июле и августе.

Плодовитость лесных леммингов средней Лены (табл. 3.43) несколько выше, чем у северо-восточных, но разница статистически недостоверна. В целом надо отметить, что в долинах рек Северной Якутии лесной лемминг отличается относительно высокой плодовитостью. Величина выводка северо-восточных и среднеленских леммингов выше, чем у южно-якутских, карельских, алтайских, при-

Таблица 3.43

Географическая изменчивость плодовитости лесного лемминга

Место сбора материала	n	M	m	Источник
Долина средней Лены (т. "Лепписке")	10	5,8	0,49	Наши данные
Долина Омолона	?	5,7	?	Чернявский и др., 1978
Среднее течение Колымы и Индигирки	54	5,6	0,20	Наши данные
Нижнее течение Индигирки	204	5,25	0,13	Наши данные
Крайний северо-восток Сибири	38	5,1	?	Чернявский, 1984
Север Дальнего Востока	53	5,24	0,22	Юдин и др., 1976
Западная Якутия	30	5,2	0,38	Мордосов, 1997
Зейский заповедник	?	4,5	?	Бромлей и др., 1984
Приобье	63	4,5	?	Рамазанова, 1983
Северное Прибайкалье	91	4,2	0,5	Лямкин и др., 1983
Алтай	19	4,5	?	Марин, 1981
Карелия	6	4,33	0,36	Ивантер, 1975
Восточная Финляндия	?	4,6	0,42	Skagen, 1963
Южная Якутия	49	3,92	0,14	Ревин, 1989

байкальских и зейских ($p < 0,01-0,001$), и близка к плодовитости леммингов долины Омолон. Невысок этот показатель также в долине Верхней Лены и в Восточной Финляндии. В целом хорошо прослеживается тенденция к повышению плодовитости в северо-восточном направлении.

Возрастная структура популяции. Для лесного лемминга, как и для других мышевидных северо-востока Сибири, характерна полная смена состава популяции за репродуктивный период. Во всех обследованных нами долинах смена поколений происходила однотипно (рис. 3.49). В июне популяция представлена только перезимовавшими особями, в июле появляются прибылые. В среднем течении Индигирки и Колымы они доминировали в популяции уже в этом месяце, в августе преобладание молодых становится абсолютным, процент особей первой генерации (подростков) низкий, а в сентябре они могут исчезнуть совсем, по-видимому, в результате высокого отхода, вызванного большими энергетическими затратами на размножение. Так, подростков не отловлено в среднем течении Колымы в 1981 и 1983 гг., когда процент размножавшихся прибылых был относительно высок, но они отмечены в 1982 г., когда молодые участвовали в размножении с меньшей активностью. Перезимовавшие осо-

Рис. 3.49. Возрастная структура популяций лесного лемминга.

би в сентябре не отлавливались, по-видимому, к этому времени они исчезают из популяции.

Половая структура популяции лесного лемминга обладает специфическими особенностями: если у абсолютного большинства мышевидных в период размножения в уловах преобладают самцы, то у лесного лемминга — самки [Огнев, 1948; Новиков, 1941; Ивантер, 1975; Волков и др., 1974; Марин, 1981]. То же наблюдается в виварных условиях [Kalela, Oksala, 1966; Frank, 1966]. Имеются данные о зависимости скорости полового созревания у мышевидных от плотности населения особей данного пола, причем рождаются в основном особи того пола, в котором популяция испытывает дефицит [Redfield et al., 1978].

В то же время в случае с лесными леммингами по всему ареалу этого вида наблюдается устойчивое преобладание самок на всех фазах популяционного цикла, которое поддерживается специальными генетическими механизмами [Большаков, Кубанцев, 1984; Федоров, 1990; Fredga et al., 1976, 1977; Stenseth, 1978]. Среди перезимовавших самцы преобладают с высокой степенью достоверности только в июне—июле (рис. 3.50), т.е. во время пика размножения этой возрастной группы. К августу соотношение полов практически сравнивается. Среди молодых преобладание самок носит абсолютный характер, по-видимому, это своеобразный резерв популяции, позволяющий в отдельные годы резко поднимать численность вида [Вольперт, Шадрина, 1990].

Миграция. Как уже упоминалось, в 1981 г. в среднем течении Колымы нами наблюдалась массовая миграция вида. Выше рассмотрена количественная характеристика этого явления, кроме того, на наш взгляд, представляет интерес качественный анализ состава мигрантов. Мигрантами мы считаем зверьков, отловленных на галечном бечевнике, который лемминги пересекали, перед тем как броситься в воду. Их состав сравнивается с населением лесных леммингов в лиственничниках горно-таежного ландшафта, отлов проводился параллельно. Естественно, что определенное количество мигрантов было и в лиственничниках, из которых выселялись зверьки, но все-таки основу населения, его ядро должны составлять оседлые зверьки.

При анализе возрастной структуры в первую очередь обращает на себя внимание отсутствие среди мигрантов перезимовавших животных, в то время как в лиственничниках представители этой возрастной группы, хотя и в небольших количествах, но отлавливались. Среди молодых животных в обеих ситуациях преобладали самки, процент размножавшихся в лиственничниках несколько выше, чем среди мигрантов. Таким образом, мигрирующая часть популяции со-

Рис. 3.50. Половая структура популяций лесного лемминга.

стоит исключительно из молодых особей, абсолютное большинство которых на момент миграции были неполовозрелыми.

Для сравнения физиологического состояния особей во время миграции и в ординарных ситуациях нами применен метод морфофизиологических индикаторов [Шварц и др., 1968]. Сравнение относи-

Морфометрические показатели взрослых особей водяной полевки Центральной Якутии
(по: [Млекопитающие Якутии, 1971])

Промеры	n	M	m	σ	limit
Масса тела, г	19	207,6	8,17	34,63	143,1–273,5
Длина тела, мм	19	181,2	3,42	14,52	148,7–210,0
Длина хвоста, мм	20	107,3	0,65	2,83	82,7–122,0
Промеры черепа, мм:					
общая длина	44	41,7	0,16	1,03	38,9–43,5
кондилобазальная длина	44	40,8	0,14	0,95	38,0–42,6
скуловая ширина	43	24,9	0,13	0,83	22,5–26,5
ширина по линии слуховых отверстий	44	17,9	0,08	0,58	16,0–19,0
длина верхнего зубного ряда	45	9,9	0,06	0,44	9,0–10,8
верхняя диастема	45	13,8	0,06	0,41	12,7–14,4
высота в области слуховых барабанов	43	13,0	0,05	0,35	12,2–13,6

тесной связью с водой. Как известно, для видов, ведущих околотовный или полуводный образ жизни, благодаря выровненным температурам водной среды характерны меньшие теплопотери, чем для родственных форм, не связанных с водой. Как следствие, у таких видов в пропорциях заметно удлинение выступающих частей тела [Пантелеев и др., 1990].

Череп у водяной полевки относительно крупный — его кондилобазальная длина составляет 22,5 % от длины тела. Скуловые дуги широкие. Сильно развиты лобно-теменные и заглазничные выступы височных костей.

Распространение. По характеру распространения водяная полевка — западный палеаркт. В Якутии заселяет долину Лены до п. Кюсюр (рис. 3.51). И.И. Колкушев [1936] приводит сведения В.И. Ушакова о полевках, принесенных водой со льдом на острова дельты Лены. Не исключено, что проникновение вида так далеко на Север объясняется пульсацией ареала [Соломонов, 1980]. Нами в процессе работ в дельту Лены водяной полевки не обнаружено [Вольперт, Сапожников, 1996]. В северо-западной Якутии ареал вида не доходит до широты оз. Эйк [Мордосов, 1980, 1997]. Сведения о находках этого вида восточнее Верхоянского хребта [Огнев, 1950] не подтвердились [Млекопитающие Якутии, 1971; Кривошеев, 1973; Соломонов, 1980; наши данные].

Ландшафтное и биотопическое распределение. В долине средней Лены в районе г. Якутска в период наших исследований водяная полевка была немногочисленной. Чаще всего она отлавливалась в луговых местообитаниях низкой поймы, несколько реже — в ивняках. В пределах высокой поймы этот вид фиксировался только в луговых местообитаниях (рис. 3.52). Такое распределение водяной полевки

тельной массы органов самцов и самок среди мигрантов показало, что у самок достоверно больше надпочечник, это говорит о высоком уровне стресса [Ивантер и др., 1985]. В эксперименте показано, что у мышевидных грызунов уровень стресса зависит от плотности населения особей того же пола [Redfield et al., 1978]. Поскольку в популяции лесного лемминга преобладают самки, то и уровень стрессовой нагрузки у них выше, чем у самцов. Среди оседлых леммингов нет достоверных половых различий по индексу надпочечника, но сердце и почки у самок больше, что указывает на высокий уровень обмена веществ у них. У оседлых самок, по сравнению с мигрирующими, масса тела была меньше ($p < 0,05$), а индекс сердца — больше ($p < 0,001$), тогда как в норме между массой тела и индексом сердца наблюдается прямая корреляция [Башенина, 1977], т.е. в нашем случае физическая нагрузка у оседлых животных больше, что труднообъяснимо. Надпочечник был, как и следовало ожидать, больше у мигрантов ($p < 0,001$). Сравнение самцов-мигрантов и оседлых не дало статистически достоверных различий ни по одному показателю. Сравнение мигрантов и оседлых в целом дало повторение варианта “самки-самки”: у мигрантов масса тела ($p < 0,05$) и индекс надпочечника ($p < 0,001$) больше, а индекс сердца — меньше ($p < 0,001$), чем у оседлых животных.

Таким образом, мигранты — это крупные по размеру зверьки, слабо приспособленные к физическим нагрузкам и испытывающие высокий уровень стресса. Крупные размеры тела позволяют предположить, что во время вспышки численности среди лесных леммингов наблюдается К-отбор [Вольперт, Шадрина, 1990].

Оценивая значимость лесного лемминга в рассматриваемом регионе, необходимо отметить, что роль его в таежных сообществах возрастает с запада на восток. В долинах Индигирки и Колымы он является массовым видом, периодически доминируя в ландшафтных сообществах. В эти периоды он не только составляет основу биомассы мелких млекопитающих, но и оказывает активное воздействие на другие виды мышевидных грызунов.

3.13. Водяная полевка — *Arvicola terrestris* Linnaeus, 1758

Морфометрическая характеристика. В наших сборах крайне немногочисленна, так как обитает только в долине Лены. Размерную характеристику приводим по литературным данным [Млекопитающие Якутии, 1971]. Это один из наиболее крупных представителей семейства Microtinae: масса тела отдельных экземпляров достигает 320 г при длине тела 210 мм. Длина хвоста составляет более половины длины тела — 59,2 % (табл. 3.44), что, по-видимому, объясняется

Рис. 3.51. Места отлова водяной полевки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

типично для долины Лены [Соломонов, 1980]. В пределах II и III надпойменных террас эта полевка нами не фиксировалась, хотя известно, что она способна заселять околородные местообитания в Центральной Якутии вне поймы, с достаточно высокой плотностью [Соломонов, 1980].

Рис. 3.52. Пространственное распределение водяной полевки в т. "Якутск".
Биотопы: низкая пойма: 1 — луг, 2 — кустарник; высокая пойма: 3 — луг, 4 — кустарник.

В т. "Лепписке" в пойме максимальная численность вида наблюдалась, как и в первом случае, на заливном лугу, несколько ниже — в березняке, приуроченном к высокой пойме и в регулярно затопливаемых ивняках (рис. 3.53).

Водяная полевка — наиболее специализированный из мышевидных грызунов гидрофильный вид, являясь, по А.А. Максимова [1974], "эндемиком" поймы. Не исключено, что наши данные по численности этого вида несколько занижены, так как, на наш взгляд, используемые нами конуса недостаточны по диаметру и высоте, для отлова такого относительно крупного животного, каким является водяная полевка. Судя по глазомерной оценке характерных следов жизнедеятельности, численность этого вида в пойме была, скорее всего, выше, чем по данным отловов.

Основное количество поселений на обследованных островах Лены приурочено к берегам стариц и мелких протоков, поросшим молодым ивняком, т.е. распределение имеет ленточный характер, что типично для пойменных местообитаний [Соломонов, 1980]. В первой половине лета водяная полевка с большей плотностью заселяет берега водоемов, находя здесь наиболее благоприятные условия для существования, вследствие размножения плотность возрастает, и молодые зверьки начинают расселяться [Соломонов, 1973, 1980].

Мигрирующая часть популяции состоит из неполовозрелых мелких особей [Пантелеев, 1968], которые, по-видимому, лучше отлавливались нашими ловушками. Не исключено, что именно последним обстоятельством объясняется тот факт, что численность в березняке, расположенном на возвышенной части острова, где попадались только неполовозрелые зверьки, была такой же, как и в наиболее благоприятных местообитаниях.

Рис. 3.53. Пространственное распределение водяной полевки в т. "Лепписке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; высокая пойма: 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса.

В равнинно-таежном ландшафте конусами водяных полевок не отловлено, но несколько особей были добыты капканами и задавлены собаками около воды. В горно-таежном ландшафте этот вид нами не обнаружен, по долине Лепписке, имеющей ярко выраженных горный характер, водяная полевка отмечена только на расстоянии 10 км от устья.

В долине нижней Лены, в устье Бесюке, в пойме водяная полевка в период исследований была относительно многочисленной. Максимальная попадаемость зарегистрирована в регулярно затапливаемых ивняковых зарослях; на заливном лугу, против обыкновения, этот вид отловлен не был.

Высокая численность и широкое распространение вида на самом краю ареала позволяют предположить, что водяная полевка потенциально могла бы проникнуть дальше на север, вплоть до дельты Лены. Препятствуют этому, как и для других таежных видов мелких млекопитающих, геоморфологические особенности долины Лены [Вольперт, Сапожников, 1996].

Питание. Н.Г. Соломоновым [1960а, 1973, 1980] отмечено поедание водяной полвкой 80 видов кормов, из которых 74 наименования относятся к растениям. В то же время указанный автор отмечает, что список кормов у животных в каждом конкретном местообитании не превышает 25–30 видов. В нашем случае в районе устья Лепписке в 100 % наполненных желудков отмечены остатки вегетативных частей растений, из них 13,3 % составляли хвощи. В низовьях Лены хвощи встречались в 41,6 % просмотренных желудков ($n = 12$). Более высокий процент встречаемости хвощей в долине Нижней Лены объясняется, скорее всего, обилием этого вида растений в облавливаемых местообитаниях.

Размножение. Сведения о размножении водяной полвки у нас весьма ограничены. В середине мая был отловлен самец с семенниками массой 700 мг. По-видимому, в районе устья Лепписке размножение начинается в мае, как и в Центральной Якутии [Шкилев, 1966; Соломонов, 1980]. Нами отловлена всего одна беременная самка с 8 эмбрионами, а в Центральной Якутии плодовитость вида составляет 8,48 [Соломонов, 1980]. Перезимовавшие самки приносят в отдельных случаях по два помета, но большинство — по одному, процент участия в репродукции молодых невелик, половая зрелость наступает при массе 50 г [Ревин и др., 1988]. Но несмотря на указанное обстоятельство, обновление популяции идет достаточно быстрыми темпами. В августе 1979 г. перезимовавшие особи составляли 12,5 % от всех отловленных ($n = 16$), в этом же месяце в 1980 г. перезимовавших зверьков не отловлено, как и в 1984 г. в долине Нижней Лены ($n = 12$).

3.14. Узкочерепная полевка — *Microtus gregalis* Pallas, 1779

Морфометрическая характеристика. Этот вид — один из относительно малочисленных в наших сборах, поэтому морфометрическую характеристику мы приводим по литературным данным (табл. 3.45). Как видно из таблицы, узкочерепная полевка характеризуется средними для полевок размерами тела. Длина хвоста составляет 17,7–19,6 % от длины тела. Для вида характерна необычная форма черепа — очень узкий, с относительно небольшой мозговой капсулой и ярко выраженным межглазничным сужением. Географическая изменчивость не изучена, и, хотя считают, что узкочерепная полевка, обитающая на территории Якутии, морфологически однородна, можно отметить, что представители вида, обитающие в бассейне Колымы, отличаются от центрально-якутских несколько более крупными размерами. По литературным данным, половой диморфизм в размерах тела не выражен [Млекопитающие Якутии, 1971].

Распространение. Согласно литературным данным, этот вид широко распространен по территории Якутии. Основные регионы, где коллектировались представители узкочерепной полвки, можно разбить на две группы: Центральную и Северную Якутию [Млекопитающие Якутии, 1971]. Нами этот вид отлавливался в среднем течении Лены в окрестностях г. Якутска, а также в дельте этой реки. В других точках сбора материала этот вид нами не отмечен, в частности в долинах Колымы и Индигирки (рис. 3.54).

Ландшафтное и биотопическое распределение. В районе г. Якутска численность вида в период исследований можно охарактеризовать как низкую. В пойме он наибольшей численности достигал в регулярно затапливаемых ивняках и на ксерофитных лугах. Если второе местообитание является типичным для этого вида, то первое, приуроченное к низкой пойме, не совсем характерно. На II надпойменной террасе численность была ниже, чем в пойме, в том числе и на остепненных лугах. На III террасе также максимальная численность отмечалась в березняках (рис. 3.55).

Широко известен факт, что этот вид придерживается ксерофитных местообитаний, в пределах аласно-таежного ландшафта с наибольшей плотностью заселяет аласы [Млекопитающие Якутии, 1971; Соломонов, 1973; Прокопьев, Винокуров, 1986]. В нашем случае характер распределения вида несколько другой, эти полвки явно предпочитали селиться в среднеувлажненных местообитаниях. Не исключено, что указанное нехарактерное стациональное распределение вида связано с особенностями года, когда проводи-

Таблица 3.45

Морфометрические показатели узкочерепной полевки Центральной и Северо-Восточной Якутии
(по: [Млекопитающие Якутии, 1971])

Промеры	Бассейн Колымы					Центральная Якутия				
	n	M	m	σ	limit	n	M	m	σ	limit
Масса тела, г	10	37,2	2,26	6,77	30,5-51,0	38	40,0	0,79	4,78	31,4-49,8
Длина тела, мм	25	117,9	2,45	8,24	107,0-132,0	39	113,9	1,06	6,61	100,0-124,8
Длина хвоста, мм	10	20,9	0,35	1,72	17,5-24,0	36	22,3	0,36	2,18	18,0-27,8
Промеры черепа, мм:										
основная длина	14	25,7	0,26	0,93	24,1-27,1	34	25,7	0,12	0,39	23,5-27,2
кондилобазальная длина	13	22,9	0,26	0,89	21,5-23,8	34	22,9	0,14	0,80	21,0-25,2
скуловая ширина	14	12,8	0,27	0,96	11,0-14,2	26	13,0	0,12	0,59	11,9-14,0
межглазничная ширина	21	3,0	0,04	0,17	2,6-3,2	34	2,6	0,03	0,16	2,1-2,8
длина верхнего зубного ряда	23	6,0	0,05	0,22	5,7-6,5	36	6,0	0,04	0,27	5,2-6,4
длина верхней диастемы	25	7,8	0,07	0,37	7,2-8,6	36	7,2	0,07	0,42	6,3-8,1
высота перед слуховыми барабанами	13	8,0	0,16	0,54	7,0-8,7	32	7,8	0,08	0,43	6,7-8,6

Рис. 3.54. Места отлова узкочерепной полевки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

Рис. 3.55. Пространственное распределение узкочерепной полевки в т. "Якутск".

Биотопы: низкая пойма: 1 — луг, 2 — кустарник; высокая пойма: 3 — луг, 4 — кустарник; II надпойменная терраса: 5 — луг на берегу озера, 6 — смешанный лес на берегу озера, 7 — березняк, 8 — смешанный лес на склоне, 9 — сосняк, 10 — остепненный склон; III надпойменная терраса: 11 — березняк разнотравный, 12 — березняк брусничный, 13 — сосново-лиственный лес.

лись исследования, который можно охарактеризовать как засушливый.

В дельте Лены узкочерепные полевки с высокой плотностью (56,7 попаданий на 100 конусо-сут) заселяли из всех обловленных типов местообитаний только булгунных, в пределах которого образовали четко очерченную колонию. Кроме того, этот вид в очень небольших количествах встречался в пределах прирусловых повышений по берегам протоков и ручьев.

Характеризуя распределение узкочерепной полевки в дельте Лены, необходимо отметить, что вид достаточно строго придерживается интразональных биотопов. В канавки, установленные в типично тундровых местообитаниях, он не отлавливался. С другой стороны, другие виды мелких млекопитающих не были зарегистрированы в пределах колонии узкочерепной полевки, приуроченной к булгуньях [Вольперт, Сапожников, 1996].

Питание. Рацион вида включает 107 видов растений, из них 13 относятся к основным [Прокопьев, Винокуров, 1986]. В желудках отловленных нами полевок встречаемость хлорофиллосодержащих частей растений доходило до 100 %.

Размножение. Начало размножения вида в Центральной Якутии приходится на конец апреля, сроки его окончания довольно вариабельны и зависят от климатических условий и фазы популяционной численности, как правило, в конце августа — начале сентября [Соломонов, 1973; Прокопьев, Винокуров, 1986].

По срокам начала размножения в дельте Лены мы имеем только косвенные данные. В середине июля абсолютное большинство прибылых самок были беременными, а отдельные особи — рожавшими. С учетом срока беременности 20 дней и наступлением сексуальной зрелости в возрасте около 1 мес начало размножения должно приходиться на последнюю декаду мая — начало июня. Заканчивается размножение в августе. Естественно, что указанные сроки могут варьировать, как и у других видов. В любом случае сезон размножения значительно укорочен по сравнению с Центральной Якутией, несмотря на то что начинается он значительно раньше схода снежного покрова.

Все перезимовавшие животные принимают активное участие в размножении, перезимовавшие и прибылые самки способны принести, как минимум, по два помета. Так, в июле нами отловлена прибылая самка на первых стадиях второй беременности. Отловленные в июле прибылые самки все участвовали в размножении, тогда как у самцов участие не превышало 10–15 %, уже в начале августа беременных самок не отмечено.

Плодовитость, определенная по эмбрионам, относительно низкая $8,7 \pm 0,75$ ($n = 6$). Для сравнения укажем, что в Центральной

Якутии этот показатель колеблется от 9,24 до 9,47 [Прокопьев, Винокуров, 1986; Млекопитающие Якутии, 1971].

В популяции начиная с июля абсолютно преобладают прибылые особи, которые составляют до 90 % популяции. Соотношение полов вне периода размножения близко к паритетному.

3.15. Северосибирская полевка — *Microtus hyperboreus* Vinogradov, 1933

Морфометрическая характеристика. Видовая принадлежность полевок рода *Microtus* подтверждена канд. биол. наук Л.И. Галкиной [БИН, г. Новосибирск].

Надо отметить, что, несмотря на достаточный срок описания [Виноградов, 1933; Огнев, 1950] и наличие посвященных этой проблеме работ [Покровский и др., 1970, 1975; Гилева, 1972], систематический статус двух видов северных полевок (*M. hyperboreus* и *M. middendorffi*) не определен. Принято считать, что ареал северосибирской полевки приурочен к Восточной Сибири, а на запад она не проникает дальше Таймыра [Громов, Поляков, 1977].

Внешне северосибирская полевка очень сходна с полевкой Миддендорфа, но череп несколько уже и вытянут в длину [Попов, 1977]. Характеризуется более крупными размерами слуховых барабанов [Чернявский, 1984].

Судя по краниологическим данным, полевки, отловленные в долинах Адычи, Колымы и Индигирки, относятся к виду *M. hyperboreus*. Ввиду небольшого объема материала мы объединили данные по разным возрастным группам. Половой диморфизм в промерах тела и черепа у северосибирской полевки выражен слабо, хотя возможно, что это объясняется в основном большим количеством прибылых особей в выборке. Так, у родственного вида — полевки-экономки — половой диморфизм в размерах перезимовавших особей выражен достаточно ярко, а у прибылых — гораздо слабее.

Северосибирская полевка Северо-Восточной Якутии немного мельче, чем полевка-экономка, и сходна с полевкой Миддендорфа. Оба вида отличаются от экономки существенно более коротким хвостом — примерно 20 % длины тела.

В наших сборах вид характеризуется относительно высоким и широким черепом [показатели высоты и ширины черепа составляют соответственно 20,1 и 56 % кондилобазальной длины], лицевой отдел укорочен, слуховые барабаны крупные — их относительная длина составляет 36,7 % длины черепа, а ширина — 25,4 %. При сравнении

северосибирских полевок из низовьев Индигирки и среднего течения Колымы можно отметить большое сходство выборок по большинству промеров, за исключением одной пропорции — у колымских особей лицевой отдел черепа немного длиннее, чем у индигирских (табл. 3.46).

В целом надо отметить, что сложное систематическое положение вида и вопрос его конспецифичности с *M. middendorffii* нуждаются в дальнейших расширенных исследованиях.

Распространение. На территорию Якутии приходится большинство находок этого вида. В процессе наших исследований северосибирская полевка обнаружена в долине средней и верхней Колымы, в среднем и нижнем течении Индигирки (рис. 3.56), известны находки в верховьях указанных рек [Кривошеев, Гутин, 1985; Винокуров, Мордосов, 1980]. Имеются данные об обнаружении этой полевки в горах Верхоянья [Яковлев и др., 1995] и устье Мая (правый приток Алдана [Боескоров и др., 1993]). Традиционно наиболее известным местом обитания этого вида считается долина Адычи, откуда, согласно распространенной версии, описан голотип. В то же время точное место отлова зверька, по которому Б.С. Виноградовым [1933] был описан новый вид, не известно. Не исключено, что животное отловлено в долине Индигирки или Колымы.

Материалы для сравнительного анализа северосибирской полевки и полевки Миддендорфа исследователями брались из долины Адычи и Ямала [Покровский и др., 1970, 1975; Гилева, 1972]. В то же время Л.И. Галкина, ознакомившись с нашими сборами из долины Адычи, сделала в устной форме предположение, что в бассейне Яны сохранилась палеоформа полевки Миддендорфа. Последняя версия хорошо объясняет данные о конспецифичности серых полевок, отловленных на Ямале и в долине Адычи.

К сожалению, анализа указанной группы видов с привлечением материалов из долин Колымы и Индигирки, как предлагалось нами ранее [Ревин, Вольперт, 1985], проведено не было, в результате до настоящего времени вопрос этот не выяснен, и соответственно невозможно определить область распространения видов. Попытка разделения северосибирской полевки и полевки Миддендорфа по морфометрическим признакам [Поздняков и др., 1998] не дала однозначных результатов. Мы можем только предполагать, что полевка Миддендорфа заселяет тундровую и лесотундровую зоны на запад от устья Яны, тогда как северосибирская полевка обитает в горно-таежных ландшафтах Колымы, Индигирки и, возможно, Лены.

Поскольку строгие доказательства предположения Л.И. Галкиной о систематическом статусе серых полевок из бассейна Адычи у нас отсутствуют, в данной работе мы сохраняем за серыми полевка-

Таблица 3.46

Морфометрические показатели северосибирской полевки в Якутии

Промеры	Долина Адычи *				Долина Индигирки				Долина Колымы			
	n	M	m	limit	n	M	m	limit	n	M	m	limit
Масса тела, г	26	36,7	2,86	16,5–65,5	72	27,3	1,39	15,5–85,5	11	25,2	1,11	20,0–30,9
Длина тела, мм	29	110,6	2,77	88,0–140	11	99,4	1,22	76,9–146,0	11	99,2	1,76	90,9–107,5
Длина хвоста, мм	25	24,7	0,70	18,5–32,5	116	22,1	0,35	17,1–44,8	11	18,8	0,94	12,6–25,0
Промеры черепа, мм:												
кондилобазальная длина	21	25,4	0,02	24,4–29,5	101	24,8	0,14	21,5–30,9	9	25,3	0,21	24,2–26,0
скуловая ширина	34	14,9	0,02	13,2–16,9	114	13,9	0,09	12,1–17,5	11	14,0	0,14	13,4–14,8
длина верхнего ряда зубов	39	6,7	0,07	5,7–7,6	119	6,6	0,02	6,0–7,7	11	6,3	0,06	5,8–6,7
длина верхней диастемы					118	7,8	0,04	6,7–10,0	11	8,1	0,11	7,5–8,5
ширина мозговой коробки					110	14,4	0,08	12,5–17,4	10	14,6	0,11	14,0–15,0
длина слуховых барабанов					100	9,1	0,06	7,2–10,4	8	9,1	0,10	8,8–9,5
ширина слуховых барабанов					93	6,3	0,05	4,9–7,2	7	6,2	0,14	5,6–6,6
высота в области слуховых барабанов	21	10,1	0,14	8,0–10,8	84	9,8	0,05	8,4–11,1	7	9,7	0,07	9,5–10,0

* По [Млекопитающие Якутии, 1971].

Рис. 3.56. Места отлова северосибирской полевки в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

ми из указанной долины традиционное видовое название — *M. hyperboreus*.

Ландшафтное и биотопическое распределение. В пойме Адычи этот вид был наиболее многочисленным в регулярно затапливаемых ивняках. Максимальная численность, зарегистрированная на одной из канавок, равнялась 68,8 попаданий на 100 конусо-сут. На предпочтение северосибирской полевкой пойменных местообитаний указывают В.Г. Кривошеев и М.В. Попов [1968] и Ю.В. Лабутин [1975]. В аласно-таежном ландшафте рассматриваемый вид отлавливался в двух биотопах — лиственничнике мохово-брусничном в непосредственной близости от старицы и на аласе. В горно-таежном ландшафте в долине Адычи вид нами не отлавливался, хотя имеются указания, что он обычен для остепненных склонов гор [Кривошеев, Попов, 1968].

В долине средней Индигирки нами отловлен единственный экземпляр этого вида на заокочаренной мари с участками ерника, поросшей осоками и пушицей.

В нижнем течении Индигирки этот вид чаще всего отлавливался в пойменных местообитаниях, примыкающих к озерно-таежному ландшафту, в первую очередь на хвощатниках и в меньшей степени

в регулярно затапливаемых ивняках. В пределах озерно-таежного ландшафта максимальное обилие зарегистрировано в лиственничниках бруснично-моховых с большим количеством мочажин. На островах численность этого вида очень низкая. В горно-таежном ландшафте и в пределах примыкающих к нему участков поймы северосибирская полевка не отловлена.

В долине средней Колымы северосибирская полевка чаще всего отлавливалась в пойменном ландшафте на вейниковом лугу. В равнинно-таежном ландшафте отловлен один экземпляр на месте недавно спущенного озера в молодых ивняках.

В долине верхней Колымы численность вида в год исследований была низкой; в пойме вид отлавливался в регулярно затапливаемых ивняках, а в озерно-таежном ландшафте — в лиственничнике с большим количеством мочажин.

В целом северосибирская полевка по всей обследованной территории явно предпочитает пойму, в которой селится по берегам проток и стариц, т.е. в местах с высокой влажностью и обильной травянистой растительностью. По степени гидрофильности она близка к полевке-экономке, которую и замещает в бассейне Адычи.

Питание. В желудках северосибирских полевков чаще всего встречаются остатки хлорофиллсодержащих частей растений как в долине Адычи (89,0 %, $n = 36$), так и в долине Колымы (80 %, $n = 15$). Анализ остатков на кормовых столиках показал, что из травянистых растений в рационе вида представлены в основном луговые злаки [Кривошеев, Попов, 1968]. Среди других кормов необходимо отметить хвощи и корневища, найденные в 13,3 % просмотренных желудков северосибирских полевков в долине Колымы.

Размножение. Данных о сроках начала размножения северосибирской полевки у нас нет, но, судя по тому что в июле отлавливались молодые беременные самки, можно предположить, что оно начинается не позднее мая. Имеются данные, что у этого вида размножение может начинаться еще под снегом в апреле [Кривошеев, Попов, 1968]. Перезимовавшие самки размножаются, по крайней мере, до августа. Нами отловлена в августе перезимовавшая беременная самка. Прибылые самки первых генераций приносят, как минимум, по два помета, вступая в размножение еще в июне. Самки второй генерации приносят, по-видимому, один помет. В долине Адычи плодовитость равняется $7,7 \pm 0,54$ ($n = 10$ [Лабутин, 1975]; наши данные). На Колыме нами отловлена одна беременная самка с шестью эмбрионами. В верховьях Индигирки этот показатель колеблется по годам от 7,2 до 3,5 [Винокуров, Мордосов, 1980], а в низовьях реки средняя величина выводка составила $7,35 \pm 0,55$ ($n = 17$).

3.16. Полевка Миддендорфа — *Microtus middendorffi* Poljakov, 1881

Морфометрическая характеристика. Согласно литературным данным, по всему ареалу существует один номинальный подвид полевки Миддендорфа. По основным промерам полевки якутских популяций укладываются в пределы изменчивости номинальной таймырской формы [Млекопитающие Якутии, 1971]. Характеризуется небольшой длиной хвоста — для западных популяций вида она составляет примерно 1/3–1/4 длины тела, для якутских популяций — еще меньше, около 20–25 % [Млекопитающие Якутии, 1971]. Череп относительно крупный, теменные гребни небольшие, межглазничное сужение выражено умеренно (табл. 3.47). Половой диморфизм не отмечен.

Распространение. Четкое выявление области распространения этого вида в рассматриваемом регионе на настоящий момент затруднено из-за неразработанности систематики северной группы серых полевок — *middendorffi* — *hyperboreus*. Наша точка зрения по этому вопросу изложена выше, в разделе, посвященном северосибирской полевке. Не возвращаясь к данной проблеме, с высокой степенью уверенности мы относим к полевым Миддендорфа серых полевок из указанной группы, обитающих в тундровой и лесотундровой части долины Лены (рис. 3.57).

Самой южной находкой полевки Миддендорфа в указанной долине является т. “Бесюке”. В пойме максимальной численности она достигала на заливных лугах в биотопах высокой поймы или не отлавливалась совсем, или была менее многочисленной (рис. 3.58).

В равнинно-таежном ландшафте вид зарегистрирован с относительно высоким уровнем численности в лиственничнике моховом переувлажненном и не был отловлен в более сухом лиственничнике лишайниковом. В лесотундре Таймыра вид предпочитает кустарничковые местообитания [Литвинов, 1987].

В дельте Лены полевка Миддендорфа отлавливалась только в южной части дельты [Вольперт, Сапожников, 1996]. Причем представители этого вида фиксировались только в пойме, достигая здесь в отдельных биотопах довольно высоких уровней обилия — 44,1 на 100 конусо-сут. В то же время, согласно литературным сведениям, в нижнем течении Омола вид селится в заболоченных полигональных тундрах [Меженный, 1975], сходные местообитания предпочитает в тундрах Ямала и Таймыра [Дунаева, 1948; Юдин, 1980], причем на Таймыре он заселяет только субарктические тундры [Юдин, 1980].

Питание. Вид повсеместно предпочитает наиболее распространенные в тундре виды растительности — осоки и пушицу [Дунаева,

Таблица 3.47
Морфометрические показатели полевки Миддендорфа из тундр Северо-Восточной Якутии

Промеры	Низовья Омолона (данные А.А. Меженного)					Низовья Колымы [Млекопитающие Якутии, 1971]				
	n	M	m	σ	limit	n	M	m	σ	limit
Масса тела, г	59	38,3	1,76	13,52	18,0–68,0	—	—	—	—	—
Длина тела, мм	59	113,8	1,69	13,0	92,0–145,0	—	—	—	—	—
Длина хвоста, мм	59	22,9	0,48	3,75	16,0–32,0	—	—	—	—	—
Промеры черепа, мм:	82	26,6	0,18	1,67	23,1–30,1	11	29,0	0,30	0,95	27,7–30,4
	83	15,0	0,13	1,27	13,0–18,0	12	16,5	0,06	0,20	15,9–17,5
скуловая ширина	79	10,0	0,11	0,94	8,7–14,5	5	13,5	0,21	0,42	12,8–13,8
ширина черепа по линии слуховых отверстий	47	9,6	0,06	0,44	8,5–10,0	9	10,3	0,03	0,10	10,0–10,3
высота черепа в области слуховых барабанов	86	7,9	0,07	0,64	6,6–9,4	13	9,1	0,03	0,40	8,0–9,5
длина верхней диастемы	85	5,5	0,13	1,26	5,6–7,3	13	6,3	0,09	0,30	5,8–6,7
длина верхнего зубного ряда

Рис. 3.57. Места отлова полевки Миддендорфа в районе исследований.
Усл. обозн. см. рис. 3.1.

1948; Млекопитающие Якутии, 1971]. В наших материалах во всех наполненных желудках отмечены зеленые части растений.

Размножение. В нижнем течении Омоя размножение начинается еще до схода снежного покрова примерно в середине мая и длится вплоть до сентября [Меженный, 1975]. По нашим данным, в

Рис. 3.58. Пространственное распределение полевки Миддендорфа в т. "Бесюке".

Биотопы: низкая пойма: 1 — ивняки, 2 — луг; высокая пойма: 3 — кустарник; равнинно-таежный ландшафт: 4 — лишайничник лишайниковый, 5 — лишайничник моховый.

дельте Лены полевки Миддендорфа не размножались уже в первых числах сентября.

В дельте Лены, по нашим весьма ограниченным данным, плодовитость относительно низкая — 7 ($n = 3$), в устье Омоя этот показатель выше — $9 \pm 0,59$, так же как и на Ямале — 7,8–9,7 [Балахонов и др., 1988].

Половозрастная структура типична для северных популяций мышевидных — из 19 полевок, отловленных в первой декаде сентября, все были прибылыми. Среди них самки составляли 36,8 %.

3.17. Полевка-экономка — *Microtus oeconomus* Pallas, 1776

Морфометрическая характеристика. Один из наиболее крупных представителей рода *Microtus*, характеризуется относительно длинным хвостом — около 30 % длины тела, крупным черепом с широкой мозговой коробкой. Скуловые дуги полого расходятся в стороны. Лобно-теменные гребни хорошо развиты.

Как известно, представители вида, обитающие в северо-восточной Якутии, отличаются от особей из других регионов более крупными размерами [Млекопитающие Якутии, 1971], но даже на этой территории полевки-экономки, отловленные в нижнем течении Индигирки и в тундровой зоне бассейна Яны, выделяются по промерам тела и черепа в сравнении, например, с экземплярами из долины Колымы и среднего течения Лены (табл. 3.48).

В большинстве работ указывается на отсутствие четко выраженного полового диморфизма у этого вида. Однако наши данные свидетельствуют о том, что при продвижении на север не только увеличиваются размеры тела, но и усиливаются различия между самцами и самками. У взрослых особей индигирской популяции хорошо выражен половой диморфизм в отношении массы и размеров тела: самцы существенно тяжелее и крупнее самок (по критерию Стьюдента уровень достоверности различий $p < 0,001$), хвост у них короче (соответственно 27,5 и 32,1 % относительно длины тела), высота ушной раковины — меньше. Кроме того, самцы и самки различаются по размерам и пропорциям черепа: у самцов он достоверно крупнее ($p < 0,005$), относительно длинный и узкий, причем особенно удлинен лицевой отдел.

Распространение. Полевка-экономка по характеру распространения является транспалеарктическим видом, в Якутии распространена очень широко [Млекопитающие Якутии, 1971].

Нам не удалось обнаружить этот вид в бассейне Адычи (рис. 3.59), как и предыдущим исследователям данной территории [Кривошеев, Попов, 1968; Лабу́тин, 1975]. Причины ее отсутствия в

Таблица 3.48

Морфометрические показатели полевки-экономки долин рек Северной Якутии
(перезимовавшие особи)

Промеры	Долина средней Лены*			Бассейн Яны		
	n	$M \pm m$	limit	n	$M \pm m$	limit
Масса тела, г	22	$48,4 \pm 3,18$	25,0–70,0	—	—	—
Длина тела, мм	24	$120,8 \pm 2,06$	93,0–137,0	20	$142,8 \pm 2,69$	118,2–165,0
Длина хвоста, мм	25	$43,3 \pm 1,26$	31,0–54,0	17	$41,3 \pm 0,95$	35,3–47,6
Длина плюсны, мм	—	—	—	19	$18,2 \pm 0,37$	12,0–19,2
Высота ушной раковины, мм	—	—	—	17	$14,9 \pm 0,35$	11,4–17,3
Промеры черепа, мм:						
кондилобазальная длина	19	$27,9 \pm 0,39$	25,0–30,0	—	—	—
длина носовых костей	—	—	—	—	—	—
длина верхнего зубного ряда	25	$6,5 \pm 0,04$	6,0–7,0	—	—	—
длина диастемы	25	$8,2 \pm 0,10$	7,0–9,0	—	—	—
скуловая ширина	20	$15,5 \pm 0,23$	14,0–17,0	—	—	—
межглазничная ширина	—	—	—	—	—	—
высота в области слуховых барабанов	14	$10,1 \pm 0,15$	9,0–11,0	—	—	—

Рис. 3.59. Места отлова полевки-экономки в районе исследований.

Усл. обозн. см. рис. 3.1.

Промеры	Долина Индигирки			Долина Колымы		
	n	$M \pm m$	limit	n	$M \pm m$	limit
Масса тела, г	85	$77,8 \pm 1,43$	37,0–111,0	19	$65,0 \pm 3,28$	44,9–93,3
Длина тела, мм	89	$140,9 \pm 1,06$	112,8–165,0	19	$137,4 \pm 2,64$	114,7–156,0
Длина хвоста, мм	89	$40,9 \pm 0,48$	27,5–51,5	19	$41,0 \pm 1,05$	35,0–51,5
Длина плюсны, мм	90	$19,1 \pm 0,09$	17,2–21,5	19	$19,6 \pm 0,16$	18,4–20,8
Высота ушной раковины, мм	93	$13,5 \pm 0,09$	11,3–15,5	19	$14,1 \pm 0,21$	12,1–16,1
Промеры черепа, мм:						
кондилобазальная длина	41	$30,9 \pm 0,21$	27,7–32,9	16	$29,0 \pm 0,24$	27,3–30,7
длина носовых костей	41	$8,6 \pm 0,09$	7,1–9,6	21	$8,4 \pm 0,17$	7,6–10,4
длина верхнего зубного ряда	38	$7,1 \pm 0,05$	6,3–8,0	20	$7,1 \pm 0,05$	6,7–7,5
длина диастемы	38	$9,9 \pm 0,09$	8,5–10,8	21	$9,1 \pm 0,15$	6,9–10,1
скуловая ширина	41	$17,8 \pm 0,12$	15,8–19,7	21	$16,5 \pm 0,19$	15,0–18,1
межглазничная ширина	42	$3,8 \pm 0,03$	3,4–4,2	21	$4,0 \pm 0,05$	3,6–4,8
высота в области слуховых барабанов	40	$11,0 \pm 0,07$	10,1–12,0	15	$10,4 \pm 0,15$	8,9–11,5

* По [Млекопитающие Якутии, 1971].

указанной долине на настоящий момент неясны [Ревин, Вольперт, 1985], поскольку известны находки в нижнем течении Яны [Кривошеев, Попов, 1968; Вольперт, Сапожников, 1998]. Кроме того, этот вид нами не отловлен в дельте Лены [Вольперт, Сапожников, 1996] и в долине Индигирки в районе Момского хребта. В последнем случае отсутствие полевки-экономки объясняется, возможно, особенностями года, так как в 100 км ниже по реке (Индигирке) этот вид был обычен. Но при этом необходимо отметить, что он не отловлен и в верховьях Индигирки [Винокуров, Мордосов, 1980]. Так что на настоящий момент данных о находках полевки-экономки в долине Индигирки выше пересечения этой рекой Момского хребта не имеется (рис. 3.59).

Ландшафтное и биотопическое распределение. Долина Лены. Полевка-экономка отлавливалась нами в двух точках долины средней Лены и в устье Бесюке.

В окрестностях г. Якутска полевка-экономка достигала максимальной численности в пойме на заливных лугах. В ивняках ее обилие было несколько ниже. В местообитаниях высокой поймы наблюдается обратная картина: численность вида в кустарниковых ме-

стообитаниях была больше, чем в открытых. Во всех обловленных пойменных биотопах полевка-экономка являлась доминантом сообщества, причем остальные виды значительно уступали ей по численности [Вольперт и др., 1997].

В пределах II надпойменной террасы рассматриваемый вид отловлен только на сыром лугу на берегу озера, но в данном случае полевка-экономка являлась только содоминантом и ее численность (отлов проводился параллельно) была значительно ниже, чем в пойме.

В местообитаниях III надпойменной террасы в период исследований экономка в небольших количествах встречалась в березняках, предпочитая при этом более увлажненные травянистые. При этом в березняках вид был немногочислен и заметно уступал по обилию типичным таежным видам.

Таким образом, в окрестностях г. Якутска полевка-экономка явно предпочитает местообитания низкой поймы, где и достигает высокой численности, доминируя в сообществе мелких млекопитающих.

В т. "Лепписке", в районе устья Вилюя, полевка-экономка является одним из фоновых видов, в пойме она — один из содоминантов и даже доминант сообществ мелких млекопитающих. В этом ландшафте встречалась во всех обследованных нами биотопах, наибольшая численность зарегистрирована по многолетним данным на заливном лугу (рис. 3.60), где вид занимал доминирующее положение. Незначительно ниже было обилие вида в регулярно затопляемых ивняках, но в последнем местообитании полевка-экономка являлась только содоминантом [Ревин и др., 1982].

В незатопляемых ивняках численность была значительно ниже, чем в ивняках низкой поймы, хотя известно, что местообитания, приуроченные к высоким участкам, служат для этого вида станциями переживания паводка [Путилов, Фалеев, 1981]. Анализ популяционной структуры поселений вида в этих биотопах (рис. 3.61) показывает, что на заливных лугах и в затопляемых ивняках чаще отлавливались перезимовавшие животные, в особенности беременные самки. Поскольку в период весеннего паводка они не могли здесь выжить, явно наличие послепаводковой миграции на освобождающиеся от воды площади, что указывает на предпочтительность низкой поймы.

Среди молодых самок большинство беременных также отловлены в низкой пойме, т.е. она является основным местом размножения вида, как и в долине Енисея [Сапогов, 1983]. При проведении абсолютного учета на участке высокой поймы плотность населения полевки-экономки равнялась 6 особям на 1 га.

Рис. 3.60. Пространственное распределение полевки-экономки в т. "Лепписке".

Биотопы: **низкая пойма:** 1 — затопляемые ивняки, 2 — заливные луга; **высокая пойма:** 3 — незатопляемые ивняки, 4 — березняки, 5 — ельники, 6 — смешанные леса; **равнинно-таежный ландшафт:** 7 — молодые лиственничники, 8 — лиственничники мохово-брусничные, 9 — смешанные леса, 10 — березняки; **горно-таежный ландшафт:** 11 — смешанные леса, 12 — осыпи, 13 — тополевики.

В равнинно-таежном ландшафте к наиболее предпочитаемым биотопам относятся березняки и смешанные хвойно-лиственные леса, но численность вида и в них невелика. Полевка-экономка — ярко выраженный гидрофил [Громов, Поляков, 1977], в Центральной Якутии она заселяет берега аласных озер [Соломонов, 1984], в Западной Сибири — берега болот и сильно увлажненные луга [Юдин, Потапкина, 1977; Глотов и др., 1978], но для рассматриваемого ландшафта указанные биотопы мало характерны. По-видимому, по этой причине полевка-экономка обычна, хотя и немногочисленна, в лесных биотопах.

Если по данным относительного учета население в лиственничниках представлено молодыми инфантильными особями или перезимовавшими самцами, то по данным мечения [Попов и др., 1978], в лиственничнике мохово-брусничном отмечены не только молодые особи, но и размножающаяся оседлая самка, имеющая свой очерченный индивидуальный участок. Последнее обстоятельство позволяет нам утверждать, что полевки-экономки используют лиственничники как станции размножения. Случаи заселения этим видом лиственничников в Якутии отмечались и ранее [Кривошеев, 1964; Ревин, 1968, 1975; Млекопитающие Якутии, 1971]. В бассейне оз. Байкал полевка-экономка способна заселять склоны гор и субальпийские луга [Швецов, 1977].

Многие авторы указывают на положительную связь заселения лесных биотопов с высокой численностью в типичных местообитаниях. В нашем случае численность полевки-экономки повсеместно

Рис. 3.61. Демографическая структура населения полевки-экономки по биотопам в долинах Лены и Колымы.

была невелика. Имеются данные, что серые полевки обычно покидают заселенные лесными полевками лесные биотопы с момента начала репродуктивного периода из-за усиления межвидовой агрессии [Turner et al., 1975]. По нашим данным, полевки-экономки успешно размножаются в нехарактерных для них биотопах, чаще отлавливаясь около мочажин и в переувлажненных низинках. Скорее всего, на заселение нехарактерных стадий полевку-экономку толкает дефицит типичных для вида местообитаний. При проведении абсолютного учета в равнинно-таежном ландшафте полевка-экономка не отловлена.

В горно-таежном ландшафте полевки-экономки в данном случае не отловлены, хотя известно, что в Верхоянье этот вид проникает довольно высоко в горы, встречаясь там только в долинах рек [Яковлев и др., 1995].

В целом в среднем течении Лены полевка-экономка явно предпочитает пойменный ландшафт, заселяя также широкий спектр сырых местообитаний в таежных ландшафтах, что обеспечивает мозаичный тип распространения в последних.

В низовьях Лены полевка-экономка отловлена нами только в пойменных биотопах, максимальная численность и индекс доминирования отмечены на заливном лугу. Тут же отловлена единственная за время исследований беременная перезимовавшая самка. В зарослях кустарниковой ивы и ольхи, расположенных на возвышенности в низкой пойме, перезимовавших животных не отловлено, и показатели интенсивности размножения у прибылых тут ниже, чем в других биотопах поймы.

Возможно, что при продвижении на север по долине реки полевка-экономка строже придерживается наиболее благоприятных для нее пойменных местообитаний.

В нижней части долины Яны [т. "Кулар"] полевка-экономка в природных местообитаниях была немногочисленна. Несколько зверьков отловлено в долине небольшого ручья. Зато она была очень многочисленна на посттехногенных территориях [Вольперт, Сапожников, 1998].

Долина Индигирки. В равнинной части долины в среднем течении реки полевка-экономка в пойменном комплексе достигала максимальной численности в ольховнике, приуроченном к высокой пойме, где этот вид встречался в одинаковых количествах с красной полевкой. Гораздо менее многочисленной она была в других биотопах высокой поймы. Заметим, что период исследований совпал с максимальными уровнями паводка, что лишило возможности обловить биотопы низкой поймы. Не исключено, что довольно высокая численность вида в местообитаниях высокой поймы

объясняется иммиграцией сюда животных из затопленных биотопов.

В другой точке среднего течения — “Белая Гора” — полевка-экономка отлавливалась, как и во многих других, только в пойме. Наиболее многочисленной она была в хвощатниках, но индекс доминирования вида был выше в пойменном лиственничнике. В регулярно затопляемых ивняках полевка-экономка, против обыкновения, являлась всего лишь фоновым видом.

В таежных ландшафтах на этом участке долины вид нами не отловлен, хотя отловом охвачены такие типичные для них местообитания, как травянистые берега озер и ивовые заросли. Поскольку перечисленные местообитания относятся к предпочитаемым этим видом по всему ареалу [Громов, Поляков, 1977], можно сделать вывод о глубиной депрессии численности полевки-экономки в таежных ландшафтах в период исследований.

В нижнем течении Индигирки полевка-экономка оказалась одним из самых распространенных и многочисленных видов мелких млекопитающих. Поскольку показатели численности вида в пойме, примыкающей к горно- и озерно-таежным ландшафтам, и на островах были близки и направления ее изменений совпадали [Шадрина, Вольперт, 1990], мы рассматриваем пойменные биотопы в совокупности, не делая разделения по расположению аналогичных биотопов.

В районе исследований наиболее высокая численность полевки-экономки отмечена в биотопах низкой поймы — на хвощовых лугах и в регулярно затопляемых ивняках. Несколько ниже она в редко затопляемых ивняках и очень низка в островных лиственничниках высокой поймы (рис. 3.62). При рассмотрении демографической структуры поселений в разных пойменных биотопах (рис. 3.63), обращает на себя внимание относительно более высокий процент перезимовавших животных на редко затопляемых участках. При этом в ивняках структура более гармоничная (в уловах присутствуют перезимовавшие самцы и самки), размножение идет активнее, а в лиственничниках эта возрастная группа представлена только самцами, и показатели участия в репродукции прибылых особей самые низкие по ландшафту.

Из трех других пойменных местообитаний редко затопляемые ивняки характеризуются не только наиболее высоким процентом перезимовавших животных, но и высокой репродуктивной активностью этой возрастной группы (здесь поймано больше всего беременных самок). По интенсивности участия в воспроизводстве прибылых животных биотопы можно расположить в порядке убывания таким образом: ивняки низкой поймы, ивняки высокой поймы, хвощатники, лиственничники. В обоих типах ивняков полевка-экономка была

Рис. 3.62. Пространственное распределение полевки-экономки в т. “Шаманово”.

Биотопы: озерно-таежный ландшафт: 1 — лиственничник мохово-голубичный, 2 — лиственничник бруснично-моховый; пойма левого берега: 3 — регулярно затопляемые ивняки; острова: 4 — хвощатники, 5 — лиственничник мохово-брусничный, 6 — редко затопляемые ивняки; пойма правого берега: 7 — хвощатники, 8 — регулярно затопляемые ивняки; 9 — редко затопляемые ивняки; горно-таежный ландшафт: 10 — осыпь, 11 — лиственничник мохово-лишайниковый, 12 — лиственничник голубично-моховый, 13 — лиственничник моховый переувлажненный.

абсолютным доминантом сообщества, а в хвощатнике — содоминантом лесного лемминга, активно выселявшегося туда из прилежащих таежных ландшафтов [Вольперт, Шадрина, 2001].

Очевидно, общая высокая обводненность территории, характерная для региона, способствует тому, что полевка-экономка широко расселена по всему комплексу таежных местообитаний: она отловлена во всех биотопах, хотя ни в одном не входила в число даже содоминантов. Демографическая структура ее поселений в озерно-таежном ландшафте сходна с таковой поймы как по проценту перезимовавших животных, так и по относительной доле размножавшихся прибылых самок, но самцов в обеих возрастных группах здесь гораздо больше. Кроме того, надо подчеркнуть, что при общем сходстве структуры поселений численность вида в пойме в 6 раз выше, чем в озерно-таежном ландшафте.

В горной тайге доля перезимовавших особей незначительна. Отсутствие самой оседлой части популяции — перезимовавших самок — можно объяснить их крайне низкой численностью или тем, что отлов проведен во временных поселениях зверьков, проникающих из прилежащей поймы. В пользу второго предположения свидетельствуют не только демографическая структура и малочисленность (средний показатель в 26 раз ниже, чем в пойме), но и тот факт, что отлов велся в основном в полосе 2–3 км от береговой линии. Следует отметить, что в конусы, расположенные на расстоянии 0,5–1 км от поймы, полевки-экономки ловились в 2 раза чаще, чем в более удаленные.

Рис. 3.63. Демографическая структура населения полевки-экономки по биотопам в т. "Шаманово".

Таким образом, полевка-экономка в нижнем и среднем течении Индигирки — широко распространенный и многочисленный вид, который явно предпочитает пойму другим ландшафтам. Движения численности этого вида совпадают по всей пойме, что указывает на наличие общего фактора, определяющего в первую очередь численность вида.

Долина Колымы. Полевка-экономка отлавливалась здесь во всех точках наблюдения. В среднем течении реки в пойменном комплексе вид достигал максимальной численности в незатопляемых ивняках (рис. 3.64) при максимальном индексе доминирования. Здесь же отмечен самый высокий процент встречаемости перезимовавших животных и размножающихся прибылых. В незатопляемых ивняках численность вида ниже, полевка-экономка представлена тут только молодыми зверьками (рис. 3.61), что указывает, на наш

Рис. 3.64. Пространственное распределение полевки-экономки в т. "Жирково".

Биотопы: **низкая пойма:** 1 — ивняки, 2 — веерные луга; **высокая пойма:** 3 — лиственничник, 4 — ивняки; **озерно-таежный ландшафт:** 5 — лиственничники на гнилых, 6 — лиственничники мохово-брусничные, 7 — ивняки; **горно-таежный ландшафт:** 8 — лиственничники лишайниковые, 9 — лиственничники мохово-голубичные.

взгляд, на наличие вторичной миграции, как и в долине средней Лены.

В озерно-таежном ландшафте численность полевки-экономки в годы исследований была низкой. В отличие от периода, описанного В.Г. Кривошеевым [1964], когда полевка-экономка активно использовала таежные местообитания, в нашем случае вид встречался исключительно в ивовых зарослях, причем крайне редко. Не отловлены особи этого вида на алах и кочкарниковых марях, где нами устанавливались ловчие заборчики.

В горно-таежном ландшафте полевка-экономка отмечена только в лиственничнике лишайниковом (рис. 3.64), причем численность вида была очень низкой — отловлено всего два экземпляра, оба около опушки леса. В целом численность полевки-экономки в период исследований можно охарактеризовать как низкую по сравнению с 1960–1964 гг., когда численность была значительно выше [Кривошеев, 1964].

Выше по течению, в т. "Мангазейка" численность полевки-экономки была несколько выше, чем в т. "Жирково". В пойменном комплексе вид был наиболее многочисленным в регулярно затопляемых ивовых зарослях. Процент перезимовавших животных и беременных прибылых самок выше в хвощатниках, которые непосредственно прилегали к надпойменным террасам, что позволяет зверькам укрываться во время паводка.

В озерно-таежном ландшафте полевки-экономки чаще всего отлавливались в ольховнике и березняке и значительно реже — в лиственничнике мохово-брусничном.

Результаты экспериментального кормления полевки-экономки

Вид корма	n	M	m	limit	σ
Мышиный горошек	8	25,8	2,2	19,9–34,8	6,2
Ячмень гривастый	16	25,6	1,5	17,6–36,6	6,0
Хвощ полевой	9	21,6	0,9	16,7–25,3	2,8
Ячмень безостый	8	24,1	0,9	20,0–27,4	2,5
Чита луговая	4	21,2	0,6	20,0–22,6	1,1
Иван-чай узколистый	3	20,2	0,7	18,9–21,2	1,2
Горец птичий	3	9,1	3,5	2,5–14,6	6,1
Голубика [ягоды]	5	6,3	2,8	1,1–17,3	6,3
Ячмень гривастый [семена]	3	6,2	2,0	3,9–10,1	3,4
Ива сухолюбивая [листья]	2	5,4	0,6	4,8–6,0	0,8
Брусника [листья]	2	3,8	1,4	3,6–4,0	0,3
Всего кормов за сутки	27	42,9	1,51	23,3–59,4	7,85

В т. “Поповка” в пойме самой высокой численности вид достигал в затопляемых ивняках, где являлся абсолютным доминантом. Вторым по предпочтительности местообитанием являются хвощатники, которые примыкали к надпойменной террасе. Как ни странно, в незатопляемых ивняках вид не обнаружен, как и в тополеводниках.

В пределах озерно-таежного ландшафта полевка-экономка отлавливалась в заболоченном лиственничнике, где уступала по численности типично таежным видам: красной полевке, средней бурозубке.

В целом в долине Колымы полевка-экономка явно предпочитает пойму другим обследованным ландшафтам, более охотно заселяя участки низкой поймы, которые являются для вида стациями размножения, но не могут служить стациями переживания видом паводка, в результате численность выше всего на фрагментах низкой поймы, непосредственно примыкающих к надпойменной террасе и к участкам высокой поймы.

Если рассматривать биотопическое и ландшафтное распределение вида по всем обследованным долинам, то необходимо отметить, что, несмотря на его широкое распространение, четко прослеживается предпочтение пойменных ландшафтов. В пределах поймы вид находит наиболее благоприятные условия для существования в местообитаниях низкой поймы при наличии рядом высоких участков, где зверьки спасаются от паводков. Заселение таежных биотопов происходит явно активнее в подзоне средней тайги, чем в северных редколесьях, естественно, что этот процесс зависит от сезонного уровня численности вида и обводненности территории.

Питание. В долине средней Лены во всех биотопах питание полевки-экономки весьма однотипно и характерно для вида [Ревин и др., 1988]. Основу его составляют хлорофиллсодержащие части травянистых растений. На аналогичный рацион вида указывают многие авторы [Кривошеев, 1964; Млекопитающие Якутии, 1971; Соломонов, 1973; Ревин, 1968]. В наших исследованиях зеленые корма обнаружены в 95 % исследованных желудков, второе место по встречаемости занимают корневища. Всего один раз в желудке полевки-экономки обнаружены ягоды, которые являются обычным объектом питания вида в других регионах [Юдин и др., 1976; Алина, Реймерс, 1975].

Нами проводилось экспериментальное кормление с целью выявления объема потребления и предпочтительности кормов. К концу эксперимента, который проводился в августе, масса особей возросла на 1,5–2 г. Как видно из данных экспериментального кормления (табл. 3.49), полевка-экономка явно предпочитает травянистые растения, произрастающие в среднеувлажненных или переувлажненных местообитаниях.

В долине Индигирки анализ содержимого желудков показал, что излюбленным кормом вида является хвощ полевой, отмеченный в 79,1 % наполненных желудков ($n = 568$; из них пустых — 20,1 %). На втором месте по встречаемости — вегетативные части травянистых растений (58,1 %), корневища и мхи составляли соответственно 1,8 и 1,3 %, случаи поедания семян, ягод голубики, брусники и шиповника были единичными (0,2–0,4 %).

В долине Колымы основу питания полевки-экономки, как и в предыдущих долинах, составляли зеленые части растений. Хвощ, в отличие от долины Индигирки, не имеет столь существенного значения, его встречаемость в желудках достигает в августе 29,2 %. Анализ биотопических особенностей питания вида показал, что там, где хвощ произрастает в изобилии, его встречаемость доходит до 80–85 %. В.Г. Кривошеев [1964] сообщает, что, судя по остаткам на кормовых столиках, корневища хвоща поедались чаще, чем стебли.

Таким образом, питание полевки-экономки во всем обследованном регионе довольно однородно, основу его составляют хлорофиллсодержащие части растений. На северо-востоке возрастает роль хвоща полевого, в изобилии произрастающего в поймах рек и играющего большую роль в существовании наземных млекопитающих [Егоров, Кривошеев, 1965].

Размножение. Начало размножения, судя по отлову первых беременных самок, приходится в долине средней Лены на середину апреля — начало мая, а заканчивается в августе—сентябре, последний срок зависит, по-видимому, как от плотности популяции [Шилов и др., 1977], так и от климатических условий. В долине средней Колымы, по данным В.Г. Кривошеева [1964], размножение начинается в апреле и заканчивается в августе, в период наших исследований в 1981–1982 гг. зарегистрированы беременные самки во второй декаде

сентября. Близкие к указанным сроки репродуктивного периода указываются и для других районов Якутии [Ревин, 1968, 1989; Соломонов, 1973].

В долине нижней Индигирки, судя по отлову вторично беременных перезимовавших и беременных прибылых самок в конце июня, размножение начинается в первых числах мая, еще до схода снежного покрова, заканчивается в конце августа, но по годам эти сроки могут варьировать [Шадрина, Вольперт, 1990]. Начало репродукции под снежным покровом отмечено в Центральной Якутии [Соломонов, 1973; Прокопьев, 1988], но в указанном регионе начинается значительно раньше, чем в низовьях Индигирки.

Для полевки-экономки, как и для других видов, проникших на север [Шварц, 1963], характерна высокая интенсивность размножения. Все перезимовавшие особи активно участвуют в репродукции, нами достоверно определено наличие двух пометов, но вполне обосновано предположение В.Г. Кривошеева [1964] о возможности наличия четырех пометов в течение сезона размножения, а три помета дают, по-видимому, большинство перезимовавших самок.

Прибылые самки начинают размножаться с июня, отдельные особи — при массе тела 21–22 г, большинство же — при массе около 30 г. Основная волна размножения прибылых приходится на июль, тогда как у перезимовавших — на июнь (табл. 3.50). В периоды, на

Таблица 3.50

Степень участия в размножении полевок-экономок, %

Месяц	Перезимовавшие					Сеголетки				
	самки			самцы		самки			самцы	
	всего добыто	рожавшие	беременные	всего добыто	размножавшиеся	всего добыто	рожавшие	беременные	яловые	всего добыто

Долина нижней Индигирки

Июнь	8	100	100	3	100	5	40,0	60,0	0	
Июль	24	79,2	83,3	53	100	102	46,1	27,5	30,4	
Август	17	17,6	100	27	100	259	15,4	34,0	54,8	
Сентябрь	—	—	—	2	100	11	0	18,2	81,8	

Долина средней Колымы

Июль	3	100	0	2	100	4	75,0	0,0	25,0	28	78,6
Август	—	—	—	1	100	8	50,0	0,0	50,0	16	6,3
Сентябрь	—	—	—	1	100	17	11,8	23,6	64,7	7	0,0

Долина средней Лены

Июль	8	87,5	100	20	100	34	67,6	14,7	23,5	68	55,8
Август	9	66,6	33,3	12	100	33	36,3	36,3	27,3	52	42,3
Сентябрь	—	—	—	12	100	17	11,8	23,6	64,7	7	0,0

которые приходится пик численности, размножение прибылых самок заканчивается раньше, что наблюдалось нами в таежной и лесотундровой подзонах. Половозрелость самцов в фазе пика численности наступает позже, чем в периоды депрессий [Шадрина, Вольперт, 1990].

Плодовитость полевки-экономки в долине средней Лены существенно колеблется по годам, размах колебаний и направление изменения размеров выводка совпадают у обеих возрастных групп. В годы высокой численности плодовитость выше, чем в периоды депрессий [Ревин и др., 1988]. В долине нижней Индигирки по годам плодовитость достоверно не различалась [Шадрина, Вольперт, 1990].

Сравнение плодовитости самок полевок-экономок в разных географических точках (табл. 3.51) показало, что почти во всех пунктах отлова, расположенных южнее района наших исследований, этот показатель ниже, причем для барабинской популяции $p < 0,001$, южно-якутской — $p < 0,001$, среднеколымской — $p < 0,05$ и среднеленской — $p < 0,05$. Различия статистически достоверны, что подтвер-

Таблица 3.51

Географическая изменчивость величины выводка

Место сбора	$M \pm m$	n	Источник
Полуостров Ямал	8,7	—	Пястолова, 1971
Центральная Якутия	$7,79 \pm 0,48$	24	Млекопитающие Якутии, 1971
Чаунская низменность	$7,70 \pm 0,20$	245	Юдин и др., 1976
Средняя Индигирка	$7,6 \pm 0,5$	9	Наши данные
Лено-Вилюйское междуречье	$7,42 \pm 0,40$	36	Мордосов, 1980
Средняя Колыма	$7,4 \pm 0,59$	17	Наши данные
Нижняя Лена	$7,4 \pm 0,41$	17	Наши данные
Чукотка	$7,40 \pm 0,30$	24	Юдин и др., 1976
Верхняя Колыма	$7,3 \pm 0,34$	26	Наши данные
Низовья Индигирки	$7,17 \pm 0,12$	218	Наши данные
Центральная Якутия	$7,08 \pm 0,21$	84	Соломонов, 1973
Долина Колымы	$6,83 \pm 0,09$	292	Млекопитающие Якутии, 1971
Предверхоанье	$6,80 \pm 0,98$	140	Ревин и др., 1988
Бассейн Оленек	6,86	44	Мордосов, 1997
Карелия	$6,50 \pm 0,50$	8	Ивантер, 1975
Средняя Волга	6,50	—	Попов, 1960
Прибайкалье	6,3	—	Матурова, 1982
Южный Урал	6,0	—	Шварц и др., 1957
Алтай	6,0	103	Потапкина, 1977
Верхняя Лена	6,0	—	Реймерс, Воронов, 1963
Южная Якутия	$5,84 \pm 0,17$	69	Ревин, 1989
Бараба	$5,44 \pm 0,11$	225	Готов и др., 1978
Татария	5,4	—	Попов, 1960

ждает мнение С.С. Шварца [1963] о более напряженном ходе воспроизводства в северных частях ареала. На Чукотке, в Центральной Якутии, Лено-Вилуйском междуречье, на п-ове Ямал и в Чаунской низменности плодовитость выше, чем в низовьях Индигирки, но достоверны различия лишь с Чаунской низменностью ($p < 0,05$).

Возрастная и половая структура популяции. В июне основную часть популяции представляют перезимовавшие полевки, а с июля — сеголетки, преобладание которых в августе—сентябре носит безусловный характер (рис. 3.65). В отдельные годы молодые составляют большинство уже в июне (1983 г., долина средней Колымы). Преобладание прибылых в популяции в начале летнего периода обеспечивается за счет активного размножения сеголеток первых генераций; полевки, рожденные в августе—сентябре, как правило, участия в размножении не принимают. Последняя возрастная группа, зверьки массой 20–23 г, составляет до 20 % осенней популяции.

Половая структура популяции полевки-экономки в целом типична для мышевидных грызунов в период размножения: из-за высокой подвижности размножающихся самцов они преобладают в уловах (рис. 3.66). В отдельные годы в долине средней Лены в популяциях полевки-экономки в период размножения наблюдается соотношение, близкое к 1:1, или даже преобладание в уловах размножающихся самок на коренном берегу как среди перезимовавших, так и

Рис. 3.65. Возрастная структура популяций полевки-экономки.

Рис. 3.66. Половая структура популяций полевки-экономки.

среди прибылых. Кроме того, подобная картина была в июне в долинах Колымы и Индигирки. Хотя соотношение полов может варьировать в зависимости от фазы динамики численности [Большаков, Кубанцев, 1984; Kalela, Oksala, 1966], все же преобладание в уловах самцов можно считать правилом. Половая структура популяций по-

левки-экономки не является исключением из правила, характерного для мышевидных грызунов. Аномальная подвижность размножающихся, в особенности беременных, самок указывает на неблагоприятные условия существования вида и может являться причиной повышенной ювенильной смертности. Повышение подвижности размножающихся самок в июне определяется резкими изменениями уровня воды.

Таким образом, полевка-экономка, будучи широко распространенным видом, заселяет большую часть обследованного региона. На этой территории она явно предпочитает пойменные местообитания, в тасжных ландшафтах ее поселения носят мозаичный характер. В тайге она чаще селится в увлажненных открытых местообитаниях, где в отдельные годы может достигать высокой численности. Характерной особенностью вида является его способность к интенсивному размножению, что позволяет даже за укороченный сезон репродукции на севере ареала восстанавливать численность после зимы.

Глава 4

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕВЕРНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

4.1. Морфометрическая характеристика мелких млекопитающих

Анализ географической изменчивости размеров и массы тела массовых видов мелких млекопитающих, обитающих в долинах рек Северной Якутии, выявил ряд общих тенденций. Для ряда грызунов (лесной лемминг, полевка-экономка и красно-серая полевка) характерно увеличение размеров тела в северо-восточном направлении. Так, длина тела красно-серой полевки Северной Якутии варьировала в пределах 115–118 мм, тогда как для более южных регионов Якутии этот показатель составляет 105–107 мм. У полевки-экономки разница еще больше — в лесотундре размеры особей доходят до 140–142 мм (максимум 165 мм), тогда как в пределах Центральной и Южной Якутии этот показатель редко превышает 115–120 мм.

Для лесного лемминга изменения длины тела неоднозначны: в пределах среднетаежной подзоны длина тела варьирует около 92–100 мм, тогда как в подзоне северной тайги в долине Яны она составила всего 91 мм, а в долинах Индигирки и Колымы — 107–108 мм. Не исключено, что в янскую выборку включены прибылые особи, тогда как в наших материалах по долинам Колымы и Индигирки — только перезимовавшие. Кроме того, возможно, различия объясняются тем, что выборки были произведены на разных фазах численности популяции. Ниже мы еще обсудим изменчивость размерных характеристик мелких млекопитающих в зависимости от этого популяционного параметра.

Как правило, у всех трех видов наиболее крупные особи обитают в низовьях рек — в лесотундре и тундре. При этом пропорции тела зачастую меняются в соответствии с правилом Аллена, что особенно наглядно проявляется в уменьшении относительных размеров хвоста (рис. 4.1).

Размеры черепа меняются не столь значительно, в результате при продвижении на север наблюдается изменение пропорций головы — относительный размер черепа у зверьков северных популяций меньше, чем у более южных.

Рис. 4.1. Географическая изменчивость размеров и пропорций тела полевки-экономки, красно-серой полевки и лесного лемминга.

* [Млекопитающие Якутии, 1971].

Рис. 4.2. Географическая изменчивость размеров и пропорций тела красной полевки.

Для красной полевки зачастую размах изменчивости морфометрических показателей внутри популяции оказывается больше, чем межпопуляционные различия, и не отмечено четких тенденций изменения размеров тела в географическом направлении [Россолимо, 1962]. Однако пропорции тела также подчиняются правилу Аллена (рис. 4.2).

Для тундрового грызуна — сибирского лемминга — 69° с.ш. в низовьях Индигирки является южной окраиной ареала. По мнению Ф.Б. Чернявского [1984], размеры этого тундрового вида уменьшаются в южном направлении. Однако сравнение наших данных с литературными дало неоднозначные результаты. По размерам черепа сибирские лемминги из долины Индигирки существенно меньше леммингов большинства тундровых популяций и крупнее особей из таежной зоны долины Колымы, а по размерам тела картина не столь ясна (рис. 4.3). Наиболее крупные по размерам тела лемминги обитают в пределах тундровой зоны, но не на побережье и не на островах (т.е. на северной периферии ареала), по длине тела лемминги из лесотундры вполне сравнимы с особями тундровых популяций.

Известно, что у бурозубок происходит снижение массы и размеров тела в направлении периферии ареала [Юдин, 1989]. Наши данные отчасти подтверждают это мнение, по крайней мере для видов средних размеров (средняя, тундровая и крупнозубая; рис. 4.4). В ка-

* [Млекопитающие Якутии, 1971].

Рис. 4.3. Географическая изменчивость размеров тела и черепа сибирского лемминга.

честве объяснения этого явления можно предположить трофический фактор. Более жестко лимитированные кормовые ресурсы ограничивают увеличение размеров тела в соответствии с правилом оптимума. У бурой бурозубки столь четкой тенденции не выявлено (рис. 4.5). При этом для всех бурозубок характерно достаточно строгое соблюдение правила Аллена в отношении пропорций хвоста. Относительные размеры черепа, в противоположность грызунам, у них

Рис. 4.4. Географическая изменчивость размеров и пропорций тела средней, тундряной и крупнозубой бурозубок.

* [Юдин, 1989].

* [Млекопитающие Якутии, 1971].

** [Пантелеев и др., 1990].

*** Наши данные.

Рис. 4.5. Географическая изменчивость размеров и пропорций тела бурой бурозубки.

в северном направлении увеличиваются (рис. 4.4, 4.5). Но в зоне лесотундры зачастую индекс черепа снова снижается.

Естественно, что внутри популяций каждого вида размеры зверьков варьируют в зависимости от возраста, пола и участия в размножении. Их мы рассмотрим на примере мелких млекопитающих, обитающих в низовьях Индигирки (т. "Шаманово"), так как это — единственная точка, по которой у нас имеется ряд наблюдений за четыре сезона подряд (1987–1990 гг.).

У четырех массовых видов микротин — полевки-экономки, лесного лемминга, красной и красно-серой полевки — перезимовавшие, прибылые размножавшиеся и не участвовавшие в размножении различаются по массе тела с высокой степенью достоверности, причем наибольшие различия существуют между перезимовавшими и прибылыми неполовозрелыми особями, в разные годы они достигают 1,5–2 раза. Кроме того, у всех четырех видов до вступления в размножение самцы крупнее самок. Участие в размножении по-разному влияет на половой диморфизм: для полевки-экономки характерно увеличение разницы в массе тела между самцами и самками с сохранением той же тенденции (табл. 4.1), а у остальных видов размножающиеся (но не беременные) самки весят больше самцов как среди перезимовавших, так и среди прибылых зверьков (табл. 4.2–4.4).

* [Юдин, 1990].

Таблица 4.1

Изменения массы тела полевки-экономки в низовьях Индигирки в 1987–1990 гг., г.

Возрастная группа	Год	Самцы				Самки				В целом			
		n	M	m	limit	n	M	m	limit	n	M	m	limit
Перезимовавшие	1987	36	84,0	1,98	46,2–103,2	11	72,7	5,05	37,0–90,0	47	81,4	1,91	37,0–103,2
	1988	28	78,5	2,27	57,8–111,0	10	64,1	3,62	47,0–78,0	38	74,7	1,93	47,0–111,0
	1989	5	70,9	9,70	47,1–102,8	2	52,0	1,15	50,9–53,2	7	65,5	7,34	47,1–102,8
	1987–1990	69	81,7	1,62	46,2–111,0	23	67,2	2,94	37,0–90,0	92	77,8	1,43	37,0–111,0
Прибылые размножавшиеся	1987	22	50,4	3,21	36,2–87,9	61	51,4	2,47	18,8–86,3	83	51,1	2,01	18,8–87,9
	1988	10	48,2	3,40	28,9–63,1	27	38,3	2,13	15,3–64,3	37	41,0	1,81	15,3–64,3
	1989	24	39,8	2,19	27,9–75,0	21	37,2	2,43	17,2–56,1	45	38,6	1,63	17,2–75,0
	1987–1990	56	45,5	1,64	27,9–87,9	109	45,4	1,56	15,3–86,3	165	45,4	1,17	15,3–87,9
Прибылые не размножавшиеся	1987	164	26,3	0,42	15,3–47,6	96	24,7	0,59	13,1–67,3	260	25,7	0,34	13,1–67,3
	1988	95	22,4	0,91	6,5–79,5	49	21,6	1,03	6,8–43,5	144	22,1	0,69	6,5–79,5
	1989	51	24,4	0,68	15,9–29,1	48	23,1	0,52	12,5–30,2	99	23,8	0,43	12,5–30,2
	1990	11	26,2	0,73	23,2–29,1	8	24,9	2,83	16,7–29,3	19	25,6	0,77	16,7–29,3
	1987–1990	321	24,8	0,36	6,5–79,5	201	23,6	0,34	6,8–67,3	522	24,3	0,26	6,5–79,5

Таблица 4.2

Изменения массы тела лесного дельфинга в низовьях Индигирки в 1987–1990 гг., г

Возрастная группа	Год	Самцы				Самки				В целом		
		n	M	m	limit	n	M	m	limit	n	M	limit
Перезимовавшие	1987	51	39,0	0,53	29,3–46,3	37	39,7	0,86	31,6–52,0	88	39,3	29,3–52,0
	1988	73	37,0	0,47	27,7–46,3	24	36,0	1,10	28,9–47,3	97	36,7	27,7–47,3
	1987–1990	125	37,9	0,36	27,7–46,4	62	38,3	0,70	28,9–52,0	187	38,0	27,7–52,0
Прибылые размножавшиеся	1987	3	36,8	0,28	36,4–37,2	10	30,6	2,36	20,7–39,8	13	32,0	20,7–39,8
	1988	—	—	—	—	9	26,7	2,07	18,1–33,8	9	26,7	18,1–33,8
	1989	1	20,1	—	—	6	24,7	2,22	20,5–32,2	6	24,7	20,5–32,2
Прибылые не размножавшиеся	1987–1990	4	32,6	4,18	20,1–37,2	25	27,8	1,36	18,1–39,8	29	28,5	18,1–39,8
	1987	110	21,5	0,25	9,6–27,7	491	20,8	0,16	10,4–36,6	601	21,4	9,6–36,6
	1988	76	19,3	0,28	12,2–27,2	204	18,9	0,16	10,4–25,0	280	19,0	10,4–27,2
1987–1990	1989	6	20,5	0,63	18,7–22,5	33	19,2	0,42	15,6–25,0	39	19,4	15,6–25,0
	1987–1990	192	20,6	0,18	9,6–27,2	728	20,6	0,10	10,4–36,6	920	20,6	9,6–36,6

Таблица 4.3

Изменения массы тела красно-серой полевки в низовьях Индигирки в 1987–1990 гг., г

Возрастная группа	Год	Самцы				Самки				В целом		
		n	M	m	limit	n	M	m	limit	n	M	limit
Перезимовавшие	1987	19	46,0	1,49	37,2–65,5	3	50,7	4,15	45,5–58,9	22	46,7	37,2–65,5
	1988	8	44,0	1,10	39,8–49,2	3	46,7	2,78	41,9–51,5	11	44,7	39,8–51,5
	1987–1990	29	45,3	1,05	37,2–65,5	6	48,7	2,50	41,9–58,9	35	45,9	37,2–65,5
Прибылые размножавшиеся	1987	5	27,4	1,44	25,0–32,8	7	27,6	1,78	20,1–33,3	12	27,5	20,1–33,3
	1988	3	26,6	0,86	25,8–27,5	5	27,8	2,66	20,4–36,0	8	27,4	20,4–36,0
	1987–1990	9	26,9	0,88	25,0–32,8	13	28,6	1,45	20,1–39,8	22	27,9	20,1–39,8
Прибылые не размножавшиеся	1987	38	25,6	0,60	16,9–34,0	28	23,9	0,78	13,8–33,9	66	24,9	13,8–34,0
	1988	54	22,8	0,37	15,6–30,0	43	20,5	0,51	13,3–27,6	97	21,8	13,3–30,0
	1989	31	22,6	0,44	17,9–27,1	31	22,6	0,42	16,0–27,4	62	22,6	16,0–27,4
1987–1990	1990	4	23,0	0,57	22,2–24,7	1	21,9	—	—	5	22,8	21,9–24,7
	1987–1990	127	23,6	0,26	15,6–34,0	103	22,1	0,33	13,3–33,9	230	22,9	13,3–34,0

Таблица 4.4

Изменения массы тела красной полевки в низовьях Индигирки в 1987–1990 гг., г

Возрастная группа	Год	Самцы				Самки				В целом		
		n	M	m	limit	n	M	m	limit	n	M	limit
Перезимовавшие	1987	58	28,2	0,32	22,3–33,4	15	31,4	1,01	26,9–38,6	73	28,9	22,3–38,6
	1988	45	29,1	0,50	22,0–36,5	12	30,0	1,53	23,8–37,8	57	29,3	22,0–37,8
	1989	29	29,7	0,54	23,5–35,2	13	33,5	1,44	24,6–41,9	42	30,9	23,5–41,9
1987–1990	1987–1990	135	28,9	0,24	22,0–37,6	40	31,7	0,74	23,8–41,9	175	29,5	22,0–41,9
Прибылые размножавшиеся	1987	—	—	—	—	12	19,9	1,40	11,2–24,6	12	19,9	11,2–24,6
	1988	3	20,0	0,29	19,5–20,5	14	20,6	1,31	13,2–27,7	17	20,5	13,2–27,7
	1989	34	21,1	0,42	18,2–21,5	35	23,0	0,95	11,9–35,5	69	22,1	11,9–35,5
1987–1990	1987–1990	37	21,0	0,39	18,2–21,5	66	22,5	0,66	11,2–37,1	103	22,0	11,2–37,2
Прибылые не размножавшиеся	1987	132	17,3	0,19	7,6–22,8	101	16,7	0,29	7,1–21,3	233	17,0	7,1–22,8
	1988	112	17,2	0,19	9,3–22,0	80	16,5	0,31	9,6–25,4	192	16,9	9,3–25,4
	1989	174	17,0	0,17	8,2–21,5	92	16,7	0,25	9,2–20,6	266	16,9	8,2–21,5
1987–1990	1990	38	18,4	0,20	16,1–20,0	28	17,3	0,47	11,7–21,4	66	17,9	11,7–21,4
	1987–1990	456	17,2	0,10	7,6–22,8	301	16,7	0,16	7,1–25,4	757	17,0	7,1–25,4

Таблица 4.5

Изменения массы тела средней бурозубки в низовьях Индигирки в 1987–1990 гг., г

Возрастная группа	Год	Самцы				Самки				В целом		
		n	M	m	limit	n	M	m	limit	n	M	limit
Перезимовавшие	1987	10	4,1	0,09	3,7–4,6	8	4,2	0,17	3,6–5,3	18	4,1	3,6–5,3
	1988	10	4,3	0,10	3,8–4,5	13	4,1	0,13	3,6–5,5	23	4,2	3,6–5,5
	1989	144	4,4	0,06	3,0–6,7	97	4,2	0,05	3,5–6,7	241	4,3	3,0–6,7
1987–1990	1990	12	4,5	0,18	3,8–5,3	10	4,3	0,14	3,6–6,2	22	4,4	3,6–6,2
	1987–1990	176	4,4	0,05	3,0–6,7	128	4,2	0,04	3,5–6,7	304	4,3	3,0–6,7

Годовые изменения средней массы тела лучше всего прослеживаются на примере полевки-экономки (табл. 4.1). Во всех трех группах наибольшие средние показатели отмечены в 1987 г. (при максимальной численности вида). В 1988 г. начался спад, численность полевки-экономки снизилась по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза, в 1989-м — еще в 1,5 раза, параллельно этому происходило и снижение средней массы тела перезимовавших животных, причем видно, что размах изменчивости признака практически не менялся в течение всего периода исследований, а среднее значение — снижалось. Масса тела прибылых размножавшихся особей менялась аналогично: максимальные показатели в 1987 г., достоверно ниже в следующем, но в 1989 г., хотя и наблюдалось дальнейшее снижение, различия с предыдущим годом не были статистически значимы. Изменения массы тела прибылых неполовозрелых экономок можно проследить в течение четырех лет. В этой группе также максимальные показатели отмечены в 1987 г. (по критерию Стьюдента достоверность различий с 1988 по 1989 г. составляет $p < 0,001$), но минимальный показатель отмечен не в год минимальной численности, а в предшествовавший ему — 1988-й, различия между этими сезонами не столь велики, но также статистически значимы ($p < 0,05$). В 1990 г. снова начался подъем численности вида и масса тела прибылых неразмножавшихся особей снова увеличилась — она была такой же, как в 1987 г., и достоверно выше, чем в 1988 и 1989 гг. ($p < 0,01$ и $p < 0,05$ соответственно).

Таким образом, в период наших исследований масса тела перезимовавших и участвовавших в размножении прибылых особей полевки-экономки колебалась примерно в одних и тех же пределах, но при этом средние значения были выше в год максимальной численности. Прибылые неразмножавшиеся особи отличались наиболее крупными размерами в год максимальной численности и в период начавшегося подъема, а минимальные размеры отмечены в год спада, предшествовавший минимуму численности популяции.

У лесного лемминга в год высокой численности перезимовавшие самцы и самки были существенно крупнее, чем в период спада ($p < 0,001$ и $p < 0,01$ соответственно). Как упоминалось выше, участие в размножении прибылых лесных леммингов было невысоким, кроме того, в этих небольших по объему выборках очень высок размах изменчивости (табл. 4.2), поэтому все различия по годам статистически недостоверны, но в целом надо отметить тенденцию к снижению размеров в годы низкой численности.

Прибылые неполовозрелые особи составляют подавляющее большинство в уловах вида и дают более полную картину об изменениях массы тела зверьков в течение трех лет. Особи, отловленные в 1987 г., с высокой степенью достоверности отличались от таковых в

1988–1989 гг. более крупными размерами ($p < 0,001$). В течение каждого отдельного сезона наибольшей массой тела отличались зверьки, отловленные в пойме. Аналогичное явление наблюдалось в долине Колымы в 1982 г.: наиболее крупными были зверьки, пойманные на галечном бечевнике, у уреза воды. В том и другом случае леммингов, отловленных на бечевнике и в пойменных стациях, можно отнести к мигрантам.

Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что наибольшая масса тела у лесного лемминга на фазе пика численности популяции, а наименьшая — в период краха популяции. Аналогичное явление зарегистрировано в Норвегии [Bondrup-Nielsen, Ims, 1988]: максимальная масса тела у лесных леммингов отмечена в год высокой численности, предшествовавший резкому спаду.

В популяции красно-серой полевки прослеживалась аналогичная тенденция: наибольшей массой тела обладали зверьки, пойманные в 1987 г., когда численность их была относительно высокой. Среди перезимовавших особей эти различия отмечены как у самцов, так и у самок, а среди прибылых размножавшихся — только у самцов. Среди прибылых неполовозрелых особей различия имеют ту же тенденцию и статистически значимы (табл. 4.3).

Для красной полевки не обнаружено общей для трех групп тенденции изменений массы тела (табл. 4.4). Неполовозрелые сеголетки характеризовались большей массой в год максимальной численности (1990), причем различия были статистически достоверны все три сезона, тогда как в 1987–1989 гг. масса тела зверьков этой группы практически не менялась. Среди перезимовавших и прибылых размножавшихся особей различия по годам не достигают статистически значимых уровней, но общей чертой было повышение этого показателя в 1989 г. (сезон наиболее высокой репродуктивной активности). По-видимому, это объясняется прежде всего повышением массы тела размножавшихся (но не беременных) самок, т.е. сказывается не фаза численности популяции, а физиологические процессы, связанные с участием в размножении.

Изменения массы тела насекомых мы можем рассмотреть на примере самого массового вида — средней бурозубки (табл. 4.5). У прибылых особей этого вида общие тенденции в изменениях размеров такие же, как у грызунов. В 1987 и 1988 гг. при крайне низкой численности бурозубки были мельче, чем в период подъема и высокой численности — 1989 и 1990 гг.

Таким образом, в районе исследований масса тела мелких млекопитающих варьировала по годам в зависимости от фазы численности популяции: наиболее крупные зверьки отлавливались в годы максимальной численности, а самые мелкие — в год спада популяции.

Сведения об аналогичных тенденциях имеются в литературе, в основном они касаются популяций леммингов и полевков [Chitty, 1960; Krebs, Myers, 1974; Boonstra, Krebs, 1979; Bondrup-Nielsen, Ims, 1988; Terekhina, 1990]. В то же время отмечены и явления противоположной направленности: у лесного лемминга в Приобье минимальные размеры отмечены в год относительно высокой численности [Буйдалина, Колесникова, 1987], у полевки Гаппера в Канаде наибольшая масса тела взрослых перезимовавших самцов зарегистрирована в год наименьшей численности [Fuller, 1985]. По мнению П.А. Пантелеева с соавт. [1990], масса тела зверьков положительно коррелирует с численностью только в случаях массового размножения, т.е. имеет значение не просто относительно более высокий уровень, а резкая вспышка численности. Л. Ханссон [Hansson, 1995] считает, что крупные, быстро растущие особи у полевков характерны для лет с зимней репродукцией и для фазы роста численности в циклических популяциях. С этим вполне согласуются и наши данные: выше уже указывалось, что в год наиболее высокой численности у полевки-экономки, лесного и сибирского леммингов отмечены очень крупные прибылые особи, судя по размерам и физиологическому состоянию рожденные до схода снежного покрова.

4.2. Рационы мелких млекопитающих

В трофической специализации мелких млекопитающих легко выделяются две группы, которые можно назвать таксоценами [Николаев, 1977], экологическими типами [Шварц и др., 1992] или гильдиями [Джиллер, 1988]. Это — бурозубки, питающиеся в основном животной пищей, и мышевидные грызуны, потребляющие растительные корма.

Надо сказать, что такое разделение по трофической специализации до некоторой степени условно, так как известно, что существует частичное перекрытие трофических ниш этих двух групп. Так, в определенные периоды бурозубки на севере Дальнего Востока способны потреблять в больших количествах семена [Докучаев, 1981, 1990], и в этот период они могут конкурировать с полевками, что сказывается на их численности [Докучаев, 1990]. Известно также, что в ряде случаев беспозвоночные могут играть значительную роль в рационе растительноядных видов, таких как желтогорлая мышь [Zubaid, Gorman, 1991] и мышь-малютка [Ивантер, Макаров, 2001]. Тем не менее нам представляется целесообразным отдельно рассмотреть особенности рационов видов, составляющих указанные группы.

Сравнительный анализ питания бурозубок мы приводим по двум точкам, где проводились многолетние стационарные исследо-

вания: “Лепписке” (среднетаежная подзона долины Лены) и “Шаманово” (лесотундра в долине Индигирки).

В долине Лены совместно обитают шесть видов бурозубок, но один из них — крошечная бурозубка — крайне малочислен, поэтому рассмотрим рационы пяти видов. Сравнительный анализ рационов бурозубок выявил наличие определенной специализации (табл. 4.6). Наиболее ярко выраженными энтомофагами являются средняя и равнозубая бурозубки. Частота встречаемости остатков насекомых в желудках средней бурозубки с высокой степенью достоверности выше, чем у тундряной, крупнозубой и бурой ($p < 0,01$). Колебания встречаемости остатков жесткокрылых в целом невелики. Гораздо больше разброс в поедаемости представителей этого отряда на разных стадиях развития: средняя, крупнозубая и равнозубая бурозубки чаще поедают личинок, бурая — явно предпочитает имаго, а тундряная — в равной степени и тех и других. Все виды бурозубок активно поедают представителей отряда двукрылых. К представителям отряда чешуекрылых отношение бурозубок неодинаково: чаще всего они встречаются в желудках средней и крупнозубой бурозубок, с высокой степенью достоверности реже их поедает тундряная бурозубка ($p < 0,001$), а в желудках у бурой их не обнаружено.

Представители класса паукообразных чаще встречаются в желудках тундряной и средней бурозубок ($p < 0,01$), но и у этих видов их доля невелика.

Большое значение в питании бурозубок имеют дождевые черви, но их роль неравноценна у разных видов. Значительно чаще

Таблица 4.6
Сравнительная характеристика рационов бурозубок в т. “Лепписке”
(встречаемость кормов), % к числу наполненных желудков

Вид корма	Бурозубка				
	тундряная (n = 70)	средняя (n = 56)	крупнозубая (n = 21)	бурая (n = 14)	равнозубая (n = 9)
Дождевые черви	67,1	10,7	19,0	85,7	55,6
Паукообразные	24,3	37,5	9,6	7,1	11,1
Многоножки	2,9	3,6	4,8	14,3	11,1
Насекомые	84,3	100	85,7	57,1	100
В том числе:					
жесткокрылые	55,7	55,4	42,9	35,7	55,6
имаго	34,3	17,9	19,0	35,7	22,2
личинки	30,0	41,0	33,3	0,0	33,3
двукрылые	27,1	41,1	42,9	28,6	44,4
чешуекрылые	5,7	25,0	19,0	0,0	22,2
перепончатокрылые	2,9	7,1	4,8	14,3	11,1
Растительные остатки	12,9	7,1	4,8	14,3	22,2

($p < 0,001$) поедают червей тундряная и бурая бурозубки, при одновременном снижении частоты потребления насекомых.

Таким образом, в долине средней Лены по характеру питания можно выделить две пары видов, между которыми возможна наиболее напряженная трофическая конкуренция. Пара тундряная — бурая бурозубки специализируется на потреблении червей, пара средняя — крупнозубая бурозубки чаще поедает насекомых. Для последней пары важнейшим механизмом, позволяющим снизить остроту конкурентных отношений, является различие в биотопической приуроченности: средняя бурозубка наиболее многочисленна в листовенничниках, тогда как крупнозубая — больше тяготеет к биотопам с большим участием листовенных пород. В пойменном комплексе средняя бурозубка, в отличие от крупнозубой, малочисленна. Сходная зависимость наблюдается и в паре тундряная — бурая бурозубки, но она в данном случае выражена менее четко. Интересно отметить, как эти виды делят другой лимитированный ресурс — биомассу жесткокрылых — тундряная бурозубка чаще поедает личинок, а бурая — взрослые формы.

Полученные нами данные противоречат мнению ряда авторов, что пищевая специализация у бурозубок обусловлена не столько предпочтениями разных видов, сколько размерами тела и спецификой вертикального распределения в биотопах. Если учесть, что мелкие виды чаще питаются в подстилке, а крупные — под землей, то вполне логично, что в рационе первых часто встречаются мелкие артроподы, а у вторых — олигохеты [Inoue, Maekawa, 1990; Churchfield, Sheftel, 1994; Churchfield et al., 1999]. Однако мы считаем, что такое разделение кормовых запасов возможно при совместном обитании видов, имеющих существенные различия в размерах тела. На рассматриваемой нами территории, хотя и обитают совместно шесть видов, но один из них можно охарактеризовать как мелкий (крошечная бурозубка), два вида — крупные (бурая и равнозубая бурозубки), а три — средние по размерам (крупнозубая, тундряная, средняя). Причем, как правило, наиболее многочисленны именно два последних вида. Поэтому разделение трофических ниш внутри одной весовой группы происходит благодаря другим механизмам. В частности, его можно объяснить морфологическими особенностями ротового аппарата, т.е. возможностями, которыми располагают животные для разгрызания объектов питания. Известно, что трофическая специализация бурозубок во многом определяется их анатомическими и этологическими особенностями [Юдин, 1962; Шварц и др., 1992; Pernetta, 1977; Whitaker, French, 1984], а также конкурентными отношениями [Saarico, 1989].

Кроме того, средняя и тундряная бурозубки имеют разную ландшафтную приуроченность: первая достигает высоких показателей

численности в тайге, а вторая — в пойме. В частности, этим объясняется то, что малощетинковые черви играют большую роль в питании тундряной бурозубки. Известно, что численность олигохет, прежде всего дождевых червей, наиболее высока в пойме [Белимов и др., 1981], т.е. как раз в том ландшафте, где тундряная бурозубка достигает максимальных показателей численности.

Сравнение рационов средней и тундряной бурозубок в нижнем течении Индигирки (табл. 4.7) показало близость их рационов: наиболее часто поедаются представители пяти систематических групп беспозвоночных. По степени предпочтения средней бурозубкой их можно расположить в следующем порядке: двукрылые — жесткокрылые — паукообразные — чешуекрылые — дождевые черви. Рацион тундряной бурозубки отличается только тем, что в нем на третьем месте по частоте поедания стоят чешуекрылые, а на четвертом — паукообразные. Однако, если рассмотреть состав наиболее часто поедаемых кормов этого вида в разных биотопах, можно отметить ряд различий, отражающих, по-видимому, пищевые предпочтения (табл. 4.7). Как и в долине средней Лены, наиболее заметна разница в частоте поедания дождевых червей. В пойме в условиях относительного обилия их поедают одинаково часто обе бурозубки, а в листовенничнике в желудках тундряных бурозубок этот вид корма отме-

Таблица 4.7
Сравнительная характеристика рационов средней и тундряной бурозубок в низовьях Индигирки, % к числу исследованных желудков

Вид корма	В целом		Лиственничник мохово-лишайниковый		Хвощовый луг	
	Средняя (n = 81)	Тундряная (n = 17)	Средняя (n = 35)	Тундряная (n = 8)	Средняя (n = 24)	Тундряная (n = 6)
Дождевые черви	17,3	23,5	5,7	12,5	33,8	33,3
Энхитреиды	3,7	—	—	—	—	—
Паукообразные	51,8	35,3	71,4	62,4	33,3	16,7
Высшие насекомые, в целом	92,6	94,1	88,6	87,5	100	100
В том числе:						
жесткокрылые, всего	54,3	47,0	31,4	12,5	91,7	100
имаго	45,7	47,0	17,1	12,5	91,7	100
личинки	13,6	—	20,0	—	8,3	—
перепончатокрылые	6,2	5,9	8,6	12,5	—	—
чешуекрылые, гусеницы	33,3	41,2	34,3	50,0	20,8	—
двукрылые, всего	54,3	58,8	51,4	50,0	66,7	66,7
имаго	38,3	35,3	34,3	50,0	50,0	16,7
личинки	25,9	29,4	28,6	12,5	29,2	50,0
Комары, имаго	17,3	23,5	22,9	37,5	12,5	—
личинки	11,1	5,9	8,6	12,5	12,5	—

чен вдвое чаще, чем у средних (12,5 и 5,7 % соответственно). На наш взгляд, это указывает на предпочитаемость и избирательный поиск дождевых червей, даже в нехарактерных для последних биотопах. Противоположная картина наблюдается в отношении паукообразных: в лесу их поедают почти одинаково часто обе бурозубки, а в пойме, где эта группа встречается реже, средняя бурозубка ест их вдвое чаще, чем тундряная. Кроме того, в качестве особенности пищевой специализации надо отметить, что представители одной из наиболее потребляемых групп беспозвоночных — жесткокрылые — поедаются на разных стадиях развития. Тундряная бурозубка поедает исключительно особей на стадии имаго, что соответствует относительно мощному ротовому аппарату, средняя — и личинок и имаго мелких видов.

Таким образом, рационы бурозубок в разных регионах имеют свои особенности, связанные прежде всего с характером местообитаний и распространением жертв в природе. Ряд групп беспозвоночных повсеместно крайне неохотно поедаются землеройками — это низшие насекомые, полужесткокрылые и ручейники. Анализ литературных данных показал, что в более южных и юго-западных частях ареала (Карелия и юг Западной Сибири) виды характеризуются более мономорфной диетой, явно предпочитая жесткокрылых. При этом часто наблюдается трофическая специализация по поеданию насекомых на разных стадиях развития. По мере продвижения в северо-восточном направлении группа часто поедаемых кормов расширяется до 4–5 таксонов, включая также паукообразных, двукрылых, чешуекрылых (якутские популяции) или двукрылых, многоножек и семена (север Дальнего Востока). В пределах таежной зоны к северу усиливается пищевая специализация, позволяющая совместно существовать 5–6 видам на относительно лимитированных пищевых ресурсах.

Далее, при продвижении в подзону лесотундры специализация ослабевает. Это можно проследить при сравнении рационов двух видов в долинах средней Лены и нижней Индигирки. В таежной зоне (долина средней Лены) пищевая специализация видов выражена гораздо ярче, чем в лесотундре (рис. 4.6). Это можно объяснить целым рядом факторов. Во-первых, более высокая численность и видовое разнообразие насекомоядных в таежной зоне диктуют необходимость более четкого разделения трофических ниш, чем в лесотундре, где два вида (средняя и тундряная бурозубки) составляют 95,5 % сообщества насекомоядных. Если учесть разные биотопические предпочтения этих видов, то становится ясно, что, несмотря на сходные размеры тела, доминанты вполне могут избежать острой конкуренции и без разделения пищевых ресурсов.

Рис. 4.6. Географические изменения рациона мелких млекопитающих.

Таблица 4.8

Сравнительная характеристика летнего питания мышевидных грызунов,
% к числу исследованных желудков

Вид корма	Тажная зона				Лесотундра		
	Красная полевка (n = 241)	Красно-серая полевка (n = 211)	Полевка-экономка (n = 120)	Лесной лемминг* (n = 94)	Красная полевка (n = 762)	Красно-серая полевка (n = 211)	Лесной лемминг* (n = 164)
Зеленые части растений	51,9	42,7	69,0	58,2	34,0	37,9	23,8
Лишайники	14,9	0,9	0,0	0,0	32,4	4,3	1,7
Мхи	2,9	2,4	0,0	20,2	2,8	0,9	40,2
Хвощ	1,2	3,3	29,2	17,0	0,0	8,5	25,6
Вегетативные части брусники	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ягоды брусники	22,0	28,9	0,0	0,0	1,8	13,7	0,0
Ягоды голубики	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	31,8	0,5
Грибы	3,7	0,0	0,0	4,3	21,0	6,2	6,2

* Данные по лесному леммингу приводятся только по лиственничникам.

Вторым фактором усиления полифагии при продвижении на север является снижение обилия почвенных беспозвоночных. Известно, что при обилии корма бурозубки стремятся нападать на возможно более крупную (из доступных жертв) добычу, что и обуславливает определенную пищевую специализацию мелких, средних и крупных видов по размерам жертв [Dickman, 1989; Saarikko, 1989; Churchfield, Sheftel, 1994]. Однако это справедливо лишь для условий достаточного обилия корма в природе. В экспериментах доказано, что при снижении обилия корма в рационе бурозубок повышается удельный вес мелкой добычи [Saarikko, 1989]. Мы отмечали ранее, что при продвижении на север спектр часто поедаемых бурозубками кормов расширяется, отражая, с одной стороны, обилие разных видов корма в природе, с другой — общее сокращение биомассы почвенных и напочвенных беспозвоночных [Шадрина, Аверенский, 1996].

Состав летних кормов мышевидных грызунов, как на средней Лене, так и в долине нижней Индигирки (табл. 4.8) весьма сходен. Основу летнего питания всех массовых видов составляют зеленые части растений. Наиболее близки рационы красной и красно-серой полевки, тогда как в зимний период в питании указанных видов наблюдаются значительные различия. Если красная полевка в период подснежной деятельности в районе исследований питается зелеными мхами и накипными лишайниками, то в зимнем питании красно-серой полевки преобладают вегетативные части брусники — до 90,4 % в случае обилия брусничника [Сафронов, 1983]. Таким образом, зимой наблюдается четкая дифференциация объектов питания, которой не отмечено в летний период, по-видимому, из-за нелIMITированности запасов зеленых кормов при зарегистрированных уровнях численности мышевидных грызунов.

В лесотундровой зоне, где, как упоминалось, в летнем питании видов выше доля зимних кормов, указанные особенности питания наблюдаются и в бесснежный период (табл. 4.8). При этом красно-серая полевка значительно больше потребляет ягод, в особенности голубики, и значительно меньше грибов, даже в периоды их обилия. Особенно ярко это прослеживается при сравнении рационов красной и красно-серой полевки, для каждой из которых обилие лимитированных кормов в пределах отдельного сезона сказывается не на порядке предпочтения, а на частоте встречаемости того или иного корма. Например, в желудках красных полевки грибы отмечены в течение всех трех лет, но в год высокого урожая они встречались в 31,9 % наполненных желудков (1988 г.), а в засушливом 1987 г. — всего в 6,3 %. Красно-серая полевка в те же годы поедала грибы с частотой 6,7 и 0 % соответственно. Ягоды голубики, наоборот, охотнее потреблялись красно-серой полевкой, которая даже в условиях дефи-

цита (1987 и 1989 гг.) поедала их достаточно часто — 20,0 и 24,6 %, а в год хорошего урожая — вдвое чаще, тогда как красная полевка независимо от обилия избегала этого вида корма, составлявшего всего 1,1–5,1 % ее летнего рациона. Аналогичная картина наблюдалась в отношении предпочтения этими видами ягод брусники, более высокий урожай которой отмечен в 1989 г. Характерной чертой рациона красной полевки в районе исследований является высокая доля лишайников даже летом, причем она увеличивается в годы низкого урожая грибов.

Полевка-экономка специализируется на потреблении травянистой растительности круглый год, поедая разные части растений в зависимости от сезона. Лесной лемминг в летний период, как и другие перечисленные виды, питается в основном травянистой растительностью. Несмотря на то что этот вид считается специализированным бриофагом, мхи в его летнем питании занимают относительно небольшое место, хотя и значительно большее, чем у других мышевидных [Вольперт, Шадрина, 1990]. В зимний период этот вид, по-видимому, целиком переходит на питание зелеными мхами.

Таким образом, мышевидные грызуны в районе исследований в летний период в основной своей массе питаются травянистой растительностью. Это правило распространяется и на зерноядные виды в западной части ареала, в частности на красную полевку и азиатскую мышь. У последней доля вегетативных частей растений в долине средней Лены составила 63,6 %. В наших материалах у растительноядных видов в летний период не наблюдается четкого разделения по типу питания, которое имеет место в более южных регионах [Шварц,

Замолодчиков, 1991], а зимой — отмечается видовая дифференциация рационов, что служит косвенным доказательством ограниченности запасов зимних кормов.

Если основной летний трофический ресурс — вегетативные части растений — полевки используют совместно, то второстепенные корма (грибы, ягоды, мхи) у них достаточно четко поделены. Мхи в летний период потребляет практически только лесной лемминг, грибы — красная полевка, ягоды — красно-серая полевка. Последнее обстоятельство, скорее всего, способствует снижению остроты трофической конкуренции при потреблении кормов, запасы которых лимитированы. Известно, что дифференциация кормов четче проявляется при их дефиците [Haken, Batzly, 1996].

Сравнение рационов полевок в таежной и лесотундровой подзонах (рис. 4.6), как и у бурозубок, отражает усиление полифагии при продвижении на север. Мы не проводили специальных исследований пищевых предпочтений при питании микротин зелеными кормами, но существуют сведения, что в условиях севера при питании родственных видов зеленью наблюдается частичное разделение трофических ниш. Например, при изучении возможности пищевой конкуренции между полевкой-экономкой и копытным леммингом обнаружена частичная специализация видов: лемминги более охотно поедали побеги дриады, а полевки — зелень однодольных растений (в основном осок), что предотвращало пищевую конкуренцию [Bergman, Krebs, 1993].

4.3. Репродуктивные параметры

Важнейшим механизмом, обеспечивающим существование широко распространенных видов в условиях севера, является интенсификация размножения, с помощью которой северные популяции компенсируют высокую смертность [Шварц, 1963; Башенина, 1977]. Как показывают литературные и наши данные, интенсификация воспроизводства северных популяций достигается несколькими путями.

С.С. Шварц [1963] считает, что основным лимитирующим фактором, сдерживающим продвижение широко распространенных таежных видов на север, является короткий летний период. В пределах таежной зоны Северной Якутии длительность этого периода варьирует от 100 до 130 дней. Наименьшая продолжительность теплого времени года характерна для лесотундровой подзоны, где бесснежный период составляет около 100 дней (II декада июня — II декада сентября), а безморозный период еще меньше — 40–55 дней. Сезон размножения, по нашим данным, в этом районе продолжается у средней и тундряной бурозубок со II декады июня до конца авгу-

ста — начала сентября, у красной и красно-серой полевок — с III декады мая по I–II декаду сентября, у лесного лемминга — со II–III декады мая по III декаду августа и у полевки-экономки с I декады мая по II–III декаду августа. Естественно, что сроки размножения по годам могут варьировать, в частности, в зависимости от фазы динамики численности [Шадрина, Вольперт, 19956].

Исходная весенняя численность мелких млекопитающих, как правило, очень низка, что, по-видимому, вызвано более существенным, чем в других регионах, отходом в течение зимы, которая отличается крайне неблагоприятными условиями.

Наибольшей продолжительностью сезона воспроизводства характеризуются два вида, отличающиеся наибольшей экологической пластичностью и достигающие высокой численности почти по всему ареалу, — это полевка-экономка и красная полевка. Первая раньше других видов вступает в размножение, заканчивая его к середине августа, сроки репродукции второй сдвинуты к осени. Очевидно, это объясняется спецификой предпочитаемых местообитаний: в пойме раньше начинается снеготаяние и появляется зелень, что способствует репродуктивной активности пойменных видов, но раннееосенние похолодания, дожди и паводки там проявляются ярче, чем в таежных стациях, что ведет к более раннему, чем в тайге, прекращению репродукции.

Мы располагаем косвенными доказательствами наличия подснежного размножения у полевки-экономки, сибирского и лесного леммингов. У этих видов в год высокой численности уже с середины июня попадались сеголетки с признаками участия в размножении и значительно крупнее большинства особей того же года рождения. В литературе и ранее отмечалась способность этих видов к раннему началу размножения, в частности, в близких регионах — в долине Средней Колымы для полевки-экономки [Кривошеев, 1964] и в низовьях этой реки для сибирского лемминга [Чернявский и др., 1985]. Причем последние авторы отмечают, что это явление более ярко выражено в годы высокой численности, и считают его одним из механизмов резкого подъема обилия.

В наших сборах такие очень крупные сеголетки были немногочисленны и отлавливались только в течение одного репродуктивного сезона, а у других видов мелких млекопитающих — вообще не отмечены, поэтому можно предположить, что подснежное размножение на северном пределе распространения решающей роли в воспроизводстве, как правило, не играет, следовательно, существуют какие-то другие механизмы, компенсирующие непродолжительность теплого времени года и большой отход в течение зимы. Мы считаем, что таким механизмом является прежде всего повышение индивидуальной плодовитости.

Рис. 4.7. Географические изменения плодовитости мелких млекопитающих.

Как показано в соответствующих разделах и на рис. 4.7, плодовитость красно-серой и красной полевки, лесного лемминга и полевки-экономки в низовьях Индигирки существенно выше, чем в более южных и юго-западных точках ареалов. При этом наши материалы показывают, что плодовитость, будучи одним из механизмов адаптации, слабо изменчива по годам и, следовательно, не является регулятором численности видов. В течение всего периода исследований при разной попадаемости и на разных фазах численности не обнаружено статистически достоверных годовых различий этого показателя, хотя в пределах одного репродуктивного сезона и для разных возрастных групп он варьирует в широких пределах.

Возрастные различия в величине выводка отмечены нами у пяти видов грызунов (табл. 4.9), причем у красно-серой полевки, полевки-экономки, сибирского и лесного леммингов плодовитость перезимовавших самок достоверно выше, чем у приплодов. У красной полевки существенные различия отмечены только между перезимовавшими и сеголетками, вступившими в размножение в возрасте менее 1 мес, 2–3-месячные самки этого вида приносят выводки, сравнимые по величине с таковыми взрослых особей (рис. 4.8).

Для полевки-экономки точной методики определения возраста животных моложе 1 года не существует, но мы разбили их на весовые группы с интервалом 10 г (табл. 4.10). Оказалось, что среди животных массой менее 20 г за все годы отмечена только одна размножавшаяся самка (8,9 %), имевшая 7 послеплодных пятен, вторая группа

Таблица 4.9

Возрастные изменения плодовитости мышевидных грызунов в низовьях Индигирки

Вид	Возрастная группа	В среднем		1-й выводок		2–3-й выводки	
		n	$M \pm m$	n	$M \pm m$	n	$M \pm m$
Красно-серая полевка	Перезимовавшие	17	$7,94 \pm 0,58$	—	—	—	—
	Приплоды	19	$5,8 \pm 0,31$	—	—	—	—
Красная полевка	Перезимовавшие	100	$7,19 \pm 0,16$	51	$6,86 \pm 0,28$	48	$7,52 \pm 0,16$
	Приплоды	91	$7,24 \pm 0,23$	57	$6,89 \pm 0,30$	34	$7,82 \pm 0,34$
Лесной лемминг	Перезимовавшие	161	$5,45 \pm 0,16$	84	$5,99 \pm 0,22$	77	$4,87 \pm 0,21$
	Приплоды	39	$4,46 \pm 0,24$	33	$4,39 \pm 0,27$	6	$4,83 \pm 0,54$
Полевка-экономка	Перезимовавшие	50	$8,18 \pm 0,33$	28	$8,39 \pm 0,44$	22	$7,91 \pm 0,52$
	Приплоды	184	$6,83 \pm 0,11$	130	$6,86 \pm 0,12$	39	$6,97 \pm 0,29$

(20–29 г) — самая многочисленная, характеризовалась несколько более активным участием в воспроизводстве (18,2 %), но плодовитость этих самок достоверно ниже, чем у перезимовавших (по критерию Стьюдента $p < 0,001$) и приплодов 3–5-й возрастных групп (достоверность соответственно $p < 0,01$, $p < 0,001$ и $p < 0,001$).

В трех последних группах участие в размножении различается несущественно, хотя надо отметить, что в 3–4-й встречались в основном самки, рожавшие один раз, а для 5-й группы характерно большое число рожавших дважды. Плодовитость по мере увеличения массы тела продолжает повышаться, но достоверных различий между этими тремя группами не обнаружено. К взрослым самкам по плодовитости приблизились только приплоды массой более 60 г, по-видимому, эти немногочисленные очень крупные сеголетки по-

Рис. 4.8. Возрастные изменения плодовитости красной полевки в низовьях Индигирки.

* Данные по Южной Якутии [Ревин, 1988].

Таблица 4.10

Плодовитость и сексуальная активность прибылых самок полевки-экономки с разной массой тела

Группа	Масса тела, г	n	$M \pm m$	σ	limit	Доля рожавших самок, %	
						1 раз	2 раза
1	До 20 (n = 45)	1	7	—	—	8,9	—
2	20–29 (n = 181)	26	$6,04 \pm 0,26$	1,31	3–8	18,2	—
3	30–39 (n = 65)	43	$7,09 \pm 0,22$	1,43	5–10	78,5	9,2
4	40–59 (n = 67)	40	$7,3 \pm 0,21$	1,32	5–10	68,7	31,3
5	Более 60 (n = 27)	27	$7,88 \pm 0,36$	1,78	5–11	25,9	66,7

являются на свет в мае — начале июня в случае подснежного размножения, значительно опережая остальных особей своего года рождения по морфометрическим и репродуктивным показателям.

Величина выводка у перезимовавших и прибылых самок, как правило, меняется в течение сезона репродукции, и не всегда эти изменения у разных видов однонаправленны. Наиболее репрезентативный материал у нас имеется по трем видам: полевке-экономке, красной полевке и лесному леммингу (рис. 4.9, табл. 4.11). У всех трех грызунов перезимовавшие самки максимальной плодовитости достигают в середине лета — в июле, но изменения этого показателя у них происходят по-разному. У красной полевки, например, плодовитость нарастает медленно, и разница в числе приносимых детенышей между июнем и июлем более значительна, чем между июлем и августом. У полевки-экономки единственная беременная в августе

Рис. 4.9. Изменения величины выводка мышевидных грызунов в течение репродуктивного периода.

Таблица 4.11

Изменения величины выводка полевки-экономки в течение лета (по эмбрионам)

Возрастная группа	Месяц	n	$M \pm m$	σ	limit
Перезимовавшие	Июнь	7	$8,0 \pm 0,44$	1,15	7–10
	Июль	11	$8,73 \pm 0,71$	2,36	5–12
	Август	1	6	—	—
Прибылые	Июнь	3	$8,0 \pm 1,0$	1,73	7–10
	Июль	39	$6,82 \pm 0,26$	1,60	4–11
	Август	31	$6,42 \pm 0,24$	1,33	3–8

перезимовавшая самка имела 6 эмбрионов, тогда как плодовитость в июне и июле составляла соответственно 8,0 и 8,7.

У лесного лемминга, как и у предыдущего вида, к концу лета происходило резкое уменьшение величины помета. Известно, что у представителя того же семейства — золотистого хомячка — плодовитость самок с возрастом сначала повышается (причем на этот показатель влияет не только возраст, но и число предшествовавших родов), а к концу жизни — снова снижается [Huck et al., 1988]. Не исключено, что в данном случае мы имеем дело с аналогичным явлением.

У прибылых самок полевки-экономки и красной полевки тенденции в изменении плодовитости примерно те же, что и у взрослых, при этом первая достигает максимальной плодовитости в июле, а вторая — только к августу; например, средняя величина первого помета у 2-месячной самки красной полевки в июле составляет 6,8 эмбриона, а в августе для самки такого же возраста — уже 7,4. У родственного вида — *Clethrionomys gapperi* — также отмечена зависимость индивидуальной плодовитости от времени родов, но только у первородящих самок. Причем, как и у красной полевки, у этого вида величина первого выводка возрастает от мая к августу, что отличает их от других микротин, у большинства которых плодовитость в течение лета падает [Innes, Millar, 1993].

Кроме того, меняется и индивидуальная плодовитость животных в течение лета: у перезимовавших и прибылых красных полевок величина первого помета достоверно меньше, чем второго, достоверность различий по критерию Стьюдента составляет $p < 0,05$ (табл. 4.9). У лесного лемминга изменения плодовитости самок разного возраста разнонаправленны: у перезимовавших второй и третий пометы достоверно меньше, чем первый, а у прибылых — второй достоверно больше первого выводка (табл. 4.9). Если средние величины первых выводков у них достоверно различаются, то второй помёт фактически одинаков для обеих возрастных групп.

У перезимовавших особей полевки-экономки второй помет существенно больше первого и третьего, но из-за небольшого объема выборки различия не достигают статистически значимых уровней; для прибылых особей разница в этих величинах еще меньше, но стоит отметить, что у самок обоих возрастов эта разница наиболее ярко выражена в июле (рис. 4.9). В целом для всех видов отмечено, что размах изменчивости величины первого помета больше, чем последующих.

Как указывалось выше, плодовитость микротин в годы с разной численностью почти не менялась, а небольшие различия в разные сезоны объясняются в основном разным соотношением в уловах прибылых и перезимовавших самок, имеющих разную плодовитость, или изменением соотношения самок, отловленных в разные месяцы.

В противоположность этому, интенсивность вовлечения в репродукцию прибылых животных по годам варьировала весьма значительно (табл. 4.12). Так, в период высокой численности лесного лемминга отмечались крайне низкое участие в воспроизводстве прибылых животных и раннее прекращение размножения перезимовавших особей. На подъеме численности этого вида отмечены наивысшие показатели репродуктивной активности сеголеток за период исследований.

Динамика репродуктивной активности полевки-экономки была несколько другой, но и у нее надо отметить невысокие показатели участия в репродукции, раннее прекращение размножения в год вы-

Таблица 4.12

Интенсивность репродукции грызунов при разных уровнях численности

Вид	Год	Численность на 100 конусо-сут	Участие в размножении прибылых особей, %			
			Самцов	Самок, в целом	Рожавших 1 раз	Рожавших 2 раза
Красно-серая полевка	1987	2,7	13,3	35,7	35,7	0
	1988	0,8	3,6	10,2	10,2	0
	1989	1,4	6,1	18,4	15,8	2,6
Красная полевка	1987	5,9	0	12,3	10,7	1,6
	1988	2,8	2,5	20,4	19,4	1,0
	1989	2,6	15,4	35,9	24,8	11,1
Лесной лемминг	1987	28,5	2,1	2,6	2,2	0,4
	1988	9,6	0	5,5	5,5	0
	1989	1,6	4,3	21,4	19,0	2,4
Полевка-экономка	1987	16,4	12,2	46,0	32,2	13,8
	1988	7,0	14,5	53,3	41,1	12,2
	1989	4,6	30,4	49,5	27,4	22,1

сокой численности и максимальную сексуальную активность в период низкой численности.

Численность красной полевки в 1987 г. находилась на фазе спада, и в этот период не отмечено размножающихся прибылых самцов и очень мало самок (12,3 %). В 1988 г. спад продолжался в горно-таежном ландшафте, что, по-видимому, связано с подъемом численности лесного лемминга, и это сказалось на участии в размножении сеголеток — ни одного размножавшегося самца и только 14 % самок; в озерно-таежном ландшафте в том же сезоне наблюдалось незначительное повышение численности красной полевки, и в репродукции участвовали 3 % самцов и 32 % самок. В 1989 г. произошел резкий подъем численности красной полевки, сопровождавшийся существенным повышением репродуктивной активности прибылых, а также наибольшей продолжительностью сезона размножения, причем большую роль в восстановлении численности сыграло более раннее половое созревание — резко повысилось участие в размножении животных в возрасте до 1 мес. Как видно из табл. 4.12, общее участие в размножении сеголеток возросло по сравнению с 1987 г. в 5, а с 1988 г. — в 3 раза, среди месячных зверьков эти цифры составили соответственно 8 и 3 раза.

В целом для микротин подавление полового созревания молодых при высокой плотности населения достаточно типично, что является следствием территориальности самок. Известно, что у полевок рода *Clethrionomys* при плотности населения выше пороговой включается механизм подавления полового созревания прибылых самок, и относительное число половозрелых самок снижается [Жигальский, Бернштейн, 1988, 1989; Bujalska, 1985]. Снижение “репродуктивного усилия” при высокой плотности населения отмечено также у полевок рода *Microtus* [Ostfield et al., 1993].

Репродукционная активность различных возрастных групп разнесена во времени и пространстве. В период наибольшей сексуальной активности перезимовавших самок плодовитость прибылых бывает относительно низкой, равно как и то, что в стациях наиболее активного размножения взрослых самок участие в воспроизводстве и плодовитость прибылых бывают относительно низкими.

Таким образом, массовые виды мелких млекопитающих на северном пределе распространения компенсируют сокращение длительности сезона размножения и высокую зимнюю смертность сдвигом начала размножения на более ранние фенологические сроки, высокой плодовитостью, ускорением полового созревания и активным участием в размножении прибылых. Указанные особенности обеспечивают достижение высоких уровней численности в условиях, максимально приближенных к экстремальным.

4.4. Движение численности

Ранее мы и другие авторы отмечали, что в горной тайге в долине средней Лены и в долинах Индигирки и Колымы движения численности некоторых видов носили асинхронный характер. Они не совпадали в разных ландшафтах в пределах конкретного участка долины и находились в противофазе с движениями численности других видов [Вольперт, 1988; Кривошеев, 1981; Вольперт и др., 1990; Шадрина, Вольперт, 1995б; Вольперт, Шадрина, 2001]. В долинах указанных рек подъем численности лесного лемминга как в озерно-таежном

Рис. 4.10. Движения численности мышевидных грызунов в долинах Колымы и Индигирки по ландшафтам.

ном, так и в горно-таежном ландшафте сопровождался глубокой депрессией красной полевки (рис. 4.10).

Попадаемость видов в конусы является прямым показателем подвижности в течение бесснежного периода. Анализ этого показателя выявил, что в течение сезона размножения по мере увеличения обилия лесного лемминга уменьшается попадаемость красной полевки (рис. 4.11). Наиболее вероятной причиной последнего является снижение подвижности из-за подавления репродуктивной активности красной полевки в эти периоды.

Изменчивость основных репродуктивных параметров красной полевки по годам показана на рис. 4.12. Как видно, участие молодых в размножении как наиболее вариабильный показатель репродуктивной активности [Окулова, Бернштейн, 1995] существенно изменялся по годам. Широко известен факт, что интенсивность включения в размножение прибылых находится в обратной зависимости от плотности популяции вида [Кошкина, 1957; Kalela, 1957], такая закономерность достаточно четко прослеживается и по нашим данным [Ревин и др., 1988; Шадрина, Вольперт, 1995а]. В этом случае численность красной полевки изменялась по годам в относительно небольших пределах для региона, где флуктуации обилия могут достигать 20 крат, причем в 1988 и 1989 гг. она находилась практически на одном уровне. Несмотря на это, интенсивность включения в репродукцию прибылых менялась весьма значительно.

Рис. 4.11. Движения численности и репродуктивные параметры красной полевки.

В момент пика численности лесного лемминга размножавшихся самцов сеголеток красной полевки не отловлено совсем, а участие самок составило 12,3 %, в результате численность популяции красной полевки на следующий год снизилась. В 1988 г. численность лесного лемминга снизилась, а интенсивность участия в размножении молодых особей красной полевки возросла. В 1989 г. численность лесного лемминга продолжала снижаться, а у красной полевки — практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. При этом степень

Рис. 4.12. Изменения популяции красной полевки и лесного лемминга в конусы в течение лета в низовьях Индигирки.

участия прибылых особей красной полевки в размножении значительно возросла. Даже принимая во внимание ограниченность временного ряда наблюдений, можно с достаточной уверенностью утверждать, что в годы подъемов численности лесной лемминг определяет интенсивность воспроизводства красной полевки.

Подобной зависимости не отмечается у красно-серой полевки, направления флуктуаций численности которой совпадали с лесным леммингом как в долине Индигирки [Вольперт, Шадрин, 2001], так и в долине Колымы [Вольперт и др., 1990]. Последнее обстоятельство усложняет проблему взаимоотношения видов, которую, по-видимому, нельзя свести к простой схеме отношений доминант — подчиненные виды, степень напряженности конкурентных отношений между членами сообщества может изменяться в широких пределах [Wammes, 1981; Lofgren et al., 1995]. Подавление воспроизводства наблюдается не у всех видов, уступающих по численности, а только у некоторых. В настоящее время достаточно четко выделяются две пары: красная полевка — лесной лемминг и красная полевка — красно-серая полевка, у которых можно предположить наличие достаточно острых конкурентных отношений между собой. Последнее обстоятельство, вероятно, и определяет смену доминанта в таежных ландшафтах северотаежной подзоны северо-востока Сибири [Вольперт, 1988].

По-видимому, такое взаимное влияние видов не является сугубо региональной особенностью. Известно, что в другом северном регионе — Финской Лапландии — в биотопах совместного обитания красной, красно-серой и темной полевки первая может резко снижать интенсивность репродукции при повышении численности конкурирующих видов, а затем быстро восстанавливать ее благодаря крупному размеру выводков [Viitala, 1985].

Кроме того, необходимо отметить, что межвидовая асинхронность движений численности мышевидных грызунов наблюдается только в регионах, где эти виды характеризуются близкими уровнями численности. Так, в долине средней Лены (т. "Лепписке") асинхронность флуктуаций обилия красной и красно-серой полевки отмечалась только в горно-таежном ландшафте [Вольперт, 1988], где красно-серая полевка достигала сравнимых с красной полевкой уровней численности, и не отмечена в равнинно-таежном ландшафте, где красно-серая полевка значительно уступает по численности красной [Ревин и др., 1988]. Такая же картина наблюдается в окрестностях г. Магадана [Курышев, 1995]. В бассейне Омолона красно-серая полевка значительно уступает по обилию красной, и движения численности этих видов синхронны [Чернявский, Лазуткин, 1985]. На северо-востоке Якутии лесной лемминг, как показали наши исследования, может достигать очень высоких уровней численности, и

в данном регионе он может вступать в конкурентные отношения с красной полевкой.

В то же время сравнительный анализ обширного материала по экологии рыжей и красной полевок в оптимуме ареалов этих видов показал отсутствие или в лучшем случае слабую значимость взаимовлияния этих видов [Бернштейн и др., 1987; Жигальский, Бернштейн, 1988, 1989]. При анализе механизмов регуляции численности красной и красно-серой полевок в оптимуме ареалов этих видов отмечается определенное воздействие первой на вторую, но только в период максимального увеличения обилия доминирующего вида [Жигальский, 1989]. По многолетним наблюдениям на Кольском полуострове [Катаев, Бойко, 1995], изменения численности рыжей и красно-серой полевок до начала антропогенного воздействия происходили синхронно. Та же картина наблюдалась в Архангельской области [Куприянова, 1978] и в бассейне Омолона, где численность красной и красно-серой полевок изменялась практически синхронно [Чернявский, Лазуткин, 1985], а в окрестностях г. Магадана изменение обилия этих видов носило асинхронный характер [Курышев, 1985]. В Скандинавии два вида серых полевок, несмотря на одинаковые параметры экологических ниш, имели синхронную динамику численности [Boostrom, Hansson, 1981].

Скорее всего, асинхронность движения численности наблюдается в случаях, когда два вида с близкими экологическими параметрами и уровнями численности существуют в условиях ограниченности каких-либо ресурсов. В таком случае понятно, почему асинхронность движения численности видов четче проявляется на северном пределе распространения видов, где они испытывают экстремальный пресс окружающей среды и в значительной степени меньше выражена в более благоприятных условиях, в частности в оптимуме ареалов таежных видов.

Это предположение в определенной мере объясняет факт асинхронности движения численности мышевидных, но оставляет открытым вопрос о причинах асинхронности флуктуаций численности конкретного вида по ландшафтам, ярче выраженной в долинах Индигирки и Колымы. Во всех случаях наблюдений в долинах указанных рек движения численности микротин в таежных ландшафтах не совпадали, в первую очередь это касается лесного лемминга и красно-серой полевки. Подъем численности указанных видов в горно-таежном ландшафте сопровождался депрессией в озерно-таежном ландшафте, и наоборот (рис. 4.10).

Не исключено, что последнее явление объясняется спецификой ландшафтов, которые характеризуются различной степенью увлажнения местообитаний. В результате изменения климатических условий конкретного года (заморозки, количество и распределение

осадков) могут по-разному отражаться на существовании видов в конкретном ландшафте.

В то же время подъем численности лесного лемминга и красно-серой полевки в горно-таежном ландшафте, так же как и депрессия этих видов в озерно-таежном ландшафте в 1981–1982 гг., охватили бассейны Индигирки и Колымы. К сожалению, наши данные не позволяют оценить территориальные масштабы указанных явлений в другие периоды наблюдений.

Таким образом, направления движений численности массовых видов в сопредельных ландшафтах, как правило, не совпадают, тогда как в пределах одного ландшафта синхронные колебания обилия вида могут охватывать обширные территории. Последнее обстоятельство позволяет утверждать, что существуют пространственно-временные закономерности в изменении численности мелких млекопитающих, населяющих ландшафты северо-востока Сибири. Причем асинхронность колебаний численности членов сообщества ярче проявляется при продвижении на север.

Колебания численности насекомоядных в рассматриваемом регионе происходят синхронно, как и в долине Енисея [Sheftel, 1989], в отличие от Карелии [Ивантер, 1981]. В долине средней Лены средняя бурозубка постоянно доминирует среди бурозубок в таежных ландшафтах, тундряная бурозубка — в пойме. В долинах Яны, Индигирки и Колымы во всех ландшафтах доминирует средняя бурозубка [Вольперт, 1992]. В случае резкого подъема численности, как наблюдалось в т. "Мома", средняя бурозубка составляла 100 % насекомоядных (при численности 100 особей на 100 конусо-сут), т.е. в данном случае вспышка численности вида совпала с глубокой депрессией других видов бурозубок.

Синхронность изменения обилия насекомоядных в разных ландшафтах позволяет предположить наличие мощного лимитирующего фактора абиотического характера, определяющего численность этой группы. Ранее было показано [Вольперт, Аверенский, 1983], что кормовая база бурозубок находится в прямой зависимости от влажности почвы. Сопоставление этих данных позволяет предположить для северных регионов Якутии наличие опосредованной связи между количеством осадков в летний период и численностью бурозубок. Межвидовые отношения вступают в силу только при достижении каким-либо видом, в данном случае средней бурозубкой, очень высоких уровней численности, что бывает достаточно редко.

Еще одной особенностью северных популяций мелких млекопитающих являются значительные изменения обилия в течение короткого отрезка времени. К сожалению, у нас отсутствуют достаточно длительные наблюдения в одной точке, которые бы позволили корректно проанализировать изменения обилия мелких млекопитаю-

щих на северном пределе распространения видов. Но и имеющиеся материалы позволяют подтвердить выводы о росте размаха флуктуаций численности вида по мере удаления от оптимума ареала [Жигальский, Бернштейн, 1988], в данном случае на север. Кроме того, можно высказать предположение, что по мере продвижения на север от оптимума ареала возрастает роль климатических факторов в регулировании численности видов на всех этапах существования популяции, а не на отдельных, как считают указанные авторы. Однако та же ограниченность временных рядов наблюдений не позволяет нам представить строгие доказательства высказанного предположения.

4.5. Возрастная структура популяций

Возрастная структура популяций мелких млекопитающих в районе исследований отражает прежде всего особенности их репродукции и численности. В июне у грызунов перезимовавшие животные составляют, как правило, 100 % в уловах (за исключением раньше вступающей в размножение полевки-экономки, у которой даже в этом месяце прибылые могут составлять до 66,7 %). Но уже с первой декады июля начинается массовый выход молодых, которые в это время составляют у разных видов в разные годы от 20 до 100 % популяции. Со второй декады июля преобладание прибылых становится бесспорным, но перезимовавшие особи встречаются в уловах еще в августе, а в отдельные годы — даже в начале сентября.

На примере красной полевки, у которой возраст прибылых особей можно определить с точностью до месяца, видно, что для популяций грызунов в низовьях Индигирки характерна не только быстрая смена перезимовавших особей прибылыми, но и очень высокий отход животных, участвовавших в репродукции. О последнем говорит неизменно большой процент месячных зверьков в течение всего репродуктивного периода. Причем в сезон более активного участия в размножении прибылых (1989 г.) в популяции, уходящей в зиму, они составляли около 68 %, а в год низкой репродуктивной активности — всего 35 %. Как показано на рис. 3.38, в предзимний период в лесотундровой популяции (т. "Шаманово") преобладают месячные зверьки, тогда как в средней тайге — 2-месячные. Более молодой состав популяции относительно более южных регионов не может не отражаться на выживаемости животных в течение зимнего периода.

* * *

Обобщая изложенные выше материалы по биологии северных популяций мелких млекопитающих, можно отметить следующие особенности.

Размеры тела большинства таежных видов грызунов в пределах таежной зоны увеличиваются. Эта закономерность наиболее ярко выражена в популяциях полевки-экономки и лесного лемминга, в меньшей степени — красно-серой полевки. Для красной полевки клинальная изменчивость размеров в пределах Северной Якутии нами не выявлена, как и ранее другими авторами для других популяций.

В северо-восточном направлении для большинства бурозубок характерно уменьшение размеров тела и возрастание относительных размеров черепа. Индексы выступающих частей тела (длина хвоста, плюсны, высота ушной раковины) у таежных видов грызунов и насекомоядных уменьшаются.

Размеры тела мелких млекопитающих меняются в зависимости от стадии популяционного цикла. На фазе пика численности у лесного лемминга, полевки-экономки, красно-серой полевки и средней бурозубки как прибылые, так и перезимовавшие особи характеризуются наиболее крупными размерами. Минимальные масса и длина тела отмечены в периоды низкой численности популяций.

Сравнительный анализ трофических спектров мелких млекопитающих в долинах рек Северной Якутии показал, что по мере продвижения на север и соответственно ухудшения абиотических условий существования, рационы видов расширяются. У мышевидных грызунов наблюдается переход на питание широкодоступными кормами, даже в случае их меньшей калорийности. Изменение характера питания возможно благодаря потенциальной всеядности мышевидных грызунов [Башенина, 1977]. Типичным примером является красная полевка, вид наиболее семеноядный из трех видов рода *Clethrionomys* на западе ареала [Попов, 1960; Башенина, 1977; Окулова, 1986] и переходящий практически полностью на питание вегетативными частями растений на северо-востоке Сибири в летний период.

При этом, несмотря на широту трофических спектров грызунов, они никогда полностью не перекрываются, у каждого вида имеется определенная специализация, ярче выраженная в отношении таких лимитированных кормов, как грибы, ягоды, семена.

У бурозубок из-за особенностей рациона (питание еще более жестко лимитированными кормами) полифагия на северном пределе распространения выражена сильнее, чем у мышевидных грызунов, а черты пищевой специализации на северной периферии ареала почти полностью утрачиваются.

Для репродукции мышевидных грызунов Северной Якутии характерны общие черты. Массовое размножение мышевидных грызунов начинается очень рано, в лесотундре — еще до полного схода снежного покрова, что нехарактерно в целом для таежной зоны. Сдвиг начала размножения на фенологически более ранние сроки в какой-то мере компенсирует укороченность сезона размножения.

Мышевидные грызуны и бурозубки, обитающие в долинах рек Северной Якутии, характеризуются более крупными размерами выводков, чем особи тех же видов в более южных точках ареала. Наибольшая величина выводка приходится на наиболее благоприятный период — для узкоспециализированных зеленоядных видов на июль, а у более приспособленной к разным видам корма красной полевки на июль—август.

Другой путь интенсификации репродукции — ускорение полового созревания у прибылых особей, что наиболее ярко выражено у бурозубок. Нами установлено, что в отдельные годы в условиях Якутии бурозубки-сеголетки первых генераций массово (до 100 %) участвуют в размножении в год своего рождения [Вольперт, 1986]. В то же время известно, что в более благоприятных условиях обитания молодые или не размножаются в год своего рождения совсем, или участие этой возрастной группы в репродукции ограничивается 2–10 % [Юдин, 1962; Ивантер, 1975; Долгов, 1985; Большаков и др., 1996; и др.].

Для популяций мышевидных грызунов на северном пределе распространения характерно также ускорение полового созревания и соответственно высокая доля участия прибылых в репродукции. Особенно ярко это прослеживается на примере прибылых первых генераций. Интенсивность полового созревания животных последующих генераций сильно колеблется по годам в зависимости от фазы численности популяции.

Динамика численности популяций на северном пределе распространения видов имеет региональную специфику. Для массовых видов грызунов и насекомоядных характерен большой размах флуктуаций численности, достигающий до 60 крат. Направления движения численности массовых видов в сопредельных ландшафтах, как правило, не совпадают, тогда как в пределах одного ландшафта синхронные колебания обилия конкретного вида могут охватывать обширные территории.

В то же время направления изменения численности массовых видов в пределах одного ландшафта не совпадают. Депрессия численности красной полевки сопровождается повышением обилия лесного лемминга и красно-серой полевки. Асинхронность колебаний численности членов сообщества ярче проявляется при продвижении на север.

Основными механизмами регуляции численности являются длительность репродуктивного периода и интенсивность включения в размножение прибылых особей второй-третьей генерации.

Для популяций грызунов и насекомоядных Северной Якутии характерны быстрая смена перезимовавших особей прибылыми и высокие темпы элиминации прибылых животных, участвовавших в ре-

продукции. В результате в зиму уходит популяция в более молодом составе по сравнению даже с подзоной средней тайги. Последнее обстоятельство не может не отразиться на выживаемости животных в ходе зимовки, что в совокупности с длительным зимним периодом определяет низкие весенние уровни численности популяций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агапитов В.Г. Рельеф // Северная Якутия / Тр. Арктич. и Антарктич. науч.-исслед. ин-та. — Л.: Морской транспорт, 1960. — Т. 236. — С. 61–119.
- Агроклиматический справочник по Якутской АССР / Под. ред. А.К. Мозолевской. — Л.: Гидрометеиздат, 1963. — 146 с.
- Алина А.В., Реймерс Н.Ф. Наземные млекопитающие (Mammalia) Фянского побережья // Систематика, фауна, зоогеография млекопитающих и их паразитов. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. — С. 127–140.
- Амстиславская Т.С., Балахонов В.С. Митотическая активность и ее связь с продолжительностью жизни и уровнем обмена у сезонных генераций субарктических популяций *Cl. rutilus* // Экология. — 1974. — № 4. — С. 80–83.
- Андреев В.Н., Беляева Н.В. и др. Тебеновочные пастбища северо-востока Якутии. — Якутск: Кн. изд-во, 1974. — 246 с.
- Балахонов В.С., Лобанова Н.А., Павлинин В.В., Штро В.Г. Распределение и численность некоторых видов млекопитающих в подзоне кустарниковых тундр Ямала // Современное состояние и история животного мира Западно-Сибирской низменности. — Свердловск, 1988. — С. 133–148.
- Башенина Н.В. Пути адаптации мышевидных грызунов. — М.: Наука, 1977. — 354 с.
- Белимов Г.Т., Ларионов П.Д., Седалищев В.Т. О распространении и условиях зимовки дождевых червей в долине средней Лены // Науч. докл. высш. шк. — М., 1981. — № 11. — С. 46–50.
- Бердюгин К.И. Влияние относительной изоляции на пространственную и демографическую структуру популяций грызунов // II съезд Всесоюз. териологического об-ва: Тез. докл. — М.: Наука, 1978. — С. 116–117.
- Берштейн А.Д., Аленкина Н.С., Копылова Л.Ф. и др. Сравнительная эколого-эпизоотическая характеристика лесных полевков (*Clethrionomys*) Среднего Приуралья // Зоол. журн. — 1987. — Т. LXVI, вып. 8. — С. 1397–1406.
- Бианки Д.В. Предварительный отчет о работе биологического отряда в Якутском округе в 1926 г. — Л., 1929. — Вып. 10. — С. 263–280.
- Боесков Г.Г., Егоров Н.Г., Ревин Ю.В. *Microtus hyperboreus* (Mammalia, Rodentia) в юго-восточной Якутии // Вестн. зоологии. — 1993. — № 2. — С. 72–74.
- Большаков В.Н. Экологическая обусловленность некоторых интерьерных признаков мелких млекопитающих гор в связи с характером питания // Экология. — 1970. — Вып. 6. — С. 70–78.
- Большаков В.Н. Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям. — М.: Наука, 1972. — 199 с.
- Большаков В.Н., Кубанцев Б.С. Половая структура популяций млекопитающих и ее динамика. — М.: Наука, 1984. — 232 с.
- Большаков В.Н., Васильева А.Г., Шарова Л.Н. Фауна и популяционная экология землероек Урала (Mammalia, Soricidae). — Екатеринбург: Изд-во "Екатеринбург", 1996. — 267 с.
- Бромлей Г.Ф., Костенко В.А. Взаимосвязи мелких грызунов с кедром корейским в лесах Среднего и Южного Сихотэ-Алиня // Мелкие млекопитающие Приамурья и Приморья. — Владивосток: изд. ДВНЦ АН СССР, 1970. — С. 3–65.
- Бромлей Г.Ф., Костенко В.А., Николаев И.П. и др. Млекопитающие Зейско-го заповедника. — Владивосток: изд. ДВНЦ АН СССР, 1984. — 139 с.
- Буйдалина Ф.Р., Колесникова Н.В. К морфометрической характеристике лесного лемминга (*Myopus schisticolor* Lill.) Северного Зауралья // Фауна, таксономия, экология млекопитающих и птиц. — Новосибирск, 1987. — С. 73–78.
- Бутурлин С.А. Наблюдения над млекопитающими, сделанные во время колымской экспедиции 1905 г. // Дневник зоол. отд. Императорского об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Нов. серия. — М., 1913. — Т. 1, № 5. — С. 225–266.
- Варшавский С.Н., Крылова К.Т. Основные принципы определения возраста мышевидных грызунов // Материалы к познанию фауны и флоры СССР. — М.: изд. МОИП. Нов. серия. — 1948. — Вып. 17. — С. 179–190.
- Виноградов Б.С. Заметки о млекопитающих Якутии. I. Лемминговидные полевки, род *Aschizomys* // Материалы комиссии по изучению ЯАССР. — Л., 1927а. — С. 1–18.
- Виноградов Б.С. Заметки о млекопитающих Якутии. II. Рыжие полевки // Материалы по изучению ЯАССР. — Л., 1927б. — Вып. 18. — С. 1–20.
- Виноградов Б.С. Грызуны. Определитель по фауне СССР. Млекопитающие. — Л.: изд. Зоол. ин-та АН СССР, 1933. — Вып. 10. — 87 с.
- Винокуров В.Н., Белимов Г.Т. Материалы к кадастровой характеристике уникальных экосистем Якутии. Вилюйские тукуланы. Животный мир // Фауна и экология животных Якутии. — Якутск, 1991. — С. 33–47.
- Винокуров В.Н., Мордосов И.И. К фауне и экологии мелких млекопитающих верхнего течения р. Индигирки // Фауна и экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1980. — С. 79–84.
- Винокуров В.Н., Прокопьев Н.П. Материалы по экологии узкощечной полевки Лено-Амгинского междуречья // Биол. проблемы Севера: Тез. докл. VI симп. — Якутск, 1974. — Вып. 1. — С. 85–89.
- Винокуров В.Н., Седалищев В.Т. Сезонные изменения гематологических показателей двух видов грызунов Центральной Якутии // Экология. — 1971. — № 2. — С. 92–94.
- Витвицкий Г.Н. Климат // Якутия. — М.: Наука, 1965. — С. 105–143.
- Волков В.И., Капко В.И., Долгов А.М., Зарубина В.Н. Лемминг лесной (*Myopus schisticolor* Lill., Mammalia, Rodentia) хребта Мяо-Чан и его эктопаразиты // Вестн. зоол. — 1974. — № 2. — С. 63–65.
- Вольперт Я.Л. Фаунистические комплексы мелких млекопитающих таежной части Колымо-Индигирской низменности // Биол. проблемы Севера: Тез. X Всесоюз. симп. — Магадан, 1983. — Ч. II. — С. 10–11.
- Вольперт Я.Л. Конкурентные отношения землероек-бурозубок в зооценозах Западного Предверхоянья // Вид и его продуктивность в ареале: Материалы 4-го Всесоюз. совещ. (3–7 апреля 1984 г.). — Свердловск, 1984. — С. 16.
- Вольперт Я.Л. Размножение бурозубок (род *Sorex*) Северо-Восточной Якутии // Охотничье-промысловые ресурсы Сибири. — Новосибирск, 1986. — С. 209–218.

- Вольперт Я.Л. Ландшафтная приуроченность лесных полевков на северо-востоке Якутии // Материалы V Всесоюз. совещ. "Вид и его продуктивность в ареале". — Виллюнас, 1988. — С. 16–18.
- Вольперт Я.Л. Особенности флуктуаций численности и воспроизводства бурозубок в Северной Якутии // I Всесоюз. совещ. по биологии насекомыхных млекопитающих, Новосибирск. — М., 1992. — С. 29–31.
- Вольперт Я.Л., Аверенский А.И. Характеристика питания землероек-бурозубок рода *Sorex* (Insectivora, Mammalia) в Западном Предверхоянье // Териологические исследования в Якутии. — Якутск, 1983. — С. 57–73.
- Вольперт Я.Л., Луковцев Ю.С., Яковлев Ф.Г. Ландшафтные группировки мелких млекопитающих долины р. Колымы // История фауны и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1990. — С. 40–61.
- Вольперт Я.Л., Поздняков В.И., Гермогенов Н.И. Территориальное распределение и видовой состав млекопитающих низовьев р. Лены // Зоогеографические и экологические исследования териофауны Якутии. — Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988. — С. 96–106.
- Вольперт Я.Л., Сапожников Г.В. Население наземных млекопитающих дельты р. Лена // Почвы, растительный и животный мир арктических районов Якутии. — Якутск, 1996. — С. 65–76.
- Вольперт Я.Л., Сапожников Г.В. Реакция населения мелких млекопитающих при различных формах техногенных воздействий на арктические ландшафты // Экология. — 1998. — № 2. — С. 133–138.
- Вольперт Я.Л., Шадрин Е.Г. Экология лесного лемминга на северо-востоке Якутии // Экология. — 1990. — № 4. — С. 42–50.
- Вольперт Я.Л., Шадрин Е.Г. Ландшафтные сообщества мелких млекопитающих лесотундровой зоны р. Индигирка // Вопросы экологии и экологического образования в Якутии. — Якутск, 2001. — С. 77–93.
- Вольперт Я.Л., Шадрин Е.Г., Кравцова В.М. Население мелких млекопитающих рекреационной зоны г. Якутска // Вопросы региональной гигиены, санитарии и эпидемиологии. Вып. 4. — Якутск, 1997. — С. 213–219.
- Вольперт Я.Л., Юдин Б.С. Пространственные изменения фаунистических комплексов мелких млекопитающих Якутии // Охотничье-промысловые ресурсы Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. — С. 198–202.
- Воробьева К.Т. Краткий отчет зоологического подотряда Виллюйской зооботанической экспедиции // Сб. трудов науч.-исслед. об-ва Саха Кескилэ. — Якутск, 1928. — Вып. 5. — С. 103–121.
- Воронцов Н.Н. Экологические и некоторые морфологические особенности рыжих полевков европейского северо-востока // Тр. ЗИН АН СССР. — 1961. — Т. XXIX. — С. 101–136.
- Врангель Ф. Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю. — СПб., 1841. — Ч. I. — 358 с.; ч. II. — 365 с.
- Гаврилова М.К. Климат Центральной Якутии. — Якутск: Кн. изд-во, 1973. — 120 с.
- Гилева Э.А. Хромосомный полиморфизм у двух близких видов субарктических полевков // Докл. АН СССР. — 1972. — Т. 203, № 3. — С. 689–692.
- Гилева Э.А., Васильева Е.А., Ищенко В.П., Покровский А.В. К вопросу о связи между числом хромосом и изменчивостью морфологических признаков у полевков р. *Microtus* // Популяционная экология и изменчивость животных. — Свердловск, 1979. — С. 78–83.
- Глотов И.Н., Ермаков Л.Н., Кузьякин В.А. и др. Сообщества мелких млекопитающих Барабы. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. — 230 с.
- Громов И.М., Поляков И.Я. Полевки (Microtinae). — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. — 502 с.
- Грязнухин А.Н. Материалы по питанию соболя в юго-западных отрогах Верхоянского хребта // Сб. НТИ ВНИИЖП. — Якутск, 1963. — Вып. 5 (8). — С. 14–25.
- Джиллер Н. Структура сообществ и экологическая ниша. — М.: Мир, 1988. — 182 с.
- Докучаев Н.Е. Особенности размножения и структура популяций средней *Sorex caecutiens* Laxmann и крупнозубой *S. daphaenodon* Thomas бурозубок на северо-востоке Сибири // Экология полевков и бурозубок на северо-востоке Сибири. — Владивосток, 1979. — С. 86–102.
- Докучаев Н.Е. Реакция землероек-бурозубок на приманку и ее связь с содержанием бурого жира // Экология. — 1980. — № 1. — С. 102–105.
- Докучаев Н.Е. Питание землероек-бурозубок (Soricidae) и оценка их роли в горно-таежных экосистемах Северо-Восточной Сибири // Экология млекопитающих Северо-Восточной Сибири. — М.: Наука, 1981. — С. 3–22.
- Докучаев Н.Е. Механизмы, обеспечивающие восстановление численности бурозубок Северо-Восточной Сибири // Тез. X Всесоюз. симп. "Биологические проблемы Севера". — Магадан, 1983. — Ч. II. — С. 20–21.
- Докучаев Н.Е. Экология бурозубок Северо-Восточной Азии. — М.: Наука, 1990. — 160 с.
- Докучаев Н.Е. Бурозубки Северо-Восточной Азии и сопредельных территорий: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Владивосток, 1998. — 63 с.
- Долгов В.А. Распространение и численность палеарктических бурозубок (Insectivora, Soricidae) // Зоол. журн. — 1967. — Т. 46, вып. 11. — С. 1701–1712.
- Долгов В.А. Бурозубки Старого Света. — М.: Изд-во МГУ, 1985. — 219 с.
- Долгов В.А., Чабовский В.И., Шилова С.А., Эфран К.М. Некоторые вопросы экологии бурозубок (Soricidae) и их значение в очагах клещевого энцефалита // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1968. — Т. 73, вып. 6. — С. 17–28.
- Доронина Н.А. Гидрография // Северная Якутия: Тр. Арктич. и антарктич. науч.-исслед. ин-та. — Л.: Морской транспорт, 1960. — Т. 236. — С. 193–234.
- Дунаева Т.Н. Сравнительный обзор экологии тундровых полевков п-ова Ямал // Тр. Ин-та географии АН СССР. — М.; Л., 1948. — С. 78–143.
- Дунаева Т.Н. К изучению биологии размножения обыкновенной бурозубки (*Sorex araneus*) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1955. — Т. 60, вып. 6. — С. 27–43.
- Дунаева Т.Н., Кучерук В.В. Материалы по экологии наземных позвоночных тундры Южного Ямала // Материалы к познанию флоры и фауны СССР. — М., 1941. — Вып. 4. — С. 1–80.
- Егоров О.В., Кривошеев В.Г. О значении хвостов в питании наземных позвоночных Якутской тайги // Природа Якутии и ее охрана: Материалы III Республ. совещ. по охране природы Якутии. — Якутск: Кн. изд-во, 1965. — С. 21–30.
- Егорова Г.Н. Природные условия дельты р. Лена и севера Хараулахских гор в пределах проектируемого заповедника // Природа Якутии и ее охрана. — Якутск, 1965. — С. 174–189.
- Емельянова Л.Г. О распространении и численности лесного лемминга в северо-восточной части его ареала // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1994. — Т. 99, вып. 5. — С. 37–43.
- Ермаков Е.Н., Шаповалов С.И. Учет численности мелких млекопитающих канавками // Экология. — 1972. — № 4. — С. 105.
- Жадринская Н.Г. Растительность и почвы // Северная Якутия: Тр. Арктич. и антарктич. науч.-исслед. ин-та. — Л.: Морской транспорт, 1960. — Т. 236. — С. 235–254.

- Жигальский О.А. Механизмы динамики популяций мелких млекопитающих: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — Свердловск, 1989. — 49 с.
- Жигальский О.А., Бернштейн А.Д. Оценка влияния экзо- и эндогенных факторов на популяцию рыжей полевки // Экология популяций. — Свердловск, 1988. — Ч. 2. — С. 69–71.
- Жигальский О.А., Бернштейн А.Д. Оценка факторов, определяющих динамику популяций рыжей полевки в северной лесостепи // Экология. — 1989. — № 1 — С. 13–21.
- Заболоцкая Л.В. Расхищение семян землеройками-бурозубками // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1955. — Т. 60, вып. 4. — С. 122.
- Заболоцкая Л.В. Растаскивание семян хвойных и ясеня землеройками-бурозубками // Тр. Приокско-Террасного гос. заповедника. — 1957. — Т. I. — С. 242.
- Залогин Б.С., Родионов Н.А. Устьевые области рек СССР. — М., 1969. — 312 с.
- Зольников В.Г. Почвы восточной половины Центральной Якутии и их использование // Материалы о природных условиях и сельском хозяйстве Центральной Якутии. — М.: изд. АН СССР, 1954. — С. 7–54.
- Зонов Г.Б., Тугутов Л.Д. Зимние наблюдения за водяными крысами в Якутии // Докл. Иркутского ПЧИ. — Чита, 1963. — Вып. 6. — С. 88–91.
- Ивантер Т.В., Ивантер Э.В., Терноуполо Е.И. Биология размножения и структура популяций землероек (Soricidae) Карелии // Вопросы экологии животных. — Петрозаводск, 1974. — С. 94–143.
- Ивантер Э.В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного северо-запада СССР. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. — 246 с.
- Ивантер Э.В. О биотопическом распределении землероек-бурозубок // Экология наземных позвоночных северо-запада СССР. — Петрозаводск, 1981. — С. 68–79.
- Ивантер Э.В., Ивантер Т.В., Лабкова М.Н. О питании землероек-бурозубок (р. *Sorex*) Карелии // Тр. Гос. заповедника "Кивач". — Петрозаводск, 1973. — Вып. 2. — С. 148–163.
- Ивантер Э.В., Ивантер Т.В., Туманов И.Л. Адаптивные особенности мелких млекопитающих: эколого-морфологические и физиологические аспекты. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. — 318 с.
- Ивантер Э.В., Макаров А.М. Территориальная экология землероек-бурозубок (*Insectivora*, *Sorex*). — Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2001. — 272 с.
- Иохельсон В.И. Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе // Тр. Якутской экспедиции. Отд. зоол. — СПб., 1898. — Т. 10, ч. 3. — С. 1–167.
- Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985. — 320 с.
- Капитонов В.И. Новые данные по биологии лемминговидной полевки *Alticola lemmings Miller* // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1963. — Т. 68, вып. 6. — С. 14–26.
- Караваев М.Н. Растительный покров // Якутия. — М.: Наука, 1965. — С. 247–284.
- Карасева Е.В., Коренберг Э.И., Меркова М.А. Мелкие млекопитающие Центральной Якутии и их значение в природных очагах некоторых болезней человека // Зоол. журн. — 1960. — Т. 39, вып. 11. — С. 1690–1699.
- Катаев Г.Д., Бойко Н.С. Динамика численности лесных полевок (*Clethrionomys*) на Кольском Севере: экологический аспект // Экология популяций структура и динамика: Материалы совещ. Ч. 2 — М., 1995. — С. 560–575.
- Киреев Д.М. Эколого-географические термины в лесоведении: Словарь-справочник. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. — 181 с.
- Кирищенко С.П., Кирищенко Т.В. Питание сибирских *Lemmus sibiricus* Kerr. и копытных *Dicrostonyx torquatus* Pall. леммингов на острове Врангеля // Экология полевок и землероек на Северо-Востоке Сибири. — Владивосток, 1979. — С. 39–45.
- Колушев И.И. Млекопитающие Крайнего Севера Западной и Средней Сибири // Тр. Биол. факультета Томского ун-та. — Томск, 1936. — 327 с.
- Копеев К.И. Материалы по экологии обского лемминга и большой узкохвостной полевки // Бюл. Урал. отд. МОИП. — 1958. — Вып. 1. — С. 109–133.
- Коржуев С.С. Рельеф и геологическое строение // Якутия. — М.: Наука, 1965. — С. 29–114.
- Кошкина Т.В. Метод определения возраста рыжих полевок и опыт его применения // Зоол. журн. — 1955. — Т. 34, вып. 3. — С. 631–639.
- Кошкина Т.В. Сравнительная экология рыжих полевок в северной тайге // Фауна и экология грызунов. — М., 1957. — Вып. 6. — С. 3–65.
- Кошкина Т.В. О факторах динамики численности леммингов // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1970. — Т. 45. — С. 11–61.
- Кошкина Т.В., Халанский А.С. Возрастная изменчивость черепа норвежского лемминга и анализ возрастного состава популяции у этого вида // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1961. — Т. 66, вып. 2. — С. 3–14.
- Кривошеев В.Г. Морфобиологические особенности северо-сибирской полевки (*Microtus hyperboreus* Vinogr.) // Зоол. журн. — 1963. — Т. 42, вып. 5. — С. 752–762.
- Кривошеев В.Г. Биофаунистические материалы по мелким млекопитающим тайги Колымской низменности // Исследования по экологии, динамике численности и болезням млекопитающих Якутии. — М., 1964. — С. 175–236.
- Кривошеев В.Г. Современные ландшафты и распространение млекопитающих в Северо-Восточной Азии // Биол. проблемы Севера. — Магадан, 1973. — Вып. 2. — С. 24–35.
- Кривошеев В.Г. Основные итоги и перспективы развития териологических исследований на северо-востоке СССР // Экология мелких млекопитающих Якутии. — Якутск: Кн. изд-во, 1975. — С. 3–14.
- Кривошеев В.Г. Географо-генетический анализ териофауны Северо-Восточной Азии // Тез. докл. VII Всесоюз. зоогеографической конф. — М., 1979. — С. 30–33.
- Кривошеев В.Г. Факторы регуляции численности мышевидных грызунов и хищных млекопитающих тайги Колымской низменности // Экология млекопитающих Северо-Восточной Сибири. — М.: Наука, 1981. — С. 61–82.
- Кривошеев В.Г., Гутин Л.И. Экологическая структура сообществ грызунов и зайцеобразных в горных ландшафтах верховий р. Колымы // Экология млекопитающих тундры и редколесья северо-востока Сибири. — Владивосток, 1985. — С. 30–43.
- Кривошеев В.Г., Попов М.В. Материалы по фауне и экологии мелких млекопитающих бассейна р. Яны // Материалы по биологии и динамике численности мелких млекопитающих Якутии. — Якутск, 1968. — С. 120–144.
- Кривошеев В.Г., Чернявский Ф.Б., Железнов Н.К., Тархов В.С. Новые данные по фауне млекопитающих Анадырского края // Фауна и зоогеография млекопитающих северо-востока Сибири. — Владивосток, 1978. — С. 66–93.
- Кручинин Ю.А. Климат // Северная Якутия: Тр. Арктич. и антарктич. науч.-исслед. ин-та. — Л.: Морской транспорт, 1960. — Т. 236. — С. 135–172.

Кузякин А.П. Зоогеография СССР // Биогеография: Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. — 1962. — Т. 109, вып. 1. — С. 3–182.

Куксов В.А. Популяционная экология и теоретические основы прогноза численности мелких грызунов Таймыра: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — 1975. — 21 с.

Куприянова И.Ф. Биотопические группировки мелких млекопитающих и динамика их численных взаимоотношений на юге Архангельской области // Фауна и экология позвоночных животных. — М.: Наука, 1978. — С. 114–130.

Куприянова И.Ф. Воспроизводство обыкновенной и средней бурозубок и его годовые особенности в Средней тайге юга Архангельской области // Вид и его продуктивность в ареале: Материалы 4-го Всесоюз. совещ. (3–7 апреля 1984 г.). — Свердловск, 1984. — С. 37.

Курьшев С.В. Данные по демографии флуктуирующих популяций красной и красно-серой полевых // Экология млекопитающих тундры и редколесья Северо-Востока Сибири. — Владивосток, 1995. — С. 119–132.

Кучерук В.В. Количественный учет важнейших видов грызунов и землероек // Методы учета численности и географического распределения наземных позвоночных. — М., 1952. — С. 9–46.

Кучерук В.В. Новое в методике количественного учета вредных грызунов и землероек // Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. — М., 1963. — С. 159–183.

Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высш. шк., 1980. — 293 с.

Лабутин Ю.В. Биофаунистические материалы по млекопитающим Табалахской впадины // Экология мелких млекопитающих Якутии. — Якутск, 1975. — С. 34–56.

Ларионов П.Д. Мелкие млекопитающие Мегино-Кангаласского района и их стадийное распределение // Учен. зап. Якутск. гос. пед. и учит. ин-та. — Якутск, 1954. — С. 69–92.

Литвинов Ю.Н. Население мелких млекопитающих у северной границы их ареала на Таймыре // Фауна, таксономия, экология млекопитающих и птиц. — Новосибирск, 1987. — С. 11–16.

Литвинов Ю.Н. Распределение тундряной бурозубки *Sorex tundrensis* (Insectivora, Soricidae) на Таймыре // Зоол. журн. — 1995. — Т. 74, вып. 12. — С. 133–135.

Литвинов Н.И., Васильев Г.И. Запасание кормов красно-серой полевкой // Экология. — 1973. — № 1. — С. 94–95.

Луковцев Ю.С., Сафронов В.М., Вольперт Я.Л. и др. О динамике численности лесных полевых в Центральной Якутии // Механизмы регуляции численности леммингов и полевых на Крайнем Севере. — Владивосток: изд. ДВНЦ, 1979. — С. 86.

Луковцев Ю.С., Попов А.Д., Вольперт Я.Л. О значении мелких млекопитающих в питании лемма и тайменя // Бюл. НТИ ЯФ СО АН СССР. — Якутск: изд. ЯФ СО АН СССР, 1980. — С. 31–32.

Лукьянова И.В. Растительные корма в пищевом рационе землероек (Soricidae) // Териология. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. — Т. 2. — С. 281–283.

Лямкин В.Ф., Малышев Ю.С., Пузанов В.М. Лесной лемминг в Западном Забайкалье // Грызуны: Материалы VI Всесоюз. совещ. — Л., 1983. — С. 325–327.

Лямкин В.Ф., Пузанов В.М., Малышев Ю.С. Некоторые особенности размножения бурозубок (род *Sorex*) Северного Забайкалья // Фауна и экология млекопитающих Якутии. — Якутск: изд. ЯФ СО АН СССР, 1985. — С. 73–84.

Маак Р.К. Вилуйский округ Якутской области. — СПб., 1886. — Ч. 3. — 192 с.

Максимов А.А. Структура и динамика биоценозов речных долин. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. — 260 с.

Марин Ю.Ф. Распространение и некоторые вопросы экологии лесного лемминга (*Myopus schisticolor* Lill.) в Алтайском заповеднике // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1981. — Т. 86, вып. 3. — С. 36–40.

Мастахов С.Е. Река Лена. — Якутск: Кн. изд-во, 1972. — 112 с.

Матурова Р.Т. Мелкие млекопитающие хребта Улан-Бургасы (Восточное Забайкалье). — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1982. — 101 с.

Меженный А.А. Колебания численности тундровых грызунов и задачи комплексного изучения их // Биол. проблемы Севера: Тез. докл. VI Всесоюз. симп. — Якутск, 1974. — Вып. 1. — С. 65–67.

Меженный А.А. Материалы по экологии мелких грызунов тундры и лесотундры Северной Якутии // Материалы по экологии мелких млекопитающих Субарктики. — Новосибирск, 1975. — С. 53–118.

Миддендорф А.Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. — СПб., 1869. — Ч. 2: Север и Восток Сибири в естественно-историческом отношении / Сибирская фауна. Отд. 5. — 833 с.

Михель Н.М. Промысловые звери северо-восточной Якутии. — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1938.

Мичурин Л.Р. Характеристика потребления кормов и энергии лесными полевками в лесах Западного Саяна // Экология питания лесных животных. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. — С. 36–49.

Млекопитающие Якутии / Под ред. В.А. Тавровского. — М.: Наука, 1971. — 657 с.

Моралева Н.В. Отношение к территории землероек-бурозубок енисейской тайги (по данным индивидуального мечения) // Животный мир енисейской тайги и лесотундры и природная зональность. — М.: Наука, 1983. — С. 215–230.

Мордосов И.И. Млекопитающие Западной Якутии // I Международный конгресс по млекопитающим. — М., 1974. — Т. 1. — С. 49–50.

Мордосов И.И. Грызуны таежной части северо-западной Якутии // Биол. проблемы Севера: Тез. докл. VII Всесоюз. симп. — Петрозаводск, 1976. — С. 199–201.

Мордосов И.И. Фауна млекопитающих таежной части Западной Якутии // Фауна и экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1980. — С. 3–27.

Мордосов И.И. Размножение красной полевки в Западной Якутии // Экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1984. — С. 46–56.

Мордосов И.И. Размножение и движения численности полевки-экономки в Западной Якутии // Фауна и экология животных Якутии. — Якутск, 1991. — С. 16–26.

Мордосов И.И. Экология красной полевки Яно-Индибирской тундры // Зоогеографические и экологические исследования животных Якутии. — Якутск, 1992. — С. 79–84.

Мордосов И.И. Млекопитающие Западной Якутии. — Якутск, 1997. — 235 с.

Мордосов И.И. Современные границы распространения млекопитающих в Якутии // Наука и образование. — Якутск, 2001. — № 1. — С. 95–98.

Мордосов И.И., Андреев И.К. Экология красно-серой полевки в Западной Якутии // Фауна и экология животных Якутии. — Якутск, 1991. — С. 3–16.

Мордосов И.И., Винокуров В.Н. Фаунистические комплексы млекопитающих таежной части Западной Якутии // Фауна и экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1980. — С. 57–65.

Мордосов И.И., Лебедева А.Д., Павлов М.С., Сыроватский Я.С. К экологии сибирского лемминга Яно-Индигирской тундры // Зоогеографические и экологические исследования животных Якутии. — Якутск, 1992. — С. 85–94.

Мордосов И.И., Осипов В.П. Материалы по питанию и активности красной полевки в Западной Якутии // Экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1984. — С. 57–65.

Мордосов И.И., Романова Г.А., Седалищев В.Т. Материалы по зимнему размножению красной полевки в населенных пунктах Якутии // Проблемы охотведения и охраны природы. — Иркутск, 1975. — С. 115–116.

Никитина Н.А. Итоги изучения перемещений грызунов фауны СССР // Зоол. журн. — 1971. — Т. 50, вып. 3. — С. 408–421.

Николаев И.И. Таксоцены как экологическая категория // Экология. — 1977. — № 5. — С. 50–55.

Новиков Г.А. К экологии лесного лемминга (*M. schisticolor*) на Кольском полуострове // Зоол. журн. — 1941. — Т. 20, вып. 4/5. — С. 626–631.

Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. — М.: Сов. наука, 1953. — 503 с.

Огнев С.И. Млекопитающие Северо-Восточной Сибири. — Владивосток, 1926. — 199 с.

Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии. I. Насекомоядные и летучие мыши. — М.; Л.: Госиздат, 1928. — 631 с.

Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран. IV. Грызуны. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — 615 с.

Огнев С.И. Материалы по систематике палеарктических полевок // Докл. АН СССР. — 1944. — Т. 43, № 4. — С. 185–188.

Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран. V. Грызуны. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. — 806 с.

Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран. VI. Грызуны. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — 559 с.

Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран. VII. Грызуны. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — 706 с.

Окулова Н.М. Биологические взаимосвязи в лесных экосистемах (на примере природных очагов клещевого энцефалита). — М.: Наука, 1986. — 248 с.

Окулова Н.М., Бернштейн А.Д. Доля размножившихся среди самок-сеголеток — гибкий демографический параметр у лесных полевок // Экология популяций: структура и динамика: Материалы всерос. совещ. — М., 1995. — С. 667–677.

Олехник В.Н. Сильные ветра по р. Лене от Якутска до Тикси // Вопр. географии Якутии. Вып. 2. — Якутск, 1960. — С. 62–68.

Охлопков И.М., Луковцев Ю.С., Яковлев Ф.Г. Экология большеухой полевки в Центральном Верхоянье // Фауна и экология животных Якутии. — Якутск, 1991. — С. 98–109.

Охотина М.В. Роль бурозубок (*Sorex, Insectivora*) в биоценозах хвойно-широколиственных лесов Приморского края // Териология. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1974. — Т. 2. — С. 253–258.

Охотина М.В., Костенко В.А. Полиэтиленовая пленка — перспективный материал для изготовления ловчих заборчиков // Тр. Биолого-почвенного ин-та ДВНЦ АН СССР. — 1974. — Т. 17. — С. 193–197.

Очилов Ю.Д., Башанов И.А. Млекопитающие Тувы. — Кызыл: Кн. изд-во, 1975. — 138 с.

Пантелеев П.А. Популяционная экология водяной полевки и меры борьбы. — М.: Наука, 1968. — 254 с.

Пантелеев П.А. Биоэнергетика мелких млекопитающих. — М.: Наука, 1983. — 266 с.

Пантелеев П.А., Терехина А.Н., Варшавский А.А. Экогеографическая изменчивость грызунов. — М.: Наука, 1990. — 374 с.

Перфильев В.И. Материалы по распространению мелких млекопитающих в тундре северо-востока Якутии // Материалы по биологии и динамике численности млекопитающих Якутии. — Якутск, 1968. — С. 146–159.

Плохинский Н.А. Биометрия. — Новосибирск: Изд-во АН СССР, 1961. — 363 с.

Поздняков А.А., Литвинов Ю.Н., Вольперт Я.Л. Распределение и внутривидовое разнообразие двух близких видов северных полевок // Сибирский экол. журн. — 1998. — № 3–4. — С. 337–345.

Покровский А.В., Васильева И.А., Лобанова Н.А. Сравнительное изучение полевки Миддендорфа, северосибирской полевки и их гибридов // Популяционная изменчивость животных. — Свердловск, 1975. — С. 39–62.

Покровский А.В., Кривошеев В.Г., Гилева Э.А. Экспериментальное изучение экологии и степени репродуктивной изоляции двух близких форм северных полевок (*Microtus middendorffi* Poljakov, 1881 и *M. hyperboreus* Vinogradov, 1933) // Экология. — 1970. — № 1. — С. 103–105.

Поляков И.С. Географическое распространение животных в юго-восточной части Ленского бассейна // Зап. Русского геогр. об-ва. — 1873. — Т. 3.

Попов В.А. Млекопитающие Волжско-Камского края. — Казань: Кн. изд-во, 1960. — 466 с.

Попов М.В. Распространение и экология сибирской красной полевки (*Clethrionomys rutilus* Pall., 1778) в Якутии // Исследования по экологии, динамике численности и болезням млекопитающих Якутии. — М., 1964. — С. 237–285.

Попов М.В. Фауна насекомоядных Якутии // Вопр. экологии: Материалы к III совещ. зоол. Сибири. — Томск, 1966. — С. 238–240.

Попов М.В. Фауна мелких млекопитающих восточной части Лено-Виллюйского междуречья (долина р. Кенкеме) // Экология мелких млекопитающих Якутии. — Якутск, 1975. — С. 57–117.

Попов М.В. Определитель млекопитающих Якутии. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. — 424 с.

Попов М.В., Вольперт Я.Л., Сафронов В.М. Некоторые результаты мечения мышевидных грызунов в бассейне средней Лены // Бюл. НТИ ЯФ СО АН СССР. — Якутск: изд. ЯФ СО АН СССР, 1978. — С. 11–13.

Портенко Л.А., Кишинский А.А., Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Корякского нагорья // Материалы по распределению, численности, биологии и экономическому значению. — М.; Л., 1963. — С. 1–130.

Потапкина А.Ф. Эколого-фаунистический очерк серых полевок (Genus *Microtus* Schrenk, 1798) Алтае-Саянской горной страны // Фауна и систематика позвоночных Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. — С. 93–107.

Прокопьев Н.П. Материалы по питанию узкочерепной полевки Центральной Якутии // Биол. проблемы Севера: Тез. докл. VII Всесоюз. симп. — Петропавловск, 1976. — С. 258–259.

Прокопьев Н.П. Биология размножения узкочерепной полевки (*M. gregalis*) в Центральной Якутии // Распространение и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1982. — С. 48–54.

Прокопьев Н.П. О подснежном размножении полевки-экономки (*Microtus oeconomus*) в Центральной Якутии // Зоогеографические и экологические исследования териофауны Якутии. — Якутск, 1988. — С. 84–85.

Прокопьев Н.П., Боескорев Г.Г. Эколого-фаунистический очерк мелких млекопитающих бассейна Среднего Вилюя // Экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1984. — С. 83–91.

Прокопьев Н.П., Винокуров В.Н. Влияние узкочерепной полевки на растительность степных биоценозов Лено-Амгинского междуречья // Фауна и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1985. — С. 65–89.

Прокопьев Н.П., Винокуров В.Н. Узкочерепная полевка в Центральной Якутии. — Якутск, 1986. — 142 с.

Путилов А.А., Фалеев В.И. Особенности переживания половодья мелкими млекопитающими // Сукцессии животного населения в биоценозах поймы р. Оби. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981. — С. 111–122.

Пушаровский Ю.М. Предверхоанский прогиб и мезозониды Северо-Восточной Азии // Тектоника СССР. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — Т. 5. — 236 с.

Пястолова О.А. Полевка-экономка // Тр. Ин-та экологии растений и животных. — Свердловск, 1971. — Млекопитающие Ямала и Северного Урала. Т. 1, вып. 80. — С. 127–147.

Рамазанова Ф.Р. Некоторые материалы по размножению лесного лемминга в тайге Сосьвинского Приобья // Грызуны: Материалы VI Всесоюз. совещ. — 1983. — С. 342–344.

Растительность и животный мир дельты р. Лена. — Якутск, 1985. — 139 с.

Ревин Ю.В. Видовой состав, численность и распространение по станциям мелких млекопитающих Олекмо-Чарского нагорья // Позвоночные Якутии. — Якутск, 1964. — С. 33–42.

Ревин Ю.В. Эколого-фаунистический очерк насекомоядных и мелких грызунов Олекмо-Чарского нагорья // Материалы по биологии и динамике численности мелких млекопитающих Якутии. — Якутск, 1968. — С. 5–86.

Ревин Ю.В. О влиянии промысловых хищников на обилие мышевидных грызунов в Южной Якутии // Пути повышения эффективности охотничьего хозяйства. — Иркутск, 1971. — Ч. 2. — С. 3–5.

Ревин Ю.В. Особенности территориального и биотопического размещения мелких млекопитающих на Олекмо-Чарском нагорье // Зоологические проблемы Сибири. — Новосибирск, 1972. — С. 458–459.

Ревин Ю.В. Основные биотопические связи и численность мелких млекопитающих в Южной Якутии // Экология мелких млекопитающих Якутии. — Якутск, 1975. — С. 118–140.

Ревин Ю.В. Млекопитающие Южной Якутии. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. — 321 с.

Ревин Ю.В. К вопросу о структуре и генезисе фауны млекопитающих Южной Якутии // История фауны и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1990. — С. 7–24.

Ревин Ю.В., Вольперт Я.Л. Об изменчивости величины выводка у красной полевки Якутии // Материалы III съезда ВТО (1–5 февраля 1982 г.). — М., 1982. — Т. I. — С. 277.

Ревин Ю.В., Вольперт Я.Л. Териофаунистические исследования в долине р. Адычи // Фауна и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1985. — С. 55–73.

Ревин Ю.В., Вольперт Я.Л., Хмелева А.С. Ландшафтные группировки мелких млекопитающих долины средней Лены // Распространение и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1982. — С. 5–18.

Ревин Ю.В., Гермогенов Н.И. Население наземных позвоночных и возможные изменения его в зоне водохранилища Вилюйской ГЭС-III // Охрана и рациональное использование животного мира и природной среды Якутии: Мате-

риалы VII Респуб. совещ. по охране природы Якутии. — Якутск, 1979. — С. 32–39.

Ревин Ю.В., Сафронов В.М., Вольперт Я.Л., Попов А.Л. Экология и динамика численности млекопитающих Предверхоанья. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. — 200 с.

Реймерс Н.Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. — М.; Л.: Наука, 1966. — 419 с.

Реймерс Н.Ф., Воронов Г.А. Насекомоядные и грызуны Верхней Лены. — Иркутск: Кн. изд-во, 1963. — 191 с.

Романова Г.А. Экология домового мыши на северо-восточном крае ареала // Экология. — 1970. — № I. — С. 98–99.

Романова Г.А. Грызуны населенных пунктов Якутии // Тез. докл. VI Всесоюз. симп. “Биологические проблемы Севера”. — Якутск: изд. ЯФ СО АН СССР, 1974а. — Вып. I. — С. 93–98.

Романова Г.А. Экологические особенности синантропических грызунов Якутии // I международный конгресс по млекопитающим (Москва, 6–12 июля 1974 г.): Рефераты докладов. — М., 1974б. — Т. 72. — С. 164–165.

Романова Г.А. Материалы по распространению и экологии домового мыши и серой крысы в Якутии // Экология наземных позвоночных таежной Якутии. — Якутск, 1984. — С. 77–82.

Россолимо О.Л. О внутривидовой изменчивости красной полевки // Зоол. журн. — 1962. — Т. 40, вып. 3.

Самойлов В.И. Устья рек. — М., 1952. — 527 с.

Сапогов А.В. Зональные особенности населения мышевидных грызунов енисейской тайги и лесотундры и природная зональность. — М.: Наука, 1983. — С. 204–214.

Сафронов В.М. Материалы по возрастной структуре популяции красной полевки в бассейне средней Лены // Биол. проблемы Севера: Тез. докл. VI Всесоюз. симп. — Якутск, 1974. — Вып. I. — С. 82–85.

Сафронов В.М. К экологическим и эколого-физиологическим особенностям зимующих генераций красно-серой полевки в бассейне средней Лены // Эколого-физиологические основы адаптации животных и человека к условиям Севера. — Якутск, 1977. — С. 82–86.

Сафронов В.М. О половом составе и сроках весеннего размножения рыжих полевок в бассейне средней Лены // Биол. проблемы Севера / Бюл. НТИ Якутского филиала СО АН СССР. — Якутск, 1978. — С. 7–11.

Сафронов В.М. Зимняя экология лесных полевок в Центральной Якутии. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1983. — 156 с.

Сафронов В.М., Ахременко А.К. Материалы по экологии и энергетическому обмену у красной полевки в долине средней Лены // Териологические исследования в Якутии. — Якутск, 1983. — С. 73–84.

Седалищев В.Т. Эколого-физиологические характеристики полевки-экономки, обитающей в долине средней Лены // Экология. — 1974. — № 3. — С. 96–99.

Сергеев В.Е. Поведение землероек при подъеме паводковых вод // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. наук. — 1974. — Вып. 2, № 5. — С. 81–84.

Сергеев В.Е. Воздействие весенне-летних разливов на землероек поймы Оби // Сукцессии животного населения в биоценозах поймы р. Оби. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. — С. 125–145.

Скалон В.Н. Заметки о грызунах Центральной Якутии // Изв. Иркутского гос. противочумного ин-та Сибири и Дальнего Востока. — Иркутск, 1949. — Т. 7. — С. 268–276.

Скрябин С.З., Караваев М.Н. Зеленый покров Якутии. — Якутск: Якут. кн. изд-во, 1991. — 176 с.

Снигиревская Е.М. Материалы по биологии размножения и колебания численности землероек в Башкирском заповеднике // Тр. Башкирского гос. заповедника. — 1967. — Вып. 1. — С. 12–18.

Снигиревская Е.М. О биологии азиатской лесной мыши // Зоол. журн. — 1964. — Т. 13, вып. 8.

Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Отр. Зайцеобразные, Грызуны. — М.: Высш. шк., 1977. — 229 с.

Соколов Н.Н., Сидоров Б.И., Ча Н.И. и др. Вопросы экологии обского и копытного леммингов // Докл. на 8-й науч. сессии Якутского филиала АН СССР. — Якутск, 1957. — С. 157–177.

Соломонов Н.Г. Материалы по экологии водяной крысы в Центральной Якутии // Учен. зап. Якутск. гос. ун-та. — Якутск, 1958. — Вып. 4. — С. 161–168.

Соломонов Н.Г. Материалы по экологии водяной крысы в Центральной Якутии // Учен. зап. Якутск. гос. ун-та. — Якутск, 1960а. — Вып. 8. — С. 63–83.

Соломонов Н.Г. Эколого-географические особенности плодovitости водяной крысы в Центральной Якутии // Учен. зап. Якутск. гос. ун-та. — Якутск, 1960б. — Вып. 8. — С. 85–92.

Соломонов Н.Г. Динамика численности водяной крысы в Центральной Якутии // Учен. зап. Якутск. гос. ун-та. — Якутск, 1960в. — Вып. 36. — С. 250–261.

Соломонов Н.Г. Экология водяной полевки в Центральной Якутии // Проблемы зоологических исследований Сибири: Тез. II совещ. — Горно-Алтайск, 1962. — С. 219–221.

Соломонов Н.Г. Направленность изменчивости средней величины выводка у некоторых млекопитающих Якутии // Экология. — 1970. — № 5. — С. 89–92.

Соломонов Н.Г. Очерки популяционной экологии грызунов и зайца-беляка в Центральной Якутии. — Якутск: Кн. изд-во, 1973. — 247 с.

Соломонов Н.Г. Пути приспособления млекопитающих к условиям Якутии // Теоретические и прикладные проблемы биологии на северо-востоке СССР. — Якутск, 1976. — С. 3–16.

Соломонов Н.Г. Пути приспособления млекопитающих к условиям Якутии // Теоретические и прикладные проблемы биологии на Северо-Востоке СССР. — Якутск, 1977. — С. 3–16.

Соломонов Н.Г. Экология водяной полевки в Якутии. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. — 135 с.

Соломонов Н.Г. Полевка-экономка в долине средней Лены // Вид и его продуктивность в ареале: Материалы 4-го Всесоюз. совещ. — Свердловск, 1984. — С. 69–70.

Соломонов Н.Г., Ларионов Г.П. Птицы и млекопитающие пойменных биотопов средней Лены // Вopr. зоологии: Материалы III Совещ. зоологов Сибири. — Томск, 1966. — С. 32–33.

Соломонов Н.Г., Мордосов И.И. Материалы по фауне мышевидных грызунов Лено-Вилуйского междуречья // Учен. зап. Якутск. гос. ун-та. — Якутск, 1971. — Вып. 18. — С. 105–110.

Соломонов Н.Г., Мордосов И.И., Винокуров В.Н. К морфо-физиологической характеристике центрально-якутских популяций некоторых видов полевков // Оптимальная плотность и оптимальная структура популяций животных. — Свердловск, 1968. — С. 112.

Справочник по климату СССР. — Якутск, 1973. — Вып. 24, ч. 2–4. — 123 с.

Строганов С.У. Звери Сибири. Насекомоядные. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 267 с.

Тестов Б.В. О связи динамики численности и полового состава микропопуляций красной полевки // Грызуны: Материалы VI Всесоюз. совещ. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. — С. 456–457.

Тишков А.А. Трофические связи позвоночных животных с мхами // Роль животных в функционировании экосистем. — М.: Наука, 1975. — С. 53–55.

Тишков А.А., Готфильд А.Б., Шефтель Б.И. Новые данные о питании лесного лемминга // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1978. — Т. 83, вып. 4. — С. 22–25.

Ткаченко М.И. Предварительный отчет о работах зоологического отряда в Вилуйском округе в 1926 г. // Материалы комиссии по изучению ЯАССР. — Л., 1929. — Вып. 10. — С. 281–296.

Тугаринов А.Я. Общий обзор фауны Якутии // Якутия. — Л., 1927. — С. 223–240.

Тугаринов А.Я., Смирнов Н.А., Иванов А.И. Птицы и млекопитающие Якутии // К десятилетию ЯАССР: Тр. СОНС. — Л.: Изд. АН СССР. Ленингр. отд-ние, 1934. — 134 с.

Тугутов Л.Д. Туляремия у красных полевков в Якутии // Особо опасные инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке. — Кызыл, 1966. — Вып. 7. — С. 58–60.

Тупикова Н.В., Сидорова Г.А., Коновалова Г.А. Определитель возраста лесных полевков // Фауна и экология грызунов. — М., 1970. — Вып. 9. — С. 145–169.

Федоров В.Б. Аллозимный полиморфизм в популяции лесного лемминга // Генетика. — 1990. — Т. 26, № 7. — С. 1324–1328.

Федоров А.Н., Ботулу Т.А., Варламов С.П. и др. Мерзлотные ландшафты Якутии (Поясн. записка к мерзлотно-ландшафтной карте Якутской АССР масштаба 1:2500000). — Новосибирск: Наука, 1989. — 169 с.

Формозов А.Н. Снежный покров как фактор среды, его значение в жизни млекопитающих и птиц СССР. — М.: Изд-во МОИП, 1946. — 152 с.

Формозов А.Н. О значении структуры снежного покрова в экологии и географии млекопитающих и птиц // Роль снежного покрова в природных процессах. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — С. 166–209.

Хляп А.А. Землеройки // Итоги мечения млекопитающих. — М.: Наука, 1980. — С. 66–76.

Хляп А.А., Корюлин Б.Б., Никитина Н.А. и др. Изучение подвижности мелких млекопитающих путем радиоизотопного мечения // Радиоэкология животных: Материалы I Всесоюз. конф. — М.: Наука, 1977. — С. 199–200.

Чернявский Ф.Б. Проблемы районирования в зоогеографии суши и подразделения Северо-Восточной Сибири по териологическим данным // Фауна и зоогеография млекопитающих Северо-Восточной Сибири. — Владивосток, 1978. — С. 3–25.

Чернявский Ф.Б. Млекопитающие крайнего северо-востока Сибири. — М.: Наука, 1984. — 387 с.

Чернявский Ф.Б., Докучаев Н.Е., Короленко Г.Е. Млекопитающие среднего течения р. Омогон // Фауна и зоогеография млекопитающих Северо-Востока Сибири. — Владивосток, 1978. — С. 26–65.

Чернявский Ф.Б., Кирюшенко Т.В., Кирюшенко С.П. Материалы по динамике и демографии лемминговых популяций в Колымской низменности // Экология млекопитающих тундры и редколесья Северо-Востока Сибири. — Владивосток, 1985. — С. 44–54.

Чернявский Ф.Б., Короленко Г.Е. Динамика численности и изменчивость некоторых популяционных показателей красной полевки на крайнем Северо-Востоке СССР // Экология. — 1979. — № 1. — С. 80–87.

Чернявский Ф.Б., Лазуткин А.Н. О динамике численности и демографии красной и красно-серой полевки // Экология млекопитающих тундры и редколесья Северо-Востока Сибири. — М.: Наука, 1985. — С. 109–118.

Чернявский Ф.Б., Ткачев А.В. Популяционные циклы леммингов в Арктике: Экологические и эндокринные аспекты. — М.: Наука, 1982. — 163 с.

Шадрина Е.Г., Аверенский А.И. Географическая и биотопическая изменчивость питания средней (*Sorex caecutiens* Laxmann, 1788) и тундряной (*S. tundrensis* Merriam, 1900) бурозубок // Биолого-экологические исследования в Республике Саха (Якутия). — Якутск, 1996. — С. 106–114.

Шадрина Е.Г., Вольперт Я.Л. Экология полевки-экономки в подзоне северного редколесья (низовья р. Индигирки) // История фауны и экология млекопитающих Якутии. — Якутск, 1990. — С. 61–76.

Шадрина Е.Г., Вольперт Я.Л. Репродуктивная стратегия мышевидных грызунов на северной периферии ареала // Экосистемы Севера: структура, адаптации, устойчивость: Материалы общерос. совещ. — М., 1995а. — С. 149–155.

Шадрина Е.Г., Вольперт Я.Л. Колебания численности и репродукции таежных грызунов на северо-востоке Якутии // Экология популяций: структура и динамика: Материалы всерос. совещ. — М., 1995б. — С. 756–766.

Шварц Е.А., Демин Д.В., Замолотчиков Д.Г. Экология сообществ мелких млекопитающих лесов умеренного пояса. — М.: Наука, 1992. — 126 с.

Шварц С.С. Биология размножения и возрастная структура популяций широко распространенных видов полевки на Крайнем Севере // Материалы по фауне приобского Севера и ее использование. — Тюмень: Кн. изд-во, 1959. — Вып. 1. — С. 220–254.

Шварц С.С. Пути приспособления наземных позвоночных к условиям существования в Субарктике. Т. I. Млекопитающие: Тр. Ин-та биологии. Вып. 33. — Свердловск: изд. УФ АН СССР, 1963. — 130 с.

Шварц Е.А., Замолотчиков Д.Г. Комбинативная система экологических ниш как способ отражения структуры населения мышевидных грызунов природных экосистем Валдайской возвышенности // Зоол. журн. — 1991. — Т. 70, № 4. — С. 113–124.

Шварц С.С., Павлинин В.Н., Сюсюмова Л.М. Теоретические основы построения прогнозов численности мышевидных грызунов в лесостепном Зауралье // Тр. Ин-та биологии Уральского филиала АН СССР. — Свердловск: Кн. изд-во, 1957. — Вып. 8. — С. 3–59.

Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных. — Свердловск: изд. УФ АН СССР, 1968. — 387 с.

Швецов Ю.Г. Мелкие млекопитающие Байкальской котловины. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. — 157 с.

Швецов Ю.Г., Потапкина А.Ф., Жаров В.Р. и др. Мелкие млекопитающие (*Microtammalia*) западного макросклона Баргузинского хребта (Прибайкалье) // Фауна и экология позвоночных Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. — С. 88–97.

Швецов Ю.Г., Смирнов М.Н., Монахов Г.И. Млекопитающие бассейна оз. Байкал. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. — 256 с.

Шелудякова В.А. Растительность Верхоянского района Якутской АССР. — Якутск: Кн. изд-во, 1948. — 61 с.

Шефтель Б.И. Зональные особенности населения насекомоядных млекопитающих енисейской тайги и лесотундры // Животный мир енисейской тайги и лесотундры. — М., 1983. — С. 184–203.

Шефтель Б.И. Анализ пространственного распределения землероек в средней енисейской тайге // Экологическая ординация и сообщества. — М.: Наука, 1990. — С. 15–32.

Шилов И.А. Эколого-физиологические основы популяционных отношений у животных. — М.: Изд-во МГУ, 1977. — 261 с.

Шилов И.А. Экология. — М.: Высш. шк., 1998. — 512 с.

Шилов И.А., Калецкая М.Л., Ивашкина И.Н., Солдатова А.Н. Динамика численности полевки-экономки (*Microtus oeconomus* Pall.) в Дарвинском заповеднике // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1977. — Т. 82, вып. 5. — С. 10–20.

Шкилев В.В. О размножении и численности водяных крыс в туляремийных очагах Якутии // Изв. Иркутского гос. противочумного ин-та. — Иркутск, 1966. — Т. 26. — С. 245–252.

Шляпкина М.С. Экспериментальные данные по экологии красной полевки // Грызуны: Материалы V Всесоюз. совещ. — М.: Наука, 1980. — С. 307–308.

Штильмарк Ф.Р. Основные черты экологии мышевидных грызунов в кедровых лесах Западного Саяна // Фауна кедровых лесов Сибири и ее использование. — М.: Наука, 1965. — С. 5–53.

Шубин Н.Г. Очерки по экологии мышей Западной Сибири // Тр. Науч.-исслед. ин-та биологии и биофизики при Томском гос. ун-те. — Томск, 1972. — Т. 2. — С. 17–26.

Щербаков И.П. Лесные ресурсы Якутии, перспективы их использования и охраны // Любите и охраняйте природу Якутии. — Якутск: Кн. изд-во, 1967. — С. 127–138.

Щербаков И.П. Лесной покров Северо-Востока СССР. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1975. — 344 с.

Юдин Б.С. Экология бурозубок (род *Sorex*) Западной Сибири // Вопросы экологии, зоогеографии и систематики животных: Тр. Биол. ин-та. — Новосибирск, 1962. — Вып. 8. — С. 33–134.

Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири (определитель). — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1971. — 168 с.

Юдин Б.С. К систематике трансарктической бурозубки (*S. cinereus* Kerr., 1792) // Териология. — Новосибирск, 1972. — Т. 1. — С. 4–50.

Юдин Б.С. К характеристике трансарктической бурозубки (*S. cinereus* Kerr., 1792) Северо-Востока Сибири и Камчатки // Фауна Сибири. — Новосибирск, 1973. — Ч. 2. — С. 269–279.

Юдин Б.С. Зональные и ландшафтные группировки мелких млекопитающих (*Microtammalia*) Таймыра // Фауна и экология позвоночных Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. — С. 5–30.

Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. — 360 с.

Юдин Б.С., Галкина Л.И., Потапкина А.Ф. Млекопитающие Алтае-Саянской горной страны. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979. — 293 с.

Юдин Б.С., Кривошеев В.Г., Беляев В.Г. Мелкие млекопитающие севера Дальнего Востока. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1976. — 288 с.

Юдин Б.С., Потапкина А.Ф. Территориальные группировки мелких млекопитающих (*Microtammalia*) в Кузнецком Алатау и Западном Саяне // Фауна и систематика позвоночных Сибири. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. — С. 32–59.

Юдин Б.С., Швецов Ю.Г. “Млекопитающие Якутии”: рецензия // Изв. СО АН СССР. Сер. биол. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1972. — Вып. 3. — С. 145–146.

- Яковлев Ф.Г., Луковцев Ю.С., Охлопков И.М. Сообщества мелких млекопитающих основных типов экосистем Центрального Верхоянья // Экосистемы Севера: структура, адаптации, устойчивость: Материалы совещ. — Петрозаводск; М., 1995. — С. 142–148.
- Anderson I.L., Boonstra R. Some aspect of reproduction in the vole *Microtus townsendii* // Can. J. Zool. — 1979. — Vol. 57. — P. 18–24.
- Bergman C.M., Krebs C.J. Diet overlap of collared lemmings and tundra voles at Pearce-Point, Northwest Territories // Can. J. Zool. — 1993. — Vol. 71. — P. 1703–1709.
- Bondrup-Nielsen S., Ims R.A. Demography during a population crash of the wood lemming, *Myopus schisticolor* // Can. J. Zool. — 1988. — Vol. 66, N 11. — P. 2442–2448.
- Boonstra R., Krebs C.J. Viability of large- and small-sized adult in fluctuating vole population // Ecology. — 1979. — Vol. 60, N 3. — P. 867–873.
- Boostrom U., Hansson L. Small rodent communities on mires: implications for population performance in other habitats // Oikos. — 1981. — Vol. 37, N 2. — P. 216–224.
- Bujalska G. Regulation of female maturation in *Clethrionomys* species, with special reference to an island population of *C. glareolus* // Ann. Zool. Fenn. — 1985. — Vol. 22, N 3. — P. 331–342.
- Chitty D. Population processes in the vole and their relevance to general theory // Can. J. Zool. — 1960. — Vol. 38, N 1. — P. 99–133.
- Christian J.J., Davis D.E. Endocrine, behaviour and population // Science. — 1964. — N 146. — P. 1550–1560.
- Churchfield S., Nesterenko V.A., Shvarts E.A. Food niche overlap and ecological separation amongst six species of coexisting forest shrews (Insectivora: Soricidae) in the Russian Far East // J. Zool. — 1999. — Vol. 248. — P. 349–359.
- Churchfield S., Sheftel B.I. Food niche overlap and ecological separation in a multispecies community of shrews in the Siberian taiga // Journ. of Zool. — 1994. — Vol. 234. — P. 105–124.
- Dickman C.R. Body size, prey size and community structure in insectivorous mammals // Ecology. — 1989. — Vol. 69. — P. 569–580.
- Frank F. Verschiedung des Geschlechtsverhältnisses in der Wühlmaus-gruppe (Microtidae) // Naturwissenschaften. — 1966. — Bd 53, N 3. — S. 90.
- Fredga K., Gropp A., Winking H., Frank F. Fertile XX- and XV-type females in the wood lemming *Myopus schisticolor* // Nature. — 1976. — Vol. 261, N 5557. — P. 225–227.
- Fredga K., Gropp A., Winking H., Frank F. A hypothesis explaining the exceptional sex ratio in the wood lemming (*Myopus schisticolor*) // Hereditas. — 1977. — Vol. 85, N 1. — P. 101–104.
- Fuller W.A. *Clethrionomys gapperi*: is there a peak syndrome? // Ann. Zool. Fenn. — 1985. — Vol. 22, N 3. — P. 243–255.
- Griddle S. The carnivorous habits of shrews // Can. Field-Nature. — 1973. — Vol. 87, N 1. — P. 69–70.
- Haken A.E., Batzly G.O. Effects of availability of food and diets of prairie voles (*M. ochogaster*) // J. Mammals. — 1996. — Vol. 77, N 2. — P. 315–324.
- Hansson L. Size dimorphism in Microtine populations — characteristics of growth and selection against large-sized individuals // Journ. of mammology. — 1995. — Vol. 76. — P. 867–872.
- Huck U.W., Pratt N.C., Labov J.B., Lisk R.D. Effects of age and parity on litter size and offspring sex ratio in golden hamsters (*Mesocricetus auratus*) // J. Reprod. and Fert. — 1988. — Vol. 83, N 1. — P. 209–214.

- Ilmen M., Lahti S. Reproduction, growth and behaviour in the captive Wood lemming, *Myopus schisticolor* // Ann. Zool. Fenn. — 1968. — Vol. 5, N 2. — P. 207–219.
- Innes D.G.L., Millar J.S. Factors affecting litter size in *Clethrionomys gapperi* // Ann. Zool. Fenn. — 1993. — Vol. 30. — P. 239–245.
- Inoue T., Maekawa K. Difference in diets between 2 species of *Soricini* shrews, *Sorex unguiculatus* and *S. caecutiens* // Acta theriologica. — 1990. — Vol. 35. — P. 253–260.
- Kalela O. Regulation of reproduction rate in subarctic populations of the vole *Clethrionomys rufocanus* // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A. — 1957. — Vol. 4. — P. 7–60.
- Kalela O., Oksala T. Sex ratio in wood lemming *Myopus schisticolor* (Lill.) in nature and captivity // Ann. Tuk. Ser. Au. — 1966. — Vol. 37. — P. 5–24.
- Krebs C.J. The lemming cycle at Baker Lake, Northwest Territories during 1959–1962 // Arct. Inst. N. Amer., Techn.; Pop. 15. — 1964. — 104 p.
- Krebs C.J., Myers J.U. Population cycles in small mammals // Adv. Ecol. Res. — 1974. — Vol. 8. — P. 267–399.
- Lofgren O. Niche expansion and increased maturation rate of *Cl. glareolus* in the absence of competitors // J. Mammol. — 1995. — Vol. 76, N 4. — P. 1100–1112.
- Lofgren O., Horufeld B., Enclaus U. Effect of supplemental food on a cyclic *Cl. glareolus* population at peak density // Acta teriol. — 1963. — Vol. 41, N 4. — P. 383–384.
- Ostfield R.S., Canham C.D., Pugh S.R. Intrinsic density dependent regulation of vole populations // Nature. — 1993. — Vol. 366. — P. 259–261.
- Pankakoski E. The cone trap — a useful tool for index trapping of small mammals // Ann. Zool. Fenn. — 1975. — Vol. 16, N 2. — P. 144–150.
- Pernetta J.C. Anatomical and behavioural specialisation of shrews in relation their diet // Can. J. Zool. — 1977. — Vol. 55, N 9. — P. 1442–1453.
- Puceck Z. Sexual maturation and variability of the reproductive system in young shrews (*Sorex L.*) in the first calendar year of life // Acta theriol. — 1960. — Vol. 3, N 12. — P. 269–296.
- Redfield J.A., Taitt M.J., Krebs C.J. Experimental alteration of sex ratios in population of *Microtus townsendii*, a field vole // Can. J. Zool. — 1978. — Vol. 56, N 1. — P. 17–27.
- Saarikko J. Foraging behaviour of shrews // Ann. Zool. Fenn. — 1989. — Vol. 26. — P. 411–423.
- Saitoh T. Control of female maturation in high density populations of the red-backed vole, *Clethrionomys rufocanus* *Bedfordiae* // J. Anim. Ecol. — 1981. — Vol. 50. — P. 79–87.
- Saitoh T., Stenseth N., Briorstad O. Density dependence in fluctuating grey-sided vole populations // J. Anim. Ecol. — 1997. — Vol. 66, N 1. — P. 14–24.
- Schaffer W.M., Tamarin R.H. Changing reproductive rates and population cycles in lemmings and voles // Evolution. — 1973. — Vol. 27, N. 5. — P. 111–124.
- Skaren U. Zur Fortpflanzungsbiologie des Walddlemmings // Arch. Soc. Zool. Bot. Fennicae "Vanamo". — 1963. — Vol. 18. — S. 17–28.
- Stenseth N.G. Is the female biased sex ratio in wood lemming *Myopus schisticolor* maintained by cyclic inbreeding? // Oikos. — 1978. — Vol. 30, N 1. — P. 83–89.
- Sutton G., Hamilton W. The mammals of Southampton Island // Mem. Carneg. Mus. — 1932. — Vol. 16. — P. 117.
- Terekhina A.N. Body size growth at the peak years of the population number increase // Dev. Ecol. Perspect. 21-st Cent. 5-th Int. Congr. Ecol. Yokohama, Aug. 23–30 1990. — Yokohama, 1990. — P. 338.

Turner B., Perrin M., Jverson S. Winter coexistence of voles in spruce forest: relevance of seasonal changes in aggression // Can. J. Zool. — 1975. — Vol. 53, N 8. — P. 1004–1011.

Viitala J. The red vole, *Clethrionomys rutilus* (Pall.), as a subordinate member of the rodent community at Kilpisjärvi, Finnish Lapland // Acta Zool. Fenn. — 1985. — Vol. 172. — P. 67–70.

Wammes D. Interspecific concurrentie bij vier soorten knaagdieren // Lutra. — 1981. — Vol. 24, N 1. — P. 7–22.

Whitaker J., French T. Foods of six species of sympatric shrews from New Brunswick // Can. J. Zool. — 1984. — Vol. 62, N 4. — P. 622–626

Zubaid A., Gorman M.L. The diet of wood mice *Apodemus sylvaticus* living in a sand duna habitat in North East Scotland // Journ. Zool. — 1991. — Vol. 225. — P. 227–232.

Научное издание

Вольперт Яков Лейзерович

Шадрина Елена Георгиевна

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРИ

Редактор Л.В. Филиппова

Художественный редактор Л.В. Матвеева

Художник И.В. Романова

Технический редактор Н.М. Остроумова

Корректоры С.М. Позудина, И.Л. Мальшева

Оператор электронной верстки В.М. Ульянин

Изд. лиц. № 020297 от 23.06.97. Слано в набор 07.06.02. Подписано в печать 14.08.02. Бумага офсетная. Формат 60×90 1/16. Офсетная печать. Гарнитура Times ET. Усл. печ. л. 15,5. Уч.-изд. л. 15,3. Тираж 300 экз. Заказ № 730.

Сибирская издательская фирма "Наука" РАН.

630099, Новосибирск, ул. Советская, 18.

СП "Наука" РАН. 630077, Новосибирск, ул. Станиславского, 25.