**LAS ESPECIES MINERALES DE LA SIERRA DE
GUANAJUATO,**

por el Dr. Ernest Wittich.

(Lám. LXIV).

La Sierra de Guanajuato, que fué en otro tiempo la montaña más rica en plata de todo el mundo, ha proporcionado gran número de especies minerales obtenidas por los trabajos mineros ejecutados en el curso de casi 350 años. Como se comprende, las más numerosas son las especies minerales de plata, pues solamente al fin del siglo XVIII y en el curso del XIX, cuando las minas alcanzaron mayor profundidad, pudieron descubrirse otras especies minerales como son la datolita, las apofilitas de El Refugio, cerca de La Luz, y otras más. Al mismo tiempo se labraron minas en otras vetas metalíferas de cobre, de bismuto, de cinabrio, etc., y se encontraron entonces más especies minerales. Además, las rocas cristalinas de la Sierra y los criaderos metalíferos de origen secundario, como son los placeres en los arroyos de las montañas, suministraron también especies minerales.

Por su manera de yacimiento, las especies minerales de la Sierra de Guanajuato se pueden dividir en los grupos siguientes:

- I. Minerales de las rocas cristalinas.
- II. Minerales de los aluviones.
- III. Minerales de las vetas y criaderos metalíferos.
- IV. Minerales depositados por los manantiales termales.

I. Al primero de estos grupos pertenecen los minerales de las dioritas y gabbros, rhyolitas, tobas rhyolíticas, basalto, toba basáltica, y de los granitos y pegmatitas del rancho Harpers al Oeste de La Luz; aunque esta última localidad no pertenece propiamente á la Sierra de Guanajuato.

II. En la parte septentrional y oriental de la Sierra los aluviones se encuentran esencialmente en la zona de las rhyolitas. Son formaciones de la época diluvial y aluvial que se hallan en los valles como terrazas fluviales. Sus minerales principales son, en primer lugar oro, en pocos puntos hacia el Este, y en segundo lugar

estaño de acarreo que se halla en abundancia en toda la región de rhyolitas y que se extrae de casi todos los arroyos. Parece que junto con el mineral de estaño se encuentra también topacio.

III. Estos criaderos, ricos en especies minerales, se pueden subdividir de la manera siguiente:

III a. Las vetas de cuarzo y espato calizo con minerales de plata. A estos pertenecen las célebres vetas de Guanajuato, como son: la Veta Madre, la Veta de La Luz, la Veta de Sta. Rosa en el Norte, y otras vetas numerosas que son metalíferas y paralelas á las anteriores. A pesar de la semejanza que tienen unas con otras, se diferencian á menudo estas vetas en sus secciones, por su contenido de especies minerales. Además de los minerales de la matriz se encuentran como principales los de plata, y en segundo lugar los sulfuros de fierro, plomo, zinc, etc.; también silicatos como son datolita, valencianita, apofilita, etc. En cambio son raras las combinaciones haloideas. En las minas de la Veta Madre, como en Valenciana, Cata, Mellado, Rayas y en otras, se hallan también con frecuencia dolomita y siderita, así como óxidos de manganeso.

III b. Mucho más escasas que las anteriores son las vetas de cobre y de pyrita. En una sola veta he encontrado minerales de cobre como substancia dominante (en la mina de Santa Fe de Esperanza, y también en la mina El Cedro, antes San Bruno). Allí se encuentra bornita, chalcopyrita, fahlerz, etc. Esta veta es transversal á las vetas principales: es N. 70° Este.

III c. La pyrita se haya como especie mineral dominante al N. de la Veta Madre en las pizarras, junta con marcasita y como accesorios se encuentran la chalcopyrita y la galena. Forman anchas capas en las pizarras y están atravesadas muchas veces por vetas de cuarzo más modernas. Son criaderos estratificados en el sentido de Stelzner-Bergeat, con extensión horizontal bastante grande.

III d. Otra subdivisión forman los minerales de una veta de bismuto que se halla en el límite Norte de la Sierra en la rhyolita. El mineral más importante en ella es el seleniuro de bismuto, guanajuatita, acompañado de misspickel, molybdenita y pyrita, y la matriz está formada por el cuarzo, el espato fluor y la baritina. Las vetas de esta localidad fueron en otro tiempo objeto de trabajos mineros (mina Sta. Catarina, cerca del Rancho Calvillo, Distrito de Sta. Rosa).

III e. La última sección de vetas con sulfuros metálicos la constituyen las vetas de cinabrio del Cerro Gigante, que se halla casi en

el límite Noroeste de la Sierra. Las especies minerales son: cinabrio, pirita, hematita y cuarzo como matriz. Estas vetas se encuentran en las tobas basálticas del Cerro Gigante.

III f. Las vetas y capas de las cuales tratamos en este párrafo, contienen solamente óxidos, principalmente hematita y casiterita, con pequeñas cantidades de tungsteno. Todas estas vetas pertenecen á la formación de rhyolitas. Estas vetas llegan á su desarrollo principal, solamente fuera de la Sierra de Guanajuato y hacia el Norte. Cuando las tobas contienen metales, entonces resultan especies de mantos ó capas irregulares con extensión horizontal bastante grande.

III g. Por último, se encuentran todavía numerosas especies minerales en dos criaderos de metamorfismo de contacto, cerca del Rancho Harperos. Los criaderos de contacto se presentan en pizarras que contienen cal; sus minerales son: silicatos de cal, como grossularia, alabandina, wollastonita, epidota, y minerales metalíferos: chalcopirita, galena, blenda, arsenopyrita y pirita.

IV. En los depósitos formados por manantiales están comprendidos los de los geysers de Comanjilla y los de manantiales termales sulfurosos, cerca de Silao (Aguas buenas); así como los ónix que se hallan en una brecha de diabasa en el valle de Sta. Ana.

Los manantiales termales sulfurosos han depositado azufre, alumbre, calcedonia, pirita, hematita y otras más substancias. Cerca de Sta. Rosa, al Norte de la ciudad de Guanajuato, se halla un pequeño manantial sulfuroso en el cual, hasta ahora, no he encontrado ninguna especie mineral notable.

Seguramente existen en la Sierra aún más manantiales sulfurosos, y varias especies minerales serán encontradas en los depósitos formados por esas aguas.

Sin duda la mayor parte de las vetas antes mencionadas son depósitos de aguas minerales; pero su formación es intratelúrica, de aguas juveniles, y por lo tanto deben ser separadas de los depósitos superficiales de los manantiales.

RESUMEN DE LAS ESPECIES MINERALES.

I.—ELEMENTOS.

1. *Oro. Au.*—Raras veces se halla oro nativo diseminado en el cuarzo, con hematita, en las minas: San Nicolás del Monte, Rayas, Mexiamora, Joya y La Luz. Con seleniuro de plata en la mina San-

to Niño, cerca de Nayal, Peregrina. Sobre pyrargyrita en Bolañitos, cerca de la Luz.

Como oro de placeres se halla en el riachuelo del Cubo, en las llamadas Playas; y también en el Arroyo del Monte abajo de la mina San Nicolás del Monte.

2. *Plata. Ag.*—Se halla más frecuentemente que el oro. En alambres, como revestimiento, en cristales disformes, á veces también como pegadura. Minas: Valenciana, Rayas, Nopal, Nayal, Caliche, Tajo de Dolores y otras más.

3. *Mercurio. Hg.*—Se encuentra en vetas de cinabrio, al pie del Cerro Gigante y al pie del Cerro de la Cabra; además se halla con cinabrio y pyrita en una veta de cuarzo en la mina Mexiamora.

4. *Cobre. Cu.*—En 1873 se halló en forma de alambre con malaquita en una veta de espato calizo en el conglomerado rojo, en un pozo, al pie del cerro del Cuarto en Guanajuato.

5. *Estaño. Sn.*—En la veta de bismuto de Rancho Calvillo, mina Santa Catarina, ahora "La Industria," fué descubierto estaño por Frenzel, en forma de pequeñas planchitas. (Frenzel, Mineralogisches. Neues Jahrb. Min. 1874 p. 679).

6. *Azúfre. S.*—Como depósito de los geysers de Comanjilla. Forma costras delgadas de color amarillo alrededor de la orilla de los manantiales.

II.—TELURUROS, SULFUROS, ETC.

7. *Telururo de oro.*—Según informes del Sr. Ing. Ponciano Aguilar, este mineral se halló como curiosidad en la mina El Nayal. Menos segura es la existencia del siguiente mineral de Teluro.

8. *Joseíta. Bi₃Te.*—En algunos ejemplares que se hallan en la colección del Colegio del Estado. Según se dice, proviene de la mina de bismuto de Santa Catarina, cerca de Calvillo.

9. *Argentita. Ag₂S.*—Es el mineral de plata más importante de la sierra. Se encuentra casi en todas las vetas, aunque en las más veces amorfo y diseminado en la matriz. Con mayor frecuencia y en buenos cristales se halla en la Veta Madre, principalmente en las cuatro minas principales: Valenciana, Cata, Mellado y Rayas. En los cristales predominan $\infty O \infty$ y también ∞O y O . Otras caras son raras, como $2 O 2$ y $m O m$.

Formas de esta especie ($\infty O \infty$ y $m O m$) se encontraron en la mina Rayas en cristales de 16 mm. de largo. Cristales $\infty O \infty$ de 3

cm. de longitud en las aristas de los cristales provinieron de la mina Cata.

Sencillos ∞ O sobre dolomitas, mina Mellado. Cristales medianos ∞ O ∞ y O de la mina Valenciana. Con polybasita del Tiro Tepexac cerca de la Valenciana. O y ∞ O ∞ de la mina El Nopal (en vetas de caliza), mina Santa Isabel cerca de Santa Rosa; además en Bolañitos, cerca de La Luz, así como en la misma Veta de la Luz; en pequeños cristales como relleno, respectivamente pseudomorfo-seando hacia espato calizo R 3 en la mina La Joya. Con cuarzo, calcedonia, pirita y malaquita en la mina Rayas. Además en las minas Peregrina, El Cedro, San Rafael; y en la Veta de La Luz, en Mexiamora, San Cayetano, Ovejera, San Pedro Gilmomene, Santo Niño, Jesús María, Los Locos, Santa Clara, San José de los muchachos. En Pingüico O ∞ , O, ∞ O, y m O m en Tajo de Dolores. Además las minas La Oscura, Guadalupe Mineral de la Fragua.

Como pseudomorfosis de espato calizo R 3 y $\frac{1}{2}$ R en la mina Cata.

9ª *Acantita*. Ag_2S .—Según G. von Rath Verhdlg. nat. Ver. Bonn p. 100 1884. El lugar de procedencia no está indicado con exactitud.

10. *Seleniuro de plata*. (Ag_2Pb) Se. *Naumannita*.—Descubierto en 1873 por Vic. Fernández y S. Navia en El Nayal.

Ordinariamente amorfo, raras veces en cristales ∞ O ∞ , pero las más veces es aurífero, mina Nopal. Bonanza 1873 en El Nayal, Peregrina, Santo Niño al Este de Guanajuato, Flores de María cerca de Mellado, mina Rayas en la veta de cuarzo de la Veta Madre, también con oro nativo, mina los canales cerca de Villalpando.

11. *Aguilarita*. $Ag_2(SeS)$.—Según Genth contiene este mineral también Cu y Sb. Pequeñas agujas y alambres dieron:

Ag.	80.27 %
S.	6.75 „
Se.	13.75 „
Cu.	0.07 „
Sb.	0.41 „
Fe.	0.26 „

Este mineral fué descubierto en las vetas paralelas al Norte de la Veta Madre. Se halla las más veces en esqueletos de cristales con aristas de ∞ O. El descubrimiento se hizo en las calizas de la mina San Carlos, en 1890. El Sr. Ing. Ponciano Aguilar, en cuyo honor

se dió su nombre á este mineral, posee muestras con cristales perfectos $\infty 0$ hasta del tamaño de 5 mm.

Se halla también en esqueletos de dodecaedro rombal en la mina Las Flores de María, cerca de Mellado. Con polybasita y pyrrargyrita en San Cayetano, Mineral Ovejera, Mina El Capulín, cerca de Villalpando al Noroeste de Guanajuato.

12. *Chalcosita*. $Cu_2 S$.—En partes amorfo en la veta de la mina Santa Fe de Esperanza, arriba de la mina Cedro. Esta mina se conoce hoy con el nombre El Sulfato.

13. *Cinabrio*. $Hg S$.—Se encontró con pyrita y mercurio en una veta de cuarzo de la mina Mexiamora, cerca de La Luz 1878. (Colección del Colegio).

También se halló en la veta de ópalo, mina Purísima cerca del lugar donde se encontró la anterior. (Colección del Colegio, Guanajuato).

Más frecuentemente se halla en la falda oriental del cerro Gigante, donde anteriormente fué explotado por mineros, en las minas San Nicolás, Almadén y otras. Allí se encuentra en vetas de cuarzo en la toba de basalto, así como en tobas de rhyolita. Se explotó en 1875 en la mina La Esperanza. Más abundante se halla al Norte del cerro del Gigante hasta San Felipe, así como hacia Rincón de Ortega. Este último punto está fuera de la sierra de Guanajuato. Las vetas contienen calcedonia, esteatita, etc., con impregnación de $Hg S$. De este último hay solamente 4% en la veta.

14. *Galena*. $Pb S$.—En pequeñas cantidades con argentita y chalcopyrita en las minas Mellado y Valenciana de la Veta Madre. Con blenda amarilla, mina Guadalupe, cerca de Santa Rosa, al Norte de Guanajuato. Con blenda también en la mina Rayas. (Colección del Sr. L. Laux).

En cristales pequeños se le encuentra en la mina Pingüico, con pyrita, argentita y polybasita.

Más frecuentemente se halla en pequeños cristales $\infty 0 \infty$, con pyrita y marcasita, en la mina San José de los Graceros, al Norte de Mellado, en una veta de pyrita.

En muchas minas del distrito, La Luz, Ovejera, Jesús María, La Providencia, Los Locos, etc

En los criaderos de contacto del Rancho Harperos se halla con molybdenita, blenda, misspickel y pyrita en la mina abandonada San Pablo.

15. *Blenda. Zn S.*—Asociada al mineral anterior se halla en las minas Mellado, Valenciana y Guadalupe, lo mismo en la mina Rayas, pero con chalcopirita y blenda parda. En la misma mina se halló hace cosa de 30 años en una veta de cuarzo que fué muy rica en oro. Se halla también en la mina San Pablo, cerca de Harperos, en el contacto con la caliza (Véase el mineral anterior).

16. *Molybdenita. Mo S₂.*—Un hilo rico en molybdenita, se halló en la mina El Nopal. Con pirita y fluorita se encuentra en las hendeduras de las rocas de la mina de bismuto, La Industrial, cerca de Santa Rosa, así como en pequeños nidos en la esteatita. Según Aguilera también en la mina Santa Inés.

17. *Pyrita. Fe S₂.* (De los mineros llamado bronce).—Muy extendida en toda la sierra; es el mineral metalífero más abundante en las vetas. En las vetas de pirita del grupo III c, es casi el único mineral metalífero, pero probablemente mezclado con marcasita. Vetas de esta clase se hallan en la barranca de Jolula, y en otras partes al Norte de la Veta Madre. Todas están en las pizarras, con inclinación al W. y tienen menos echado que la Veta Madre.

Varias veces se emprendieron, en tiempos anteriores, pequeños trabajos en estas vetas, porque contienen siempre alguna ley de plata. Minas de esta clase son la Santa Gertrudis, cerca de Santa Ana, San José de los Graceros, etc. Estas vetas están mejor desarrolladas al pie del cerro de la Gloria, cerca de Mellado.

En cristales $\infty 0 \infty$, así como $\frac{\infty 0 m}{2}$ se halla en la mina Rayas. Muchas veces impregna á la roca de los respaldos de la veta, pizarra, conglomerado rojo, rhyolita y andesita.

Se encuentran también en los criaderos de contacto cerca de Harperos y es muy escasa en las pegmatitas de la misma localidad.

18. *Marcasita. Fe S₂.*—La segunda modificación de Fe S₂ es un poco más rara que la pirita y se le encuentra en hermosas formas de estructura, así como "Speer kies" legítimo, en la mina Cata y Sechó. En grupos de cristales dendríticos, parecidos á las espigas de cobre de Frankenberg, en la mina Sirena. Allí también está en estalactitas. En pequeños cristales en el cuarzo de la Veta Madre, de S. Eligio, más arriba de la Sirena. Con yeso, en la mina San Cayetano, Mineral Ovejera. En hojitas cristalizadas sobre dolomita y cuarzo, en la mina Sagrado Corazón de Jesús, cerca de Cata. Junta con pirita, en la mina Santa Gertrudis, cerca de Santa Ana.

19. *Misspickel, Arsenopyrita. Fe As S.*—Se le encuentra en pequeños cristales en la veta de Guanajuatita de la mina La Indus-

tria, cerca del rancho Calvillo. En el criadero de contacto cerca de Harperos, con pyrita, blenda, chalcopirita, etc. Según dicen, se halla también en la mina Rosita, al E. del Carmen. En el rancho Duarto, cerca de Silao, se encuentra la arsenopyrita en mayor extensión, pero únicamente en pequeñas cantidades.

20. *Bornita*. $3 Cu_2 S. Fe_2 S_3$. Cobre abigarrado. — Se encuentra amorfo en la veta de mineral de cobre de la mina Fe de Esperanza, cerca de El Cedro 1890 (antes San Bruno). En la rhyolita del cerro El Guapillo, al Norte de Guanajuato.

21. *Chalcopirita*. $Cu Fe S_2$. — Muy frecuente, pero solamente en pequeñas cantidades y raras veces en cristales. En mayores cantidades se halla amorfa en la mina La Esperanza, cerca de El Cedro. En pequeños cristales sobre cuarzo con pyrita, mina Mexiamora, cerca de La Luz y en La Luz, Tiro Tepeyac y Tiro General cerca de Valenciana; en la rhyolita del Tiro Humboldt, cerca de Calderones. Con pyrargyrita en la mina La Luz. Junto con pyrita sobre polybasitas, en la mina Sirena, Tajo de Dolores, Pingüico. En el criadero de contacto cerca de Harperos con molybdenita, blenda y con la especie mineral siguiente:

22. *Pyrrotita*. $Fe_7 S_8$. — Amorfa en los criaderos de contacto, cerca del rancho Harperos. Véase núm. 21.

23. *Antimonita Stibnita*. $Sb_2 S_3$. — En largos cristales lameliformes, frecuentemente con costra de cervantita, en la mina Siglo XX, de la Compañía Inglesa, más abajo de Santa Ana; mina San Pedro cerca de La Luz. Además en una veta en la falda Noroeste del Cerro Prieto.

24. *Guanajuatita*. $Bi_2 Se_3 (S)$ (según Mallet). — De composición variable; (probablemente no se le analizó casi nunca este material en estado perfectamente puro); otros análisis dan la siguiente fórmula: $4 Bi_2 Se_3 + Bi_2 S_3$.

Dos análisis cuantitativos dieron por resultado:

Bi=77.54—68.86%

Se= 8.80—25.50%

S=14.06— 4.68%

100.40—99.04

Peso específico 6.3—6.977.

En cristales rómbicos y amorfo; isomorfo con stibnita. Las formas observadas son: $\infty P\infty$, $\infty \bar{P}\infty$, Pm, P casi 90° mina La In-

dustrial, cerca del rancho Calvillo; al Norte de Guanajuato se hallan vetas en rhyolita con galapectita, pyrita, molybdenita, fluorita, baritina y otros minerales de bismuto que todavía están poco estudiados. En tiempos anteriores fué objeto de trabajos mineros.

En cuanto á la nomenclatura se ha dicho, que el primer descubridor, el Prof. Fernández describió este mineral en 1873 con el nombre que tiene hoy; y más tarde fué descrito como Fernandita, Castillita y Frenzelita.

La Silaonita, un mineral de la misma mina, es según Bruns, Guanajuatita mezclada con bismuto.

III. SULFO-SALES.

25. *Pyrargyrita*. $Ag_3 Sb S_3 = 3 Ag_2 S. Sb_2 S_3$.—Ruby Silver, Rosicler obscuro. Es el mineral de plata más frecuente y después de la argentita el más importante de la Sierra. Se halla á menudo en cristales grandes y bien formados ó amorfo y diseminado en la matriz; en este último caso se llama petanque. Se encuentra en casi todas las minas, pero las más veces en las vetas de La Luz; es menos frecuente en la Veta Madre y en las minas de la región oriental.

De la mina San Pedro y San Pablo, Veta Bolañitos, cerca de La Luz, se han obtenido cristales transparentes hasta de 6 cm. de largo, por 3 cm. de diámetro. Las formas principales son ∞R , $2, \infty R$, $-\frac{1}{2} R$, oR , con una serie de caras estriadas angostas. (El propietario de estos cristales es el Sr. Ricardo Rubio, de Guanajuato).

Pyrargyrita con estefanita y polybasita se encuentra en La Luz. En Bolañitos con espato calizo y lo mismo en La Purísima, con dolomita, mina San Pedro, cerca de la Luz. La Pyrargyrita se halla también en las minas Sta. Lucía, Sta. Clara, San Pedro y Pabellón, todas cerca de La Luz. Con polybasita en la Joya y Puertecito; con chalcopyrita en la mina El Nayal. Mina Marciélagu, cerca de la Valenciana. La Soledad, cerca de Sta. Ana. Poco en el Pingüico y diferentes otras.

26. *Proustita*. $Ag_3 As S_3 = 3 Ag_2 S. As_2 S_3$.—Este mineral se halla mucho menos frecuentemente que el anterior. Sus cristales son pequeños. El color es más claro que el del anterior. Caras principales según R , $-\frac{1}{2} R$ en Villalpando; con romboedros puntiagudos en la mina El Capulín. Según se dice, también hay en la Peregrina; los análisis del metal concentrado de allí, dan por resultado: Ag 820,6 onz. As 3,0% por tonelada y Sb 0,1%.

27. *Polybasita*. $9Ag_2S \cdot Sb_2S_3$ con mezcla de As, Cu etc.—Un ensaye del mineral muy limpio de la mina Sta. Lucía, Gto., dió, según Prior, l. c. lo siguiente:

Ag=68.39%

Cu= 5.13,,

Sb=10.64,,

As= 0.50,,

S=15.43,,

Después de la pyrargyrita, ésta es el sulfoantimoniato que se halla más frecuentemente.

Siempre en cristales macleados, exagonal y al parecer las bases son romboedros. En el mayor número de casos, las bases muestran los macles en grupos de cristales. Muchas veces se halla revestida de costras de pyrita y chalcopryrita. Se encuentra en casi todas las vetas más grandes: Mina Valenciana, La Cebada, cerca de Sta. Ana, La Aldana, Mina Sirena, Tajo de Dolores, cerca de Villalpando, El Pingüico, La Luz (con stephanita), y en la Ovejera (según Aguilera). Cristales hasta el tamaño de 3 cm., con oro nativo, en la mina El Nopal. En San Cayetano, con plata nativa. En Tiro Tepeyac, cerca de la Valenciana, con argentita.

28. *Stephanita*. $Ag_5SbS_4=5Ag_2S \cdot Sb_2S_3$. Plata agria.—Cristales de forma prismática, las más veces de muchas caras. Predominan prismas, domos y P. Cristales hasta 3 cm. de tamaño. Frecuentemente macleados.

Se halla con polybasita en La Luz y Jesús María, también con costras de chalcopryrita. Con pyrargyrita en El Nopal, Mina Valenciana, Rayas y San Carlos.

29. *Miargyrita*. $Ag_2S \cdot Sb_2S_3$. Rosicler semiprismático.—Es el más escaso de los Sulfoantimonitos. La colección del Colegio posee dos muestras, una con cristales pequeños y una segunda amorfa; las dos de la Mina Sirena.

30. *Tetraedrita* var. *Freibergita*. $4(CuAgS) \cdot Sb_2S_3$.—Tetraedrita argentífera. Amorfa y en $\frac{0}{2}$ pequeños, con pyrita y fluorita, Mina Rayas. Amorfa con bornita y chalcopryrita; Mina Esperanza, Sulfato cerca de El Cedro. La variedad que contiene plata y zinc con pyrita, Tiro Arcángeles, cerca de La Luz.

IV. OXIDOS.

31. *Cuarzo*. SiO_2 .—Es el mineral más frecuente y forma con el espato calizo la maza principal de casi todas las vetas. Muchas ve-

ces se halla en cristales bien desarrollados, que entonces son conocidos con el nombre "chichicles." Además del cristal de roca puro, es frecuente la ametista; raro el topacio ahumado. La forma de los cristales es las más veces R y $-R$; en algunas vetas predomina la forma trigonal; el cristal de roca de la veta de bismuto cerca de Calvillo, como el de las vetas de pegmatita (de Harperos), muestra muy frecuentemente caras del tetartoedro. Las inclusiones líquidas son frecuentes en el cristal de roca de Sta. Rosa y en el de las vetas del conglomerado rojo. En las vetas, el cuarzo es casi siempre el mineral más reciente, el cual ha formado pseudomorfosis del espato calizo más antiguo. De las localidades en que se halla, mencionaremos sólo algunas. Ametista con apophyllita, mina El Refugio, cerca de La Luz. Vetas de ametista mina La Luz y en el pueblo Mellado, cerca de la Veta madre; con cristales de stilbita, en la mina La Cebada, cerca de Sta. Ana. Cristales hasta 25 cm. de largo, con inclusiones líquidas, en la mina Los Reyes, cerca de Sta. Rosa. (Colección Lanx). Cristales con $16 R-R$ Tiro Tepeyac, cerca de la Valenciana; también de Bolañitos cerca de La Luz.

Cristales en que predomina la forma trigonal $\infty \frac{R}{2}$ y $\frac{R}{2}$ con los negativos $\frac{\infty R}{2}$ y $\frac{R}{2}$ hasta de 15 cm. de largo, de una veta en el conglomerado rojo, en el nuevo camino de Cata á Mellado; $\infty R-R$ de la Valenciana.

De las pseudomorfosis de calcita por cuarzo, mencionaremos formas de R , oR , $R 3, -\frac{1}{2} R$; así como en hojas de la variedad de calcita, que es conocida con el nombre de "papier-spat" de la mina Valenciana; de calcita R_3 de las minas Fraustos y Mellado. Formas trigonales con huecos é inclusiones líquidas de la veta de bismuto, mina La Industrial, cerca del Rancho Calvillo. Cristales trapezoédricos de las vetas de pegmatita del Rancho Harperos. De pequeñas vetas de cuarzo en las aplito-dioritas, de las vetas en el Cerro Antimonio, arriba de Sta. Ana, cristales regulares y trigonales. Topacio ahumado se halla en las pegmatitas mencionadas de Harperos, cristales hasta 15 cm. de largo y 8 cm. y más de diámetro.

32. *Tridymita*. SiO_2 .—Cristales pequeños en las drúsas, en la rhyolita, con hematita. Rhyolitas de Sta. Rosa y de la Mesa de los Hernández al Noroeste de Guanajuato.

33. *Opalo*. $SiO_2 + ag$.—Opalo de diferentes variedades, como hyalita, ópalo de fuego, ópalo blanco, ópalo fino, etc., se halla muy extendido en la región de la rhyolita, al Norte y Oriente de Guanajuato. A veces se encuentran revestimientos opalinos en la Veta Madre;

ópalo blanco lechoso daba la mina La Candelaria, cerca de Cata. Opalo fino se halla como cosa muy rara en geodas de rhyolita, en el Rancho Quinteros (Colección del Colegio). En las mismas geodas, y en lo general en las tobas de rhyolita, se encuentra frecuentemente la hyalita. *Pseudomorfosis de calcita por hyalita* R_3 de la Mesa de los Hernández; también como costra, revistiendo la hematita; pseudomorfosis de calcita R_{16} del Rancho Calvillo (Colección Laux). Muestras muy hermosas se hallan cerca del Rancho Quinteros, Rosa de Castilla, Campuzanos; en el Cerro de Campana, cerca de Nayal; en el rancho El Rodeo, cerca de la hacienda Saucedá; en Sta. Rosa y en otros puntos. Hyalita se encuentra también frecuentemente en las tobas basálticas del Cerro Gigante. El ópalo de fuego, aunque con colores mates, en la toba de rhyolita, como ancha cinta, ó también como relleno de geodas en el Cerro El Capulín, cerca del Rancho Quinteros; también en el Cerro El Fraile y en la Mesa de Castillo.

34. *Calcedonia, Jaspe, Piedra córnea*. $SiO_2 + (SiO_2 + ag.)$ — Las diferentes variedades se encuentran frecuentemente como el mineral anterior. Se hallan con más frecuencia en los criaderos de plata p. e. la calcedonia en mina Cata, Rayas, Mellado, en la mina San Pedro Gilmomene, San Cayetano, etc. El Jaspe, principalmente el de cinta y el esférico frecuentemente en las geodas de la toba de rhyolita, cerca del rancho Calvillo, Sta. Rosa, Rosa de Castillo, Mesa de los Hernández. La piedra córnea se halla como depósito de manantiales. Los geysers de las Comanjillas, así como los manantiales sulfo-termales de Aguas Buenas, formaron anchas vetas de piedra córnea, que contienen pyritas. Con hematita micácea como cuarzo aventurino, en el criadero de estaño, Cerro Todos Santos, cerca de Campuzanos. Calcedonia con hyalita es también el medio de silificación de los pseudofósiles (*Palaeotrochis*) de Calvillo.

35. *Pyrolusita (Braunstein en parte Wad)* MnO_2 . — Se encuentra con frecuencia, pero nunca en cantidades considerables, en forma terrosa ó pulverulenta en la Veta Madre, desde la mina Valenciana hasta la Aparecida. Así en la mina Valenciana, como revestimiento sobre cuarzo y espato calizo, muchas veces con carácter de wad, en Cata, San Vicente, cerca de Rayas, Fraustos, cerca de Mellado. Se halla también en esta parte de la veta una serie de otros compuestos de Mn. que por lo demás faltan en la Sierra, sobre todo la rodonita. En mayores cantidades se encuentra la pyrolusita en la mina Peregrina, y limitada á los labrados orientales de la mina. Las

3 vetas de la mina están allí muy quebrantadas por dislocaciones y enteramente penetradas de arcilla y de pyrolusita terrosa; no he encontrado cristales de pyrolusita (Según Hobson se encontró aquí alabandita, pero no cabe duda que esa determinación del mineral era falsa).

36. *Psilomelano*. $Mn O$, $Ba O$, $Mn O_2$, H_2O .—Se halla con la anterior en Peregrina, en riñones pequeños. También sobre espato calizo en la Veta Madre, mina Valenciana, y en la mina San Vicente, cerca de Rayas. En la Sierra de Sta. Rosa, á veces en las vetas de fierro y estaño, como en el rancho de Sto. Domingo, en el Cerro de Todos Santos, cerca de la hacienda Saucedá.

37. *Cassiterita*, $Sn O_2$. (Ensayos, pág. 192).—Solamente en masas compactas. Criadero primario en vetas de hematita, con tungstatos, en la rhyolita y en forma de mantos, en las tobas de la misma. En yacimientos secundarios, en los terrados diluviales y recientes de los ríos de la región de la rhyolita, se halla como estaño de acarreo. Este último da en la Sierra de Guanajuato la masa principal de la cassiterita que se explota; pues raras veces se explotan las vetas irregulares y los mantos. En la mina del Cerro Jabalí, cerca del rancho Rincón y Estaño, se encuentra estaño en filones; también en la mina Cebolletas, cerca del rancho San Isidro de los Núñez, al Norte de Sta. Rosa. En la mina Garambullo del Cerro Estaño, al Sur de Pingüico, con Raspita. Veta en el Cerro Cuervo cerca del Rancho Tanderos. En el Rancho Enmedio al Noroeste de Santa Rosa. Masas compactas en el Rancho Tlachiquera, ya fuera de la Sierra de Guanajuato, en forma de riñones; también pseudomorfosis de marcasita. En la toba de rhyolita cerca de Sta. Rosa. Ya en la época de Humboldt fué conocida la cassiterita; Humboldt se llevó muestras de la falda del Cerro Gigante. Estaño de acarreo se encontró en la 5ª decena del siglo XIX en las barrancas, al pie de la Mesa de los Calzones.

38. *Oligisto ó hematita*, Fe_2O_3 .—Casi siempre se halla junta con la anterior. Forma la masa principal de las vetas de estaño. Se encuentra en el Cerro Todos Santos cerca del Rancho Campuzanos, en el Cerro el Fraile, Cerro Jabalí; los cristales son en su mayor número, pequeños romboedros lisos. Más raras son las formas prismáticas. Principalmente en las vetas de mineral de fierro de la Mesa de los Hernández, al Norte de Sta. Rosa, se hallaron cristales, predominando ∞R , con $O R$ y pequeños romboedros. Mac Kee (véase Lit.) describe cristales de esta localidad con 0001; 1010, 1122, 1128, 2241.

En cristales chicos Mina Rosita cerca de El Carmen, Rancho Los Núñez, cerca de Peregrina. En romboedros cerro El Maguey, cerca de la Hda. Saucedá. La hematita amorfa se encuentra muy extendida en el conglomerado rojo.

39. *Martita* $Fe_2 O_3$.—En pequeños octaedros, Mesa de los Hernández, al Norte de Santa Rosa.

40. *Limonita* $2 Fe_2 O_3, 3 H_2 O$.—Las más veces se halla como acompañante en las vetas ricas en hierro ó pirita, principalmente donde éstas atraviesan el conglomerado rojo, por ejemplo en la Veta del Amparo, Veta del Maguey y otras, cerca de Guanajuato. Con frecuencia se encuentra en la zona de "colorados" de las vetas. Como ocre de hierro en la mina Rosita, cerca de El Carmen. En la veta de bismuto, mina La Industrial, cerca de Rancho Calvillo. Se formó en muchas vetas por la descomposición de las pyritas y se halla en forma de incrustaciones más ó menos gruesas. Con pyrolusita en las labores de la parte oriental de la mina Peregrina.

V. CARBONATOS.

41. *Calcita*. $Ca CO_3$.—Con el cuarzo es el mineral que más abunda en los filones, principalmente en el sistema de vetas de La Luz y Veta Madre, menos frecuente en las vetas de la región de la rhyolita, al Oriente de la ciudad de Guanajuato. Las más veces es el mineral más antiguo de las vetas, pero parece que lo hay de varias generaciones. Muchas veces en grandes cristales de muchas caras, que varían según las diferentes localidades. Las formas de cristalización que más frecuentemente se hallan, son las siguientes:

$R, -\frac{1}{2} R$ (socavón), mina La Aparecida y en labores anteriores de Mellado.

+ $\frac{5}{4} R$,—mina Rayas.

$R, -\frac{1}{2} R$ o R —Mina Borrego, cerca de La Valenciana.

$-\frac{1}{2} R$, o R Mellado, Cata, frecuentemente maclas según o R .

En láminas delgadas, las más veces con basis grande y pequeños romboedros o $R, -\frac{1}{2} R$ que tienen el nombre de Papierspat. Valenciana y Cata; Mellado y Rayas. Grupos de cristales— $\frac{1}{2} R$ frecuentemente revestidos con dolomita, en la Valenciana.

16 $R, -\frac{1}{2} R$ Valenciana.

R — muy rara vez en Mellado, las más veces encostradas de dolomita y siderita.

Escalenoedros son más raros; $R3$ y $R3 R, -\frac{1}{2} R$ Mellado (cristales hasta 25 cm. de largo) (véase Lit. Bustamante). $R 3, -2 R$ mina El Nopal. $R 3, -2 R, R$, las caras que se encuentran en lugar de

las aristas—2 R y R son ligeramente teñidas de la pyrolusita, mientras que el cristal es casi claro como agua, de manera que tiene el aspecto de vidrio con aristas de color de la mina Cata (Colec. Laux). R₃ y escalenoedros lisos, muchas veces encostrados de dolomita, Rayas.

Una vez se encontró en pseudomorfosis como Apophylita $\infty P \infty$, P. o P, mina Rayas. Cristales— $\frac{1}{2}$ R de color amarillo de paja, mina La Aldana.

En las vetas del Distrito de La Luz predominan las formas escalenoédricas. R₃ clara como agua, mina Bolaños cerca de La Luz, lo mismo en El Refugio.

R 3 gemelos según o R, cristales hasta del tamaño de 30 cm. Mina Joya (según el Sr. Laux).

Muchas veces se hallan estos cristales alargados en una dirección, de manera que el cristal tiene una forma rómbica. Si estos cristales, además, se hallan como gemelos, según $-\frac{1}{2}$ R, entonces resultan formas que se parecen á los gemelos característicos de yeso. Parece que esta especie de formación de gemelos se encuentra solamente en Bolañitos, cerca de La Luz.

Además se hallan:

R₃ $\frac{1}{4}$ R₃; también R₃ gemelos según o R de Bolañitos.

4 R,—2 R cristales amarillos, La Luz.

$\frac{2}{5}$ R 2 frecuentemente con $-\frac{1}{2}$ R Mellado, La Luz y El Refugio.

16 R,— $\frac{1}{2}$ con vestigios de Mn CO₃ de color rojizo, mina Cinco Señores, cerca de La Luz.

R 5 con escalenoedros obtusos, las aristas siempre redondeadas, los cristales teñidos por óxido de manganeso, mina Santa Clara, cerca de La Luz.

R 3,— $\frac{1}{2}$ R, $\frac{1}{4}$ R 3 mina Jesús María, cerca de La Luz.

R 3,— $\frac{1}{2}$ R con aristas redondeadas, de La Luz.

Escalenoedros especiales, que parecen aplastados.

$-\frac{7}{5}$ R $\frac{3}{2}$ de Santa Clara.

Cristales R 5,— $\frac{1}{2}$ R₃ con caras terminales de cada lado, La Luz (Colección Laux).

Gemelos de cristales de R 3 según $\frac{1}{2}$ R crecidos sobre envero fósil, minas El Refugio y La Luz. (Col. Ponciano Aguilar).

Las formas que he medido yo con el goniómetro en las calizas de la Sierra de Guanajuato, son:

o R; $\frac{1}{4}$ R; $-\frac{1}{2}$ R, R,— $\frac{5}{4}$ R,—2 R, 4 R, 17 R, R, R 2, R 3, R 5, $\frac{2}{5}$ R 2,— $\frac{7}{5}$ R $\frac{3}{2}$, $\frac{4}{5}$ R 3.

Según Mügge se encontró también $\frac{1}{4} R n$ ($n=3$); Pirson describe gemelos de Bolañitos con R_3 , $-2 R$ y $1/5 R$ $11/3$.

Esta lista de las combinaciones de la calcita será completada por estudios especiales. Las minas en la región de la rhyolita, como Pingüico, Peregrina y otras, contienen poca caliza. Solamente en los criaderos de contacto de Harperos se halla frecuentemente en cristales en combinaciones simples y gemelos según R y o R .

42. *Dolomita*. (*Ca Mg*.) CO_3 . En la Veta madre es donde más se encuentra. Forma las más veces costras en $\frac{1}{2} R$ y R sobre caliza y cuarzo. Cristales ordinariamente encorvados. En posesión del Sr. L. Laux existe una muestra de la Valenciana con cristales de dolomita de más de un cm. de tamaño con ∞R , $2R$, $-\frac{1}{2} R$. Minas Valenciana, Tiro general y Guadalupe, Cata, Rayas, Mellado y Sirena en cristales regulares. Muchas veces también en pseudomorfo-sis de calcita. Estos cristales extraordinariamente hermosos, $-\frac{1}{2} R$ sobre espato calizo R_3 , daba la mina Sagrado Corazón de Jesús, cerca de Cata. En muestras de la Valenciana las generaciones minerales se hallaron muchas veces en el orden siguiente: primera generación caliza, después cuarzo y por encima espato calizo en R_3 ó en romboedros lisos; después dolomita en costras y ésta se halla cubierta de una multitud de hojitas de marcasita. En las minas de Cata y Tepeyac se halla á menudo el mismo orden de sucesión. Según Aguilera, hubo dolomita en la mina San Javier, Veta Nopal. Siempre pertenece la dolomita á la generación más moderna. De la misma manera se halla la dolomita también en La Luz. Con pyrrargyrita mina San Pedro, Distrito de La Luz, (Col. Instituto Geol. Nac.)

43. *Siderita*, *Fe C O_3*.—Cristales ordinariamente pequeños, muestran solamente R , es también más moderna que cuarzo y caliza. Mina Valenciana, Cata, Rayas.

44. *Rodochrosita*, *Mn CO_3*.—Bastante rara; se halla solamente en la parte ya mencionada de la Veta madre, en la cual se encuentra manganeso. Pequeños romboedros sobre calcedonia, mina Cata (Colección Laux); en la misma mina también en pequeños partidos cristalinos. Hojitas delgadas de cristales, mina Rayas, mina San Pedro, cerca de La Luz. R con o R mina Valenciana, Tiro Tepeyac.

Rodochrosita de color rosa (Himbeerspat) en escalenoedros con cuarzo y wad, Cerro Sirena, en venas de cuarzo en la toba de andesita.

45. *Aragonita*. CaCO_3 .—En la Veta madre, con frecuencia formando costras en forma de pequeños haces de cristales sobre el cuarzo en la mina Mellado, Cata.

La variedad conocida con el nombre de "Onyx," se halla también cementando una brecha de diabasa, con frecuencia en cintas verdes de un decímetro de ancho, al pie del Cerro Aldana, más abajo del Tajo de Ayuntas.

46. *Malaquita*. $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ se halla siempre junta con la siguiente:

47. *Azurita*. $\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$.—En pequeños cristalitos con cuarzo y tetraedrita, mina El Maguey, en el declive Sur del Cerro Sirena.

Mina San José de los Graceros, al Nordeste de Mellado, en el criadero estratificado de galena y pirita.

Con chalcopirita, bornita y freibergita en la vena de cobre, mina Esperanza (El Sulfato) cerca de Cedro. Mina Caliche cerca de Cata; además, mina Mellado. En el socavón Bernabé, cerca de La Luz, sobre argentita.

En el criadero de contacto cerca de Harperos, con chalcopirita, blenda, molybdenita, galena.

48. *Bismutospherita*. $\text{Bi}_2(\text{CO}_3)_3$.—Con guanajuatita, de la mina La Industrial, cerca del Rancho Calvillo; solamente en trozos macizos. Según Winkler contiene el mineral $\text{Bi} = 91.68\%$

$$\text{Co} = 8.29\%$$

según Frenzel $\text{Bi} = 90.1$; $\text{CO}_2 = 7.0$; $\text{H}_2\text{SO}_4 = 0.27$; Agua 1.80. Además de éstas se hallan aún otros compuestos de bismuto, pero sus componentes no están determinados con seguridad.

VI. SULFATOS, ETC.

49. *Barytina*. BaSO_4 .—Se halla con bastante rareza; en la Veta madre solamente en planchas pequeñas, mina Mellado y Cata.

Cristales más grandes y poco más frecuentes en la veta de bismuto de la mina Industrial cerca de Calvillo, juntos con fluorita. Los cristales son muy sencillos, muchas veces no más ∞P y 0P dominante.

50. *Celestita*. SrSO_4 .—Se encontró una sola vez. El ejemplar muestra prismas y cúpulas; cristales de hermoso color azul claro, con cuarzo y dolomita, mina Cata. (Col. Colegio).

51. *Yeso*. (*Selenita*) $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.—Proviene siempre de la descomposición del sulfuro; muchas veces se halla en cristales

bien desarrollados. Los más hermosos de éstos de la mina Sirena; además en Rayas, Valenciana, Cata. En las pizarras de la mina Sta. Gertrudis; allí se ha formado yeso como producto reciente de la transformación de numerosas pirritas, y forma el pegamento entre los pedazos de pizarra en la mina explotada.

52. *Chalkantita*. $Cu SO_4 + 5 H_2O$.—Encontré este mineral como costra en la mina Guapillo, en el cerro del mismo nombre, proviene de los minerales de cobre esparcidos en la rhyolita; lo mismo en la mina El Cobre (Sulfato) cerca de Cedro, con caliza de pequeñas estalactitas.

53. *Halotrichita* (en parte alcaparrosa). $Fe SO_4 + Al_2 (SO_4)_3 + 24$ agua. (Alumbre de pluma).—Bastante esparcido en las partes de las vetas que contienen pirita de fierro; se formó por descomposición de los sulfatos; en esflorescencias capilares. Muestras hermosas daban las minas Mellado, San Pedro Gilmomene, cerca de La Luz, Sirena, Rayas.

54. *Epsomita*. $Mg SO_4 + 7 H_2O$.—Como esflorescencias capilares. Se halla muy raras veces. Tiro Tepeyac de la mina Valenciana. El Instituto Geológico Nacional posee cristales de la Veta Madre.

55. *Kalinita K.* (Alumbre común). $K Al (SO_4)_2 + 12 H_2O$.—Como depósito de los geysers cerca del rancho Comanjillas, forma venas pequeñas y angostas, junto con hematita é incrustaciones de azufre. (1)

56. *Diadochita*. $Fe (PO_3)_2 + Fe SO_4 + mH_2O$.—Es el único mineral fosforado de la Sierra. Se encontró una sola vez en la mina Mellado, en 1879. Forma masas duras, macizas, de color verde negruzco. (Colec. Colegio).

57. *Raspita* $Pb W O_4$.—La raspita es para la República un mineral nuevo. Hasta ahora se ha encontrado solamente en Broken Hill, Nueva Gales de Sur, en Australia. La he descubierto en la Sierra de Guanajuato, en una mina abandonada de estaño, en el Cerro de Estaño cerca de Calderones. Forma cristallitos muy pequeños de color pardo amarillento, de fuerte brillo diamantino. Según sus cualidades ópticas pertenece al sistema monoclinio; químicamente es idéntica con la stolzita.

Acompañantes son la hematita y cassiterita maciza.

---

(1) Véase Geysers y Manantiales termales de Comanjillas (Guanajuato). Tomo VI, pág. 184. Bol. de la Soc. Geológica Mexicana.

VII. HALOIDES.

58. *Fluorita*. Ca Fl_2 .—La fluorita se encuentra esparcida, pero solamente en poca cantidad, mientras que en otros distritos mineros sucede lo contrario. Según parece, falta en todo el distrito de La Luz. En la Veta madre se encuentra en cristales $\infty O \infty$, rojo hasta color violeta con dolomita, mina Valenciana; en la misma localidad sobre valencianita, sencillas O color rojo de rosa.

∞O , O de color morado rojizo en grietas en el conglomerado rojo, mina Murciélagos cerca de la Valenciana. $\infty O \infty$ con indicación de ∞O m cristales claros como agua, sobre dolomita y cuarzo, mina Cata. $\infty O \infty$ morada y O roja: El obrero de porvenir de la mina Valenciana. $\infty O \infty$, ∞O . Tiro Tepeyac cerca de la Valenciana. Sencilla O morada rojiza sobre calcita, mina el Nopal. Verde O, $\infty O \infty$, ∞O vetas en el Cerro de la campana cerca de la mina El Nayal. $\infty O \infty$ cristales verdes, y otros claros como agua más rara vez O con m O m, Cerro Alto cerca del rancho Quinteros. Más frecuentemente se halla la fluorita en la veta de bismuto de la mina Industrial cerca de Calvillo en $\infty O \infty$ verdosas y claras; forma estras con barita, pyrita, etc.

En cristales claros como agua, raras veces un poco verdosos, $\infty O \infty$, ∞O , O y m O m, en la veta Tajo de Dolores. En octaedros verdes, Mina el Cubo (Col. Instit. Geolog. Nac.) Llama la atención que en la Veta Madre solamente se encuentran fluoritas rojas y moradas, mientras que en la región de la rhyolita siempre son verdes ó claras como el agua.

59. *Cerargyrita* $\text{Ag}_2 \text{Cl}_2$.—Se halla muy raras veces como revestimiento delgado en la Veta Madre, en pegaduras en el crestón de la Veta Madre, cerca de Las Cruces arriba de Mellado. Además, cerca de Cata, en la Barranca Jolula y en la mina Fraustos, cerca de Mellado. En pegaduras pequeñas verdes en la mina Pingüico.

60. *Embolita* $\text{Ag}_2 (\text{Cl}, \text{Br})$.—Algo más frecuente que la anterior. En pequeños $\infty O \infty$ mina Fraustos, Rayas, Jolula. En el crestón de la Veta madre, cerca de Mellado. $\infty O \infty$, O y en pegadura, mina San Pedro, cerca de La Luz. Con azurita, malaquita y oro nativo, mina San Bernabé, cerca de La Luz.

VIII. SILICATOS.

61. *Ortoclase* $\text{K Al Si}_3 \text{O}_8$.—En grandes cristales, en las vetas de pegmatita cerca del rancho de Harperos. Las más veces gemelos,

según Baveno, más rara vez según la ley de Manebach; predominan ∞P , $\infty P\infty$, y $\infty P\infty$. Con frecuencia se halla revestida con una costra de Albita. En los granitos porfíroides de la Mesa de estancia, fenocristales de algunos cm. de largo, principalmente gemelos según la ley de Karlsbad.

62. *Valencianita*. $K Al Si_3 O_8$ — (Chovelita, Adularita.) En grandes cristales, semejante á la adularia en venas de cuarzo de la Veta Madre, siempre sobre cuarzo. Con frecuencia en gemelos polysintéticos, con aristas quebradas. Los ángulos de los cristales de un modo algo diverso de la ortoclasa, son: $PM=87^\circ$; $PT=67^\circ$; $MT=57^\circ 30'$; las aristas PT de la ortoclasa tienen $67^\circ 47' 20''$. Antes solamente se había encontrado en el Tiro general de la mina Valenciana, y después en el Tiro Guadalupe. La Valencianita ensayó, según Hintze, $SiO_2=66,82\%$; $Al_2O_3=17,58$ $K_2O=14,80$ y $Fe_2O_3 0,09$. Esta pequeña cantidad de Fe_2O_3 es probablemente causa del cambio de color bajo mencionado. Según informes del Sr. Ing. Don Ponciano Aguilar, se encontró también en la mina Caliche cerca de Cata. Los cristales de allí tuvieron antes color de rosa, pero este color se perdió y les quedó un tono amarillo parduzco. Lo mismo tenemos que decir de la Valencianita del Cerro La Sirena, que fué descubierta por Sr. L. Laux. Los cristales se presentan como mineral más reciente en las venas que atraviesan desde la Veta Madre las tobas de andesita que rodean á esta veta. Este mineral fué descubierto por Casimiro Chovel; por esto lo llamaron largo tiempo Chovelita, pero también se llamó cuarzo romboidal.

63. *Albita*. $Na Al Si_3 O_8$ — En pequeñas costras sobre ortoclasa (véase No. 61), en las vetas de pegmatita del rancho Harperos.

64. *Wollastonita*. — $Ca (Mg Fe)_3 (Si O_3)_4$. En cristales que forman haces de varillas ó en cristales radiantes, de los criaderos de contacto cerca de Harperos, junta con granates y epidota.

65. *Rodonita*. $Mn Si O_3$. — Según Aguilera l. c. de la Veta Madre, que, como ya hemos dicho, contiene bastantes compuestos de Mn en el trecho entre las minas Valenciana y Aparecida.

66. *Hornblenda*. *Amphibola*. *Var.* — En cristales largos pero sin caras en sus extremidades, de las vetas de la diorita pegmatítica, así como del gabbro del Cerro Aldana. *Var. Asbesto* en fibras radiantes, y hasta felpudo, de La Luz, á veces con apophyllita encima; de la misma localidad un grupo arboriforme de asbesto encerrado en calcita clara, incolora (Col. Burrows); *Var. cuero fósil*, en pedazos parecidos á cuero destrozado, de Sta. Clara, cerca de La

Luz. Corcho fósil con gemelos de espato calizo, según la forma de Bolañitos, de la mina El Refugio (Col. Ponciano Aguilar); la misma de La Luz.

67. *Berylo*. $Be_3 Al_2 (Si O_3)_6$.—Hay solamente en la veta madre. En pequeños grupos de cristales verdosos que forman haces de varillas, encontré sobre y con Valencianita; también en pequeños cristales exagonales, todos de cosa de 1-2 mm. de tamaño. Mina Valenciana, Tiro general. El primer hallazgo lo hice yo en el terrero de la mina; el Instituto Geológico tuvo la amabilidad de analizar el mineral y determinó la presencia de berylo. Descubrí los pequeños cristales de berylo sobre muestras de valencianita. (Col. del Colegio).

El berylo es en la República de México un mineral raro, que hasta ahora está conocido de la Sierra Gorda; ahora lo he encontrado por primera vez en la Sierra de Guanajuato.

68. *Granates*. $R_3 Al_2 (Si O_4)_3$.

a). *Grosularita*. $Ca_3 Al_2 (Si O_4)_3$.—Granates amarillo-verdosos macizos en piezas hasta de 5 mm. de diámetro, frecuente en la región de los silicatos de cal en los criaderos de contacto, en el rancho de Harperos, mina San Pablo y Anexas. En la continuación de los criaderos hacia el Poniente se hallan granates en cristales ∞ O hasta de un centímetro de largo.

b). *Almandita*. $Fe_3 Al_2 (Si O_4)_3$.—Granate rojo, se halla junto con el anterior; hasta ahora no se ha encontrado nunca en forma de cristales bien limitados.

69. *Olivino*. $(Mg. Fe)_2 (Si O_4)_3$.—Solamente se encuentra en los basaltos en los límites de la Sierra; el más acabado en la forma, en los basaltos de dolerita, al pie del Cerro Gigante, en cristales de un centímetro de largo, pero sin caras en sus extremidades.

70. *Topacio*. $Al (O Fe)_2 Al Si O_4$.—Como producto de un procedimiento neumatolítico en las rhyolitas al Este de la Sierra. En la roca todavía no he encontrado topacio. (Pero se halla en el Estado de San Luis Potosí, en cintas de poros en la rhyolita). También lo que se encuentra en colecciones son cristales aislados de las arenas de los arroyos. Aguilera menciona un topacio de la Cañada de Marfil. En los arroyos que todavía corren de la región de la rhyolita hacia el Este, en la dirección hacia el rancho Campuzanos (al Norte de la hacienda Saucedá) se lavan á veces cristales de topacio al mismo tiempo con los minerales de estaño. La mayor cantidad la daba el Cerro Jabalí, en donde estaba la mina de estaño Santa Margarita, al Poniente de Campuzanos. Los cristales son las más veces de

color de rosa ó de carne, raras veces claros como agua; hay 2 tipos unos con prismas y las bases, y otros con brachydomas y pirámides. Parece que sin duda está el topacio en relación genética con los minerales de estaño.

71. *Turmalina*. $R_2 (B O_2) (Si O_4)_2$.—Se encuentra solamente en las vetas de pegmatita cerca del rancho Harperos, es decir, ya fuera de lo que se llama propiamente la Sierra de Guanajuato. En grupos de cristales radiantes y negros, como turmalina de fierro, como formación pneumatolítica en el interior ó en la zona marginal de las vetas mencionadas de pegmatita aplítica; cristales muestran R , $\frac{R \pm m}{2}$ etc., con $-\frac{1}{2} R$ y otros; muchas veces con hábitos trigonal.

72. *Datolita*. $Ca (BOH) Si O_4$.—Este silicato que contiene Bor se encontró como una rareza grande en la mina de Caliche, Veta Madre. Allí forma cristales del tamaño hasta de 1 cm. que son extraordinariamente ricos en caras, pero nunca tienen aristas bien marcadas, porque están muy ligados con la pasta de la roca. Predominando la ortodoma 102, así como las clinodomas 013 y 012, los cristales se diferencian un poco del ordinario tipo de cristalización. Por los señores Farrington y Dr. Waitz, fueron observadas también las caras: 100, 010, 320, 110, 120, 130, 102, 302, 013, 012, 011, 111, 115, 114, 113, 112, 111.

73. *Epidota*. $H Ca_2 (Al Fe)_3 Si_3 O_{13}$.—Se encuentran cristales de varios centímetros de largo, de color verde de praseo, en las dioritas, Cerro Aldana, cerca de Santa Ana; además en vetas pequeñas con cuarzo y calcita, en la cañada de Santa Ana y en la falda del Cerro de Cubilete. Como roca de epidota en la diorita de la loma de los cenizos al Norte de Puertecito, también en la cuesta San Juan de la Luz.

Junta con turmalina en las pegmatitas del rancho Harperos. En vetillas con la caliza en la región al N O. del Cubilete. (1)

74. *Prehnita*. $H_2 (Ca Al)_2 (Si O_4)_3$.—El Sr. Dr. C. Hlawatsch, Viena, anunció hace poco tiempo en una carta particular al Sr. Dr. P. Waitz, que encontró la Prehnita en cristales pequeños en una muestra mineral de la Sierra de Guanajuato; el lugar más exacto no es conocido.

75. *Biotita*. $(H K)_2 (Mg Fe)_2 (Si O_4)_4$.—En cristales grandes aunque escasamente en las pegmatitas, rancho Harperos. Allí también en los granitos porfíroides de la Mesa de Estancia.

(1) Véase Algunos datos preliminares sobre diques de Aplito-pegmatita, cerca de Silao, (Guanajuato). Tomo VI, pág. 173. Bol. de la Soc. Geológica Mexicana.

IX.—HIDROSILICATOS. a ZEOLITAS.

76. *Apophyllita*. $H_7 K Ca_4 (Si O_3)_8 + 4\frac{1}{2} H_2 O$.—Según Friedel l. c. contiene poca cantidad de NH_3 , hasta 0,51%.

Se conoce solamente de pocas localidades. Con frecuencia se encontró en la mina El Refugio cerca de La Luz. Cristales muestran ∞P ; $\infty P \infty$, P , $O P$; más grandes llegan á 5 cm. de largo y 2 cm. de ancho; muchas veces son hemimorfos, bases en una extremidad, pirámide en la otra.

Los cristales de El Refugio tienen muchas veces una construcción zonal; en la zona interior blancos ó claros como agua, en la zona exterior color de rosa. Apophyllitas blancas con calcita en la veta el Nopal. La mina Rayas daba apophyllitas de color de rosa con P , $\infty P \infty$ y $O P$. Además, predominando P , pequeños cristales de $\infty P \infty$ y $O P$, de color rojo claro hasta blanco, de Rayas; muchas veces también el cubo-octaedro tetragonal. Una especie particular de Refugio muestra pequeños cristales prismáticos que están pegados, muchas veces como embroquetados sobre fibras de amianto.

Una vena de Apophyllita del ancho, poco más ó menos de 3 cm., atraviesa las corrientes de andesita entre Chichíndaro y Calderones, al pie de la Bolita.

77. *Stilbita*. $(Na_2 Ca) Al_2 Si_6 O_{16} \cdot 6H_2 O$.—Es la zeolita que con más frecuencia se encuentra. En cristales grandes, casi siempre en grupos gerbiformes, muchas veces en la veta Madre, por ejemplo, en las minas Maravillas, Cata, Rayas, Valenciana, Mellado.

Grandes cristales aislados (hasta 2 cm. de largo), mina El Nopal. Mina La Cebada, cerca de Sta. Rosa; La Fragua. En cristales sencillos con pinakoides predominantes en las pegmatitas de aplita de Harperos.

Cristales pequeños en las venas de zeolita de las capas andesíticas del cerro La Bolita, de Cedro y Calderones, así como del rancho Enmedio, cerca de Sta. Rosa.

78. *Heulandita*. $H_4 Ca Al_2 (Si O_3) H_2 O$.—Cristales grandes en espacios huecos de la rhyolita arriba del rancho Chichíndaro (Coleo, Laux); también en rhyolita cerca del rancho Calvillo. En andesitas, en vetas angostas, en el cerro La Bolita, al Sur de Chichíndaro; á veces juntos con Stilbita, cerca de Cedro y Calderones; también más abajo del rancho Enmedio. Los cristales más grandes tienen hasta 3 cms. de largo y provienen de las rhyolitas de la mina Nayal.

Aguilera le menciona también de la veta El Nopal. De la mina La Luz. (Col. Inst. Geol. Nac.)

79. *Laumontita*. $H_4 Ca Al_2 Si O_{14} \cdot H_2 O$.—Se halla muy frecuentemente; forma las más veces la última generación mineral en las vetas metalíferas, con frecuencia como revestimiento fino en cristales muy pequeños, que muchas veces no se notan. Cristales más grandes provienen de las minas Rayas y Cata de La Luz, de la mina Los Angeles, cerca de Puertecito. A veces en pequeños pedazos en diabasas. Junta con stilbitas en la corriente de andesita, entre Chichíndaro y Calderones, así como en el camino de este último pueblo al Cerro Estaño; también en la andesita al Sur del Puerto de Barrientos, así como cerca del rancho Enmedio.

80. *Mesolita*.—En la colección del Colegio hay una sola geoda de rhyolita que está designada como “mesolita,” y ésta contiene un mineral de fibras finas. Por la pequeñez del mineral no se puede determinar con exactitud.

La muestra proviene de la mina Cardones, cerca de Nayal.

Además existe otra muestra parecida en la colección del Instituto Geológico Nacional. Es una geoda de la toba rhyolítica del cerro El Capulín, cerca del rancho Calvillo, Sierra Sta. Rosa; adentro está revestida por una capa de haces y masas blancas semejantes á un fieltro fibroso. El mineral será objeto de un estudio especial.

81. *Natrolita*. $Na_2 Al_2 Si_3 O_{10} \cdot 2 H_2 O$.—Mencionada por Aguilera l. c. es la del cerro Chichíndaro.

b. NO CRISTALIZADOS.

82. *Chrysocola*. $Cu Si O_3 \cdot 2 H_2 O$.—En la zona metalífera de los criaderos de contacto cerca del rancho Harperos.

83. *Esteatita*. $H_2 Mg (Si O_3)$.—En la mina Mellado. En algunas andesitas en el camino de Guanajuato á Pingüico, cerca de la Presa de Renovato y arriba de la misma, que se volvieron por la descomposición en esteatita.

84. *Kaolinita*. $H_4 Al_2 Si_2 O_9$.—En bolas del tamaño de un puño y en cintas en la rhyolita del cerro Guapillo.

85. *Halloysita* = *Smectita*. (Galapectita); en parte tierra bolar. $2 H_2 O, Al_2 O_3 (Si O_2) 2$.

En la mina de bismuto “La Industrial,” cerca del rancho Calvillo, en bolas blanco-verdosas, muchas veces impregnadas de guanajuatita y de otros minerales.

Además, en la mina Villalpando; la variedad rica en fierro "Bol," en la mina Sechó, cerca de Cata; así como en Fraustos, cerca de Mellado.

Todavía no estudiado, es un mineral que encontré cerca del rancho El Encinal, al pie oriental del cerro de Gigante. En una corriente de rhyolita vítrea de aspecto de obsidiana, se halla con frecuencia este mineral en cristales y granos amarillo-verdosos; que según sus propiedades ópticas y el crucero, parecen ser un mineral de la clase de *Diopsida*.

Para los estudios precedentes he visitado la mayor parte de las localidades donde se hallan los minerales correspondientes, para llegar á conocer, sobre todo, el carácter específico de los criaderos. De parte de los particulares recibí siempre el permiso para entrar en las minas; sobre todo la Development Company de Guanajuato, me permitió gustosamente visitar sus minas. Además estudié las colecciones de minerales, para conocer especialmente los minerales más antiguos que hoy ya no se encuentran. Por la amabilidad del Sr. Gobernador Don Joaquín Obregón González y de la Administración del Colegio de Guanajuato, tuve la ocasión de estudiar allí mismo la extensa colección. Muy agradecido estoy por esto al Señor Gobernador, como á los Sres. Director Ing. Pablo Orozco y Prof. Heredia. De las colecciones particulares me daban mucho material para mi trabajo, la magnífica colección del Sr. Luis Lanx y las colecciones de los Sres. Ing. Ponciano Aguilar y H. R. Burrows. Al Sr. Luis Lanx tengo que agradecer también muchos informes importantes sobre minerales de aquella localidad. También me dieron material científico para el trabajo presente los Sres. Enrique Langenscheid, cónsul alemán, Maxim. Kölbl, y los Sres. Ingenieros A. Bravo, Enrique Medina y Fidencio García. A todos los señores mencionados, así como á la Development Company en Guanajuato, doy por eso las gracias más expresivas. Asimismo, estoy agradecido al Sr. José G. Aguilera, Director del Instituto Geológico, por la amabilidad con que me permitió estudiar la importante colección de dicho Instituto; al Sr. Ing. J. D. Villarello, Presidente de la Sociedad Geológica, y al Sr. Dr. P. Waitz, por su ayuda extraordinaria en la composición del trabajo precedente.

Espero que tendré la oportunidad de completar esta lista más tarde, con estudios especiales y más detallados.

LITERATURA.

1. AGUILERA J. G. *Catálogos sistemático y geográfico de las especies mineralógicas de la República Mexicana*. Bol. Inst. Geol. Nac. México XI. 1898.
2. BAUER M. *Beiträge zur Mineralogie Herzförmige Zwillingungsverwachsung am Quarz von Guanajuato in Mex.* N. Jahr. Min. 1882 I. 150.
3. BLAKE W. P. *Note on the Mines and minerals of Guanajuato*. Transac. Amer. Inst. M. E. XXXII. Mexican Meeting. 1902.
4. BORDLAENDER. *Zusammensetzung des Polybasits*. N. Jahrb. M. 1895. I. 98.
5. BRUNS H. D. *Chemical News*. XXXVIII. 1878. p. 109.
6. BUSTAMANTE J. M. *Mémoire sur les nouvelles variétés de chaux carbonatée et d'argent sulfuré de Mexique*. Ann. des Sc. nat. Paris 1826. VIII. 205.
7. COLLET-DESCOTILES. *Analyse de l'étain en grains de Goanxoato au Mexique, envoyé par Mr. de Humboldt*. Ann. Chim. LIII, 266.
8. CASTILLO ANT. DEL. *Descubrimiento de una nueva especie mineral de Bismuto*. La Naturaleza II. 1873; Minero Mex. I, 20.
9. FARRINGTON O. C. *Datolith from Guanajuato*. Am. Jour. of Sc. IV. Serie April 1898. 285.
10. FERNÁNDEZ VIC. *La Guanajuatita*. "La República." Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. 1873. Julio. Minero Mex. I. No. 16; 20.
11. FERNÁNDEZ VIC. Y NAVIA S. *El seleniuro de plata aurífero en los frutos del Nayal*. "La República." Periódico Oficial, Guanajuato. 1874. Octubre No. 68; Minero Mex. II. Número 28.
12. FERNÁNDEZ VIC. Y NAVIA S. *Un nuevo seleniuro de Bismuto*. Minero Mex. 1874/75. No. 34.
13. FRENZEL. *Mineralogisches-Selenwismuthglanz*. N. Jahrb. Min. 1873-801. 1874. pág. 679; 1875. 685.

14. FRIEDEL CH. *Sur la composition de l'Apophyllit*. Bull. Soc. Min. Fr. 1894. XVII, 142.
15. GENTH F. A. *Contributions to Mineralogy*. Am. Jour. Sc. XLI, 1891, 401. XLIV, 1892, 381.
16. MACKEE G. W. *Prismatic crystals of Haematite*. Am. Jour. Sc. XVII, 1904, 241. Rev. Soc. Alzate, 1904. XXI, 10.
17. MAILLET J. W. *Nota sobre la composición química de la Guanajuatita ó seleniuro de bismuto*. La Naturaleza, IV, 1877-79, pág. 73.
18. KLEIN C. *Mineralogische Mitteilungen. — (Apophyllit)*. N Jahrb. Min. 1, 1884, 253.
19. PRIOR G. AND SPENCER L. J. *The cerargyrit group Mineral*. Magazin XIII, Londres 1902, 174.
20. PRIOR G. AND SPENCER L. J. *Polybasit of Guanajuato*. Mineral. Magaz. IX, pág. 9.
21. MIERS H. G. *Mineralog. Notes. Polybasit of Guanajuato*. Min. Magaz. VIII, 204.
22. RATH, G. V. *Seltene Mineralien von Guanajuato und Zacatecas*. Verh. nat. Ver. Bonn. 41, 1884, 100.
23. PLATTNER. *Valencianit, Chemische Unters. d. Val. von Grube Valenciana Mex. Poggend. An. d. Phys. u. Chem.* 46, pág. 299.
24. MUEGGE O. *Mineral. Notizen; Kalkspat von Guanajuato*. N. Jahr. Min. 1897, II, 76.
25. PIRSSON L. *On some remarkably developed Calcit crystals*. Am. Jour. Sc. 1891, 61.
26. VILLARELLO J. D., FLORES TEOD., ROBLES R. *Etude de la Sierra de Guanajuato, Guide géologique au Mexique*. XV. Excursion du Nord 1906.
27. VILLARELLO J. D. *Estudio químico del procedimiento metalúrgico conocido con los nombres de amalgamación mexicana ó beneficio de patio*. Mem. Soc. Alzate, 1903-04. T. 19 y 21.
28. WEISBACH A. *Mineralog. Notizen, Wismuth carbonat von Guanajuato*. N. Jahrb. Min. II, 1882, 254.
29. WITTICH E. *Algunos datos preliminares sobre diques de Aplito-Pegmatitas cerca de Silao, (Gto.)* Bol. Soc. Geol. 1909. T. VI.
30. WITTICH E. *Los criaderos de contacto cerca de Harperos*. Id.
31. WITTICH E. *El estaño en la Sierra de Guanajuato*. Id.
32. STELZNER-BERGEAT. *Die Erzlagerstätten 1904-05*. I-III.