“EL SALTO DE SAN ANTON”, CUERNAVACA, MOR.

—
Por el Ing. Ezequiel Ordóñez, M. S. G. M.

**Guía para la Excursión de la Sociedad Geológica Mexicana
Febrero 1º de 1937.**

Situación

Escasamente a 1000 metros de distancia en línea recta y justamente al oeste de la Catedral de Cuernavaca, está ubicado el bien conocido Salto de San Antón, que es una caída de agua de no gran volumen, pero de algo más de 40 metros de altura, cayendo por el lado norte de una profunda olla de paredes verticales practicada por las mismas aguas, las que después de formar un gran charco en el fondo, siguen su curso por un angostísimo cañón de paredes también acantiladas, con una altura de 50 metros.

Descripción del Salto

Esta hermosa cascada y otra más pequeña llamada el “Salto Chico”, se cuentan entre los muchos atractivos que tiene a ciudad de Cuernavaca. Lo agreste y bello del Salto de San Antón, en efecto, atrae continuamente visitantes, quienes para admirar esta obra de la naturaleza encuentran la comodidad de un fácil acceso por una amplia carretera que conduce hasta el borde mismo del gran tajo, y de allí por una escalera de mampostería bien trazada, se desciende hasta 26 metros arriba del

fondo, seguida de un amplio corredor en forma de anfiteatro que permite recorrer a nivel casi todo el perímetro de la olla, pudiendo pasar y estacionarse detrás de la caída de agua y admirar, no sólo su fascinante movimiento al caer en chorro cristalino, sino también la masa de espuma que se forma en el fondo al precipitarse en el arroyo; los frecuentes arcoiris a los rayos del sol, fantásticamente visibles contra el fondo obscuro de una amplia cavidad que se ha formado en la pared, cerca del fondo, por efecto del golpe de las aguas y hacia arriba y de un lado los torcidos árboles enraizados y como suspendidos en las paredes cortadas a pico, hechas de lava maciza con espléndida estructura columnar aumentan el atractivo.

El Salto de San Antón es en realidad digno de verse, no únicamente por los que aman la naturaleza en su aspecto salvaje, sino también por quien ve en este sitio la obra de los siglos y observa los fenómenos geológicos que han preparado esta bella obra natural, cuyos fenómenos, no por ser muy simples, dejan de tener gran interés para la historia geológica de los alrededores de la ciudad de Cuernavaca.

Esta ciudad, fundada antes de la conquista del Anáhuac, está situada hacia la media altura de algo así como un gran plano inclinado, surcado por multitud de barrancas, que se extiende en parte del flanco meridional de una prolongación de la "Serranía de Ajusco". Este plano, de moderada inclinación, que comienza al pie de las escarpadas pendientes de los altos cerros de Huitzilac, de Zempoala y de parte de los cerros de Ocuilan, se dilata bastante hacia el sur de Cuernavaca y va a terminar, confundiéndose con otros accidentes topográficos, hacia las tierras calientes por donde serpentea el río Grande o Amacusac, alimentado en buena parte por las aguas que bajan del apretado conjunto de montañas que acabamos de citar.

El Nudo del Ajusco

El Ajusco, como es bien sabido, con sus 3,900 metros de altura sobre el nivel del mar, es la cumbre de un importante nudo montañoso del que parten ramificaciones en diversas direcciones; desde luego la sierra de las Cruces y Monte Alto que

"El Salto de San Antón"—41 mts. — Cuernavaca, Mor.

corre en dirección del norte, separando los valles de México y Toluca, siendo su cresta línea de división continental de aguas; las sierras de Jalatlaco y Tenancingo es otra rama de este nudo, que corren hacia el oeste, uniéndose a los largos desprendimientos del Nevado de Toluca. Otra rama, no menos importante, se

desprende hacia el este y termina casi al pie de las estribaciones del Popocatepetl y es la que se ha llamado propiamente la "Serranía de Ajusco", sembrada de cimas con cráteres volcánicos y numerosas corrientes de lava basáltica. Todavía otra ramificación importante se extiende hacia el sur, sirviendo de lindero a los Estados de México y Morelos, como una larga estribación desprendida de los cerros de Zempoala y montes de Ocuilán, en forma de un gran arco al noroeste de Cuernavaca y que alimenta a muchos arroyos y ríos, siendo uno de tantos y pequeño, el que forma el Salto de San Antón y Salto Chico. El Ajusco mismo, con todo y ser la cima más alta, no es precisamente el centro del nudo montañoso, sino que este se forma con otras alturas, tales como los cerros de Magdalena, de San Miguel, de las Cruces, etc. El alto cerro del Capulín, los montes de Zempoala y sierra de Huitzilac, que se divisan desde Cuernavaca al noroeste, casi se unen directamente al Ajusco por el espinazo llamado la sierra del Capadero, que corre en dirección norte-sur formando una cadena de altos cerros que tiene como 20 kilómetros de longitud.

No hay que olvidar que la Serranía de Ajusco y la sierra que lo une con el Nevado de Toluca, es parte de la alta barrera que separa la Mesa Central de la provincia fisiográfica de la Cuenca del Balsas; que el nudo del Ajusco, con sus magníficos bosques, ya muy mermados por inconcebibles y deplorables tallas, que ponen en grave peligro el abastecimiento de aguas potables de la Capital de la República, es además un alimentador importante de los tres grandes ríos de México: del Moctezuma o Pánuco, con los manantiales de Xochimileo; del río de Lerma o Grande de Santiago, con los manantiales de Lerma y Almoloya, y del Balsas, con las corrientes que bajan de los flancos meridionales de este nudo. No se debieran aquí recordar estos hechos tan triviales, sino fuera por el deseo incontenible de insistir sobre la conservación y repoblación efectiva de esos bosques.

El nudo montañoso a que nos referimos, fué un centro eruptivo esencialmente andesítico, del que radiaron, quizás al finalizar el período Mioceno, las fisuras por donde surgieron las enormes masas de rocas que forman las sierras de ese núcleo, construidas éstas en verdad, no de una sola vez, sino en

Estructura columnar del basalto – "Salto de San Antón"
Cuernavaca, Mor.

paroxismos sucesivos que apilaban rocas, ganando las sierras en altura y extensión, con ligeras variantes en la composición mineralógica y textura de esas rocas, en el curso de las diversas emisiones. Poco a poco las largas grietas se van estrechan-

do rellenas de lavas que se enfrían con relativa lentitud y van quedando solamente chimeneas aisladas de erupción, por donde salen a la vez que lavas fundidas, cantidades enormes de materiales cineríticos, acabando con estos últimos este largo ciclo volcánico, como acabaron parecidos episodios, en otras partes de nuestra Mesa Central. El Ajusco, ya lo hemos dicho otras veces, es tal vez una de las últimas chimeneas de erupción de ese ciclo y su mayor altura no parece ser debida a más continua actividad, sino a que en ese punto se concentró la fuerza impulsiva del material salido del interior. Hoy queda de aquel centro final de erupción, parte de su caldera y los restos de un colosal obelisco, que se irguió de su medio como un tapón. (El Pico del Aguila).

Debido al trabajo de erosión, a la vegetación forestal y a la gruesa cubierta de tierra vegetal, no es posible observar con suficiente detalle, los episodios volcánicos sucesivos, ni los efectos paroxismales que dieron origen a aquel gran conjunto de montañas, ni las más jóvenes chimeneas, excepto el Ajusco, ni como fueron acumulados originalmente los materiales cineríticos, que, posteriormente arrastrados, forman hoy extensos y gruesos mantos debilmente inclinados en la base de estas sierras, como lo veremos adelante.

La Serranía de Ajusco

Pero con lo expuesto no ha terminado el boceto de la historia volcánica del nudo del Ajusco. Después de un período largo de tranquilidad, aprovechado en desgastar y arredondear las cimas y en acomodar en su base en capas sobrepuestas los materiales cineríticos, surge en la época reciente y hasta en los días prehistóricos, dos nuevos ciclos volcánicos, primero el de las andesitas basálticas, localizado en los cerros de Zempoala, en donde estas lavas han obstruido partes de angostos valles y antiguas barrancas, dando lugar a la formación de charcos y lagunas temporales y después el de los basaltos, los que como una formidable inundación, cubren los dos flancos de la Serranía de Ajusco, es decir, de toda la región montañosa que se extiende al oriente y sureste del Ajusco y que separa al Valle de

"El Salto Chico" – Cuernavaca, Mor.

México de los valles del sur y cuyas características fisiográficas, se ven con claridad en la carretera de México-Cuernavaca. La mayor parte de las cimas desparramadas sobre esta serranía son cráteres volcánicos, reposando sobre corrientes de lava, y son tantos estos cráteres, que desde el pie del Ajusco,

hasta el extremo oriental de la serranía, se pueden contar más de sesenta de estas bocas.

Las corrientes basálticas, que cubren tan vasto territorio, (como unos 2,000 kilómetros cuadrados) se derramaron sucesivamente durante un largo período de tiempo, que termina, como es bien sabido, cuando ya las razas aborígenes y las tribus históricas poblaban estas tierras, atraídas esas razas por la benignidad del clima, por la fertilidad del suelo y por la abundancia de aguas puras. Los basaltos cubrieron de mantos sucesivos las estribaciones orientales del Ajusco y de otras sierras andesíticas, más o menos ya intensamente erosionadas y con sus cursos de drenaje ya maduros; y hoy, por esos canales, siguen corriendo subterráneamente las aguas, protegidas por las lavas basálticas o por los taludes de tobas volcánicas. A esta protección y curso subterráneo, se debe la existencia de grandes manantiales en ambos flancos al pie de esta serranía, así como la abundancia de aguas artesianas en el Valle de México.

Seguramente que para nuestro objeto, que es el dar una descripción somera del Salto de San Antón, en Cuernavaca, hemos retrocedido demasiado lejos, pero no es tiempo perdido, si queremos tener una buena idea de como se ha formado ese Salto y en que rocas han trabajado las aguas que forman la cascada.

Origen del Salto, Tobas y Basaltos

Como hemos dicho al principio de esta nota, las aguas del Salto se precipitan por el borde de una profunda olla de paredes verticales, excavada por las aguas. La olla tiene un contorno que se aproxima al de una pera, estando el eje mayor orientado en dirección aproximada norte-sur, desde el lugar donde las aguas caen hasta la desembocadura de la olla en el acantilado cañón del arroyo. En esta dirección, la distancia es de 56 metros y el eje menor en dirección perpendicular, tiene 41 metros. La pared occidental del arroyo tiene allí no menos de 50 metros de altura cortada enteramente a pico.

El origen de este Salto, como el de otras muchas caídas de agua naturales, es la diferente dureza de las rocas en las que labran sus cauces, más duras las de arriba en nuestro caso el

basalto, más blandas las de abajo, las brechas y tobas andesíticas en que descansan. Y todo es visible en el soberbio anfiteatro que se tiene enfrente al descender por la escalinata de cemento que conduce al interior de la olla, con el amplio corredor que la circunda; al frente el blanco chorro de agua, que ha cavado en el basalto un angosto cajón, abajo del cual esta roca muy compacta, tiene un espesor de 7 metros, viéndose la base de esta corriente de lava inclinada, adelgazarse al poniente y engruesarse rápidamente al oriente y tanto, que ya en la pared oriental de la olla, su espesor es de 40 metros admirándose en este corte vertical de lava, la magnífica estructura columnar de la roca. Desde el mismo observatorio, es decir, desde la escalinata de bajada, se ven en la pared occidental de la olla, las capas de tobas y brechas andesíticas con una inclinación muy débil hacia el sur, con pequeñas cuevas cavadas por la erosión a lo largo de sus planos de juntura. Piedras de todos tamaños asoman aquí y allá, sin ningún orden, sobresaliendo de las superficies ásperas o lisas de las brechas y las tobas, éstas con aspecto más o menos terroso. Así pues, la pared oriental de la olla es de basalto, la pared occidental está formada de capas de brechas y tobas, y al frente, en la cascada se ve, el basalto descansando sobre la superficie inclinada de las tobas, indicando que la lava escurrió sobre una superficie ya erodada, inclinada como unos 25° hacia el oriente. En la parte alta del contacto, las tobas y brechas se ven un poco calcinadas por el calor de la lava y en otras partes, se ve que la misma lava corrió por una superficie de piedras sueltas y aun sobre grueso aluvión, según se advierte en la pared oriental, en la base de la corriente de lava, en donde se han formado grandes y pequeñas oquedades por donde surgen algunos pequeños manantiales. Seguramente que el antiguo cauce del arroyo antes de que escurriera la lava, venía por la que es hoy la pared oriental de la olla y hacia su medio, pues que en ese lugar dicha lava alcanza su espesor máximo, adelgazándose rápidamente también hacia el sur, pues así se ve con toda claridad al descender la escalinata. A la simple vista se puede seguir fácilmente el contorno de la base de la lava y aun observar en algunas partes las tobas y brechas calcinadas. Un saliente de tobas en la parte sur, indica que el antiguo cauce del arroyo era bastante sinuoso.

Las características de la masa de lava descubierta en el cantil oriental de la olla, son dignas de observarse cuidadosamente. Es uniforme y ligeramente ampollosa en la parte superior, debida al enfriamiento rápido, lajeada y semicolumnar un poco más abajo; y hacia el medio, en un espesor de 12 metros presenta la más perfecta estructura columnar que pueda verse en un basalto, como resultado de un enfriamiento lento. Esta lava adquiere de nuevo, hacia la base de la corriente, la forma maciza, carente de toda estructura. En la base misma, al contacto de la toba, el basalto tiene un aspecto careado y esponjoso debido al escurrimiento sobre una superficie relativamente blanda.

El basalto de San Antón procede de una corriente que baja desde los cerros de Hutzilac y puede seguirse desde esas alturas en partes destruido por la erosión. En su escurrimiento tomó el cauce de la barranca llamada del Tecolote, que es la misma del Salto de San Antón, la que unida con otras harrancas y arroyos, forma más abajo, al suroeste de Cuernavaca, el río de este nombre o de Apatlaco.

La corriente de lava muy *flúida*, escurrió primero por una pendiente relativamente fuerte, después más abajo por pendiente suave y en cantidad no grande, pues que un poco abajo del Salto de San Antón termina la lava como una angosta lengua. En la última parte de su curso, la lava solamente escurrió por el fondo del arroyo, lo mismo que ahora las aguas, entre paredes de tobas más o menos altas y acantiladas. En las hondonadas del arroyo y de sus tributarios, la lava adquiría mayor espesor y en las partes planas se extendió, cubriendo una superficie más amplia y delgada.

Es muy interesante seguir el curso superior de esta corriente de basalto hacia el norte, arriba del Salto, aunque sea en un trayecto corto, por ejemplo hasta la altura del acueducto que alimentaba la antigua fábrica de La Carolina, o sea por unos 600 metros. De este trayecto hemos hecho un croquis el cual acompaña a esta nota. (Fig. 1).

Entre aquel acueducto y el Salto, se extiende una superficie angosta, casi plana, ocupada por el panteón de Cuernavaca, por un terreno fértil sembrado de hortaliza y por la huerta del rancho de Atzingo.

CROQUIS
 DEL PONIENTE
 DE
 CUERNAVACA, MOR.
 Mostrando la situación del
 Salto de Sn. Antón, Salto
 Chico y la corriente de la
 va. basáltica

ESCALA 1:5000

Este espacio plano, de unos 200 metros de anchura, está limitado al poniente, por lomas alargadas de brechas andesíticas bien recortadas en su base, indicando en efecto, que en el límite occidental de una hondonada o lugar bajo antes del escurrimiento de la lava el arroyo corría como ahora, al pie de la alargada loma occidental, la más alta de las que forman el contorno de la hondonada. La corriente de lava siguió también el curso del arroyo después de haber cubierto parte de la hondonada. Las aguas del arroyo, en su trabajo posterior de excavación, han tajado las tobas justamente en el borde occidental de la corriente de basalto, viéndose en las paredes, las tobas andesíticas de un lado y el borde de la corriente lávica del otro, o bien escurrieron directamente sobre el basalto formando rápidas o caídas.

De éstas, la más bella, además de la de San Antón, es la llamada El Salto Chico, como 250 metros arriba del de San Antón, un remedo en pequeño del gran Salto, pero no menos hermoso. Igualmente escurre en la pared norte de una olla en forma de pera, con paredes verticales de 10 metros de altura, de tobas y brechas al poniente y de basalto al oriente también con perfecta estructura columnar, no variando en nada el aspecto físico de la lava, ni las características de sus condiciones de enfriamiento. Como el charco que se forma al pie de la cascada de este Salto es hondo, se aprovecha por el público como excelente estanque de natación, teniendo igualmente acceso, desde el borde de la barranca hasta el fondo, por una buena escalera de mampostería. En automóvil se llega hasta el borde de la barranca por el camino que va junto a la barda norte del panteón, ya citado. Junto a la cascada, hacia el poniente, puede notarse, además de la superficie esponjosa de la lava en su base, la masa de escombros que la lava acarreó en sus bordes durante el escurrimiento.

Treientos metros arriba del Salto Chico, en el mismo arroyo que se cruza por un puente, sobre el camino que va a Buenavista del Monte, hay otro pequeño salto en el basalto y que llamamos "El Saltito", y todavía junto al acueducto que pasa junto al rancho de Atzingo hay otras rápidas en el mismo basalto, teniendo aquí la corriente de lava, en el fondo del arroyo, sólo unos cuantos metros de anchura.

Todo el terreno plano, desde el panteón hasta la huerta de Atzingo, está cubierto de una gruesa capa de tierra vegetal. El basalto no asoma sino por accidente y solamente hacia la parte occidental de la pequeña planicie. Sin embargo, en el panteón, los encargados de abrir las sepulturas, nos informan que a un poco más de un metro de profundidad y debajo de la tierra vegetal, se encuentra esta roca a veces acordelada, como en la superficie de corrientes de basalto muy flúidas.

Tobas y Brechas Volcánicas

Réstanos ahora, exponer nuestras ideas acerca de la manera cómo se depositaron las capas de brechas y de tobas volcánicas, sobre las que reposan las lavas basálticas de San Antón. No es fácil dar una explicación satisfactoria del modo de formación de estas capas y aparece como un problema de difícil solución. Por otra parte, el estudio de estas capas tiene una importancia considerable, en vista de la grande área que cubren en los flancos meridionales de la Serranía de Ajusco en las laderas de Cuernavaca, así como en los flancos septentrionales de esta montaña y de las sierras de las Cruces y Monte Alto, en el Valle de México. (1).

Esta enorme cantidad de material tufáceo y brechiforme, que cubre centenares de kilómetros cuadrados de superficie y aun centenares de metros de espesor, debe su origen a erupciones explosivas que tuvieron lugar al fin del período volcánico andesítico, creador de las montañas del nudo del Ajusco y sus congéneres. Estos materiales deleznales, lo repetimos, deben haber cubierto de gruesos mantos todas estas montañas al terminar las erupciones, cayendo sea en forma de polvos o cenizas, o bien escurriendo a manera de torrentes de lodos; y si así fué, entonces estas grandes masas de material suelto no adquirieron sino después, la disposición en capas débilmente inclinadas que ahora tienen al partir de un cierto nivel, en los flancos bajos de estas montañas. Al principio, estas acumulaciones cineríticas y toda clase de materiales proyectados por las explosiones, de-

(1) — E. Ordoñez—"Las Rocas Eruptivas del Suroeste de la Cuenca de México". Bol. Inst. Geol. No. 2, Mex. 1895.

bieron haber cubierto las montañas como masas informes, pero no han de haber quedado mucho tiempo así, tanto por su condición deleznable, como por la fuerte pendiente de las masas rocallosas duras sobre las que se depositaron, siendo copiosas lluvias las que debieron acarrear estos productos y extenderlos como capas gruesas en las superficies bajas de menor pendiente, en la base de los cerros, ya en parte rodeados de grandes abanicos aluviales, según se ha visto en algunos pozos profundos al pie de las lomas de tobas.

No es fácil explicarse el mecanismo de esta rápida sedimentación, si se atiende a la desigualdad en tamaño y densidad de los materiales individuales que componen la mayor parte de estas capas, pues en cualquier parte, en los alrededores de Cuernavaca, por ejemplo, en donde la erosión ha practicado tajos profundos, se puede ver que en la masa compuesta de materiales finos se encuentran piedras semiarredondeadas o angulosas de todos tamaños, desde las dimensiones de un chicharro, hasta de varias toneladas de peso, distribuidas sin ningún orden ni regularidad. Y no nos referimos a las capas superficiales, hechas casi siempre de brechas, en las que las piedras pueden haber sido removidas por erosión retenidas al fin y sufrido toda la masa una cierta consolidación, sino a las capas a mediana profundidad, aunque en estas las grandes piedras y guijarros sean en menor número, pero siempre embutidas en desorden. No faltan dentro de estas capas algunas lentes de aluvión típico, ni tampoco algunas capitas de arena y de cenizas volcánicas caídas en el lugar en que se encuentran.

Si se examinan al microscopio los materiales finos de estas capas, se ve que consisten de partículas de rocas andesíticas, de pedacitos de cristales de feldespatos y de minerales ferromagnesianos, de esquirlas de pasta vídriosa de las mismas rocas andesíticas; y por último de pequeños aglomerados arredondeados de vidrio volcánico, con algunos microlitos feldespáticos granitos de fierro y ferromagnesianos. No existe propiamente una pasta de cementación a no ser muy poca arcilla secundaria. El color de estas capas es el gris blanquizo o amarillentas y en estas últimas, el color es debido a la oxidación de los granitos de fierro negro que contiene la pasta de las rocas, y que tiñe de amarillo a los granos feldespáticos y vidrio. En

todo caso, en esta aglomeración de materiales andesíticos de todos tamaños, se nota un cierto arredondeamiento debido a la abrasión ejercida durante su movimiento sin que este arredondeamiento llegue a ser el de las arenas. Además, en los granos más pequeños no se nota el desgaste, conservando los granos o pedazos de cristales sus formas esquinadas.

De estas condiciones físicas de las tobas y brechas andesíticas de los taludes occidentales de Cuernavaca, parece deducirse: a) Que se trata de un transporte en forma de lodos espesos que permitió el acarreo de grandes piedras con el material fino; b) Que en general el movimiento de estos lodos se hizo con alguna lentitud, toda vez que las capas tienen muy ligera inclinación (de 2° a 4°) y por último; c) Que su depósito se hacía de un modo uniforme y continuo, pues los planos de separación de estas capas son muy poco marcados variando su espesor desde 1 hasta 6 metros. Aunque el modo de formación de tan extensas capas, que aquí sugerimos, no parece enteramente convincente, es el único que el que éste escribe les puede suponer, quedando siempre el problema en pie.

Series de Capas

Aunque las capas de materiales andesíticos de Cuernavaca no tienen una textura y aglomeración física uniforme, variando su carácter de un lugar a otro, así como la continuidad de las capas, es posible distinguir tres series de capas, a veces en insensible transición: 1) Capas de tobas amarillas de grano fino, poco consistentes, con raras piedras semiesquinadas enclavadas y con relativa abundancia de granitos de pómez; 2) Capas de brechas andesíticas, más consistentes que las anteriores y con muy escasa pómez y casi sin materia terrosa de cementación. Las capas de tobas amarillas se encuentran generalmente abajo de las brechas y en los arroyos donde estas capas se descubren, forman altas paredes verticales encajonando los arroyos. A esta clase pertenecen las capas inferiores de las paredes de la olla del Salto de San Antón y que forman el angosto cañón de este arroyo. Las capas de brechas andesíticas vienen encima de aquéllas y aunque a veces también forman paredes verticales,

tienen más la tendencia a desgastarse en formas arredondeadas, con muy fuerte pendiente en las laderas. Este tipo de brechas se ve muy bien en la loma alargada que limita al oeste el cauce del arroyo del Salto de San Antón, Salto Chico, etc. Es también la roca superficial de todas las lomas al poniente de Cuernavaca y sobre estas mismas brechas está edificada la capital de Morelos.

Hay por último otro tipo: 3) De rocas arenosas y de brechas de color gris, que aunque tiene la tendencia a formar capas continuas más bien se presenta en la forma de alargadas lentes imbricadas. Me refiero a las pseudocapas, que en varias partes, al poniente de Cuernavaca, se explotan para extraer arena, ripio y grava para uso de morteros y concretos en las construcciones. A estas arenas se les llama, como en el Valle de México, "arena de mina" y a los lugares de donde se extraen "minas de arena". Para hacer la separación de arena, ripio y grava, se cierne este material en los patios de las mismas "minas". En los tajos y cuevas que se hacen para extraer estos materiales, se puede observar muy bien la desigual posición de las arenas, gravas y grandes piedras que componen estas grandes y pequeñas lentes, teniendo generalmente en las superficies de juntura una delgada costra endurecida de color blanco rosado, de arena fina, probablemente con algo de caliche.

Aunque los lechos de "arena de mina" se entremezclan a veces con las brechas superiores, parece que los depósitos más importantes de estos materiales han sido los más recientes y que se han erodado después de su depósito con más rapidez. La hondonada alargada por donde escurrió la lava basáltica, entre los terrenos de Atzingo y Salto de San Antón, fué cavada en esta clase de arenas, pues las lomas bajas desnudas que limitan la hondonada al oriente de los terrenos sembrados y del panteón, están formados de esta roca y aun hay en estas lomas dos grandes minas de arena en actual explotación.

Los lechos de grava y arena de mina son físicamente diferentes a las capas de tobas y brechas andesíticas. Las arenas consisten casi exclusivamente de granos **semiarredondeados** de andesitas de la misma naturaleza que el ripio, la grava y las grandes piedras. No contienen prácticamente materiales cine-

ríticos y cuando los hay se aíslan en lentes separadas. El origen de las "arenas de mina" es pues, distinto al de las otras capas arriba descritas y no parece ser otro que el de materiales de canchales arrastrados de los ventisqueros o glaciares que existieron en las cimas de las montañas del nudo del Ajusco, verdaderas tilitas acarreadas durante el deshielo de los ventisqueros, al terminar un tiempo glacial. Aun es posible que las capas de brechas andesíticas tengan también semejante origen, pero acarreando también productos cineríticos. Prister (1) ha emitido esta opinión, sobre el origen de los materiales de las minas de arena del Valle de México, que son enteramente semejantes a las de las lomas de las cercanías de Cuernavaca.

Las tobas, brechas y tilitas que acabamos de describir someramente, ocupan un área muy bien definida y bien característica al NW., W. y SW. de Cuernavaca, tanto por la uniformidad de su constitución geológica, dentro de variantes regionales, como de su topografía, que consiste como hemos dicho de una superficie uniformemente inclinada, surcada por multitud de barrancas angostas y relativamente profundas que en el curso de su descenso se van uniendo unas o otras, para formar hacia el sur unos cuantos arroyos o pequeños ríos que forman en definitiva los ríos de Xochitepec y Tetlama, tributarios del río de Yautepec, después del Jojutla y éste finalmente del Amacusac. Al norte y poniente, los límites son los flancos de las montañas y altos estribos de las sierras. Las lomas de Cuernavaca, que así las llamamos, siguen teniendo el mismo aspecto hacia la tierra caliente del valle del Amacusac, pero no con la misma uniformidad, en vista de haber numerosos cerros aislados, cuyos materiales han contribuido también a la formación de lomas. Finalmente, ya muy atenuadas estas, se funden en las extensas terrazas fluviales y lacustres, en los que ha cavado su actual curso, el valle del río Amacusac.

Al oriente, noreste y sureste de Cuernavaca el aspecto del terreno cambia bruscamente, lo cual se nota claramente siguiendo la carretera de México. En esta región, de escasas corrientes de agua y de escasos accidentes, las brechas andesíti-

(1).—Prister A.—Notas Preliminares sobre Vestigios Glaciales en el Estado de Hidalgo y en el Valle de México — Soc. Cient. Ant. Alzate, Mem. y Rev., Tomo 48, N° 1-6, pp. 1-13, Glams. 1927.-IV, N° 2, pp. 123-127, Dic. 1931.

cas están cubiertas por extensas corrientes de basalto, unas frescas y otras más o menos erodadas, corrientes que proceden de los altos cerros de la Serranía de Ajusco y de las que nos ocuparemos en un próximo estudio sobre Tepoztlán, lugar que también se visitó durante la excursión de la Sociedad Geológica Mexicana.

El mapa del Estado de Morelos, publicado en 1910, expresa con alguna claridad la peculiar topografía de las lomas de Cuernavaca, que tienen, topográfica y geológicamente, gran semejanza con las lomas del suroeste de la Cuenca de México, en los flancos norte y oriente del mismo nudo del Ajusco.