Repositorio Digital Institucional
"José María Rosa"

Universidad Nacional de Lanús
Secretaría Académica
Dirección de Biblioteca y Servicios de Información Documental

Mónica Serena Perner
serenaperner@gmail.com

Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad

Tesis presentada para la obtención del título de Doctor en Salud Mental Comunitaria del Departamento de Salud Comunitaria

Director de Tesis
Marcio Alazraqui

El presente documento integra el Repositorio Digital Institucional "José María Rosa" de la Biblioteca "Rodolfo Puiggrós" de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
This document is part of the Institutional Digital Repository "José María Rosa" of the Library "Rodolfo Puiggrós" of the University National of Lanús (UNLa).

Cita sugerida

Perner, M. (2019). Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad (Tesis de Doctorado) Universidad Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria. Disponible en <https://doi.org/10.18294/rdi.2020.176363>

Condiciones de uso

www.repositoriojmr.unla.edu.ar/condicionesdeuso

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
Departamento de Salud Comunitaria

Doctorado en Salud Colectiva

Orientación En Epidemiología

2ª cohorte (2014-2016)

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTORA

Título

Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad

Doctoranda

Esp. Mónica Serena Perner

Director

Dr. Marcio Alazraqui

Co-directora

Dra. Gilda Garibotti

Fecha de entrega

Diciembre 2018

Lanús, Argentina

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

Departamento de Salud Comunitaria

Doctorado en Salud Colectiva

Orientación en Epidemiología

2ª Cohorte (2014-2016)

TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTORA

Título

Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad

Doctoranda

Esp. Mónica Serena Perner

Director

Dr. Marcio Alazraqui

Co-directora

Dra. Gilda Garibotti

Integrantes del jurado

Dra. Claudia Medina Coeli

Dr. Usama Bilal

Dr. Andrés Trotta

Fecha de aprobación

25/04/2019

Calificación

10 (diez)

A Marcos, por estar siempre, por su infinita confianza.

A mis hijos Camilo y Fidel.

AGRADECIMIENTOS

A mi director, Marcio Alazraqui por compartir generosamente sus conocimientos, por su respetuosa actitud crítica y su incansable paciencia.

A Nora Baccalá por su valioso acompañamiento.

A Leila Amarin por sus apreciados aportes.

A mis compañeras y compañeros del doctorado con quienes aprendí mucho y compartí hermosos momentos.

A las y los investigadores del ISCo-UNLa, siempre dispuestos ante mis consultas: Vanessa di Cecco, Andrés Trotta, Osvaldo Santiago y Carlos Leveau.

A las y los investigadores de otras instituciones: Soledad Pérez, Ana Ortigoza, Adela Tisnes, Anabella Fantozzi, Diego Díaz Córdova y Facundo Malvicino. A Claudio Morate del INDEC-Bariloche. A las y los trabajadores del Hospital Bariloche y los centros de salud.

A mis hermanas y amigas por su acompañamiento. A Cachu, por las charlas que fueron abriendo caminos en esta tesis. Gracias a vos y Mariano por tener siempre un lugar para alojarme.

A mi mamá y mi papá, por su incondicional apoyo.

A ellos,

“...los que ‘no saben vivir’, los que más dinero dedican a los alimentos materiales, y a los pesados, a los más groseros y a los que más engordan [...], los que menos dedican al vestido y a los cuidados corporales, a la cosmética y a la estética, [...], los que van a plantar sus tiendas en los camping superpoblados, los que se instalan con sus meriendas en los bordes de las carreteras nacionales [...] los que, con todas sus ‘elecciones’ tan mal inspiradas, confirman el racismo de clase, si es necesario, en la convicción de que no tienen más que lo que se merecen....” (Bourdieu, 2012, p. 210).

RESUMEN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las principales causas de defunción. Aspectos vinculados al crecimiento económico, cambios tecnológicos y el nivel de urbanización han generado profundos cambios en los estilos de vida y en el perfil de morbi-mortalidad. Éstos son distintos entre los grupos sociales, así las ECV no afectan a todos los grupos sociales por igual. El objetivo general fue estudiar la presencia de ECV en contextos de desigualdad social. Para ello en primer lugar se realizó un análisis bibliométrico para estudiar la producción científica sobre desigualdades sociales y ECV. Se observó una concentración de las publicaciones en EEUU y Reino Unido, y el lugar periférico de la mayoría de los países latinoamericanos (excepto Brasil), quienes publicaron principalmente en colaboración. Se visibilizaron redes interinstitucionales alrededor de los principales autores que publicaron en la temática. Luego se realizó un análisis espacial en la ciudad de Bariloche, norpatagonia argentina, el cual nos brindó información sobre la distribución en el espacio de las condiciones de vida y problemas de salud. La mayoría de la población estudiada vive en zonas con condiciones de vida críticas. En zonas críticas y deficitarias viven mayor proporción de individuos con ECV y con otros aspectos analizados. Finalmente se realizó un análisis multinivel en la misma ciudad, donde se observaron diferencias en la presencia de distintas ECV al incorporar simultáneamente aspectos individuales, de los vecindarios y de los centros de salud. Todas las ECV estudiadas presentaron mayores *odds* entre los hombres, en mayores a 55 años y en individuos que subieron de peso. Vecindarios con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas mostraron mayores *odds* en dos ECV. Aspectos vinculados a la modalidad de atención mostraron asociación con las distintas ECV. Esta información en conjunto podría ser un aporte para el abordaje de estos problemas de salud al incorporar información sobre aspectos individuales y contextuales para estudiar la ECV.

PALABRAS CLAVES: Disparidades en el Estado de Salud; Factores Socioeconómicos; Enfermedades Cardiovasculares; Sistemas de salud.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases (CVDs) are the main cause of death. Aspects related to economic growth, technological changes, and urbanization level generated deep changes in life styles and morbidity and mortality profile. These are different between social groups, this way CVDs does not affect all social groups equally. The general aim was to study the presence of CVDs in inequality contexts. First, we carried out a bibliometric analysis where we studied scientific production on social inequalities and CVDs. United States and United Kingdom concentrated publications in this topic, most Latin American countries had a secondary role (except Brazil), and published mainly in collaboration. Interinstitutional networks where made visible around the main authors who published in this topic. Then, a spacial analysis was carried out in Bariloche city, Argentinian North-Patagonia, which provided information on living conditions and health problems spacial distribution. Most studied populations lived in living condition critical areas. In critical and deficit areas lived higher proportion of individuals with CVDs and other analyzed aspects. Finally, a multilevel analysis was done in the same city. Differences in different CVDs were observed when adding simultaneously individual, neighborhood and health centers aspects. In all CVDs greater odds in men, older than 55 years, and individuals who gained weight were found. Neighborhoods with higher levels in unsatisfied basic needs showed greater odds in two CVDs. Aspects related to attention modalities were associated with the different CVDs. Together, this information may contribute to incorporate individual and contextual aspects in studying CVDs populations.

KEY WORDS: Health Status Disparities; Socioeconomic Factors; Cardiovascular Diseases; Health Systems.

LISTADO DE FIGURAS

Figura 5.1: Esquema utilizado en Scopus para la selección final de los artículos para el análisis bibliométrico tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión.....	28
Figura 5.2: País de origen de la institución laboral de los autores que han publicado artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975-2016.	30
Figura 5.3: Distribución mundial de la cantidad de publicaciones nacionales sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.	30
Figura 5.4: Distribución mundial de la cantidad de publicaciones colaborativas internacionales sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.	31
Figura 5.5: Red de colaboración entre los autores que han publicado en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.	32
Figura 5.6: Red de colaboración entre instituciones de pertenencia de los cinco principales autores que han publicado en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.	36
Figura 5.7: Tendencia temporal de los artículos publicados sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016 (n=2.979).	38
Figura 6.1: Distribución espacial de los estratos según condiciones de vida en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Año 2010.	50
Figura 6.2: Georreferenciamiento de los domicilios de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según el centro de salud donde han sido atendidos. Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.....	53
Figura 6.3: Características de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro (n=803)*. Años 2014-2015.	55

LISTADO DE CUADROS

Cuadro 5.1: Principales autores (20 primeros) y sus instituciones de pertenencia	34
--	----

LISTADO DE TABLAS

Tabla 5.1: Medidas de centralidad (grado y grado de intermediación intermediación) de la red entre países que publicaron en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular.....	33
Tabla 5.2: Medidas de centralidad (grado y grado de intermediación intermediación) de la red entre instituciones de pertenencia de los cinco principales autores que han publicado en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular.....	37
Tabla 6.1: Características de los vecindarios en base a las zonas con distintas condiciones de vida. San Carlos de Bariloche, Río Negro. Año 2010.....	51
Tabla 6.2: Distribución de las características de los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.	54
Tabla 6.3: Características de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro (n=820). Años 2014-2015.	57
Tabla 6.4: Frecuencia de cada enfermedad cardiovascular de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.....	58
Tabla 7.1: Características demográficas y socioeconómicas de los individuos y los vecindarios. Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.....	72
Tabla 7.2: Problemas de salud de los individuos y características de los centros de salud. Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.....	73
Tabla 7.3: OR (<i>odds ratio</i>) curdo y ajustado en los modelos multinivel para enfermedad cerebrovascular en la población con diabetes y/o hipertensión arterial atendidas en los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015 (n=820).....	76
Tabla 7.4: OR (<i>odds ratio</i>) curdo y ajustado en los modelos multinivel para enfermedad coronaria en la población con diabetes y/o hipertensión arterial atendidas en los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015 (n=820).	77
Tabla 7.5: OR (<i>odds ratio</i>) curdo y ajustado en los modelos multinivel para enfermedad cardíaca hipertensiva en la población con hipertensión arterial atendida en los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015 (n=712).	78

LISTADO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

CCI = coeficiente de correlación interclase

CIE = Clasificación internacional de enfermedades

CS = centro de salud

DE = desvío estándar

ECV = enfermedad cardiovascular

ES = equipo de salud

HC = historia clínica

HTA = hipertensión arterial

IC95% = intervalo de confianza del 95%

IMC = Índice de masa corporal

Kg = kilogramos

Km = kilómetro

OR = odds ratio

NBI = Necesidades Básicas Insatisfechas

RC = radio censal

WOS = Web of Science

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	15
1.1 <i>Desigualdades sociales y enfermedades cardiovasculares</i>	16
1.2 <i>El contexto y sus relaciones con enfermedad cardiovascular</i>	17
1.3 <i>Los estilos de vida y los modos de vida.....</i>	18
2. OBJETIVOS.....	20
3. PROPÓSITO	21
4. PROPUESTA METODOLÓGICA.....	22
5. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 1975-2016.....	23
5.1 <i>Introducción</i>	23
5.2 <i>Metodología.....</i>	25
5.3 <i>Resultados</i>	27
5.3.1 <i>País de la institución de origen de los autores</i>	29
5.3.2 <i>Red de colaboración entre países</i>	31
5.3.3 <i>Principales autores y sus instituciones</i>	34
5.3.4 <i>Tendencia temporal.....</i>	37
5.4 <i>Discusión.....</i>	39
5.4.1 <i>Aspectos geográficos: diferencias en la participación y en las colaboraciones internacionales.....</i>	39
5.4.2 <i>Las redes de colaboración</i>	40
5.4.3 <i>Modificaciones en el tiempo en las publicaciones.....</i>	41
5.4.4 <i>Fortalezas y limitaciones</i>	41
5.5 <i>Conclusión.....</i>	42
6. CONDICIONES DE VIDA Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. ANÁLISIS ESPACIAL EN UNA POBLACIÓN URBANA DE BARILOCHE, NORPATAGONIA ARGENTINA.	43
6.1 <i>Introducción.....</i>	43
6.2 <i>Metodología.....</i>	44
6.2.1 <i>Área de estudio</i>	44
6.2.2 <i>Conformación del sistema de salud</i>	45
6.2.3 <i>Datos, indicadores y análisis</i>	45
6.2.4 <i>Recaudos éticos</i>	48
6.3 <i>Resultados</i>	49

6.3.1 Condiciones de vida.....	49
6.3.2 Sistema de salud	51
6.3.3 Problemas de salud.....	54
6.4 <i>Discusión</i>	59
6.4.1 Relaciones en el espacio entre las condiciones de vida y los problemas de salud.....	59
6.4.2 Vínculos entre modos de vivir y enfermar	60
6.4.3 Agregación espacial y mecanismo de reacción	61
6.4.4 Estrategias individuales, estrategias poblacionales.....	62
6.4.5 Fortalezas y limitaciones	63
7. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN CONTEXTOS DE DESIGUALDAD: ESTUDIO CON ABORDAJE MULTINIVEL EN UNA POBLACIÓN URBANA DE BARILOCHE, NORPATAGONIA ARGENTINA.	64
7.1 <i>Introducción</i>	64
7.2 <i>Metodología</i>	65
7.2.1 Área de estudio	65
7.2.3 Diseño y población.....	66
7.2.4 Unidades de análisis	66
7.2.5 Fuentes de información	66
7.2.6 Variables	67
7.2.7 Análisis de datos	69
7.2.8 Recaudos éticos	69
7.3 <i>Resultados</i>	70
7.3.1 Descripción de la población estudiada	70
7.3.2 Enfermedades cardiovasculares	74
7.4 <i>Discusión</i>	79
7.4.1 Diferencias entre mujeres y hombres: distintos accesos y problemas de salud.....	79
7.4.2 El peso corporal: la relación de pequeños cambios en el peso en personas con obesidad.	80
7.4.3 El trabajo inestable y las obras sociales.....	81
7.4.4 Relaciones entre enfermedad cardiovascular y los entornos.....	82
7.4.5 El sistema de salud y las enfermedades cardiovasculares.....	82
7.4.6 Fortalezas.....	83
7.4.7 Limitaciones	83
7.4.8 ¿Fortaleza o limitación?	84

8. CONCLUSIONES.....	85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	88
APÉNDICES	103
ANEXOS	123
DIARIO DE INVESTIGACIÓN. AÑOS 2014-2018.....	125
CURRICULUM VITAE. PERNER, MÓNICA SERENA	128

1. INTRODUCCIÓN

Modificaciones en la tendencia temporal del perfil de morbilidad y mortalidad se observan a nivel mundial: descensos en la mortalidad general, modificaciones en las causas, aumento en la expectativa de vida y descensos en la natalidad (CELADE, 2005b; CELADE, 2006; Torrado, 2007). Por otro lado, las poblaciones han atravesado un proceso de migraciones y urbanización lo que tiene grandes impactos en la salud de la población y en la modificación de sus estilos de vida (Diez Roux, 2015; CELADE, 1997; Reddy, 2002).

Dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial se encuentran las enfermedades no transmisibles, donde las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa, constituyendo (en el año 2012) el 30% de las muertes; más del 80% de las defunciones por esta causa se produjeron en países de ingresos bajos y medios, afectando casi por igual a hombres y mujeres (Ministerio de Salud, 2009; OMS, 2015; Reddy, 2002). A nivel global y regional se observa un descenso en las tasas de mortalidad cardiovascular, pero un aumento en la carga por enfermedades cardiovasculares; a su vez, presentan diferencias geográficas tanto a nivel nacional como provincial (Ministerio de Salud, 2009; Ministerio de Salud de Río Negro, 2017; UNLa, *et al.*, 2005). Como plantea Srinath Reddy en relación a la epidemia de las enfermedades cardiovasculares:

Los comportamientos de riesgo, factores de riesgo y la carga de enfermedad en países desarrollados fueron inicialmente elevados en los “adoptadores tempranos”¹ (clases sociales altas). Sin embargo, estos factores luego se convirtieron en un fenómeno de masas debido a que los mediadores del riesgo fueron producidos para el consumo masivo. Finalmente se impuso una mayor carga de enfermedad a los “adoptadores tardíos”² (clases sociales bajas), mientras los adoptadores tempranos redujeron su riesgo en respuesta a los nuevos conocimientos y tecnologías [Comillas en el original]. (Reddy, 2002, p. 232)³.

Como fue planteado, estas enfermedades no afectan a todos los grupos por igual. Así se buscó problematizar estas diferencias y estas modificaciones que se han ido presentando a nivel geográfico (entre países de altos, medianos y de bajos ingresos) y entre clases

¹ Del inglés *early adopters*, también traducido como primeros seguidores o primeros adoptantes. Fue desarrollado por Everett Rogers en relación a los perfiles de adoptadores/adoptantes (*adopters*) de innovaciones, los *early adopters* son presentados como los iniciadores de nuevas tendencias donde su opinión es observada por otros potenciales adoptadores/adoptantes (Rogers, 2002).

² Del inglés *late adopters*.

³ Traducción libre de la autora. Original en inglés: “*Risk behaviours, risk factors and disease burdens in the developed countries were initially higher in the ‘early adopters’ (the higher social classes). However, these factors later became a mass phenomenon as the mediators of risk were abundantly produced for mass consumption and ultimately imposed the highest burdens of disease on the ‘late adopters’ (lower social classes), as the early adopters reduced their risk in response to new knowledge and new technologies*”.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

sociales. Para introducir a esto, en un primer momento se analiza la relación entre las desigualdades sociales y las enfermedades cardiovasculares, y su relación con la urbanización de las poblaciones. Luego se desarrollan las propuestas analíticas para estudiar el contexto y su relación con problemas de salud.

1.1 Desigualdades sociales y enfermedades cardiovasculares

En la actualidad se han incrementado las investigaciones sobre las enfermedades cardiovasculares donde se analizan los determinantes sociales implicados en su desarrollo, buscando así la relación entre factores biológico/genéticos y sociales (Kaplan & Keil, 1993; Fleischer & Diez Roux, 2013; Riva, *et al.*, 2007; Cerezo-Correa, *et al.*, 2012). La expresión biológica de la desigualdad social se refiere a cómo las personas incorporan y expresan biológicamente sus experiencias de desigualdad económica y social, desde la vida intrauterina hasta la muerte (Krieger, 2002). Los grupos con peores condiciones socioeconómicas no sólo sufren una mayor carga de la enfermedad, sino que además presentan enfermedades crónicas e incapacidades a edades más tempranas y tienen un menor acceso a los servicios de salud (Schneider, *et al.*, 2002).

Como plantean Yoav Ben Shlomo y Diana Kuh, “hacia fines del siglo XX han habido muchos debates en torno a la necesidad de teorías epidemiológicas, particularmente en relación a las desigualdades en salud”⁴ (Ben-Shlomo & Kuh, 2002, p. 288). Existe gran cantidad de publicaciones que demuestran que en la población general la privación social y material están directamente relacionadas con la incidencia y prevalencia de enfermedades e inversamente relacionadas al estado de salud. Así, se relacionan las condiciones de vida y los niveles de salud, donde cuánto mayor es la desigualdad entre grupos sociales, peores son los indicadores (Almeida-Filho, 1999; Fleischer & Diez Roux, 2013; Schneider, *et al.*, 2002; Spinelli & Alazraqui, 2008).

Por otro lado, un aspecto que influye en el perfil epidemiológico de una población es su nivel de urbanización, el cual viene aumentando tanto a nivel mundial como a nivel local (en Latinoamérica y en Argentina) (OMS, 2014). La urbanización de una población implica modificaciones en sus estilos de vida (debido a cambios en la alimentación, sedentarización, obesidad), sumado a la presencia en los espacios urbanos de poblaciones con diversidades étnicas/raciales y con diferencias socioeconómicas, se manifiesta esto en desigualdades en salud y las consecuentes diferencias en la salud, espacialmente visibilizadas a través de los barrios (Diez Roux, 2015; Fleischer, *et al.*, 2011).

⁴ Traducción libre de la autora. Original en inglés: “The end of 20th century has seen much debate around the need for epidemiological theory, particularly in relation to health inequalities”.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Las ciudades como espacios urbanos presentan factores en múltiples niveles de organización, como por ejemplo aspectos vinculados a sus gobiernos, vecindarios, instituciones, familias e individuos, heterogéneos entre ellos pero con cierta dependencia a su interior (entre personas que viven en un mismo vecindario, entre miembros de una misma familia o entre individuos de una misma institución) (Diez Roux, 2015).

1.2 *El contexto y sus relaciones con enfermedad cardiovascular*

Distintas propuestas desde la Salud Colectiva buscan incorporar lo social, lo contextual en el desarrollo de problemas de salud, éstas “no implica(n) negar la biología, sino mirar lo fenómenos biológicos dentro de sus contextos sociales” (Diez Roux, 2008, p. 73). Implica integrar lo individual en modelos más amplios que incorporen determinantes a nivel grupal o social.

Los fenómenos sociales no se distribuyen en el espacio geográfico de manera homogénea (Buzai, 2014). Incorporar el espacio geográfico producido y reproducido socialmente es clave para interpretar los procesos de fragmentación y la desigual apropiación de los aspectos que definen las condiciones de vida y, en consecuencia, las condiciones de salud (Vega, *et al.*, 2008).

Así, los grupos poblacionales a través de sus acciones y en interacción con otros grupos van construyendo el espacio social donde viven; el espacio así es “una expresión de las condiciones de vida de la población” (Spinelli & Alazraqui, 2008, p. 25).

Podemos describir diferentes maneras de estudiar la relación entre contexto, entre espacio y salud. Uno de estos enfoques proponen el análisis de aspectos individuales y características de los lugares para analizar cómo influyen ambos en la salud de sus residentes, para ello se pueden emplear modelos de análisis multinivel. Un segundo abordaje se enfoca en analizar las desigualdades en salud entre distintos lugares como resultado de patrones espaciales (Aschan-Leygonie, *et al.*, 2013). Ambos análisis en conjunto permiten un análisis de problemas de salud de forma complementaria, por un lado analizar los patrones espaciales y por el otro medir aspectos individuales y de los lugares para estudiar problemas de salud.

Los problemas de salud se producen en un espacio determinado, donde siempre se revela el cotidiano compartido y complementado y donde los procesos que lo determinan adquieren características que los hacen únicos (Santos, 1996; 2000). Así, el territorio debe formar parte del estudio de los problemas, el análisis espacial es un recurso clave para localizarlos, para especificar así las acciones.

Por otro lado, estas propuestas que buscan articular niveles de complejidad, analizando la realidad en niveles múltiples, donde el *macronivel* se encuentra entrelazado con

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

un *micronivel*. La integración de estos niveles mediante un enfoque analítico, cuyo origen también está en las Ciencias Sociales (en las áreas educación, sociología y demografía) como lo es el análisis multinivel, nos permitirá incorporar determinantes en distintos niveles en el estudio de problemas de salud (Diez Roux, 2003).

Así, técnicas de análisis multinivel nos permitirán comprender los espacios urbanos en niveles de organización para analizar problemas complejos como las enfermedades cardiovasculares. Mediante el análisis multinivel se analizan factores actuando en niveles jerárquicos, desde lo macro-económico hasta el molecular (Ben-Shlomo & Kuh, 2002). Parten del concepto de la influencia de los grupos sociales en los cuales están insertos los individuos, donde las características de estos grupos están influenciadas por los individuos que los constituyen (Hox, 1995). Entonces, los modelos multinivel integran individuos dentro de sus grupos o contextos sociales, analizando los efectos combinados tanto de las variables individuales como de las grupales.

El desafío planteado entonces es, a partir del análisis multinivel, analizar la relación entre las enfermedades cardiovasculares y los grupos sociales en los cuales están insertos los individuos (Hox, 1995). Integrando así los individuos dentro de sus grupos o contextos sociales, analizando los efectos combinados tanto de las variables individuales como de las grupales, buscando esta relación entre aspectos de una micronivel y de un macronivel. Cada uno de estos problemas de salud se encuentra determinado por factores que deben ser pensados en distintos niveles de análisis.

Las variables medidas a nivel poblacional afectan a los individuos directamente a través de las elecciones realizadas por cada uno; muchas variables medidas individualmente son fuertemente condicionadas por procesos sociales que operan en el nivel de grupo social. La posibilidad de adoptar cierto comportamiento depende en parte del grado en que este comportamiento fue adoptado por la comunidad (Mendonça, 2001).

1.3 Los estilos de vida y los modos de vida

Los riesgos desde la perspectiva biomédica son usados para el medir, por ejemplo, el “riesgo cardiovascular” se toman en cuenta patrones de comportamiento dañinos individuales que afectan el estado de salud de un individuo; los estilos de vida desde ésta perspectiva son utilizados para describir hábitos diarios y comportamentales individuales. Vinculando de esta manera los estilos de vida a comportamientos específicos identificados como factores de riesgo (Coreil, *et al.*, 1985).

Distintos referentes de la Salud Colectiva, como Naomar de Almeida Filho (2000), Ricardo Ayres (2005), David Castiel (2006), éste junto a Carlos Álvarez-Dardet (2007; 2010)

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

y Eduardo Menéndez (Menéndez, 2009), traen desde distintas aristas críticas al concepto de riesgo. Proponen que el mismo en la actualidad es empleado para analizar problemas de salud desde una perspectiva individualizada y bajo el principio de homogeneidad (Almeida Filho, 2000), donde la causalidad es transformada en una asociación probabilística traducida en riesgo (Ayres, 2005), donde los riesgos son usados como una forma de predecir el futuro (Castiel, 2006); “huir de los riesgos se transformó en sinónimo de estilo de vida sano” (Almeida Filho, 2000, p. 325).

A su vez, desde la Salud Colectiva fueron propuestas nuevas conceptualizaciones que buscan recuperar e incorporar lo social, lo contextual, lo poblacional, en el estudio de los problemas de salud: epidemiología del modo de vida (Almeida Filho, 2000); vulnerabilidad (Ayres, 2005), los estilos de vida colectivos (Castiel & Álvarez-Dardet, 2007; Castiel & Álvarez Dardet, 2010); y la propuesta analítica del modo de vida (Possas, 1989). Así, Naomar de Almeida Filho plantea que debemos “superar los conceptos de causa y de riesgo”, buscar “una apertura para distintos niveles y categorías de determinación, potencialmente más capaces de dar cuenta de la complejidad de los objetos concretos de la salud colectiva” (Almeida Filho, 2000, p. 293).

Ana Diez Roux plantea que se han ido aplicando “estrategias que aíslan y diseccionan los riesgos en la investigación epidemiológica”, lo cual refuerza la idea que las verdaderas causas de enfermedad deben encontrarse exclusivamente a nivel individual. “La tarea actual de la epidemiología es volver a unir las partes una vez examinadas y reconsiderar la dimensión de la población o la sociedad” (Diez Roux, 2008, p. 73).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Indagar la presencia de enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad social.

Objetivos específicos

- Analizar la producción científica sobre enfermedad cardiovascular y desigualdades sociales a nivel mundial.
- Analizar el patrón espacial de enfermedad cardiovascular de personas con diabetes y/o hipertensión arterial que fueron atendidas en los años 2014 y 2015 en los centros de salud públicos de Bariloche, norpatagonia Argentina.
- Indagar la relación de aspectos medidos en el nivel individual, vecindarios y del sistema de salud con la presencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes y/o hipertensión arterial de Bariloche norpatagonia Argentina durante los años 2014-2015.

3. PROPÓSITO

Esta investigación tiene como objeto producir conocimiento sobre las personas que viven con enfermedades cardiovasculares en Bariloche, ubicada en el área andina de la norpatagonia Argentina mediante una forma de pensar los problemas de salud desde lo contextual, con el propósito de producir conocimiento que integre aspectos individuales y contextuales en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Esto fue realizado a partir de la visibilización de la distribución de la enfermedad en el espacio y al analizar una manera de abordar estos problemas de salud donde se estudien conjuntamente aspectos individuales, de los vecindarios donde viven los individuos y de los centros de salud. Finalmente se buscará transmitir información local generada a los trabajadores de la salud de las instituciones locales.

4. PROPUESTA METODOLÓGICA

El objetivo general fue trabajado mediante diferentes abordajes metodológicos, los cuales en conjunto buscan analizar la enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad social.

En el capítulo 5 fue realizado un análisis bibliométrico para estudiar la producción científica sobre enfermedad cardiovascular y desigualdades sociales a nivel mundial, analizar las redes de colaboración internacionales, los principales autores que han publicado en la temática y el lugar ocupado por publicaciones de instituciones latinoamericanas.

Los capítulos 6 y 7 han sido estudiadas las personas con diabetes y/o hipertensión arterial que concurren a los centros de salud públicos de una localidad de la norpatagonia argentina. Para ello se emplearon las siguientes fuentes de información: historias clínicas de los centros de salud públicos para caracterizar las personas, entrevistas a agentes sanitarios para caracterizar los centros de salud y del censo de población, hogares y viviendas para caracterizar los vecindarios. De cada una de estas fuentes fueron construidos distintos aspectos (Apéndices A, B, C y D). En el capítulo 6 fueron analizadas la distribución espacial de las condiciones de vida y su relación con enfermedad cardiovascular. En el capítulo 7 ha sido realizado un análisis multinivel, para ello se relacionaron aspectos a el nivel individual, nivel vecindarios y del sistema de salud con la presencia de enfermedad cardiovascular.

5. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, 1975-2016

5.1 Introducción

La carga de enfermedad por enfermedades cardiovasculares (ECV) está aumentando y representa la principal causa de muerte a nivel regional y mundial (CELADE, 2006; OMS, 2015; Ministerio de salud, 2009), reflejándose como un problema de salud tanto en países de altos, como de medianos y bajos ingresos (CELADE, 2006; Anderson, 2009). En el año 2012 representaron el 30% de las muertes en el mundo; si sumamos todas las enfermedades no transmisibles se llega al 68% de las muertes (OMS, 2015).

Por otro lado, aproximadamente 42% de las muertes por enfermedades no transmisibles fueron antes de los 70 años (muertes prematuras) y la mayoría de éstas (82%) se produjeron en países de ingresos bajos y medios (OMS, 2015). Así, las diferencias que se puedan observar entre ellos o a su interior, nos lleva al estudio de las inequidades sociales en los problemas de salud, donde peores condiciones de vida se relacionan con peores indicadores de salud (Alazraqui, *et al.*, 2007; Schneider, *et al.*, 2002; Bouchard, *et al.*, 2015). En los últimos años existe un volumen creciente de publicaciones que muestran el efecto de las inequidades sociales en los problemas de salud (Almeida-Filho, *et al.*, 2003; Bleich, *et al.*, 2012). Distintos autores han publicado revisiones que muestran la relación entre condiciones socioeconómicas y enfermedades cardiovasculares (Fleischer & Diez Roux, 2013; Tang, *et al.*, 2016; Agardh, *et al.*, 2011; Ricchi-Cabello, *et al.*, 2010; Brown, *et al.*, 2004; Grotto, *et al.*, 2008). A partir de esto se va a jerarquizando y recuperando el lugar de lo socio-histórico en el estudio del proceso salud enfermedad abandonado por la biomedicina (Almeida-Filho, *et al.*, 2003; Marmot, 2005).

Para poder afrontar estos cambios es necesario el impulso local de políticas públicas, estrategias y programas locales para abordar las ECV mediante, entre otros, el desarrollo local de investigaciones y el consiguiente desarrollo de estrategias para su abordaje. Países con menores ingresos no invierten suficiente presupuesto en investigación, lo que se traslada en una menor capacitación, en una peor calidad de las investigaciones y en una baja producción científica (Prabhakaran, *et al.*, 2007). En contraparte, países de altos ingresos (como EEUU, Reino Unido y Japón) concentran gran parte de las investigaciones en esta temática, donde la mayoría son escritas en idioma inglés y publicadas en revistas con alto índice de impacto (Bouchard, *et al.*, 2015).

Por otro lado, América Latina presenta una larga tradición en investigación tanto teórica como empírica sobre desigualdades sociales, vinculado al movimiento de la Medicina Social

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

(Almeida-Filho, *et al.*, 2003). Ésta muestra un mayor peso (cantidad de publicaciones y países) al incorporar en el análisis “bibliografía gris” (Almeida-Filho, *et al.*, 2003), publicaciones que no se encuentran indexadas y por lo tanto disponibles en grandes bases de datos como Web of Science (WOS), Scopus o PubMed.

Es así que nos preguntamos ¿cómo ha sido la producción científica entre los países sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular? ¿Cómo han sido las relaciones y las colaboraciones internacionales en esta producción científica? ¿Cuál es el lugar que tiene Latinoamérica en esta producción científica?

Las publicaciones de artículos en revistas *peer-reviewed* nos pueden proporcionar una aproximación sobre la magnitud y desarrollo de investigaciones en cierta temática. La cuantificación y comparación de las investigaciones desarrolladas a nivel mundial puede ser potencialmente útil a responsables de la formulación de políticas públicas, agencias de financiamiento y a los gobiernos para establecer prioridades, asignar recursos y financiar la investigación en salud (Prabhakaran, *et al.*, 2007).

El análisis bibliométrico es un análisis cuantitativo para medir patrones de publicaciones científicas y citaciones, pudiendo ser útil para evaluar el impacto de investigaciones en el área de salud (Ismail, *et al.*, 2012). Las bases de datos bibliográficas son la principal fuente de información utilizada en este tipo de estudios (Granda-Orive, *et al.*, 2013). Existen distintas bases, pero son dos las principalmente empleadas: WOS de Thomson Reuters y Scopus de Elsevier. Ambas bases pertenecen a compañías comerciales y requieren de un acceso pago. WOS ha sido la “única herramienta, internacional y multidisciplinaria, disponible para el acceso a la literatura de ciencia, tecnología, biomedicina y otras disciplinas” (Granda-Orive, *et al.*, 2013, p. 2) hasta el año 2004, cuando Elsevier fundó Scopus. Ésta última tiene más de 55 millones de registros que datan del año 1823 (Elsevier, 2015). Diferentes publicaciones han comparado la cobertura de publicaciones entre ambas bases de datos (WOS y Scopus) en general (Gavel & Iselid, 2008) o sobre alguna temática en particular: tabaquismo (Granda-Orive, *et al.*, 2013) anatomía y morfología (Hernández-González, *et al.*, 2016), brucelosis (Falagas, *et al.*, 2008), oncología (López-Illescas, *et al.*, 2008). En todas ellas la cobertura fue mayor en Scopus que en WOS. Por otro lado, otra publicación muestra una elevada correlación entre ambas bases de datos en la cantidad de artículos por país, citaciones y países (Archambault, *et al.*, 2009).

En Latinoamérica la cobertura de revistas es mayor en Scopus que en WOS (2010); un 2,5% de las revistas indexadas de Scopus y un 0,9% en WOS del total mundial son revistas latinoamericanas.

Han sido publicadas algunas investigaciones sobre análisis bibliométrico en relación a ECV en general y otras sobre problemas vinculados a ECV: diabetes, accidente

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

cerebrovascular, retinopatía diabética; todas empleando la base de datos WOS. Así, fueron encontrados análisis bibliométricos sobre ECV a nivel mundial (Gal, *et al.*, 2017; Huffman, *et al.*, 2013), en países africanos (Bloomfield, *et al.*, 2015) y en países latinoamericanos (Colantonio, *et al.*, 2015). En este último podemos ver que a nivel latinoamericano Brasil fue el país donde hubo mayor cantidad de publicaciones sobre ECV, seguido por Argentina, México y Chile (Colantonio, *et al.*, 2015).

Análisis bibliométricos sobre temáticas vinculadas a ECV a nivel mundial (Asplund, *et al.*, 2012; Geaney, *et al.*, 2015; Caglar, *et al.*, 2016), nos muestran que los principales países de origen de estas publicaciones fueron EEUU, Reino Unido y Japón. Así, EEUU representó entre un 24 y un 28,7% de la cantidad de publicaciones, seguido por Reino Unido entre un 8 y 10% y Japón en tercer lugar (entre 6,7% y 8%).

Por otro lado, fueron realizados distintos análisis bibliométricos sobre desigualdades sociales, a nivel mundial (Bouchard, *et al.*, 2015) y en Latinoamérica (Almeida-Filho, *et al.*, 2003). La primera de ellas empleando la base de datos WOS y la segunda empleando diferentes bases de datos.

Se han publicado análisis bibliométricos sobre ECV por un lado y sobre desigualdades sociales por el otro, pero no hemos encontrado sobre estos dos temas en conjunto: el estudio de ECV y desigualdades sociales.

Por otro lado, la principal base de datos empleada para las investigaciones presentadas fue WOS, siendo que Scopus ha presentado una mayor cobertura.

Así, el objetivo general fue buscar conocer la producción científica sobre desigualdades sociales y ECV a nivel mundial, buscando analizar la tendencia temporal, la distribución mundial (en cuanto a los países y los principales autores) y las relaciones internacionales.

5.2 Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Scopus (Elsevier, 2017). Para ello se combinaron palabras de dos grupos: uno con términos vinculados a las desigualdades sociales (grupo 1: *health inequalities, social inequalities, contextual, social disparities, neighbourhood*) y el otro con problemas de salud en relación a enfermedad cardiovascular (grupo 2: *cardiovascular, diabetes, hypertension, stroke, infarction*). Éstos fueron empleados como términos libres presentes en el “título, las palabras claves y resumen”.

Los criterios de selección fueron: a) artículos escritos como resultado de investigaciones empíricas (incluyendo solamente trabajos a partir del término “*article*” del campo *Document Type*); b) artículos publicados hasta el año 2016.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Fueron eliminados: a) los artículos que presentaron duplicados (debido a la estrategia empleada que generó que se repitiesen los artículos tras las sucesivas búsquedas), b) los artículos sin el campo *Authors*, ya que sin los autores no se permitía completar parte del análisis propuesto y c) los artículos que investigaron otros problemas de salud y que no tuvieron un análisis de desigualdades sociales.

Se realizó un análisis bibliométrico mediante dos estrategias: una descriptiva y una relacional (Bouchard, *et al.*, 2015). Para ambos abordajes fueron analizados los países que publicaron en esta temática. Para definir los “países” se imputó el nombre del país de acuerdo al país en base a la primera dirección institucional de cada autor (Gal, *et al.*, 2017; Bloomfield, *et al.*, 2015). En el caso donde todos los autores del artículo pertenecían a instituciones de un mismo país fueron denominadas “publicaciones nacionales”; en el caso donde los distintos autores pertenecían a más de un país: “publicaciones colaborativas internacionales”. En este último caso, a cada país se le asignó una fracción de ese artículo dependiendo de la cantidad de países y autores presentes; por ejemplo, un artículo con dos autores/as de un país y un autor/a de otro país, al primer país se le asignaron dos tercios el artículo y al otro país, un tercio (Asplund, *et al.*, 2012; Bloomfield, *et al.*, 2015; Huffman, *et al.*, 2013). Para construir la representación gráfica de la red fueron incluidos los países que sumaron al menos un artículo sumando las fracciones de artículos.

Las medidas descriptivas dan cuenta de la actividad, el volumen y la distribución de las publicaciones. Para esto fueron analizados los países de las instituciones, los autores que más publicaron y la tendencia temporal. Para el análisis relacional se analizaron las redes de colaboración internacional entre países y entre instituciones.

Fueron graficadas redes y analizado el tamaño de los nodos y el grosor de las aristas. El tamaño de los nodos (nombres de los países/instituciones) representó el volumen total de publicaciones en las cuales ese país/autor participó de manera colaborativa y el grosor de las aristas representó la cantidad publicaciones colaborativas entre esos países/instituciones. Así, a mayor tamaño del nombre y mayor grosor de la línea, mayor cantidad de publicaciones colaborativas donde participó ese país/institución y mayor cantidad de colaboración internacional/interinstitucional.

Luego fueron analizadas dos medidas de centralidad de las redes: el “grado” y el “grado de intermediación” (*betweenness centrality*). El grado indica la cantidad de lazos que posee cada nodo. El grado de intermediación mide la proporción de veces que un actor está ubicado entre otros actores, cuantos actores dependen de mí para hacer conexiones con otra gente, quien está más equidistante del resto de la red (Hanneman & Riddle, 2005). Finalmente fueron detectadas “comunidades” de la red interinstitucional a partir del estadístico “modularidad” y de su visualización en el gráfico de red mediante distintos colores.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Para estos análisis fueron utilizados los *software Excel 2013* y *Gephi 0.9.1* para los gráficos de redes.

Esta investigación fue aprobada por la Comisión de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Lanús con fecha del 19/06/2018.

5.3 Resultados

Fueron recuperados 11.229 artículos, de éstos fueron excluidos 15 artículos por no tener registrados los autores y 4.318 por ser duplicados. El elevado volumen de artículos duplicados se debió a la estrategia de búsqueda empleada (ver 5.2. Metodología). Luego de aplicar los criterios de selección quedaron un total de 4.688 artículos (se eliminaron 1.945 por no ser artículos empíricos y 263 por haber sido publicados en el año 2017). Finalmente, tras la búsqueda en el título y, en segundo lugar en el resumen o palabras claves de los diferentes términos seleccionados en la estrategia de búsqueda vinculados a las desigualdades sociales, fueron descartados 1.709 artículos, quedando un total de 2.979 artículos (Figura 5.1).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Figura 5.1: Esquema utilizado en Scopus para la selección final de los artículos para el análisis bibliométrico tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión.

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

5.3.1 País de la institución de origen de los autores

Para el análisis de los países fue imputado el país de origen de la institución de cada autor. Así la mayoría de los artículos (el 87%, 2.593 artículos), fueron publicados por autores pertenecientes a un solo país (publicaciones nacionales), en relación al 12,3% (368 artículos) de los artículos que fueron publicaciones donde figuraba más de un país (publicaciones colaborativas internacionales); en los restantes artículos no figuraba el país de los autores. En total hubo más países que publicaron artículos en conjunto que países que publicaron solos (89 vs 73 países). En consecuencia, hubo más países presentes en el 12,3% de las publicaciones colaborativas internacionales, que en el 87% de las publicaciones nacionales. Si sumamos las fracciones que corresponden a cada colaboración internacional, más de la mitad de los países que publicaron colaborativamente (54%) no llegan a la suma de un artículo.

Los dos principales países de origen institucional de los autores, tanto de manera sola como en colaboración, fueron EEUU y Reino Unido. EEUU estuvo presente en 36,6% (1089 artículos), Reino Unido en 14,4% (430 artículos). Si solamente analizamos las publicaciones colaborativas, la cantidad de artículos de estos dos países fue similar: EEUU sumó el 17,4% (64 artículos) y Reino Unido el 16% (59 artículos) de las publicaciones colaborativas internacionales (Figuras 5.2, 5.3 y 5.4).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Figura 5.2: País de origen de la institución laboral de los autores que han publicado artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

^a Suma de fracciones de artículos.

Figura 5.3: Distribución mundial de la cantidad de publicaciones nacionales sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Figura 5.4: Distribución mundial de la cantidad de publicaciones colaborativas internacionales sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

5.3.2 Red de colaboración entre países

Para analizar la red de colaboración internacional fueron empleados los países (en base al país de la institución laboral de cada autor/a) que sumaran al menos un artículo. Los actores más influyentes (con mayor grado de vínculos) fueron Reino Unido, EEUU y Países Bajos (Figura 5.5). El promedio del grado (de vínculos de cada país) fue de 8,6 ($\pm 7,7$ DE), con un rango entre 1 y 35.

Con respecto al grado de intermediación hubo mucha variación (desde 0 a 216,57), con un promedio de 17,35. Pocos fueron los países con mayor poder de acuerdo a esta medida: Reino Unido, EEUU, Francia, Países Bajos y Canadá. Hubo países que presentaron grados cercanos al promedio, pero bajos grados de intermediación. Esto significa que tienen valores promedio de vínculos con otros países pero se encuentran ubicados en zonas desfavorables, con menos caminos, por lo tanto con mayor dependencia de otros países (Tabla 5.1).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Figura 5.5: Red de colaboración entre los autores que han publicado en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

Nota: La red fue realizada con los países (a partir de las instituciones laborales) que sumaron al menos un artículo (al sumar las fracciones de artículos realizados en colaboración internacional).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Tabla 5.1: Medidas de centralidad (grado y grado de intermediación) de la red entre países que publicaron en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular.

País	Grado ^a	Grado de Intermediación ^b	País	Grado ^a	Grado de Intermediación ^b
Reino Unido	35	220,90	Rep. Checa	3	2,06
EEUU	32	216,57	Sudáfrica	5	2,05
Francia	14	40,49	Dinamarca	10	1,84
Países Bajos	22	32,92	Finlandia	10	1,29
Canadá	17	32,32	Tailandia	5	1,08
Australia	14	28,01	Austria	5	0,82
Alemania	16	21,97	México	4	0,78
Suecia	17	14,82	Noruega	6	0,52
Italia	10	10,19	Burkina Faso	2	0,33
Japón	8	8,83	Colombia	6	0,17
España	11	8,76	Nueva Zelanda	6	0
Portugal	10	8,75	Chile	3	0
Suiza	14	8,34	Grecia	3	0
Ghana	5	8,23	Bangladesh	2	0
Bélgica	10	5,59	Corea del Sur	2	0
India	9	4,68	Costa Rica	2	0
Brasil	6	4,43	Irán	2	0
China	7	2,88	Irlanda	2	0
Argentina	6	2,31	Arabia Saudita	1	0
Hungría	3	2,06	Trinidad y Tobago	1	0

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

Nota: El orden en la tabla fue establecido en base al valor del grado de intermediación.

^a Grado: Cantidad de publicaciones colaborativas que presenta ese país.

^b Grado de intermediación: la proporción de veces que un actor está ubicado entre otros actores.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

5.3.3 Principales autores y sus instituciones

Los cinco autores con más publicaciones fueron (en orden de frecuencia) Ana Diez Roux de EEUU, Johan Mackenbach de Países Bajos, Michael Marmot y Simon Capewell de Reino Unido y Anton Kunst de Países Bajos (Cuadro 5.1).

Cuadro 5.1: Principales autores (20 primeros) y sus instituciones de pertenencia.

Nº Autor/a	Cantidad de artículos	Año ^a	Instituciones ^b y país
1 Diez Roux A.V.	62	1995	Columbia University, New York, United States ; Division of General Medicine, New York, United States ; Department of Epidemiology, Univ. of Michigan Ann Arbor, United States ; Dornsife School of Public Health, Drexel University, Philadelphia, United States
2 Mackenbach J.P.	38	1996	Department of Public Health, Erasmus, Rotterdam, Netherlands
3 Marmot M.G.	34	1984	Department of Community Medicine, University College London, United Kingdom ; Department of Epidemiology and Public Health, University College, London, United Kingdom ; International Centre for Health and Society, Department of Epidemiology and Public Health, London, United Kingdom
4 Capewell S.	25	2001	Department of Public Health, University of Liverpool, Liverpool, United Kingdom
5 Kunst A.E.	24	1998	Department of Public Health, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands
6 Karter A.J.	21	2000	Division of Research, Kaiser Permanente Med. Care Program, Oakland, United States ; Kaiser Permanente Northern California Division of Research, Department of Health Services, University of Washington, United States
7 Regidor E.	21	2000	Department of Preventive Medicine and Public Health, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, España ; CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Barcelona, España
8 Borrell C.	20	2001	Agència de Salut Pública de Barcelona, España ; Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España ; CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
9 Kawachi I.	20	1991	Dept. of Health and Social Behavior, Harvard School of Public Health, Boston, MA 02115, United States
10 Sundquist K.	19	2004	Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden ; Lund University, Malmö, Sweden

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Cuadro 5.1: Continuación

Nº Autor/a	Cantidad de artículos	Año ^a	Instituciones ^b y país
11 Mielck A.	19	1992	Institute of Health Economics and Health Care Management, Neuherberg, Germany
12 Chaix B.	18	2006	Department of Clinical Sciences in Malmö, Malmö University Hospital, Sweden ; Université Pierre et Marie Curie-Paris, France
13 Smith G.D.	17	1996	Department of Social Medicine, University of Bristol, United Kingdom
14 Costa G.	17	2000	University of Turin, Italy
15 Martikainen P.	16	2000	Department of Sociology, University of Helsinki, Finland ; International Centre for Health and Society, Department of Epidemiology and Public Health, UCL Medical School, London, United Kingdom
16 O'Flaherty M.	16	2009	Institute of Psychology, Health and Society, University of Liverpool, United Kingdom
17 Sundquist J.	15	1999	Lund University, Malmö, Sweden ; Stanford University, School of Medicine, United States ; Karolinska Institutet, Stockholm; Sweden
18 Millett C.	14	2007	Department of Primary Care and Social Medicine, Imperial College Faculty of Medicine, London, United Kingdom ; Department of Primary Care and Public Health, Imperial College London, United Kingdom ; South Asia Network for Chronic Diseases, Public Health Foundation of India, New Delhi, India .
19 Schillinger D.	14	2009	University of California, San Francisco School of Medicine, Center for Vulnerable Populations, San Francisco, United States
20 Subramanian S.V.	14	2010	Department of Society, Human Development and Health, Harvard School of Public Health, Harvard University, United States

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

^a Año de la primera publicación.

^b En algunos casos figura más de una institución debido a que ésta se fue modificando en los distintos artículos y lo largo del tiempo.

Si observamos la red de colaboración entre instituciones de estos autores podemos observar una zona de la red alrededor de Diez Roux (una “comunidad”) y sus vínculos con instituciones de EEUU y por el otro los cuatro autores de países europeos (dos de Reino Unido y dos de Países Bajos) con una gran red entre ellos (Figura 5.6).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Figura 5.6: Red de colaboración entre instituciones de pertenencia de los cinco principales autores que han publicado en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016.

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

Nota: Los colores de las aristas representan las comunidades detectadas a partir del estadístico “modularidad”.

Mackenbach presentó la mayor cantidad de vínculos, seguido por Diez Roux, Kunst, Marmot y Capewell (39, 37, 32, 23, 18 grados respectivamente) (Tabla 5.2).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Tabla 5.2: Medidas de centralidad (grado y grado de intermediación) de la red entre instituciones de pertenencia de los cinco principales autores que han publicado en conjunto artículos sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular.

Autor/a	Grado ^a	Grado de intermediación
A. V. Diez Roux	37	2.65
J. P. Mackenbach	39	1.98
M. G. Marmot	23	1.36
S. Capewell	18	1.01
A. E. Kunst	32	94

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

Nota: El orden en la tabla fue establecido en base al valor del grado de intermediación.

^a.Grado: Cantidad de publicaciones colaborativas que presenta ese país.

^b.Grado de intermediación: la proporción de veces que un actor está ubicado entre otros actores.

Otra medida analizada en la red fue la centralidad del grado de intermediación (*betweenness centrality*). Al comparar estos cinco autores, Diez Roux presentó el valor más elevado (2.658,51), seguido de Mackenbach (1.983,96), Marmot, Capewell y quinto, Kunst. Entonces Diez Roux fue la autora ubicada en la posición más favorable (en relación a los otros cuatro autores analizados), ya que de ella dependieron mayor cantidad de instituciones para hacer conexiones con otras instituciones (Tabla 5.2).

En este sentido, fueron distintos los países (y continentes) con los que cada autor se vinculó. Mientras Diez Roux lo hizo principalmente con instituciones de EEUU y latinoamericanas (de Brasil, México y Argentina), Marmot presentó una mayor colaboración internacional con instituciones de distintos continentes: instituciones asiáticas, americanas (de EEUU y Colombia), y europeas. Capewell lo hizo con instituciones americanas (Canadá y Brasil) y europeas.

Fueron detectadas cuatro comunidades a partir del estadístico “modularidad” del Gephi, así se observan en la Figura 5.6 en cuatro colores distintos quedando unidos en una misma comunidad Kunst y Mackenbach.

5.3.4 Tendencia temporal

Al analizar la cantidad y la tendencia de las publicaciones a lo largo del tiempo podemos ver que la primera publicación sobre desigualdades sociales y ECV encontrada en Scopus fue en el año 1975 (siendo que Scopus tiene registros desde el año 1823), publicada por autores de instituciones de EEUU. El primer estudio de autores de instituciones de Reino Unido fue publicado por Marmot, Shipley y Rose en el año 1984 a partir del análisis de la cohorte Whitehall (1984). Ese año también aparece la primera publicación de Brasil (principal

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

país que ha publicado de Latinoamérica); la primera publicación de un país latinoamericano fue en el año 1976, realizada por autores de instituciones de El Salvador.

A nivel general, se observa un ascenso década tras década de manera exponencial: con una media de 3,8 artículos por año en la década del '80, de 17,2 artículos en la década de 1990, de 89,4 en los 2000 y de 268 en parte de la última década analizada (hasta 2016). A partir de mediados de la década del '90 se comienzan a duplicar los artículos cada 5 años. La disminución en la cantidad de artículos en 2016 puede deberse al retraso en la carga de las publicaciones en las bases relevadas (Figura 5.7).

Figura 5.7: Tendencia temporal de los artículos publicados sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular. 1975 a 2016 (n=2.979).

Fuente: elaboración propia a partir de la búsqueda realizada en Scopus.

Notas:

- La disminución en la cantidad de artículos en 2016 puede deberse al retraso en la carga de las publicaciones.
- En los años 1977, 1981, 1982 y 1987 no fueron encontradas publicaciones.

5.4 Discusión

Fueron analizados como influyeron aspectos geográficos a nivel de los países y regiones, las instituciones y autores considerando su distribución geográfica, temporal y las redes que han establecidos. Luego fueron analizadas las limitaciones, las fortalezas y los aportes de este trabajo.

5.4.1 Aspectos geográficos: diferencias en la participación y en las colaboraciones internacionales

En base al análisis bibliométrico realizado EEUU fue el principal país que publicó en revistas indexadas en Scopus sobre desigualdades sociales y ECV seguido por Reino Unido. Estos dos países fueron los que se encontraron en otras revisiones a nivel mundial sobre distintos problema de salud, sin analizar las desigualdades sociales: (Asplund, *et al.*, 2012; Colantonio, *et al.*, 2015; Asplund, *et al.*, 2012). Le siguieron en orden de frecuencia diferentes países: Japón, Alemania e Italia en los otros análisis bibliométricos; en cambio en nuestro análisis, al incorporar las desigualdades sociales, estos fueron Canadá, Australia y Suecia.

América concentró sus publicaciones en tres países: EEUU, Canadá y Brasil. Europa presentó una mayor diversidad; debemos recordar que la mayor indexación de revistas en Scopus es de países europeos, EEUU y Canadá (y la reciente incorporación de Brasil (Santa & Herrero-Solana, 2010), por lo que podría haber una subrepresentación de revistas de otras regiones.

Las publicaciones colaborativas permitieron que se sumaran en el análisis una mayor cantidad de países africanos, latinoamericanos y asiáticos. Esto puede estar relacionado a distintos factores: al mayor peso que tienen revistas de países europeos, EEUU y Canadá en Scopus (Santa & Herrero-Solana, 2010), y a la inversión en investigación en estos países. Existen diferentes niveles de acceso a la información científica: los países con más recursos económicos producen un gran volumen de investigaciones y estas se ubican en bases de datos de fácil acceso (Martínez Larrarte, 2015).

Existen diferencias teóricas y apropiaciones geográficas para definir las desigualdades sociales. Distintos han sido los términos empleados en base a las la localización geográfica: *inequalities* en Reino Unido a partir del *Black Report* en 1980 y *disparities* en EEUU vinculado al establecimiento de los *National Institutes of Health's Center on Minority Health and Health Disparities* en el año 2000 (Bouchard, *et al.*, 2015). Pero sigue habiendo diferencias teóricas y en la apropiación de estos términos, de allí la necesidad de incorporar palabras que nos permitieran sumar artículos que incorporaran la perspectiva analizada.

La misma dispersión observada en el análisis por países se observa en el análisis institucional: EEUU presentó mayor cantidad de publicaciones nacionales y en el análisis de

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

las publicaciones de la autora más prolífica (Diez Roux) se observó principalmente la colaboración con instituciones estadounidenses. En cambio, uno de los autores más prolíficos europeos (Marmot) presentó una mayor dispersión mundial de colaboración interinstitucional internacional y Mackenbach, Capewell y Kunst a nivel principalmente europeo. En este sentido, la dispersión territorial y la cantidad de instituciones (principalmente de universidades) en EEUU fue mucho mayor que la observada al interior de cada país europeo.

5.4.2 Las redes de colaboración

Pensar en los datos en forma de red nos llama a pensar qué actores (en este caso: países o instituciones) están ubicados y dónde; los actores que tienen más vínculos tienen mayores oportunidades porque tienen más opciones. Esta autonomía los hace menos dependientes ante cualquier otro actor específico y por lo tanto más poderosos (Hanneman & Riddle, 2005).

Aquellos actores con más conexiones, más intermediaciones, tendrán más poder, más opciones de intercambio. Por otro lado, distintos actores se encuentran insertos en una red de manera diferente: actores con mayores intercambios tendrán posiciones más favorables en la red, lo que representa mayores oportunidades para lograr sus objetivos. Entonces actores más influyentes de la red son los que más grados tienen, medidos en la cantidad de vínculos que ese nodo posee: cuantos más vínculos tenga un nodo, más poder tendrá (Hanneman & Riddle, 2005).

Analizando las redes en términos de concentración, de poder, donde pocos nodos concentran muchos vínculos, nos habla de una situación sesgada. En este caso las regiones, los países, las instituciones, los autores, no tienen poder en abstracto sino en relación a otros (Hanneman & Riddle, 2005): cuantas más relaciones, más vínculos tengan, más poder tienen; cuanto más central es, más poder tiene. Entonces, pensando en términos de redes podrían describirse dos grandes “comunidades”, centros de poder: una en EEUU y otra en Europa (centrada en Reino Unido).

Es en estas regiones donde surgen las propuestas conceptuales en relación a desigualdades sociales (Bouchard, *et al.*, 2015): en Reino Unido el *Black Report* en 1980 (Black, 1980), luego el *Acheson Report* en 1998 (Acheson, 1998) y empíricamente se inicia con el estudio de cohorte *Whitehall* en Reino Unido por Marmot sobre enfermedad cardiovascular y determinantes sociales. Fue también en la década del '80 del siglo pasado cuando comienzan los estudios sobre desigualdades sociales en EEUU (Vilagrasa Ibarz, 2000).

Por otro lado, tanto en Europa como en EEUU fue donde primero se observaron cambios en el perfil de morbilidad y mortalidad en la población: pasando de ser la principal causa las

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

enfermedades infecciosas a ser las enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares (CELADE, 2005a).

5.4.3 Modificaciones en el tiempo en las publicaciones

El aumento exponencial en la cantidad de investigaciones sobre desigualdades sociales y enfermedad cardiovascular se observa principalmente con el cambio de siglo. Esto podría vincularse al lapso de tiempo entre las discusiones conceptuales y la consolidación de esto en investigaciones empíricas (Bouchard, *et al.*, 2015), y por otro lado al gran salto que implicó el uso de la computación, tanto para el análisis de datos, al uso de programas estadísticos, como posteriormente para la facilidad en el acceso y la posibilidad de relaciones que la computación e internet permite (Faneite, 2003).

Scopus presenta registros desde el año 1823, así nos resulta llamativo que la primera publicación en la temática analizada haya aparecido recién en el año 1975. Siendo que los intentos por relacionar las desigualdades sociales con el desarrollo de problemas de salud datan del siglo XVIII y XIX, donde se vinculaba el trabajo y las condiciones de vida con problemas de salud (Santos Padrón, 2011; Urquía, 2006). Esto puede vincularse a que los desarrollos conceptuales analizados previamente, hayan surgido recién a partir de finales del siglo XX (Almeida-Filho, 1999), donde recién allí se vuelve a incorporar esta discusión: en América Latina desde la Medicina Social y en Reino Unido a partir del *Black Report* (Santos Padrón, 2011). Probablemente al emplear términos desarrollados recién a fines del siglo XX, como inequidades o disparidades, es que no surjan artículos publicados previamente.

5.4.4 Fortalezas y limitaciones

Scopus, la base seleccionada para el análisis bibliométrico presenta sus fortalezas y sus limitaciones. Como fortalezas el volumen de citas presentes, el acceso libre para el usuario (donde son los países quienes pagan para poder acceder a estos contenidos) y la modalidad en la exportación de los campos de la base de datos. Pero Scopus es propiedad de una compañía comercial, Elsevier, así como WOS lo es de Clarivate Analytics, y estas “bases de datos internacionales condicionan y limitan lo que se publica” (Martinovich, 2017). Esto representa un círculo vicioso difícil de romper: publicar en revistas científicas de mayor prestigio, medidas a partir de criterios bibliométricos, es una de las condiciones para mantenerse en el mundo académico. Entonces es lo que permite visibilidad en el mundo académico, en estas “comunidades de poder” del conocimiento.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

5.5 Conclusión

Fueron encontrados tres grandes grupos poderosos que han publicado sobre desigualdades sociales y ECV: uno centrado en EEUU, con Diez Roux como principal referente, otro en Reino Unido y en Países Bajos. Gran parte de las publicaciones de otros países e instituciones dependen de estas “comunidades” para poder publicar en revistas reconocidas internacionalmente. Desde estos centros de poder es desde donde han surgido importantes discusiones conceptuales, allí es donde se concentra y se difunde por el resto del mundo.

Existen importantes núcleos de pensamiento social en salud en países latinoamericanos (Granda, 2003), centrado en Brasil pero con desarrollos en México, Ecuador y Argentina (Testa & Silva Paim, 2010). Desde estos espacios es desde donde proviene la autora que más ha publicado en la temática.

Por ahora la solución se visibiliza en una “cooperación científica y técnica” entre países de altos ingresos y medianos y bajos ingresos. Desde el hemisferio sur, desde la Medicina Social, desde la Salud Colectiva, se vienen desarrollando desde la década del '60 del siglo pasado discusiones teóricas y empíricas. El desafío es lograr visibilizar las producciones científicas desarrolladas en Latinoamérica, para poder discutir con los centros de poder editorial científica la relación entre las desigualdades sociales y los problemas de salud.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2018.

6. CONDICIONES DE VIDA Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. ANÁLISIS ESPACIAL EN UNA POBLACIÓN URBANA DE BARILOCHE, NORPATAGONIA ARGENTINA.

6.1 Introducción

Cada vez es mayor la población del mundo que vive en áreas urbanas, en 1950 representaba el 21% y hoy llegamos a más de la mitad de la población mundial (Santos, 1988; UNPF, 2007). La urbanización representa la concentración de la pobreza y el crecimiento de zonas marginales, pero también una posibilidad de escapar de ella (UNPF, 2007). Por otro lado, la urbanización influye en el desarrollo de enfermedades crónicas (Fleischer, *et al.*, 2011); hay una sustancial variación intraurbana en el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte en las ciudades, en parte explicada por los patrones de distribución de las desigualdades/desventajas sociales (Diez Roux, *et al.*, 2001; Smith, *et al.*, 1998; Gómez-Barroso, *et al.*, 2015; Pickett & Pearl, 2001). Sumado a esto, en personas viviendo con problemas crónicos de salud, como las enfermedades cardiovasculares, las desigualdades generan diferentes oportunidades y posibilidades de acceso al sistema de salud y su continuidad en el mismo.

La mayor parte de las desigualdades observadas en la salud está directamente relacionada con las desigualdades observadas en otros planos de la vida social. Las desigualdades en salud generan oportunidades desiguales de disfrutar de los avances científicos y tecnológicos, diferentes posibilidades de exposición a los factores que determinan la salud y la enfermedad, diferencias entre enfermar y morir (Barreto, 2017).

Los grupos poblacionales modifican el medio a través de su accionar en interacción con otros grupos, construyendo el espacio social donde habitan; el espacio es así una expresión de las condiciones de vida (Alazraqui & Spinelli, 2008). Cristina Possas (1989) plantea como uno de los aspectos fundamentales para analizar los diferentes patrones epidemiológicos, los patrones de morbilidad, indagar en las características de los grupos poblacionales sometidos a diferentes condiciones de vida y trabajo. Condiciones de vida referidas a una dimensión espacial de la ocupación del espacio urbano y rural, a las condiciones materiales básicas de subsistencia, a las condiciones de alimentación, habitacionales, de saneamiento, entre otras.

La dimensión espacio puede ser presentada como algo anterior que existe independientemente de la constitución o las acciones de quienes lo habitan, como sustrato de los fenómenos naturales o desde una visión dinámica, como testimonio de una historia escrita

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

por los procesos del pasado y del presente (Czeresnia & Ribeiro, 2000; Santos, 1990). El concepto de espacio recupera así su historicidad, la dinámica de sus organizaciones, la complejidad de sus interacciones y la totalidad de su constitución (Costa & Teixeira, 1999). Sumado a esto, la producción social del espacio está influenciada por las condiciones (recursos) naturales, determinado por los medios de producción precedentes como por los actuales a escala local, nacional y hoy mundial (Iñiguez Rojas, 1998).

Son recientes los estudios que buscan relacionar características de los grupos o los contextos a los cuales los individuos pertenecen, con aspectos que afectan su salud. Este interés se vinculó a la insuficiente explicación de aspectos puramente individuales en captar la relevancia de la determinación social de las enfermedades. Además estos son importantes para políticas públicas de prevención: políticas públicas enfocadas en los contextos donde los individuos viven (Diez Roux & Mair, 2010).

Así, la propuesta fue buscar donde se localizan los problemas, en que poblaciones, para producir conocimiento a fin de orientar políticas públicas. Por ello nos preguntamos ¿cómo es la relación entre la distribución espacial de problemas cardiovasculares y de las condiciones de vida? Para ello nos proponemos analizar el patrón espacial de enfermedad cardiovascular de personas con diabetes y/o hipertensión arterial que son atendidas en los centros de salud públicos de Bariloche, norpatagonia Argentina.

6.2 Metodología

6.2.1 Área de estudio

Este trabajo se llevó adelante en la ciudad de San Carlos de Bariloche (de ahora en adelante, Bariloche), ubicada en la norpatagonia argentina. Ésta se extiende en una superficie de más de 30 km de este a oeste y no supera los 8 km de norte a sur (Sánchez, *et al.*, 2007), tiene una densidad poblacional de 589 habitantes/km². Allí viven, en base a información del último censo del año 2010, más de 113.112 personas (INDEC, 2013a), clasificándose como una de localidad de tamaño intermedio menor⁵.

⁵ Vapnarsky y Gorojovsky (1990) han clasificado los centros urbanos por magnitud o tamaño en:

a) aglomeraciones de más de un millón de habitantes.

b) aglomeraciones de tamaño intermedio (mayores: de 400.000 a 999.999; menores: de 50.000 a 399.999).

c) ciudades pequeñas (20.000 a 39.999) y pueblos grandes (de 2.000 a 19.999).

Luego por otro lado clasifican la población rural en:

a) pueblos pequeños (hasta 1.999).

b) población dispersa.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Un acelerado crecimiento “con fuerte diferenciación social, ha devenido en mosaicos urbanos donde la división del espacio residencial muestra distintos grados de exclusión” (Matossian, 2015a, p. 173). Esto puede visualizarse por ejemplo en la distribución espacial en esta localidad de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), indicador empleado para identificar la pobreza estructural. Este muestra un contraste, con heterogeneidades en su interior, entre una zona más turística de la ciudad cercana al lago Nahuel Huapi, la cual presenta los menores porcentajes de población que vive con NBI y el resto de la ciudad hacia el sureste y suroeste, donde los porcentajes de población con NBI son mayores (Matossian, 2015b). En el mismo sentido constituyendo estas desigualdades socio-espaciales se observa el patrón de asentamiento de los migrantes, donde el área central de la ciudad vinculada al turismo y actividades comerciales, muestra un perfil de migrantes europeos; el sector conocido como “el alto” (ubicado en la zona sur de la ciudad) predomina un perfil de migración chilena (Matossian, 2015b). Cada uno de los cuales se vincula a trasfondos étnico-culturales e históricos: mientras la ubicación de los migrantes europeos se remonta a la idea de una “Suiza argentina” constituida en el marco de la campaña del desierto a fines del siglo XIX (Navarro Floria & Vejsberg, 2009) momento de fundación de la localidad, el principal flujo migratorio chileno se vincula a las dictaduras militares latinoamericanas de la década del '70 y '80 del siglo pasado (Matossian, 2015b).

6.2.2 Conformación del sistema de salud

El financiamiento del sistema de salud en Argentina se encuentra compartido entre los subsectores público, la seguridad social y la medicina prepaga. Aunque formalmente esta cobertura es universal, la población que utiliza los servicios públicos de salud es la población que no cuenta con otra cobertura. Este conjunto representaba en el año 2010, un 35%, tanto a nivel nacional, como provincial (INDEC, 2013a).

En Bariloche el sistema público de salud es responsabilidad de la provincia, conformado por el Hospital Zonal Bariloche “Dr. Ramón Carrillo” y 15 centros de salud bajo su dependencia, 13 de ellos ubicados en las distintas zonas de la ciudad y dos en localidades aledañas, por lo cual no fueron incluidos en el presente trabajo.

6.2.3 Datos, indicadores y análisis

Para este trabajo fueron empleadas diferentes fuentes de información: datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 para caracterizar las condiciones de vida (a); entrevistas al equipo de salud e información del servicio de estadística del hospital para

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

relevar información sobre los centros de salud (b); historias clínicas para relevar información sobre los problemas de salud (c).

a. Condiciones de vida

La información demográfica y socioeconómica de la localidad de Bariloche fue obtenida para cada radio censal a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, sistematizado mediante el uso del software REDATAM+SP (INDEC, 2013a). Los radio censales urbanos son la división territorial que comprenden entre 200 y 400 viviendas, estos fueron empleados como proxy de los vecindarios. Una revisión realizada por Pickett & Pearl (2001) muestra que la mayoría de los estudios que analizan los efectos de pequeñas áreas y distintos desenlaces de salud emplean agregados censales, circunscripciones electorales o códigos postales como proxy de vecindario; esto facilita el *linkage* con información recolectada disponible, por ejemplo de los censos (Diez Roux & Mair, 2010).

Entonces a partir de la información censal fueron seleccionados indicadores que miden aspectos de los hogares: calidad de conexión a servicios básicos, calidad de los materiales, calidad constructiva de la vivienda, necesidades básicas insatisfechas (NBI), hacinamiento crítico; e indicadores medidos a nivel poblacional: educación, población adulta, desocupación, viven solas, inmigrantes, densidad poblacional (Apéndice A).

Para seleccionar qué indicadores caracterizan las condiciones de vida fue realizado un análisis factorial utilizando el análisis de componentes principales como método de selección de factores. Este fue aplicado a indicadores del hogar y la población medidos a nivel vecindario (radio censal). El análisis factorial es una metodología estadística que permite la reducción de variables para determinar qué aspectos o indicadores se relacionan con constructos que no pueden definirse con un solo aspecto, dichos constructos se determinan “dimensiones latentes” (no directamente observables) denominadas factores (Diez Roux, *et al.*, 2001; Buzai, 2014; Garamendia, 2007), como puede ser el *apoyo social*, la *satisfacción*, o como en nuestro caso las *condiciones de vida*.

Así, luego de seleccionar qué aspectos conformaron cada factor, se elaboró un score para el primer factor a partir de la sumatoria de valores z de cada indicador que lo compone (Diez Roux, *et al.*, 2001). Los valores z se calculan para estandarizar variables que presentan unidades de medida distintas o con medias y desvíos muy diferentes, así se transforman los datos originales llevándolos a una misma unidad de medida y de esta manera, hacerlos comparables (Buzai, 2014).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Luego de obtener el rango de valores del score se definieron intervalos de clase y categorías que expresaran las distintas intensidades en la distribución espacial (Buzai, 2014). Esta distribución espacial fue representada cartográfica y analíticamente.

b. Sistema de salud

Para caracterizar cada centro de salud fueron realizadas entrevistas semiestructuradas a los agentes sanitarios de cada establecimiento. Estas fueron diseñadas en base a la observación de distintos aspectos que caracterizaban a cada centro de salud durante el relevamiento de las historias clínicas. Cubrían los siguientes aspectos: la existencia del trabajo con grupos de personas con problemas crónicos de salud, la distancia al hospital, el tamaño del área de influencia y la proporción de profesionales (en relación a la población). Además se calculó la cantidad de individuos con diabetes e hipertensión arterial atendidos en cada centro de salud y la media de sus consultas a partir de la base de datos de las historias clínicas. La cantidad anual total de consultas de cada centro de salud fue tomada de información consolidada por el servicio de estadística del Hospital Bariloche. Los centros de salud fueron analizados descriptivamente mediante la distribución de estos aspectos estudiados y mediante medidas de correlación acordes al tipo de relación que vinculó a los pares de variables.

c. Problemas de salud

Las historias clínicas fueron relevadas durante 2014 y 2015 en los 13 centros de salud públicos de Bariloche. Se incluyeron aquellas correspondientes a las personas mayores a 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (en adelante diabetes) y/o hipertensión arterial primaria (en adelante HTA) que hubieran consultado entre los años 2010 y 2015. Fueron excluidas: a) historias clínicas donde figuró la última consulta antes del año 2009 y b) historias clínicas donde las personas presentaron menos de 3 consultas en total, debido a que en estos casos no pudieron ser relevados en forma completa los datos necesarios para la investigación.

Para mejorar la calidad de los registros relevados se realizó un *record linkage* determinístico (Olivera, et al., 2016), metodología donde se combinan registros de distintas bases de datos a partir de un identificador común (Coeli, 2015; Mota, et al., 2011). En nuestro caso fue realizado un *record linkage* entre la base de datos de los individuos con diabetes e HTA atendidos en los centros de salud y las bases de datos de los egresos hospitalarios del Hospital Zonal Bariloche entre 2005 y 2015, correspondientes a las internaciones que los individuos atendidos en los centros de salud pudieran haber tenido. Esto nos permitió complementar datos faltantes de los problemas de salud estudiados, como la especificidad

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

del diagnóstico de egreso o situaciones de internación omitidas. Cada historia clínica correspondió a un individuo sin presentar duplicaciones (cada individuo es atendido solamente en un centro de salud); cada individuo presentó ninguna, una o más de una internación (medida en egresos hospitalarios).

A partir de ambas fuentes de información se elaboró una única base de datos para estudiar los problemas de salud. Así, fueron definidos para este trabajo los siguientes aspectos: *edad* (edad de las personas con diabetes y/o HTA), *hombres* (hombres con diabetes y/o HTA en relación al total de mujeres y hombres), *cambio de peso* (diferencia promedio del cambio de peso entre el inicio del seguimiento por diabetes y/o HTA y el último control registrado), *inmigrante* (personas con diabetes y/o HTA que nacieron en otro país), *alcoholismo* (personas con diabetes y/o HTA y problemas actuales o pasados con el alcohol), *tabaquismo* (personas con diabetes y/o HTA y tabaquistas actuales o pasados).

Además para cada uno de los individuos se definió la presencia o ausencia de las siguientes enfermedades cardiovasculares: enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca hipertensiva, pie diabético (Apéndice A).

Se determinó y analizó la distribución espacial de los aspectos seleccionados de las personas con diabetes y/o HTA. Para ello, primero fueron georreferenciados de manera automatizada en el QGIS mediante la geocodificación con el *OpenStreetMap*, donde se ubica un punto en el mapa en base al domicilio de la persona con diabetes y/o HTA. Esto se complementó mediante la ubicación manual de los domicilios cuando la dirección no coincidía exactamente o cuando no pudieron ser georreferenciados (archivo *notfound.csv* generado por QGIS), lo cual representó 8,8% (72) de los individuos. Esto permitió georreferenciar a todos los individuos. Finalmente fue imputado el radio censal correspondiente a cada uno.

Para estudiar las relaciones entre condiciones de vida y los problemas de salud se calcularon las proporciones para cada una de las zonas con distintas condiciones de vida y en cada zona se analizaron los distintos aspectos de los individuos (edad, hombres, cambio de peso, inmigrantes, alcoholismo, tabaquismo) y las proporciones de individuos con cada enfermedad cardiovascular en relación a la cantidad de individuos con diabetes y/o HTA.

Para los análisis en los puntos descriptos en 6.2.3 se utilizaron los siguientes *software*: *Excel*, *QGIS* y *STATA*.

6.2.4 Recaudos éticos

Fueron protegidos los datos que permitieran identificar a las personas (directa o indirectamente) de las historias clínicas y los egresos hospitalarios, solo habiendo tenido

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

acceso a esta información la investigadora en el momento de recolección de los datos y con el único fin de realizar el *record linkage* entre ambas bases de datos. Luego estos datos fueron eliminados y codificados. Se protegió la confidencialidad de las personas según la Ley de Protección de los datos personales, N° 25.326 para el procesamiento de Datos Sensibles y la Ley de Secreto Estadístico N° 17.622. Este trabajo ha sido aprobado por el comité de ética del Hospital Zonal Bariloche con fecha 06/06/2014 y por la Comisión de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Lanús con fecha 19/6/2018.

6.3 Resultados

A partir del análisis factorial se seleccionaron los indicadores de aspectos de los hogares y de los individuos para caracterizar las condiciones de vida, luego estas se categorizaron en zonas con distintos niveles y se analizó su distribución en el espacio. Se realizó una breve descripción de la población estudiada y su relación con la distribución espacial de los centros de salud. Finalmente se describió la distribución de distintos aspectos individuales y problemas de salud en base a las zonas generadas con distintas condiciones de vida.

6.3.1 Condiciones de vida

A partir del análisis factorial fueron definidos tres factores que explicaron el 80,3% de la variación total. El primer factor explicó el 55,1% de la misma y estuvo conformado por los siguientes indicadores: calidad constructiva de la vivienda, calidad de los materiales, NBI, hacinamiento, educación y desocupación. El segundo factor explicó el 13,7% de la varianza y estuvo conformado por la densidad poblacional y relación de dependencia; el tercero explicó el 11,5% y estuvo conformado por la proporción de inmigrantes y de personas que viven solas. El primer factor se denominó *condiciones socioeconómicas*, el segundo *condiciones sociodemográficas* y el tercero *condiciones habitacionales*.

Luego cada indicador que conformó este factor fue calculado un score con la suma de sus valores estandarizados (puntaje z). Estos fueron representados espacialmente (Figura 6.1) en cinco estratos (quintiles), con un gradiente de colores donde colores más oscuros representan peores condiciones de vida. Así, las áreas más claras corresponden a la zona que bordea al lago Nahuel Huapi desde el centro de la ciudad hacia el oeste, zona que corresponde a barrios residenciales, zonas con condiciones *muy buenas* y *buenas*. Las zonas más oscuras se corresponden con áreas de condiciones de vida *deficitarias* y *críticas*, ubicadas al sur de la ciudad, zona conocida localmente como “el alto”. Se debe observar a lo

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

largo de la costa del lago la presencia de zonas con condiciones socioeconómicas *deficitarias* y *críticas* (color más oscuro) en medio de *zonas buenas* y *muy buenas* (de color más claro).

Figura 6.1: Distribución espacial de los estratos según condiciones de vida en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Año 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

Nota:

Condiciones de vida: score elaborado en base al análisis factorial con los siguientes indicadores: calidad constructiva de la vivienda, calidad de los materiales, Necesidades básicas insatisfechas (NBI), hacinamiento, educación y desocupación.

Si observamos en la Tabla 6.1 el comportamiento de los indicadores empleados para construir estas zonas podemos ver la gran brecha que existe en la ciudad. A modo de ejemplo, en las zonas con condiciones socioeconómicas muy buenas el 1,2% en promedio de las viviendas tienen calidad constructiva insuficiente, en cambio en las zonas *crítica* dicho promedio es de 31,9%. Situación similar se observa con el NBI: 1,3 y 27,3% respectivamente. Es importante destacar que casi la mitad (46%) de la población de la ciudad vive en condiciones de vida *deficitarias* y *críticas* (52.155 personas).

Tabla 6.1: Características de los vecindarios en base a las zonas con distintas condiciones de vida. San Carlos de Bariloche, Río Negro. Año 2010.

	Muy buenas (score -5,5 a -4,2)	Buenas (score -4,2 a -3,0)	Regulares (score -3,0 a -0,2)	Deficitarias (score -0,2 a 3,7)	Críticas (score 3,7 a 19,7)
N° individuos de la localidad de Bariloche	18.871	17.211	24.875	20.749	31.406
N° vecindarios de Bariloche	35	31	34	27	33
N° individuos con diabetes y/o HTA	10	7	64	192	547
N° vecindarios de la población bajo estudio*	1	1	5	9	20
Media score de los vecindarios	-4,8	-3,7	-1,5	1,8	8,6
Media de calidad constructiva insuficiente (%)	1,2	2,7	6,3	13,6	31,9
Media de baja calidad de los materiales (%)	0,8	1,8	4,0	9,1	18,4
Media de NBI (%)	1,3	2,7	4,8	12,4	27,3
Media de hacinamiento (%)	0,4	0,6	1,4	3,3	7,9
Media educación (%)	1,8	3,6	6,7	9,6	14,2
Media de desocupación (%)	3,4	4,7	6,9	8,5	11,7

Fuente: elaboración propia en base a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

Notas:

Condiciones de vida: score elaborado en base a factor 1 del análisis factorial con los siguientes indicadores: calidad constructiva de la vivienda, calidad de los materiales, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), hacinamiento, educación y desocupación.

Media: fue calculada la media de los valores porcentuales de los indicadores de los hogares (calidad constructiva, calidad de los materiales, NBI y hacinamiento) o de los individuos (educación y desocupación) correspondientes a los vecindarios que componen cada zona.

* Población bajo estudio: personas con diabetes y/o HTA atendidas en los centros de salud públicos.

6.3.2 Sistema de salud

Si bien los centros de salud presentan características en común (horario de atención, prácticas realizadas, presencia de programas nacionales y provinciales, conformación interdisciplinaria de los equipos de salud, priorización de la atención de los niños y niñas menores de 2 años y las embarazadas), cada uno presenta sus particularidades en relación a la organización de la atención. Así, cada equipo de salud define como organiza la entrega de los turnos, como organiza las historias clínicas, si emplean como modalidad de abordaje el trabajo con grupos coordinados por el equipo de salud (como complemento de la atención médica individual).

Además cada centro de salud tiene una distribución diferente del espacio y es distinta la pertenencia de los edificios donde funcionan: Juntas Vecinales, Iglesia católica, Ministerio de Salud, Ministerio Desarrollo Social; los distintos centros de salud se fueron construyendo en relación al desarrollo de la ciudad, al crecimiento poblacional y a decisiones políticas sanitarias. Cabe mencionar que los centros de salud contruidos más recientemente presentan mejores comodidades y condiciones edilicias mejoradas espacio para reuniones, mayor tamaño de las salas de espera y salón de usos múltiples.

Para observar la relación entre las características de los centros de salud estas fueron graficadas para definir qué medida de correlación emplear. Debido a que algunas de ellas mostraron distribuciones sesgadas o con valores distantes, fue empleado el coeficiente de correlación de rango (rho de Spearman = r_s) y su correspondiente nivel de significancia (valor p).

En relación a las características de los centros de salud la cantidad de personas con diabetes e HTA absoluta presentó una correlación moderada con la cantidad de consultas generales realizadas por cada centro de salud en 2015 ($r_s = 0,560$, $p=0,058$). La cantidad de personas con diabetes e HTA relativa a la población total no mostró relación con las consultas generales ($r_s = 0,130$, $p=0,688$), pero si con la proporción de profesionales ($r_s = 0,623$, $p=0,030$).

Los centros de salud más alejados se correlacionaron con las zonas menos densamente pobladas ($r_s = - 0,782$, $p= 0,003$), con mayores áreas de influencia ($r_s=0,664$, $p=0,018$) y con menor cantidad de personas con diabetes e HTA ($r_s= - 0,662$, $p= 0,031$).

En la Figura 6.2 fueron georreferenciados los 820 individuos con diabetes e HTA atendidos en los centros de salud públicos de Bariloche en base a sus domicilios; los diferentes colores representan los distintos centros de salud donde el individuo fue atendido. En general, alrededor de cada centro de salud se observan puntos en el espacio de un mismo color, lo que evidencia una relación espacial entre el lugar donde fueron atendidos y los domicilios de los individuos. Sin embargo, en el zoom de la Figura 6.2, en la zona de mayor concentración de puntos no es tan clara esta relación, ya que se entrecruzan puntos de distintos colores mostrando una mayor variabilidad entre los domicilios y los lugares de atención, vinculado a la mayor disponibilidad de centros de salud en esa zona. En el área los centros de salud Casa de la Salud, Las Quintas y La Cumbre es donde esto es más marcado.

En cambio, la distribución de los centros de salud en la zona oeste de la ciudad es muy distinta. Hay dos centros de salud (Madre Teresa y Virgen Misionera) muy distantes entre sí (aproximadamente 13 km). Algunos individuos que se atienden allí provienen de vecindarios muy distantes del centro de salud, lo que resulta en mayores áreas de influencia. Resaltamos el área de influencia extendida en el espacio que presentó el centro de salud Madre Teresa

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

(Tabla 6.2). Dichos centros de salud están insertos en zonas *precarias* rodeados de zonas con condiciones socioeconómicas *muy buenas* (ver punto 6.3.1).

Figura 6.2: Georreferenciación de los domicilios de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según el centro de salud donde han sido atendidos. Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.2: Distribución de las características de los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.

Centro de Salud	Cantidad de consultas (2015)	Cantidad de personas con diabetes y/o HTA	Tamaño área de influencia (km ²)	Media de consultas/año ^a	Proporción de profesionales ^b	Proporción de personas con diabetes e HTA ^c
34 hectáreas	5.269	39	0,32	3,8	51,5	22,3
Arrayanes	4.424	154	1,59	1,7	24,0	36,9
Casa de la salud	4.959	115	1,20	2,7	6,0	11,4
Frutillar	6.520	110	2,90	2,4	9,6	15,1
La cumbre	3.878	56	1,83	2,3	7,2	6,7
Las quintas	5.269	89	1,68	1,5	7,9	7,8
Lera	4.099	45	1,22	1,6	9,2	6,9
Madre Teresa	2.388	34	18,55	3	11,8	6,7
Nahuel Hue	4.315	11	2,44	5,2	10,5	1,7
Pilar I y II ^d	879	23	4,66	1	31,7	36,5
San Francisco III	4.218	105	1,68	2	11,3	14,8
Virgen Misionera	2.765	39	3,30	3,2	24,6	16,0

Fuente: elaboración propia en base las historias clínicas, egresos hospitalarios y a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

^a Media de la cantidad de consultas de las personas con diabetes y/o HTA en el último año.

^b Cantidad de médicos/as + enfermeros/as por 10.000 habitantes del área de influencia.

^c Cantidad de personas atendidas en el centro de salud con diabetes y/o HTA por 10.000 habitantes del área de influencia.

^d Son dos centros de salud que fueron unificados para el análisis debido a que ambos tienen el mismo equipo de salud que se distribuye los días de atención entre ambos establecimientos. También se encuentran unificados en las estadísticas hospitalarias analizadas.

6.3.3 Problemas de salud

A cada individuo con diabetes y/o HTA se le imputó la zona generada del score a partir del macheo entre el valor de la zona del radio censal con las condiciones de vida y su radio censal. Así podemos decir que los individuos estudiados viven en zonas con peores condiciones de vida: un 66,7% (547) viven en zonas críticas (quintil con peores condiciones de vida), en contraste con el 2,1% (17) de los individuos estudiados que viven en zonas de condiciones muy buenas a buenas de Bariloche (Tabla 6.3).

Al describir algunas características relevadas de estos individuos en relación a las zonas de distintas condiciones de vida podemos observar un gradiente si vemos los vecindarios con condiciones regulares a críticas, donde se encuentran viviendo la mayor parte de la población estudiada (97,9%) en relación a la proporción de inmigrantes, de personas

con problemas con el alcohol, con la edad, con el aumento de peso, con la proporción de hombres y de personas que viven solas (Tabla 6.3).

Al analizar cada enfermedad cardiovascular, para la mayoría (salvo para Pie diabético) se observa el mismo gradiente, donde a medida que empeoran las condiciones de vida en los vecindarios (de regulares a críticas), mayor es la proporción de individuos con estas enfermedades (Tabla 6.4).

Figura 6.3: Características de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro (n=803)*. Años 2014-2015.

Fuente: elaboración propia en base las historias clínicas, egresos hospitalarios y a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

* No fueron incluidas en esta figura las zonas con condiciones muy buenas y buenas debido a la baja cantidad de individuos.

Figura 6.4: Porcentaje de cada enfermedad cardiovascular en los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro (n=803)*. Años 2014-2015.

Fuente: elaboración propia en base las historias clínicas, egresos hospitalarios y a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

* No fueron incluidas en esta figura las zonas con condiciones muy buenas y buenas debido a la baja cantidad de individuos.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2018.

Tabla 6.3: Características de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro (n=820). Años 2014-2015.

	Inmigrantes	Viven solos	Alcoholismo	Subió de peso	Cambio de peso	Edad	Hombres*	Tabaquismo
Zonas ^a	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	Media ^c	Media ^c	n (%)	n (%)
Muy buenas (n=10) ^b	3	-	6	2	-2,9	56,6	6	5
Buenas (n=7) ^b	2	2	-	1	-1,7	58,6	3	3
Regulares (n=64)	20 (31,2)	3 (4,7)	4 (6,2)	12 (19,3)	-1,6	59,8	12 (18,7)	20 (31,2)
Deficitarias (n=192)	86 (44,8)	21 (10,9)	19 (9,9)	58 (30,2)	-0,7	60,9	54 (28,1)	52 (27,1)
Críticas (n=547)	261 (47,7)	62 (11,3)	63 (11,5)	191 (35,3)	0,4	61,5	162 (29,6)	167 (30,5)
Total (n=820)	372 (45,5)	88 (10,7)	92 (11,2)	264 (32,5)	-0,1	61,1	237 (28,9)	247 (30,1)

Fuente: elaboración propia en base las historias clínicas, egresos hospitalarios y a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

* Cantidad y porcentaje de hombres en relación al total de hombres y mujeres.

^a Los números representan la cantidad de individuos con diabetes y/o HTA que viven en cada zona.

^b En las zonas con condiciones muy buenas y buenas no fueron calculados porcentajes debido a la baja cantidad de individuos.

^c Media para cada zona. Media del total: media calculada con el valor de cada uno de los 820 individuos estudiados.

Tabla 6.4: Frecuencia de cada enfermedad cardiovascular de los individuos con diabetes y/o hipertensión arterial según las zonas con distintas condiciones de vida de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.

Zonas *	Cantidad de individuos ^a			Enfermedad. cerebrovascular ^b	Enfermedad renal crónica ^b	Enfermedad coronaria ^b	Pie diabético ^c	Enfermedad cardíaca hipertensiva ^d
	Con diabetes	Con HTA	Con diabetes y/o HTA	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Muy buenas	4	7	10	-	1	-	-	1
Buenas	3	6	7	1	-	-	-	3
Regulares	29	59	64	1 (1,6)	1 (1,6)	1 (1,6)	3 (10,3)	8 (13,6)
Deficitarias	90	166	192	13 (6,8)	7 (3,6)	7 (3,6)	9 (10,0)	35 (21,1)
Críticas	221	474	547	33 (6,0)	23 (4,2)	20 (3,7)	18 (8,1)	110 (23,2)
Total	347	712	820	48 (5,8)	32 (3,9)	28 (3,4)	30 (8,6)	157 (22,1)

Fuente: elaboración propia en base las historias clínicas, egresos hospitalarios y a datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC, 2013a).

* Los números representan la cantidad de individuos con diabetes y/o HTA (hipertensión arterial) que viven en cada zona. En las zonas con condiciones muy buenas y buenas no fueron calculados porcentajes debido a la baja cantidad de individuos.

^a Cantidad de individuos “con diabetes” (pueden o no tener HTA), “con HTA” (pueden o no tener diabetes) o con “diabetes y/o HTA” (pueden tener una de las dos o ambas).

^b porcentaje calculado en relación a los individuos con diabetes y/o HTA.

^c porcentaje calculado en relación a los individuos con diabetes.

^d porcentaje calculado en relación a los individuos con HTA.

6.4 *Discusión*

Estudios de análisis espacial nos permiten examinar variaciones en el espacio; relacionar a escala espacial aspectos socioeconómicos, demográficos con determinados aspectos vinculados a problemas de salud. Para discutir esto se problematizarán los hallazgos encontrados en la distribución en el espacio de los patrones de salud y enfermedad para luego indagar en las relaciones entre abordajes individuales y poblacionales.

6.4.1 **Relaciones en el espacio entre las condiciones de vida y los problemas de salud**

Como fue presentado, y en consonancia con los resultados de otros autores (Abaleron, 1995; Matossian, 2016), la ciudad de Bariloche muestra un gran contraste en su distribución, los vecindarios con peores condiciones de vida se ubican principalmente al sur de la ciudad, en la zona conocida localmente como *el alto*, en contraste con la zona que bordea al lago Nahuel Huapi, conocida por y para el turismo. Pero, como resultado del presente trabajo, podemos retomar varios puntos interesantes al interior de este análisis más general de la ciudad. Primero, el marcado gradiente observado entre los vecindarios en todos los indicadores analizados para definir las condiciones de vida, las cuales fueron definidas con distintos indicadores seleccionados mediante análisis factorial. Segundo, la gran brecha observada entre los vecindarios con condiciones de vida muy buenas y críticas. Y tercero, al ubicar en el espacio a las personas con diabetes y/o HTA atendidas en los centros de salud públicos, observamos que la mayoría vive en las zonas con peores indicadores: zonas deficitarias y críticas. Esto no es llamativo teniendo en cuenta la ubicación estratégica de los centros de salud públicos en zonas con mayor vulneración social. Pero lo que resulta importante destacar es que ante una peor condición de vida de los vecindarios, mayor es la cantidad de personas que fueron atendidas en los centros de salud con diabetes y/o HTA.

Sumado a esto, en este trabajo encontramos una relación entre las enfermedades cardiovasculares y con las características de los individuos; en términos generales se observa un gradiente positivo: a medida que estratificamos vecindarios con peores condiciones de vida, estas personas con diabetes y/o HTA tienen una mayor proporción de enfermedad cardiovascular y además presentan las siguientes características: mayor proporción de hombres, de personas que viven solas, de inmigrantes, de personas que subieron de peso, con mayor promedio de edad, con mayor aumento de peso corporal. Podemos así decir, que a peor condición socioeconómica, mayores los problemas de salud.

6.4.2 Vínculos entre modos de vivir y enfermar

Distintas son las posibilidades de elección de los distintos grupos sociales, distintos los equipos de salud que los atienden, distinta es su condición socioeconómica, distinta su posibilidad de inserción territorial. En una ciudad de la norpatagonia argentina, que hace poco festejó su centenario, los procesos de migración, inserción y ubicación territorial son claves en la conformación de su espacio. Se entrelazan así tensiones culturales y políticas, diferencias en los factores que llevan a los procesos de migración (sean laborales, políticos, familiares o mejoras en la calidad de vida), aspectos presentes en el destino (acceso a la tierra y la vivienda), distintas redes sociales de sostén, diferentes políticas estatales respecto al mercado del suelo urbano y de la vivienda (Matossian, 2015a; Matossian, 2015b).

Así se constituyen estos espacios urbanos, estos contextos no libres de conflictos, donde conviven en el mismo espacio grupos sociales de diversos orígenes culturales, étnicos y sociales. Esto influye en la apropiación del espacio y en los modos de vida que adoptan los individuos y los conjuntos sociales. Pertenecer a una u otra área implicará la posibilidad o la imposibilidad de acceder a niveles relativos de satisfacción de necesidades materiales e inmateriales, las cuales tienen que ver con la calidad de vida, la calidad y funcionalidad de la educación, la realización por medio del trabajo, la calidad del medio ambiente, entre otras cosas (Santos, 1997).

Hemos visualizado como se entrelazan y encuentran en el espacio poblaciones que viven bajo condiciones de vida más desfavorables con una mayor proporción de problemas y aspectos vinculados a la salud. Distintas son las posibilidades de exposición a problemas de salud, entrelazados por las condiciones de vida y los estilos de vida. Condiciones de vida entendidas en las condiciones básicas de subsistencia; estilos de vida entendidos como las formas social y culturalmente determinadas de vida, expresadas en los patrones de alimentación, hábitos o el uso del tiempo libre (Possas, 1989).

Entonces, esta configuración se construye con la historia local, en los encuentros y desencuentros entre diferentes al interior del espacio urbano; con expresiones, magnitudes e intensidades particulares, distintas a las estudiadas en ciudades de mayor tamaño (Matossian, 2015b). Las personas no son solamente habitantes de determinado lugar son también productoras, consumidoras y miembros de una clase social, que ocupa un lugar específico y especial en el espacio (Santos, 2002).

Los fenómenos se dan en contextos que son cada vez más amplios. La historia que ocurre en un determinado lugar, no se restringe a los límites de ese lugar, va mucho más allá. Cada lugar combina de manera particular aspectos que pueden ser comunes a muchos lugares (Santos, 1988). Existe una relación entre el nivel global y el nivel local, conjuntamente esenciales para comprender el Mundo y el Lugar: lo que sucede localmente está referido, en última instancia, al acontecer mundial. Los distintos acontecimientos reproducen una totalidad,

son complementarios y se explican entre sí; cada evento es fruto de Mundo y Lugar al mismo tiempo (Santos, 1997).

6.4.3 Agregación espacial y mecanismo de reacción

Uno de los principales intereses en analizar la distribución geográfica de eventos es observar la presencia de agregaciones en el espacio (*clustering*). Estos pueden ser atribuidos a aspectos demográficos, genéticos, ambientales o socioculturales, superpuestos geográficamente al patrón observado (Barradas Barata & Wernecke, 2012). Uno de los mecanismos para explicar la agregación espacial según Barradas Barata y Werneck (2012) es el *mecanismo de reacción*, empleado para explicar estas relaciones en problemas crónicos de salud, donde las personas afectadas, independientemente unas de otras, están sujetas a un riesgo más alto en función de compartir un mismo conjunto de exposiciones; las personas así *reaccionan* conjuntamente.

Esta agregación en el espacio determina patrones espaciales, como en nuestro caso observamos cierta agregación espacial de personas con los problemas de salud vinculados a enfermedad cardiovascular. Como los alimentos que se consuman, las actividades recreativas que se realicen, las posibilidades o imposibilidades de descender de peso, se verán fuertemente influenciadas por determinados comportamientos de los individuos y por las “elecciones” que estos realicen o puedan realizar, vinculadas a patrones culturales/étnicos de gustos y posibilidades de elección. Los individuos reaccionan así conjuntamente a su entorno. La magnitud de determinadas decisiones tomadas por los individuos (o agregados de individuos) depende de reacciones a decisiones tomadas por otros. El hecho que un individuo elija determinada decisión se ve influenciada y afectada por elecciones realizadas por otros individuos directa (modelo del derrame / *spillover model*) o indirectamente (flujo de recursos / *resource flow*) (Anselin, 2002). Este autor vincula estos conceptos al uso de la tierra por parte de trabajadores rurales: la cantidad de tierra que asigna un agricultor al cultivo en su tierra se relaciona con la tierra asignada por otro agricultor (mecanismo directo) y por la cantidad de recursos de los que dispone (como puede ser el volumen de agua para riego) (mecanismo indirecto). Estos aspectos interaccionan con decisiones tomadas en otros niveles, siguiendo el ejemplo presentado por el autor del trabajador rural: por cómo se distribuye el recurso (agua) entre ellos.

Así, llevando esto a pensar los mecanismos de reacción como explicación de los patrones espaciales de enfermedades crónicas como proponen Barradas, Barata & Werneck (2012) nos lleva a pensar como personas que viven en el mismo vecindario o en vecindarios aledaños toman decisiones vinculadas a sus comportamientos cotidianos, vinculando zonas de las ciudades con modos de construir los hogares y sus entornos o en decoraciones

elegidas, en las actividades realizadas, en los alimentos consumidos. Pero también influenciados por aspectos de otros niveles como puede ser la disponibilidad de los mismos y sus posibilidades de acceso.

6.4.4 Estrategias individuales, estrategias poblacionales

Ante un problema de salud que se mide y manifiesta a nivel de los individuos, pero donde estudiamos poblaciones, donde se responsabiliza al individuo de la prevención de la enfermedad y de la ocurrencia de eventos, nos planteamos esta dicotomía entre estrategias a nivel poblacional e individual, entre abordajes a nivel individual y poblacional.

Es más difícil demostrar relaciones a nivel individual entre la dieta de un individuo, su actividad física, su peso corporal y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo a nivel poblacional es diferente, se ha mostrado la existencia de relaciones entre valores poblaciones promedio de mayor ingesta de sodio e HTA, mayor ingesta de grasas saturadas y enfermedad coronaria; “los factores determinantes de la incidencia no son necesariamente los mismos que las causas de los casos” (Rose, 1991, p. 902).

A pesar de esto, los abordajes utilizados para enfrentar estos problemas de salud habitualmente se centran en estrategias individuales y no poblacionales (Alazraqui, *et al.*, 2007). Estrategias necesarias pero complejas, ya que muchos de estos aspectos se vinculan a comportamientos: fumar, comer verdura, hacer ejercicio son características de nuestro estilo de vida restringidos por normas sociales (Rose, 1991) y por las diferencias en las posibilidades de elección y acceso (Menéndez, 2009). Dejar de fumar, cambiar nuestra dieta, realizar actividad física son aspectos que están fuertemente condicionados por nuestras costumbres y por las de nuestro entorno. Pero una vez que el cambio social ha sido adoptado, el mantenimiento de esta situación ya no requiere esfuerzos a nivel individual (Rose, 1991).

Por otro lado, el acceso (y la continuidad) en el sistema de salud resulta clave para complementar y construir estos cambios poblacionales. Sumado a esto, en personas con problemas crónicos de salud, quienes necesitan el uso diario y continuo de tratamientos farmacológicos, requieren estrategias individuales. Para ello distintos aspectos que aseguren un acceso (y su continuidad en el tiempo) tendrán impacto en estas enfermedades crónicas. Frenk (1985) propone tres dimensiones para analizar la accesibilidad: la ecológica (en relación a la ubicación geográfica), la organizacional (en el ingreso al sistema de salud y su continuidad) y la financiera (costos directos e indirectos). En nuestro caso, la población analizada en este trabajo representa un subgrupo: únicamente quienes están siendo atendidos en los centros de salud públicos. Éste parecería homogéneo pero podemos encontrar diferencias en estas dimensiones propuestas para medir accesibilidad que podrían repercutir en los problemas de salud estudiados. Diferencias en las distancias y en la

ubicación de los centro de salud (dimensión ecológica), diferencias en la modalidad de atención e ingreso (dimensión organizacional) y diferencias en las condiciones de vida de los individuos y en la provisión de insumos por parte del estado que impactan en la posibilidad de acceso continuo a medicamentos (dimensión financiera).

Por ello consideramos fundamental para afrontar uno de los principales problemas sanitarios como las enfermedades cardiovasculares, la búsqueda de estrategias que superen el abordaje exclusivamente individual. La identificación y localización de los grupos sociales más afectados, tomar en cuenta potenciales barreras en el acceso a los servicios de salud, son aspectos que podrían ayudar a mejorar la gestión sanitaria, a tomar decisiones basadas en patrones epidemiológicos de personas atendidas en el sistema público y que viven con problemas crónicos de salud.

6.4.5 Fortalezas y limitaciones

En este trabajo fueron estudiadas las personas atendidas en los centros de salud públicos empleando historias clínicas como una de las fuentes de información. Esto fue realizado ya que las historias clínicas de los centros de salud presentan sus fortalezas en relación a las historias clínicas de otros niveles de atención o al uso de éstas para el estudio de otros problemas de salud: como una mejor completitud, seguimiento, disponibilidad y acceso (Apéndice D). Pero presenta sus limitaciones ya que la cantidad de personas estudiadas es menor y pertenecen a zonas con condiciones de vida más desfavorables, lo cual no nos permitió comparar entre las distintas zonas de la ciudad, centrando los análisis en los individuos que viven en las zonas con peores condiciones de vida.

Otra de las fortalezas se vincula al hecho de haber incorporado distintos aspectos para el análisis espacial de problemas crónicos de salud: características de los vecindarios, de los centros de salud y de los individuos. Estos representan aspectos que nos son habitualmente analizados en conjunto para el estudio de problemas crónicos de salud. A su vez, son resultados que pueden ser útiles para el diseño de intervenciones a nivel local a partir del análisis de su distribución en el espacio.

7. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN CONTEXTOS DE DESIGUALDAD: ESTUDIO CON ABORDAJE MULTINIVEL EN UNA POBLACIÓN URBANA DE BARILOCHE, NORPATAGONIA ARGENTINA.

7.1 Introducción

La carga de enfermedad y mortalidad por enfermedades no transmisibles representada principalmente por las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas está aumentando a nivel mundial. De acuerdo a datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en 2012, 68% de las muertes en el mundo se debieron a estas enfermedades; tres de cada cuatro ocurrieron en países con bajos y medianos ingresos, países donde ocurren la mayoría de las muertes prematuras (en menores de 70 años) (OMS, 2015).

Existe gran cantidad de publicaciones que muestran que en la población general, la privación social y material están directamente relacionadas con el desarrollo de enfermedades e inversamente relacionadas al estado de salud (Kaplan & Keil, 1993; Cerezo-Correa, *et al.*, 2012; Riva, *et al.*, 2007; Fleischer & Diez Roux, 2013). Distintos autores han publicado revisiones que muestran la relación entre condiciones socioeconómicas y enfermedades cardiovasculares en general (Fleischer & Diez Roux, 2013; Tang, *et al.*, 2016), diabetes (Agardh, *et al.*, 2011; Ricchi-Cabello, *et al.*, 2010; Brown, *et al.*, 2004) o hipertensión arterial (Grotto, *et al.*, 2008) en particular. En los últimos años existe un volumen creciente de publicaciones que muestran el efecto de las inequidades sociales en estos problemas de salud (Almeida-Filho, *et al.*, 2003; Bleich, *et al.*, 2012; Brown, *et al.*, 2004).

Existe un interés creciente en investigar la temática que muestra el efecto de las desigualdades sociales en las enfermedades cardiovasculares en países de altos ingresos (Capítulo 5), esta literatura es escasa en Latinoamérica (Fleischer & Diez Roux, 2013). Queremos abordar el estudio de desigualdades tomando las enfermedades cardiovasculares en una localidad de la Patagonia en la Argentina, un país de medianos ingresos.

Para analizar la relación entre enfermedades crónicas y desigualdades sociales, uno de los abordajes posibles son los modelos multinivel (Ben-Shlomo & Kuh, 2002). Este tipo de modelos tienen la potencialidad de analizar factores actuando en niveles jerárquicos, desde lo macro-económico hasta el molecular. Parten del concepto en el cual los individuos son influenciados por los grupos sociales a los cuales pertenecen y, a su vez, las características de estos grupos se ven influenciadas por los individuos que los conforman (Hox, 1995). Los modelos multinivel integran individuos dentro de sus grupos o contextos sociales, analizando los efectos combinados tanto de las variables individuales como de las grupales (Diez Roux, 2008).

Fueron publicados diferentes estudios que emplearon análisis multinivel para estudiar enfermedad cardiovascular en personas con diabetes que incorporaron como nivel de análisis aspectos vinculados al sistema de salud: como el uso de la atención médica (consultas, internaciones), comunicación (entre el equipo de salud y con pacientes), las especialidades médicas disponibles y la duración de la consultas (Struijs, *et al.*, 2006; Tai-Seale, *et al.*, 2014); por otro lado, otros estudios analizan el desarrollo de diferentes enfermedades cardiovasculares y su relación con vivir en vecindarios con mayor deprivación o con bajo nivel socioeconómico (Sundquist, *et al.*, 2004; Diez Roux, *et al.*, 2001; Chau, *et al.*, 2011; Stjarne, *et al.*, 2006; Chaikiat, *et al.*, 2012).

El objetivo de este trabajo fue indagar la relación de aspectos del nivel individual, de los vecindarios y del sistema de salud con la presencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes y/o hipertensión arterial en Bariloche, norpatagonia Argentina. Para ello se aplicaron técnicas de análisis multinivel buscando la interrelación entre características de los individuos, del lugar donde viven y de donde atienden su salud.

7.2 Metodología

7.2.1 Área de estudio

El presente estudio se llevó adelante en la ciudad de San Carlos de Bariloche (en adelante Bariloche), ubicada en la norpatagonia argentina, allí viven en base a datos censales del año 2010, 112.887 personas (INDEC, 2013a). Una economía local concentrada alrededor del turismo (Abaleron, 1995; Matossian, 2015), lo cual genera oscilaciones propias de esta actividad: puestos de trabajo temporario y una mayor oferta de empleo durante los meses de mayor afluencia de turistas en la zona. Es una ciudad en la cual una parte de la población vive en condiciones socioeconómicas y ambientales privilegiadas, y un gran grupo en condiciones de alta vulnerabilidad (Capítulo 6). Esta polarización económico-social y cultural se manifiesta en la convivencia, no libre de conflictos, entre la imagen de una aldea turística, inserta en la zona de bosques y en la costa de lagos, hacia el noroeste, y el contraste con numerosos barrios pobres (Matossian, 2016, p. 4).

A nivel local, el sistema público de salud es responsabilidad de la provincia, conformado por el Hospital Zonal Bariloche “Dr. Ramón Carrillo” y 15 centros de salud bajo su dependencia, 13 de ellos ubicados en las distintas zonas de la ciudad y dos en localidades aledañas.

7.2.3 Diseño y población

Fue realizado un estudio transversal con análisis multinivel. La población estudiada fueron las personas adultas (con 18 años o más) bajo seguimiento clínico por diabetes y/o hipertensión arterial en los centros de salud públicos de Bariloche en los años 2014-2015.

7.2.4 Unidades de análisis

Para el análisis multinivel fueron definidas tres unidades de análisis: a) *Individuos*: personas de 18 años o más con diagnóstico de diabetes y/o hipertensión arterial atendidas en los centros de salud públicos de Bariloche; b) *vecindarios*: lugar donde viven los individuos en base a sus domicilios; c) *centros de salud*: establecimiento sanitario público donde fueron atendidos los individuos con diabetes e hipertensión arterial. Cada una de estas unidades de análisis se corresponde con un nivel de análisis: unidades de un nivel inferior (individuos) integrados en unidades de niveles superiores (vecindarios y centros de salud). Si bien las unidades de análisis del nivel superior son distintas, no son jerárquicas unas en relación a las otras, ya que las vecindades no están anidadas en los centros de salud, ni los centros de salud en las vecindades.

7.2.5 Fuentes de información

a) Nivel 1 (*individuos*). Fueron empleadas las historias clínicas de los centros de salud públicos de Bariloche de las personas con diabetes mellitus tipo 2 (en adelante diabetes) y/o hipertensión arterial primaria (en adelante HTA) que hubieran consultado entre los años 2010 y 2015. Fueron excluidas: a) historias clínicas donde figuró la última consulta antes del año 2009 y b) historias clínicas donde las personas presentaron menos de 3 consultas en total, debido a que en estos casos no pudieron ser relevados en forma completa los datos necesarios para la investigación.

Para mejorar la calidad de los registros relevados se realizó un *record linkage* determinístico (Olivera, *et al.*, 2016), metodología donde se combinan registros de distintas bases de datos a partir de un identificador común (Coeli, 2015; Mota, *et al.*, 2011). En nuestro caso fue realizado un *record linkage* entre la base de datos de los individuos con diabetes e HTA atendidos en los centros de salud y las bases de datos de los egresos hospitalarios entre 2005 y 2015 del Hospital Zonal Bariloche de internaciones que los individuos atendidos en los centros de salud pudieran haber tenido. Esto nos permitió complementar datos faltantes de los problemas de salud estudiados, como la especificidad del diagnóstico de egreso o situaciones de internación omitidas. Cada historia clínica correspondió a un individuo sin presentar duplicaciones (cada individuo es atendido solamente en un centro de salud); cada

individuo presentó ninguna, una o más de una internación (medidas a partir de los egresos hospitalarios).

b) Nivel 2a (*vecindario*): Para elaborar este nivel fueron empleados indicadores del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INDEC, 2013a), extraído mediante el programa RADATAM (Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC-) empelando información a nivel radio censal: áreas definidas por el INDEC que contienen entre 200 y 400 viviendas, empleadas como proxi de vecindad (Diez Roux & Mair, 2010).

Para relacionar las características de los individuos con las de su vecindad (nivel 1 con nivel 2a), se utilizó el radio censal, utilizando los datos de los domicilios donde viven los pacientes que figuraban en cada historia clínica. Fue adjudicado el código del radio censal a través del georreferenciamiento mediante el *software QGIS*.

c) Nivel 2b (*centro de salud*): fue empleada información relevada a través de documentos disponibles en los centros de salud y de entrevistas semiestructuradas a los agentes sanitarios de cada centro de salud.

Para relacionar los individuos con los centros de salud (nivel 1 y nivel 2b) se utilizó el nombre del centro de salud donde fueron atendidos los pacientes y donde fueron relevados los datos individuales.

Desde el punto de vista estadístico, para realizar estimaciones confiables en regresiones logísticas multinivel, son necesarias por lo menos 30 unidades del nivel 1 por cada una de las unidades del nivel 2 (Teles Santos, *et al.*, 2011). Como consecuencia, en estos casos, para caracterizar al vecindario fue seleccionado uno de estos radio censales (dentro de los que conforman el vecindario); imputando los individuos de un mismo vecindario a uno de sus radio censales, con el fin de buscar mayor cantidad de unidades del nivel 1 por cada unidad del nivel 2 (individuos en cada vecindario). Para realizar esta selección fueron empleadas dos variables presentes en los datos censales que midieran el nivel socioeconómico: educación y NBI. A partir de los valores de estas variables fueron imputados los individuos de ese vecindario (constituido por varios radio censales) a un solo radio censal (de ese mismo vecindario), siempre y cuando el radio censal presentara valores similares en las variables socioeconómicas (perteneciente al mismo cuartil). En promedio hubo 23 individuos por vecindario.

7.2.6 Variables

a. Nivel 1 (*individuos*):

Variables explicativas:

- Sociodemográficas: *edad* (menor o mayor a 55 años), *sexo* (femenino, masculino), *inmigrante* (nacido en otro país: si, no), *vivir sola/o* (si, no).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

- Socioeconómicas: *educación* (analfabeto/a, primaria incompleta, primaria completa, secundaria completa y más), *obra social* (si, no), *trabajo* (empleada/o, oficios, trabajo doméstico, pensionada/o ó jubilada/o).
- Problemas de salud: *IMC* (índice de masa corporal = peso/altura²) *cambio peso corporal* (entre el inicio del seguimiento y el último peso (bajó [+ 2 kg], se mantuvo [$\pm$ 2 kg] o subió [+2 kg]), *diabetes* (si, no), *HTA* (si, no) *otra enfermedad crónica* (si: problemas respiratorios crónicos, cáncer, problemas de salud mental, problemas neurológicos, artritis; no).
- Otros problemas: *tabaquismo* (no, actual, ex), *alcoholismo* (no, problemas actuales o pasados con el alcohol), *problemas intrafamiliares* (registro de problemas de violencia intrafamiliar, adicciones o alcoholismo en el entorno familiar).

Variables respuesta: las siguientes enfermedades cardiovasculares: enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca hipertensiva (Apéndice A).

b. nivel 2a (vecindad): *NBI* (Necesidades Básicas Insatisfechas). Porcentaje de población con al menos uno de los siguientes indicadores de en ese RC: i. Hogares que habitan viviendas con más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico), ii. Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo), iii. Hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua, iv. Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela, v. Hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario) (DINREP, 2014).

c. Nivel 2b (centro de salud)

- *Consultas en el último año:* media mayor a 2 o menor a 2 de consultas en el último año en el centro de salud de la población con diabetes y/o HTA.
- *Población identificada:* no /si (si: listado nominalizado y separación de las historias clínicas de las personas con diabetes e HTA en ese centro de salud)
- *Distancias:* cercanas, intermedias y alejadas. En relación a la distancia del centro de salud al hospital y del tamaño del área de influencia, representando la distancia que deben realizar los individuos para llegar al centro de salud.

7.2.7 Análisis de datos

Para analizar la información relevada se elaboró una base de datos electrónica. En un primer momento se realizó un análisis descriptivo. Luego se realizaron los análisis multinivel, tanto crudos como ajustados por los aspectos medidos a nivel individual. El modelo de regresión empleado fue logístico multinivel, elaborando distintos modelos para cada enfermedad cardiovascular, incorporando distintas variables explicativas para analizar distintos desenlaces. La variable respuesta fue la presencia o ausencia de alguna enfermedad cardiovascular (ECV): enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca hipertensiva.

La medida de asociación fue el *odds ratio* (OR). Para evaluar significancia se usó un α de 0,05 y un intervalo de confianza del 95%. Se utilizó el programa estadístico STATA 13, comando xtlogit.

Para evaluar la modificación de efecto (interacción) se utilizó el término producto (término formado por el predictor principal con la covariable), este luego fue sometido al test de significancia estadística; en caso que este fue significativo se procedió al análisis para cada estrato de la covariable (Amorim, *et al.*, 2011).

Para evaluar las posibles variables confusoras se comparó el OR crudo y ajustado (Szklo & Nieto, 2003). En los casos donde nos encontramos ante una variable confusora, se informó el OR ajustado (Amorim, *et al.*, 2011).

Finalmente fue calculado el coeficiente de correlación interclase (CCI), el cual en los modelos multinivel logísticos se estima mediante rho (ρ), el cual oscila entre 0 y 1 (Teles Santos, *et al.*, 2011). Este valor nos da la semejanza entre unidades del nivel inferior pertenecientes a la misma unidad del nivel superior, “la proporción de la varianza de la variable dependiente que corresponde a diferencias entre grupos” (Diez Roux, 2003, p. 11).

7.2.8 Recaudos éticos

Fueron protegidos los datos que permitieran identificar a las personas de las historias clínicas y los egresos hospitalarios, solo habiendo tenido acceso a esta información la investigadora en el momento de recolección de los datos y con el único fin de realizar el *record linkage* entre ambas bases de datos. Luego estos datos fueron eliminados y codificados. Se protegió la confidencialidad de las personas según la Ley de Protección de los datos personales, N° 25.326 para el procesamiento de Datos Sensibles y la Ley de Secreto Estadístico N° 17.622.

Este trabajo ha sido aprobado por el comité de ética del Hospital Zonal Bariloche con fecha 06/06/2014 y por la Comisión de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Lanús con fecha 19/6/2018.

7.3 Resultados

7.3.1 Descripción de la población estudiada

Fueron estudiados un total de 820 individuos atendidos en los 13 centros de salud públicos de Bariloche agrupados en 36 vecindarios. En total hubo un promedio de 22,8 individuos ($\pm 17,8$ DE) por vecindario; a nivel sistema de salud hubo un promedio de 68,3 ($\pm 44,7$) individuos por centro de salud.

Un 43,5% (357) de los individuos estuvieron internados en el Hospital Zonal Bariloche, la mitad de ellos una vez, los restantes dos o más veces; un 13,0% (107) estuvieron internados por causas vinculadas a la problemática estudiada. En promedio, estuvieron internados dos veces entre los años 2005 y 2015, con una media de 7 días cada vez.

En las Tablas 7.1 y 7.2 se puede observar la distribución de las distintas características medidas a nivel individual. De los 820 individuos un 71,1% (583) fueron mujeres. La media de edad en la población fue de 61,1 años, siendo ésta levemente mayor entre los hombres en relación a las mujeres (62,3 vs 60,7 años).

El 45,4% (372) de los individuos nacieron en otros países, principalmente en Chile (39,6%).

La mayoría de las mujeres realizaban principalmente trabajo dentro de su hogar (53,9%) seguido por las que se dedicaban al empleo doméstico u otros tipos de empleo. En cambio, los hombres se dedicaron principalmente a los oficios, seguidos por los empleados. Una mayor proporción de hombres refirieron estar jubilados o pensionados en relación a las mujeres (10,1% vs 5,3%).

Con respecto a otros problemas de salud, hubo un mayor consumo de alcohol en exceso (actual o en el pasado) entre los hombres, sumando un 32,1%; entre las mujeres este valor fue de 2,7%. Lo mismo sucedió con el tabaquismo, sumando los tabaquistas actuales y en el pasado un 39,7% entre los hombres y un 26,2% entre las mujeres.

Un 21,2% de la población tenía registrados otros problemas crónicos de salud, siendo este valor similar entre mujeres y hombres.

El IMC promedio fue de 32,6 kg/m², con un valor mayor entre las mujeres en relación a los hombres (33,5 vs 30,3).

Las enfermedades cardiovasculares analizadas presentaron diferentes frecuencias. Un 5,8% presentó enfermedad cerebrovascular, un 3,4% enfermedad coronaria. Entre la subpoblación con HTA un 22,0% presentó problemas cardíacos. Todas las frecuencias fueron mayores entre los hombres.

Distinta es la relación entre la frecuencia de individuos con ECV según donde éstos fueron atendidos en base las distintas características de los centros de salud. Entre los

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

individuos atendidos en centros de salud sin población identificada la proporción de enfermedad cerebrovascular fue de 8,6% y de 4,7% entre aquellos individuos atendidos en centros de salud donde la población sí estuvo identificada; para las otras dos ECV es similar el porcentaje entre ambas categorías. En cambio, la proporción de individuos con enfermedad coronaria y atendidos en centros de salud con una media de consultas menor a 2 en el último año fue de 4,6%; aquellos con una media mayor a 2 fue de 2,6%; para las otras dos ECV es similar el porcentaje entre ambas categorías. Finalmente, la proporción de individuos con enfermedad cardíaca hipertensiva atendidos en centros de salud con diferentes distancias fue: de 17,5% entre aquellos más cercanos, 23,0% intermedios y 31,2 % aquellos alejados; para las otras dos ECV es similar el porcentaje entre estas tres categorías.

Tabla 7.1: Características demográficas y socioeconómicas de los individuos y los vecindarios. Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.

	Mujeres (n=583) n (%)	Hombres (n=237) n (%)	Total (n=820) n (%)
CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS			
Edad			
≤ 55 años	167 (28,6)	53 (22,3)	220 (26,8)
>55 años	416 (71,4)	184 (77,6)	600 (73,2)
Edad. Media ± DE	60,7 (± 11,8)	62,3 (± 11,4)	61,1 (± 11,7)
Inmigrante			
Si	256 (43,9)	116 (48,9)	372 (45,4)
No	327 (56,1)	118 (49,8)	445 (54,2)
No figura	-	3 (1,3)	3 (0,4)
Vivir sola/o			
Si	59 (10,1)	29 (12,2)	88 (10,7)
No	524 (89,9)	208 (87,8)	732 (89,3)
Obra social			
Si	191 (32,8)	66 (27,8)	257 (31,3)
No	392 (67,2)	171 (72,1)	563 (68,7)
Trabajo			
Empleada/o	153 (26,2)	34 (14,3)	187 (22,8)
Oficio	52 (8,9)	137 (57,8)	189 (23,0)
Trabajo doméstico	314 (53,9)	-	314 (38,3)
Pensionada/o	31 (5,3)	24 (10,1)	55 (6,7)
No figura	33 (5,7)	42 (17,7)	75 (9,1)
Educación			
Analfabeto/a	67 (11,5)	13 (5,5)	80 (9,8)
Primaria incompleta	118 (20,3)	45 (19,0)	163 (19,9)
Primaria completa	115 (19,7)	50 (21,1)	165 (20,1)
Secundaria incompleta y más	77 (13,2)	32 (13,5)	109 (13,3)
No figura	206 (35,3)	97 (40,9)	303 (36,9)
Problemas familiares			
No	499 (85,6)	229 (96,6)	728 (88,8)
Si	84 (14,4)	8 (3,4)	92 (11,2)
CATACTERÍSTICAS DE LOS VECINDARIOS^a			
Necesidades básicas insatisfechas (NBI)			
Q1 (0-11,5)	101 (17,3)	32 (13,5)	133 (16,2)
Q2 (12,1-17,2)	161 (27,6)	72 (30,4)	233 (28,4)
Q3 (17,3-24,7)	166 (28,5)	74 (31,2)	240 (29,3)
Q4 (27,1-56,5)	155 (26,6)	59 (24,9)	214 (26,1)

Fuente: elaboración propia en base a las historias clínicas, egresos hospitalarios y datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC).

DE = desvío estándar

^a Distribución de los vecindarios donde viven los individuos en base al porcentaje de hogares (valores entre paréntesis) con al menos un NBI agrupados en cuartiles (Q).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Tabla 7.2: Problemas de salud de los individuos y características de los centros de salud. Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015.

	Mujeres (n=583) n (%)	Hombres (n= 237) n (%)	Total (n=820) n (%)
Alcoholismo			
No	545 (93,5)	127 (53,6)	672 (81,9)
Social	22 (3,8)	34 (14,3)	56 (6,8)
Alcoholismo	13 (2,2)	59 (24,9)	72 (8,8)
Ex alcoholismo	3 (0,5)	17 (7,2)	20 (2,5)
Tabaquismo			
No tabaquista	430 (73,8)	143 (60,3)	573 (69,9)
Tabaquista	100 (17,1)	58 (24,5)	158 (19,3)
Ex tabaquista	53 (9,1)	36 (15,2)	89 (10,8)
Peso corporal			
Normal	58 (9,9)	33 (13,9)	91 (11,1)
Sobrepeso	142 (24,4)	80 (33,8)	222 (27,1)
Obesidad grado I	175 (30,0)	77 (32,5)	252 (30,7)
Obesidad grado II	105 (18,0)	27 (11,4)	132 (16,1)
Obesidad grado III	98 (16,8)	16 (6,8)	114 (13,9)
No figura	5 (0,9)	4 (1,7)	9 (1,1)
IMC inicial. Media $\pm$ DE	33,5 ($\pm$ 7,2)	30,3 ($\pm$ 5,3)	32,6 ($\pm$ 6,9)
Cambio de peso			
Bajo de peso	271 (46,5)	84 (35,5)	355 (43,3)
Se mantuvo	126 (21,6)	66 (27,8)	192 (23,4)
Subió de peso	181 (31,0)	83 (35,0)	264 (32,2)
No figura	5 (0,9)	4 (1,7)	9 (1,1)
Diabetes e HTA			
Solo diabetes	72 (12,3)	36 (15,2)	108 (13,2)
Solo HTA	333 (57,1)	140 (59,1)	473 (57,7)
Ambas juntas	178 (30,5)	61 (25,7)	239 (29,1)
Otros problemas crónicos			
Si	126 (21,6)	48 (20,2)	174 (21,2)
No	457 (79,4)	189 (79,8)	646 (78,8)
Enfermedad cardiovascular			
Enfermedad coronaria	13 (2,2)	15 (6,3)	28 (3,4)
Enfermedad cerebrovascular	23 (3,9)	25 (10,5)	48 (5,8)
Enfermedad cardíaca hipertensiva ^a	99 (19,4)	58 (28,9)	157 (22,0)

Fuente: elaboración propia en base a las historias clínicas, egresos hospitalarios.

IMC = Índice de masa corporal.

^a Solamente en los individuos con HTA (n=712).

7.3.2 Enfermedades cardiovasculares

Fue calculado el promedio en años entre el diagnóstico de diabetes y/o HTA (el que hubiera sido diagnosticado primero) y el diagnóstico de cada una de las enfermedades cardiovasculares como complicaciones de diabetes y/o HTA. Éste fue para enfermedad cerebrovascular 5,6 años, para enfermedad coronaria 6,6 años y de 7,7 años para enfermedad cardíaca hipertensiva. En todas ellas el tiempo fue mayor para las mujeres que para los hombres.

El promedio de edad del diagnóstico de diabetes y de HTA fue de 51,5 y 51,8 años respectivamente. El promedio de edad entre los hombres fue dos años mayor en relación a las mujeres (53,3 vs 51,1 años).

Fueron construidos distintos modelos de regresión logística multinivel (vecindarios y centros de salud), uno para cada enfermedad cardiovascular (ECV).

No se encontró asociación entre el índice de masa corporal y ninguna de las enfermedades cardiovasculares estudiadas.

a. Enfermedad cerebrovascular

En de la población total estudiada (con diabetes y/o HTA) un 5,9% presentó enfermedad cerebrovascular; este valor fue de 7,2% entre los individuos sólo con HTA y 6,3% entre las personas con diabetes más HTA. Todos los individuos que tuvieron enfermedad cerebrovascular tenían HTA.

En la tabla 3 se observa el análisis en base a las características de los vecindarios (nivel de NBI) y de los individuos (sexo, edad, alcoholismo y cambio de peso). Así, tanto en el modelo sin ajuste (modelo 1) como en el ajustado (modelo 2) el valor puntual de OR es mayor en los niveles de vecindario con mayor proporción de viviendas con NBI, entre 2 y 3 veces más *odds*, pero sin encontrar significancia estadística en los modelos ajustados (únicamente en el modelo crudo): cuartil 1 de referencia, el cuartil 2 OR 2,89 (IC95% 0,79-10,57), cuartil 3 OR 2,81 (IC95% 0,76-10,42) y cuartil 4 OR 1,87 (IC95% 0,45-7,70) (Tabla 7.3).

En el modelo multinivel en base a características del sistema de salud ajustado por sexo, edad, alcoholismo y diferencia de peso, se obtuvo casi dos veces más *odds* de tener enfermedad cerebrovascular en aquellos establecimientos donde no se tenía a la población con diabetes y/o HTA identificada (OR 1,98 [IC95%: 1,07-3,66]) (Tabla 7.3).

b. Enfermedad coronaria

Un 3,4% (28) de las individuos estudiados (con diabetes y/o HTA) presentaron enfermedad coronaria. Entre los que sólo tenían diabetes este valor fue de 1,8%, de 2,1% entre los que sólo tenían HTA y de 6,3% entre aquellos que tenían ambas (diabetes e HTA).

A nivel vecindad, en el modelo ajustado se observó un gradiente positivo entre el nivel de NBI y la presencia de enfermedad coronaria entre el nivel más bajo de NBI (cuartil 1 de referencia), el cuartil 2 (OR 4,66 [IC95% 0,57-37,97]), cuartil 3 (OR 5,91 [IC95% 0,73-47,64]) y con un valor similar en el cuartil 4 (OR 5,57 [IC95% [0,67-46,01]]). No se encontró significancia estadística (Tabla 7.4).

Al analizar el modelo multinivel con aspectos de los centros de salud se encontró relación con la media de consultas, con mayores *odds* de enfermedad cardiovascular entre aquellos centros de salud con una media menor a 2 consultas en el último año (OR 2,15 [IC95% 0,95-4,86]) (Tabla 7.4).

c. Enfermedad cardíaca hipertensiva

Un 22,1% (157) de los individuos con HTA presentaron enfermedades cardíaca hipertensiva; este valor fue similar entre aquellos que solo tenían con HTA y aquellos que además tenían diabetes (22,3 vs 22,1%).

En este caso se encontró escasa relación en base al nivel de NBI de los vecindarios con valores de OR alrededor de 1 tanto en el análisis crudo como ajustados (Tabla 7.5).

En relación a la variación entre centros de salud, se encontró asociación con aquellos centros de salud con mayor distancia al hospital y mayor distancia entre los vecindarios y el centro de salud, con un gradiente positivo entre aquellos más cercanos (referencia), los de una distancia intermedia (OR 1,73 [IC95%1,11-2,69]) y aquellos más alejados (OR 2,31 [IC95% 1,24-4,32]), donde a mayor distancia, mayores *odds* de enfermedad cardíaca hipertensiva (Tabla 7.5).

Para enfermedad cerebrovascular los valores de rho (coeficiente de correlación interclase para los modelos logísticos multinivel) fueron mejores para el modelo ajustado por sexo, edad, alcoholismo y cambio de peso (0,021) en relación al modelo ajustado por sexo y edad (0,000). Para las demás enfermedades presentadas, se encontraron rho de 0,000.

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Tabla 7.3: OR (*odds ratio*) crudo y ajustado en los modelos multinivel para enfermedad cerebrovascular en la población con diabetes y/o hipertensión arterial atendidas en los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015 (n=820).

	OR crudo (Vecindad). Modelo 1			OR ajustado (Vecindad). Modelo 2			OR crudo (Sistema de salud). Modelo 3			OR ajustado (Sistema de salud). Modelo 4		
	OR	(IC95%)	Valor p	OR	(IC95%)	Valor p	OR	(IC95%)	Valor p	OR	(IC95%)	valor p
Edad												
≤ 55	1			1			1			1		
>55	4,28	(1,52-12,03)	0,006	3,80	(1,33-10,85)	0,013	4,28	(1,52-12,03)	0,006	4,09	(1,43-11,70)	0,008
Sexo												
Femenino	1						1					
Masculino	2,87	(1,59-5,17)	0,000	3,04	(1,60-5,79)	0,001	2,87	(1,59-5,17)	0,000	3,02	(1,60-5,71)	0,001
Alcoholismo												
No	1			1			1					
Actual o ex	0,91	(0,35-2,37)	0,856	0,34	(0,11-1,05)	0,060	0,91	(0,35-2,37)	0,856	0,32	(0,10-0,97)	0,044
Diferencia de peso												
Bajo de peso	1			1			1			1		
Se mantuvo	2,08	(0,90-4,82)	0,086	1,70	(0,72-4,03)	0,226	2,08	(0,90-4,82)	0,086	1,69	(0,72-3,98)	0,229
Subió de peso	3,13	(1,50-6,50)	0,002	2,82	(1,33-5,99)	0,007	3,13	(1,50-6,50)	0,002	2,94	(1,39-6,21)	0,005
NBI												
Cuartil 1	1			1								
Cuartil 2	3,41	(0,96-12,08)	0,058	2,89	(0,79-10,57)	0,108						
Cuartil 3	3,56	(1,00-12,61)	0,049	2,81	(0,76-10,42)	0,121						
Cuartil 4	2,00	(0,50-8,02)	0,327	1,87	(0,45-7,70)	0,387						
Población identificada												
Si							1			1		
No							1,91	(1,06-3,46)	0,031	1,98	(1,07-3,66)	0,030

Fuente: elaboración propia en base a las historias clínicas, egresos hospitalarios, entrevistas en los centros de salud y datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC).

Tabla 7.4: OR (*odds ratio*) crudo y ajustado en los modelos multinivel para enfermedad coronaria en la población con diabetes y/o hipertensión arterial atendidas en los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015 (n=820).

	OR crudo (Vecindad). Modelo 1			OR ajustado (Vecindad). Modelo 2			OR crudo (Sistema de salud). Modelo 3			OR ajustado (Sistema de salud). Modelo 4		
	OR	(IC95%)	Valor p	OR	(IC95%)	Valor p	OR	(IC95%)	Valor p	OR	(IC95%)	Valor p
Sexo												
Femenino	1			1			1			1		
Masculino	2,96	(1,39-6,32)	0,005	2,94	(1,33-6,50)	0,008	2,96	(1,39-6,32)	0,005	3,89	(1,77-8,51)	0,001
Diabetes e HTA												
HTA solo	1			1			1					
Diabetes solo	0,87	(0,19-4,04)	0,863	0,78	(0,17-3,67)	0,758	0,87	(0,19-4,04)	0,863			
Ambas	3,32	(1,48-7,44)	0,004	3,68	(1,57-8,57)	0,003	3,32	(1,48-7,44)	0,004			
Obra social												
Si posee	1			1			1					
No posee	0,38	(0,18-0,81)	0,013	0,41	(0,18-0,89)	0,024	0,38	(0,18-0,81)	0,013			
Alcoholismo												
No	1						1			1		
Actual o ex	0,28	(0,04-2,07)	0,212				0,28	(0,04-2,07)	0,212	0,10	(0,01-0,78)	0,028
Tabaquismo												
No	1			1			1			1		
Actual o ex	2,39	(1,12-5,11)	0,023	2,40	(1,08-5,32)	0,031	2,39	(1,12-5,11)	0,023	2,55	(1,17-5,54)	0,018
NBI												
Cuartil 1	1			1								
Cuartil 2	5,30	(0,66-42,34)	0,115	4,66	(0,57-37,97)	0,150						
Cuartil 3	5,74	(0,73-45,34)	0,098	5,91	(0,73-47,64)	0,095						
Cuartil 4	5,12	(0,63-41,45)	0,126	5,57	(0,67-46,01)	0,111						
Consultas (último año)												
Media ≤ 2							1			1		
Media > 2							2,10	(0,90-4,85)	0,084	2,15	(0,95-4,86)	0,067

Fuente: elaboración propia en base a las historias clínicas, egresos hospitalarios, entrevistas en los centros de salud y datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC).

Tabla 7.5: OR (*odds ratio*) crudo y ajustado en los modelos multinivel para enfermedad cardíaca hipertensiva en la población con hipertensión arterial atendida en los centros de salud públicos de Bariloche, Río Negro. Años 2014-2015 (n=712).

	OR crudo (Vecindad).			OR ajustado (Vecindad).			OR crudo (Sistema de salud).			OR ajustado (Sistema de salud).		
	OR	Modelo 1 (IC95%)	valor p	OR	Modelo 2 (IC95%)	valor p	OR	Modelo 3 (IC95%)	valor p	OR	Modelo 4 (IC95%)	valor p
Edad												
≤ 55	1			1			1			1		
>55	4,10	(2,26-7,46)	0,000	5,12	(2,72-9,63)	0,000	4,10	(2,26-7,46)	0,000	1,81	(1,49-2,21)	0,000
Sexo												
Femenino	1			1			1					
Masculino	1,69	1,15-2,46	0,006	1,38	(0,92-2,07)	0,123	1,69	1,15-2,46	0,006	1,43	(0,94-2,16)	0,094
Obra Social												
Si posee	1						1					
No posee	0,44	(0,30-0,63)	0,000				0,44	(0,30-0,63)	0,000			
Tabaquismo												
No	1			1			1			1		
Actual o ex	1,61	(1,10-2,34)	0,013	1,80	(1,20-2,72)	0,005	1,61	(1,10-2,34)	0,013	1,86	(1,22-2,83)	0,004
Diferencia de peso												
Bajo de peso	1			1			1			1		
Se mantuvo	2,21	(1,34-3,63)	0,002	2,11	(1,23-3,53)	0,004	2,21	(1,34-3,63)	0,002	2,16	(1,28-3,64)	0,004
Subió de peso	3,70	(2,39-5,73)	0,000	4,14	(2,62-6,54)	0,000	3,70	(2,39-5,73)	0,000	4,20	(2,65-6,67)	0,000
NBI												
Cuartil 1	1			1								
Cuartil 2	1,37	(0,78-2,41)	0,273	1,16	(0,63-2,11)	0,634						
Cuartil 3	0,95	(0,53-1,70)	0,864	0,71	(0,38-2,80)	0,293						
Cuartil 4	1,43	(0,81-2,52)	0,219	1,20	(0,65-2,20)	0,561						
Distancias												
Cercanas							1			1		
Intermedias							1,40	(0,93-2,10)	0,102	1,73	(1,11-2,69)	0,015
Alejadas							2,13	(1,20-3,80)	0,010	2,31	(1,24-4,32)	0,008

Fuente: elaboración propia en base a las historias clínicas, egresos hospitalarios, entrevistas en los centros de salud y datos del censo de población, hogares y viviendas (INDEC).

7.4 *Discusión*

Fueron analizadas cada una de las ECV de manera independiente, donde para cada una de ellas distintos fueron los aspectos que mostraron asociación a nivel individual como de los centros de salud. Ningún aspecto estuvo presente en todas las ECV. En conjunto los resultados nos indican que hay diferencias en la presencia de las distintas ECV al incorporar simultáneamente aspectos individuales, contextuales y de los centros de salud.

Por ello, serán discutidos algunos de los aspectos que consideramos relevantes: la diferente relación encontrada entre mujeres y hombres, su acceso diferencial al sistema de salud y a los problemas de salud; la relación entre el cambio en el peso corporal y los problemas de salud; el trabajo y la pertenencia cambiante a obras sociales; la relación entre los contextos, los centros de salud y los problemas de salud. Finalmente serán expuestas las fortalezas y limitaciones del trabajo.

7.4.1 Diferencias entre mujeres y hombres: distintos accesos y problemas de salud

Al analizar las diferencias encontradas entre las mujeres y los hombres en relación a los problemas de salud estudiados debemos recordar cual fue la población estudiada: las personas que accedieron al sistema de salud y que se encuentran bajo seguimiento por diabetes ó HTA en los centros de salud públicos de Bariloche. Un perfil de población adulta preferentemente conformada por mujeres. En este contexto, este primer dato donde un 71% de la población estudiada estuvo conformada por mujeres, podría vincularse a un acceso diferencial de las mujeres al sistema de salud en relación a su lugar en el cuidado familiar y en relación a la priorización de la salud materno infantil (grupo poblacional que continúa siendo prioritario en el acceso a la salud a nivel provincial). Por otro lado, los hombres presentaron mayor frecuencia relativa y mayores *odds* de todas las ECV, menor tiempo entre el diagnóstico de HTA/diabetes y el de cada ECV y una edad diagnóstica dos años antes que las mujeres.

Así, las mujeres acceden al cuidado y entran en el circuito asistencial primero en relación al lugar que las relaciones sociales dan a la mujer respecto a la anticoncepción, luego como madres gestantes y finalmente continúan su vínculo en el sistema de salud en relación al cuidado de las/os niñas/os y muchas veces de sus nietas/os. En cambio los hombres acceden al sistema de salud más frecuentemente para la atención de problemas agudos que necesitan resolución para continuar sus actividades laborales (Pérez & Perner, 2018). Las mujeres como usuarias directas del sistema de salud, son las que realizan la mayoría de las consultas puesto que es habilitado socio-subjetivamente para ellas expresar y consultar por su malestar en salud, con lo cual hacen consultas más precoces que los varones (Tajer, 2012).

Perner MS. Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad. [Tesis para la obtención del título de Doctora]. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús, 2019.

Esto necesariamente nos introduce la necesidad de pensar esta diferencia desde una perspectiva de género que tenga en cuenta los roles estereotipados para hombres y mujeres, accesos diferenciales al sistema de salud, posibilidades de autocuidado y cuidado familiar. Esto determina modos diferentes de vivir, enfermar, consultar, ser atendidos/as y morir (Tajer, 2012).

En relación a esto, en Argentina en base a la tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2013 las mujeres presentaron mayor prevalencia de diabetes y de HTA en relación a los hombres, pero también mayor porcentaje de mujeres se controló en alguna oportunidad la glucemia (82,2% vs 70,2%) y la tensión arterial (86,6% vs 77,8%) (Ministerio de Salud & INDEC, 2015).

Distintos meta-análisis muestran diferencias por sexo en la mortalidad enfermedad coronaria en poblaciones con diabetes donde el riesgo relativo de muerte fue mayor entre las mujeres que entre los hombres (Lee, *et al.*, 2000; Huxley, *et al.*, 2006; Kanaya, *et al.*, 2002). En cambio en otro meta-análisis, enfermedad coronaria no mortal no presento diferencias significativas entre mujeres y hombres (Kanaya, *et al.*, 2002).

Si el uso de tabaco, la realización de actividad física, la búsqueda de tratamiento médico, las formas de cuidado son diferentes en las mujeres y los hombres (Pautassi, 2007; Rodríguez Enríquez, 2015; Ministerio de Salud & INDEC, 2015), el desarrollo de enfermedades que guarden relación con estos aspectos también lo será.

7.4.2 El peso corporal: la relación de pequeños cambios en el peso en personas con obesidad.

Otro aspecto a analizar se vincula a la relación entre el peso corporal y la presencia de ECV. Como fue expuesto, no se encontró asociación entre el IMC y la presencia de ECV. Este aspecto puede vincularse a una población que ya presenta problemas crónicos (como diabetes e HTA), donde el sobrepeso y la obesidad son algunos de los aspectos vinculados en su desarrollo: el promedio de IMC se ubicó en el rango de obesidad, tanto en mujeres como en hombres. Así, partimos en nuestro caso de una población con elevado IMC. Sumado a esto, se trata de una población que vive en los barrios con condiciones más desfavorables de Bariloche (Capítulo 6); distintos trabajos han descripto la relación inversa entre el sobrepeso y la obesidad y en nivel socioeconómico (Fleischer, *et al.*, 2008; Pérez & Perner, 2017; Ministerio de Salud & INDEC, 2015).

Existen distintas publicaciones que analizan como aspectos ambientales afectan la obesidad, como las personas que viven en espacios donde se facilita la realización de actividad física han presentado menores IMC (Moore, *et al.*, 2013; Hoehner, *et al.*, 2011; Eisenstein, *et al.*, 2011). Se han relacionado vecindades con mejor nivel socioeconómico con

la disponibilidad de lugares recreacionales, la seguridad, caminabilidad y la disponibilidad de alimentos saludables (Moore, *et al.*, 2013). En el lugar donde se realizó nuestra investigación presenta particularidades en relación a estos aspectos, el clima en la Patagonia andina no favorece la realización continuada de actividad física, además que se presenta gran contraste entre grupos sociales en cuanto a con diferentes disponibilidades de espacios y a los usos que de ellos se hacen (Pérez & Perner, 2017).

La complejidad de este aspecto, presentada como la *paradoja de la obesidad*, donde las personas obesas han mostrado menor mortalidad y mejor supervivencia que las personas no obesas, sería el resultado de distintos sesgos (Preston & Strokes, 2014): posibles factores de confusión no medidos, causalidad reversa y otros vinculados a la pérdida de peso corporal por diferentes mecanismos (enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o el tabaquismo).

Fue analizado así el cambio de peso corporal a lo largo del seguimiento y fue encontrada asociación positiva entre los individuos que subieron de peso para dos de tres de las ECV, mostrando así la importancia del cambio del peso corporal en relación a la presencia de ECV. Sabiendo, cómo fue dicho, que la modificación en el peso presenta importantes interacciones con otros aspectos, algunos de los cuales fueron analizados, como la presencia de otra enfermedad crónica (como el cáncer) (Preston & Strokes, 2014).

Entonces, en una población que vive en condiciones socioeconómicas desfavorables resulta importante tener en cuenta el impacto que tiene el descenso en el peso corporal aún si partimos de elevados IMC.

7.4.3 El trabajo inestable y las obras sociales

Otro aspecto llamativo que observamos es la relación inversa encontrada entre la pertenencia a una obra social y la presencia de algunas ECV (enfermedad coronaria y enfermedad cardíaca HTA), aún en modelos ajustados. Así las personas sin obra social tuvieron menos *odds* de estas dos ECV. La pertenencia a una obra social o una prepaga se vincula a una mejor condición socioeconómica por el acceso a las mismas mediante el pago directo o indirecto, necesitando para ello un mayor salario o la pertenencia a un trabajo en relación de dependencia. La población estudiada es una población que se atiende en el sistema público de salud, que vive en condiciones socioeconómicas desfavorables y con trabajos inestables (temporarios en muchos casos) por lo que podría vincularse a cierta inestabilidad laboral de esta población, con la alternancia en la pertenencia a una obra social y la consiguiente discontinuidad en el acceso a prestaciones sanitarias, lo cual tiene mayor impacto en una población que requiere la continuidad en los tratamientos por la presencia de problemas crónicos de salud.

7.4.4 Relaciones entre enfermedad cardiovascular y los entornos

Este trabajo nos permitió incorporar el análisis de niveles grupales en el estudio de enfermedad cardiovascular, permitiendo estudiar cómo interactúan aspectos de los grupos y del nivel individual. Fue estudiada una población que vive en condiciones socioeconómicas desfavorables. Fue empleado el NBI para caracterizar aspectos socioeconómicos de los vecindarios, observamos que en dos de las tres ECV analizadas, ante vecindarios con peor nivel socioeconómico, mayores los *odds* de ECV. Llama la atención que la mayoría de los casos al incorporar aspectos de la vecindad el gradiente fue del cuartil 1 (mejores condiciones) al cuartil 3, y las vecindades donde viven personas en el cuartil 4 (peores condiciones) este gradiente se corta o en algunos casos es el que deja de ser estadísticamente significativo.

Al medir aspectos de los vecindarios, inclusive al emplear indicadores censales, no estamos interesados en medir los efectos de los vecindarios per se en el desarrollo de enfermedades, sino en medir los efectos de los entornos físicos y sociales. Entornos físicos como las construcciones realizadas, el uso de la tierra, el diseño de las calles y espacios públicos, el acceso a alimentos saludables y lugares recreativos; entornos sociales como las redes entre vecinos, normas sociales, niveles de violencia y seguridad. Tanto unos como otros afectan la salud mediante restricciones o mejoras de diferentes comportamientos vinculados a la salud (Diez Roux & Mair, 2010).

7.4.5 El sistema de salud y las enfermedades cardiovasculares

Distintos fueron los aspectos de los centros de salud que mostraron asociación. Para enfermedad coronaria el seguimiento, para enfermedad cerebrovascular la población identificada, para enfermedad cardíaca hipertensiva las distancias a establecimientos sanitarios. Cada uno de ellos mostró distintas dimensiones de las modalidades de atención de cada centro de salud, lo cual repercute en distintos problemas de salud, algunas de las dimensiones que podrían medir barreras en el acceso a la salud.

Otros estudios con metodología multinivel y análisis por vecindarios o aspectos del sistema de salud también mostraron asociación al modelar por niveles pero es más difícil de encontrar significancia estadística, se encuentran asociaciones más modestas que las observadas en relación a aspectos individuales (Alter, *et al.*, 2005; Chau, *et al.*, 2011; Brown, *et al.*, 2011; Diez Roux, *et al.*, 1997; Diez Roux & Mair, 2010; Riva, *et al.*, 2007). En parte esto puede explicarse por la necesidad de algunos aspectos contextuales de presentar mayor variación entre los grupos, de la necesidad tener una elevada prevalencia del evento (Alter, *et al.*, 2005), o por la técnica estadística empleada, donde en las regresiones logísticas multinivel se necesitan mayor cantidad de individuos que en las regresiones lineales por cada unidad de análisis del nivel superior (Teles Santos, *et al.*, 2011). Por otro lado a la búsqueda de

factores mediadores de las interacciones u otros aspectos no medidos (Diez Roux, *et al.*, 2001).

Los modelos multinivel fueron empleados para estimar las posibilidades de tener enfermedad cardiovascular en relación a características de las vecindades y del sistema de salud. Esto nos permitió explicar parte de la variación en los resultados encontrados por características grupales, donde éstas afectan a todos los individuos que viven dentro de esa vecindad o se atienden en determinado centro de salud. Así, estos estudios nos permiten medir al mismo tiempo la variabilidad interindividual e intergrupar, al modelar sistemáticamente ambas variaciones (Diez Roux & Álvarez Hernández, 2010). En estos estudios se toma en cuenta la estructura diferenciada de los determinantes, lo cual se logra definiendo modelos para cada nivel y luego integrando los modelos para cada nivel en un modelo completo (Diez Roux & Álvarez Hernández, 2010). Este tipo de estudios reconoce la importancia de los grupos y los individuos.

7.4.6 Fortalezas

Consideramos que este trabajo presenta varias fortalezas. Primero la incorporación de aspectos de niveles contextuales para el estudio de problemas de salud los cuales no son habitualmente tenidos en cuenta: mostrar cómo interactúan características individuales en relación a características contextuales nos muestra la complejidad de estos problemas de salud, la complejidad de los espacios urbanos y de las modalidades de acceso y atención del sistema de salud.

Otra fortaleza de este trabajo se vincula al hecho de estudiar en una misma población diferentes desenlaces, donde se muestran como son diferentes entre sí. A nivel local no existen estudios que analicen las desigualdades sociales en relación a problemas de salud, ni estudios que incorporen simultáneamente aspectos individuales y contextuales. En Argentina o en Latinoamérica son pocos los estudios publicados que incorporaron estas asociaciones (Capítulo 5) y estas metodologías.

7.4.7 Limitaciones

Pese a las limitaciones reconocidas del uso de historias clínicas para el estudio de problemas de salud, algunos aspectos volcados en las mismas nos permitieron analizar los problemas de salud estudiados. Consideramos que son una buena fuente de información para el estudio de problemas crónicos y para ciertos aspectos vinculados a ellas. La principal limitación fue no poder incorporar en los análisis otros aspectos que permitieran medir las desigualdades a nivel individual (como el nivel educativo), o prácticas de alimentación o de prácticas de actividad física.

Por otro lado, una de las limitaciones del tipo de diseño empleado (transversal) es el sesgo temporal: la medición simultánea de las variables explicativas y respuesta (Szklo & Nieto, 2003). Fueron buscadas diferentes estrategias para buscar disminuir este sesgo. Por un lado, se incorporaron aspectos que no cambian con el tiempo (António & Villegas, 1998), como el hecho de ser inmigrante, la condición de ser mujer u hombre. Para otros aspectos se armaron categorías que permitieran disminuir estos sesgos: tabaquismo actual junto al tabaquismo pasado, o alcoholismo actual y junto al pasado. Finalmente se empleó otra estrategia, registrando y analizando las fechas disponibles para mostrar la secuencia temporal (Szklo & Nieto, 2003): los años de diagnóstico de diabetes e HTA y de las complicaciones (enfermedades cardiovasculares).

Finalmente, otra limitación se vincula a la baja frecuencia de los eventos estudiados, lo cual puede afectar las estimaciones, con resultados de OR más inestables.

7.4.8 ¿Fortaleza o limitación?

Finalmente, un punto importante tiene que ver con la población estudiada: representa un sector que vive en condiciones socioeconómicas desfavorables. Por ello, no resulta sencillo mostrar los contrastes habitualmente presentados en los estudios de desigualdades, donde se contrasta entre distintos estratos de nivel socioeconómico. Si lo vemos desde este punto lo podríamos considerar una limitación, la necesidad de mostrar mejor estas diferencias y la falta de un sector más favorecido socioeconómicamente nos oculta estas brechas. Pero lo podemos considerar una fortaleza: haber podido encontrar dentro de las personas con mayor desigualdad cuales son algunas de las diferencias y mostrar que estas siguen estando aún entre aquellos que presentan peores condiciones socioeconómicas. Estudiar la desigualdad dentro de la desigualdad; mostrar que dentro de la desigualdad no todos enferman igual, mostrar dentro de establecimientos pensados como homogéneos las diferencias que hacen que no todos acceden igual a la salud, lo consideramos una fortaleza del trabajo.

8. CONCLUSIONES

A lo largo de la historia, distintas fueron las teorías que explicaron las potenciales “causas” de las enfermedades. Hoy, el énfasis desde la biomedicina y las líneas de investigación hegemónicas están centradas en buscar y analizar características biológicas (y genéticas) y características vinculadas a comportamientos individuales. Esto ha sido acompañado por una progresiva individualización de las intervenciones, en lugar de colocar el énfasis en los contextos y en los aspectos sociales que los determinan. Los comportamientos y los estilos de vida son (desde la mirada hegemónica) considerados como “elecciones libres de los individuos”, disociados así de los contextos sociales que los configuran; la posibilidad de adoptar cierto comportamiento depende en parte del grado en que éste fue adoptado por el grupo al cual pertenecen los individuos (Diez Roux, 1998).

Es en los contextos donde la vida cotidiana de los individuos tiene lugar, son los ambientes sociales que influyen en la salud los que son capaces de modelar normas y de generar (o no) oportunidades para mejorar la salud. No subestimamos los aspectos biológicos ni los individuales, sino que debemos tener en cuenta que al analizarlos, al analizar la edad, el sexo o diferencias en el valor de tensión arterial, de glucemia o de peso corporal, estamos analizando los mecanismos biológicos proximales a través de los cuales otros mecanismos más distales (mecanismos sociales o culturales) operan; variables medidas a nivel individual están fuertemente condicionadas por procesos sociales; “de alguna manera el contexto entra en el cuerpo”⁶ (Diez Roux, 1998, p. 220).

Entonces, con el objetivo de analizar las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte y de enfermedad en el mundo, en nuestro país y en nuestra ciudad, se analizó su relación con las desigualdades sociales y con los contextos donde estas se producen y reproducen. Para ello se abordaron distintos ejes para estudiar estas relaciones: quién investiga y quién publica en esta temática, como es su relación en el espacio y como es la relación entre aspectos medidos en distintos niveles

En relación al primer eje analizado, vinculado a quién publica y con quién se publica sobre desigualdades sociales y enfermedades cardiovasculares, se observó un interés creciente en estas publicaciones. Quienes investigan (o quienes logran visibilizar estas investigaciones) se encuentran principalmente en instituciones del hemisferio norte, como Estados Unidos o Reino Unido, concentrando el poder, con una gran autonomía y opciones posibles. En cambio, instituciones de países como el nuestro se encuentran ubicadas en lugares periféricos (en relación a los primeros), con un desafío en poder entrar en estos círculos de poder. No es la falta de desarrollos conceptuales y empíricos, ya que Latinoamérica tiene un gran recorrido produciendo conocimiento vinculado a Medicina Social

⁶ Traducción libre de la autora. Original en inglés: “*context must somehow get into the body*”.

y a la Salud Colectiva; el punto está en poder encontrar esas pequeñas grietas para poder inmiscuirse en los debates, en la construcción de conocimientos de estos grupos concentrados de poder.

Respecto al segundo eje analizado, el análisis espacial, la ciudad estudiada, Bariloche, a pesar de tener grandes áreas inmersas en bosques y lagos, reconocidas nacional e internacionalmente en relación al turismo, éstas se contrastan con otras zonas no tan conocidas o no tan visibilizadas. Como hemos expuesto, casi la mitad de la población de Bariloche vive en estas zonas, donde las condiciones de vida son críticas o deficitarias (con viviendas de construcciones deficitarias, con mayores niveles de hacinamiento, de desocupación y bajo nivel educativo). Es de estas zonas de donde proviene la población estudiada. Esto se vincula a que la población fue seleccionada de los centros de salud públicos, los cuales han sido estratégicamente ubicados en zonas de la ciudad con mayor vulneración social.

Los centros de salud estudiados presentaron distintas dimensiones que permiten modificar el acceso a la salud de las personas con enfermedades cardiovasculares, planificando la organización de su atención y mediante la conformación de los equipos de salud que los atienden. Esto se vio reflejado en la forma, la organización y la sistematización de información a partir de las fuentes de información empleadas (historias clínicas, consultas, egresos hospitalarios). Dichas fuentes de información presentaron una buena calidad de datos (para su uso en investigación y el seguimiento de los individuos allí atendidos), pero estos no son sistematizados por los equipos de salud o de gestión, menos aún analizados por parte del sistema de salud, por ende sin potenciales acciones políticas que puedan surgir para intervenir a partir de los mismos.

Se observó una relación positiva entre la proporción de los distintos aspectos medidos en los individuos (demográficos, problemas de salud y enfermedades cardiovasculares) con las zonas de la ciudad con distinto nivel de condiciones de vida: a medida que estratificamos vecindarios con peores condiciones de vida, estos presentaron una mayor proporción de personas que viven solas, de inmigrantes, de personas que subieron de peso, de hombres, de mayor edad, de personas con problemas con el alcohol y de las distintas enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, a partir del tercer eje analizado, se encontraron diferencias en las enfermedades cardiovasculares al analizar los aspectos medidos en distintos niveles, individual, contextual y del sistema de salud. Para entender los comportamientos de los individuos (en última instancia las elecciones que realizan) debemos analizar las características de los grupos a los cuales estos individuos pertenecen. Al incorporar variables grupales estamos agregando información que no puede ser medida a nivel individual, pero

que afectan a todos los individuos que conforman ese grupo (sea un vecindario, una ciudad o un establecimiento sanitario).

Son los contextos donde los individuos viven, los grupos a los que los individuos pertenecen los que van conformando las elecciones y las oportunidades de elegir que los individuos tienen. Son los gustos, las preferencias, los intereses. El estilo de vida de un sujeto que está condicionado y estructurado por las oportunidades ligadas al lugar que ocupa en el espacio social y es a partir de esta configuración de los sistemas de clasificación que se naturaliza el acceso o la imposibilidad de acceder a ciertos bienes y /o prácticas.

Así, para analizar la relación entre las enfermedades cardiovasculares y las desigualdades sociales partimos y entretejimos distintas maneras de pensar los contextos. Contextos como espacios sociales, contextos donde los individuos conforman (y pertenecen a) grupos y contextos donde se genera conocimiento sobre el lugar del contexto en el estudio de las enfermedades cardiovasculares.

Distinta es la constitución del espacio, distintos son los modos de vida según las oportunidades de elección de los individuos viviendo en los espacios urbanos, distintos son los contextos. Algunas más complejas, otras parecerían más simples, pero van entramando desigualdades sociales que se transforman en desigualdades en la salud. Se torna esto visible en la desigual distribución de los determinantes a los que los individuos están expuestos. Estas diferencias de se van escribiendo en el cuerpo de los individuos a lo largo de su vida, dejando en él constancia de las relaciones sociales expresadas en diferentes grupos, en sus formas distintas de sufrir, de enfermar, de buscar curación y de morir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abaleron CA. (1995). Difusión espacial de la pobreza y destrucción del patrimonio natural, las dos caras de una misma moneda. *Eure* [Internet]. 21(64):61-74 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1149/250>
- Acheson D. (1998). *Independent Inquiry into inequalities in Health: Report*. Londres: The Stationery Office.
- Agardh E, Allebeck P, Hallqvist J, Moradi T, Sidorchuk A. (2011). Type 2 diabetes incidence and socio-economic position: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Epidemiology* [Internet]. 40:804-818 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://ije.oxfordjournals.org/content/40/3/804.full.pdf+html>
- ALAD. (2006). *Guías ALAD de diagnóstico, control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2. ALAD*.
- Alazraqui M, Mota E, Spinelli H. (2007). El abordaje epidemiológico de las desigualdades en salud a nivel local. *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 23(2):321-330 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n2/08.pdf>
- Alazraqui M, Spinelli H. (2008). *Desigualdades en salud en el nivel local/municipal. Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLa*.
- Almeida-Filho N. (1999). *Desigualdades em saúde segundo condições de vida: análise da produção científica na América Latina e Caribe e bibliografia anotada. Serie de documentos técnicos* [Internet]. Washington DC: Organização Pan-americana da Saúde [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://www1.paho.org/Portuguese/HDP/HDR/s%E9rie19composite.pdf>
- Almeida Filho N. (2000). *La ciencia tímida. Ensayos de deconstrucción de la Epidemiología*. Ciudad de Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Almeida-Filho N, Kawachi I, Pellegrini Filho A, Dachs N. (2003). Research on Health Inequalities in Latin America and the Caribbean: Bibliometric Analysis (1971–2000) and Descriptive Content Analysis (1975-1995). *American Journal of Public Health* [Internet]. 93(12):2037-2043 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448147/pdf/0932037.pdf>
- Almeida Filho N, Rouquayrol MZ. (2008). *Introducción a la Epidemiología*. Ciudad de Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Alter DA, Austin PC, Tu JV. (2005). Community factors, hospital characteristics and inter-regional outcome variations following acute myocardial infarction in Canada. *The Canadian Journal of Cardiology*. 21(3):247-55.

- Amorim LD, Fernandes de Oliveira N, Fiaccone R. (2011). Modelos e Regressão em Epidemiologia. En: Almeida Filho N, Barreto M, Editores. Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, Métodos, Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.p. 252-264.
- Anderson GF. (2009). Missing in action: international aid agencies in poor countries to fight chronic disease. Health Affairs. 28(1):202-205.
- Anselin L. (2002). Under the hood Issues in the specification and interpretation of spatial regression models. Agricultural economics [Internet]. 27:247-267 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/177794/2/agec2002v027i003a006.pdf>
- Antônio JR, Villegas AM. (1998). Los estudios de prevalencia. En: Salud Pública. Madrid: McGraw Hill Interamericana.p. 179-198.
- Archambault É, Campbell D, Gingras Y, Larivière V. (2009). Comparing Bibliometric Statistics Obtained From the Web of Science and Scopus. Journal of the American Society for information science and technology [Internet]. 60(7): 1320-1326 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: http://www.science-metrix.com/pdf/SM_OST_CIRST_Comparing_Statistics_WoS%20vs%20Scopus.pdf
- Aschan-Leygonie C, Baudet-Michel S, Mathian H, Sanders L. (2013). Gaining a better understanding of respiratory health inequalities among cities: An ecological case study on elderly males in the larger French cities. International Journal of Health Geographics [Internet]. 12(19) [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://www.ij-healthgeographics.com/content/pdf/1476-072X-12-19.pdf>
- Asplund K, Eriksson M, Persson O. (2012). Country Comparisons of Human Stroke Research Since 2001. A Bibliometric Study. Stroke [Internet]. 43: 830-837 [citado 23 abr 2018];. Disponible en: <http://stroke.ahajournals.org/content/43/3/830.long>
- Ayres JR. (2005). Acerca del riesgo. Para comprender la epidemiología. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Barradas Barata R, Wernecke GL. (2012). Observação e Registro dos Fenômenos Epidemiológicos (Tempo, Espaço, Indivíduos e Populações). En: Almeida Filho N, Barreto M, editores. Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, Métodos, Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Ltda. p. 127-149.
- Barreto ML. (2017). Desigualdades en Salud: una perspectiva global. Ciência & Saúde Coletiva [Internet]. 22(7):2097-2108 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n7/es_1413-8123-csc-22-07-2097.pdf
- Ben-Shlomo Y, Kuh D. (2002). A life course to chronic disease epidemiology: conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives. International Journal of Epidemiology [Internet]. 31:285-293 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://ije.oxfordjournals.org/content/31/2/285.full.pdf+html>

- Black SD. Health Inequalities. (1980). Report of a Research Working Group. Londres: Department of Health and Social Security.
- Bleich S, Jarlenski M, Bell C, LaVeist T. (2012). Health Inequalities: Trends, Progress, and Policy. *Annu Rev Public Health* [Internet]. 33:7-40 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3745020/pdf/nihms501067.pdf>
- Bloomfield GS, Baldrige A, Huffman MD, Colantonio LD, Bahiru E, Ajay VS, Prabhakaran P, Lewison G, Prabhakaran P. (2015). Disparities in Cardiovascular Research Output and Citations From 52 African Countries: A Time-Trend, Bibliometric Analysis (1999–2008). *Journal of the American Heart Association* [Internet]. 4:1-13 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4579930/pdf/jah3-4-e001606.pdf>
- Bouchard L, Albertini M, Batista R, Montigny JD. (2015). Research on health inequalities: A bibliometric analysis (1966–2014). *Social Science & Medicine*. 141:100-108.
- Bourdieu P. (2012). *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*. Ciudad de Buenos Aires: Taurus.
- Brown AF, Ettner SL, Piette J, Weinberger M, Gregg E, Shapiro MF, Karter AJ, Safford M, Waitzfelder B, Prata PA, Beckles GL. (2004). Socioeconomic position and health among personas with diabetes mellitus: a conceptual framework and review of the literature. *Epidemiologic Reviews* [Internet]. 26: 63-77 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://epirev.oxfordjournals.org/content/26/1/63.full.pdf+html>
- Brown AF, Liang LJ, Vassar SD, Stein-Merkin S, Longstreth JWT, Ovbiagele B, Yan T, Escarce JJ. (2011). Neighborhood Disadvantage and Ischemic Stroke: The Cardiovascular Health Study (CHS). *Stroke* [Internet]. 42(12): 3363-3368 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3781011/pdf/nihms323048.pdf>
- Burgos-Lunar C, Salinero-Fort MA, Cárdenas-Valladolid J, Soto-Díaz S, Fuentes-Rodríguez CY, Abánades-Herranz JC, Cura-González I. (2011). Validation of diabetes mellitus and hypertension diagnosis in computerized medical records in primary health care. *BMC Medical Research Methodology* [Internet] 11(146) [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3215645/pdf/1471-2288-11-146.pdf>
- Buzai GD. (2014). *Mapas Sociales Urbanos*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Caglar C, Demir E, Kucukler FK, Durmus M. (2016). A bibliometric analysis of academic publication on diabetic retinopathy disease trends during 1980-2014: a global and medical view. *International Journal of Ophthalmology* [Internet]. 9(11): 1663-1668 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.18240%2Fijo.2016.11.21>
- Castiel, L. D. (2006). Dédalo y los dédalos: identidad cultural, subjetividad y los riesgos para la salud. En: Czeresnia D, Machado de Freitas C, organizadores. *Promoción de la salud. Conceptos, reflexiones y tendencias*. Ciudad de Buenos Aires: Lugar Editorial. p. 93-112.

- Castiel LD, Álvarez-Dardet C. (2007). La salud persecutoria. Revista de Saúde Pública [Internet]. 41(3):461-466 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v41n3/6212.pdf>
- Castiel LD, Álvarez Dardet C. (2010). La salud persecutoria: los límites de la responsabilidad. Ciudad de Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía. (1997). Demografía I. México DF: PROLAP-IISUNAM.
- Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía. (2005a). Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe [Internet]. Santiago de Chile: CELADE [citado 23 abr 2018]. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7197/1/S0412973_es.pdf
- Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. (2005b). Una pirámide que exige nuevas miradas [Internet]. Santiago de Chile: CELADE. [citado 15 ene 2018]. Disponible en: https://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/2/23462/PyDTD_1.pdf
- Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía. (2006). América Latina y el Caribe: Los vaivenes en el panorama de mortalidad. Temas de Población y desarrollo. CELADE [Internet]. 4 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37305/Temas%20de%20Poblacion_4_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cerezo-Correa MP, Cifuentes-Aguirre OL, Nieto-Murillo E, Parra-Sanchez JH. (2012). Desigualdades de la morbilidad por enfermedades crónicas según determinantes estructurales e intermediarios. Revista Gerencia y Políticas de Salud [Internet]. 11(23):165-188 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/545/54525297012.pdf>
- Chaikiat A, Li X, Bennet L, Sundquist K. Neighborhood deprivation and inequities in coronary heart disease among patients with diabetes mellitus: a multilevel study of 334,000 patients. Health Place. 2012; 18(4):877-82.
- Chau PH, Woo J, Goggins WB, Wong M, Chan KC, Ho C. (2011). Analysis of spatio-temporal variations in stroke incidence and case-fatality in Hong Kong. Geospatial Health [Internet]. 6(1):13-20 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.geospatialhealth.net/index.php/gh/article/view/153/153>
- Coeli CM. Técnicas de linkage de bases de datos para estudios poblacionales en salud. Webinar Instituto de Salud Colectiva - Universidad Nacional de Lanús [Internet]. 1 oct 2015 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://www.unla.edu.ar/index.php/component/allvideoshare/video/popular/webinar-con-claudia-medina-coeli-tecnicas-de-linkage-de-bases-de-datos-para-estudios-poblacionales-en-salud>

- Colantonio LD, Baldrige AS, Huffman MD, Bloomfield GS, Prabhakaran D. (2015). Cardiovascular Research Publications from Latin America between 1999 and 2008. A Bibliometric Study. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* [Internet]. 104(1): 5-15 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387606/pdf/abc-104-01-0005.pdf>
- Coreil J, Levin JS, Jaco EG. (1985). Life style - An emergent concept in the sociomedical sciences. *Culture, Medicine and Psychiatry*. 9:423-37.
- Costa MCN, Teixeira MGLC. (1999). A concepção de “espaço” na investigação epidemiológica. *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 15(2):271-279 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://www.scielo.org/article/csp/1999.v15n2/271-279/>
- Czeresnia D, Ribeiro MA. (2000). O conceito de espaço em epidemiologia: uma interpretação histórica e epistemológica. *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 16(3):595-617 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v16n3/2947.pdf>
- Diez Roux, A, Nieto J, Muntaner C, Tyroler HA, Comstock GW, Shahar E, Cooper LS, Watson RL, Sklo M. (1997). Neighborhood Environments and Coronary Heart Disease: A Multilevel Analysis. *American Journal of Epidemiology* [Internet]. 146(6):48-63 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://aje.oxfordjournals.org/content/146/1/48.long>
- Diez Roux AV. (1998). Bringing context back into epidemiology: variables and fallacies in multilevel analysis. *American Journal of Public Health* [Internet]. 88(2): 2016-2222 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1508189/pdf/amjph00014-0044.pdf>
- Diez Roux AV. (2001). Neighborhood of residence and incidence of coronary heart disease. *The New England Journal of Medicine* [Internet]. 345(2):99-106 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200107123450205>
- Diez Roux AV; Stein MS; Arnett D, Chambless L, Massing M, Nieto J, Sorlie P, Sklo M, Troyler, H, Watson R. (2001). Neighborhood of residence and incidence of coronary heart disease. *The New England Journal of Medicine* [Internet]. 345(2):99-106 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM200107123450205>
- Diez Roux AV. (2003). Glosario de Análisis Multinivel. Parte II. *Boletín Epidemiológico / OPS* [Internet]. 24(4):10-13 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: http://www1.paho.org/spanish/dd/ais/EB_v24n4.pdf
- Diez Roux AV. (2008). Genes, individuos, sociedad y epidemiología. En: Spinelli H, compilador. *Salud Colectiva. Cultura, instituciones y subjetividad*. Ciudad de Buenos Aires: Lugar Editorial. p. 71-82.
- Diez Roux AV, Álvarez Hernández G. (2010). La necesidad de un enfoque multinivel en epidemiología: desafíos conceptuales y metodológicos. En: Haro JA, organizador.

- Epidemiología sociocultural. Un diálogo en torno a su sentido, métodos y alcances. Buenos Aires: Lugar Editorial. p. 67-88.
- Diez Roux AV, Mair C. (2010). Neighborhoods and health. *Annals of the New York Academy of Sciences* [Internet]. 1186:125-145 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: http://www.lchc.org/wp-content/uploads/01_LCHC_Safe-Neighborhoods.pdf
- Diez Roux AV. (2015). Health in cities: is a systems approach needed? *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 31Sup:S9-S23 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v31s1/0102-311X-csp-31-s1-0009.pdf>
- Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias. (2014). Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Información censal del año 2010 [Internet]. Buenos Aires: INDEC [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf>
- Eisenstein AR, Prohaska TR, Kruger J, Satariano WA, Hooker S, Buchner D, Kealey M, Hunter RH. (2011). Environmental correlates of overweight and obesity in community residing older adults. *Journal of aging and health*. 23(6): 994-1009.
- Elsevier. (2015). Guía rápida de referencia. [Internet]. [citado 14 junio 2018]. Disponible en: https://www.elsevier.com/_data/assets/pdf_file/0019/227404/3617-Versao-Scopus-Quick-Reference-Guide-ES_SUL.pdf
- Falagas ME, Pitsouni EI, Malietzis GA, Pappas G. (2008). Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. *The FASEB Journal* [Internet]. 22:338-342 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.579.1862&rep=rep1&type=pdf>
- Faneite P. (2003). Las computadoras en la medicina de hoy. *Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela* [Internet]. 63(1):47-54 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322003000100007
- Fleischer NL, Diez Roux AV, Alazraqui M, Spinelli H. (2008). Social Patterning of Chronic Disease Risk Factors in a Latin American City. *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine* [Internet]. 85(6):923-937 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2587655/pdf/11524_2008_Article_9319.pdf
- Fleischer NL, Diez Roux AV, Alazraqui M, Spinelli H, De Maio F. (2011). Socioeconomic gradients in chronic disease risk factors in Middle-Income Countries: Evidence of Effect Modification by Urbanicity in Argentina. *American Journal of Public Health* [Internet]. 101(2):294-301 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3020206/pdf/294.pdf>

- Fleischer NL, Diez Roux AV. (2013). Inequidades en enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública* [Internet]. 30(4):641-648 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.org/pdf/rpmesp/v30n4/a17v30n4.pdf>
- Frenk J. (1985). El concepto y la medición de accesibilidad. *Salud Pública de México* [Internet]. 438-453 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/422>
- Gal D, Glänzel W, Sipido KR. (2017). Mapping cross-border collaboration and communication in cardiovascular research from 1992 to 2012. *European Heart Journal* [Internet]. 38(16):1249-1258 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw459>
- Garamendia ML (2007). Análisis factorial: una aplicación en el cuestionario de salud general de Goldberg, versión de 12 preguntas. *Revista Chilena de Salud Pública* [Internet]. 11(2):57-65 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/4596/459645433002.pdf>
- Gavel Y, Iselid L. (2008). Web of Science and Scopus: a journal title overlap study. *Online Information Review*. 32(1):8-21.
- Geaney F, Scutaru C, Kelly C, Glynn RW, Perry IJ. (2015). Type 2 Diabetes Research Yield, 1951-2012: Bibliometrics Analysis and Density-Equalizing Mapping. *Plos One* [Internet]. 1-14 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133009>
- Gómez-Barroso D, Prieto-Flores ME, Mellado San Gabino A, Moreno Jiménez A. (2015). Análisis espacial de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la ciudad de Madrid, España. *Revista Española de Salud Pública* [Internet]. 89(1):27-37 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://scielosp.org/pdf/resp/2015.v89n1/27-37/es>
- Granda E. (2003). ¿A qué cosa llamamos Salud Colectiva hoy? *Revista Cubana de Salud Pública* [Internet]. 30(2) [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21430209>
- Granda-Orive JI, Alonso-Arroyo A, García-Río F, Solano-Reina S, Jiménez-Ruiz CA, Aleixandre-Benavent R. (2013). Ciertas ventajas de Scopus sobre Web of Science en un análisis bibliométrico sobre tabaquismo. *Revista Española de Documentación Científica* [Internet]. 36(2) [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2013.2.941>
- Grotto I, Huerta M, Sharabi Y. (2008). Hypertension and socioeconomic status. *Current Opinion in Cardiology*. 23(4):335-339.
- Hanneman RA, Riddle M. (2005). *Introduction to Social Network Methods* [Internet]. Universidad de California Riverside [citado 17 jul 2018]. Disponible en: <http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/>

- Harrett E, Thomas SL, Schoonen M, Smeeth L, Hall AJ. (2010). Validation and validity of diagnosis in the General Practice Research Database: a systematic review. *British Journal of Clinical Pharmacology* [Internet]. 69(1):4-14 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805870/pdf/bcp0069-0004.pdf>
- Hernández-González V, Sans-Rosell N, Jové-Deltell MC, Reverter-Masia J. (2016). Comparación entre Web of Science y Scopus, Estudio Bibliométrico de las Revistas de Anatomía y Morfología. *International Journal of Morphology* [Internet]. 34(4):1369-1377 [citado 23 abr 2018];. Disponible en: <http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v34n4/art32.pdf>
- Hoehner CM, Handy SL, Yan Y, Blair SN, Berrigan D. (2011). Association between neighborhood walkability, cardiorespiratory fitness and body-mass index. *Social Science & Medicine*. 295(13):1549-55.
- Hox JJ. (1995). *Applied multilevel analysis* [Internet]. Amsterdam: TT-Publikaties [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://joophox.net/publist/amaboek.pdf>
- Huerta JM, Tormo MJ, Egea-Caparrós JM, Ortolá-Devesa JB, Navarro C. (2009). Validez del diagnóstico referido de diabetes, hipertensión e hiperlipemia en población adulta española. Resultados del estudio DINO. *Revista Española de Cardiología*, 62(2):143-52.
- Huffman MD, Baldrige A, Bloomfield GS, Colantonio L, Prabhakaran P, Vamadevan A, Suh S, Lewison G, Prabhakaran D. (2013). Global Cardiovascular Research Output, Citations, and Collaborations: A Time-Trend, Bibliometric Analysis (1999–2008). *Plos One* [Internet]. 8(12):1-7. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3877050/pdf/pone.0083440.pdf>
- Huxley R, Barzi F, Woodward M. (2006). Excess risk of fatal coronary heart disease associated with diabetes in men and women: meta-analysis of 37 prospective cohort studies. *BMJ* [Internet]. 332(73) [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/bmj.38678.389583.7C>
- Iñiguez Rojas L. (1998). Geografía y salud: temas y perspectivas en América Latina. *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 14(4):701-711 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v14n4/0063.pdf>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013a). Base de datos REDATAM [Internet]. INDEC [citado 11 oct 2018]. Disponible en: http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013b). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Base de datos REDATAM. Definiciones de la base de datos [Internet]. Buenos Aires: INDEC [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://redatam.indec.gob.ar/redarg/CENSOS/CPV2010rad/Docs/base.pdf>
- Ismail S, Nason E, Marjanovic S, Grant J. (2012). Bibliometrics as a Tool for Supporting Prospective R&D Decision-Making in the Health Sciences. *Rand Health Quarterly*

- [Internet]. 1(4):11 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4945260/>
- Kanaya AM, Grady D, Barrett-Connor E. (2002). Explaining the Sex Difference in Coronary Heart Disease Mortality Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. A meta-analysis. Archives of Internal Medicine [Internet]. 162(15): 1737-1745 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/754066>
- Kaplan GA, Keil JE. (1993). Socioeconomic Factors and Cardiovascular Disease: A Review of the Literature. Circulation [Internet]. 88:1973-1998 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://circ.ahajournals.org/content/88/4/1973>
- Khan NF, Harrison SE, Rose PW. (2010). Validity of diagnostic coding within the General Practice Research Database: a systematic review. British Journal of General Practice [Internet]. e128-e136 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828861/pdf/bjgp60-e128.pdf>
- Krieger N. Glosario de epidemiología social. Revista Panamericana de Salud Pública [Internet]. 2002 [citado 15 ene 2018]; 11(5/6):480-90. Disponible en: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n5-6/10738.pdf>
- Lee WL, Cheung AM, Cape D, Zinman B. (2000) Impact of Diabetes on Coronary Artery Disease in Women and Men. Diabetes Care [Internet]. 23(7):962-968 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://care.diabetesjournals.org/content/23/7/962.full-text.pdf>
- López-Illescas C, Moya-Anegón F, Henk M. (2008). Coverage and citation impact of oncological journals in the Web of Science and Scopus. Journal of Infometrics. 2(4):304-16.
- Majeed A, Car J, Sheikh A. (2008). Accuracy and completeness of electronic patient records in primary care. Family Practice [Internet]. 25(4): 213-214 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://academic.oup.com/fampra/article/25/4/213/606647>
- Marmot M, Shipley MJ, Rose G. (1984). Inequalities in death-specific explanations of a general pattern? The Lancet. 323:1003-1006.
- Marmot M. (2005). Social determinants of health inequalities. The Lancet [Internet]. 365:1099-1104 [citado 14 junio 2018]. Disponible en: http://www.uc.pt/en/fmuc/phdhs/Courses/HealthandDevelopment/Marmot_Lancet_1_.pdf
- Martínez Larrarte JP. (2015). Nuestra válida Web profunda. Revista Cubana de Reumatología [Internet]. 17(3) [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rcur/v17n3/rcur01315.pdf>
- Martinovich V. (2017). Los dueños de la ciencia. Revista Anfibia [Internet]. Mayo [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/los-duenos-de-la-ciencia/>

- Matossian B. (2015a). División social del espacio residencial y migraciones. El caso de San Carlos de Bariloche, Argentina. *Eure* [Internet]. 41:163-184 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/eure/v41n124/art08.pdf>
- Matossian B. (2015b). Derecho a la ciudad en San Carlos de Bariloche: inserción residencial y política de inmigrantes. *Revista Universitaria de Geografía* [Internet]. 24(1): 11-39 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=383241100002>
- Matossian B. (2016). Lógicas residenciales y migraciones en San Carlos de Bariloche: un abordaje desde la interseccionalidad. *Pilquen* [Internet]. 19(2):1-13 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5560065.pdf>
- Mendonça GA. (2001). Tendências da investigação epidemiológica em doenças crônicas. *Cadernos de Saúde Pública* [Internet]. 17(3):697-703 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v17n3/4652.pdf>
- Menéndez EL. (2009). Estilos de vida, riesgo y construcción social. En: *De sujetos, saberes y estructuras. Introducción al enfoque relacional en epidemiología*. Buenos Aires: Lugar Editorial. p. 73-130.
- Ministerio de Salud. (2009). Evaluación de la tendencia de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Argentina entre 1987 y 2007. *Boletín de Vigilancia de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo* [Internet]. 1(3):33-50 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/m_evaluacion-tendencia-mortalidad-enfermedades-cardiovasculares.pdf
- Ministerio de Salud. (2014). *Enfermedad renal crónica. Manual de consulta rápida* [Internet]. Ministerio de salud de la Nación. [citado 15 ene 2018]. Disponible en: http://www.incucai.gov.ar/files/docs-incucai/Materiales/profesionales/10-Manual_bolsillo_ultimo.pdf
- Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2015). Tercera encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles [Internet]. Buenos Aires: Ministerio de Salud, INDEC [citado 15 ene 2018]. Disponible en: Ciudad de Buenos Aires: s.n. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf
- Ministerio de Salud de Río Negro. (2017). Perfil de mortalidad de Río Negro 2016 [Internet]. Ministerio de Salud de Río Negro [citado 15 ene 2018]. Disponible en: http://www.salud.rionegro.gov.ar/sala/documentos/mortalidad/morta2_rn.pdf
- Moore K, Diez Roux AV, Auchincloss A, Evenson KR, Kaufman J, Mujahid M, Williams K. (2013). Home and Work Neighborhood Environments in Relation to Body Mass Index: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Journal of Epidemiology and Community*

- Health [Internet]. 67(10):846-853 [citado 12 nov 2018];. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3779875/pdf/nihms509682.pdf>
- Mota E, Almeida MF, Viacava F. (2011). O Dado Epidemiológico: Estrutura, Fontes, Propriedade e Instrumentos. En: Almeida Filho N, Barreto M, editores. Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, Métodos, Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p. 85-94.
- Navarro Floria P, Vejsberg L. (2009). El proyecto turístico barilochense antes de Bustillo. Entre la prehistoria del Parque Nacional Nahuel Huapi y el desarrollo local. Estudios y Perspectivas en Turismo, [Internet]. 18:414-433 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n4/v18n4a04.pdf>
- Nicholson, A., Tate, A. R., Koeling, R. & Cassell, J. A. (2011). What does validation of cases in electronic record databases mean? The potential contribution of free text. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 20(321-324).
- Oliveira, G.P., Bierrenbach, A.L., Camargo, K.R. Júnior, Coeli, C.M., Pinheiro, R.S. Accuracy of probabilistic and deterministic record linkage: the case of tuberculosis. Revista de Saúde Pública [Internet]. 50:49 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4988803/pdf/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006327.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (2014). Urban population growth. [Internet] Ginebra: OMS. [citado 15 ene 2018] Disponible en: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/urban_health/population/atlas.html?indicator=i1&date=2010
- Organización Mundial de la Salud. (2015). Global status report on noncommunicable diseases 2014 [Internet]. Ginebra: OMS [citado 15 ene 2018]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
- Pautassi L. (2007). El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. CEPAL [Internet]. 87 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://m.unciencia.unc.edu.ar/2017/junio/pautassi-derecho-al-cuidado.pdf>
- Pérez S, Perner S. (2017). Desigualdades en salud en la norpatagonia argentina una aproximación desde el enfoque de las capacidades. Intersticios [Internet]. 11(1): 101-114 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://www.intersticios.es/article/view/16952/11207>
- Pérez S, Perner S. (2018). El acceso a la salud desde un enfoque de derechos. Percepciones de los equipos de salud de la Zona Andina de Río Negro. Revista Pilquen [Internet]. 21(3):32-44 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/2086/58593>
- Pickett KE, Pearl M. (2001). Multilevel analysis of neighborhood socioeconomic context and health outcomes: a critical review. Journal of Epidemiology & Community Health

- [Internet]. 55(2):111-122 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731829/pdf/v055p00111.pdf>
- Possas C. (1989). Epidemiologia e Sociedade. Heterogeneidade Estructural e Saúde no Brasil. Sao Paulo: Editora Hucitec.
- Prabhakaran P, Ajay VS, Prabhakaran D, Gottumukkala AK, Shrihari JS, Snehi U, Bijoy J, Kolli Srinath R. Global Cardiovascular Disease Research Survey. Journal of the American College of Cardiology. 2007;50(24):2322-2328.
- Preston SH, Strokes A. (2014). Obesity Paradox. Conditioning on Disease Enhances in Estimating the Mortality Risks of Obesity. Epidemiology [Internet]. 25(3):454-461 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984024/pdf/ede-25-454.pdf>
- Pringle M, Ward P, Chilvers C. (1995). Assessment of the completeness and accuracy of computer medical records in four practices committed to recording data on computer. British Journal of General Practice [Internet]. 45:537-541 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1239405/pdf/brjgenprac00015-0029.pdf>
- Reddy S. (2002). Cardiovascular diseases in the developing countries: dimensions, determinants, dynamics and directions for public health action. Public Health Nutrition. 5(1A):231-7.
- Ricchi-Cabello I, Ruiz-Pérez I, Orly de Labry-Lima A, Márquez Caldereón S. (2010). Do social inequalities exist in terms of the prevention, diagnosis, treatment, control and monitoring of diabetes? A systematic review. Health & Social Care in the Community [Internet]. 18(6):572-587 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2524.2010.00960.x/pdf>
- Riva M, Gauvin L, Barnett TA. (2007). Toward the next generation of research into small area effects on health: a synthesis of multilevel investigations published since July 1998. Journal of Epidemiology and Community Health [Internet]. 61(10):853-861 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652961/pdf/853.pdf>
- Rodríguez Enríquez C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de desigualdad. Nueva Sociedad [Internet]. 256:30-44 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/4102_1.pdf
- Rogers EM. (2002). Diffusion of preventive innovations. Addictive Behaviors. 27:989 – 993.
- Rose G. (1991). Individuos enfermos y Poblaciones enfermas. En: El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas. Washington DC: OPS. p. 900-909.

- Sánchez D, Sassone S, Matossian B. Barrios y áreas sociales de San Carlos de Bariloche: Análisis geográfico de una ciudad fragmentada [Internet]. IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población; 31 oct, 1-2 nov 2007; Huerta Grande, Córdoba [citado 11 oct 2018]. Disponible en: http://www.redaepa.org.ar/jornadas/ixjornadas/resumenes/Se16--Patagonia_Herrero/ponencias/Sanchez_Sassone_Matossian.pdf
- Santa S, Herrero-Solana V. (2010). Cobertura de la ciencia de América Latina y el Caribe en Scopus vs Web of Science. Investigación biotecnológica. 24(52):13-27 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v24n52/v24n52a2.pdf>
- Santos M. (1988). Metamorfoses do espaço habitado, fundamentos teórico e metodológico da geografia. São Paulo: Huittec.
- Santos M. (1990). Por una nueva geografía. Madrid: Espasa Caple.
- Santos M. (1997). A natureza do espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: Huittec.
- Santos M. (2002). O Espaço do Cidadão. São Paulo: Edusp.
- Santos Padrón H. (2011). Los determinantes sociales, las desigualdades en salud y las políticas, como temas de investigación. Revista Cubana de Salud Pública [Internet]. 37(2):137-144 [citado 14 junio 2018]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v37n2/spu07211.pdf>
- Schneider MC, Castillo-Salgado C, Bacallao J, Loyola E, Mujica OJ, Vidaurre M, Roca A. (2002). Métodos de medición de las desigualdades en salud. Revista Panamericana de Salud Pública [Internet]. 12(6): 398-415 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v12n6/a08v12n6.pdf>
- Schpilberg M, Pedernera F, Luna D, Rodríguez G, Figar S, Soriano E, Gómez A, Martínez M, González Bernaldo de Quirós F. (2002). Validez y confiabilidad de una Historia Clínica Electrónica para el registro de problemas de los pacientes. Anales JAIIO [Internet]. 31 [citado 15 ene 2018]. Disponible en: https://www.hospitalitaliano.org.ar/multimedia/archivos/servicios_attachs/4521.pdf
- Scobie S, Basnett I, McCartney P. (1995). Can general practice data be used for needs assessment and health care planning in an inner-London district? Journal of Public Health Medicine. 17(4):475-483.
- Smith GD, Hart C, Watt G, Hawthorne V. (1998). Individual social class, area-based deprivation, cardiovascular disease risk factors, and mortality: the Renfrew and Paisley study. Journal of Epidemiology and Community Health [Internet]. 52:399-405 [citado 11 oct 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1756721/>
- Spinelli H, Alazraqui M. (2008). Abordaje conceptual de las desigualdades en salud en el nivel local/municipal. En: Alazraqui M, Spinelli H, organizadores. Desigualdades en salud en

- el nivel local municipal. Remedios de Escalada: Universidad Nacional de Lanús. p. 17-32.
- Stjarne MK, Fritzell J, Ponce De Leon A, Hallqvist J. (2006). Neighborhood socioeconomic context, individual income and myocardial infarction. *Epidemiology*. 17(1):14-23.
- Struijs JN, Baan CA, Schellevis FG, Westert GP, van den Bos G. (2006). Comorbidity in patients with diabetes mellitus: impact on medical health care utilization. *BMC Health Services Research* [Internet]. 6(84) [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1534031/pdf/1472-6963-6-84.pdf>
- Sundquist K, Winkleby M, Ahlén H, Johansson SE. Neighborhood socioeconomic environment and incidence of coronary heart disease: a follow-up study of 25,319 women and men in Sweden. *American Journal of Epidemiology* [Internet]. 159(7):655-662 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <http://aje.oxfordjournals.org/content/159/7/655.full.pdf+html>
- Szklo M, Nieto FJ. (2003). *Epidemiología intermedia. Conceptos y aplicaciones*. Madrid: Diaz de Santos.
- Tai-Seale M, Wilson CJ, Panattoni L, Kohli N, Stone A, Hung DY, Chung S. (2014). Leveraging Electronic Health Records to Develop Measurements for Processes of Care. *Health Services Research* [Internet]. 49(2): 628-644 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3976190/pdf/hesr0049-0628.pdf>
- Tajer D. (2012). Construyendo una agenda de género en las políticas públicas en salud. En: *Género y Salud. Las Políticas en acción*. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Tang K, Rashid R, Godley J, Ghali WA. (2016). Association between subjective social status and cardiovascular disease and cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* [Internet]. 6 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4800117/pdf/bmjopen-2015-010137.pdf>
- Teles Santos CA, Amorim LD, Fernandes de Oliveira N. (2012). Métodos de Análise Multinível em Epidemiologia. En: Almeida Filho N, Barreto M. *Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, Métodos, Aplicações*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p. 265-272.
- Testa M, Silva Paim J. (2010). Memoria e Historia: diálogo entre Mario Testa y Jairnilson Silva Paim. *Salud Colectiva* [Internet]. 6(2):211-227 [citado 23 abr 2018]. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v6n2/v6n2a07.pdf>
- Thiru K, Hassey A, Sullivan F. (2003). Systematic review of scope and quality of electronic patient record data in primary care. *BMJ* [Internet]. 326:1-5 [citado 12 nov 2018]. Disponible en: <https://www.bmj.com/content/bmj/326/7398/1070.full.pdf>
- Torrado S. (2007). Introducción. En: *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Tomo I*. Buenos Aires: Edhasa. p. 15-28.
- United Nations Population Found. *State of World Population*. (2007). *Unleashing the Potential of Urban Growth*, Nueva York: UNPF.

- Universidad Nacional de Lanus, Ministerio de Salud de la Nación, Organización Panamericana de la Salud Argentina. (2005). Atlas de mortalidad de Argentina. Trienios 1990-1992 / 1999-2001. Buenos Aires: UNLa.
- Urquía ML. (2006). Teorías dominantes y alternativas en Epidemiología. Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLa.
- Van Staa T-P, Abenhaim L. (1994). The Quality of Information Recorded on a UK Database of Primary Care Records: A Study of Hospitalizations due to Hypoglycemia and Other Conditions. *Pharmacoepidemiology and drug safety*. 3:15-21.
- Vapnarsky CA, Gorojovsky N. (1990). El crecimiento urbano en la Argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Vega A, Zunino MG, Spinelli H, Alazraqui M. (2008). Espacio geográfico y epidemiología. Geoprocesamiento y estudio de desigualdades en salud. En: Alazraqui M, Spinelli H, organizadores. Desigualdades en salud en el nivel local / municipal. Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLa. p. 49-65.
- Vilagrasa Ibarz J. Los debates sobre pobreza urbana y segregación social en Estados Unidos. Scripta Nova [Internet]. 2000 [citado 23 abr 2018]; 4. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn-76.htm>

APÉNDICES

<i>Apéndice A. Definición de las variables</i>	<i>104</i>
<i>Apéndice B. Ejes de la entrevista a los trabajadores de los centros de salud</i>	<i>114</i>
<i>Apéndice C. Consentimiento para relevar información de los centros de salud</i>	<i>115</i>
<i>Apéndice D. El uso información de historias clínicas para estudios epidemiológicos.....</i>	<i>116</i>

Apéndice A. Definición de las variables

Cuadro 1: Variables propuestas para caracterizar los individuos

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
1. Demográficas		
Edad	Continua (años)	Edad: fecha de la última consulta - fecha de nacimiento
Sexo	Femenino Masculino	Sexo del individuo registrado en la historia clínica por el ES en base a la auto-referencia de los individuos atendidos: ▪ Femenino: registrado en la HC como “mujer” o “femenino” ▪ Masculino: registrado en la HC como “hombre” o “masculino”
País de nacimiento	Argentina Cada uno Extranjero No figura	País de nacimiento registrado en la HC por el ES en base la auto-referencia de los individuos atendidos: ▪ Argentina: registrado en la HC como nacido en Argentina. ▪ Cada uno de los otros países registrados. ▪ Extranjero: registrado en la HC como extranjero sin especificar el país de nacimiento. ▪ No figura: no figura en la HC el país de nacimiento.
Vive solo/a	Si No	Convivientes registrados en la historia clínica (HC) por el equipo de salud (ES) en base a la auto-referencia de los individuos atendidos: ▪ Si: registrado que vive solo/a ▪ No: registrados convivientes (hijos/as, pareja, nietos/as)
Dirección		Domicilio donde vive en base al registro en la HC
Vecindario		Radio censal: georreferenciamiento en base al domicilio
2. Socioeconómicas		
Educación	Analfabeto Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Terciario/Universitario	Nivel de instrucción registrado en la HC por el ES en base a la auto-referencia de los individuos atendidos, complementado con el registro en el campo “Estudios” de los egresos hospitalarios. ▪ Analfabeto: figura “No lee ni escribe”, “solo 1° grado”; “solo lee”, “casi analfabeto” ▪ Primaria incompleta: figura “primaria incompleto”, “Alfabetizada/o” ▪ Primaria completa: figura “primaria completo”, “primaria” ▪ Secundaria incompleto: figura “secundaria incompleto” ▪ Secundaria completo: figura “secundaria completo”, “secundaria” ▪ Terciario/Universitario: figura “terciario”, “universitario”

Cuadro 1. Continuación

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
2. Socioeconómicas (continuación)		
Obra social	Si No	<p>Pertenencia a una obra social en base al registro en la HC por el ES sobre la auto-referencia de los individuos atendidos. Complementado con el registro en el campo “Código obra social” de las bases de egresos hospitalarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: pertenencia alguna obra social ▪ No: sin pertenencia alguna obra social
Trabajo	Empleada/o Oficio No trabaja Pensionada/o- Jubilada/o	<p>Trabajo registrado en la HC por el ES sobre la auto-referencia de los individuos atendidos. Complementado cuando el dato no figuraba en la HC con el registro en el campo “trabajo” en las bases de egresos hospitalarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Empleada/o: empleada/o en relación de dependencia, en gastronomía, en el campo, portera/o, taxista/chofer larga distancia, fletero, mecánico, mucama, metalúrgico, empleada doméstica, cuidadora de niños o de adultos, cooperativas (vertedero), comercio ▪ Oficio: Albañil, mecánico, tejido, carpintero, plomero, recicladora, jardinero, cocinera, gasista, modista, vendedor/a ambulante, vende ropa, artista, toca instrumentos ▪ No trabaja: desocupado, no trabaja, ama de casa ▪ Pensionada/o ó /Jubilada/o: pensión por discapacidad, jubilada/o, pensionada/o ▪ No figura
3. Problemas de salud		
HTA	Si No	<p>En base al registro de HTA en la HC por el ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: a) figura la HTA como uno de los problemas de salud diagnosticados en la HC y b) se encuentra bajo seguimiento y tratamiento en el último año. ▪ No: no figura la HTA como problema de salud, y b) no se encuentra bajo tratamiento en el último año
Diabetes	Si No	<p>En base al registro de diabetes en la HC por el ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: a) figura la diabetes como uno de los problemas de salud diagnosticados en la HC y b) se encuentra bajo seguimiento y tratamiento en el último año. ▪ No: no figura la diabetes como problema de salud, y b) no se encuentra bajo tratamiento en el último año

Cuadro 1. Continuación

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
3. Problemas de salud (continuación)		
Peso inicial	Continua (kg)	En base a al peso registrado en la HC por el ES al inicio del seguimiento en la HC por HTA y/o por diabetes
Peso final	Continua (kg)	En base a al último peso registrado en la HC por el ES
Talla	Continua (metros)	En base a la talla (en metros) registrada por el ES en la HC
Otra enfermedad crónica	Si No	<p>En base al registro de otra enfermedad crónica en la HC por el ES, complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: Con antecedente registrado en la historia clínica o internado por una enfermedad que requiere tratamiento de forma crónica (asma, EPOC, cáncer, epilepsia, Parkinson, artritis (reumatoidea, gotosa, juvenil o seronegativa), demencia, esquizofrenia, psicosis, retraso mental, insuficiencia hepática, hipoacusia severa ▪ No: No figuran estos problemas. Problemas de salud crónicos cardiovasculares, vinculados a la diabetes o la HTA. Excluidos: Hipotiroidismo, artrosis, depresión, hipertrofia prostática benigna, gastritis (subaguda), osteoporosis, gota, hipoacusia (cuando no figura el grado)
Enfermedad Cerebrovascular	Si No	<p>En base al registro de Enfermedad cerebrovascular en la HC por el ES, complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: Con registro de: a) accidente cerebrovascular (ACV) (CIE 10: I64), b) Hemorragia intraencefálica (CIE10: I61), c) Infarto cerebral (CIE10: I63), d) Accidente isquémico transitorio (AIT). ▪ No: sin diagnóstico de esos problemas de salud
Enfermedad coronaria	Si No	<p>En base al registro de Enfermedad coronaria en la HC por el ES, complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: Con antecedente registrado en la HC o internado por: a) infarto agudo de miocardio (CIE10: I21); b) cardiopatía isquémica (CIE10: I25), cardiopatía coronaria, CI, coronariopatía, angina de pecho/inestable (CIE10: I20), stent ▪ No: a) No tuvo; b) sin diagnóstico definitivo en la HC (“con diagnóstico dudoso”, “antecedente dudoso de CI”); c) pre-infarto; d) dolor precordial (CIE10 R07.2)

Cuadro 1. Continuación

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
3. Problemas de salud (continuación)		
Enfermedad renal crónica	Si No	<p>En base al registro de Enfermedad renal crónica^c en la HC por el ES, complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: Estadio 2 a 5 de enfermedad renal crónica^d en base a: a) resultados de laboratorio que figuran en la HC; o b) según resultado de interconsulta con especialistas; c) internado por insuficiencia renal crónica (CIE 10: N18) ▪ No: a) sin alteración de la función renal; b) solamente un valor de laboratorio alterado; c) estadio 1 de enfermedad renal crónica
3a. Problemas de salud en la subpoblación con HTA		
Enfermedad cardíaca hipertensiva	Si No	<p>En base al registro de Enfermedad cardíaca en la HC por el ES, con fecha posterior al diagnóstico de HTA o concomitantemente a este diagnóstico, complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: antecedente registrado en la HC o internado por: a) hipertrofia ventricular izquierda (leve, moderada, severa), sobrecarga del ventrículo izquierdo; b) insuficiencia cardíaca/congestiva (CIE10: I50); c) cardiopatía hipertensiva (CIE10: I11); d) falla cardíaca; f) cardiopatía dilatada (CIE10: I42.0); g) aneurisma Aorta ▪ No: diagnóstico de HTA y sin registro de enfermedad cardíaca o: a) Solamente síntomas de IC sin diagnóstico en la HC, b) cardiomegalia por radiografía o electrocardiograma solamente; c) probable sobrecarga/HVI/IC, diagnóstico presuntivo de sobrecarga/HVI/IC; d) estudios anormales que luego se normalizan o no vuelve con ese diagnóstico; e) cardiopatía por EPOC o secundario a problemas respiratorios; f) arritmias/marcapasos f) otras alteraciones del ecocardiograma distintas a HVI
Pie diabético	Si No	<p>En base al registro de pie diabético^a en la HC por el ES, complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: diagnóstico de diabetes y grados 1 a 5 de la escala de Wagner^b: a) úlcera en miembros inferiores (CIE10 L97); b) osteomielitis complicado de DBT (CIE10 M86.6); c) gangrena (CIE10 R02). Diagnóstico de: d) pie diabético, e) amputación de algún dedo (CIE10 S98.1); e) Internación por DBT con complicaciones circulatorias periféricas (CIE10: E10.5 / 11.5 / 13.5 / 14.5); ▪ No: diagnóstico de diabetes y grado 0 de la escala de Wagner (Nota b): lesiones pre-ulcerativas y/o neuropáticas; y b) sin registro de pie diabético

Cuadro 1. Continuación

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
4. Otros problemas		
Problemas intrafamiliares	Si No	<p>En base al registro en la HC por el ES de problemas de violencia o adicciones en miembros de la familia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si: registro de problemas de violencia, alcoholismo o adicciones en el entorno familiar: a) violencia de algún miembro del grupo familiar (pareja, hija/os, padre/madre, abuso, maltrato); y/o b) adicciones o alcoholismo en el grupo familiar. ▪ No: no figura en la HC el registro de esos problemas en el entorno familiar.
Tabaquismo	Tabaquista Ex tabaquista No tabaquista No figura	<p>En base al consumo de alcohol registrado en la HC por el ES sobre la auto-referencia de los individuos atendidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabaquista: En base al registro en la HC: a) “fuma/tabaquismo: si”; b) “tabaquista” ▪ Ex tabaquista: En base al registro en la HC: a) “fuma/tabaquismo: ex”; b) “ex tabaquista”; ▪ No tabaquista: En base al registro en la HC: a) “fuma/tabaquismo: no” ▪ No figura: no figura en la HC
Alcoholismo	Alcoholismo Ex Alcoholismo Consumo social No bebe No figura	<p>En base al consumo de alcohol registrado en la HC por el ES sobre la auto-referencia de los individuos atendidos. Complementado con el registro del diagnóstico de egreso de las bases de egresos hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alcoholismo: En base al registro en la historia clínica: a) “<i>consumo diario de alcohol</i>”; b) “<i>consumo de alcohol (varios litros) los fines de semana</i>”; c) consultas con aliento etílico. En base al “diagnóstico de egreso”: a) Trastornos mentales y del comportamiento vinculados al consumo de alcohol (CIE10: F10); b) Enfermedad alcohólica del hígado (CIE10: K70) ▪ Ex alcoholismo: En base al registro en la historia clínica: “<i>ex etilista</i>” o “<i>ex alcoholismo</i>” ▪ Consumo social: En base al registro en la historia clínica: a) bebe vino/cerveza con las comidas/ ocasional/mente; b) bebe a veces; c) bebe poco; d) bebe esporádicamente ▪ No bebe: En base al registro en la historia clínica: “<i>alcoholismo: no</i>” ▪ No figura: no figura el consumo de alcohol en la HC ni diagnóstico de egreso vinculado al consumo de alcohol en los egresos hospitalarios.

Cuadro 1. Continuación

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
5. Internación		
Causa de internación	Cardiovascular Otras causas No internado	<p>En base al registro de egresos hospitalarios :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cardiovascular: figura en las bases de egresos hospitalarios con alguno de los siguientes diagnóstico de egreso: a) infarto agudo de miocardio (CIE10: I21); b) cardiopatía isquémica (CIE10: I25), c) angina de pecho/inestable (CIE10: I20), d) insuficiencia cardíaca/congestiva (CIE10: I50); e) cardiopatía hipertensiva (CIE10: I11); f) cardiopatía dilatada (CIE10: I42.0); g) insuficiencia cardíaca/congestiva (CIE10: I50); h) aneurisma Aorta, ruptura aneurisma (CIE10 I71), i) accidente cerebrovascular (ACV) (CIE 10: /I63 / I64), j) Hemorragia intraencefálica (CIE10: I61), k) Infarto cerebral (CIE10: I63), l) Accidente isquémico transitorio (AIT). ▪ Otras causas: figura en las bases de egresos hospitalarios al menos una vez, pero por otros motivos de internación ▪ No internado: no figura en las bases de egresos hospitalarios
Cantidad de internaciones	Discreta	Total de internaciones en base al registro de egresos hospitalarios
Tiempo de internación	Continua (días)	Total de días que estuvo internado (suma de todas las internaciones), en base al registro de egresos hospitalarios:
6. Tiempo de evolución		
Tiempo de evolución de la HTA	Continua (en años)	<p>En base al a fecha registrada en la HC por el ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De la fecha que se diagnosticó la HTA ▪ Si no figura el diagnóstico de HTA, en consultas posteriores: a) el año de diagnóstico de HTA, o b) el tiempo de evolución de la HTA
Tiempo de evolución de la diabetes	Continua (en años)	<p>En base al a fecha registrada en la HC por el ES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De la fecha que se diagnosticó la diabetes ▪ Si no figura el diagnóstico de HTA, en consultas posteriores: a) el año de diagnóstico de diabetes, o b) el tiempo de evolución de la diabetes

Cuadro 1. Continuación

Fuente: elaboración propia

CS = centro de salud

ES = equipo de salud

HC = historia clínica

Km = kilómetro

Kg = kilogramo

RC = radio censal, unidad de análisis del censo de población y vivienda empleada para caracterizar los vecindarios.

^a Pié diabético “Se denomina pie diabético al pie que tiene al menos una lesión con pérdida de continuidad de la piel (úlceras)” (ALAD, 2006, p. 50).

^b Escala de Wagner grados 0 a 5 (ALAD, 2006):

0. Pie en riesgo por presencia de enfermedad vascular periférica, neuropatía, deformidades ortopédicas, pérdida de la visión, nefropatía, edad avanzada.

1. Úlcera superficial (úlceras sin internación).

2. Úlcera profunda que llega a tendón, ligamento, articulaciones y/o hueso (Úlcera con internación).

3. Infección localizada: celulitis, absceso, osteomielitis (Internación por diabetes con complicaciones circulatorias periféricas).

4. Gangrena local (Pie diabético).

5. Gangrena extensa (amputación).

^c Enfermedad renal crónica: “presencia de daño renal por un período mayor a 3 meses de evolución” (Ministerio de salud, 2014, p. 9).

^d Estadíos de enfermedad renal crónica (Ministerio de salud, 2014):

Estadío 1. Daño renal con función renal normal (IFGe $\geq$ 90ml/min). *Daño renal: proteinuria persistente, alternaciones del sedimento urinario, resultados anormales de estudios por imágenes, biopsia renal patológica.*

Estadío 2. Daño renal con leve disminución del IFGe (IFG 80-90 ml/min).

Estadío 3a. Moderada disminución del IFGe (IFGe 59-45 ml/min).

Estadío 3b. Moderada disminución del IFGe (IFGe 44-33 ml/min).

Estadío 4. Severa disminución la función renal (IFGe 29-15 ml/min).

Estadío 5. Insuficiencia renal (< 15 ml/min).

Cuadro 2: Indicadores propuestos para caracterizar los vecindarios

Nombre del indicador	Valores	Definición operacional
1. Indicadores referidos a la población		
Inmigrantes	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre el número de personas inmigrantes de ese RC y el total de la población de ese RC por cien.
Viven solas	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre la cantidad de hogares con una persona de ese RC y el total de hogares de ese RC por cien.
Población adulta	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre el número de personas de 65 años y más de ese RC y el total de la población de ese RC por cien.
Desocupación	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre la población desocupada ^a de ese RC y la población económicamente activa (Nota b) de ese RC por cien.
Educación	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre la población mayor a 14 años con primaria incompleta o menos y el total de la población mayor a 14 años de ese RC por cien.
Densidad poblacional	Continua	Habitantes / Km ² = Cantidad de habitantes en ese RC / Km ² de ese RC
2. Indicadores referidos a los hogares		
Calidad de conexión a servicios básicos (INCALSERV)	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre la cantidad de hogares con calidad de la conexión a servicios (vinculados a la procedencia del agua y el tipo de desagüe) insuficiente y el total de hogares en ese RC por cien.
Calidad de los materiales (INMAT)	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre la cantidad de hogares con calidad IV (baja calidad en pisos y techos) de los materiales y el total de hogares en ese RC por cien.
Calidad constructiva de la vivienda (INCALCONS)	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre la cantidad de hogares con calidad de los materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos (agua de red y desagüe) insuficiente y el total de hogares en ese RC por cien.

Cuadro 2. Continuación

Nombre del indicador	Valores	Definición operacional
2. Indicadores referidos a los hogares (continuación)		
NBI	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre el número de hogares con al menos un NBI ^b de ese RC y el total de hogares de ese RC por cien.
Hacinamiento crítico	Continua (porcentaje: 0-100%)	Cociente entre el número de hogares donde viven tres o más personas por cuarto de ese RC y el total de hogares de ese RC por cien.

Fuente: elaboración propia en base a las definiciones del INDEC (2013b).

^a Población desocupada: población que durante las cuatro semanas previas al día del censo no desarrolló acciones tendientes a establecer una relación laboral o iniciar una actividad empresarial (INDEC, 2013b).

^b Hogares con NBI (Necesidades básicas insatisfechas): aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación:

i. Hogares que habitan viviendas con más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico).

ii. Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).

iii. Hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua.

iv. Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela.

v. Hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario) (DINREP, 2014).

Cuadro 3. Variables propuestas para caracterizar los centros de salud

Nombre de la variable	Valores o categorías de la variable	Definición operacional
Nombre del CS	34 has, Arrayanes, Casa de la salud, Frutillar, La Cumbre, Las Quintas, Lera, Madre Teresa, Nahuel Hue, Pilar (I y II), San Francisco III, Virgen Misionera	Establecimiento donde fueron relevadas las HC
Porcentaje de consultas	Continua (porcentaje: 0-100%)	Variable derivada de los datos individuales, agrupados para cada centro de salud = (cantidad de personas con diabetes y/o HTA que consultaron al menos una vez en 2014-2015/ total de personas con diabetes y/o HTA) x 100
Frecuencia de consultas	Discreta (cantidad de consultas)	Variable derivada construida con datos individuales, agrupados para cada centro de salud de la frecuencia de consultas en el último año de la población con diabetes y/o HTA en cada CS.
Modalidad de atención	Si / No	En base a la información suministrada por el ES respecto a la presencia en el CS de trabajo con grupos personas con problemas crónicos de salud.
Cantidad de personas con diabetes y/o HTA	Discreta	Variable derivada construida con datos individuales, agrupados por centro de salud: cantidad en cada CS de personas con diabetes y/o HTA.
Cantidad de consultas	Discreta	Cantidad total de consultas realizadas en ese CS en base a la información suministrada por el servicio de estadística del Hospital Bariloche.
Proporción de profesionales	Continua	Cantidad de médicas/os más enfermeras/os en ese CS / población total del área de influencia de ese CS por 10.000 habitantes.
Tamaño del área de influencia	Continua (Km ²)	Km ² totales de los radio censales del área programática de ese centro de salud.

Fuente: elaboración propia en base a las HC relevadas, a las entrevistas realizadas, a información suministrada por el servicio de estadística.

CS = centro de salud

ES = equipo de salud

HTA = hipertensión arterial

HC = historia clínica

Km = kilómetro

Apéndice B. Ejes de la entrevista a los trabajadores de los centros de salud

Fecha de realización:

Nombre del Centro de salud:

Nombre del/la entrevistada/o:

Tiempo hace que trabaja en este centro de salud:

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

- a. Horario y días de atención:
- b. Conformación el equipo de trabajo:
- c. ¿Cómo es la organización de los turnos?

INFRAESTRUCTURA:

- a. Cantidad de consultorios:
- b. Espacio de trabajo común (para reuniones, actividades):
- c. Pertenencia del edificio
- d. Superficie del CS

POBLACIÓN

- a. ¿Podrías describir en términos generales (socioeconómico, ambiental, social) como es la población que se atiende en este centro de salud?
- b. ¿Principalmente de cuales barrios concurren?
- c. Aproximadamente, ¿cuánta población vive en estos barrios?

POBLACIÓN CON DBT/HTA

- a. Aproximadamente ¿cuántas personas con diabetes /HTA se atienden acá?
- b. ¿Existe alguna otra actividad que no sea la atención individual para los ellos? (grupo de pacientes, organización de los turnos, entrega de medicación, otras)
- c. ¿Cómo es el acceso a los medicamentos para estos problemas crónicos de salud?
- d. ¿Cómo es el acceso a estudios complementarios para estos problemas crónicos de salud? (laboratorio, ECG, ecocardiograma, fondo de ojo)

Apéndice C. Consentimiento para relevar información de los centros de salud

Lo invitamos a participar en una encuesta que tiene como propósito relevar información sobre los centros de salud públicos de Bariloche. Para llevarlo a cabo se le realizarán unas preguntas sobre la modalidad de atención en general y en particular para las personas con enfermedades crónicas, sobre espacio físico disponible en el centro de salud y sobre la conformación del equipo de salud. Los datos obtenidos serán confidenciales y en ningún momento se utilizará su nombre para el análisis de los resultados.

Su participación es totalmente voluntaria.

Si Ud. decide participar en esta entrevista, se le pedirá que autorice su realización firmando este formulario.

Si Ud. decide no participar no implicará ningún tipo de perjuicio. Si aceptara participar, pero luego decidiera dejar de hacerlo, podrá hacerlo de manera inmediata y sin tener que dar explicación alguna de las causas que motivan su decisión.

Si le surgiera alguna consulta en el transcurso de la realización de la misma, la puede realizar a la investigadora responsable, Serena Perner.

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN:

He leído y comprendido las declaraciones incluidas en este consentimiento informado. Acepto voluntariamente participar en la encuesta autorizando el uso de la información en relación con el estudio.

Nombre:.....

Firma:.....

Lugar y Fecha:.....

Hora:.....

DNI:.....

Apéndice D. El uso información de historias clínicas para estudios epidemiológicos

1. Introducción

Las historias clínicas (HC) tienen como principal objetivo el seguimiento clínico de los individuos (Khan, *et al.*, 2010). Como fuentes de información para la investigación presentan limitaciones no diferentes a otras fuentes secundarias de información: son construidas con otro objetivo, el seguimiento clínico de los individuos y sus problemas de salud; son elaboradas por múltiples actores (en su mayoría médicos/as) empleando normas clínicas elaboradas por diferentes sociedades científicas.

Por otro lado, el empleo de historias clínicas para el estudio (como en nuestro caso) de problemas crónicos presenta fortalezas en relación a otros problemas como los agudos, por la complejidad misma del problema estudiado y por la necesidad de su continuidad, lo cual muchas veces este problema lleva a la necesidad de un abordaje interdisciplinario y a una necesidad de articulación con distintos niveles de atención para el acceso a estudios complementarios, a interconsultas o a internaciones. Este aspecto ha sido estudiado y la historia clínica (electrónica) presenta una mejor sensibilidad en el estudio de patologías crónicas (Schpilberg, *et al.*, 2002; Almeida Filho & Rouquayrol, 2008). Por otro lado, uno de los principales beneficios de la utilización de históricas clínicas (electrónicas) para el estudio de problemas de salud radica en el acceso a información de grandes poblaciones. Scobie *et al.* (1995) también hacen referencia a otro beneficio, el uso de información de las HC a nivel local para estimar la prevalencia de enfermedades, para describir los cuidados y evaluar cambios a lo largo del tiempo.

En nuestro caso, para describir los aspectos a nivel individual (Capítulos 6 y 7) de un problema crónico de salud como son las enfermedades cardiovasculares fue empleada información de historias clínicas. Entonces con el objetivo de analizar su validez, se realizó una revisión de este aspecto en el uso de historias clínicas para emplear información en estudios epidemiológicos y se indagaron los métodos empleados para medirla, para luego describir la situación particular de las historias clínicas empleadas y analizar su validez.

2. Algunas definiciones

La *validez* es la ausencia de sesgo (Szklo & Nieto, 2003); el sesgo es “la variación sistemática, con algún grado conocido de determinación, resultado del desvío o la distorsión de la propia operación de medida, de un instrumento o su operador” (Almeida Filho & Rouquayrol, 2008, p. 104). Para medir la validez se emplea la sensibilidad, la especificidad y

el valor predictivo (Almeida Filho & Rouquayrol, 2008). La presencia y la fuerza de la asociación observada en estudios epidemiológicos dependen de la validez de las variables, lo que determina la presencia de errores de clasificación y el grado en que se producen (Szklo & Nieto, 2003). La *precisión* es medida mediante la confiabilidad, es una cualidad exclusiva de los instrumentos de recolección de datos, mide la variación de una medida, su capacidad de no variar los resultados al ser empleado por distintos operadores o en distintos momentos del tiempo (Almeida Filho & Rouquayrol, 2008).

Para validar HC existen dos tipos de métodos, unos son los internos y otros los externos (Nicholson, *et al.*, 2011). La validación interna se vincula a la confirmación del diagnóstico volcado en la HC, por ello a veces se denomina confirmación más que validación. Refleja si el diagnóstico final representa lo que el médico realmente diagnosticó. Éste método de validación habitualmente emplea información adicional de la misma HC, se realizan cuestionarios o consultas a los médicos que han atendido.

La validación externa está vinculada a cuan correcto fue el diagnóstico respecto al problema estudiado. En este caso son métodos externos al médico que registra. Éste es el método más conocido de validación el cual contrasta el diagnóstico con un *gold standard*. El mismo puede variar en función de la condición estudiada: pueden ser criterios diagnósticos de guías de práctica clínica o *record linkage* con otras bases de datos (Nicholson, *et al.*, 2011): como otras bases de datos de atención primaria, otros registros estadísticos nacionales (Khan, *et al.*, 2010; Thiru, *et al.*, 2003), otras bases de datos de mortalidad, egresos, registros de enfermedades, y la comparación con tasas de prevalencia (Harrett, *et al.*, 2010). Otras fuentes pueden ser encuestas a pacientes o sus cuidadores, las cuales presentan diferentes perspectivas de un problema de salud o de un tratamiento (Thiru, *et al.*, 2003). Podemos decir que no fue encontrado un acuerdo en cuanto a cuál es el *gold standard* más preciso, las diferencias en las fuentes de datos no asegura cuales son los correctos.

3. Revisiones bibliográficas sobre validación de historias clínicas

Fueron encontradas distintas revisiones bibliográficas sobre validación de HC, haciendo hincapié principalmente en las HC electrónicas. La base de HC más ampliamente empleada en los estudios encontrados fue la de Reino Unido GPRD (*General Practice Research Database*). Esta base tiene una parte codificada, la cual ha sido más empleada para investigaciones, y una parte de texto libre. Puede haber falsos negativos si se emplean únicamente los códigos extraídos de las HC electrónicas debido a casos diagnosticados que no fueron codificados, cuando se registran signos o síntomas y no el diagnóstico final en el espacio para tal fin (Nicholson, *et al.*, 2011).

Las revisiones encontradas resumen la validez de diferentes datos registrados en HC electrónicas. Así, podemos resumir que la validez fue muy buena para estudiar los diferentes

aspectos clínicos vertidos en las HC, como diferentes problemas de salud. Para enfermedades cardiovasculares se encontró una validez para la mayoría de las revisiones alrededor del 90% (Khan, *et al.*, 2010; Thiru, *et al.*, 2003; Burgos-Lunar de, *et al.*, 2011; Van Staa & Abenhaim, 1994).

El aspecto que presentó la precisión más elevada fue la prescripción de medicamentos, llegando al 100% en varios estudios (Thiru, *et al.*, 2003; Khan, *et al.*, 2010). Por otro lado, en una revisión fue analizada la fecha de los diagnósticos para (entre otros) infarto de miocardio, encontrándose inconsistencias en la fecha del evento en un 15%, en general con pequeñas diferencias (dentro de los 15 días) (Khan, *et al.*, 2010).

Para otros aspectos, como alcoholismo o tabaquismo se encontró elevada validez (97,3% y 95% respectivamente) en un estudio el cual se contrastó el datos de as HC con cuestionarios a médicos (Van Staa & Abenhaim, 1994). Fueron encontrados otros dos estudios que analizan estos aspectos a partir de la revisión de Thiru & Sullivan (2003), pero al revisar estas investigaciones los valores se vinculan al grado de completitud de los mismos, sin corroborar los mismos con otras fuentes de datos. Así, el grado de completitud fue moderado: para alcoholismo de 37% y 62%, y para tabaquismo de 52% y 61% (Scobie, *et al.*, 1995; Pringle, *et al.*, 1995). En otra revisión de Khan *et al.* (2010) analizan el registro de tabaquismo en HC y concluyen que encontraron mejores registros para los que alguna vez fumaron (85,7%) en relación a los fumadores actuales (70%) o los ex fumadores (60%).

Fue encontrado un trabajo que analiza la validez de estos problemas como alcoholismo o tabaquismo, los restantes analizan su completitud en las HC.

Scobie *et al.* (1995) también analizan el porcentaje del registro en las HC del peso, la talla, el ejercicio físico y la dieta, con valores de 56 y 57% para peso y talla, 24% para ejercicio y 21% para la dieta.

Habitualmente los aspectos socioeconómicos no han sido empleados en los estudios de validación de HC. Fue encontrado un estudio que analiza su completitud mostrando que el registro de este dato es bajo, cercano al 50% (Scobie, *et al.*, 1995).

Por otro lado, el empleo de HC como fuente de información para investigaciones presenta mayor validez para problemas crónicos que para los agudos (Khan, *et al.*, 2010), para los problemas crónicos sintomáticos y que requieren medicación (Schpilberg, *et al.*, 2002) y para problemas con claros criterios diagnósticos (Majeed, *et al.*, 2008). En el mismo sentido Naomar de Almeida Filho y M. Zélia Rouquayrol plantean en relación a los registros institucionales, que estos “son eficaces tan solo para (el estudio de) las patologías de mayor grado de severidad, aquellas que llevan necesariamente al tratamiento” (2008, p. 210).

4. Situación local

La necesidad de validación interna o externa depende entonces de la condición estudiada, de la pregunta de investigación y de la población analizada. Así, podemos decir que el uso de HC para el estudio de problemas crónicos complejos como las enfermedades cardiovasculares en una población con diabetes e HTA que requieren medicación en forma crónica y un seguimiento continuo, presenta fortalezas en relación a su uso para otros problemas como los agudos o los asintomáticos. Sumado la complejidad misma del problema estudiado, es una población que vive en condiciones socioeconómicas desfavorables. Esto lleva en muchos casos a la necesidad de un abordaje interdisciplinario y de articulación con el segundo nivel de atención para el acceso a estudios complementarios, a interconsultas o a internaciones, por lo cual el uso de HC es un instrumento útil en este seguimiento.

En nuestro caso fueron empleados diferentes métodos de confirmación, sin llegar a realizar una validación interna, pero se buscaron estrategias para colocar únicamente los diagnósticos y los aspectos confirmados. Para ello fue leída y revisada la totalidad de cada una de las historias clínicas buscando toda la información necesaria para ratificar cada evento. En los centros de salud donde constaban otras fuentes de información individualizadas estas fueron empleadas para verificar o completar información faltante (como las fichas de relevamiento de población) o consultas a los médicos (para los aspectos clínicos) o a los agentes sanitarios (para los aspectos sociales). Por otro lado, se han relevado la totalidad de cada HC y no bases de datos con códigos. Así, no se han perdido diagnósticos de enfermedades cardiovasculares o de condiciones relacionadas, presentes cuando se describen signos y síntomas y no se termina de definir determinada condición, sin terminar de diagnosticar y codificar, como puede ocurrir con lo presentado para las HC electrónicas de Reino Unido (Nicholson, *et al.*, 2011).

En nuestro caso, las HC relevadas fueron todas en formato papel; no se cuenta a nivel local en el sistema público con HC en formato electrónico. Por ello, fueron relevadas todas las HC de las personas con diabetes y/o HTA de todos los centros de salud públicos de Bariloche. Y la definición operativa de las fue realizada con posterioridad al relevamiento a partir de bibliografía de referencia, en función de los hallazgos analizados en su totalidad y de la validez interna y externa relevada en diferentes estudios presentados.

Las diferentes fuentes de información que pueden ser empleadas para definir las variables en algunos casos representan diferentes perspectivas de un problema. Por ello el empleo de una u otra fuente de información depende del objetivo de la investigación y del problema de salud estudiado. Por otro lado, dos son los aspectos fundamentales para el uso de datos, su completitud y su validez (Van Staa & Abenhaim, 1994).

Para disminuir posibles sesgos fueron relevadas únicamente las HC de los centros de salud, donde los equipos de salud son más pequeños que realizan la atención y el seguimiento

de la población que vive en los barrios cercanos, no hay “servicios” (como en el hospital) sino profesionales distintos, y muchas veces es/son el/los mismo/s profesional/es a lo largo de una misma historia clínica que realiza/n el seguimiento. Finalmente, de los 13 centros de salud, en la mayoría de los centros de salud las HC para el estudio estos problemas crónicos (y otros como los respiratorios crónicos o los neurológicos) se encuentran separadas del resto de las HC (en cinco centros de salud), en los restantes disponen de un listado de estos individuos para facilitar su identificación y seguimiento.

Como fue presentado en la revisión realizada (punto 3.) los aspectos clínicos registrados en las HC presentan una elevada sensibilidad y valor predictivo positivo. Además en nuestro caso, estos presentaron una elevada completitud. Valores como el peso y la talla presentaron una elevada completitud y estos son registrados en las HC a partir de su medición con instrumentos presentes en los centros de salud. En comparación a otros estudios (Scobie, *et al.*, 1995), el elevado porcentaje de completitud de los mismos puede deberse a su relación con los problemas de salud que presentan estos individuos (entre peso corporal, diabetes, HTA y enfermedades cardiovasculares). Salvo para el registro de fondo de ojo (usado para el estudio de retinopatía diabética e hipertensiva), pero no por falta de registro en las historias clínicas, sino por dificultades en el acceso al mismo, por lo que este problema de salud no pudo ser estudiado.

Por la modalidad del sistema de salud público local los individuos deben concurrir al hospital local para la realización de algunos estudios complementarios o en caso de que requieran internación. Esto puede implicar que luego continúen allí su atención o parte de la misma. Por ello, para poder “recuperar” eventos de individuos que estuvieron internados fue realizado un *record linkage* con los egresos hospitalarios. De esta manera se registraron todos los eventos y se verificaron las enfermedades cardiovasculares. Además se buscó mejorar la calidad de la información de la base de datos. Un 43,5% (357) de los individuos registrados en los centros de salud tuvieron al menos una internación (un 13% por problemas cardiovasculares y un 30,6% por otros como gastrointestinales, ginecológicos, oncológicos).

Por lo tanto, con el objetivo de realizar una validación externa de los datos se analizó la concordancia entre aspectos seleccionados entre las HC de los centros de salud que presentaron al menos una internación con la base de egresos hospitalarios los años 2005 al 2015. Se calculó el estadístico *kappa*, el cual se usa para analizar el nivel de concordancia entre dos conjuntos de observaciones el cual incorpora la concordancia debida al azar (Szklo & Nieto, 2003). Este ha sido empleado en diferentes estudios para evaluar el grado de acuerdo entre diferentes fuentes de información (Burgos-Lunar de, *et al.*, 2011; Huerta, *et al.*, 2009; Schpilberg, *et al.*, 2002).

El nivel de concordancia más elevado se obtuvo para la fecha de nacimiento y el sexo. Los distintos problemas de salud analizados presentaron diferentes niveles de concordancia,

con mejores niveles para enfermedad cerebrovascular ($k=0,714$) y pié diabético ($k=0,590$) y los más bajos por enfermedades vinculadas al corazón. En relación a los aspectos socioeconómicos la educación en nuestro caso presentó completitud menor en relación a los demás aspectos estudiados en ambas bases de datos (63% en la base de HC y 70,5% en la base de egresos) pero una concordancia *notable* ($k=0,536$). En relación al trabajo, fue analizada la ocupación de los individuos, ya que fue la categorización empleada en ambas bases de datos. En las HC presentó una completitud mayor al 90% y en los egresos del 65%. Entre ambas bases de datos presentó una concordancia *notable* ($k=0,552$) (Tabla 1).

Debido al bajo grado de completitud de educación esta solamente será empleada de manera descriptiva, la ocupación será incorporada debido a que presentó una concordancia notable, pero teniendo en cuenta las limitaciones de la misma al ser la población estudiada de un sector que vive en condiciones socioeconómicas desfavorables, donde el trabajo es un aspecto dinámico y sin posibilidad de correlación con los momentos de los problemas de salud estudiados.

Como consecuencia, esta validación nos permitió analizar la validez que tienen las HC para el estudio de un problema crónico como las enfermedades cardiovasculares. Donde para la mayoría de estas enfermedades, para el alcoholismo y para los aspectos socioeconómicos (educación y trabajo) se obtuvo una validez *notable*. Las enfermedades cardíacas presentaron la menor validez dentro de las enfermedades cardiovasculares, en particular para enfermedad coronaria. Esto es llamativo siendo que este es habitualmente un problema de salud que requiere internación; en este caso los eventos registrados en las HC no fueron corroborados en internaciones y los diagnósticos de egreso no fueron registrados en las HC. Por otro lado enfermedad cardíaca hipertensiva presentó una validez menor al resto de las enfermedades, pero este problema de salud no necesariamente requiere internación, de ahí el nivel bajo de concordancia.

Tabla 1: Concordancia entre aspectos medidos en las historias clínicas de los centros de salud y en los egresos hospitalarios				
	Kappa	Error estándar	Valor p	Nivel de concordancia ^a
Fecha de nacimiento	0,997	0,0028	0,0000	Casi perfecta
Sexo	0,981	0,0529	0,0000	Casi perfecta
Enfermedad cerebrovascular	0,714	0,0528	0,0000	Notable
Pie diabético	0,703	0,0529	0,0000	Notable
Enfermedad renal crónica	0,590	0,0528	0,0000	Notable
Ocupación	0,552	0,0283	0,0000	Notable
Educación	0,536	0,0618	0,0000	Notable
Alcoholismo	0,422	0,0445	0,0000	Notable
Enfermedad cardíaca hipertensiva	0,234	0,0444	0,0000	Aceptable

Fuente: Elaboración propia en base a la información en las historias clínicas y egresos hospitalarios

^a En base a la clasificación de Landis y Koch (Szklo & Nieto, 2003):

0,8 a 1,0: casi perfecta

0,6 a 0,8: notable

0,4-0,6: moderada

0,2-0,4: aceptable

0 a 0,2: reducida

-1,0 a 0: pobre

ANEXOS

<i>Anexo A. Evaluación ética.....</i>	<i>124</i>
---------------------------------------	------------

Anexo A. Evaluación ética

PLANILLA DE CONSIDERACIONES ÉTICAS

Código: RG-01

Versión: 04

Vigente desde: 01/02/2018

FECHA DE EVALUACIÓN: 19/06/2018

APELLIDO Y NOMBRE DEL EVALUADOR: Ambrosini Cristina, Pourrieux Cecilia, Hernán Amatriain, Alazraqui Hugo

NOMBRE DEL PROYECTO: Enfermedad cardiovascular en contextos de desigualdad

APELLIDO Y NOMBRE DEL DIRECTOR/A DEL PROYECTO: Dr. Marcelo Alazraqui

APELLIDO Y NOMBRE DEL MAESTRANDO DEL PROYECTO: Esp. Mónica Serena Perner

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO (conflictos de interés, relación riesgo beneficio, equidad, confidencialidad, veracidad, interés comunitaria):

El proyecto evaluado es de Interés Institucional y para la Salud Pública. Se realiza en base a diferentes metodologías. El consentimiento informado que se presenta es adecuado, y los recaudos para preservar la confidencialidad de la información secundaria que se maneja también es pertinente.

No presenta conflictos de interés.

NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO:

SI ☒ NO ☐

PREVE CONSENTIMIENTO:

SI ☒ NO ☐

SEGUIMIENTO:

SI ☐ NO ☒

CONCLUSIÓN:

ACEPTADO:

SI ☒ NO ☐

ACEPTADO.

COMISIÓN DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
RECTORADO

DIARIO DE INVESTIGACIÓN. AÑOS 2014-2018

Tanto durante mi período de estudiante de medicina como durante la residencia de Medicina General fui buscando “otras miradas” que complementaran el abordaje centrado en el hospital, individualizado y asistencial. Esto lo pude conceptualizar al estudiar la Carrera de Especialización en Epidemiología del ISCo-UNLa. Así volví a una ciudad en la que me crié, luego de transitar largos años de estudio, militancia y trabajo en Buenos Aires, siendo parte (en la vida personal) de *otro* grupo poblacional distinto (en términos sociales y culturales) al estudiado en esta tesis, con mayores posibilidades de elección y a la vez buscando entender en estas *elecciones* de estos *otros*, es que cómo se construyen los *modos de vivir* de los distintos grupos sociales. Al compartir con *unos*; al vivir con *otros*. Pero buscando un lugar de respecto, pero de búsqueda de comprensión. Atravesada además por vivencias personales de usos (o no usos) de los espacios para actividades recreativas en un lugar inserto en la montaña, con una gran disponibilidad de los mismos y en un contexto donde (quienes pueden elegir) comienzan a seleccionar cada vez más que grupos de alimentos consumir y como construir sus casas.

Así, en mi regreso a esta ciudad, en el armado local de redes para mi inserción laboral y personal a partir de vínculos establecidos desde mis redes en Buenos Aires, me fui vinculando a trabajadores del sistema público de salud local y provincial, principalmente aquellos relacionados al primer nivel de atención. Esto fue fundamental para vincularme con los equipos de salud y de esta manera realizar el trabajo de campo para esta tesis doctoral.

En estas recorridas, comencé a buscar datos socioeconómicos que me permitieran caracterizar los vecindarios para ser empleados en parte de los análisis de la tesis. A nivel local no se realiza la Encuesta Permanente de Hogares⁷; ésta fue realizada en un momento sin continuidad en el tiempo, siendo Bariloche la localidad más grande de la provincia. Entonces la única información disponible para obtener datos socioeconómicos y demográficos locales y desagregados es la información de los censos realizada por el INDEC, sin contar tampoco con otra cartografía actualizada y unificada localmente. No había conocimiento de ninguna institución local (municipal o provincial) sobre los límites de los vecindarios y por ende se generó una mayor complejidad en la compatibilización con la cartografía elaborada por el INDEC y los vecindarios contruidos localmente. Como consecuencia esta fue una tarea que llevó su tiempo y sus vueltas dado el desconocimiento por parte de las distintas instituciones a nivel local (sean estas municipales, provinciales y nacionales) de la existencia de información, sumado al no uso por parte de distintos espacios de gestión y planificación local.

⁷ En Rio Negro se realiza en Viedma y Carmen de Patagones.

Durante largos meses concurrí a todos y cada uno de los centros de salud de la ciudad donde llevé adelante la investigación y relevé cada una de las historias clínicas definidas para esta investigación. En esta tarea fui recibida gratamente gracias a los vínculos establecidos con distintas personas de (o vinculadas a) cada equipo de salud, aceptando mi presencia sin problemas durante las jornadas necesarias en cada establecimiento sanitario. Esto fue muy enriquecedor, ya que me permitió conocer cada centro de salud por dentro, los distintos miembros de los equipos de salud, sus relaciones con el hospital local y los vecindarios donde éstos están insertos.

Poder concurrir personalmente a cada centro de salud me ayudó a construir como analizar las diversas modalidades de acceso constituidas localmente en cada uno de ellos. Poder recorrer la ciudad y muchos lugares por mí no conocidos y así observar los vecindarios con sus distintas constituciones del espacio, de la construcción de las viviendas, la conformación de las calles, tanto en sus diferencias como en sus características comunes. Con la premisa de que tanto el contexto como la atención de la salud, tienen relación en el desarrollo de problemas de salud crónicos, como los estudiados.

Fui así construyendo como se diferencian los centros de salud, como los equipos de salud buscan distintas maneras de mejorar el acceso a la atención; cómo se diferencian los vecindarios de la ciudad, en los usos del espacio y en los usos de zonas recreativas y en qué se diferencian los individuos que llegan a atenderse. Cada uno de estos aspectos construyó y así fue parte y todo de esta tesis.

Para el trabajo de campo concurrí con una propuesta de los aspectos a ser analizados en las historias clínicas pero con una gran incertidumbre de poder encontrarlos, pero la sorpresa fue positiva. Por un lado con una multiplicidad de disciplinas que escribían en las historias clínicas, construyendo así una mirada diversa de los problemas allí volcados, propia de cada una de ellas: medicina general, cardiología, trabajo social, psicología y agentes sanitarios (ante las visitas en las casas). Por otro lado, encontré gratamente, que cada centro de salud tenía identificada la población a ser estudiada en esta investigación; cada uno a su manera, pero todos pudieron suministrarme un listado de las historias clínicas de la población a ser relevada. Estos aspectos hicieron que la completitud de los registros fuera mejor que la esperada y además abrió preguntas de cómo construir los aspectos a ser medidos para caracterizar los centros de salud en cuanto a las modalidades de acceso y de atención.

Por otro lado, fue frustrante la escasez de información relativa a aspectos socioeconómicos en las fuentes de información relevadas (historias clínicas y egresos hospitalarios). Esta limitación encontrada me llevó a la necesidad de ampliar la mirada sobre como problematizar el tema estudiado. Así, en el ir y venir por los vecindarios hacia los centros de salud, con zonas con mayor vulneración de los derechos que otras, se fue construyendo

la necesidad de analizar como la constitución del espacio hace a las condiciones de vida y como estas se relacionan con la salud.

CURRICULUM VITAE. Perner, Mónica Serena

FORMACIÓN ACADÉMICA (DE GRADO Y POSGRADO)

- 2014 - actual. Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús.
- Cursos de postgrado:
 - 2013. Taller “Enfoque del curso de vida para enfermedades cardiovasculares”. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Guatemala.
 - 2013. Cursos en “Graduate Summer Session in Epidemiology” (sobre epidemiología, análisis multinivel y sistemas de información geográfico) Universidad de Michigan, Estados Unidos.
 - 2016. Pasantía en análisis multinivel en el Instituto de Saúde Coletiva - Universidad Federal de Bahía, Brasil.
- 2012. Especialista en Medicina General. Ministerio de Salud de la Nación.
- 2011. Especialista en Epidemiología. Universidad Nacional de Lanús (2008 – 2011).
- 2005. Médica. Facultad de Medicina - Universidad de Buenos Aires (1999 – 2005).

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Artículos

- 2018. Pérez S, Perner S. “El acceso a la salud desde un enfoque de derechos. Percepciones de los equipos de salud de la Zona Andina de Río Negro”. *Revista Pilquen*. 21(3):32-44.
- 2018. Pérez S, Perner S. “Del dicho al hecho: el derecho a la salud en Río Negro, Argentina”. *Revista Interface Comunicação, Saúde, Educação*. 22(65):359-71.
- 2017. Pérez S, Perner S. Desigualdades en salud en la norpatagonia argentina: una aproximación desde el enfoque de las capacidades. *Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*. 11(1):101-14.
- 2015. Pérez S, Perner S. Prácticas alimentarias y actividades físicas en contextos de desigualdad. En: Domínguez Mon, Schwarz. Redes de cuidado, autocuidado y desigualdad en salud: personas que viven con enfermedades de larga duración. *Documento de trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani N° 75*.
- 2014. Perner. Respuesta a la carta “La evidencia publicada y las transformaciones en el abordaje de la diabetes”. *Salud Colectiva*. 10(2):281-3.
- 2013. Perner. “Las transformaciones en el abordaje de la diabetes: análisis de las evidencias científicas publicadas por dos sociedades científicas (1980 – 2010)”. *Salud Colectiva*. 9(3):373-89.
- 2013. Gould IT, Perner MS, Santini MS, y otros. “Leishmaniasis visceral en la Argentina: notificación y situación vectorial (2006-2012)”. *Revista Medicina (Buenos Aires)*. 73: 104-10.

Libros y capítulos de libros

- 2013. Domínguez Mon A, Perner S, Pérez S. E-book “De la agencia social a la salud colectiva”. Editorial UNRN.
- 2013. Domínguez Mon A, Perner S, Pérez S. “Simposio del Padecimiento a la Agencia Social en Salud Colectiva: Enfermedades Crónicas y vida cotidiana”. En: “Iniciativas de gobierno abierto de las Américas”. Editorial Teseo.

Trabajos en eventos científico- tecnológicos

- Presentación de trabajos y ponencias (9) sobre: acceso al derecho a la salud, desigualdades sociales, prácticas de alimentación y de actividad física, cuidado y salud, vigilancia epidemiológica.
- Presentación de posters (5) en eventos científicos sobre desigualdades sociales y prácticas de alimentación y actividad física, sobre accidentes de tránsito, sobre vigilancia epidemiológica.

Formación de recursos humanos en ciencia y técnica

- 2017-actual. Dirección de tesis (1). Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud. Universidad Nacional de Rosario.
- 2017-actual. Co-dirección de tesis (2). Lic. en Enfermería. Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue (CRUB-UNCo).
- 2015-actual. Tutora de trabajos (6) en la Residencia de Medicina General y Hospital Bariloche.

BECAS Y FINANCIAMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

- 2013-2019. Becaria doctoral: beca interna de postgrado para temas estratégicos - CONICET.
- 2013-actual. Participación en distintos proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de Lanús sobre los temas: derecho a la salud, cuidados y derechos, cuidados y agencia social, accidentes de tránsito.

TRAYECTORIA LABORAL Y PROFESIONAL

- 2018-2022. Consejera docente del Consejo Directivo del CRUB-UNCo.
- 2012-actual. Docente CRUB-UNCo: *Bioestadística aplicada y Cuidados para la salud comunitaria I*
- 2016-actual. Miembro del comité científico Federación Argentina de Medicina General.
- 2011. ISCo-UNLa. Proyecto de cooperación OPS sobre salud y trabajo.
- 2009-2011. Área de Vigilancia Epidemiológica, Dir. de Epidemiología, Min. de Salud Nación. Buenos Aires.