Эндосонография средостения – доступ эхобронхоскопом через пищевод (ЭУС-б)

И. В. Сивокозов

Центральный НИИ туберкулеза

1. Введение

Как уже отмечалось ранее, исторически первоначальным доступом к средостению для эндосонографии был именно чреспищеводный с помощью эхогастроскопов. Вместе с тем, почти сразу же после начала широкого применения эндобронхиальной ультрасонографии, стали описываться единичные случаи применения эхобронхоскопа с помощью трансэзофагеального доступа [3-4]. Такое исследование получило аббревиатуру ЭУС-б (где литера «б» означает применение эхобронхоскопа).

2. Показания и противопоказания к ЭУС-б

Основные показания к ЭУС-б существенно не отличаются от таковых для эндобронхиальной ультрасонографии в целом. В том случае, если цель для биопсии является достижимой как через бронхиальное дерево, так и через пищевод (см. рис. П). (Подпись. Аксиальные срезы компьютерной томограммы грудной клетки в средостенном (слева и справа) и легочном (в центре) режимах, без контрастного усиления. В средостенном режиме с совмещением ПЭТ определяется симметричная аденопатия средостения, с накоплением меченой глюкозы в бифуркационной группе лимфоузлов. В легочном режиме в обоих легких субплеврально определяются зоны консолидации легочной ткани на фоне перилимфатической диссеминации и аденопатии средостения в бифуркационной зоне. В средостенном режиме определяется аденопатия средостения в бифуркационной зоне. По результатам ЭУС-ТИП во всех случаях установлен диагноз саркоидоза), ЭУС-б является вполне законной альтернативой ЭБУС. В том случае, если целью для эндосонографии средостения являются параззофагеально/перигастрально расположенные структуры, недостижимые для ЭБУС-доступа, ЭУС-б становится безальтернативным вариантом выполнения исследования (см. рис. № [10]). (Подпись. Аксиальные срезы компьютерной томограммы грудной клетки в средостенном режиме, с контрастным усилением (слева) и без (справа). Слева - в средостенном режиме определяется изолированная аденопатия средостения в параззофагеальной группе ВГЛУ, при ЭБУС-ТИП - акустического окна для достижения данной группы не выявлено, ЭУС-б-ТИП выполнена без затруднений, верифицирован метастаз аденокарциномы. Справа - в средостенном режиме определяется аденопатия средостения групп 8 и 12R, при ЭБУС-ТИП акустического окна для выполнения биопсии не определяется, ЭУС-б-ТИП группы 8 выполнена без затруднений, верифицирован саркоидоз.)

В клинической практике ЭУС-б исследование выполняется у пациентов с генерализованной и симметричной аденопатией средостения (в первую очередь, у пациентов с подозрением на саркоидоз), при подозрении на метастатическое поражение и/или рецидив параззофагеально расположенных лимфоузлов (например 2L, 4L, 7), а также при наличии патологических изменений в легочной ткани, анатомически смежных с пищеводом (как правило, в S6 и сегментах базальных пирамид обоих легких).

Противопоказания к ЭУС-б не отличаются от таковых для эндобронхиальной ультрасонографии в целом. В какой-то степени ЭУС-б может служить альтернативой ЭБУС при тяжелой гипоксемии и дыхательной недостаточности, однако, всегда решение о выполнении эндосонографии принимается на основании конкретной клинической ситуации с учетом всех возможных альтернатив.

3. Методика выполнения – эндоскопическая интубация

Положение пациента. Чреспищеводное исследование эхобронхоскопом может быть выполнено как в положении лежа на спине, так и в положении пациента на левом боку.

Жестких правил в этом отношении нет. Тем не менее, чаще все же используется положение пациента лежа на спине. **Анестезия.** Как правило, исследование вполне может быть выполнено под местной анестезией. В случае применения местной анестезии выполняется орошение слизистой глотки раствором 10% лидокаина в виде спрея (общим числом 4-5 доз в два-три подхода с промежутком примерно в минуту). После завершения последней серии введения анестетика пациента можно укладывать на кушетку/стол в положении лежа на спине или на боку, в зависимости от предпочтений врача. Эндоскоп вводится через загубник, желательно с возможностью фиксации.

Как правило, в начале освоения методики эндоскопии излюбленным методом обезболивания является именно седация. Она предоставляет больший комфорт при проведении исследования для пациента – медикаментозный сон позволяет избежать страха, неприятных переживаний и ощущений, связанных с исследованием. Вместе с тем, седация несет в себе и определенные недостатки – прежде всего, меньшая степень самоконтроля пациента зачастую значительно снижает комфорт выполнения биопсии врачом.

Введение эндоскопа и интубация пищевода. Прежде всего, следует помнить об особенностях эхобронхоскопа – скошенной оптике. Поэтому, выполняя интубацию пищевода или трахеи, всегда следует учитывать, что истинная ось движения эндоскопа находится несколько ниже, чем визуализируется на экране монитора.

4. Опорные точки при интубации пищевода эхобронхоскопом

Корень языка, срединная борозда – сразу после введения эндоскопа через загубник визуализируется слизистая языка со срединной бороздой, далее – корень языка (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндофото при интубации эхобронхоскопом пищевода, скошенная оптика. Визуализируется поверхность языка с срединной бороздой.) Тяга эндоскопа на данном этапе находится в среднем положении вниз (down), обеспечивая сгибание дистальной части аппарата.

Увула - аккуратным движением продвигая эндоскоп, по средней линии визуализируется язычок мягкого неба (см. рис. №[1]). или увула. (Подпись. Эндофото при интубации эхобронхоскопом пищевода, скошенная оптика. Визуализируется поверхность языка с прилежащей увулой.) Эндоскоп аккуратно проводится за нее. В этот момент тяга эндоскопа переводится в нейтральное положение.

Надгортанник. Для облегчения выведения надгортанника желательно попросить пациента разогнуть шею, вытянуть подбородок вверх, тем самым обеспечивается комфортное анатомическое расположение надгортанника и он немного приподнимается, позволяя достигнуть хорошей визуализации (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндофото при интубации эхобронхоскопом пищевода, скошенная оптика. Визуализируется надгортанник, сомкнутые голосовые складки в момент глотания.) В случае, если исследование выполняется в условиях седации, желательно попросить ассистента вывести нижнюю челюсть пациента тем же образом для облегчения визуализации надгортанника. С этого момента тяга эндоскопа находится либо в нейтральном, либо в положении разгибания (up) – в зависимости от вариантной анатомии гортаноглотки. Плавным движением эндоскоп проводится немного дистальнее, под надгортанник, с визуализацией структур гортани.

Задняя комиссура гортани/черпаловидные хрящи. Ориентиром, который позволяет определить адекватное для интубации пищевода положение эхобронхоскопа, служит задняя комиссура гортани (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндофото при интубации эхобронхоскопом пищевода, скошенная оптика. Визуализируется поверхность надгортанника, черпаловидные хрящи, голосовые складки и задняя комиссура гортани.) Ее визуализация скошенной оптикой означает, что ось движения эндоскопа проходит ниже комиссуры, в направлении устья пищевода. Возможно введение эндоскопа как при глотательном движении пациента, так и без него – размер аппарата небольшой, и как правило интубация не вызывает затруднений.

Просвет пищевода. После того, как аппарат миновал устье пищевода, возникает ощущение «провала» – эндоскоп, не встречая препятствий, без усилий проходит по

просвету пищевода. Важной является визуализация просвета пищевода, с характерной эндоскопической картиной (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндофото при интубации эхобронхоскопом пищевода, скошенная оптика. Визуализируется стенка пищевода, эхобронхоскоп успешно проведен в пищевод.)

5. Методика выполнения – эндосонография средостения

Осмотр средостения: ретроградный и антероградный способы. После успешной интубации пищевода в эндоскопическом изображении более нет нужды. Исследование может проводиться двумя способами – антероградно (сверху вниз) и ретроградно (снизу вверх). Оба подхода являются взаимозаменяемыми и существенных различий в их применении нет. В зависимости от личных предпочтений врача или основной зоны интереса могут применяться тот или иной подходы.

Структуры средостения: «опорные» точки. В отличие от ЭБУС, ЭУС-б исследование, как правило, выполняется без эндоскопического контроля положения УЗ-датчика. Место эндоскопической картины здесь занимает ультразвуковая. Ниже приведем ряд опорных, своего рода «реперных точек», и описание методики выведения их с помощью эхобронхоскопа.

Аорта. Сразу после интубации, ощутив «провал» эндоскопа за устье пищевода, аппарат проводится чуть дальше, буквально на несколько сантиметров. Изначально датчик эндоскопа смотрит точно вверх, проходя через часть трахеи с находящимся в ней воздухом. Мягким поворотом запястья руки, держащей рукоятку эндоскопа, против часовой стрелки в акустическое окно выводится магистральный сосуд, по сути целая «река» - аорта (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. Визуализируется магистральный сосуд (аорта) с прилежащими к ней дистально лимфатическими узлами превазкулярной группы). Продолжая движение против часовой стрелки, аорта постепенно уходит за пределы акустического окна, и появляется резкая граница гиперэхогенной области - зона грудных позвонков. Мягким скользящим движением в дистальном и проксимальном направлении Вы можете осмотреть течение этой «реки», ее ответвления. Аорта – важный ориентир при оценке структур средостения с левой стороны, в частности, зоны лимфоузлов группы 2L.

Воздух в трахее. Как уже упоминалось ранее, после интубации датчик эндоскопа смотрит точно вверх, проходя через часть трахеи с находящимся в ней воздухом. Эта красивая картина напоминает расходящиеся во все стороны волны или «знак кометы» (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. Визуализируются множественные реверберации воздуха в прилежащей трахее - "знак кометы").

Бифуркационная зона. После выведения зоны «кометы», плавное продвижение эндоскопа дистально позволяет проследить эту область до момента разделения трахеи на правый и левый главные бронхи. Как только трахея разделяется, преграда для ультразвука в виде воздушной прослойки исчезает, и становится доступной зона бифуркации. Аккуратными ротационными движениями небольшой амплитуды (примерно до 30-45° в каждую сторону) можно осмотреть бифуркационные лимфатические узлы, камеры сердца, а также ветви легочной артерии (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На обеих сканограммах визуализируется крупный конгломерат ВГЛУ 7 группы неправильной формы, отдавливающий правую ветвь легочной артерии (справа на каждом снимке) и левое предсердие (слева на каждом снимке)).

Зона аортопульмонального окна, или 4L. После осмотра зоны бифуркации эхоэндоскоп выводят в позицию подготовки к выведению зоны 4L. Два крупных сосуда, дуга аорты и ствол легочной артерии, формируют своего рода карман, или окно, в котором и располагаются узлы данной зоны, отсюда и название – «аортопульмональное окно». Эта зона располагается немного выше и левее бифуркационной области. Поэтому для ее выведения потребуется ретроградное движение эндоскопа.

Сперва датчик эхоэндоскопа располагается в пищеводе чуть ниже бифуркации трахеи. Достигается это положение следующим образом: выполняется ретракция аппарата до момента появления симптома «кометы». Это означает, что ультразвуковой датчик находится под мембранозной стенкой трахеи, а наблюдаемые волны «кометы» отображают воздух в просвете трахеи. Медленным плавным движением в дистальном направлении достигается такое положение датчика, когда часть ультразвукового изображения еще представлена реверберациями воздуха, а часть – уже структурами бифуркационной зоны. Далее выполняется плавная медленная ротация эндоскопа против часовой стрелки с одновременной медленной ретракцией аппарата. На короткое время появляется и почти сразу исчезает небольшой знак «кометы» - отражение ультразвуковой волны от зоны перехода ткань-воздух в левом главном бронхе, а затем, по мере дальнейшей ретракции аппарата, становится явной еще одна опорная точка средостения. Два магистральных сосуда окружают зону аортопульмонального окна. При достаточном воображении можно представить себе, что два больших пульсирующих сосуда – это уши, а лимфатические узлы между ними – нос одного известного персонажа мультипликационных фильмов (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На обеих сканограммах визуализируется солитарный овоидной формы ВГЛУ группы 4L, располагающийся между стволом легочной артерии (на левой сканограмме выделен в режиме ЦДК) и аортой (на правой сканограмме выделена в режиме ЦДК - "уши Микки Мауса"). Опорная точка группы 4L именно поэтому часто называется «знаком Микки Мауса»).

Зона 2L – левая верхняя паратрахеальная группа. Выведение этой группы не вызывает серьезных затруднений и по сути является продолжением маневра выведения группы 4L. После того, как в зоне сканирования установлены и аорта, и ствол легочной артерии, необходимо провести плавную ретракцию эхобронхоскопа, без ротационных движений дистальной части эндоскопа. Таким образом, в зону сканирования полностью входит дуга аорты. Область, расположенная проксимальнее (выше) уровня дуги аорты, и относится к зоне 2L (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На сканограмме визуализируется солитарный треугольной формы ВГЛУ группы 2L (выделен в режиме соноэластографии), располагающийся выше дуги аорты (часть сосуда захвачена в окне соноэластографии, нет окрашивания)).

Верхние и нижние паразофагеальные лимфоузлы. Для выведения этих лимфоузлов эндоскоп из положения осмотра бифуркационной зоны проводится дистальнее, до зоны камер сердца. На этом уровне располагаются лимфоузлы группы 8, или верхние паразофагеальные. При продвижении дистально на уровне нижней легочной связки, располагаются лимфоузлы нижней паразофагеальной группы, или 9 группы. Сама легочная связка на ультразвуковом изображении трудно визуализируема.

Печень. При продвижении эхобронхоскопа дистальнее уровня камер сердца и диафрагмы становится возможным проведение осмотра левой доли печени (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На сканограмме визуализируется типичная ультразвуковая картина левой доли печени.)) Мягкими ротационными движениями выводится типичная ультразвуковая картина печеночной ткани. Для чреспищеводного варианта исследования печень является опорной точкой для оценки экзогенности исследуемых групп лимфоузлов – в случае, если экзогенность зон интереса выше плотности печени, их относят к гиперэкзогенным, если ниже – к гипоекзогенным. Сопоставимые по эхохарактеристикам с печенью очаги относят к изоэкзогенным.

Левый надпочечник. Для выведения левого надпочечника используется трехэтапная техника [2]. На первом этапе достигается визуализация левой доли печени через кардию желудка (см. рис. №[1]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На сканограмме визуализируется типичная ультразвуковая картина левой доли печени.)) Вторым этапом выполняется мягкое ротационное движение эндоскопа по часовой стрелке

до момента выведения абдоминальной части аорты и чревного ствола (см. рис. №[]). (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На сканограмме визуализируется аорта и чревный ствол.) И наконец, завершающим третьим этапом является дальнейшее движение эндоскопа в каудальном направлении, с выведением левого надпочечника и левой почки через стенку желудка (см. рис. №[]) (Подпись. Эндосонографическая картина при выполнении ЭУС-б. На сканограмме визуализируется видеоизмененный левый надпочечник (по форме напоминает чайку) и апикальный полюс левой почки).

6. Заключение

Чреспищеводная эндосонография средостения эхобронхоскопом (ЭУС-б) – мощный инструмент в руках бронхолога и эндоскописта. Метод характеризует легкая доступность, простота выполнения исследования, возможность проведения манипуляции при выраженной дыхательной недостаточности, меньшая сложность выполнения биопсии в сравнении с ЭБУС.

Библиография

1. Линденбратен Л.Д., Наумов Л.Б. Медицинская рентгенология. 384 с, илл. М.: 1984
2. Crombag LM, Annema JT. Left Adrenal Gland Analysis in Lung Cancer Patients Using the Endobronchial Ultrasound Scope: A Feasibility Trial. // *Respiration*. 2016;91(3):235-40. doi: 10.1159/000443991.
3. Fally M, Nessar R, Behrendt N, Clementsen PF. Endoscopic Ultrasound-Guided Liver Biopsy in the Hands of a Chest Physician. // *Respiration*. 2016;92(1):53-5. doi: 10.1159/000446924.
4. Fujiwara T, Yasufuku K, Nakajima T et al. The utility of sonographic features during endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for lymph node staging in patients with lung cancer: a standard endobronchial ultrasound image classification system. *Chest*. 2010;138(3):641-647. DOI: doi: 10.1378/chest.09-2006
5. Hhwangbo, B., Lee, H. S., Lee, G.-K., Lim, K.-Y., Lee, S.-H., Kim, H.-Y., Lee, J.-Y. and Zo, J. I. (2009), Transoesophageal needle aspiration using a convex probe ultrasonic bronchoscope. // *Respirology*, 14: 843–849. doi:10.1111/j.1440-1843.2009.01590.x
6. Hwangbo B, Lee GK, Lee HS, Lim KY, Lee SH, Kim HY, Lee HS, Kim MS, Lee JM, Nam BH, Zo JI. Transbronchial and transesophageal fine-needle aspiration using an ultrasound bronchoscope in mediastinal staging of potentially operable lung cancer. // *Chest*. 2010 Oct;138(4):795-802. doi: 10.1378/chest.09-2100.
7. Izumo T, Sasada S, Chavez C, Matsumoto Y, Tsuchida T.. Endobronchial ultrasound elastography in the diagnosis of mediastinal and hilar lymph nodes. *Jpn J Clin Oncol*. 2014;44(10):956-62. DOI: doi: 10.1093/jjco/hyu105
8. Nakajima T, Anayama T, Shingyoji M, Kimura H, Yoshino I, Yasufuku K. Vascular image patterns of lymph nodes for the prediction of metastatic disease during EBUS-TBNA for mediastinal staging of lung cancer. *J Thorac Oncol*. 2012;7(6):1009-14. DOI: doi: 10.1097/JTO.0b013e31824cbafa
9. Ojha S, Ie S, Boyd M, Rubio E. Vertebral body tumor biopsy: An expanded role of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration. // *J Bronchology Interv Pulmonol*. 2014 Jan;21(1):85-7.
10. Oki M, Saka H, Ichihara S, Moritani S. Transesophageal Bronchoscopic Ultrasound-guided FineNeedle Aspiration for Metastatic Vertebral Body Lesion. // *J Bronchology Interv Pulmonol*. 2016 Feb 22. DOI: [10.1097/LBR.0000000000000235](https://doi.org/10.1097/LBR.0000000000000235)
11. Rozman A, Malovrh MM, Adamic Ket al. Endobronchial ultrasound elastography strain ratio for mediastinal lymph node diagnosis.. *Radiol Oncol*. 2015;49(4):334-40. DOI: doi: 10.1515/raon-20150020

12. Sivokozov IV, Silina TL, Korolev VN et al.. The first experience in using elastography in combination with endobronchial ultrasonography for mediastinal pathology: Preliminary assessment of feasibility and comparison of characteristics via different approaches. Vestn Rentgenol Radiol. 2014;(4):13-19.
13. Sivokozov IV et al. Endobronchial Ultrasound in Mediastinal Lymphadenopathy, Endoscopic Ultrasound - From Usual to Special, Dr Charing Chong (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/66079.
14. Trosini-Desert V, Jeny F, Taillade L, Vignot S, Zribi H, Capron F, et al. . Bronchial endoscopic ultrasound elastography: preliminary feasibility data. Eur Respir J. 2013;41:477-9.