Цель. Оценить результаты восстановительного лечения в раннем послеоперационном периоде после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов пожилого возраста: купирование болевого синдрома, восстановление подвижности в суставе, восстановление мышечной силы и мышечной активности.

Материал и методы. В течение 4-х лет восстановительное лечение в раннем послеоперационном периоде (через 7–9 дней после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава) получили 112 пациентов пожилого возраста (средний возраст – $64,4 \pm 4,12$ года) с показателем по Интегральной реабилитационной ортопедической шкале 14 баллов и более. Среди них женщин было 61%, мужчин – 39%. Все пациенты при поступлении осматривались мультидисциплинарной бригадой (МДБ) с оценкой реабилитационного прогноза и выработкой индивидуальной программы реабилитации. Программа реабилитации длительностью 14 дней включала в себя: режим стационарный, высоко-белковая диета, обезболивающая и противовоспалительная терапия; профилактика тромбозов, лечебная физкультура, физиотерапия (электростимуляция синусоидальными модулированными токами четырехглавой мышцы бедра, ягодичных мышц, паравертебральных мышц, электрофорез Са – Р на область бедра поперечно, лазеротерапия на область оперированного сустава расфокусированным лучом по 8–10 процедур, переменное магнитное поле на область оперированного сустава, иглорефлексотерапия, массаж оперированной ноги, ягодич, здоровой ноги, светотерапия, психотерапия. До начала терапии, через 7 дней и в конце восстановительного лечения проводились ЭКГ, общие и биохимические лабораторные исследования, рентгенография заинтересованного сустава; пациент осматривался специалистами МДБ, оценивались выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), показатели локомоторной функции, объем (в см) бедра на границе верхняя – средняя/средняя – нижняя треть, тонус мышц бедра, показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии.

Результаты и обсуждение. После курса комплексной реабилитационной терапии отмечено полное купирование болевого синдрома в 94,3% наблюдений, регресс до 1,34 баллов по ВАШ – в 5,7%. У всех пациентов отмечена активизация локомоторной функции, незначительное уменьшение субатрофии оперированной конечности, достаточно быстрый регресс отека мягких тканей, улучшение мышечного тонуса в зоне оперированного сегмента, улучшение эмоционального фона пациентов (субшкала тревоги: $7,2 \pm 1,36$ балла до лечения, $5,4 \pm 1,77$ – после лечения).

Заключение. Восстановительное лечение в раннем послеоперационном периоде через 7–9 дней после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов пожилого возраста позволяет за относительно короткий период (14 дней) увеличить объем движения в оперированном суставе за счет значительного купирования болевого синдрома, улучшения мышечного тонуса и уменьшения отека мягких тканей.

ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

А.В. Соловьева, О.М. Королева, А.А. Родионов, Е.В. Караева, О.Б. Поселюгина

ГБОУ ВПО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России, г. Тверь, Россия

В период самоизоляции Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям оставаться физически активными, поскольку именно низкий уровень физической активности может оказать негативное воздействие на здоровье и качество жизни. Особенно это актуально для пожилых людей, имеющих хронические заболевания.

Цель. Изучить изменение образа жизни, связанного с физической активностью у пожилых, находящихся на самоизоляции.

Материал и методы. Путем анкетирования опрошено 114 человек в возрасте от 65 до 79 лет (муж. – 51 (44,7%), жен. – 63 (55,3%), средний возраст 71,1 года), находившихся в домашних условиях на самоизоляции, связанной с распространением новой инфекции COVID-19. Анкетирование проводилось путем интервьюирования по телефону. Анкета состояла из 18 закрытых вопросов, позволяющих оценить изменение образа жизни пожилых людей, находящихся на самоизоляции.

Результаты и обсуждение. Среди опрошенных 84 (73,7%) респондента проживали в семье, 30 (26,3%) – были одиночками. При этом 21 (18,4%) опрошенный отметил, что проживает один и полностью себя обслуживает, а 9 (7,9%) одиноких пользовались услугами социальных работников и волонтеров. В городских условиях проживали 63 (55,3%) человека, в сельской местности – 51 (44,7%). При этом в период самоизоляции в квартире остались проживать 52 (45,6%) человека, в частном секторе – 41 (36,0%), переехали жить на дачу – 21 (18,4%) опрошенных. Согласно опросу, строгий режим самоизоляции соблюдали только 34 (29,8%) человека, относительный допускавший выход в магазин или аптеку, прогулку с собакой или посещение поликлиники – 44 (38,6%) опрошенных, 36 (31,6%) человек продолжали жить обычной жизнью, без ограничений. Среди последних доминировали одинокие дееспособные жители сельской местности и пенсионеры, переехавшие жить на дачу.

До самоизоляции регулярные физические нагрузки средней интенсивности в спортивном зале выполняли 3 (2,6%) опрошенных, утреннюю гимнастику выполняли 12 (10,5%) респондентов, регулярные пешеходные прогулки не менее 10 минут за один раз – 56 (49,1%) пациентов, прогулки в зеленой зоне при хорошей погоде совершал 101 (88,6%) респондент. Физические ограничения в перемещении на период самоизоляции волновали 88 (77,2%) пациентов. При этом перестали ходить: на работу – 11 (9,6%); в магазин – 26 (22,8%); на встречу с друзьями – 13 (11,4%); гулять на свежем воздухе – 63 (55,3%).

Однако, респонденты стали чаще отдыхать в положении лежа – 84 (74,3%), смотреть телевизор > 2 часов подряд (68; 59,6%), длительно общаться через социальные сети, мессенджеры или по телефону (67; 58,8%), больше заниматься с домашними питомцами (37; 32,5%), готовить (19; 16,7%), сидеть у окна (18; 15,8%), читать (12; 10,5%), вязать (3; 2,6%) и др.

Заключение. Таким образом, у 2/3 респондентов выявлено значительное снижение физической активности в связи с введением ограничительных мероприятий. Указанная проблема требует дальнейшего изучения для разработки национальных рекомендаций пожилым людям в условиях самоизоляции.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ У ВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ С СЕРОПОЗИТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

С.С. Спицина^{1,2}, С.А. Бедина²

¹ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,

г. Волгоград, Россия

² ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского»,

г. Волгоград, Россия

Сердечно-сосудистая патология при ревматоидном артрите (РА) встречается чаще, чем в общей популяции. Особое внимание уделяется нарушениям функций сердца, своевременная диагностика которых влияет на прогноз жизни пациентов.

Цель. Оценить частоту нарушений ритма и проводимости у больных серопозитивным РА без клинических проявлений ИБС, определить их взаимосвязь с активностью и длительностью РА.

Материал и методы. В исследование были включены 48 пациентов с серопозитивным РА. Критериями исключения были возраст старше 60 лет, ожирение, пороки сердца, ИБС, атеросклероз периферических артерий нижних конечностей, заболевания щитовидной

железы, сахарный диабет и другие тяжелые сопутствующие заболевания, которые могли бы оказать влияние на проводимость и ритм сердца. Всем пациентам проводилось общеклиническое и лабораторно-инструментальное обследование (общий и биохимический анализы крови, электрокардиография (ЭКГ) в покое).

Результаты и обсуждение. Среди обследованных было 100% женщин, средний возраст $50,5 \pm 7,22$ лет, средняя продолжительность заболевания $8,13 \pm 2,34$ лет. Диагноз РА верифицировался на основании классификационных критериев ACR/EULAR 2010. Все пациенты имели суставную форму (без системных проявлений) умеренной и высокой активности, были серопозитивными. Больные получали базисные и нестероидные противовоспалительные препараты, на момент обследования отсутствовал прием глюкокортикоидов. При проведении стандартной ЭКГ нарушения ритма и проводимости были выявлены у 56,25% больных РА. Чаще выявлялись нотоопные нарушения (31,25%): синусовая тахикардия (18,75%), синусовая брадикардия (6,25%), синусовая аритмия (6,25%). В 12,5% была зарегистрирована экстрасистолия (суправентрикулярная (6,25%), одиночная желудочковая экстрасистолия (6,25%)). У 12,5% пациентов выявлена блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. У 18,75% диагностированы нарушения реполяризации миокарда в виде депрессии сегмента ST более 0,1 мВ или появления отрицательных зубцов Т, соответствующие критериям безболевой ишемии миокарда, без субъективных ощущений (все пациенты в этой группе были с длительностью РА более 10 лет). Связи частоты нарушений ритма с рентгенологической стадией РА не было.

Выводы. Нарушения ритма и проводимости сердца регистрировались у 56,25% больных серопозитивным РА, безболевая ишемия миокарда – у 18,75%. Частота нарушений реполяризации миокарда повышается при длительности РА более 10 лет. Полученные данные свидетельствуют о важности контроля (дополнительного проведения Холтер-ЭКГ) за проводящей системой сердца у данной категории пациентов с целью раннего выявления кардиоваскулярной патологии.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО СИНДРОМА

Е.В. Степанов¹, А.А. Заварзин^{1,2}, Н.А. Насонова²

¹ БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», г. Воронеж, Россия

² ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж, Россия

Цель. Анализ возрастных групп пациентов с миофасциальным синдромом.

Задачи. Обследование различных групп мышц, а также узлов Мюллера, миогелозов Шаде – Ланге с последующим анализом полученных данных.

Материал и методы. При данном заболевании характерно уплотнение мышцы, болезненное при пальпации – миофасциальный триггерного пункта (МФТП). В рамках исследования осмотрены 76 пациентов с клиническим диагнозом – дегенеративно-дистрофическое заболевание поясничного отдела позвоночника, у которых с использованием критериев Тревелла-Симона диагностирован миофасциальный синдром. Возрастные группы (по ВОЗ), включали в себя средний возраст (45–59 лет) – 10 мужчин и 14 женщин; пожилой (60–74 лет) – 14 мужчин, 16 женщин; старческий (75–89 лет) – 8 мужчин, 14 женщин.

Результаты и обсуждение. Пальпаторным способом с дальнейшим выполнением новокаиновой блокады выделялись болезненные мышцы с МФТП без узлов, узлы Мюллера, миогелозы Шаде – Ланге. Костные ориентиромы – остистые отростки поясничных позвонков, гребень подвздошной кости, крестцово-подвздошное сочленение. Исследовались мышцы, выпрямляющие спину; большие, средние ягодичные мышцы. В средней возрастной группе у 10 мужчин и 6 женщин выявлены МФТП в проекции мышцы выпрямителя спины, узел Мюллера определялся в 25% случаев, 8 женщин имели МФТП в области большой ягодичной мышцы без узлов Мюллера. В пожилой группе (8 мужчин, 4 женщины) МФТП (узлы Мюллера в 50% случаев) определялись только в проекции мышцы, выпрямителя спины, у 4 женщин определялись МФТП в большой ягодичной мышце, у 12 пациентов (6 мужчины, 6 женщин) узлы Мюллера встречались в 75% случаев в области мышцы-выпрямителя спины и большой ягодичной мышцы, у 2 женщин МФТП имелись во всех исследуемых мышцах в качестве узлов Мюллера, определяемые как плотные тяжи округлой или продольной формы, резко болезненные при пальпации, с подвижной кожей над ними, обнаруживались по всей задней поверхности подвздошного гребня, включая участок средней ягодичной мышцы. В старческой группе у 4 мужчин МФТП (узлы Мюллера в 50% случаев) определялись только в проекции мышцы, выпрямителя спины. У 4 мужчин и 8 женщин определялись МФТП в области мышц-выпрямителей спины, большой ягодичной мышцы, узлы Мюллера встречались в 66,7% случаев; у 6 женщин МФТП имелись во всех исследуемых мышцах (узлы Мюллера в 100%), в сочетании с миогелозом Шаде – Ланге в 33%.

Заключение. Частота встречаемости узлов Мюллера возрастает на 14,5% в пожилой группе, в старческой группе на 4% увеличивается вероятность формирования миогелоза Шаде-Ланге. У женщин на 40% чаще возникают МФТП в большой ягодичной мышце.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВИРУЛЕНТНОСТЬ КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2 И ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

А.В. Халявкин

¹ ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

² ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Москва, Россия

Анализ *Anamnesis morbi* и *Anamnesis vitae* больных COVID-19 показывает избирательную вирулентность данного коронавируса, как в возрастном, так и в анамнестическом аспекте. Выборочное тестирование обнаружило наличие антител класса IgG против SARS-CoV-2 (или класса IgM на ранних стадиях контакта с вирусом) у части населения без клинических признаков COVID-19, указывая на то, что их организмы оказались способными противостоять вирусным атакам. Или же они переболели в легкой форме, как сезонным простудным заболеванием, не требующим госпитализации. Полагают, что на самом деле имевших контакт с вирусом было больше. Но с вирусом у них справился Т-клеточный иммунитет, без участия гуморального. Возрастное распределение индивидов можно будет проанализировать после того, как репрезентативная выборка населения будет протестирована на наличие специфических антител IgG и IgM. В то же время анамнестический анализ уже сейчас показал что целый ряд хронических патологий (напр., сахарный диабет) является как фактором, способствующим заболеваемости (напр., за счет повышенной экспрессии ряда рецепторов, облегчающим вирусу проникновение в клетку), так и ухудшающим прогноз. Насколько должен подняться процент резистентных индивидов для того, чтобы выработался, так называемый, коллективный иммунитет пока неясно. Тем более что даже среди инфицированных данным типом коронавируса отмечены значительные индивидуальные различия в вероятностях его дальнейшего распространения. Однако геном этого коронавируса обладает сочетанием довольно любопытных свойств, что заставляет задуматься над его генезисом и делает разработку действенной и безопасной вакцины непростым делом. Например, наряду с выработкой антител, нейтрализующих SARS-CoV-2, часть противокоронавирусных иммуноглобулинов, наоборот, способствует их проникновению в клетку и может ухудшить течение болезни в случае заражения (так называемое антитело-зависимое усиление инфекции). С другой стороны, основная опасность при COVID-19 это немалая веро-