УДК 614.7: 616 – 053.2 (470.55)

Витковский Ю.А.¹, Михайлова Л.А.¹, Бондаревич Е.А.¹, Солодухина М.А.², Эпова Е.С.²,
Еремин О.В.², Алексеева О.Г.³, Бурлака Н.М.³, Лапа С.Э.³, Барановская Н.В.⁴, Агеева Е.В.⁴

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ П. ХАПЧЕРАНГА (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия»*

Министерства здравоохранения Российской Федерации

²*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки*

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита

³*Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Забайкальскому краю, г. Чита*

⁴*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», г. Томск*

Цель исследования. Оценить уровень загрязнения объектов окружающей среды (в том числе пищевых продуктов) тяжелыми металлами и мышьяком в окрестностях хвостохранилища горно-обогатительного комбината и изучить его влияние на элементный статус детей и подростков.

Материалы и методы. Исследование содержания химических элементов в почве, воде, растениеводческой продукции, волосах проводилось в 2016–2017 гг. В почве, воде и овощах изучался уровень свинца, ртути, кадмия, мышьяка, цинка, меди, железа. В пастибищных растениях и воде поверхностных водоемов концентрацию химических элементов определяли методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, в овощах – инверсионным вольтамперометрическим методом. Определено содержание 28 элементов методом нейтронно-активационного анализа (ИНАА) в волосах у детей. Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи программы «STATISTICA 6.0».

Результаты. В почве отмечается превышение содержания на уровне медианных концентраций мышьяка (4,7 ПДК), цинка – 3,33 ПДК, свинца – 1,86 ПДК, кадмия – 2,14 ПДК. Поверхностные воды характеризуются повышенными концентрациями сурьмы – 4 ПДК, висмута – 1,2 ПДК. Содержание свинца в овощах на уровне медианы составляет 1,6 ПДК, меди – 4 ПДК, в растениях отмечаются высокие концентрации Fe, Pb, Cd, Zn, As. Элементный состав волос характеризуется тем, что на уровне медианных значений содержание цинка, натрия, кальция и мышьяка находятся в пределах референтных значений, хрома выше среднероссийского Q75 в 6,8, железа – 31,0, кобальта – 5,6 раз.

Заключение. Результаты эколого-гигиенической оценки химического загрязнения почвы, воды, растениеводческой продукции свидетельствуют о превышении ПДК изучаемых веществ, что в сочетании с выявленным дисбалансом макро- и микроэлементов в биосубстратах детей подтверждает наличие сформировавшейся природно-техногенной геохимической провинции в п. Хапчеранга.

Ключевые слова: элементный статус, почва, тяжелые металлы, дети

Vitkovsky Y.A.¹, Mihajlova L.A.¹, Bondarevich E.A.¹, Soloduhina M.A.², Epova E.S.²,

Eremin O.V.², Alekseeva O.G.³, Burlaka N.M.³, Lapa S.E.³, Baranovskaya N.B.⁴, Ageeva E.V.⁴

INFLUENCE OF ANTHROPOGENOUS GEOCHEMICAL HABITAT FACTORS ON ELEMENTAL STATUS OF CHILDREN LIVING IN KHAPCHERANGA VILLAGE (EASTERN TRANSBAIKALIA)

¹*Chita State Medical Academy, Chita, Russia*

²*Institute of Natural Resources, Ecology, and Cryology, Siberian Branch, Russian Academy of
Sciences, Chita, Russia*

³*Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, Chita, Russia*

⁴*National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia*

Objective of Study is to research the degree of environmental contamination (including soil contamination) by heavy metals and arsenic in the vicinity of the tailings storage facility of the mining and processing complex and to estimate its influence on elemental status of children and adolescents.

Materials and Methods. Content of chemical elements in soil, water, plant products and hair was analyzed in 2016–2017. Content of lead, mercury, cadmium, arsenic, zinc, copper, and iron was measured in soil, water, and vegetables. In pasture plants and surface water sources concentration of chemical elements was determined by atomic emission spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry; in vegetables it was measured by stripping voltammetry. Content of 28 chemical elements in hair samples of children was determined by neutron activation analysis. Statistical processing of results was performed by «STATISTICA 6.0» software.

Results. Exceedance of content was observed in soil at median concentration level of arsenic (4.7 of maximum allowable concentrations (MAC)), of zinc – 3.33 of MAC, lead – 1.86 of MAC, and cadmium – 2.14 of MAC. In surface water increased concentrations of antimony (4 of MAC) and bismuth (1.2 of MAC) were determined. Median concentration of lead in vegetables is 1.6 of MAC; concentration of copper is 4 of MAC. High concentrations of Fe, Pb, Cd, Zn, and As are observed in plants. Elemental composition of hair shows that median concentrations of zinc, sodium, calcium, and arsenic are within limits of reference values, while chrome content exceeds average content in Russia Q75 in 6.8 times, iron – in 31.0 times, and cobalt – in 5.6 times.

Conclusion. Results of environmental and hygienic estimation of chemical contamination of soil, water, and plant products are the evidence of the fact that concentrations of the studied elements exceed maximum allowable concentrations, which in combination with determined disbalance of macro- and microelements of bio-substrates of children proves presence of formed natural and man-made geochemical province in Khapcheranga Village.

Key words: elemental status, soil, heavy metals, children

Забайкальский край дает уникальную возможность изучения воздействия химических факторов на организм человека, так как на его территории имеются геохимические провинции как естественного, так и техногенного происхождения, формирование которых обусловлено деятельностью предприятий горнорудной промышленности. В результате переработки оловополиметаллических руд на Хапчерангинском горно-обогатительном комбинате образовалось хвостохранилище, представляющее потенциальную опасность как источник загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почвы, подземных и поверхностных водоисточников, атмосферного воздуха.

Накопление поллютантов в объектах окружающей среды, растительных и животных организмах посредством так называемых пищевых цепочек обуславливает контаминацию продовольственного сырья, пищевых продуктов и поступление наиболее опасных веществ в организм человека с пищей. Хорошо известно, что накопление тяжелых металлов способствует ухудшению здоровья на индивидуальном и популяционном уровне, приводя к развитию специфических донозологических и патологических состояний, таких как морфологические изменения, уродства, изменения воспроизводства, эндемические заболевания. Высокая токсичность, способность к кумуляции, отрицательное влияние данных веществ даже в небольших концентрациях обуславливают риск развития у человека экологически обусловленных заболеваний [1].

В связи с этим весьма актуальным является изучение длительного воздействия токсикантов на население, проживающее в районе расположения хвостохранилища. В настоящее время для выявления роли факторов окружающей среды в развитии заболеваний широко используют методы определения маркеров в биологических субстратах. Содержание химических элементов в волосах позволяет информативно охарактеризовать длительность и характер поступления их в организм, поэтому биомониторинг такого рода является перспективным скрининговым методом определения групп населения с высоким экологическим риском.

Цель исследования: оценить уровень загрязнения объектов окружающей среды (в том числе пищевых продуктов) тяжелыми металлами и мышьяком в окрестностях хвостохранилища горно-обогатительного комбината и изучить его влияние на элементный статус детей и подростков.

Материалы и методы. По данным Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю было изучено валовое содержание свинца, ртути, кадмия, мышьяка, цинка, меди в почве п. Хапчеранга за 2016 г. Отбор проб осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериоло-

гического, гельминтологического анализа». Было отобрано 30 проб в 6 мониторинговых точках, расположенных в селитебной зоне населенного пункта (рис. 1)

Рис. 1. Схема расположения хвостохранилища и мониторинговых точек в с. Хапчеранга
(№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – мониторинговые точки)

Степень опасности загрязнения почв определялась в соответствии с ориентировочной оценочной шкалой опасности загрязнения почв (МУ 2.1.7.730–99 «Почва. Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»), ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» и СанПиН 2.1.7.1287 - 03 «Почва. Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Гигиеническая оценка уровня содержания химических элементов в почве осуществлялась путем соотношения фактических концентраций к величине его предельно-допустимой концентрации (далее – ПДК).

Оценка степени опасности загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения была проведена на основе коэффициентов концентрации (K_c) и суммарного показателя загрязнения почв (Z_c), которые были рассчитаны относительно кларков (по А.П. Виноградову). Критические значения, характеризующие суммарное загрязнение: при $Z_c < 16$ – допустимая, $16 < Z_c < 32$ – умеренно опасная, $32 < Z_c < 128$ – опасная, $128 < Z_c$ - чрезвычайно опасная категория загрязнения.

Пробы вод отбирались из ручья Тырин, протекающего вдоль хвостохранилища в населенном пункте, и из карьерного озера. Макрокомпонентный состав поверхностных вод определялся методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре Perkin Elmer NexION 300D (США), микрокомпонентный состав определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии на спектрометре Perkin Elmer Optima 5300 DV (США) в аккредитованной лаборатории ЗАО «СЖС Восток Лимитед». Определение кислотности растворов проводилось рН-метром «АНИОН-7000» с помощью комбинированного рН-электрода ЭСК 10601/4. Степень загрязнения поверхностных вод определялась на соответствие содержания элементов значениям ПДК согласно ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Исследовали пищевые продукты (картофель, свеклу, морковь) на наличие свинца, цинка, меди, кадмия. Для количественного определения содержания тяжелых металлов применяли инверсионный вольтамперометрический метод с использованием анализатора «Универсал». Анализ исследуемых проб проводили согласно СанПиН 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и «Временные гигиенические нормативы содержания некоторых химических элементов в основных пищевых продуктах» (№ 2450 – 81; М., 1982).

В пастбищных растениях содержание химических элементов определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS Elan DRC II Perkin Elmer (США) в Институте тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН. Так как объединенная проба растений формировалась из большого количества отдельных (от 4 до 23) растений, то в работе представлены анализы более 500 экземпляров растений.

Проанализированы образцы волос 28 детей в возрасте от 5 до 12 лет, постоянно проживающих на территории населенного пункта, на содержание макро- и микроэлементов. Предварительно от родителей получено информированное согласие на проведение обследования. Этические принципы исследования соответствуют принципам Хельсинской декларации 1975 г. и ее пересмотру 1983 г. Определено содержание 28 элементов методом нейтронно-активационного анализа (ИНАА) на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». Содержание исследуемых элементов в волосах сравнивали с российскими референтными значениями А.В. Скального [2].

Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи программы «STATISTICA 6.0» с учетом характера распределения полученных данных, определенного с помощью метода Шапиро-Уилка. В связи с тем, что распределение концентраций элементов статистически значимо отличалось от нормального, для анализа использовали медиану и интерквартильный размах [Me (Q₂₅ – Q₇₅)].

Результаты и обсуждение. Концентрации свинца превышали нормативные значения в 66,7%, кадмия – 66,7%, мышьяка – 100%, цинка – 76,7%, меди – 30,0%, никеля – 23,1% отобранных проб.

Медианная и максимальная концентрации изучаемых токсикантов в почве обследованной части села значительно превышают нормативные значения и составляют для мышьяка 9,35 мг/кг, что выше ПДК в 4,7 раза и 49,4 мг/кг (в 24,7 раза), цинка – 183,15 мг/кг (3,33 ПДК) и 414,9 мг/кг (7,54 ПДК), свинца – 59,5 мг/кг (1,86 ПДК) и 266,9 мг/кг (8,34 ПДК), кадмия – 1,07 мг/кг (2,14 ПДК) и 2,1 мг/кг (4,2 ПДК) соответственно.

В разрезе мониторинговых точек отмечается неодинаковый уровень загрязнения территории населенного пункта (табл. 1).

Таблица 1

Уровни содержания тяжелых металлов и мышьяка
в почве с. Хапчеранга в разрезе мониторинговых точек

Точки отбора проб	Химический элемент, мг/кг	M	Min	Max	Me	σ
1	Pb	59,6	36,1	91,0	63,7	23,7
	Cd	1,2	0,62	2,1	0,7	0,61
	Zn	253,8	137,0	414,9	258,7	120,2
	Cu	30,4	14,3	53,4	33,1	16,6
	As	17,4	9,0	41,4	9,9	13,9
2	Pb	76,7	13,7	266,9	23,0	108,4
	Cd	0,6	0,0	1,7	0,2	0,69
	Zn	140,2	35,7	365,3	128,8	134,8
	Cu	13,1	0,0	33,7	9,2	12,51
	As	10,7	8,9	16,0	9,4	3,01

3	Pb	71,1	26,8	88,4	88,4	27,0
	Cd	1,1	0,0	1,9	0,8	0,7
	Zn	249,7	117,6	373,2	308,1	113,1
	Cu	18,1	0,0	38,3	14,1	13,6
	As	20,3	9,0	32,7	17,8	11,9
4	Pb	68,2	37,0	96,3	67,2	21,1
	Cd	1,1	0,0	1,9	0,8	0,74
	Zn	335,7	166,0	404,0	378,2	96,6
	Cu	26,4	0,0	59,2	19,4	21,9
	As	18,5	9,0	49,4	9,9	17,48
5	Pb	3,2	0,0	7,0	4,5	3,1
	Cd	0,1	0,0	0,2	0,1	0,08
	Zn	9,0	0,0	16,2	12,8	8,37
	Cu	1,7	0,0	3,5	1,2	1,7
	As	5,3	4,5	6,0	5,4	0,54
6	Pb	55,5	25,7	73,0	55,5	18,4
	Cd	1,2	1,1	1,8	1,1	0,32
	Zn	259,3	136,6	399,3	280,1	98,7
	Cu	29,8	13,7	35,3	32,5	9,1
	As	10,9	9,3	16,1	9,8	2,9

Примечание: М – среднее значение; σ – стандартное отклонение; Мах – максимальное значение в выборке; Min – минимальное значение в выборке; Me – медиана; * - $p < 0,05$

Уровни содержания анализируемых веществ превышают гигиенические нормативы в каждой из мониторинговых точек, исключение составляет 5 точка, расположенная на территории детского сада, в которой только концентрация мышьяка не соответствует гигиеническим нормативам (медианная и максимальная концентрации составляют 2,7 ПДК и 3,0 ПДК соответственно). В остальных точках наиболее неблагоприятная ситуация по содержанию мышьяка отмечается в местах отбора проб, расположенных на территории бывшей горно-обогатительной фабрики (2 и 3 точка). В 3 точке зарегистрированы самые высокие уровни медианных концентраций не только мышьяка (17,8 мг/кг – 8,9 ПДК), но и свинца (88,4 мг/кг – 2,8 ПДК), кадмия (1,42 мг/кг – 2,8 ПДК), цинка (308,1 мг/кг – 5,6 ПДК). Во 2 точке для мышьяка значения составили 9,4 мг/кг (4,7 ПДК), цинка – 128,8 мг/кг (2,3 ПДК), уровень кадмия и свинца соответствует нормативным параметрам.

На территории, непосредственно примыкающей к хвостохранилищу, также отмечается содержание изучаемых поллютантов выше нормативных значений. В 1 точке медианная концентрация мышьяка превышает ПДК в 4,9 раза (9,9 мг/кг), цинка в 4,7 раза (258,7 мг/кг), кадмия в 2,4 раза (1,2 мг/кг), свинца в 2,0 раза (63,7 мг/кг). В 4 точке содержание цинка составило 378,2 мг/кг (6,9 ПДК), мышьяка – 9,9 мг/кг (4,9 ПДК), свинца – 67,2 мг/кг (2,1 ПДК), кадмия – 1,1 мг/кг (2,14 ПДК). Необходимо отметить, что в 6 точке, расположенной на расстоянии 1,5 км от хвостохранилища, содержание мышьяка определяется на уровне 4,9 ПДК, свинца – 1,7 ПДК, кадмия – 2,2 ПДК, цинка – 5,1 ПДК. Таким образом, загрязнение почвы наблюдается и на значительном удалении от объекта, что обусловлено эоловым переносом тонкой фракции технозема.

В мониторинговых точках, за исключением 3 точки, почвы по суммарному показателю загрязнения, рассчитанного по медианным концентрациям, относятся к категории «допустимого» уровня ($0 < Z_c < 15,37$), в данной точке в соответствии с ранжированием показателя почва является умеренно опасной (значение Z_c составило 18,32). Расчет суммарного показателя с учетом максимальных концентраций позволил определить, что степень загрязнения почвы во 2 точке является опасной (значение Z_c составило 38,3), в остальных мониторинговых точках степень опасности загрязнения почвы определяется как умеренно опасная (табл. 2).

Таблица 2

Суммарный показатель загрязнения почвы обследованной части с. Хапчеранга
в разрезе мониторинговых точек

Концентрации	Номер мониторинговой точки					
	1	2	3	4	5	6
Медианная	13,58	3,66	18,32	15,37	0	12,9
Максимальная	28,55	38,3	24,56	30,41	0	19,9

Таким образом, результаты оценки загрязнения почвы свидетельствуют о превышении нормативных значений концентрации изучаемых элементов на всей территории населенного пункта.

Тяжелые металлы, поступаая из почвы в растения, передаваясь по цепям питания, оказывают токсичное действие на растения и человека. При исследовании химического состава овощей установлено, что содержание свинца на уровне медианных концентраций превышает нормативные значения и составляет 1,6 ПДК (0,83 мг/кг), для меди данный показатель равен 4 ПДК (41,0 мг/кг). Уровень цинка и кадмия соответствует допустимым параметрам. Обращает на себя внимание, что значение верхнего предела экспозиции (Q_{75}) для всех токсикантов значительно превышает ПДК (табл. 3).

Таблица 3

Содержание химических элементов в пищевых продуктах, выращенных
на территории с. Хапчеранга (мг/кг)

Химический элемент	ПДК	Me ($Q_{25} - Q_{75}$)
Pb	0,5	0,83 (0,0345 – 18)
Cd	0,03	0,04 (0,001 – 2,3)
Zn	10	10,0 (7,4 – 248)
Cu	10	41,0 (0 – 116)

Me – медиана; Q_{25} - нижний квартиль; Q_{75} - верхний квартиль.

Медианная концентрация железа составляет 45,2 мг/кг, и так как содержание элемента в пищевых продуктах не нормируется, для анализа использованы справочные данные сборника «Химический состав пищевых продуктов» под ред. И.М. Скурихина (1987 г.), в котором его средний уровень для овощей равен 7 мг/кг. Проведенное исследование показало, что отмечается накопление тяжелых металлов в растениеводческой продукции.

Содержание химических элементов в надземных частях пастбищных растений приведено в табл. 4.

Таблица 4

Среднее содержание Pb, Cd, Zn, Cu, As и Hg в пастбищных растениях, мг/кг (число проб)

Химический элемент	Место отбора проб			Содержание в растениях мира, пределы колебаний [Кабата, 1989]
	Хвостохранилище (30)	Огород (на границе хвостохранилища) (7)	Пастбище в 1000 м на юго-восток от с. Хапчеранга (5)	
Fe	856,7	178,7	762,1	55-376
Pb	28,1	2,2	5,6	0,2-7,8
Cd	9,03	4,86	0,5	1-1,6*
Zn	343,3	148,8	82,3	6-80 65-350*
Cu	15,9	9,3	6,5	1,1-33
As	7,8	1,1	1,9	0,2-0,3
Hg	0,02	0,03	0,002	0,003-0,02

Примечание: * данные для старых горнорудных районов; жирным выделено содержание, превышающее среднее мировое.

Анализ таблицы дает основание сделать следующие выводы. В растениях, произрастающих на хвостохранилище, из семи изученных химических элементов превышено содержание пяти (кроме Cu и Hg). В растениях, отобранных в огороде, примыкающему к хвостохранилищу, существенно выше содержание Cd, Zn и As, в пастбищных растениях вдали от источника загрязнения содержание Fe, Zn и As также повышено. Это объясняется близостью к источнику загрязнения и особенностью геохимического поведения этих химических элементов. По данным [3] в зоне техногенеза накопленные естественной травянистой растительностью металлы выстраиваются в следующий ряд: $Cd > Zn \geq Pb > Cu > Mn > Ni > Cr$. На исследуемой территории тенденция сохраняется. Так как растения является частью пищевой цепи человека, и непосредственным звеном в питании домашних животных, через продукты животноводства возможно попадание токсичных химических элементов в организм человека.

На соответствие гигиеническим нормативам анализировались поверхностные воды карьерного озера ($pH=8,3$) и ручья Тырин ($pH=7,7$), поскольку оба водных объекта используются местными жителями. Карьерное озеро востребовано как рекреационная зона, а в ручье Тырин вылавливают рыбу и используют для хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд. Рассматриваемые поверхностные воды близки по макрокомпонентному составу, значительно отличаются только жесткостью. Вода карьерного озера жесткая (8,5 мг-экв/л), в то время как жесткость воды в ручье соответствует 0,75 мг-экв/л. Все пробы поверхностных вод характеризуются повышенными концентрациями сурьмы – 4 ПДК и висмута – 1,2 ПДК. В водах карьерного озера имеются незначительные превышения ПДК по свинцу и мышьяку – максимальные значения содержаний Pb – 0,04 мг/л, As – 0,06 мг/л, в то время как медианные концентрации идентичны нормативам – 0,03 мг/л и 0,05 мг/л соответственно. Содержание Zn, Cd, Cu, Cr, Co и Sr близки к верхним пределам ПДК, но находятся в границах нормы.

Таким образом, проведенный анализ содержания тяжелых металлов и мышьяка в объектах окружающей среды выявил наличие природно-техногенной геохимической аномалии на территории п. Хапчеранга, формирование которой обусловлено добычей и переработкой оловополиметаллических руд. Необходимо отметить, что местные жители широко используют в питании продукцию собственных подсобных хозяйств, местную воду и лесные пищевые ресурсы, поэтому исследуемые вещества могут поступать в организм и накапливаться в нем, вызывая нарушения в состоянии здоровья.

В настоящее время для оценки элементного состава биосубстратов человека широко используется центильный метод, при этом интервал от 25 до 75 центиля рассматривается как соответствующий средним значениям содержания данного химического элемента в популяции, то есть «норме». Показатели, лежащие в интервале до 25 и выше 75 центиля, оцениваются как отклонения, соответствующие состоянию «предболезни» и болезни [4]. Из 28 исследуемых элементов проведен анализ содержания элементов, представляющих наибольший интерес, как маркеров антропогенного и природного воздействия геохимических особенностей среды на организм. При сравнении полученных данных со среднероссийскими значениями выявлены существенные отличия по целому ряду веществ (табл. 4).

Таблица 4

Содержание химических элементов в волосах детей п. Хапчеранга (мг/кг)

Химический элемент	Me (Q25-Q75)	Референтные значения (Q25-Q75)
Ca	323 (94 – 671)	254 – 611
Cr	4,8 (4,3 – 5,5)	0,26 – 0,70
As	0,21 (0,16 – 0,33)	0 – 0,69
Rb	0,25 (0,16 – 0,58)	0,76 – 2,73
Fe	820 (706 – 965)	13 – 27
Zn	147 (125 – 177)	94 – 183
Co	0,61 (0,52 – 0,66)	0,02 – 0,11
Na	146 (97 – 262)	75 – 562

Me – медиана; Q25 – нижний квартиль; Q75 – верхний квартиль.

К особенностям элементного состава волос необходимо отнести повышенное по сравнению с безопасными значениями содержание хрома, железа, кобальта, что, по-видимому, связано с проживанием детей на территории геохимической провинции с высоким уровнем изучаемых элементов в объектах окружающей среды. Данные металлы образуют группу железа (Fe, Mn, Cr, Ni, Co), и почвы районов естественных геохимических аномалий, приуроченных к ультраосновным горным породам, в значительной степени обогащены элементами этого семейства. Концентрация хрома на уровне медианных значений выше среднероссийского Q75 в 6,8, железа – 30,4, кобальта – 5,5 раз.

Следует отметить, что содержание данных металлов в волосах детей этой территории значительно выше в сравнении с населенными пунктами, для которых также характерно присутствие хвостохранилищ горнорудного производства [5]. В частности, при сравнении элементного состава волос детей, проживающих в районе населенных пунктов Комсомольск и Урск Кемеровской области, с волосами детей п. Хапчеранга, значимо более высокими содержаниями отличается именно железо, кобальт и хром. Еще более высокие содержания характерны для гафния, урана и золота (рис.1), несмотря на то, что район расположения хвостохранилищ Урска и Комсомольска отличается золоторудной спецификой [5].

Рис. 1. Сравнительные данные по накоплению химических элементов в волосах детей районов расположения хвостохранилищ горно-рудного производства: населенных пунктов Хапчеранга (Забайкалье), Комсомольск и Урск (Кемеровская область).

Анализ ассоциативных взаимосвязей химических элементов в составе волос детей п. Хапчеранга показал, что железо, кобальт и хром являются ведущими элементами, играющими основную роль в данной депонирующей среде (рис.2), в то время как уран, золото и гафний не образуют устойчивой ассоциации. По-видимому, это связано с разной миграционной активностью рассматриваемых элементов в организме человека и с различным их депонированием [6].

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи химических элементов в составе волос детей п. Хапчеранга. Сплошной жирной линией показаны основные взаимосвязи на уровне значимости 0,9 при критическом 0,6 (99% достоверности), тонкая линия – на уровне 0,8, волнистая – 0,7.

Содержание кальция и натрия на уровне медианных значений соответствует референтным значениям. Значения медианы цинка и мышьяка также находятся в пределах интерквартильного интервала, несмотря на то, что оба элемента являются приоритетными загрязнителями почвенного покрова. Необходимо отметить, что содержание рубидия на уровне медианных значений в 2,4 раза меньше нижнего уровня среднероссийского центильного интервала.

Повышенное содержание макро- и микроэлементов в волосах отражает повышенное поступление и, соответственно, выведение из организма химических элементов. Исследованиями установлено, что отклонение от безопасного уровня содержания Сг в волосах коррелирует с уровнем смертности взрослого населения ($r = -0,5$, $p < 0,05$ между группой нормы и показателями смертности за 2005 г.), то есть увеличение доли дефицита или избытка Сг в волосах ассоциируется с увеличением смертности. Сг является эссенциальным микроэлементом, влияющим на перекисное окисление липидов, обмен углеводов, иммунитет, когнитивные и другие функции, следовательно, его недостаток отрицательно влияет на организм, но в то же время и избыточное поступление повышает риск заболеваний иммунной, эндокринной и нервной систем [7].

Таким образом, элементный статус детей, проживающих в п. Хапчеранга, имеет ряд выраженных отличий от среднероссийских данных, что обусловлено наличием на данной территории геохимической аномалии, характеризующейся дисбалансом исследуемых химических элементов в объектах окружающей среды. Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо проведение углубленных медико-биологических исследований, которые позволят определить нарушения в состоянии здоровья населения, обусловленные геохимической ситуацией, а также разработать рациональные экономические и природоохранные мероприятия для обеспечения безопасных условий проживания в населенном пункте.

Литература:

1. Рыбкин В.С., Богданов А.Н., Чуйков Ю.С., Теплая Г.А. Тяжелые металлы как фактор возможных экологически обусловленных заболеваний в Астраханском регионе. Гигиена и санитария. 2014. 2. 27-31.
2. Скальный А.В. Референтные значения концентрации химических элементов в волосах, полученные методом ИСП-АЭС (АНО «Центр биотической медицины»). Микроэлементы в медицине. 2003.1. 55-56.

3. Минкина Т.М., Мотузова Г.В., Мирошниченко Н.Н., Фатеев А.И., Манджиева С.С., Чаплыгин В.А. Накопление и распределение тяжелых металлов в растениях зоны техногенеза. *Агрохимия*. 2013. 9. 65-75.
4. Скальная М.Г., Демидов В.А., Скальный А.В., О пределах физиологического (нормального) содержания Са, Mg, P, Fe, Zn и Cu в волосах человека. *Микроэлементы в медицине*. 2003. 2. 5-10.
5. Рихванов Л.П. Биогеохимический мониторинг в районах хвостохранилищ горнодобывающих предприятий с учетом микробиологических факторов трансформации минеральных компонентов. М-во образования и науки РФ, Нац. исслед. Том. политехн. ун-т; Ин-т геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. 437 с.
6. Барановская Н.В., Рихванов Л.П., Игнатова Т.Н., Наркович Д.В., Денисова О.А. Очерки геохимии человека. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). Томск: Дельтаплан, 2015. 377 с.
7. Агаджанян Н.А. Скальный А.В., Детков В.Ю. Элементный портрет человека: заболеваемость, демография и проблема управления здоровьем нации. *Экология человека*. 2013. 11. 3-12.

References

1. Rybkin V.S., Bogdanov A.N., Chuykov Yu.S., Tyoplaya G.A. Heavy Metals as a Factor Inducing Potential Environment Illnesses in the Astrakhan Region. *Hygiene and Sanitation*. 2014. 2. 27-31. in Russian.
2. Skalny A.V. Reference Concentration Values of Chemical Elements in Hair, Received by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (Autonomous Non-Commercial Organization «Center of Biotic Medicine»). *Microelements in Medicine*. 2003.1. 55-56. in Russian.
3. Minkina T.M., Motuzova G.V., Miroshnichenko N.N., Phateyev A.I., Mandzhiyeva S.S., Chaplygin V.A. Accumulation and Distribution of Heavy Metals in Plants of Technogenesis Zone. *Agrochemistry*. 2013. 9. 65-75. in Russian.
4. Sjalnaya M.G., Demidov V.A., Skalny A.V. On Limits of Physiological (Normal) Content of Ca, Mg, P, Fe, Zn and Cu in Human Hair. *Microelements in Medicine*. 2003. 2. 5-10. in Russian.
5. Rikhvanov L.P. Biogeochemical Monitoring in the Areas of TSF of Mining Enterprises Taking into Account Microbiological Factors of Transformation of Mineral Components. Novosibirsk. Publishing House of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 2017. 437 pages. in Russian.
6. Baranovskaya N.V., Rikhvanov L.P., Ignatova T.N., Narkovitch D.V., Denisova O.A. Analytical Reviews on Human Geochemistry. Tomsk. Deltaplane. 2015. 377 pages. in Russian.
7. Agadzhanyan N.A. Skalny A.V., Detkov V.Yu. Human Elemental Portrait: Morbidity, Demography and National Health Management. *Human Ecology*. 2013. 11. 3-12. in Russian.