УДК 504.38

Т. А. Капитонова, канд. физ.-мат. наук, ученый секретарь, e-mail. kapitonova@iptpn.ysn.ru, **В. В. Тимофеева**, вед. инженер, **Г. П. Стручкова**, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук

Прогноз изменения динамики временных рядов климатических норм возле города Якутска

Показаны характер и последствия взаимодействия технических систем с многолетнемерзлыми грунтами, сильно зависящими от климатических показателей. Отмечено, что потепление климата вызывает изменение свойств многолетнемерзлых пород и может вызвать потерю их несущей способности, что опасно для технических систем, построенных в криолитозоне. Приведены модели для прогнозирования изменений климатических показателей, полученные на основе вероятностно-статистического аппарата. Для моделирования использованы временные ряды климатических параметров с 1891 по 1999 г. и приведены полученные на их основе результаты ретро-прогнозов изменения среднегодовых температур воздуха и среднегодовых атмосферных осадков.

Ключевые слова: климатические изменения, температуры воздуха, атмосферные осадки, технические системы, многолетнемерзлые грунты, статистическое моделирование, прогнозирование

Введение

В работах по исследованию воздействий факторов природного и техногенного характера на магистральный трубопровод (МТ), проложенный на территории распространения многолетнемерзлых грунтов, отмечено, что основными причинами возникновения и развития аварий являются [1, 2]. сложные природно-климатические условия эксплуатации, большая протяженность магистрального газопровода, многолетнемерзлые грунты; термокарстовые явления, непроектные участки трубопроводов на слабонесущих грунтах (болота, мари и поймы рек) и др. Многолетнемерзлые породы весьма чувствительны к любым природным или техногенным процессам, возникающим на территории их распространения. Повышение температуры вызывает увеличение глубины сезонного протаивания, усиливает процесс оттайки, что приводит к изменению свойств мерзлых пород, и при высокой льдистости грунтов может вызвать потерю их несущей способности, что, в свою очередь, может быть опасным для технических систем [3]. Увеличение количества атмосферных осадков также имеет негативные последствия, связанные с подъемом уровней подземных вод и развитием процессов заболачивания, особенно в зонах избыточного увлажнения, вызывает активизацию процессов деградации мерзлоты. Последствия изменения среднегодовых температур воздуха и количества атмосферных осадков проявляются также в росте

повторяемости опасных гидрометеорологических явлений.

Поэтому проблемы изучения изменения климата, его прогноза и оценки последствий антропогенного потепления в последнее десятилетие приобрели особую актуальность. Чтобы выяснить проявляется ли изменение климата в конкретных природных характеристиках и на конкретной территории, необходимо осуществить исследование и моделирование динамики временных рядов. Анализ и статистическое моделирование временных рядов температуры и осадков позволит оценить климатические особенности региона с целью дальнейших научных исследований, а также позволит планировать сценарии устойчивого развития региона.

Анализ метеорологических данных, выполненный в работе [4, 5] по ряду стран Северного полушария (Россия, Канада, США-Аляска, Китай), показывает, что в последние 25–30 лет действительно происходит умеренное потепление климата. Повышение температуры воздуха за этот период в большинстве регионов России составляет 1...1,2 °С. Темп повышений среднегодовой температуры воздуха за последние 25–30 лет составляет 0,02...0,03 °С в год в условиях Европейского Севера, 0,03...0,07 на севере Западной Сибири и 0,01...0,08 °С в год в Якутии [6]. Температура воздуха за этот период повысилась на 0,4...1,8 °С.

Потепление климата обусловлено главным образом повышением температуры воздуха зимой. Сложностью и многофакторностью процессов,

определяющих погоду и климат, объясняется отсутствие эффективных методик прогноза климатических изменений [7]. Результаты прогнозов изменения климата получаются разноречивыми, что, в свою очередь, вызывает неоднозначность в мерзлотных прогнозах. Метеорологические данные за последние 10—15 лет показывают, что экстремальные сценарии изменения климата не оправдываются, потепление идет, но более скромными темпами.

Результаты физико-математического моделирования позволяют оценивать только тренды и осредненные по некоторым пространственным и временным интервалам значения характеристик будущего климата, при этом неопределенности таких модельных значений больше величины прогнозируемых трендовых изменений [8].

Статистические модели позволяют учесть некоторые общие закономерности межгодовых колебаний регионального климата и построить их экстраполяции на ближайшие два-три десятилетия для получения более точных результатов [9]. Для более длительных сроков статистические модели пока не пригодны. Во многих случаях наиболее актуальной является задача получения оценок межгодовых колебаний климата на одно-два ближайших десятилетия. На этом временном интервале видно явное преимущество статистических моделей [10].

Цель исследования — совершенствование методики прогнозирования климатических характеристик, в данном случае среднегодовых температур воздуха и количества атмосферных осадков, а также оценка адекватности подобных прогнозов. Для достижения поставленной цели было выполнено: 1) построение пространственных статистических моделей климатических характеристик для выбранной территории; 2) выбор наиболее эффективных моделей параметров климата для определения среднегодовых температур и количества атмосферных осадков; 3) определение будущих значений выбранных климатических параметров на основе наиболее эффективных моделей климата.

Одним из методов вероятностно-статистического аппарата, который может быть использован для прогнозирования изменений климатических показателей, является метод анализа временных рядов.

Материал, методы исследования

В качестве исходных материалов были использованы данные о среднегодовых температурах воздуха и количестве атмосферных осадков в районе г. Якутска с 1891 по 1999 г., и на их

основе составлен числовой прогноз изменения среднегодовых температур воздуха и количества атмосферных осадков до 2002 г.

Задачи прогнозирования временных рядов сводятся к следующему: первичный анализ "исходных" данных; идентификация модели, подходящей для описания имеющегося временного ряда, оценивание параметров модели, исследование адекватности модели; прогноз.

В универсальной интегрированной системе STATISTICA, предназначенной для статистического анализа и обработки данных, представлен широкий набор процедур, реализующих все перечисленные этапы.

Метод прогнозирования содержит последовательность действий, в результате выполнения которой определяется модель прогнозирования конкретного временного ряда, т. е. определяет функциональную зависимость, адекватно описывающую временной ряд. Кроме того, метод прогнозирования содержит действия по оценке качества прогнозных значений. Построим модель прогнозирования по трем методам прогнозирования.

1 Метод экспоненциального сглаживания. Весьма эффективным и надежным методом прогнозирования является экспоненциальное сглаживание. Основные достоинства этого метода состоят в возможности учета весов исходной информации, простоте вычислительных операций, гибкости описания различных динамик процессов. Метод экспоненциального сглаживания дает возможность получить оценку параметров тренда, характеризующих не средний уровень процесса, а тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения. Наибольшее применение метод нашел для реализации среднесрочных прогнозов. Для метода экспоненциального сглаживания основным и наиболее трудным моментом является выбор параметра сглаживания α , начальных условий и степени прогнозирующего полинома.

Формула простого экспоненциального сглаживания имеет следующий вид:

$$S_t = \alpha X_t + (1 - \alpha)S_{t-1},$$

где t — прогнозный период; $t - 1$ — период, предшествующий прогнозному; S_t — прогнозируемый показатель, S_{t-1} — значение показателя в предшествующий прогнозному период; X_t — фактическое значение показателя за период, предшествующий прогнозному; α — сглаживающий коэффициент

Когда эта формула применяется рекурсивно, каждое новое сглаженное значение (которое является также прогнозом) вычисляется как взвешенное

среднее текущего наблюдения и сглаженного ряда. Результаты прогнозирования показали, что весьма часто простое экспоненциальное сглаживание дает достаточно точный прогноз, наиболее удачная модель содержит аддитивную сезонную составляющую, при сглаживающей константе $\alpha = 0,5$.

2. Метод гармонического анализа. Рассмотрим особенности применения метода гармонического анализа для прогнозирования временного ряда с регулярными циклами (Фурье-аппроксимация). С помощью ряда Фурье динамика явления представляется функцией времени.

Для прогнозирования подобного временного ряда можно применить следующую методику выделения временного тренда и периодических составляющих: в определении как вида функций, аппроксимирующих временную зависимость двух составляющих, так и числовых параметров этих функций.

Для аппроксимации временного тренда наиболее простым и чаще всего используемым подходом является его полиномиальное представление, когда соответствующая составляющая временного ряда функция, является полиномом, коэффициенты которого могут быть найдены методом наименьших квадратов.

Стандартным методом выделения периодических составляющих временного ряда является разложение его в ряд Фурье (анализ Фурье).

Уравнение для описания циклической составляющей ряда остатков строится на основании результатов гармонического анализа.

3. Метод прогнозирования на базе ARIMA моделей. Эти модели охватывают достаточно широкий спектр временных рядов, а небольшие модификации ARIMA-моделей позволяют весьма точно описывать и временные ряды с сезонностью.

Процесс построения ARIMA-моделей можно разбить на несколько этапов: преобразование ряда к стационарному виду, идентификация частной модели и оценка коэффициентов модели с использованием статистических методов, руководствуясь поведением автокорреляционных функций.

В данном случае поведение автокорреляционной функции (экспоненциально затухает) согласуется с моделью ARIMA (1,0).

Результаты исследования

В табл. 1 и 2 приведены значения прогнозов, полученные перечисленными выше методами. Критерием качества модели является величина ошибки модели при описании реального

Таблица 1

Сравнительная характеристика результатов ретро-прогнозов среднегодовых температур (°C) в районе г. Якутска

Метод	2000		Ошибка, %	2001		Ошибка, %	2002		Ошибка, %
	Фактические данные	Прогнозные данные		Фактические данные	Прогнозные данные		Фактические данные	Прогнозные данные	
Экспоненциальное сглаживание	-9,13	-9,23	1,1	-8,68	-9,12	5	-7,58	-8,4	10,8
Гармонический анализ	-9,13	-8,59	5,9	-8,68	-8,46	2,5	-7,58	-8,32	9,7
ARIMA	-9,13	-8,82	3,4	-8,68	-8,3	4,3	-7,58	-8,59	13

Таблица 2

Сравнительная характеристика результатов ретро-прогнозов количества атмосферных осадков (мм) в районе г. Якутска

Метод	2000		Ошибка, %	2001		Ошибка, %	2002		Ошибка, %
	Фактические данные	Прогнозные данные		Фактические данные	Прогнозные данные		Фактические данные	Прогнозные данные	
Экспоненциальное сглаживание	14,47	13,6	6	12,31	13,53	9	12,46	14,3	12,7
Гармонический анализ	14,47	13,7	5,3	12,31	13,06	6	12,46	13,9	11,5
ARIMA	14,47	13,8	4,6	12,31	13,15	6,8	12,46	13,7	10

климата [9]. Как видно из таблиц, прогнозные значения в целом незначительно отличаются от фактических. Ошибки прогноза показывают достаточную адекватность выбранных статистических моделей. На последнем этапе применяются различные диагностические процедуры проверки достоверности выбранной модели по имеющимся данным.

Исследование остатков, полученных после процедуры удаления тренда и циклической составляющей, показывает, что плотность распределения остатков успешно аппроксимируется нормальным законом распределения, что является признаком адекватности построенной модели прогноза.

Заключение

Анализ проводился в сравнении с результатами оценок точности из трех статистических моделей. Метод экспоненциального сглаживания показывает лучший результат при прогнозировании на более короткий срок (первый год прогнозирования), и худший результат при прогнозировании на более длительный срок времени (третий год). Метод гармонического анализа показывает худший результат при прогнозировании на более короткий срок (первый год), и лучший результат при прогнозировании на более длительный срок (третий год).

Потеря устойчивости криолитозоны может иметь многие неблагоприятные социальные, экономические и экологические последствия. В ближайшие несколько десятилетий изменение климата может привести к уменьшению прочностных свойств многолетнемерзлых грунтов, что, в свою очередь, вызовет уменьшение несущей способности фундаментов и повреждение или же разрушение построенных на них сооружений. Деформации и аварии трубопроводов, проходящих через вечную мерзлоту, могут сопровождаться выбросами в окружающую среду нефтепродуктов. На неосвоенных участках криолитозоны могут развиваться деструктивные геоморфологические процессы, вызывая просадки грунта и значительно изменяя северные ландшафты.

Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в росте

повторяемости опасных гидрометеорологических явлений, и в увеличении неблагоприятных последствий, которые влияют на эффективность деятельности таких жизненно важных секторов экономики, как энергетика, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Возникающие при этом проблемы требуют незамедлительного и всестороннего изучения, поскольку они ставят под угрозу экологическую безопасность районов Крайнего Севера.

Список литературы:

1. Слепцов О. И., Левин А. И., Стручкова Г. П., Семенова Т. И. Безопасность РС(Я): социальные, экономические и техногенные проблемы / Под ред. В. Ю. Фридовского, В. А. Прохорова. Новосибирск: Наука, 2008. 296 с.
2. Стручкова Г. П., Капитонова Т. А., Тарская Л. Е., Ефремов П. В. Мониторинг сложных технических систем в условиях криолитозоны // Труды Евразийского симпозиума по проблемам надежности материалов и машин для регионов холодного климата // Пленарные доклады 1—3 декабря 2014 г. СПб.: Изд-во Политехнич. Ун-та. 2014. С. 312—315.
3. Стручкова Г. П., Капитонова Т. А., Левин А. И. Порядок анализа риск-факторов аварий сложных технических систем, работающих в условиях низких температур // Journal of International Scientific Publication. Ecology & Safety. 2011. Vol. 5. Part 3. P. 25—33.
4. Павлов А. В., Гравис Г. Ф. Вечная мерзлота и современный климат // Природа. 2000. № 4. С. 10—18.
5. Якорь И. С. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеониздат, 1987. Т. 1. Вып. 16. Ч. 1, 2. 595 с.
6. Павлов А. В. Мерзлотно-климатический мониторинг России: Методология, результаты наблюдений, прогноз // Криосфера Земли. 1997. № 1. С. 47—58.
7. Анисимов О. А., Нельсон Ф. Э. О применении математических моделей для исследования взаимосвязи климат—вечная мерзлота // Метеорология и гидрология. 1990. № 10. С. 13—19.
8. Анисимов О. А., Скворцов М. Ю. О применении математических моделей для исследования влияния изменения климата на вечную мерзлоту // Метеорология и гидрология. 1989. № 9. С. 98—103.
9. Шерстюков Б. Г. Оценки точности физико-математических моделей ЕСНАМ4, HadCM3 и CGCM2 по данным на территории России // Труды ГУ ВНИИГМИ-МЦД, 2010. Вып. 175. С. 3—19.
10. Шерстюков Б. Г. Оценки точности статистической модели изменений климата по данным на территории России // Труды ГУ ВНИИГМИ-МЦД, 2010. Вып. 175. С. 20—32.

T. A. Kapitonova, Scientific Secretary, e-mail. kapitonova@iptpn.ysn.ru,
V. V. Timofeeva, Leading Engineer, **G. P. Struchkova**, Leading Researcher, Institute of Physical and Technical Problems of the North named after V. P. Larionova of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk

Forecast of Changes in Time Series Dynamics Climatic Norms near the City of Yakutsk

The nature and consequences of the interaction of technical systems with permafrost soils are rapidly changing under the influence of any natural or man-made processes. This is especially true for the increase in air temperature. It is known that the increase in temperature causes an increase in the depth of seasonal thawing, increases the defrost process, which leads to a change in the properties of permafrost, and with high icy soils can cause a loss of their bearing capacity, which in turn can be dangerous for technical systems built in this area. One of the methods of probabilistic and statistical apparatus, which is applicable to predict changes in climate indicators is the method of time series analysis. In this article the following specific tasks are considered: methodical approaches to the analysis of long-term temperature series and identification of structural components of a time series for construction of analytical and prognostic models, on the basis of the probabilistic and statistical device models for forecasting of changes of climatic indicators are received, the modern trend of change of average annual temperatures is defined. The time series of climatic parameters from 1891 to 1999 are used for modeling and on their basis the numerical retro-forecast of change of average annual air temperatures is made.

Keywords: climatic changes, air temperatures, precipitation, technical systems, permafrost, statistical modeling, forecasting.

References

1. **Sleptsov O. I., Levin A. I., Struchkova G. P., Semenova T. I.** Bezopasnost' RS(YA): sotsial'nyye, ekonomicheskiye i tekhnogennyye problemy. Pod redaktsiyey V. Yu. Fridovskogo, V. A. Prokhorova. Novosibirsk: Nauka, 2008. 296 p.
2. **Struchkova G. P., Kapitonova T. A., Tarskaya L. Ye., Efremov P. V.** Monitoring slozhnykh tekhnicheskikh sistem v usloviyakh kriolitozony. *Trudy Yevraziyskogo simpoziuma po problemam nadezhnosti materialov i mashin dlya regionov kholodnogo klimata. Plenarnyye doklady 1–3 dekabrya.* 2014 g. — Saint-Petersburg: Izdatelstvo Politekhnikeskogo Universiteta. 2014. P 312–315.
3. **Struchkova G. P., Kapitonova T. A., Levin A. I.** Poryadok analiza risk-faktorov avariyy slozhnykh tekhnicheskikh sistem, rabotayushchikh v usloviyakh nizkikh temperatur. *Journal of International Scientific Publication. Ecology & Safety.* 2011. Vol. 5. Part 3. P 25–33.
4. **Pavlov A. V., Gravis G. F.** Vechnaya merzlota i sovremennyy klimat. *Priroda*, 2000, No. 4. P 10–18.
5. **Yakor' I. S.** Mnogoletniye dannyye o rezhime i resursakh poverkhnostnykh vod sushi. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1987. Vol. 1. Iss. 16. Part. 1, 2. 595 p.
6. **Pavlov A. V.** Merzlotno-klimaticheskii monitoring Rossii: Metodologiya, rezul'taty nablyudeniyy, prognoz. *Kriosfera Zemli.* 1997. No. 1. P. 47–58.
7. **Anisimov O. A., Nel'son F. E.** O primeneniі matematicheskikh modeley dlya issledovaniya vzaimosvyazi klimat-vechnaya merzlota. *Meteorologiya i gidrologiya.* 1990. No. 10. P 13–19.
8. **Anisimov O. A., Skvortsov M. Yu.** O primeneniі matematicheskikh modeley dlya issledovaniya vliyaniya izmeneniya klimata na vechnuyu merzlota. *Meteorologiya i gidrologiya.* 1989. No. 9. P. 98–103.
9. **Sherstyukov B. G.** Otsenki tochnosti fiziko-matematicheskikh modeley ECHAM4, HadCM3 i CGCM2 po dannym na territorii Rossii // *Trudy GU VNIIGMI-MTSD.* 2010. Iss. 175. P 3–19.
10. **Sherstyukov B. G.** Otsenki tochnosti statisticheskoy modeli izmeneniya klimata po dannym na territorii Rossii. *Trudy GU VNIIGMI-MTSD.* 2010. Iss. 175. P 20–32.