Результаты. Приверженность пациентов к терапии статинами через 12 мес. после КС составила 53,6% для 1-й группы, 55,8% для 2-й группы и 24,4% для 3-й группы ($p < 0,05$ для 3-й группы по сравнению с 1-й и 2-й группами). В 1-й группе — 26,9/36,5/31,7/37,4/41,3% пациентов достигли целевого уровня ХС ЛПНП исходно/1 мес/3 мес/6 мес/12 мес соответственно. Во 2-й группе — 35,8/36,8/40,0/51,6/57,9% соответственно. В 3-й группе — 25,5/28,2% пациентов достигли целевого уровня ЛПНП исходно/через 12 мес, соответственно ($p < 0,05$ относительно исходного уровня). Значимое снижение концентрации ХС ЛПНП между исходным уровнем и через 12 мес наблюдалось в 1-й и 2-й группах ($p < 0,05$). В 3-й группе различий не наблюдалось.

Выводы. Различий в приверженности к терапии статинами, достижении целевого уровня ХС ЛПНП у пациентов, находящихся под непосредственным наблюдением кардиолога и пациентов, находящихся под дистанционным наблюдением, не выявлено. Дистанционное мониторинг является безопасным методом повышения приверженности к терапии статинами у пациентов, перенесших КС.

107 ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Рустамов Б.Е., Иошина В.И., Камардинов Д.Х., Рахимов А.З., Сонгуров Р.П., Алимов В.П., Бузиашивили Ю.И.

ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Эпидемический характер роста хронической сердечной недостаточности превращается в одну из глобальных социальных медико-экономических проблем.

Цель исследования. Обсудить эффективность/целесообразность реваскуляризации миокарда и принципы индивидуального подхода к выбору лечебной стратегии у пациентов с ишемической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ).

Материал и методы. Формирование концепции гипернатрии миокарда, как обратимой формы ишемической дисфункции, и утонченность современных техник восстановления коронарного кровотока привели к необходимости решения крайне важного вопроса о роли коронарной реваскуляризации в лечении таких пациентов. Эту миссию взял на себя крупномасштабный проект STICH. Опубликованные результаты 5-летнего наблюдения, не подтвердившие преимуществ АКШ в сочетании с оптимальной медикаментозной терапией (ОМТ) по отношению к монотерапии ОМТ, во многом оказались неожиданными и вступили в противоречие с мировым практическим опытом и пониманием патофизиологии, что серьезно обострило уже имевшиеся разногласия. Значимые преимущества АКШ+ОМТ получили доказательства при 10-летнем периоде наблюдения (STICHES). А каково место чрескожных вмешательств (ЧКВ) у этой категории больных? К сожалению, целевых рандомизированных исследований по этому вопросу не представлено. Но, согласно нескольким проспективным и наблюдательным исследованиям,

ЧКВ продемонстрировало эффективность при определенных клинических условиях (полная реваскуляризация, наличие диабета, пожилой возраст). Экстраполирование данных исследовательской программы в реальные условия ведения конкретного пациента зачастую вызывает существенные затруднения, и на сегодняшний день вопрос выбора оптимальной лечебной стратегии остается сложной практической задачей. Для ее успешного решения в контексте индивидуального подхода необходимо соблюдение балансов: 1) польза/риск реваскуляризации; 2) «за»/«против» АКШ/ЧКВ; 3) польза/риск/прогноз реваскуляризации с учетом клинического профиля каждого пациента (возраст, общее состояние здоровья, выраженность проявлений ИБС, функциональное состояние и объемные характеристики миокарда, идентификация жизнеспособного миокарда и перспектив его восстановления, тяжесть поражения коронарного русла, предполагаемая продолжительность жизни).

Выводы. Реваскуляризация миокарда у пациентов с ишемической дисфункцией ЛЖ показана (класс I; уровень доказанности В) с АКШ в качестве предпочтительного метода (класс I; уровень доказанности В) и ЧКВ в качестве альтернативного (класс IIa; уровень доказанности С); ОМТ служит эффективным базовым компонентом лечения. Принятие решения осуществляется на основании стратификации риска и оценки ближайших и отдаленных перспектив.

108 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Спицина С.С.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского», Волгоград, Россия;

ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России, Волгоград, Россия

Введение. В настоящее время уделяется внимание не только увеличению продолжительности жизни, но и повышению качества жизни (КЖ) пожилых больных ишемической болезнью сердца (ИБС). КЖ может использоваться для оценки эффективности различных методов лечения и реабилитации, определения степени тяжести состояния больных и прогноза заболеваний.

Цель исследования. Оценить качество жизни пожилых пациентов со стабильной стенокардией при помощи «болезнь—специфических» опросников.

Материал и методы. В исследование были включены 15 амбулаторных пациентов в возрасте от 60 до 75 лет кардиологического профиля (50% женщин, 50% мужчин). Критерием исключения были заболевания, которые могли бы отягощать течение основного заболевания (сахарный диабет, декомпенсация патологий почек и печени и др.). Для оценки КЖ больных со стабильной стенокардией использовались Сиэтлский опросник (Seattle Angina Questionnaire, SAQ) и опросник HeartQoL (The New European Questionnaire for Assessment of Quality of Life of Patients With Ischemic Heart Disease).

Результаты. У всех включенных пациентов был верифицирован диагноз «ИБС. Стенокардия напряжения».

У 80% больных имелись признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН) I—IIб стадий. Средний возраст составил $62,8 \pm 5,1$ лет. Суммарный показатель по опроснику HeartQoL составил $21,1 \pm 10,3$ балла, что соответствует сниженным показателям КЖ. При этом наихудшие показатели отмечались у больных ИБС в сочетании с ХСН. У пациентов со стабильной стенокардией согласно опроснику SAQ результаты по шкале ограничения физических нагрузок (PL) составили 52,2%, по шкале стабильности приступов (AS) — 43,8%, по шкале частоты приступов (AF) — 59,1%, по шкале удовлетворенности лечением (TS) — 75,7%, по шкале отношения к болезни (DP) — 34,9%. Самые выраженные изменения были связаны с нестабильностью приступов стенокардии, сниженной толерантностью к физическим нагрузкам, а также с негативным отношением к болезни, что может быть связано с развитием тревожно-депрессивного синдрома. При этом была отмечена высокая удовлетворенность лечением, что свидетельствует об эффективности проводимой терапии.

Выводы. С помощью «болезнь-специфических» опросников было выявлено снижение качества жизни пожилых пациентов со стабильной стенокардией, особенно в сочетании с ХСН. Комплексный анализ динамики параметров КЖ на фоне проводимых лечебных мероприятий позволяет адекватно и своевременно оценивать происходящие изменения в состоянии пациента.

109 ЛИПОПРОТЕИД(А), НЕРУТИННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ И КЛАССИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И РАННЯЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У МУЖЧИН

Тюрина А.В., Афанасьева О.И., Клесарева Е.А.,
Ежов М.В., Покровский С.Н.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Известна роль липопротеида(а) (Лп(а)), как ключевого фактора резидуального риска сердечно-сосуди-

стых осложнений. Имеются данные о преимуществе холестерина (ХС), не связанного с липопротеидами высокой плотности (ХС неЛВП), перед холестерином липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) в качестве независимого липидного фактора сердечно-сосудистого риска. При этом среди больных с ранней манифестацией ишемической болезни сердца (ИБС) частота классических факторов риска, гиперлипипропротеидемии(а) и ХС неЛВП недостаточно исследована.

Цель исследования. Изучить частоту классических факторов риска, высокого уровня ХС неЛВП и гиперлипипропротеидемии(а) у мужчин с ранней манифестацией ИБС.

Материал и методы. В исследование включили 210 мужчин (средний возраст 59 ± 9 лет), проходивших обследование в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России. Основную группу составили 161 пациент с ИБС, возникшей в возрасте до 55 лет (возраст манифестации медиана [25%; 75%] составил 47 [42; 51] лет), и гемодинамически значимым (>50%) стенозом коронарных артерий (КА) по данным коронарной ангиографии. Группа контроля — 49 пациентов без ИБС и атеросклероза КА. У всех пациентов определены классические факторы риска и измерены: липидный профиль, Лп(а), рассчитаны ХС неЛВП, ХС ЛНП (по формуле Мартина—Хопкинса), скорректированный ХС ЛНП, учитывающий ХС в составе Лп(а).

Результаты. Группы не различались по основным факторам риска за исключением курения, общего ХС, ХС ЛНП (см. таблицу). Пациенты основной группы имели достоверно более высокий исходный уровень ХС неЛВП ($p < 0,01$), концентрации Лп(а) медиана 34 [11; 82] мг/дл против 11 [5; 30] мг/дл ($p < 0,01$). Концентрация Лп(а) >30 мг/дл увеличивает шансы развития ранней манифестации ИБС в 2,7 раза (ОШ 2,75; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,2—6,1; $p < 0,02$). Высокие концентрации ХС неЛВП ассоциируются с риском ранней ИБС (ОШ 1,2; 95% ДИ 1,03—1,5; $p < 0,01$).

Выводы. Гиперлипипропротеидемия(а) и ХС неЛВП ассоциированы с ранней манифестацией ИБС вне зависимости от других факторов риска.

Таблица. Общая характеристика обследованных пациентов.

	Основная группа <i>n</i> =161	Контроль <i>n</i> =49	<i>p</i> -value	ОШ
Возраст, лет	58 [52; 64]	61 [55; 67]		
Ожирение, <i>n</i> (%)	78 (48%)	21 (49%)	0,5	1,2
Гипертоническая болезнь, <i>n</i> (%)	134 (83%)	35 (71%)	0,06	2
Курение, <i>n</i> (%)	110 (68%)	24 (49%)	0,048	2,25
Наследственность, <i>n</i> (%)	49 (30%)	12 (25%)	0,3	1,34
Сахарный диабет, <i>n</i> (%)	48 (30%)	9 (18%)	0,1	1,9
Общий холестерин, ммоль/л	$7,8 \pm 2,7$	$6,3 \pm 2,3$	0,001	
ХС ЛНП, ммоль/л	$6 \pm 2,6$	$4,5 \pm 2,3$	0,0001	
ХС ЛНП корр., ммоль/л	$5,6 \pm 2,5$	$4,3 \pm 2,2$	0,001	
ХС ЛВП, ммоль/л	$1,13 \pm 0,3$	$1,2 \pm 0,3$	0,07	
Триглицериды, ммоль/л	$1,92 \pm 1,86$	$1,83 \pm 1$	0,7	
ХС неЛВП, ммоль/л	6,3 [6; 7]	4,7 [4; 5]	0,0001	
Лп(а), мг/дл	33,5 [11; 82]	11 [5; 30]	0,0001	
Лп(а) >30 мг/дл	81(50%)	11 (22%)	0,001	3,5

Примечание. Данные представлены как $M \pm SD$, где *M* — среднее, *SD* — стандартное отклонение, *n* (%), медианы [интерквартильный интервал].