7. Комисарова, Н.Ю. Технология приготовления и рецептуры рыбных колбас, сосисок и ветчин / Н.Ю. Комисарова // Обработка рыбы и морепродуктов. Научно-технический реферативный сборник. – М. – 1977. – №12. – С. 3 – 4.
8. Отчет по научно-исследовательской работе к договору № -16/БиРХ «Исследование полуфабрикатов рыбных изделий на токсикологическую безопасность». Научная работа выполнена на базе ООО «ИДАС-КЛИН». Научный руководитель - к.т.н., доцент МГУТУ им. К.Г.Разумовского С.Н. Дмитриева стр. 35
9. Отчет по научно-исследовательской работе к договору № 06-18/БиРХ «Формирование экологически безопасных отходов продукции из рыбного сырья с учетом модернизации производства». Научная работа выполнена на базе ООО «ИДАС-КЛИН». Научный руководитель - к.т.н., доцент МГУТУ им. К.Г.Разумовского С.Н. Дмитриева стр. 38
10. Романенко А.И., Головачева Н.А Исследование процесса замораживания сырья морского происхождения при его криообработке // Дельта науки. – 2019. – № 2. – С. 77-79.
11. Фатыхов Ю.А. Современный подход к разработке ресурсосберегающего разделочно-филетировочного оборудования // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2007. – № 3 (298). – С. 91-94.

Каскулова Д.З.

**Дефекты и болезни молочных зубов у детей. Виды и профилактика
патологических состояний**

*Кабардино-Балкарского госуниверситета
(Россия, Нальчик)*

doi: 10.18411/lj-07-2020-09

idsp: ljjournal-07-2020-09

Аннотация

Проблемы с зубами широко распространены среди детей с самого раннего возраста. Родителям важно позаботиться о профилактике стоматологических заболеваний и изучить все признаки их развития, чтобы вовремя диагностировать недуг и принять соответствующие меры.

Ключевые слова: кариес, пульпит, гипоплазия, наркоз, пломбирование

Abstract

The problems with the teeth are wide -spread among children with the early age. Parents should take care about the prevention of the dental diseases and study all the signs of their development to diagnose the problem in time and take the proper measures.

Key words: Caries, pulpitis, hypoplasia, anesthesia, filling

Рот новорожденного абсолютно свободен от микробов. Последние начинают активность несколько позже, когда оказываются переданы малышу родителями во время поцелуев или ввиду использования общих столовых принадлежностей. Когда у малыша появляются зубки, родителям следует позаботиться об их очищении. Но даже своевременное начало дружбы ребенка с зубной щеткой не является гарантией полного здоровья его зубов. Ничего удивительного в этом нет: ежедневно зубы ребенка контактируют с кислотами, вызывающими их разрушение. Если вовремя не обратить внимания на наличие проблем с молочными зубками, ребенок может стать заложником более серьезных, нежели кариес, заболеваний.

Основная причина появления стоматологических проблем в детском возрасте – неудовлетворительный уход за зубками ребенка. Многие родители осуществляют несвоевременную покупку детской зубной щетки, ссылаясь на малую в ней необходимость. Это приводит к нарушению правил гигиены ротовой полости, ввиду чего возникает зубной налет и соответствующие отложения.

Нередко между основными приемами пищи родители позволяют детям употреблять сладости. Безобидные на первый взгляд конфетки вполне могут привести к проблемам стоматологического характера.

Если ребенок регулярно использует столовые приборы родителей, зубы которых поражены кариесом, в какой-то момент нарушение может проявиться и у него. Многие родители даже не подозревают, что, будучи носителями кариозной инфекции, заражают свое чадо.

Не стоит исключать и наследственный фактор. Вполне вероятно, что болезни зубов очень распространены среди родственников ребенка, и тогда ему будет сложно избежать похожей неприятности. Состав слюны в этом смысле также играет немалую роль.

Основные болезни молочных зубов

Кариес

Пожалуй, большинство взрослых отнесет к этой группе исключительно известный всем кариес. На самом деле, пульпит является не менее популярным заболеванием, как и гипоплазия эмали.

Кариес молочных зубов проявляется в виде белых пятен, располагающихся вдоль линии передних зубов верхнего ряда. При несвоевременной диагностике болезнь будет прогрессировать, что выражается в смене цвета пятен (из белого переходит в коричневый). Согласно утверждениям детских стоматологов, перерождение занимает минимум времени.

Кариес молочных зубов может проявляться следующим образом:

зубная боль; дискомфорт при употреблении горячих и холодных продуктов; плохой аппетит; не эстетический внешний вид эмали. В дальнейшем, при условии отсутствия реакции на развитие кариеса, у ребенка могут отмечаться проблемы с речью и плохой сон, что определяется постоянным дискомфортом.

Пульпит

Заболевание начинает развиваться при запущенном кариесе, то есть разрушении костной ткани зуба и проникновении микробов в его пульпу. С обращением к доктору медлить нельзя. Дело в том, что пораженный заболеванием молочный зуб вполне может выпасть до того момента, когда процесс будет считаться нормой [1,45].

Гипоплазия эмали

Данное заболевание характеризуется уменьшением нормального количества эмали на зубе. Недостаток эмали приводит к образованию на поверхности зуба небольших вмятин. Если медлить с устранением дефекта, вскоре поверхность зуба может стать слишком грубой, а сам зуб будет выглядеть деформированным.

Как проводить диагностику

В запущенной стадии стоматологические болезни молочных зубов видно невооруженным глазом.

Если кариес находится в начальной стадии, выявление выполняется при помощи специфического раствора синего цвета. Состав наносится на просушенные посредством тампона зубы ребенка. Если эмаль в норме, окрашивания не произойдет. В ином случае кариозные места меняют цвет.

Нередко родители мотивируют отказ от осмотра зубов ребенка стоматологом, даже при явном их поражении, тем, что вскоре молочные зубы сменятся коренными. На самом деле, очень важно производить лечение, так как инфицирование молочных зубов может привести к затруднению роста коренных, а также стать толчком к ОРЗ, тонзиллиту, ларингиту и фарингиту.

Сегодня стоматология предлагает достаточно методов лечения молочных зубов. К щадящим вариантам специалисты прибегают на начальных стадиях поражения. Таковые легко переносятся каждым ребенком, направлены на прекращение патологического процесса [2,74].

Одна из популярных на сегодня методик – серебрение (нанесение на эмаль зуба нитрата серебра). Ввиду покрытия зуба своеобразной пленкой кариес останавливает свою активность. Результат после процедуры сохраняется не менее полугода. К сожалению, при нанесении серебра зубки приобретают темный цвет, оставаясь такими до смены на постоянные.

Аналог серебрения – озонирование. В этом случае на эмаль наносится озон, способствующий избавлению от инфекции. При этом зубы не становятся черными.

Щадящий метод борьбы с кариесом – покрытие их поверхности фтор-лаком. Способ рационален при первых симптомах заболевания. Фтор-лак надежно защищает зубы от негативных воздействий, а также способствует уменьшению пораженной поверхности. Эффект от процедуры редко сохраняется около пяти месяцев.

Лечить зубы при помощи известной всем бормашины – настоящее испытание для детей. При этом не каждый ребенок сумеет стойко перенести процедуру. И все же, иногда это лучший выход. Разрушенные ткани зуба в таком случае удаляются, а затем зуб покрывается специальным составом. Если возникнет необходимость, стоматолог может произвести пломбирование [3,77].

Если ребенок нуждается в лечении пульпита, применяется препарирование с последующим пломбированием. Процедура не занимает много времени. Если возникает необходимость в удалении пульпы, доктор может порекомендовать ребенку местное обезболивание.

Зубные проблемы и наркоз

В определенных случаях врачи-стоматологи рекомендуют выполнять процедуры под общим наркозом, что позволит произвести быстрое и качественное лечение пораженных зубов, сохранив при этом спокойствие ребенка.

Оправдана ли такая методика лечения? В некоторых случаях бесспорно. Следует отметить, что наркоз заключается в ингаляционной анестезии, которая является совершенно безопасной для здоровья ребенка.

Гипоплазия эмали молочных зубов

Зачатки молочных зубов у ребенка формируются еще в период внутриутробного роста и развития. На их здоровье влияет много факторов: питание женщины во время беременности, функционирование сердечно-сосудистой системы плода, прием лекарственных средств и синтетических витаминных комплексов.

Молочные зубы, как и коренные, состоят из цемента, дентина, зубной коронки, пульпы, корня и эмалевого покрытия. Зубная эмаль покрывает коронку и защищает ее от проникновения патогенных бактерий и развития кариеса.

Это самая твердая ткань человеческого организма, более 90% которой составляют минеральные вещества неорганического происхождения.

Период закладки зубных зачатков

Если минеральный обмен в тканях плода по каким-то причинам нарушается, зубная эмаль истончается и не может в полной мере выполнять свои функции. Такое состояние называется гипоплазией (недоразвитие).

Определить патологию визуально можно не всегда, поэтому необходимо проходить профилактические осмотры у стоматолога регулярно. Первый раз показать ребенка специалисту необходимо после прорезывания первых зубов – в 6-8 месяцев.

Врач сможет вовремя заметить нарушения и назначит необходимое лечение, которое позволит предотвратить кариес и разрушение зубной эмали.

Гипоплазия эмали молочных зубов

Примерно у 60% детей, страдающих гипоплазией эмали, причины нарушений связаны с патологическим течением беременности или пороками развития плода в эмбриональном периоде.

Если женщина во время беременности перенесла тяжелые инфекционные болезни, риск неправильного формирования зубных зачатков будет выше, чем у женщин, у которых беременность протекает без отклонений. Особенно опасны во время беременности так называемые детские болезни — корь, ветряная оспа, краснуха.

Тяжелые последствия могут быть после перенесенного токсоплазмоза — паразитарной инфекции, при которой поражаются все жизненно важные органы и системы матери и ребенка: печень, легкие, мышечная ткань, нервные волокна, сердечная мышца и органы зрения. Основным переносчиком токсоплазмы считаются кошки, поэтому при наличии в доме животных необходимо регулярно показывать их ветеринару, раз в год сдавать анализы крови и мочи и делать профилактические прививки в соответствии с графиком вакцинации животных.

Причины возникновения местной гипоплазии

К другим факторам, увеличивающим вероятность недоразвития эмали, относятся: рождение раньше положенного срока и связанная с этим недоношенность (максимальные риски у детей, рожденных раньше 33-34 недель); выраженный токсикоз у матери в начале беременности и на поздних сроках беременности; родовые травмы (включая повреждения, полученные в результате наложения акушерских щипцов или применения вакуума); врожденные пороки сердечной системы или кровеносных сосудов; недостаточная лактация или состояния, приводящие к ухудшению качества грудного молока, у женщин, которые кормят грудью (курение, употребление алкоголя, прием сильнодействующих лекарств, плохое питание); гемолитическая болезнь — несовместимость крови матери и ребенка по антигенам, возникающая в результате резус-конфликта.

В большинстве случаев распознать патологию самостоятельно невозможно. Чтобы диагностика была более точной, зубы необходимо высушить при помощи потоков воздуха — так специалисту будет проще рассмотреть бороздки, ямочки и углубления, которые возникают в результате деформации и истончения эмали.

К клиническим признакам неправильного формирования эмалевого покрытия можно отнести: потемнение либо чрезмерное осветление эмали; появление пятен молочного, кремового или желтоватого оттенка, которые внешне могут напоминать начальную стадию кариеса; болезненная реакция при контакте с горячей или холодной пищей, воздухом и другими раздражающими факторами.

У ребенка может наблюдаться один из перечисленных признаков или сразу несколько симптомов — в этом случае врач ставит диагноз «смешанная гипоплазия эмали».

Виды и формы патологии

Гипоплазия у детей может появляться в трех клинических формах. Самой распространенной из них является пятнистая гипоплазия, при которой единственным симптомом имеющихся нарушений являются молочные пятна.

Если степень деминерализации достаточно высокая, пятна могут приобретать темно-желтый, бежевый или коричневый цвет и внешне напоминать ранние стадии кариеса.

На данном этапе справиться с проблемой можно при помощи минеральных аппликаций с растворами, содержащими кальций и фтористые соединения..

1. Персин Л.С., Стоматология детского возраста Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г., 240 с
2. Виноградова Т.Ф., Максимова О.П., Рогинский В.В. Стоматология детского возраста, Н. Новгород: Издательство НГМА, 2004. - 744 с.
3. О.О. Янушевич, Л.П. Кисельниковой, О.З. Топольницкий Детская стоматология . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017 -744 с.