Перспективные нефтесодержащие сланцевые толщи России

*Петрова Р.Н., студентка,
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь
E-mail: kitregina Petrova@gmail.com*

*Научный руководитель:
д.г.-м.н., Карасева Т.В.*

Сланцевые толщи, в последнее время, являются предметом пристального внимания во всем мире, образуя новую ресурсную базу углеводородов на фоне истощения традиционных источников нефти. На территории России залежи сланцевой нефти выявлены в баженовской свите Западной Сибири, доманиковой Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, майкопской серии в Предкавказье и др.

Каждая из свит является основной нефтегазопроизводящей толщей в регионах их распространения. Сложены они кремнисто-глинисто-карбонатными породами, сильно обогащенными органическим веществом и имеющие ярко выраженную сланцевую текстуру.

На сегодняшний момент добыча сланцевой нефти в России осложнена в виду того, что сланцевые толщи характеризуется отсутствием ловушки, водонефтяного контакта, аномально высоким поровым давлением и низкой проницаемостью. К ним не применимы подходы, методы и технологии, эффективно работающие при освоении традиционных ресурсов нефти. В России добыча сланцевой нефти в основном ведется попутно и в режиме естественного истощения.

Самой изученной толщей в России, содержащей сланцевые углеводороды, является баженовская свита. Как самостоятельное литостратиграфическое подразделение свита впервые была выделена Ф.Г. Гурари в 1959 году, на основе изучения глубоких скважин в Саргатском районе [1, стр. 37].

Баженовская свита (титон-берриасский возраст $J_{3t} - K_{1b}$) сложена породами углеродистыми кремнисто-глинисто-карбонатными черными с коричневатым оттенком. Площадь распространения свиты на территории Западной Сибири превышает 1 млн. км². Отложения залегают на глубине 2400-3100 м, их мощность изменяется от 10-12 до 35-40 м. Свита трансгрессивно, с несогласием, залегает на отложениях верхневасюганской подсвиты или с согласием перекрывает аргиллиты георгиевской свиты, и перекрывается глинами верхнетутлеймской подсвиты, фроловской и ахской свит.

Нефтеносные сланцы баженовской свиты представлены в основном четырьмя породообразующими компонентами [2, стр. 68]:

1) глинистыми минералами (22-30% вес): гидрослюда, реже смешаннослойные образования гидрослюда-монтмориллонит, в незначительных количествах (следы) - хлорит и каолинит;

2) минералами кремнезема (35-40% вес): опал, халцедон, кварц, тридимит и кристобалит;

3) карбонатными минералами (8-52% вес): кальцит, доломит, реже сидерит, в единичных случаях - анкерит;

4) органическое вещество (10-12% вес), которое в большинстве случаев представлено гелефицированным бесструктурным веществом различного цвета (с равномерным или микрослоистым его распределением в породе), ОВ относится к гумусо-сапропелевому типу.

Также представлены обломочные минералы - кварц и полевые шпаты (обычно 3-5%) и, в незначительных количествах, другие минералы: целестин, барит, фосфаты и гипс (спорадически). Кроме того, повсеместно присутствует пирит, содержание которого обычно составляет около 5%.

За полувековой период изучения баженовской свиты, выявлены нефтепроявления на десятках площадей. Введены в эксплуатацию опытные участки Салымского, Правдинского, Галяновского и Средне-Назымского и других месторождений. Нефти баженовской свиты, как правило, легкие, плотностью от 0,811 до 0,866 г/см³, малосернистые, количество серы не превышает пределов 0,11-0,60%, в отдельных случаях достигает 1%. Количество смол меняется от 0,12 до 8,3, асфальтенов от 0 до 7%, твердых парафинов 0,89-3,92%. Вязкость изменяется от 0,4 до 5,5 МПа*с. Ежегодно добывается около 800 тыс. т нефти из отложений баженовской свиты. По данным Международного энергетического агентства, она оценена как наиболее богатая сланцевая толща в мире – 60-140 млрд. т. нефти.

На территории России, второй по значимости, нефтематеринской формацией морского генезиса является доманиковая свита Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинции. Доманиковые отложения имеют позднедевонско-раннекаменноугольный возраст (D_{3fr}–C_{1t}). Свита широко распространена в пределах Восточно-Европейской платформы, на севере от широты Полярного Урала до Южного Урала на юге. Площадь распространения доманиковой свиты превышает 300 тыс. км².

В стратотипе доманиковый горизонт сложен битуминозными, кремнисто-карбонатными породами, с примесью глинистого материала до 30%. Породы черные, темно-коричневые за счет высокого содержания битуминозного органического вещества до 18,7%, преимущественно высококремнистые от 10 до 30% и высококарбонатные 40-85%. Отложения свиты залегают на глубине 1800-3500 м, их мощность изменяется от 14 до 50 м. В доманике Волго-Уральской и Тимано-Печорской НГП выявлено свыше 20 месторождений нефти. Ее притоки составили от 15 до 120 тонн в сутки. Это доказанная высокопродуктивная, нефтегазоматеринская толща, которая генерировала нефть и газ для большинства залежей в карбонатных постройках Тимано-Печорского и Волго-Уральского нефтегазоносных бассейнов.

Так же весьма перспективной является нижнемайкопская серия Предкавказья, включающая хадумскую свиту и баталпашинскую свиты. Почти на всей территории Предкавказья развита хадумская нефтегазоматеринская свита (ранне-среднеолигоценный возраст Р_{1-2hd}). Это самая нижняя часть майкопской серии. Площадь ее распространения составляет около 200 тыс. км². Свита сложена преимущественно глинами с прослоями мергелей (до известняков) и алевролитов. Мощность отложений варьирует от 25 до 90 м, в среднем составляя 50 м. Диапазон концентрации Сорг изменяется от 0,25 до 9,82 м среднее содержание 2,02 % [3, стр. 23].

Формация баталпашинская широко распространена в Западно-Кубанском и Терско-Каспийском передовых прогибах Северного Предкавказья. Имеет палеогеновый олигоценный возраст. Небольшие залежи нефти присутствуют в кремнисто-глинистых

отложениях нижней половины разреза баталпашинской свиты. Толщина изменяется от 20 до 150 м.

Источником майкопских нефтей, в Терско-Каспийском прогибе, служит смешанный тип исходного органического вещества. Его накопление происходило в мелководно-морских восстановительных обстановках. Состав нефтей сформирован за счёт захоронения главным образом остатков низших морских организмов и, в большей или меньшей степени, при участии континентального органического материала. Содержание Сорг изменяется от 0,12 до 8,46%, при среднем содержании 3,1%. Катагенетическая зрелость нефтей оценивается на уровне МК2.

Региональная нефтегазоносность майкопских отложений установлена в пределах Терско-Каспийского передового прогиба и Восточного Предкавказья. Нефтяные залежи открыты на Моздокской, Советской, Бенойской, Шамхал-Булакской, Карабулак Ачалукской и Берикейской площадях. Для нефтей хадумской и баталпашинской свит характерны повышенная плотность от 0,84 до 0,89 г/см. Это обусловлено наличием смолисто-асфальтеновых компонентов и твердых парафинистых веществ. Содержание смол составляет 7,3-8,8%, асфальтенов – 1,03-1,52%, серы - 0,12-0,22%, парафинов 8-11%.

Так же, на территории Предкавказья, в широкой полосе между Северным Предкавказьем и Черным, и Каспийским морями распространена кумская свита палеогенового среднеэоценового возраста. Она сложена аргиллитами с песчано-алевритовыми и мергелевыми прослоями. Толщина кумской свиты изменяется от 20 до 700 м. Для восточной части Западно-Кубанского прогиба характерны битуминозные мергели. По данным пиролитических исследований содержание органического углерода в породах кумской свиты, в аргиллитах изменяется от 0,36 до 8,07%, а в алевролитах от 0,52 до 2,03%.

Суммируя вышесказанное, на территории Россия широко распространены сланцевые толщи, которые представляют собой высокоперспективные объекты для поиска и добычи нефти. Колоссальные ресурсы сланцевой нефти приходятся на баженовскую свиту Западной Сибири. Однако, проблема изучения и освоения нефти сланцевых формации относится к числу сложных, наукоемких. Несмотря на многочисленные публикации, освещающие отдельные аспекты изучения потенциалов углеводородов сланцевых толщ России, в настоящее время отсутствуют системные подходы к комплексному геологическому и технологическому решению данной проблемы.

Список литературы:

1. Гурари Ф.Г. Геология и перспективы нефтегазоносности Обь-Иртышского междуречья // Тр.СНИИГИМС-Л.: Гостоптехиздат, 1959 - вып.3 - 174 с.
2. Сонич В.П. Перспективы разработки отложений баженовской свиты на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз», 250 с.
3. Цветков Л.Д., Цветкова Н.Л. Сланцевые углеводороды. Библиографический обзор. - Ярославль: НПЦ «Недра», 2012, 297 с.