- modulation in cardiac surgery: case series. *Fundamental and clinical medicine*. 2018; 3 (4): P 51–59. (In Russ.)] doi: 10.23946/2500-0764-2018-3-4-51-59.
15. Кудрявцев А.Н., Кулабухов В.В., Чижов А.Г. Выбор режима гемофильтрации при сепсисе // *Общая реаниматология*. – 2016. – Т.12, № 2. – С. 43-55 [Kudryavtsev A.N., Kulabukhov V.V., Chizhov A.G. The Selection Of Hemofiltration Regimen In Sepsis. *General Reanimatology*. 2016;12(2): 43-55. (In Russ.)] doi: 10.15360/1813-9779-2016-2-43-55.
 16. Australia and New Zealand Extracorporeal Membrane Oxygenation (ANZ ECMO) Influenza Investigators, Davies A, Jones D, Bailey M, Beca J, Bellomo R, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for 2009 Influenza A(H1N1) Acute Respiratory Distress Syndrome. *JAMA*. 2009 Nov 4;302(17):1888-95. doi: 10.1001/jama.2009.1535.
 17. Alshahrani MS, Sindi A, Alshamsi F, Al-Omari A, El Tahan M, Alahmadi B, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for severe Middle East respiratory syndrome coronavirus. *Ann Intensive Care*. 2018 Jan 10; 8(1): 3. doi: 10.1186/s13613-017-0350-x.
 18. “Clinical management of COVID-19 interim guidance”. World Health Organization. May 27, 2020. [https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected](https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected) (дата обращения 15.07.2020)
 19. Liu J., Zheng X., Tong Q., Li W., Wang B., Sutter K., et al. Overlapping and Discrete Aspects of the Pathology and Pathogenesis of the Emerging Human Pathogenic Coronaviruses SARS-CoV, MERS-CoV, and 2019-nCoV. *Med Virol*. 2020 May; 92(5): 491-494. doi: 10.1002/jmv.25709
 20. Sinha P., Matthay M.A., Calfee C.S. Is a “Cytokine Storm” Relevant to COVID-19? *JAMA Intern Med*. Published online June 30, 2020. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3313.
 21. Arabi YM, Alothman A, Balkhy HH, Al-Dawood A, AlJohani S, Al Harbi S, et al. Treatment of Middle East Respiratory Syndrome with a combination of lopinavir-ritonavir and interferon-β1b (MIRACLE trial): study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*. 2018 Jan 30; 19(1): 81. doi: 10.1186/s13063-017-2427-0.
 22. Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. *N Engl J Med*. 2020 May 7; 382(19): 1787-1799. doi: 10.1056/NEJMoa2001282.
 23. “An exploratory randomized controlled study on the efficacy and safety of lopinavir/ritonavir or arbidol treating adult patients hospitalized with mild/moderate COVID-19 (ELACOI)”. Yueping L, Zhiwei X, Weiyin L, Weiping C, Chunyan W, Yujuan G, et al. *medRxiv*. April 15, 2020. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.19.20038984v2>; doi: 10.1101/2020.03.19.20038984 (дата обращения 15.07.2020)
 24. Duan K, Liu B, Li C, Zhang H, Yu T, Qu J, et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2020 Apr 28;117(17):9490-9496. doi: 10.1073/pnas.2004168117.
 25. Shen C, Wang Z, Zhao F, Yang Y, Li J, Yuan J, et al. Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma. *JAMA*. 2020 Mar 27;323(16):1582–9. doi: 10.1001/jama.2020.4783.
 26. Fischer JC, Zänker K, van Griensven M, Schneider M, Kindgen-Milles D, Knoefel WT, et al. The role of passive immunization in the age of SARS-CoV-2: an update. Version 2. *Eur J Med Res*. 2020 May 13;25(1):16. doi: 10.1186/s40001-020-00414-5.
 27. Li L, Zhang W, Hu Y, Tong X, Zheng S, Yang J, et al. Effect of Convalescent Plasma Therapy on Time to Clinical Improvement in Patients With Severe and Life-threatening COVID-19: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2020 Jun 3:e 2010044. doi: 10.1001/jama.2020.10044.
 28. Epidemiology Working Group for NCIP Epidemic Response, Chinese Center for Disease Control and Prevention. [The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China]. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*. 2020 Feb 10;41(2):145-151. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.02.003.

**Карпачев А.А., Солошенко А.В., Ярош А.Л., Шевченко Е.Г., Калашникова Н.О.,
Аль Мажмай Н.М., Адель М.Ф.**

**Качество жизни больных после хирургического лечения грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы**

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(Россия, Белгород)*

doi: 10.18411/scienceconf-03-2021-08

idsp: scienceconf-03-2021-08

Аннотация

На сегодняшний день лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является актуальной проблемой абдоминальной хирургии. Основным способом лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является хирургический, несмотря

на высокий риск развития осложнений и рецидивов. Возврат симптомов заболевания чаще возникает в сроки от 1 года до 3 лет после первичного вмешательства. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения и изучены результаты опроса по качеству жизни пациентов после видеолапароскопической задней крурорафии, фундопликации по Ниссену, лапаротомной задней крурорафии. Среди исследуемых больных – женщин было 19 (67,86%), мужчин – 9 (32,14%). Проанализированы жалобы, имеющиеся у пациентов до операции и в послеоперационном периоде. В послеоперационном периоде у 5 больных наблюдалась дисфагия. В отдаленные сроки пациенты предъявляли жалобы на боли в эпигастрии, изжогу, отрыжку. По поводу рецидива ГПОД были оперированы 2 больных. Показатели качества жизни у мужчин после превышали значения женщин: наименьшее ограничение физической активности, влияние боли, выше способность к самообслуживанию, сопротивляемость болезням, меньше вероятность возникновения депрессии и тревожных состояний. У женщин выше способность выполнять повседневную ролевую деятельность.

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия, хирургическое лечение, качество жизни, фундопликация.

Abstract

Currently, treatment of hiatal hernia is an actual problem of abdominal surgery. The main method of treatment of hiatal hernia is surgical treatment, however there is high risk of complications and recurrences. Recurrence of symptoms of the disease often occurs between 1 year to 3 years after the primary intervention. Conducted retrospective analysis of results of surgical treatment of patients for the period 2014-2018 with estimation of results of the survey of quality of life of patients after laparoscopic posterior cruroraphy, laparoscopic Nissen fundoplication, laparotomy posterior cruroraphy. Among examined patients - there were 19 women (67.86%), 9 men (32.14%). We analyzed complaints of patients before surgery and in the postoperative period. In the postoperative period dysphagia was observed in 5 patients. In long term period, patients complained on pain in the epigastrium, heartburn, eructation. In case of recurrence of hiatal hernia two patients were operated. Quality of life indicators in men exceeded values of women: less limited physical activity, less effect of pain, higher self-service ability, higher resistance to diseases, less possibility of occurrence of depression and anxiety conditions. Women have a higher ability to perform everyday role-playing activities.

Keywords: hernia hiatal, surgical treatment, quality of life, fundoplication.

На сегодняшний день ГПОД является одним из самых распространенных заболеваний в гастроэнтерологии, занимая 3 место в структуре заболеваний органов пищеварения после язвенной и желчнокаменной болезней. ГПОД отнесено к 5 состояниям, ухудшающим качество жизни пациентов, поэтому является актуальной проблемой в абдоминальной. Консервативная терапия дает лишь временный эффект и приводит к увеличению количества хронических больных ГЭРБ и таких осложнений, как пептическая язва, кровотечение, пищевод Барретта.

Факторами риска развития ГПОД являются: слабость соединительно-тканых структур, укрепляющих пищевод в отверстии диафрагмы; повышение внутрибрюшного давления; тракция пищевода кверху при дискинезиях пищеварительного тракта и заболевания пищевода.

Основным способом лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) является хирургическая коррекция, вследствие рецидивирования заболевания после окончания приема препаратов и возможности возникновения осложнений в виде атрофии слизистой оболочки желудка на фоне приема блокаторов Н⁺ каналов. Оперативное лечение целесообразно использовать при неэффективности консервативной терапии, невозможности длительного медикаментозного лечения, развитии осложнений, сочетании ГПОД с другими заболеваниями брюшной полости, требующими хирургического вмешательства (желчнокаменная болезнь и др.), больших

размерах ГПОД в сочетании с дыхательной недостаточностью, нарушением сердечной деятельности. Однако помимо преимуществ данных операций отмечается высокое количество специфических осложнений, значительно снижающих качество жизни больных, таких как послеоперационная дисфагия и чувство переполнения желудка газом при невозможности отрыжки, так называемый синдром «gas bloat». По результатам исследования разных авторов, частота развития этих осложнений достигает 25—54% после операции Ниссена. Возврат симптомов заболевания чаще возникает в сроки от 1 года до 3 лет после первичного вмешательства. Появление большого количества оперативных методик коррекции при ГПОД так и не привело к выработке единой тактики хирургического лечения заболевания. Этим обусловлены неудовлетворительные результаты как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде.

Сведения литературных источников указывают на большую вероятность рецидивов грыж и ГЭРБ, до 42%, преимущественно после крурорафии. Вероятность рецидивов в результате пластики огромных и крупных смешанных и параэзофагеальных ГПОД остается высокой. Преобладающее число литературных источников показывает на то, что средняя частота анатомических рецидивов данных грыж составляет 25%, а у части авторов достигает до 42%. Ведущей задачей антирефлюксной хирургии желудочно-пищеводного перехода является осуществление повышения показателей качества жизни у таких пациентов.

Цель исследования. Изучить отдаленные результаты хирургического лечения и качество жизни у 28 пациентов от 1 года до 5 лет.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 28 пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Исследование качества жизни больных проводилось с помощью международного опросника общего здоровья Short Form Medical Outcomes Study (SF-36) (автор Ware J.E., 2000).

Результаты исследования и их обсуждение. Из 28 пациентов ГПОД I степени – 2 (7,14%) больных, ГПОД II степени – 16 (57,14%) и ГПОД III степени составляло 10 (35,72%) больных. Среди исследуемых больных – женщин было 19 (67,86%), мужчин – 9 (32,14%). Средний возраст исследуемых 55±4 лет. По виду проведенного хирургического вмешательства, все пациенты были разделены на две группы – больные, после выполненной видеолaparоскопической задней крурорафии (ВКР) и фундопликации по методике Ниссена (n=23, 82,15%), и больные после выполнения традиционной операции из лапаротомного доступа (ЛЗК-лапаротомная задняя крурорафия) и фундопликации по Ниссену (n=5, 17,85%) (табл.1).

Таблица 1

Распределение респондентов по характеру оперативного вмешательства

Показатель	Характер оперативного вмешательства	
	Видеолaparоскопическая задняя крурорафия.	Задняя крурорафия из лапаротомного доступа
Количество пациентов, чел	23	5
Удельный вес пациентов, %	82,15	17,85
Средний возраст пациентов, лет	52±11,1	59±9,2
Медиана возраста пациентов, лет	56	61
Количество пациентов мужчин, чел	9	0
Удельный вес пациентов мужчин, %	39,13	0
Количество пациентов женщин, чел	14	5
Удельный вес пациентов женщин, %	60,87	100

При сборе анамнеза заболевания, выяснилось, что 16 пациентов (57,14%) получали консервативную терапию, которая оказалась неэффективной, 12 пациентов (42,86%) не проходили лечения у врача-гастроэнтеролога.

При обследовании пациентов: 2 (7,14%) больных предъявляли жалобы на боли в грудной клетке, иррадиирующие в челюсть, спину, а также чувство сердцебиения и перебоев в работе сердца. Наиболее часто встречающимися жалобами являлись изжога (64,3%), отрыжка воздухом (64,3%), боль в эпигастрии (53,6%), тяжесть в эпигастрии после приема пищи (42,8%), тошнота (35,7%). Реже пациенты жаловались на затрудненное глотание (7,14%), рвоту (7,14%); жалобы на икоту, вздутие живота, одышку, кашель, перебои в работе сердца озвучивал 1 больной (3,57%). Жалоб не предъявлял 1 пациент (3,57%) (табл.2).

Таблица 2

Частота и характер выявленных симптомов у респондентов

Характер симптомов	n	%
Изжога	18	64,3
Отрыжка, в том числе и кислым	18	64,3
Боль в эпигастрии	15	53,6
Тяжесть в эпигастрии после приема пищи	12	42,8
Тошнота	10	35,7
Рвота	2	7,14
Затруднение прохождения пищи по пищеводу	2	7,14
Икота	1	3,57
Вздутие живота	1	3,57
Внепищеводные проявления	1	3,57
Отсутствие жалоб	1	3,57

По результатам обследования, наиболее часто встречающейся формой грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, являлась аксиальная грыжа – 25 больных (89,3%), параэзофагальный тип встречался в 3 случаях (10,7%). При этом выполнялись симультанные вмешательства по поводу желчнокаменной болезни у 7 (25%) больных, по поводу грыж передней брюшной стенки у 4 (14,3%) пациентов. По поводу рецидива ГПОД были оперированы 7,14 % (2) больных. Причинами операций являлись рецидив рефлюкс-эзофагита и рецидив грыжи.

Показаниями к выполнению операции были: неэффективность консервативной терапии в течение 12 нед у 16 больных (57,14%); наличие рецидива ГПОД – 2 пациента (7,14%); наличие параэзофагальной диафрагмальной грыжи – 3 пациента (10,7%); сопутствующая хирургическая патология (желчнокаменная болезнь, вентральные грыжи) – 11 больных (39,2%); внепищеводные проявления гастро-эзофагеального рефлюкса (прежде всего бронхолегочных и кардиальных) – у 2 (7,14% от общего числа операций).

Летальных исходов после оперативного вмешательства не было. Дисфагия после операции была выявлена только у 17,85 % (5/28) больных после фундопликации по Ниссену. В ближайшем послеоперационном периоде у 5 (17,85%) больных наблюдалась дисфагия функционального характера, которая купировалась самостоятельно (n=2, 7,14%) и консервативно с помощью прокинетиков (n=3, 10,7%). В отдаленные сроки 13 (46,43%) пациентов предъявляли жалобы на периодические боли в эпигастрии, жалобы на изжогу сохранялись у 6 больных (21,4%), троих пациентов (10,7%) беспокоила отрыжка, у 2 пациентов зафиксировано рецидив ГПОД (7,14%). Пациенты указывают на то, что происходит ограничение стандартных физических нагрузок (71,8%): ходьба на небольшом расстоянии, поднятие небольших весов, наклоны и приседания. В ближайшем послеоперационном периоде у 5 (17,85%) больных наблюдалась дисфагия функционального характера, которая купировалась консервативно. В отдаленные сроки 13 (46,43%) пациентов предъявляли жалобы на периодические боли в эпигастрии, жалобы на изжогу сохранялись у 6 больных (21,4%),

троих пациентов (10,7%) беспокоила отрыжка, у 2 пациентов зафиксировано рецидив ГПОД (7,14%).

С целью изучения эффективности хирургического лечения в удаленном послеоперационном периоде, было проведено исследование качества жизни больных с помощью международного опросника общего здоровья Short Form Medical Outcomes Study (SF-36) (автор Ware J.E., 2000).

Результаты обработки опросника SF-36 оценивали по восьми шкалам, отражающим физическое и психическое благополучие респондентов. Каждая из шкал оценивается определенным количеством баллов (от 0 до 100), чем выше балл, тем более высокий показатель качества жизни.

Показатели качества жизни были подсчитаны отдельно для мужчин и женщин (жен (n=19, 67,86%) и муж (n=9, 32,14%)). Практически все показатели качества жизни мужчин (за исключением RP и RE), превышали значения КЖ женщин. Это значит, что у мужчин способность к самообслуживанию, ходьбе/подъёмам, переноске тяжестей, чувство полноты сил и энергии, сопротивляемость болезням, перспектива к лечению, выше, чем у женщин. Физическое состояние мужчин в меньшей степени ограничивает выполнение физических нагрузок, влияние боли на повседневную деятельность у мужчин, выражено менее. Показатели социального функционирования у обоих полов значительно выше средних. В случае психического здоровья, его состояние у мужчин выше, чем у женщин. Это говорит о том, что у мужчин физическое и эмоциональное состояние не ограничивает социальную активность, вероятность возникновения депрессии и тревожных состояний у мужчин ниже, чем у женщин. Но при этом, у женщин способность выполнять повседневную ролевую деятельность выше, чем у мужчин, а также в меньшей мере у женщин эмоциональное состояние влияет на выполнение работы и при этом с меньшими затратами времени и с более высоким качеством выполненной работы.

Также, все респонденты (28 чел.) были разделены на 3 возрастные группы: от 34 до 44 лет (n=8), от 45 до 55 лет (n=4), от 56 до 67 лет (n=16). С повышением возраста, показатели качества жизни снижаются (табл. 4).

Таблица 4

Показатели качества жизни по опроснику sf-36 в разрезе возрастных групп

Возраст, лет	PF_s	RP_s	BP_s	GH_s	VT_s	SF_s	RE_s	MH_s
34-44	56,3	49,1	54,5	57,6	52,5	52,3	52,2	52,7
45-55	50,5	48,4	51,4	49,7	50,3	50,6	48,8	52,0
56-67	47,5	44,7	42,2	44,3	45,3	48,8	43,4	48,1

Наряду с делением респондентов по возрасту и полу, был проведен анализ качества жизни в зависимости от оперативного вмешательства: видеолaparоскопическая задняя крурорафия и задняя крурорафия из лапаротомного доступа. Из данных, представленных на таблице 5 видно, что показатели первого, превышают показатели второго. Это значит, что качество жизни в результате ВКР, превышает КЖ при хирургическом лечении из лапаротомного доступа.

Таблица 5

Показатели качества жизни по опроснику SF-36 по виду хирургического лечения

Вид хирургического вмешательства	PF_s	RP_s	BP_s	GH_s	VT_s	SF_s	RE_s	MH_s
Видеолaparоскопическая крурорафия	55,2	52,4	54,1	50,2	52,8	58,3	51,1	52,5
Крурорафия из лапаротомного доступа	46,4	48,7	50,2	42,6	45,3	52,1	49,4	50,7

Вывод. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы является состоянием, значительно ухудшающим качество жизни больных. Единственным эффективным способом лечения ГПОД, является хирургическая коррекция, но и в данном случае, риск возникновения осложнений и рецидивов остается высоким. Результаты исследования показали, что в послеоперационном периоде с повышением возраста показатели КЖ снижаются, у мужчин они несколько выше, чем у женщин.

1. Алиев С. А., Омаров О. И., Омаров И. М. 2013. Экспериментальное обоснование нового способа лечения аксиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы // Вестник новых медицинских технологий. №1.
2. Родин А. Г., Базаев А. В., Никитенко А. И. 2012. Опыт оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы //СТМ;4:89-94.
3. Черкасов Д. М. Оригинальный способ хирургического лечения больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы //Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2018. – Т. 6. – №. 2. 26-31.
4. Лищук Н.Б., Симаненков В.И., Тихонов С.В. 2017. Дифференцированная терапия «некислых» форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Терапевтический архив.;89(4):57-63.
5. Черкасов Д.М., Черкасов М.Ф., Старцев Ю.М. 2016. Современный подход к лечению осложненных грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Эндоскопическая хирургия.;22(2):14-17.
6. Никитенко А.И., Родин А.Г., Овчинников В.А. 2012. Анализ результатов эндовидеохирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Эндоскопическая хирургия;18(5):3-7.
7. Губергриц Н. Б., Лукашевич Г. М., Голубова О. А. 2012. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: современные представления о патогенезе и лечении //Современная гастроэнтерология.;(3):105-113.
8. Черноусов А.Ф. 2012. Хирургическое лечение желчнокаменной болезни, сочетанной с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы //Врач;(10)
9. Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Ветшев Ф.П. 2011. Повторные антирефлюксные операции. Вестник хирургической гастроэнтерологии.;3:4-15.
10. Галимов О.В., Ханов В.О., Мамадалиев Д.З., Сайфуллин Р.Р., Сагитдинов Р.Р. 2017. Креативная хирургия грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.;(7):30-32
11. Опарин, А. Г., Опарин, А. А., Шаповалова, О. Е., Лаврова, Н. В. 2014. Особенности качества жизни больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей железодефицитной анемией. // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. №11(182), вып.26/1.-С. 74-77.
12. K. C. Sasse. 2019. Large Hiatal Hernia Repair with Urinary Bladder Matrix Graft Reinforcement and Concomitant Sleeve Gastrectomy //JSL: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. Т. 23. – №. 1.
13. A. Lebenthal, S. D. Waterford, P.M. Fisichella. 2015. Treatment and controversies in paraesophageal hernia repair //Frontiers in surgery. Т. 2. – С. 13.
14. Herek Ozkan, Yildiran Nergül, A Surg. 2002. Massive hiatal hernia that mimics a congenital diaphragmatic hernia. An unusual presentation of hiatal hernia in childhood: report of a case Today;32(12):1072-4 Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Pamukkale University, 20100 Denizli, Turkey.
15. A Sfara, D.L. Dumitrascu. 2019. The management of hiatal hernia: an update on diagnosis and treatment. Med Pharm Rep. Oct; 92(4):321-325. doi: 10.15386/MPR-1323.

Рубцов М.С., Гейзе А.В., Кожанова А.В., Чагирев В.Н., Плотников Г.П.
Интермиттирующая заместительная почечная терапия у кардиохирургических
пациентов с нестабильной гемодинамикой

ФГБУ Национальный Медицинский исследовательский Центр хирургии им. А.В.
Вишневского Министерства Здравоохранения РФ
(Россия, Москва)

doi: 10.18411/scienceconf-03-2021-09

idsp: scienceconf-03-2021-09

Аннотация

Цель. Сравнение эффективности и безопасности различных вариантов он-лайн гемодиализации с позиции воздействия на гемодинамику и системный воспалительный ответ у кардиохирургических пациентов в критическом состоянии. Материалы и методы. Проспективное рандомизированное методом конвертов