FITOSSOCIOLOGIA EM POMARES DE MANGUEIRA IRRIGADOS POR GOTEJAMENTO E MICROASPERSÃO EM CONDIÇÕES SEMIÁRIDAS

Naasoom Luiz Santos Mesquita¹, Poliana Prates de Souza Soares¹

¹ Mestrando(a) em Fitotecnia pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Vitória da Conquista, Bahia. E-mail: nasonmesquita@yahoo.com; poliana_prates@hotmail.com.

Recebido em: 04/10/2019 – Aprovado em: 30/11/2019 – Publicado em: 15/12/2019
DOI: 10.18677/EnciBio_2019B29

RESUMO

Sistemas de irrigação pertencentes a um mesmo método podem exercer diferentes impactos sobre a ocorrência e distribuição das plantas daninhas, portanto, objetivou-se avaliar o efeito dos diferentes sistemas de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento), sobre índices fitossociológicos das plantas daninhas em duas áreas de um pomar de mangueira 'Palmer'. As coletas foram em novembro de 2017 utilizando-se o método do quadrado inventário, de forma aleatória e em caminamento zigue-zague nas respectivas áreas. Avaliou-se a massa seca (MS), frequência (F), frequência relativa (FR), densidade (D), densidade relativa (DR), dominância relativa (Dor), índice de valor de importância (IVI), importância relativa (IR) das espécies encontradas, e o índice de similaridade (SJ_{ij}) entre as áreas. No pomar de mangueira irrigado por microaspersão os maiores valores de IVI e IR foram obtidos por *Sorghum arundinaceum* (137,63; 45,88% respectivamente) e *Cyperus rotundus* (98,98; 32,99%). Já no pomar irrigado por gotejamento os maiores valores de IVI e IR foram obtidos por *Cyperus rotundus* (119,54; 39,85% respectivamente) e *Chloris barbata*, (90,51; 30,17%). A densidade total de plantas daninhas foi semelhante entre as áreas, e o índice de similaridade, baixo (27,27%). Estes resultados sugerem que os sistemas de irrigação avaliados influenciaram a ocorrência de diferentes espécies de plantas daninhas nas áreas em estudo, o que pode implicar em diferentes estratégias de manejo dessas plantas a depender do sistema de irrigação utilizado.

PALAVRAS-CHAVE: irrigação, *Mangifera indica* L., plantas daninhas.

PHYTOSOCIOLOGY IN HOSE ORCHARDS IRRIGATED BY DRIP AND MICRO SPRINKLER IN SEMI-ARID CONDITIONS

ABSTRACT

Different irrigation systems may influence the occurrence and distribution of weeds. Therefore, the objective of this study was to evaluate the influence of different irrigation systems (micro sprinkler and drip) on weed phytosociological indexes in two areas of a mango orchard 'Palmer'. Samplings were performed in November 2017, using the inventory square method. The quadrat measured 0.4 m x 0.4 m and was randomly thrown on the field in zigzag. The following data were assessed: dry matter (DM), frequency (F), relative frequency (RF), density (D), relative density (RD),

relative dominance (Dr), importance value index (IVI), relative importance (RI), and similarity index (SJ_{ij}). At the mango orchard irrigated by micro-sprinklers, *Sorghum arundinaceum* and *Cyperus rotundus* exhibited the highest values of IVI and RI, 137.63, 45.88% and 98.98 and 32.99%, respectively. As for the orchard irrigated by dripping, the highest values of IVI and RI were observed in *Cyperus rotundus* and *Chloris barbata*, 119.54 and 39.85%, and 90.51 and 30.15%, respectively. The total weed density was similar between the areas, and the similarity index was low (27.27%). These results suggest that the irrigation systems evaluated influenced the occurrence of different weed species in the study areas, which may imply different management strategies depending on the irrigation system used.

KEYWORDS: irrigation, *Mangifera indica* L., weeds.

INTRODUÇÃO

A fruticultura se destaca no cenário produtivo na região semiárida e a mangueira se insere entre as principais fruteiras cultivadas, principalmente quanto à exportação de frutas frescas, sendo em 2017 a segunda fruta mais exportada em volume pelo Brasil, com ampliação do embarque de 16,5%, em relação ao ano anterior, enviando 179 mil toneladas e sendo a primeira em receita gerada (US\$ 205,00 milhões) (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2018).

A irrigação é uma técnica indispensável para o desenvolvimento da fruticultura nas regiões semiáridas, sendo a irrigação localizada (gotejamento e microaspersão) o método mais indicado para cultivo de fruteiras nesta região, uma vez que pode proporcionar maior eficiência no uso da água que outros sistemas, e diminuir as perdas por evaporação, percolação e escoamento superficial (SIMÕES et al., 2018).

Os diferentes métodos de irrigação exercem influência sobre os parâmetros fitossociológicos das plantas daninhas, acredita-se que sistemas de irrigação pertencentes a um mesmo método de irrigação também possuam este potencial. As plantas daninhas interferem no processo de produção das culturas, competindo por recursos como água, luz, nutrientes e gás carbônico, além disso, podem liberar substâncias alelopáticas e hospedar pragas e doenças comuns à cultura (MOURA FILHO et al., 2015).

O levantamento fitossociológico em áreas de cultivo fornece dados sobre as populações de plantas daninhas, que aliado às características morfológicas, tais como: método de propagação, ciclo de vida, hábito de crescimento e rota fotossintética, indicarão as medidas de controle mais adequadas a serem utilizadas (ALBURQUEQUE et al., 2017).

Pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de verificar a influência da lâmina aplicada ou do método de irrigação adotado nos parâmetros fitossociológicos das plantas daninhas. Kamoshita et al. (2014) verificaram que a variação espacial na profundidade da água em arrozais resultou na ocorrência de diferentes ervas daninhas, com muitas espécies de Poaceae e Cyperaceae observadas em campos mais rasos e plantas aquáticas em campos mais profundos. Em lavoura de tomate Sutton et al. (2006) verificaram que a densidade de plantas daninhas nos tratamentos com irrigação por gotejamento em subsuperfície foram 98% inferiores à dos tratamentos de irrigação por sulcos.

Levantamentos fitossociológicos tem sido realizados em pomares de diversas fruteiras (SARMENTO et al., 2015; LIMA et al., 2015; ALMEIDA et al., 2018;), no entanto, não há estudos na cultura da mangueira, sobretudo que avaliem o efeito de

diferentes sistemas de irrigação localizada na fitossociologia das plantas daninhas. Desta forma objetivou-se com o presente trabalho avaliar os índices fitossociológicos das plantas daninhas em uma área comercial de mangueira 'Palmer' irrigada por gotejamento e outra por microaspersão.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido em uma área agrícola localizada no Perímetro Irrigado de Ceraíma no Município de Guanambi, região Sudoeste da Bahia, com latitude de 14° 13' S, longitude de 42° 46' W, altitude de 545m. Sendo a precipitação anual média de 680 mm, com período chuvoso entre novembro a março e, a temperatura média de 25,78 °C.

Dois experimentos, um sob microaspersão e outro sob gotejamento foram instalados em um pomar de mangueira 'Palmer' com seis anos de idade plantada no espaçamento de 6 x 5 m. A água utilizada na irrigação foi obtida de um poço tubular onde foi aplicada às unidades experimentais de maneira diferenciada por um sistema de irrigação por gotejamento com nove gotejadores autocompensantes de vazão unitária 8 L h⁻¹ e microaspersores de vazão de 100 L h⁻¹.

O manejo dos pomares foi realizado de maneira igualitária. A adubação foi realizada com base na produtividade esperada (20 - 30 t ha⁻¹) e o controle das plantas daninhas por meio de roçagem e aplicação de Paraquat (Gramoxone®), na dose de 10 mL do produto comercial por litro de calda.

As coletas das amostras foram realizadas dois anos após a implantação do experimento, em novembro de 2017, período em que o pomar se encontrava na fase de enchimento dos frutos. Utilizou-se o método do quadrado inventário com dimensões de 0,4 m x 0,4 m (BRAUN-BLANQUET, 1979), foram realizadas 10 amostras em cada pomar. Ambos pomares possuindo área igual a 750m².

As plantas localizadas dentro do quadrado em cada amostra foram cortadas rente ao solo com o auxílio de faca, identificadas, separadas por espécie e armazenadas em sacos de papel, sendo posteriormente levadas ao laboratório onde foram quantificadas e classificadas quanto à espécie e família com o auxílio do Manual de Identificação de Plantas Daninhas (MOREIRA; BRAGANÇA, 2011). Foram desidratadas em estufa a 65 °C por 72 horas e em seguida realizou-se a aferição da massa seca em balança de precisão.

Realizou-se a aferição dos seguintes índices fitossociológicos de acordo com as equações (1 a 7) propostas por MuellerDombois e Ellenberg (1974):

$$F = \frac{\text{número de quadrados que contém a espécie}}{\text{número total de quadrados obtidos}} \quad (1)$$

$$FR = \frac{\text{frequência da espécie} * 100}{\text{frequência total das espécies}} \quad (2) \quad D = \frac{\text{número total de indivíduos por espécie}}{\text{área total ocupada pelos quadrados}} \quad (3)$$

$$DR = \frac{\text{densidade da espécie} * 100}{\text{densidade total das espécies}} \quad (4)$$

$$DoR = \frac{\text{massa seca da espécie} * 100}{\text{massa seca total das espécies}} \quad (5)$$

$$IVI = \sum Fr + \sum Dr + \sum DoR \quad (6)$$

$$IR = \frac{IVI \text{ da espécie}}{IVI \text{ total}} \quad (7)$$

O Índice de Similaridade (SJ_{ij}) foi calculado analisando as espécies comuns em ambas as áreas em relação ao total de espécies encontrada, de acordo com o coeficiente de similaridade de Jaccard (equação 8) (MULLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974):

$$SJ_{ij} = \frac{c}{a+b-c} \quad (8)$$

Em que:

a = número de espécies ocorrentes na área irrigada por gotejamento,

b = número de espécies ocorrentes na área irrigada por microaspersão

c = número de espécies comuns às duas áreas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No pomar de mangueira 'Palmer', irrigado por microaspersão, foram encontrados 88 indivíduos, representados por seis espécies, distribuídas em cinco gêneros e quatro famílias. No pomar de mangueira irrigado por gotejamento, foram encontrados 86 indivíduos, representados por oito espécies, distribuídas em oito gêneros e seis famílias. Em ambos locais a porcentagem de plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas foram iguais a 50% (Quadro 1).

QUADRO 1. Classificação de plantas daninhas em pomar de mangueira 'Palmer' irrigados por microaspersão e gotejamento, Guanambi-BA, 2017.

Nome comum	Espécie	Família	Classe
Microaspersão			
Corda de viola	<i>Ipomoea purpurea</i>	Convolvulaceae	Dicotiledônea
Capim pé de galinha	<i>Chloris barbata</i>	Poaceae	Monocotiledônea
Chucalho de cascavel	<i>Crotalaria sp.</i>	Fabaceae	Dicotiledônea
Falso massambará	<i>Sorghum arundinaceum</i>	Poaceae	Monocotiledônea
Tiririca de brejo	<i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae	Monocotiledônea
-	<i>Ipomoea sp.</i>	Convolvulaceae	Dicotiledônea
Gotejamento			
Algodão seda	<i>Calotropis procera</i>	Apocynaceae	Dicotiledônea
Angiquinho	<i>Aeschynomene rudis</i>	Fabaceae	Dicotiledônea
Capim arroz	<i>Echinocchloa crus-galli</i>	Poaceae	Monocotiledônea
Capim pé de galinha	<i>Chloris barbata</i>	Poaceae	Monocotiledônea
Erva de Santa Luzia	<i>Euphorbia hirta</i>	Euphorbiaceae	Dicotiledônea
Falso massambará	<i>Sorghum arundinaceum</i>	Poaceae	Monocotiledônea
Picão preto	<i>Bidens alba</i>	Asteraceae	Dicotiledônea
Tiririca de brejo	<i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae	Monocotiledônea

Ambos os pomares apresentaram baixa diversidade de plantas daninhas, levantamentos realizados em outras culturas identificaram maior número de

espécies, sendo identificadas 43 espécies em pomar de bananeira (LANZA et al., 2017) e 13 em pomar de goiabeiras (LIMA et al., 2015).

A família Poaceae apresentou o maior número de espécies nas áreas em estudo, com duas espécies na área irrigada por microaspersão e três na área irrigada por gotejamento. Resultados semelhantes foram obtidos por Moura-Filho et al. (2015) em área de banana irrigada, onde a família poaceae apresentou maior número de espécies (3), perfazendo um total de 25% das espécies encontradas.

Frequência, densidade e dominância relativa mostram respectivamente a influência de uma espécie, quanto à sua ocorrência, número de indivíduos e acúmulo de massa seca, em relação à comunidade infestante (PITELLI, 2000). No pomar de mangueira irrigado por microaspersão os maiores valores de índice de valor de importância (IVI) e importância relativa (IR) foram obtidos por *Sorghum arundinaceum* (falso massambará) (137,63; 45,88) e *Cyperus rotundus* (tirica) (98,98; 32,99). Para *S. arundinaceum* estes valores se devem principalmente à alta frequência relativa (42,86%) e dominância relativa (74,32%), e para a tiririca ocorreu em função da alta densidade relativa (59,09%) (Tabela 1).

TABELA 1. Índices fitossociológicos de plantas daninhas em pomar de mangueira 'Palmer' irrigado por microaspersão, Guanambi-BA, 2017.

Espécies	NQ	NI	Den.R(%)	FA	FR(%)	DoR(%)	IVI	IR(%)
<i>Chloris barbata</i>	2	10	11,36	20	9,52	9,07	29,96	9,99
<i>Crotalaria sp.</i>	2	3	3,41	20	9,52	1,80	14,73	4,91
<i>Cyperus rotundus</i>	6	52	59,09	60	28,57	11,31	98,98	32,99
<i>Ipomoea purpurea</i>	1	2	2,27	10	4,76	1,59	8,63	2,88
<i>Ipomoea sp.</i>	1	3	3,41	10	4,76	1,90	10,08	3,36
<i>Sorghum arundinaceum</i>	9	18	20,45	90	42,86	74,32	137,6	45,88
Total	10	88	100	210	100	100	300	100

Número de quadrados (NQ), número de indivíduos (NI), frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR), dominância relativa (DoR), índice de valor de importância (IVI) e importância relativa (IR).

S. arundinaceum está presente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do Brasil. É uma gramínea anual ou perene, que se desenvolve entouceirada e que foi introduzida como forrageira no Brasil, porém, não se desenvolveu somente nas áreas de pastagens e passou a ocupar áreas com lavouras anuais e perenes, sobretudo destinadas à implantação de fruticultura (MOREIRA; BRAGANÇA, 2011).

Esta planta daninha é frequentemente encontrada na região ao longo das estradas e em plantações de sorgo. O alto IVI pode estar relacionado ao fato dos agricultores utilizarem grãos de sorgo com baixo índice de pureza coletados na própria lavoura para plantios subsequentes, facilitando a dispersão das sementes desta planta invasoras na região. Além disso, a temperatura da região é favorável à germinação das sementes (KRENCHINSKI et al., 2015).

De acordo com Martins et al. (2016) o *S. arundinaceum* possui características fisiológicas e de crescimento semelhantes a outras gramíneas invasoras que apresentam metabolismo de C4, requerendo assim, atenção no manejo desta invasora especialmente em cultivos de verão e nos estágios iniciais de estabelecimento das culturas. As demais espécies encontradas no pomar irrigado por microaspersão foram *Ipomoea purpurea*, *Chloris barbata*, *Crotalaria sp.* e *Ipomoea sp.* que apresentaram IVI de 8,63; 29,96; 14,73 e 10,08 respectivamente.

No pomar de mangueira irrigado por gotejamento *C. rotundus* e *Chloris barbata* (capim pé de galinha) apresentaram os maiores valores de IVI e IR 119,54, 39,85% e 90,51, 30,17%, respectivamente. O alto IVI de *C. rotundus* se deu em função da alta densidade relativa (72,09%), e de *C. barbata* em função da alta dominância relativa (48,31%) (Tabela 2). Resultados semelhantes foram obtidos por Lima et al. (2015) em pomar de goiabeiras, onde *Braquiaria decumbens* e *C. rotundus* foram as espécies de maior representatividade fitossociológica em todas as avaliações.

TABELA 2. Índices fitossociológicos de plantas daninhas em pomar de mangueira 'Palmer' irrigado por gotejamento, Guanambi-BA, 2017.

Espécies	N Q	NI	Dens.R(%)	FA	FR(%)	DoR(%)	IVI	IR(%)
<i>Aeschynomene rudis</i>	1	1	1,16	10	5,88	0,01	7,05	2,35
<i>Bidens alba</i>	1	1	1,16	10	5,88	5,15	12,19	4,06
<i>Calotropis procera</i>	1	1	1,16	10	5,88	0,22	7,27	2,42
<i>Chloris barbata</i>	5	11	12,79	50	29,41	48,31	90,51 119,5	30,17
<i>Cyperus rotundus</i>	5	62	72,09	50	29,41	18,033	4	39,85
<i>Echinocchloa crus-galli</i>	1	4	4,65	10	5,88	3,62	14,15	4,72
<i>Euphorbia hirta</i>	1	4	4,65	10	5,88	1,66	12,19	4,06%
<i>Sorghum arundinaceum</i>	2	2	2,33	20	11,76	23,01	37,1	12,37
Total	10	86	100	170	100	100	300	100

Número de quadrados (NQ), número de indivíduos (NI), frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR), dominância relativa (DoR), índice de valor de importância (IVI) e importância relativa (IR).

C. rotundus é uma planta invasora perene, que causa prejuízos em várias culturas. O período crítico de competição encontra-se na fase inicial de desenvolvimento das culturas, porém os prejuízos da competição ocorrem durante todo o ciclo (PANOZZO et al., 2009).

Esta planta se multiplica por sementes e principalmente vegetativamente por meio de tubérculos, que são considerados sua principal unidade de dispersão e propagação, estas estruturas reprodutivas podem permanecer dormentes no solo por longos períodos sem perda de viabilidade propagativa (KHATOUNIAN et al., 2018) e emergir de profundidades de até 50 cm (ROOZKHOSH et al., 2017), sendo, portanto, uma planta daninha de difícil controle.

A presença de *C. rotundus* nas duas áreas e o alto IVI se deve as suas características reprodutivas bem como a capacidade de tolerar tanto a restrição hídrica como o encharcamento (HONG et al., 2011), esta planta daninha esteve presente tanto nas entrelinhas que permaneciam secas como na área molhada.

Chloris barbata conhecida popularmente como capim-roxo ou capim pé-de-galinha-roxo, está presente em vários estados das regiões, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, possui capacidade de se desenvolver em condições desfavoráveis estando presente tanto em ambientes agrícolas como urbanos (MOREIRA; BRAGANÇA, 2011). Pode se tornar um problema em áreas agrícolas, pois, apresenta biótipos resistentes aos herbicidas Ametryne, Diuron (CABI, 2018) e

Glifosato (BRACAMONTE et al., 2018). Os dados de IVI e IR desta espécie bem como o fato de estar presente em ambas as áreas se deve a sua ampla distribuição na região e a facilidade de dispersão das sementes pelo vento.

As demais espécies encontradas no pomar irrigado por gotejamento foram *Aeschynomene rudis*, *Bidens alba*, *Calotropis procera*, *Echinocchloa crus-galli*, *Euphorbia hirta* e *Sorghum arundinaceum* que apresentaram IVI de 7,05; 12,19; 7,27; 14,15; 12,19 e 37,1 respectivamente.

A importância relativa infere em quais espécies são mais importantes em termos de infestação, levando em consideração a densidade, frequência e dominância relativa (LIMA et al., 2015). *S. arundinaceum* e *C. rotundus* apresentaram a maior importância relativa, a primeira espécie principalmente em função do seu porte ereto e caule lignificado que propicia maior massa seca, e a segunda em função do elevado número de indivíduos, que ocasiona o aumento da densidade.

Além disso, espécies menos afetadas ou favorecidas por práticas agrícolas tendem a apresentar maior importância relativa (PITELLI, 2000), é possível que estas espécies não tenham sido afetadas tanto quanto as demais, pelos métodos de controle utilizados (roçagem ou aplicação de herbicida de contato (Gramoxone®)), uma vez que estes métodos não são eficazes no controle de espécies que apresentam reprodução vegetativa, pois possibilita a rebrota das plantas poucos dias após sua realização (MARTINS, 2013).

O índice de similaridade é obtido pela relação entre o número de espécies comuns e o número total de espécies encontradas entre duas áreas (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974). Áreas que atingem índice de similaridade superiores a 25% são consideradas similares (ROSA-JÚNIOR et al., 2015), e quando este valor é superior a 50% pode-se inferir que há elevada similaridade (FELFILI; VENTUROLI, 2000).

Apesar das áreas em estudo fazerem parte de um mesmo pomar, sendo adjacentes uma à outra e diferindo apenas quanto ao sistema de irrigação adotado, o índice de similaridade das espécies encontradas nos pomares foi baixo (27,27%), apenas três espécies foram comuns às duas áreas.

Sarmento et al. (2015) avaliando a fitossociologia de plantas daninhas em diferentes banais obtiveram médio índice de similaridade (48,27%). Já Lima et al. (2015) avaliando a fitossociologia de plantas daninhas em pomar de goiabeiras em diferentes épocas obtiveram alto índice de similaridade (60%).

O baixo índice de similaridade encontrado entre os pomares sugere que os sistemas de irrigação avaliados podem influenciar na ocorrência de diferentes espécies de plantas daninhas, o que pode ter ocorrido devido a irrigação por gotejamento umedecer uma área de solo menor do que a irrigação por microaspersão (SILVA; SILVA, 2005). De acordo Ayars et al. (2015) a redução na área molhada ocasiona uma redução significativa na germinação e crescimento das ervas daninhas, particularmente na área entre as fileiras, ocasionando a ocorrência de diferentes espécies nas áreas, de acordo como seu grau de adaptação à restrição hídrica. No entanto, a densidade total de plantas daninhas não foi afetada pelos diferentes sistemas de irrigação, a densidade do pomar irrigado por microaspersão (55 plantas m⁻²) foi apenas 2,32% superior ao do irrigado por gotejamento (53,75 plantas m⁻²).

CONCLUSÃO

No pomar de mangueira irrigado por microaspersão *Sorghum arundinaceum* apresentou o maior índice de valor de importância, já no irrigado por gotejamento o maior índice foi obtido por *Cyperus rotundus*.

A densidade total de plantas daninhas foi semelhante entre as áreas e o índice de similaridade foi baixo.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, J. A. A.; SANTOS, T. S.; CASTRO, T. S.; EVANGELISTA, M. O.; ALVES, J. M.; SOARES, M. B. B.; MENEZES, P. H. S. Estudo florístico de plantas daninhas em cultivos de melancia na Savana de Roraima, Brasil. **Scientia Agropecuaria**, v. 8, n. 2, p. 91-98, 2017. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.02.01>>. doi: 10.17268/sci.agropecu. 2017 .02.01.

ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA. Editora Gazeta Santa Cruz, 2018. Disponível em: <<http://www.editoragazeta.com.br/flip/anuario-fruticultura-2018/files/assets/basichtml/index.html#2>>. Acesso em: Março de 2018.

AYARS, J. E.; FULTON, A.; TAYLOR, B. Subsurface drip irrigation in California - Here to stay? **Agricultural Water Management**, v. 157, p. 39-47, 2015. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2015.01.00>>. doi:10.1016/j.agwat.2015.01.001.

ALMEIDA, U. O.; NETO, R. C. A.; LUNZ, A. M. P.; TAVELLA, L. B.; MARINHO, T. S.; NOGUEIRA, S. R. Ocorrência de plantas daninhas em cultivo de bananeira comprida em diferentes espaçamentos no estado do Acre. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, v. 5, n. 1, 2018. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/176767/1/26616.pdf>>.

BRACAMONTE, E.; SILVEIRA, H. M.; CRUZ, R. A.; DOMÍNGUEZ-VALENZUELA, J. A.; CRUZ-HIPOLITO, H. E.; PRADO, R. From tolerance to resistance: mechanisms governing the differential response to glyphosate in *Chloris barbata*. **Pest Management Science**, v. 74, p. 1118-1124, 2018. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1002/ps.4874>>. doi: 10.1002/ps.4874

BRAUN-BLANQUET, J. **Fitossociologia**: Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Madrid: H. Blume, 1979. 820p.

CABI - Centre for Agricultural Bioscience International. **Invasive Species Compendium**. *Chloris barbata* (purpletop chloris), 2018. Disponível em: <<https://www.cabi.org/isc/datasheet/13113>>. Acesso em 29 de Agosto de 2019.

FELFILI, J. M., VENTUROLI, F. Tópicos em análise de vegetação. **Comunicações técnicas florestais**, n. 2, 2000.

HONG, M.; GUO Q. S.; NIE, B.H.; KANG, Y.; PEI, S.X. Responds of *Cyperus rotundus* to flooding-drying habit changes in Three Gorges Reservoir hydro-fluctuation belt. **Journal of Agricultural University of Hebei**, v. 34, p. 77-84, 2011.

KAMOSHITA, A.; ARAKI, Y.; NGUYEN, Y. T. B. Weed biodiversity and rice production during the irrigation rehabilitation process in Cambodia. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 194, p. 1-6, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.05.001>>. doi: 10.1016/j.agee.2014.05.001.

KHATOUNIAN, C. A.; OLIVEIRA, D. A. M.; FERREIRA, T. M.; DUPRE, M.; MERIANNE, H. Distribuição dos tubérculos de Tiririca (*Cyperus rotundus* L.) no perfil do solo e suas implicações para a conversão para agricultura orgânica de hortas urbanas. **Scientia Plena**, v. 14, n. 9, p. 1-6, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.14808/sci.plena.2018.090201>>. doi: 10.14808/sci.plena.2018.090201.

KRENCHINSKI, F. H.; ALBRECHT, A. J. P.; ALBRECHT, L. P.; VILLETI, H. L.; ORSO, G.; BARROSO, A. A. M., & VICTORIA FILHO, R. Germination and dormancy in seeds of *Sorghum halepense* and *Sorghum arundinaceum*. **Planta Daninha**, v. 33, n. 2, p. 223-230, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0100-83582015000200007>>. doi: 10.1590/0100-83582015000200007.

LANZA, T. R.; MACHADO, A. F. L.; MARTELLETO, L. A. P. Effect of planting densities of “BRS princess” banana tree in the suppression of weeds. **Planta Daninha**, v.35, n.e017162958, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-83582017350100054>>. Doi: 10.1590/S0100-83582017350100054.

LIMA L. K. S.; ARAÚJO, R. C.; SANTOS J. P. S.; LOPES, M. F. Q. Fitossociologia de plantas daninhas em pomar de goiabeiras em diferentes épocas de amostragem. **Revista Biociências**, v. 21, p. 45-55, 2015. Disponível em: <<http://periodicos.unitau.br/ojs/index.php/biociencias/article/view/2001/1513>>.

MARTINS, D. A.; JAKELAITIS, A.; CARDOSO, I. S.; COSTA, A. C.; SALES, J. F. Growth and physiological characteristics of the weed false johnsongrass (*Sorghum arundinaceum* (Desv.) Stapf). **Revista Ceres**, v. 63, p. 16-24, 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0034-737X201663010003>>. doi: 10.1590/0034-737X201663010003.

MARTINS, T. Herbicida Paraquat: conceitos, modo de ação e doenças relacionadas. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 34, p. 175-186, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5433/1679-0367.2013v34n2p175>>. doi: 10.5433/1679 0367.2013 v34 n2p175.

MOREIRA, H. J. C.; BRAGANÇA, H. B. N. **Manual de identificação de plantas infestantes**: Hortifrúti. São Paulo: FMC Agricultural Products, 2011. 1017p.

MOURA FILHO, E. R.; MACEDO P.M.; SILVA A. R. S. Levantamento fitossociológico de plantas daninhas em cultivo de banana irrigada. **HOLOS**, v. 2, p. 92-97, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15628/holos.2015.1006>>. doi: 10.15628/holos.2015.1006.

MÜELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. **Aims and Methods of Vegetation Ecology**. New York: John Wiley and Sons, 1974. 547p.

PANOZZO, L. E.; AGOSTINETTO, D.; GALON, L.; MORAES, P.V.D.; PINTO, J.J.O.; NEVES, R. Métodos de manejo de *Cyperus esculentus* na lavoura de arroz irrigado. **Planta Daninha**, v. 27, p. 165-174, 2009. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-8358200900010002>>. doi: 10.1590/S0100-8358200900010002.

PITELLI, R. A. Estudos fitossociológicos em comunidades infestantes de agroecossistemas. **Journal Conserb**, v. 1, p. 1-17, 2000.

ROOZKHOSH, M.; ESLAMI, S. V.; AL-AHMADI, M. J. Effect of plastic mulch and burial depth on purple nutsedge (*Cyperus rotundus*) emergence and growth. **Archives of Agronomy and Soil Science**, v. 63, n. 10, p. 1454-1464, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/03650340.2017.1280782>>. doi: 10.1080/03650340.2017.1280782.

ROSA-JÚNIOR, A. O.; BASTOS, M. N. C.; AMARAL, D. D., SOARES, C. C. Composição florística de remanescentes florestais na área de influência do Reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, Pará, Brasil. **Biota Amazônia**, v. 5, n. 2, p. 10-17, 2015. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v5n2p10-17>>. doi: 10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v5n2p10-17.

SARMENTO, H. G. S.; CAMPOS FILHO, J. M.; ASPIAZÚ, I.; RODRIGUES, T.M.; FERREIRA, E. A. Levantamento fitossociológico de plantas daninhas em áreas de bananicultura no Vale do Rio Gorutuba, norte de Minas Gerais. **Revista Agro@mbiente On-line**, v. 9, p. 308-316, 2015. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18227/1982-8470ragro.v9i3.2314>>. doi: 10.18227/1982-8470ragro.v9i3.2314.

SILVA, C. A.; SILVA, C. J. Avaliação de uniformidade em sistemas de irrigação localizada. **Revista Científica Eletrônica de Agronomia**, v. 8, p. 1-17, 2005. Disponível em: <http://www.faeF.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/Tm9d5yhlcpzey1x_2013-4-29-15-39-59.pdf>.

SIMÕES, W. L.; FERREIRA, P. P. B.; MOUCO, M. D. C.; GUIMARÃES, M.; da SILVA, J. A. B. Produção e respostas fisiológicas da mangueira cv. Keitt sob diferentes sistemas de irrigação no Submédio do São Francisco. **Irriga**, v. 23, n. 1, p. 34-43, 2018. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2018v23n1p34-43>>. DóI: 10.15809/irriga.2018v23n1p34-43.

SUTTON, K. F.; LANINI, W.T.; MITCHELL, J. P.; MIYAO, E.M.; SHRESTHA, A. Weed control, yield, and quality of processing tomato production under different irrigation, tillage, and herbicide systems. **Weed Technology**, v. 20, p. 831-838, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1614/WT-05-057.1>>. doi: 10.1614/WT-05-057.1.