Среднекаменноугольная граница на северо-востоке европейской России

А. В. Журавлев, Я. А. Вевель, Д. А. Груздев

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

micropalaeontology@gmail.com

Рассмотрены пограничные отложения нижнего и среднего карбона на гряде Чернышева (разрезы на р. Шарью и р. Вангыр), Приполярном Урале и северном Пай-Хое (разрезы побережья Баренцева моря и района оз. Хардто). Определены региональные биостратиграфические (по фораминиферам и конодонтам), циклостратиграфические и изотопно-геохимические критерии проведения среднекаменноугольной границы в разнофациальных разрезах. Наиболее надежным критерием проведения границы нижнего и среднего карбона на северо-востоке европейской России представляется сочетание следов максимума трансгрессии с первыми находками конодентов *Declinognathodus noduliferus* и *D. inaequalis*.

Ключевые слова: среднекаменноугольная граница, фораминиферы, конодонты, стратиграфия.

Mid-Carboniferous boundary in the north-east of European Russia

A. V. Zhuravlev, Ya. A. Vevel, D. A. Gruzdev

Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The Lower-Middle Carboniferous boundary deposits of the Tchernyshev Ridge (Vangyr River and Sharyu River section), Subpolar Urals, and northern Pai-Khoi (Barents Sea shore and Hardto Lake sections) are considered. Regional biostratigraphic markers of the boundary based on foraminifers and conodonts are determined. Additional cyclostratigraphic and isotope stratigraphic markers allow recognizing the mid-Carboniferous boundary in different facies over the region. The most reliable markers of the boundary in the region are transgression maximum associated with first occurrences of conodonts *Declinognathodus noduliferus* and *D. inaequalis*.

Keywords: mid-Carboniferous boundary, foraminifers, conodonts, stratigraphy.

Введение

Среднекаменноугольная граница, отвечающая в Общей стратиграфической шкале границе нижнего и среднего отделов каменноугольной системы (серпуховского и башкирского ярусов), отражает один из существенных рубежей, как в глобальной эволюции биосферы, так и в развитии Североуральско-Пайхойского региона. Положение среднекаменноугольной границы, которая совпадает с границей миссисипской и пенсильванской подсистем каменноугольной системы, зафиксировано в разрезе Arrow Canyon (Невада, США) по первому появлению конодентов *Declinognathodus noduliferus* решением Международного геологического конгресса в 1996 г. (Lane et al., 1999). При этом в Североуральско-Пайхойском регионе данная граница традиционно проводится по форамини-

ферам, точнее по исчезновению последних раннекаменноугольных форм фораминифер (Николаев, 2005; Николаев, Журавлев, 2016). Изучение опорного разреза на р. Шарью (гряда Чернышева) показало несовпадение уровня появления конодентов *Declinognathodus noduliferus* и уровня исчезновения типично раннекаменноугольных фораминифер (Николаев, Журавлев, 2016), что приводит к сложностям в региональном прослеживании среднекаменноугольного рубежа. Ситуация усугубляется еще и слабой изученностью конодентов этого стратиграфического интервала в регионе.

Цель данной работы состоит в обобщении имеющихся данных по конодонтам пограничного серпуховско-башкирского интервала в разрезах Североуральско-Пайхойского региона и оценке возможных региональных критериев проведения границы подсистем.

Материал

Материалом для данной работы послужили результаты изучения разрезов северного Пай-Хоя (побережье Баренцева моря, бассейн р. Песчаная и район оз. Хардто), гряды Чернышева (р. Шарью и р. Вангыр) и востока Косью-Роговской впадины (скважинный материал) (рис. 1). Эти разрезы характеризуют различные фациальные зоны – от карбонатной платформы до батиали (Николаев, Журавлев, 2016; Журавлев, Вевель, 2017) и содержат остатки как конодонтов, так и фораминифер. Подробная литологическая и биостратиграфическая характеристика разрезов северного Пай-Хоя была опубликована ранее (Журавлев, Вевель, 2017). Фораминиферы из разреза на р. Шарью (Средние Ворота) были детально изучены А.И. Николаевым (Николаев, 2005; Николаев, Журавлев, 2016), поэтому здесь по этим разрезам приводятся лишь общая информация и недостающие в указанных публикациях сведения.

Рис. 1. Схема расположения разрезов.

1 – скважина; 2 – естественные обнажения

Fig. 1. Locality map. 1 – borehole; 2 – outcrops

Характеристика разрезов

Северный Пай-Хой

Пограничные отложения нижнего и среднего карбона на севере Пай-Хоя представлены в двух формационных зонах – Печорской и Пайхойской. В Печорской зоне они приурочены к верхней части болванской свиты и представлены отмельными карбонатами (рис. 2). Пограничный интервал охарактеризован фораминиферами и конодонтами (Журавлев, Вевель, 2017). Изотопный состав

углерода в карбонатах характеризуется некоторым облегчением (на 1–2 ‰) с последующим утяжелением в пограничном интервале (Kossovaya et al., 2019). В Пайхойской зоне среднекаменноугольному рубежу отвечает граница карской и карасиловской свит (рис. 2). Карская свита представлена глубоководными карбонатами, а карасиловская – темноцветными аргиллитами с градационными прослоями аллохтонных карбонатов. В низах карасиловской свиты обнаружены раннебашкирские конодонты *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves) и *Rhachistognathus minutus* (Higgins et Bouckaert) (Журавлев, Вевель, 2017).

Гряда Чернышева

Разрез пограничных ранне-среднекаменноугольных отложений на р. Шарью (Средние Ворота, обн. 3 по (Николаев, 2005), 66° 07' 34" с.ш. 58° 44' 45" в.д.) представлен следующей последовательностью слоев (рис. 3):

1. Известняки мелко-тонкодетритовые в нижней части слоя, до тонко-мелкодетритовых в верхней части, коричневые, пологоволнистослойчатые. Текстура подчеркнута распределением детрита и органических остатков, ориентированных по напластованию. Среди органических остатков отмечены членики криноидей, раковины и створки брахиопод (*Striatifera*), одиночные ругозы. Они образуют линзовидные прослои (0.1–0.2 м по мощности) с волнистыми нижними границами и пологоволнистыми верхними. В слое найдены конодонты *Cavusgnathus* sp. Кровля пологоволнистая. Мощность 1.5 м.

2. Известняки мелкодетритовые светло-серые, коричневатые, с линзовидно-рассеянным распределением среднего до крупного детрита (членики криноидей, обломки и створки брахиопод) и одиночных ругоз. Текстура неотчетливо линзовидно-волнистослойчатая. Кровля пологоволнистая. Мощность 0.6 м.

3. Известняки тонко-мелкодетритовые с рассеянно-гнездовидным распределением среднего до грубого детрита, светло-серые, коричневатые неотчетливо волнистослойчатые в нижней части слоя, мелкодетритовые волнисто-линзовиднослойчатые в верхней части слоя. По всему слою наблюдаются рассеянные плохо оформленные кремнистые стяжения неправильной формы. Кровля волнистая. Мощность 1.4 м.

4. Известняки мелкодетритовые светло-серые с гнездовидно-распределенным средним до грубого детритом и члениками криноидей. Текстура массивная, до неотчетливо волнистослойчатой. Вверх по слою размер детрита снижается до тонко-мелкого. Наблюдаются кремнистые стяжения неправильной формы. В верхней части слоя найдены конодонты *Gnathodus* cf. *postbilineatus* Nigmatzhanov et Nemirovskaya. Кровля бугристая. Мощность 1.9 м.

Рис. 2. Корреляция разрезов севера Пай-Хоя. Легенда: 1 – известняки глинистые; 2 – известняки кремнистые; 3 – известняки с микробиальными постройками; 4 – известняки детритовые; 5 – силициты; 6 – аргиллиты; 7 – фосфатные конкреции; 8 – кремнистые конкреции. Серым обозначен трансгрессивный интервал

Fig. 2. Correlation of the northern Pai-Khoi sequences. Legend: 1 – clayey limestones; 2 – cherty limestones; 3 – limestones with microbial buildups; 4 – detrital limestones; 5 – cherts; 6 – argillites; 7 – phosphate concretions; 8 – cherty concretions. The interval of transgression is in grey

5. Известняки мелко-тонкодетритовые светло-серые, коричневатые, неотчетливо волнистослойчатые. Отмечается рассеянно-линзовидные скопления среднего и крупного детрита, а также члеников криноидей. Наблюдаются кремнистые стяжения неправильной формы. В верхней части слоя найдены конодонты *Lochriea commutata* (Branson et Mehl), *Gnathodus girtyi simplex* Dunn, *Gnathodus bollandensis* (Higgins et Bouckaert), характерные для верхнего серпухова. Неполная мощность 0.6 м.

Не обнажено 0.3 м по мощности.

6. Известняки от тонкодетритовых в нижней части до тонко-мелкодетритовых в верхней части слоя, светло-коричневые волнистослойчатые. Характерно рассеянно-гнездовидное распределение мелкого и среднего детрита и органических остатков (членики криноидей, раковины и створки брахиопод), концентрация которых повышается вверх по слою. В прикровельной части отмечается массовое скопление раковин и створок брахиопод. Часть раковин находится в близком к прижизненному положению. В нижней части слоя обнаружены конодонты *Cavusgnathus naviculus* (Hinde). Кровля бугристая. Неполная мощность 0.55 м.

7. Известняки от тонкодетритовых в нижней части до тонко-мелкодетритовых в верхней части слоя, светло-серые, коричневатые, неотчетливо пологоволнистослойчатые. Мелкий детрит и органические остатки (членики криноидей и створки брахиопод) распределены гнездовидно-рассеянно. В нижней части слоя найдены среднекаменноугольные конодонты *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), *Declinognathodus lateralis* (Higgins et Bouckaert). Постепенный переход к вышележащему слою. Мощность 1.3 м.

8. Линзовидный слой известняка средне-мелкодетритового коричневатого-серого с маятниковым распределением среднего и грубого детрита. Текстура линзовиднослойчатая. Из органических остатков отмечены многочисленные членики криноидей, раковины и створки брахиопод, одиночные ругозы. По слою распределены плохо оформленные мелкие кремнистые стяжения. Постепенный переход к вышележащему слою. Мощность 0.4 м.

9. Известняки от тонко-мелкодетритовых в нижней части до тонкодетритовых в верхней части слоя, коричневатого-серые, неотчетливо волнисто-линзовиднослойчатые за счет распределения мелкого и среднего детрита, а также члеников криноидей, створок брахиопод, одиночных ругоз, мшанок. В верхней части слоя обнаружены конодонты *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), *Declinognathodus inaequalis* (Higgins). Кровля пологобугристая. Мощность 1.1 м.

На р. Вангыр среднекаменноугольные отложения изучены в фрагментарном выходе на пра-

вом берегу реки (обн. 12 по А. И. Елисееву) (65° 08' 50" с.ш. 58° 45' 01" в.д.). Здесь обнажаются известняковые конглобрекции (обломки 2-20 см, умеренно и хорошо окатанные), серые, массивные, с прослоями серых детритовых криноидных известняков. Из детритовых известняков определены раннебашкирские конодонты *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves) в комплексе с характерными для раннего карбона *Gnathodus postbilineatus* Nigmatzhanov et Nemirovskaya, *Hindeodus scitulus* (Hinde), *Lochriea commutata* (Branson et Mehl) и *L. senckenbergica* Nemirovskaya, Perret et Meischner. Неполная мощность 4.5 м.

Восток Косью-Роговской впадины

Пограничные ранне-среднекаменноугольные отложения, вскрытые скважиной в интервале глубин 1435-1440 м, представлены следующими слоями (рис. 3):

1. Тонкое чередование аргиллитов и известняков. Аргиллиты известковистые с рассеянным мелким детритом зеленовато-серые волнистослойчатые с пятнистым выделением доломита и битумной пропиткой. Известняки тонко-мелкодетритовые серые до темно-серых неотчетливо волнистослойчатые. Детритовые известняки преобладают. Мощность 0.4 м.

2. Известняки пелитоморфные с рассеянным тонким детритом, темно-серые неотчетливо волнистослойчатые до массивных. Присутствуют раковины и детрит брахиопод, членики криноидей, ветвистые колонии кораллов. В известняках определены фораминиферы позднего серпухова: *Earlandia vulgaris* (Rauser et Reitlinger), *E. elegans* (Rauser et Reitlinger), *Tolypammina* sp., *Pseudoammodiscus volgensis* (Rauser), *Pseudoglomospira duplicata* (Lipina), *P. elegans* (Reitlinger), *Rugosoarchaediscus* sp., *Insolentitheca* sp., *Mediocris breviscula* (Ganelina), *Tetrataxis* sp., *Consobrinella gibbosa minima* Lipina, *Biseriella parva* (Chernysheva), *Eostaffella mosquensis* Vissarionova. Мощность 0.8 м.

3. Известняки слабо глинистые пелит-тонкодетритовые серые до темно-серых неотчетливо волнистослойчатые, с прослоями (0.1 м через 0.3-0.6 м) аргиллитов известковистых зеленовато-серых волнистослойчатых с раковинами брахиопод и рассеянной микровкрапленностью сульфидов. В известняках найдены характерные для пограничного ниже-среднекаменноугольного интервала конодонты *Gnathodus* cf. *postbilineatus* Nigmatzhanov et Nemirovskaya, зеленые водоросли *Beresella* sp., а также разнообразные фораминиферы: *Earlandia elegans* (Rauser et Reitlinger), *Tolypammina* sp., *Pseudoglomospira prisca* (Rauser), *Paraarchaediscus convexus* (Grozdilova et Lebedeva), редкие *Asteroarchaediscus* sp., *Neoarchaediscus* sp., *Rugosoarchaediscus* sp., единичная *Janischewskina* sp., *Endostaffella parva* (Moller), *Mediocris mediocris*

(Vissarionova), *M. breviscula* (Ganelina), *Biseriella parva* (Chernysheva), *Eostaffella* sp., *E. mosquensis* Vissarionova, *Eostaffella pseudostruvei chomatifera* Kireeva. Мощность 1.1 м.

4. Известняки доломитистые глинистые тонкодетритовые серые, до темно-серых в нижней части слоя, неотчетливо волнистослойчатые, текстура намечена распределением мелкого детрита, мелких раковин брахиопод, члеников криноидей, остатков красных водорослей *Ungdarella uralica* Maslov. В нижних 0.25 м наблюдается скопление крупных раковин брахиопод. Редкая рассеянная тонкая вкрапленность сульфидов. В средней части слоя обнаружены конодонты *Hindeodus cristulus* (Youngquist et Miller), а в верхней — среднекаменноугольные *Idiognathoides* cf. *sulcatus* Higgins et Bouckaert. Фораминиферы представлены следующими формами: *Earlandia vulgaris* (Rauser et Reitlinger), *E. elegans* (Rauser et Reitlinger), редкие *Tolypammina* sp., много псевдогломоспир - *Pseudoglomospira* sp., *P. prisca* (Rauser), *P. duplicata* (Lipina), *P. elegans* (Reitlinger), присутствуют *Paraarchaediscus convexus* (Grozdilova et Lebedeva), мелкие *Endothyra* sp., *Endostaffella parva* (Moller), *Mediocris mediocris* (Vissarionova), *M. breviscula* (Ganelina), *Biseriella parva* (Chernysheva), *Globivalvulina* sp., *Eostaffella* sp., *Ikensieformis* ex gr. *ikensis* Vissarionova, *E. postmosquensis* Kireeva, *Eostaffellina* sp., *Plectostaffella* sp. Мощность 2.6 м.

Методы

В работе использованы био-, цикло- и изотопно-стратиграфические методы. Основу биостратиграфических построений составили данные по конодонтам и фораминиферам.

Результаты фациального анализа разрезов позволили выявить следы колебаний уровня моря и трансгрессивно-регрессивные циклиты. В основу фациальной интерпретации положены модели мелководного карбонатного осадконакопления (Irwin, 1965; Жемчугова, 2014) и мелководной седиментации (Piper, 1978; Lowe, 1982; Фортунатова, 2007).

По материалам из скважины востока Косью-Роговской впадины проведены изотопно-геохимические исследования карбонатов и карбонатно-глинистых пород с определением соотношений стабильных изотопов углерода и кислорода. Изотопные исследования проводились на масс-спектрометре DELTA V Advantage с системой пробоподготовки Gas Bench II в ЦКП «Геонаука», аналитик И. В. Смолева. Значения $\delta^{13}\text{C}$ даны в промилле относительно стандарта PDB, $\delta^{18}\text{O}$ — относительно стандарта SMOW с аппаратной ошибкой 0.1‰.

Результаты и их обсуждение

В мелководно-отмельных разрезах севера Пай-Хоя среднекаменноугольная граница мар-

кируется небольшим интервалом, в котором отсутствуют находки конодонтов и фораминифер. Выше этого интервала найдены конодонты *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), маркирующие нижнюю часть башкирского яруса и фораминиферы *Eostaffella pseudostruvei angusta* Kireeva, *Plectostaffella jakhensis* Rietlinger, *Pseudostaffella antiqua* (Dutkevich) нижней части акавасского подъяруса башкирского яруса. Не охарактеризованный конодонтами и фораминиферами интервал сложен тонкодетритовыми кремнистыми известняками, которые на фоне волнисто-линзовидных чередований детритовых известняков интерпретируются как следы максимума трансгрессии (Журавлев, Вевель, 2017) (рис. 2).

В глубоководных разрезах севера Пай-Хоя среднекаменноугольная граница маркируется переходом от пачки известняков глинистых с отдельными градационными известняковыми циклитами карской свиты к серым аргиллитам с фосфорит-кремнисто-глинистыми конкрециями карасиловской свиты. Верхние карской свиты охарактеризованы серпуховскими конодонтами *Gnathodus bollandensis* (Higgins et Bouckaert) и *Gnathodus girtyi collinsoni* Rhodes, Austin et Druce. В нижней части карасиловской свиты найдены конодонты *Rhachistognathus minutus* (Higgins et Bouckaert), а несколько выше — типичные раннебашкирские формы *Idiognathoides asiaticus* Nigmatzhanov et Nemirovskaya и *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves). Нижняя часть карасиловской свиты, сложенная аргиллитами без карбонатных градационных прослоев интерпретируется в качестве следов максимума трансгрессии (Журавлев, Вевель, 2017) (рис. 2).

В мелководных последовательностях гряды Чернышева (разрезы на р. Шарью и р. Вангыр) пограничные ранне-среднекаменноугольные отложения хорошо охарактеризованы конодонтами. Граница устанавливается по уровню первой находки *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), которая примерно отвечает уровню появления в разрезе фораминифер *Pseudostaffella antiqua* (Dutkevich) и несколько ниже уровня исчезновения типичных раннекаменноугольных фораминифер (Николаев, 2005). В разрезе на р. Шарью уровень биостратиграфической границы отмечен отчетливой межслоевой поверхностью (кровля слоя б), к которой приурочено массовое скопление раковин (в близком к прижизненному положении) и створок брахиопод. Эта поверхность интерпретируется как уровень максимального затопления с пониженной придонной динамикой и замедлением осадконакопления (см. также (Николаев, Журавлев, 2016)) (рис. 3).

В относительно мелководном разрезе востока Косью-Роговской впадины пограничный ниже-среднекаменноугольный интервал прак-

тически не охарактеризован конодонтами и содержит индифферентный комплекс фораминифер. Граница условно проведена по следам максимума трансгрессии в пограничном интервале (рис. 3). Изотопно-геохимические данные показали незначительный положительный сдвиг значений $\delta^{13}\text{C}_{\text{carb}}$ вблизи этого уровня, сходный

с таковым в мелководных разрезах Пай-Хоя (Kossovaya et al., 2019). Положительный экскурс в конодонтовой зоне *Declinognathodus noduliferus* отмечается и в глобальном масштабе, что делает его потенциальным маркером среднекаменноугольной границы (Ерофеевский, Журавлев, 2019).

Рис. 4. Конодонты пограничного нижне-среднекаменноугольного интервала: 1 – *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), обр. 2037/41, пачка 3, карасиловская свита, средний карбон, башкирский ярус; 2 – *Gnathodus bollandensis* (Higgins et Bouckaert), обр. 2037/37, пачка 7, карская свита, нижний карбон, серпуховский ярус; 3 – *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), обр. 2711/7, пачка 5, болванская свита, средний карбон, башкирский ярус; 4 – *Gnathodus bilineatus* Roundy, обр. 2719/8, пачка 1, болванская свита, нижний карбон, серпуховский ярус; 5 – *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), обр. W12-3, р. Вангыр, средний карбон, башкирский ярус; 6 – *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), обр. 2700/58, пачка 5, болванская свита, средний карбон, башкирский ярус; 7 – *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), обр. W12-2, р. Вангыр, средний карбон, башкирский ярус; 8 – *Lochriea senckenbergica* Nemirovskaya, Perret et Meischner, обр. W12-2, р. Вангыр, средний карбон, башкирский ярус; 9 – *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), обр. W12-3, р. Вангыр, средний карбон, башкирский ярус; 10 – *Hindeodus scitulus* (Hinde), обр. W12-3, р. Вангыр, средний карбон, башкирский ярус; 11 – *Gnathodus postbilineatus* Nigmatzhanov et Nemirovskaya, обр. W12-3, р. Вангыр, средний карбон, башкирский ярус

Fig. 4. Conodonts from the Lower-Middle Carboniferous boundary interval: 1 – *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), sample 2037/41, unit 3, Karasilova Fm., Middle Carboniferous, Bashkirian; 2 – *Gnathodus bollandensis* (Higgins et Bouckaert), sample 2037/37, unit 7, Kara Fm., Lower Carboniferous, Serpukhovian; 3 – *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), sample 2711/7, unit 5, Bolvanskiy Fm., Middle Carboniferous, Bashkirian; 4 – *Gnathodus bilineatus* Roundy, sample 2719/8, unit 1, Bolvanskiy Fm., Lower Carboniferous, Serpukhovian; 5 – *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), sample W12-3, Vangyr River section, Middle Carboniferous, Bashkirian; 6 – *Declinognathodus noduliferus* (Ellison et Graves), sample 2700/58, unit 5, Bolvanskiy Fm., Middle Carboniferous, Bashkirian; 7 – *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), sample W12-2, Vangyr River section, Middle Carboniferous, Bashkirian; 8 – *Lochriea senckenbergica* Nemirovskaya, Perret et Meischner, sample W12-2, Vangyr River section, Middle Carboniferous, Bashkirian; 9 – *Declinognathodus inaequalis* (Higgins), sample W12-3, Vangyr River section, Middle Carboniferous, Bashkirian; 10 – *Hindeodus scitulus* (Hinde), sample W12-3, Vangyr River section, Middle Carboniferous, Bashkirian; 11 – *Gnathodus postbilineatus* Nigmatzhanov et Nemirovskaya, sample W12-3, Vangyr River section, Middle Carboniferous, Bashkirian

Следует отметить, что следы максимума трансгрессии в пограничном интервале устанавливаются в различных фациях и на значительной территории, что рассматривается как признак эв-татической природы трансгрессии. Это позволяет предполагать высокую степень изохронности максимума этой трансгрессии.

Конодонты, найденные в пограничном интервале, отличаются невысоким разнообразием. Совместно с характерными для башкирского яруса представителями рода *Declinognathodus* присутствуют проходящие из раннего карбона таксоны: поздние виды рода *Gnathodus*, некоторые *Lochriea* и *Hindeodus scitulus* (Hinde) (рис. 4).

Выводы

В глубоководных фациях пограничный ниже-среднекаменноугольный интервал фиксируется по конодонтам (первые находки *Declinognathodus noduliferus*) и дополнительно маркируется следами максимума трансгрессии (темные аргиллиты, иногда с фосфатными конкрециями, не содержащие прослоев карбонатных турбидитов). В относительно мелководных фациях карбонатного шельфа пограничный интервал опознается по конодонтам (последние находки типичных раннекаменноугольных форм и первые находки *Declinognathodus* и *Idiognathoides*), следам максимума трансгрессии, а также постепенному исчезновению раннекаменноугольных фораминифер и появлению *Pseudostaffella antiqua*. В изотопно-геохимической записи в пограничном интервале отмечается малоамплитудный положительный сдвиг в изотопном соотношении углерода, который приблизительно соответствует биостратиграфической и циклостратиграфической границе.

Наиболее надежным критерием проведения границы нижнего и среднего карбона на северо-востоке европейской России представляется сочетание следов максимума трансгрессии с первыми находками конодонтов *Declinognathodus noduliferus* и *D. inaequalis*.

Литература

1. Ерофеевский А. В., Журавлёв А. В. Перспективы использования изотопно-стратиграфического метода ($\delta^{13}\text{C}_{\text{карб}}$) для корреляции верхнедевонско-каменноуголь-

ного интервала востока Тимано-Печорской провинции // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2019. Т. 14. № 1. http://www.ngtp.ru/rub/2019/9_2019.html

2. Жемчугова В. А. Резервуарная седиментология карбонатных отложений. Москва: ООО "ЕАГЕ Геомодель", 2014. 232 с.

3. Журавлев А. В., Вевель Я. А. Среднекаменноугольная граница на севере Пай-Хоя – корреляция мелководных и глубоководных разрезов // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2017. Т. 159. Кн. 1. С. 152–163.

4. Николаев А. И. Фораминиферы и зональная стратиграфия башкирского яруса востока Тимано-Печорской провинции. СПб: Недра, 2005. 158 с.

5. Николаев А. И., Журавлев А. В. Граница нижнего и среднего отделов каменноугольной системы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2016. Т. 11. № 2. http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf

6. Постановления межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. 1997. № 29. С. 15–17.

7. Фортунатова Н. К. Седиментационные модели карбонатных конусов выноса – новых нефтегазопи-сковых объектов // Геология нефти и газа. 2007. № 2. С. 61–69.

8. Irwin M. L. General theory of epeiric clear water sedimentation // Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 1965. 49. P. 445–459.

9. Kosssovaya O. L., Petrov E. O., Evdokimova I. O., Shmanyak A. V., Zhuravlev A. V., Leontiev D. I., Berbenev M. O. & Yudin S. V. New analytic study of Devonian-Permian deposits in the Polar Urals (Kozhim River) and Pay-Khoi (Yugorsky Peninsula) // Abstract. Third International Congress on Stratigraphy, Milano (Italy), 2-5 July 2019. P. 38.

10. Lane H. R., Brenckle P. L., Baesemann J. F., and Richards B. The IUGS boundary in the middle of the Carboniferous: Arrow Canyon, Nevada, USA // Episodes. 1999. 22(4). P. 272–283.

11. Lowe D. R. Sediment gravity flows: II. Depositional models with special reference to the deposits of high-density turbidity currents // Journal of Sed. Petrol. 1982. 53(1). P. 279–297.

12. Piper D. J. W. Turbidite muds and silts on deep sea fans and abyssal plains // Sedimentation in submarine canyons, fans, and trenches. 1978. P. 163–175.