Палинологическое исследование жертвенного места Хайбеда-Пэда в бассейне Море-ю (Большеземельская тундра)

Т. И. Марченко-Вагапова

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

timarchenko@geo.komisc.ru

В статье рассмотрены результаты палинологического анализа раскопок жертвенного места Хайбеда-Пэда, расположенного в северной части Большеземельской тундры (Ненецкий Автономный Округ). Реконструированы изменения природной среды в районе жертвенного места со времени суббореального потепления до конца субатлантического периода голоцена. Сделан вывод о неустойчивом характере температурного режима в период существования памятника. Появление человека на территории связывают с временем субатлантического потепления (1200–1800 лет назад), когда здесь произрастали еловые, елово-березовые леса. В целом влияние человека на окружающую среду было не велико, так как значительного преобразования растительного покрова не происходило.

Ключевые слова: северо-восток Европы, жертвенное место, палинология, голоцен.

A palynological study of the Khaibed-Padar Sacrific Site in the More-Yu River basin (Bolshezemelskaya tundra)

T. I. Marchenko-Vagapova

Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The article discusses the results of a palynological analysis of excavations of the Khaibed-Padar Sacrific Site, located in the northern part of the Bolshezemelskaya tundra (Nenets Autonomous Okrug). The environmental changes in the area of the sacrificial place from the time of subboreal warming to the end of the subatlantic period of the Holocene were reconstructed. The conclusion is made about the unstable nature of the temperature regime during the existence of the monument. The appearance of man on the territory is associated with the time of sub-Atlantic warming (1200–1800 years ago), when spruce, spruce-birch forests grew here. In general, the human impact on the environment was not large, since there was no significant transformation of the vegetation cover.

Keywords: northeast of Europe, Sacrificial site, palynology, Holocene.

Введение

Спорово-пыльцевой анализ приобретает все большее значение в археологии. Его широко используют при изучении культурно-исторических эпох в развитии человеческого общества. Применяют для восстановления палеоландшафтов и определения степени влияния человека на природную среду; уточнения и сравнения датированных культурных слоев стоянок; корреляции одновозрастных культурных слоев, как в пределах археологического объекта, так и между различными памятниками; для определения роли земледелия в хозяйственном укладе древнего человека (вырубка леса, земледелие, выпас скота, создание искусственных водоемов, осушение заболоченных лугов).

В арктической зоне Европейского Северо-Востока России изучение археологических памятников ведется уже более 200 лет, открыты сотни стоянок (Мурыгин, 2014). Тем не менее, данных об изменении природной среды обитания человека получено еще не много. Сейчас перед исследователями стоит задача получения палеогеографических данных с целью лучшего понимания взаимодействия человека и природы.

Материал

Палинологическим методом были проанализированы образцы, взятые с раскопок жертвенного места Хайбеда-Пэда (материалы предоставлены А. М. Мурыгиным, ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ

УрО РАН). Жертвенное место находится в 60 км от морского побережья, на коренном 30-метровом отрезке левого берега р. Море-ю (Большеземельская тундра), в 10 км выше левого притока р. Море-ю — р. Сямаю, в районе реликтового елово-березового редколесья (Мурыгин, 1992) (рис. 1).

Памятник расположен на бровке 30-метрового берега реки, в основании мыса, выступающего в сторону русла реки. Снаружи представляет собой песчаный задернованный бугор почти правильной округлой формы, возвышающийся над ровной поверхностью берега до 1.5 м. Местонахождение открыто Г. А. Черновым в 1947 г., затем исследовано В. И. Канивцом в 1967 г. на площади 43 кв.м. В 1987 г. исследование было продолжено А. М. Мурыгиным на площади около 84 кв. м до глубины 2.3 м.

Сводная стратиграфия раскопа (описание А. М. Мурыгина, сверху вниз):

1. Растительный слой с плотным задернованным темно-желтым песком, пронизанным мелкими корешками; под растительным слоем песок сероватой окраски — 6–16 см.
2. Песок светло-желтый; граница с вышележащим и нижележащим слоем нечеткая — 2–10 см.
3. Песок темно-серый плотный однотонный гумусированный — 2–10 см.
4. Песок светло-желтый рыхлый — 2–6 см.
5. Песок темно-серый плотный однотонный гумусированный (верхний культурный горизонт) — 2–14 см.
6. Песок светло-желтый однотонный рыхлый — 6–22 см.

7. Песок слоистый розовато-серый с коричневатым оттенком с углистыми прослойками и линзами, пятнистый (средний культурный горизонт) — 6–30 см; во всех случаях углистые прослойки и линзы имели толщину около 2 см.

8. Песок светло-желтый рыхлый слоистый с включениями немногочисленных углистых прослоек — 6–94 см.

9. Песок розовато-серый с коричневатым оттенком слоистый с углистыми прослойками и линзами в верхней части (нижний культурный горизонт) — 10–42 см.

10. Песок светло-желтый слоистый — 16–64 см.

11. Пачка песчаных отложений, состоящая из чередующихся прослоек темно-коричневого или черного, темно-желтого и серого песка; иногда отмечались прослойки песка темно-синего цвета — 4–32 см.

12. Погребенный подзол белого цвета с размытой темно-серой прослойкой в верхней части — 2–10 см.

13. Песок желтовато-зеленый рыхлый светлый. По краям раскопа, примыкающим к яреям и склону коренного берега, наблюдались нарушения в отложении слоев различного вида (сбросы, выклинивания), вызванные, видимо, мерзлотными процессами, оползнями, ветровым действием.

Из т.н. взято 12 образцов. В них обнаружены пыльца и споры разной степени сохранности. Также отмечены минеральные и растительные остатки, центрические и пеннатные пресноводные диатомовые водоросли, углистые остатки. На

Рис. 1. Место расположения Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места

Fig. 1. Location of the Khaibed-Padar Sacrificial Site

Рис. 2. Хэйбеда-Пэдарское жертвенное место. Северо-восточная стенка (профиль № VII, кв. Е/7). Снимок с юго-запада. Цена деления линейки — 10 см

Fig. 2. Khaibed-Padar Sacrificial Site. Northeast wall (profile No.VII, quarter E/7). Shot from the southwest. The division line of 10 cm

основании проведенного анализа выделено шесть спорово-пыльцевых комплексов (рис. 3).

В образцах 11 и 12 пыльца и споры не обнаружены.

Спорово-пыльцевой комплекс I (обр. 10 с глубины 2.01–1.83 м (здесь и ниже по тексту величины средние), песок).

В общем составе спектра доля пыльцы древесных растений преобладает (около 72 %). Травы и споры составляют равные группы (примерно по 14 %). Среди древесных форм доминируют хвойные породы: пыльцы *Picea* sp. встречено 35 %, *Pinus sylvestris* — почти 32 %. Виды рода *Betula* sp. отмечены в значительно меньшем количестве: *Betula* sect. *Fruticosae* — почти 15 %, *Betula* sect. *Albae* — до 12 %, *Betula nana* единична. В составе комплекса также принимает участие пыльца ольхи *Alnus* sp. около 3 %. В небольшом количестве встречена пыльца ивы *Salix* sp. Единична пыльца липы *Tilia* sp., представителя неморальной флоры.

Состав травянистых растений довольно разнообразен. Преобладает пыльца вересковых *Ericaceae* (21 %). Присутствуют *Roaceae*, *Superaceae*, *Artemisia* sp. **Разнотравье** представлено видами сем. *Ranunculaceae*, *Primulaceae*, *Onagraceae*, *Caryophyllaceae*, *Polygonaceae*, *Asteraceae*. Отмечен представитель влаголюбивого

растения, живущего по берегам водоемов, на влажных лугах и болотах (частуха *Alisma* sp.). Среди споровых растений преобладает *Sphagnum* sp. (64 %). Отмечены плауны *Lycopodium clavatum*, *L. complanatum*, *L. appressum*, *L. annotinum* и папоротники сем. *Polypodiaceae*.

Данный спорово-пыльцевой спектр характеризует развитие темнохвойных лесов с господством ели, участием сосны и березы, ольхи. В составе лесных сообществ единично принимала участие широколиственная липа. Открытые участки были заняты луговыми ценозами, что отражено в составе пыльцы травянистых растений. Участие вересковых, присутствие водных растений, большой процент сфагновых мхов указывают на достаточно большую увлажненность территории.

Спорово-пыльцевой комплекс II (обр. 9 с глубины 1.83–1.43 м, песок).

Общий состав спектра комплекса при сильном уменьшении общего количества пыльцы и спор сохраняет свою структуру. Доля пыльцы древесных растений по-прежнему преобладает (почти 88 %), травы и споры встречены в небольших количествах и составляют почти 8 и 4 % соответственно. Среди пыльцы древесных растений доминирует пыльца сем. *Betulaceae*: встречены *Betula* sect. *Fruticosae* (23.5 %), *Betula* sect. *Albae* (почти 15 %), *Betula* sect. *Nanae* (около 12 %) и *Alnus* sp. (7.5 %). Хвойные породы отмечены примерно в равных количествах и составляют *Picea* sp. — 17.6 %, *Pinus sylvestris* — 16 %. Ива (*Salix* sp.) представлена единично.

Состав пыльцы травянистых растений беден и малочислен, единично отмечены *Ericaceae*, *Artemisia* sp., *Caryophyllaceae*, *Valerianaceae*. Среди споровых единично встречены *Sphagnum* sp. и *Lycopodium* sp.

Состав спорово-пыльцевого спектра отражает развитие березовых редколесий с участием ели и сосны.

Спорово-пыльцевой комплекс III (обр. 8, 7 с глубины 1.43–0.6 м, песок).

В общем составе спектра по-прежнему преобладает доля пыльцы древесных растений (до 63 %), участие трав и спор возросло, и они составляют почти 27 и 17 % соответственно. Среди пыльцы древесных растений в начале комплекса доминирует пыльца хвойных пород, причем и ель, и сосна отмечены в количестве 27.5 %. Пыльца рода *Betula* сначала играет подчиненную роль, а затем становится преобладающей: *Betula* sect. *Fruticosae* — 10–26 %, *Betula* sect. *Albae* — 14–18 %, *Betula* sect. *Nanae* — около 8 %. Пыльца *Alnus* sp. представлена от 3 до 9 %. Участие *Salix* sp. возрастает до 18 %.

Состав травянистых растений остается постоянным на протяжении всей зоны, все время присутствуют злаки, осоки, полыни, маревые, вересковые *Ericaceae*. Среди разнотравья отмечены представители сем. *Onagraceae*, *Brassicaceae*,

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений из раскопа Хэйбидя-Пэдара.

1 – песок, 2 – сумма пыльцы древесных пород, 3 – сумма пыльцы травянистых пород, 4 – сумма спор высших споровых растений, 5 – ольха, 6 – береза, 7 – сосна, 8 – ель, 9 – сумма пыльцы разнотравья, 10 – злаки, 11 – вересковые, 12 – осоки, 13 – полыни, 14 – маревые, 15 – плауны, 16 – папоротники, 17 – зеленые мхи, 18 – сфагновые мхи

Fig. 3. Spore-pollen diagram of sediment from the Khaibed-Padar Site.

1 – sand, 2 – the sum of pollen of tree species, 3 – the sum of pollen of herbaceous species, 4 – the sum of spores of higher spore plants, 5 – Alnus, 6 – Betula, 7 – Pinus, 8 – Picea, 9 – the sum of pollen of herbs, 10 – Poaceae, 11 – Ericaceae, 12 – Carex, 13 – Artemisia, 14 – Chenopodiaceae, 15 – Lycopodium, 16 – Polypodiaceae, 17 – Bryales, 18 – Sphagnum

Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae. Среди споровых господствует *Sphagnum* sp. (68 %). Отмечены виды рода *Lycopodium* sp., папоротники сем. Polypodiaceae, *Selaginella selaginoides*.

Состав спорово-пыльцевого спектра отражает в начале комплекса существование северотажных еловых лесов с примесью сосны, березы, которые постепенно замещаются березняками и ивняками. На территории наряду с бореальными элементами флоры участвовали болотные и травянистые формации.

В обр. 6 с глубины 0.6–0.49 м, песок, пыльца деревьев, трав и споры отмечены в единичных экземплярах. Встречены представители *Betula* sect. *Fruticosae*, Onagraceae, Polypodiaceae. Обнаруженные пыльца и споры не дают возможность восстановить характер растительного покрова. Все это может указывать на ухудшение условий окружающей среды или большую обводненность территории.

Спорово-пыльцевой комплекс IV (обр. 5 с глубины 0.49–0.35 м, песок).

В общем составе спектра доля пыльцы древесных растений преобладает и составляет около 77 %. На второе место выходят споры (14 %). Количество трав достигает 9 %. Среди пыльцы древесных растений доминирует пыльца *Salix* sp., составляя 54.5 %. Количество пыльцы других представителей: *Betula* sect. *Albae*, *Betula* sect. *Fruticosae*, *Betula nana*, *Alnus* sp., *Alnaster* sp., *Picea* sp. и *Pinus sylvestris*, колеблется от единично до 10 %.

Состав травянистых растений беден и немногочислен. Отмечены злаки, польни, Caryophyllaceae, Polemonium и Asteraceae. Среди встреченных споровых преобладают сфагновые мхи. Участие *Lycopodium clavatum*, *L. complanatum*, *L. pungens* не велико.

Данный спорово-пыльцевой спектр характеризует этап восстановления растительности, отражает развитие ивняков с примесью березы и хвойных. Это могло произойти в результате улучшения окружающей обстановки. Обводненность и заболоченность территории несколько снизилась, но оставалась еще достаточно высокой.

Спорово-пыльцевой комплекс V (обр. 2–4 с глубины 0.35–0.17 м, пески).

В общем составе спектра доля пыльцы древесных растений преобладает и достигает почти 53 %. Вторую группу по численности составляют травы – 41 %, спор отмечено до 12 %. Среди пыльцы древесных доминируют представители хвойных растений. Количество пыльцы сосны *Pinus sylvestris* достигает почти 35 %, достаточно велико участие ели *Picea* sp. – около 16 %. Виды рода *Betula* sp. отмечены в немного меньшем количестве: *Betula* sect. *Albae* составляет более 21 %, *Betula* sect. *Fruticosae* – более 19 %, *Betula nana* в начале комплекса составляет почти 4 %, затем ее количество уменьшается. В составе комплекса также

принимает участие пыльца ольхи *Alnus* sp. – около 6 %, ольховник *Alnaster* sp. единичен. Доля пыльцы *Salix* sp. значительно уменьшается.

Состав травянистых растений довольно разнообразен. Преобладает пыльца вересковых Ericaceae (почти 30 %), велика роль Poaceae (16.5 %). Присутствуют Cyperaceae, *Artemisia* sp., **Chenopodiaceae**. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Primulaceae, Onagraceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Cichoriaceae, Polemoniaceae, Plumbaginaceae и другие. Среди споровых растений преобладает *Sphagnum* sp. (40–72 %). Отмечены плауны *Lycopodium clavatum* (почти 30 %), *L. complanatum*, *L. appressum*, *L. pungens* и папоротники сем. Polypodiaceae.

Данный спорово-пыльцевой спектр характеризует формирование на данной территории березово-еловых лесов с участием сосны, ольхи, ивы. Открытые площади были заняты луговыми ценозами, развиты болота. Климат достаточно теплый.

Спорово-пыльцевой комплекс VI (обр. 1 с глубины 0.17–0.0 м, пески).

В общем составе спектра доля пыльцы древесных растений преобладает и составляет около 61 %. Второе место по-прежнему занимают травы (почти 27 %). Количество спор достигает 12 %. Среди пыльцы древесных растений доминирует пыльца *Betula* sect. *Albae* (33 %), велико участие *Betula* sect. *Fruticosae* (почти 20 %), отмечены *Betula nana*, *Alnus* sp., *Alnaster* sp. **Количество представителей хвойных:** *Picea* sp. и *Pinus sylvestris*, уменьшается (до 9 и 16 % соответственно). Встречена пыльца *Salix* sp.

Состав травянистых растений сохраняется, но численность снижается. Среди всех преобладают представители сем. Caryophyllaceae и Asteraceae. Среди споровых господствуют сфагновые мхи, содержание других компонентов не велико.

Данный спорово-пыльцевой спектр отражает развитие березово-еловых редколесий.

Результаты

Полученные палинологические материалы позволили реконструировать изменения природной среды, которые происходили в суббореальном и субатлантическом климатических периодах (согласно схемы зонального деления голоцена (Никифорова, 1982)).

Во время суббореального потепления (SB-2) до начала заселения человеком района были распространены коренные темнохвойные елово-сосновые леса (спорово-пыльцевой комплекс I). В составе лесов в качестве примеси участвовали березняки и ольшанники. Климатические условия были теплее современных, на что указывает и присутствие в составе единичной пыльцы широколиственных пород (липа). На открытых участках распространялись естественные луга. Участие

вересковых, высокий процент сфагновых мхов указывают на достаточно большую увлажненность территории и на процессы заболачивания. Затем, в результате ухудшения условий окружающей среды на рубеже SB-3+SA-1, хвойные леса заместились березовыми лесами с участием ели и сосны (II комплекс). Произошло увеличение доли ерниковых зарослей.

Заселение человеком данной территории произошло во время субатлантического (SA-2) потепления. Начало образования культурного слоя на памятнике, отнесено ко времени не ранее VI в. н.э. III спорово-пыльцевой комплекс характеризует в этот период умеренные условия внешней среды, достаточно прохладные. Вновь произошло развитие северо-таежных еловых лесов с примесью сосны, березы, которые постепенно вытеснялись березняками и ивняками. В целом давление человека на среду было незначительно, так как полная замена растительности не происходит. Вероятно, происходила небольшая вырубка хвойных деревьев и только возле поселения, что привело к заселению открытых участков кустарниками. Наряду с бореальными элементами флоры в составе растительности участвовали болотные и травянистые формации.

Находки артефактов из среднего культурного горизонта (обр. 6) единичны (2 экз.) Образец не содержит пыльцу и споры в достаточном количестве для характеристики окружающей среды. Все это может быть связано как с ухудшением условий захоронения, перемывом осадков в результате большой обводненности территории. Спорово-пыльцевой комплекс IV характеризует этап восстановления растительности, отражает развитие ивняков с небольшой примесью березы и хвойных. Обводненность и заболоченность территории высока.

Верхняя дата археологического памятника определяется XIII—XIV или XV вв. н.э. Спорово-пыльцевой комплекс V характеризует условия на рубеже SA-2—SA-3. Период потепления завершал-

ся, что привело к развитию березово-еловых лесов с участием сосны, ольхи, ивы. Открытые площади были заняты луговой растительностью. Процессы заболачивания постепенно возрастали, что отразилось в увеличении численности вересковых, видов Plumbaginaceae, Polemoniaceae, сфагновых мхов. Влияние человека на среду было не велико и проявлялось лишь в незначительном присутствии в составе трав сорняков: полыней, маревых, видов сем. Onagraceae, Cichoriaceae.

Спорово-пыльцевой комплекс VI отражает развитие елово-березовых редколесий, которые развиты сейчас на данной территории.

Приведенные палинологические материалы позволяют говорить о том, что заселение территории происходило во время субатлантического потепления (1200–1800 лет назад) когда здесь существовали еловые и елово-березовые леса. В целом влияние человека на окружающую среду было не велико, так как существенного преобразования растительного покрова вокруг жертвенного места не происходило.

Исследования выполнены в рамках темы НИР ГР № АААА-А17-117121140081-7 и при частичной поддержке Комплексной программой фундаментальных исследований УрО РАН № 18-5-5-50.

Литература

1. Мурыгин А. М. Печорское Приуралье: эпоха средневековья. М.: Наука, 1992. 182 с.
2. Мурыгин А. М. Краткий обзор археологии континентальной области арктической зоны северо-востока Европы // Арктический вектор научного поиска: история и традиционная культура. Мат. науч.-практ. конф. "Обдорья: история, культура, современность" / Науч. вестник Ямало-Ненецкого автономного округа №1 (82), Салехард, 2014. С. 9–16.
3. Никифорова Л. Д. Динамика ландшафтных зон голоцена Северо-Востока Европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М.: Наука, 1982. С. 154–162.