ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЛИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛМАЗСОДЕРЖАЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ АСЫВВОЖСКОЙ СВИТЫ ($D_{2-3}AS$) ЮЖНОГО ТИМАНА

О. В. Гракова, Н. С. Уляшева

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
ovgrakova@geo.komisc.ru, nsulasheva@geo.komisc.ru

Показано, что образование алмазосодержащих отложений в асывовожской свите на Южном Тимане могло происходить за счет латерального переноса из коренных источников или относительно удаленных коллекторов и в результате перемыва нижележащих отложений.

Ключевые слова: алмазосодержащие отложения, терригенные породы, Южный Тиман.

PETROGRAPHIC COMPOSITION AND LITHOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF DIAMOND-BEARING DEPOSIT OF ASYVVVOJ SERIES ($D_{2-3}AS$) OF SOUTH TIMAN

O. V. Grakova, N. S. Ulyasheva

Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar

In this study the formation of diamond deposits in Asyvvoj series in South Timan might occur due to lateral migration of indigenous sources, or relatively remote reservoirs and including as a result of rewashing the underlying sediments.

Keywords: *diamond-bearing deposit, terrigenous rocks, South Timan.*

Проблема алмазоносности Тимана находится в поле зрения исследователей уже около семидесяти лет. Проведенные за это время работы привели к открытию кимберлитовых трубок, в том числе с признаками алмазоносности, а также алмазопроявлений в девонских отложениях Тимана. На Южном Тимане алмазы были обнаружены в отложениях асывовожской свиты в 1988 году в результате геолого-поисковых работ, выполненных Вычегодской ГРЭ под руководством В. В. Терешко. Вопрос об условиях формирования, размещения и строения алмазопроявлений Тимана остается предметом дискуссий. В настоящее время в противовес традиционной гипотезе о рос-

сыпях и промежуточных коллекторах возникла новая гипотеза о коренных алмазных месторождениях туффизитового типа. Для сторонников россыпной природы алмазопроявлений остается нерешенным вопрос о возможных источниках сноса на Среднем Тимане, а для алмазосодержащих отложений Южного Тимана этот вопрос практически не рассматривался.

Изучение вещественного состава алмазосодержащих отложений является важным аспектом при определении условий образования этих пород и оценки перспектив выявления промышленно-значимых алмазоносных объектов.

Геологическая характеристика района исследования

На Южном Тимане алмазосодержащие отложения локализованы в северо-западной части Джеджимпарминской структуры (рис. 1). Они представлены терригенно-карбонатными образованиями асывовожской свиты ($D_{2-3}as$). Нами была вскрыта нижняя часть асывовожской свиты мощностью 5.5 м на восточной стенке щебеночного карьера Асывовож (рис. 2). Свита сложена разнозернистыми песчаниками с прослоями и линзами кварцевых гравелитов и глин. Песчаники кварцевые светло-серого, дымчатого, розовато-кремового цветов. Встречаются также про-

слои коричневатого-рыжего и темно-серого (почти черного) песчаника, что связано с ожелезнением и омарганцеванием пород. Породы асывовожской свиты залегают на песчаниках джеджимской свиты верхнего рифея. Джеджимская свита вскрывается по бортам щебеночного карьера и представлена отложениями нижней подсвиты с видимой мощностью около 25 м. Она состоит из переслаивающихся песчаников, алевропесчаников и аргиллитов.

Высказываются разные мнения относительно природы контакта джеджимской и асывовожской свит. Одни исследователи считают, что отложения асывовожской свиты контактируют с породами джеджимской сви-

ты по тектоническому нарушению [10]. По мнению других, в зоне контакта породы асывовожской свиты имеют магматическую проработку с развитием флюидизатно-эксплозивных образований [4, 5].

Идея о магматической проработке пород в зоне контакта, по-видимому, возникла в связи с наблюдаемыми фактами явного перемещения материала. Так, глинистое вещество в песчаниках асывовожской свиты не только залегает в виде прослоев и линз, но и выполняет полости тонких, секущих слоистость трещин. В девонских песчаниках встречаются тонкие прослои и «жилы» песчаного материала черного цвета. Черные песчаники залегают среди внешне совершен-

но не деформированных серых, серо-розовых и желтых песчаников. Но сами они смяты в мелкие асимметричные складки (рис. 3). Из этого факта следует, что вся толща песчаников смята в складки, однако в однородно сложенных пачках пород эти складки внешне не заметны и проявляются лишь благодаря наличию черных прослоев. Кровельные части черных прослоев имеют резкие контакты с вмещающими песчаниками. Нижние ограничения черных прослоев неровные, с «заливами», что, очевидно, связано с просачиванием растворов в условиях влияния гравитационных сил. Таким образом, черные песчаники являются вторичными образованиями. Их происхождение, скорее всего,

Рис. 1. Схематическая геологическая карта возвышенности Джеджимпарма. Условные обозначения: 1 — четвертичные отложения: суглинки с гравием и галькой (Q); 2 — пермские отложения: глины, известняки, доломиты и гипсы (P₂); 3 — отложения каменноугольной системы: известняки с прослоями глин, алевролитов и аргиллитов (C); 4–9 — отложения девонской системы: 4 — биязьяельская свита D₃bz (известняки с прослоями глин, доломиты), 5 — вильская свита D₃vl (известняки), 6 — шераельская свита D₃chr (доломиты с прослоями глин и песчаников), 7 — ыбская свита D₃ib (известняки с прослоями глин), 8 — изьяельская свита D₃iz (глины, алевролиты, песчаники и известняки), 9 — асывовожская свита D₂₋₃as (конгломераты и песчаники с линзами гравелитов, алевролитов и глин); 10–12 — отложения среднего и верхнего рифея: 10 — ышкемская свита RF₃ish₁ (доломиты и кварцевые песчаники), 11 — джеджимская свита RF₃dz₁ (кварцевые, кварц-полевошпатовые песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов), 12 — визингская свита RF₂vz₁₋₂ (кварцевые песчаники, алевролиты и аргиллиты); 13 — надвиги: а — достоверные, б — предполагаемые; 14 — границы между разновозрастными образованиями: а — достоверные, б — предполагаемые; 15 — предполагаемые разломы; 16 — полезные ископаемые: а — проявления алмазов, б — проявления минеральных красок

Fig. 1. Schematic geological map of the Dzhezdzhiparma Uplift. Legend: 1 — quaternary sediments: loam with gravel and pebbles (Q); 2 — permian sediments: clay, limestones, dolomites and gypsum (P₂); 3 — carboniferous sediments: limestones with interbedded clays, aleurolites and argillites (C); 4–9 — devonian sediments: 4 — biyaizyaelskaya suite D₃bz (limestones with interbedded clay, dolomites), 5 — vilskaya suite D₃vl (limestones), 6 — sheraelskaya suite D₃chr (dolomites interbedded with clays and sandstones), 7 — ybskaya suite D₃ib (limestones interbedded with clays), 8 — izyaelskaya suite D₃iz (clays, aleurolites, sandstones and limestones), 9 — asyvvozhskaya suite D₂₋₃as (conglomerates and sandstones with lenses of gravelites, aleurolites and clays); 10–12 — middle and Upper Riphean sediments: 10 — yshkemeskaya suite RF₃ish₁ (dolomites and quartz sandstones) 11 — dzhedzhimskaya suite RF₃dz₁ (quartz, quartz-feldspar sandstones interbedded with siltstones and mudstones), 12 — vizingskaya suite RF₂vz₁₋₂ (quartz sandstones, siltstones and mudstones); 13 — thrusts: a — confirmed, b — estimated; 14 — boundaries between heteroaged formations: a — confirmed, b — estimated faults; 15 — estimated faults; 16 — mineral resources: a — diamond shows, b — mineral paints shows

связано с просачиванием по ослабленным зонам растворов, обогащенных марганцем. Повышенное содержание марганца в рассматриваемых породах подтверждено данными приближенно-количественного анализа (табл. 1).

Для изучения зоны контакта нами также был пройден шурф глубиной около 2 м. В нижней части шурфа вскрываются сильновыветрелые песчаники розового цвета с прослоями глин серого и черного цвета. Эти породы относятся к джеджимской свите. На высоте 1.4 м от дна карьера был установлен контакт джеджимской и асывовожской свит. В основании асывовожской свиты наблюдаются прослои и включения глинистого песчаника и глин серого цвета, а также включения темно-серого цвета (остатки углефицированных растений), которые выполняют «карман» (рис. 4). Общая мощность слоя составляет 0.4 м. Выше залегает средне- и мелкозернистый кварцевый песчаник серого и желтовато-серого цвета с прослоями гравелитов и глин. Гравий хорошо окатан. Состав гальки преимущественно кварцевый, в меньшей мере встречаются гальки, сложенные розовым кварцитом.

Вкрест простирания границы асывовожской и подстилающей ее джеджимской свит были отобраны пробы и выполнен приближенно-количественный спектральный анализ (табл. 1). В профиле коры выветривания (от пробы № 1 к пробе № 5) отмечается закономерное уменьшение содержания стронция и бария. По абсолютным содержаниям и отношениям Ba/Mn породы как джеджимской, так и асывовожской свиты на генетической диаграмме Я. Э. Юдовича [11] попадают в поле мелководных (шельфовых) песчаников и алевролитов. Выявленные закономерности в изменении содержаний стронция, бария и ванадия в зоне контакта между отложениями джеджимской и асывовожской свит подтверждают гипотезу о стратиграфическом характере контакта и об образовании глинистого материала в зоне гипергенеза.

Исследование зоны контакта показало, что породы асывовожской свиты залегают с угловым несогласием на рифейских песчаниках. Тектоническое нарушение, описанное многими исследователями, реально существует, однако проходит не по контакту свит, а расположено в области распространения пород джеджимской свиты. Поверхность подошвы отложений асывовож-

Рис. 2. Коренные выходы песчаников асывовожской свиты ($D_{2-3}as$) в карьере Асывовож на Южном Тимане

Fig. 2. Primary sandstone outcrops of asyvvozhskaya suite ($D_{2-3}as$) in Asyvvozh pit at South Timan

Рис. 3. Тонкие прослои и «жилы» песчанистого материала черного цвета в девонских песчаниках асывовожской свиты

Fig. 3. Thin interbeds and sandy black veins in Devonian sandstones of asyvvozhskaya suite

кой свиты неровная, с «карманами», заполненными грубыми терригенными осадками, обогащенными углефицированным древесным материалом.

Изучение отложений асывовожской свиты показало, что даже разрезы двух разных частей одного и того же обнажения плохо сопоставимы друг с другом. Это связано с изменением разности терригенного материала, с выклиниванием отдельных слоев, проявлением косой слоистости, смещением отдельных слоев вдоль трещин. Различают разрезы разрозненных обнажений даже в том случае, если они характеризуют один и тот же стратиграфи-

ческий уровень. Все это свидетельствует о динамичных условиях осадконакопления при образовании асывовожской свиты.

В составе свиты встречаются линзы каолиновых глин. Каолин присутствует также в корях выветривания по джеджимским песчаникам. Известно, что каолинит служит индикатором гумидных климатических фаций [12], что может свидетельствовать о кислых гумидных обстановках при формировании коры выветривания. Кора выветривания, послужившая исходным материалом для пород асывовожской свиты, отличается достаточно высокой зрело-

Таблица 1

Содержание элементов в отложениях джеджимской и асывовожской свит в зоне контакта по результатам приближенно-количественного спектрального анализа, г/т

Table 1

Element composition in dzhezhimskaya and asyvvozhskaya suites in the contact zone according to approximate quantitative spectral analysis, g/t

Элементы	1	2	3	4	5	6
Be	1.9	1.4	1.9	1.9	1.9	1.4
Mn	340	190	340	450	190	140
Pb	1900	8.1	8.1	14	8.1	11
Ga	6.1	4.5	8.1	11	2.6	—
Mo	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	1.4
V	26	14	26	34	4.5	4.5
Cu	26	19	6	34	14	26
Zn	45	81	81	45	45	—
Ti	1900	3400	3400	2500	1900	450
Ni	4.5	8.1	8.1	4.5	4.5	4.5
Zr	81	45	140	140	140	140
Cr	45	34	26	81	34	14
Sr	140	81	45	45	14	14
Ba	450	450	81	140	26	26
Y	26	—	—	26	26	26
La	45	45	45	45	45	45
Yb	—	45	26	26	26	26

Примечание. 1 — неизмененные песчаники джеджимской свиты, 2 — песчаник из зоны дезинтеграции, 3–5 — глинистый материал выветривания, 6 — песчаник асывовожской свиты.

Note. 1 — unaltered sandstones of dzhezhimskaya suite, 2 — sandstone from disintegration zone, 3–5 — weathering clay material, 6 — sandstone of asyvvozhskaya suite.

стью и пользуется региональным распространением. В пользу этого свидетельствует присутствие в песчаниках и гравелитах асывовожской свиты кластического материала кварцевого состава при незначительном содержании полевых шпатов и обломков пород и наличие отмеченных уже выше линз каолиновых глин. Высокая зрелость исходной коры объясняет также своеобразность акцессорной минерализации асывовожской свиты, в том числе её рассыпную алмазность и низкое содержание типичных парагенетических минералов — спутников алмазов.

Данные о геологическом строении джеджимской (в зоне контакта с асывовожской) и асывовожской свит с учетом имеющихся опубликованных и фондовых материалов приводят к выводу о том, что они были сформированы в континентальных и прибрежно-морских условиях, в обстановках теплого гумидного климата.

Петрографическая характеристика отложений

В зоне контакта в составе джеджимской свиты были изучены средне- и мелкозернистые олигомиктовые и мезомиктовые (по классификационной диаграмме песчаных пород минерально-петрокластического класса [9]) кварцевые песчаники со слюдисто-

глинистым цементом (рис. 5). Содержание обломочного материала в породах варьирует от 60 до 95 %. Текстура пород слоистая, что обусловлено сортировкой обломочного материала и присутствием прослоев черного цвета, обогащенных тяжелыми минералами, возможно ильмено-гематитового состава; структура — алевропсаммитовая, размеры терригенного материала 0.04–0.6 мм. Кластический материал представлен среднеокатанными и средне- и плохосортированными зернами, среди которых преобладает кварц (70–90 %). Кроме того, в песчаниках встречается плагиоклаз (3–15 %), калиевый полевой шпат (5–10 %), обломки глинистых пород (до 10 %), обломки кварцитов и кремния, а также акцессорные минералы: циркон, турмалин, анатаз, магнетит, ильменит, титанит, лейкоксен, рутил.

Кварц представлен хорошо окатанными и угловатыми чистыми зернами различной размерности. Местами минерал трещиноват и имеет пылевидные включения темного цвета. Погасание волнистое. Плагиоклаз встречается в виде угловатых зерен с сохранившейся таблитчатой формой. Заметны трещинки спайности и полисинтетические двойники. Судя по показателю преломления, плагиоклаз по составу близок к альбиту. Минерал

Рис. 4. Прослой глинистого песчаника темно-серого цвета с углефицированными остатками растений, выполняющими «карман». Контакт джеджимской и асывовожской свит (выделен линией черного цвета)

Fig. 4. Clay sandstone dark gray interbeds with coalified plant remains filling «pockets». Contact of dzhezhimskaya and asyvvozhskaya suites (marked with black line)

местами трещиноват и пелитизирован. Калиевый полевой шпат имеет овальные и угловатые зерна, часто замутнен и сильно трещиноват, содержит включения черного минерала. Наблюдается микроклиноватая решетка. По краям и трещинкам замещается глинистым цементом. Обломки глинистых пород хорошо- и среднеокатанные, имеют желтый и замутненный цвет. В скрещенных николях изотропны вследствие скрытой кристалличности или же интерферируют в ярких тонах за счет мелких чешуек слюды. Обломки кварцитов в проходящем свете — чистые, среднеокатанные. Лишь в скрещенных николях можно обнаружить, что они состоят из отдельных зерен кварца. Обломки кремней представлены угловатыми, слегка замутненными зернами. В скрещенных николях изредка видно, что они состоят из радиально-лучистого халцедона.

Цемент песчаников слюдисто-глинистый и кварцевый. Слюдисто-глинистый цемент желтовато-бурого цвета, открыто-поровый, сплошной, неравномерный, проникновения и замещения, корродирует зерна калиевого полевого шпата и плагиоклаза. Кварцевый цемент встречается редко, он прерывистый, контурный, регенерационный, развивается вокруг обломков кварца.

Рис. 5. Олигомиктовые среднелкозернистые песчаники зоны контакта: а — из нижней части разреза (содержание обломков пород до 10 %), б — из верхней части разреза (содержание обломков пород 2 %); в — среднелкозернистые олигомиктовые песчаники с кварцевым и гидрослюдистым цементом асывовожской свиты

Fig. 5. Oligomictic medium to fine-grained sandstones of the contact zone: а — from the bottom part of the section (content of rock fragments up to 10 %), б — from the top of the section (content of rock fragments 2 %); в — medium-grained oligomictic sandstones with quartz and hydromicaceous cement of asyvvzhskaya suite

Снизу вверх по разрезу наблюдается уменьшение количества содержащий обломков калиевого полевого шпата и глинистых пород и увеличение содержания кварца.

В основании разреза асывовожской свиты преобладают мелко- и среднелкозернистые олигомиктовые песчаники с кварцевым и гидрослюдистым цементом. Текстура пород однородная, структура псаммитовая. Кластический материал среднеокатан и среднесортирован, преобладающим минералом является кварц (80—90 %). Встречаются также зерна плагиоклаза (до 10 %), циркона, титанита, лейкоксена, ильменита, рутила и слюди-сто-кварцевых пород.

Кварц встречается в виде как хорошо окатанных, так и угловатых зерен. Наблюдаются две разновидности этого минерала. Одна представлена сильно загрязненным темным пылевидным веществом, трещиноватыми зернами, другая — чистыми обломками. Погасание облачное и волнистое. Обломки кварца регенерируются новообразованным мозаичным кварцем. *Плагиоклаз* (альбит) представлен угловатыми зернами. Часто в минерале наблюдаются трещинки спайности. Местами минерал пелитизирован. Об-

ломки *слюди-сто-кварцевых пород* хорошо окатанные, серого цвета, мутные за счет развития глинистого материала по трещинкам. В скрещенных полях различаются микроскопические чешуйки слюды и зерна кварца. Цемент гидрослюдистый, неполный поровый, по преимуществу несплошной, коррозионный. Кварцевый цемент неполный поровый, пятнистый, регенерационный.

В верхней части изученного нами разреза в среднелкозернистых олигомиктовых песчаниках с кварцевым цементом содержание обломков достигает 95 %. Текстура пород однородная, структура псаммитовая. Содержания кварцевых обломков и плагиоклаза составляют соответственно 80—90 % и 5—8 %. Кроме того, в песчаниках имеются слюда, циркон и лейкоксен.

Кварц представлен угловатыми, редко хорошоокатанными сильно замутненными и чистыми зернами. *Плагиоклаз* (альбит) трещиноват, пелитизирован, угловат. В нем часто наблюдаются трещинки спайности. Цемент кварцевый, прерывистый контурный, островной регенерационный.

Петрографический состав пород асывовожской свиты позволяет отнести их к зрелым осадкам.

Литохимические особенности отложений

Литохимические особенности среднедевонских терригенных пород Южного Тимана были изучены по данным комплексного метода мокрой химии с рентгено-флуорисцентным анализом (аналитик С. Т. Неверов) (табл. 2).

На основе химической классификации Я. Э. Юдовича [13], было установлено, что породы джеджимской свиты в зоне контакта относятся к таксону «силиты» (ГМ < 0.30), где выделяются следующие классы: суперсилиты (ГМ 0.06—0.10), нормосилиты (ГМ 0.11—0.20), миосилиты (ГМ 0.21—0.30). В изученном разрезе джеджимской свиты снизу вверх отмечается постепенный переход от миосилитов к нормосилитам, это, по мнению Я. Э. Юдовича [13], может свидетельствовать о том, что песчаники становятся менее глинистыми либо менее полевошпатовыми, что подтверждается результатами петрографических исследований.

В составе асывовожской свиты отложения относятся к таксону «силиты» и «сиаллиты» (ГМ 0.30—0.55), включая следующие классы: суперсилиты, миосилиты, гипосиаллиты (ГМ 0.3—0.35 — пониженно-гидролизатные) и

Таблица 2

Химический состав пород асывовожской (Южный Тиман) и пижемской (Средний Тиман) свит, содержание компонентов в мас. %

Chemical composition of asyvvzhskaya (South Timan) and pizhemskaia (Middle Timan) suites, component composition in % wt.

Компонент	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	миосилит	миосилит	нормосилит	нормосилит	нормосилит	нормосилит	суперсилит	гипосилит	нормосилит	суперсилит	суперсилит	нормосилит
SiO ₂	72.39	76.62	79.41	85.28	86.27	88.55	91.44	68.39	65.45	88.8	90.61	80.88
TiO ₂	0.74	0.83	0.36	0.31	0.42	0.34	0.32	0.89	0.89	0.22	0.33	0.61
Al ₂ O ₃	15.33	12.58	13.07	9.81	10.04	8.17	4.99	20.33	22.51	7.15	6.37	14.14
Fe ₂ O ₃	1.85	2.28	0.49	0.32	0.4	0.36	0.75	1.03	0.95	0.35	0.53	0.5
FeO	0.84	0.42	0.45	0.49	0.26	0.24	0.18	0.58	0.42	0.89	0.1	0.02
MnO	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.38	0.03	0.02	0.01	0.14	0.01
MgO	0.65	0.44	0.57	0.19	0.23	0.36	0	1.09	1.03	0.3	0.28	0.48
CaO	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.24	0.32	0.1	0.1	0.1
Na ₂ O	0.21	0.18	0.13	0.11	0.06	0.05	0.06	0.09	0.1	0.05	0.04	0.07
K ₂ O	4.26	3.62	3.04	1.39	0.97	1.22	0.64	1.76	1.92	0.57	0.79	1.88
P ₂ O ₅	0.12	0.15	0.05	0.08	0.08	0.09	0.1	0.1	0.1	0.08	0.09	0.1
п.п.п.	3.5	2.78	2.32	2.01	1.27	0.61	1.13	5.56	6.38	1.6	0.73	1.22
Сумма	100.01	100.01	100	100.1	100.11	100.1	100.09	100.09	100.09	100.12	100.11	100.01
ГМ	0.26	0.21	0.18	0.13	0.13	0.1	0.07	0.33	0.38	0.1	0.08	0.19
Компонент	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	суперсилит	миосилит	нормосилит	нормосилит	миосилит	нормосилит	миосилит	гипосилит	нормосилит	суперсилит	миосилит	миосилит
SiO ₂	91.67	74.61	83.98	81.97	77.95	88.1	73.38	70.43	82.1	93.15	76.07	77.45
TiO ₂	0.29	0.93	0.41	0.63	0.8	0.27	0.79	0.96	0.42	0.1	0.65	0.67
Al ₂ O ₃	5.65	18.3	9.63	11.63	15.67	8.15	19.49	20.64	12.24	4.25	17.47	16.81
Fe ₂ O ₃	0.19	0.91	3.08	1.08	0.99	0.51	0.58	1.2	0.94	0.47	1.58	1.1
FeO	0.3	0.25	0.02	0.23	0.25	0.42	0.04	0.02	0.36	0.44	0.04	0.04
MnO	0.01	0.08	0.01	0.2	0.25	0.01	0.01	0.06	0.01	0.02	0.02	0.01
MgO	0.28	0.53	0.55	0.56	0.45	0.3	0.73	0.52	0.56	0.31	0.57	0.64
CaO	0.1	0.13	0.1	0.11	0.15	0.1	0.27	0.26	0.1	0.1	0.18	0.14
Na ₂ O	0.05	0.08	0.05	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05
K ₂ O	0.63	1.84	1.27	1.14	1.73	0.68	1.74	1.72	1.07	0.36	1.68	1.56
P ₂ O ₅	0.05	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.11	0.09	0.08
п.п.п.	0.89	2.49	0.93	2.3	1.86	1.44	2.85	4.05	2.08	0.74	1.61	1.47
Сумма	100.11	100.24	100.11	100	100.24	100.11	100.02	100	100.01	100.1	100.01	100.02
ГМ	0.07	0.27	0.16	0.17	0.23	0.11	0.28	0.32	0.17	0.06	0.26	0.24

Примечание. Литохимические модули пород рассчитываются по методике Я. Э. Юдовича [13].

Note. Lithochemical modules of the rocks are calculated according to Ya. E. Yudovich [13].

нормосилиты (ГМ 0.36–0.48 – нормально-гидролизатные).

По положению фигуративных точек составов пород на петрохимической диаграмме А. Г. Коссовской, М. И. Тучковой [5] отложения джеджимской свиты (1–6, 9–11) относятся к кварцевым, олигомиктовым и полимиктовым песчанкам; отложения асывовожской свиты (7, 8, 12) – к кварцевым и полимиктовым песчанкам.

Для более точной классификации пород, восстановления петрографического состава источников сноса, реконструкции физико-химических и геодинамических особенностей обстановок накопления нами были исследованы терригенные отложения асывовожской и джеджимской (в зоне контакта) свит на основе петрохимических модулей (отношений петрогенных оксидов). По значениям гидролизатного модуля (ГМ) – $(\text{TiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO} + \text{MnO}) / \text{SiO}_2$ [7, 13] в составе джеджимской свиты, расположенной на контакте с асывовожской свитой, присутствуют мономиктовые кварцевые песчанки (ГМ 0.06–0.1), олигомиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.11–0.19), мезомиктовые и полимиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.21–0.28); в асывовожской свите присутствуют мономиктовые кварцевые песчанки, мезомиктовые и полимиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.21–0.28). Известно, что чем выше значение этого модуля, тем более сильное и глубокое выветривание претерпели исходные породы источников сноса и тем выше зрелость осадочной породы. В результате можно сделать вывод, что исходные породы асывовожской свиты (по видимому, в основном песчанки джеджимской свиты) претерпели сильное выветривание. Можно отметить достаточно высокую зрелость пород асывовожской свиты; при этом снизу вверх по разрезу осадки становятся более зрелыми.

дованы терригенные отложения асывовожской и джеджимской (в зоне контакта) свит на основе петрохимических модулей (отношений петрогенных оксидов). По значениям гидролизатного модуля (ГМ) – $(\text{TiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO} + \text{MnO}) / \text{SiO}_2$ [7, 13] в составе джеджимской свиты, расположенной на контакте с асывовожской свитой, присутствуют мономиктовые кварцевые песчанки (ГМ 0.06–0.1), олигомиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.11–0.19), мезомиктовые и полимиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.21–0.28); в асывовожской свите присутствуют мономиктовые кварцевые песчанки, мезомиктовые и полимиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.21–0.28). Известно, что чем выше значение этого модуля, тем более сильное и глубокое выветривание претерпели исходные породы источников сноса и тем выше зрелость осадочной породы. В результате можно сделать вывод, что исходные породы асывовожской свиты (по видимому, в основном песчанки джеджимской свиты) претерпели сильное выветривание. Можно отметить достаточно высокую зрелость пород асывовожской свиты; при этом снизу вверх по разрезу осадки становятся более зрелыми.

вые песчанки, мезомиктовые и полимиктовые кварцевые песчанки и алевриты (ГМ 0.21–0.28). Известно, что чем выше значение этого модуля, тем более сильное и глубокое выветривание претерпели исходные породы источников сноса и тем выше зрелость осадочной породы. В результате можно сделать вывод, что исходные породы асывовожской свиты (по видимому, в основном песчанки джеджимской свиты) претерпели сильное выветривание. Можно отметить достаточно высокую зрелость пород асывовожской свиты; при этом снизу вверх по разрезу осадки становятся более зрелыми.

Рис. 6. Вариации медианных значений индекса CIA ($100 \times \text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$) в терригенных отложениях джеджимской, асывовожской и пижемской свит (по [6, 15]): 1–7, 11–21 (в шурфе) – породы джеджимской свиты в зоне контакта, 8–10, 22–24 – отложения асывовожской свиты

Fig. 6. Variations of median CIA index values ($100 \times \text{Al}_2\text{O}_3 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$) in terrigenous sediments of dzhedzhimskaya, asyvvozhskaya and pizhemskaia suites (according to [6, 15]): 1–7, 11–21 (in pit) – rocks of dzhedzhimskaya suite in the contact zone, 8–10, 22–24 – rocks of asyvvozhskaya suite

Выветривание пород на водосборах, особенно выветривание, происходящее в гумидном климате, существенным образом изменяет состав слагающих эти породы компонентов. При этом происходит вынос из пород наиболее растворимых (подвижных) элементов, и в корках выветривания накапливаются наиболее инертные окислы. В той или иной мере трансформированное процессами выветривания вещество поступает из областей размыва в конечные водоемы стока, где его зрелость, а также интенсивность процессов преобразования исходных пород в источниках сноса и, значит, косвенно климат на палеоводосборах могут быть оценены количественно по данным химического состава осадков [6].

Индекс химического выветривания CIA (Chemical Index of Alteration) [6, 14] в настоящее время широко используется как показатель климата в области размыва. Рассчитывается он по молекулярным количествам петрогенных окислов. Интенсивность химического выветривания в областях размыва напрямую коррелируется с палеоклиматом. Для осадочных образований гумидных климатических обстановок характерен вынос из полевых шпатов Ca, Na и K, что ведет к увеличению соотношения алюминия и щелочей в продуктах выветривания. В аридных и гляциальных обстановках в область аккумуляции, напротив, поступает слабо переработанный процессами выветривания на палеоводосборах материал. Представлен он в основном глинистыми минералами с относительно небольшими содержаниями алюминия и значительным количеством неизменных или слабо измененных полевых шпатов. Таким образом, невыветрелые породы харак-

теризуются значениями CIA порядка 50, тогда как сильно выветрелые разности имеют CIA до 100 единиц. Критерием для разграничения отложений, сформировавшихся в обстановках теплого и холодного климата, принято считать значение индекса CIA = 70 [6, 15].

На диаграмме вариаций медианных значений индекса CIA в терригенных отложениях асывовожской свиты (рис. 6) все значения исследуемых образцов близки к 70, т. е. находятся в «поле» сильно выветрелых пород. При этом на вопрос о возможных климатических обстановках однозначного ответа нет. Точки расположились у границы со значениями около 70 единиц. По данным О. П. Тельновой [8], в девоне господствовал теплый влажный климат тропической зоны. Следовательно, отложения асывовожской и пижемской свит являются продуктами размыва сильно выветрелых пород, сформированных в зоне гумидного климата. Зрелость осадков может быть связана в том числе с неоднократным их перемывом.

В отложениях асывовожской свиты присутствует древний плутогенный (глубинный) циркон (малакон), характерно малое количество обломков пород при резком преобладании обломков кварца. Все это указывает на то, что в петрофонде преобладали породы кислого состава, а «зрелость» материала указывает на процессы глубокого выветривания. С процессами глубокого выветривания связано также образование каолинита; на это же может указывать и присутствие калиевого полевого шпата (он более устойчив к выветриванию, чем плагиоклаз). Минералогическое описание отложений асывовожской свиты показало, что

они формировались при размыве сильно выветрелого гетерогенного субстрата [2]. Большинство размываемых пород относится к кислым магматическим и метаморфическим образованиям, определенную роль как источники размыва играли также основные и ультраосновные магматиты, в том числе повышенной щелочности, а также карбонатиты. Химический состав осадочных пород (в нашем случае существенно-кварцевых песчаников) может весьма резко отличаться от состава магматических пород, послуживших для них источником питания.

Результаты петрографических и литохимических исследований асывовожских песчаников в зоне контакта с рифейскими отложениями указывают на то, что в их составе содержатся продукты переотложения коры выветривания по подстилающим песчаникам джеджимской свиты.

Вывод

Геологическая позиция, а также литологические и петрографические особенности алмазосодержащих среднедевонских терригенных отложений Южного Тимана свидетельствуют об их осадочном образовании. В раннем палеозое в додевонское время в результате глубокой пенепленизации и интенсивного корообразования происходило переотложение, размыв и концентрирование алмазов и других полезных компонентов в благоприятных палеогеографических обстановках, в континентальных и прибрежно-морских условиях [1]. Базальные среднедевонские отложения Южного Тимана перекрыты старооскольским горизонтом живетского яруса со стратиграфическим перерывом, что может быть связано с нестабильной тектонической обстановкой осадконакопления в позднеэфельское время на Тимане.

Образование алмазосодержащих отложений в асывовожской свите на Южном Тимане могло происходить за счет латерального переноса из коренных источников или относительно удаленных коллекторов алмазов [2]. Приуроченность ископаемых россыпных проявлений алмазов к основанию терригенных образований, неровности нижнего контакта с подстилающими породами могут указывать на то, что аккумуляция алмазов происходила в результате процесса обогащения терригенных пород асывовожской свиты (ее базальных слоев), в том числе в результате перемыва нижележащих

отложений. В целом отмечается малая мощность продуктивных на алмазы отложений, невыдержанность мощностей и гранулометрического состава. Особенностью алмазоносных отложений также является наличие в них продуктов кор выветривания, зрелость осадков.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований РАН № 15-18-5-17.

Литература

1. Гракова О. В. Акцессорный ильменорит алмазодержащих среднедевонских пород Южного Тимана // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. № 10. С. 11–13.

2. Гракова О. В. Видовой состав, химические и типоморфные особенности акцессорных минералов девонских алмазодержащих отложений Южного и Среднего Тимана // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 3. С. 3–8.

3. Коссовская А. Г., Тучкова М. И. К проблеме минералогическо-петрохимической классификации и генезиса песчаных пород // Литология и полезные ископаемые. 1988. № 2. С. 8–24.

4. Макеев А. Б., Брянчинина Н. И. Новый взгляд на перспективы алмазоносности Южных районов Республики Коми // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. № 9. 1998. С. 7–11.

5. Макеев Б. А. Рентгеноструктурный анализ глин рифей-девонской межформационной зоны Деджимпарминского поднятия (р. Асывовж, Южный Тиман) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 20-й науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 39–43.

6. Маслов А. В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретация полученных данных: Учеб. пособие. Екатеринбург, 2005. 289 с.

7. Скляр Е. В. и др. Интерпретация геохимических данных: Учеб. пособие. М: Интернет Инжиниринг, 2001. 288 с.

8. Тельнова О. П. Палинологическое обоснование стратиграфии и корреляция девонских отложений возвышенности Деджимпарма (Южный Тиман) // Геология Европейского Севера России. Сыктывкар, 1999. Сб. 4. С. 5–11.

9. Шванов В. Н., Фролов В. Т., Сергеева Э. И. и др. Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов. СПб.: Недра, 1998. 352 с.

10. Щербakov Э. С. Условия залегания девонских отложений в карьере Асывовж (Южный Тиман) // Алмазы и алмазоносность Тимано-Уральского региона: Материалы всероссийского совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2001. С. 47–48.

11. Юдович Я. Э. Курс геохимии осадочных пород (избранные главы): Учеб. пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2001. 284 с.

12. Юдович Я. Э., Кемпус М. П. Минеральные индикаторы литогенеза. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 564 с.

13. Юдович Я. Э., Кемпус М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

14. Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites // Nature. 1982. V. 299. P. 71–717.

15. Visser J. N. J., Young G. M. Major element geochemistry and paleoclimatology of the Permo-Carboniferous glaciogene Dwyka Formation and postglacial mudrocks in Southern Africa // Palaeogeogr., Palaeoclimat., Palaeoecol., 1990. V. 81. P. 49–57.

References

1. Grakova O. V. *Aktsessornyi ilmenorutil almaszoderzhashchih srednedevonskih porod Yuzhnogo Timana* (Accessory ilmenorutil in diamond-bearing Middle Devonian South Timan). Vestnik of Institute of Geology Komi SC UB RAS, 2011, No. 10, pp. 11–13.

2. Grakova O. V. *Vidovoi sostav, himicheskie i tipomorfnye osobennosti aktsessornykh mineralov devonskih almaszoderzhashchih otlozhenii Yuzhnogo i Srednego Timana* (Species composition, chemical and typomorphic features of accessory minerals of Devonian diamond-bearing deposits of South and Middle Timan). Vestnik of Institute of Geology Komi SC UB RAS, 2014, No. 3, pp. 3–8.

3. Kossovskaya A. G., Tuchkova M. I. *K probleme mineralogo-petrohimicheskoi klassifikatsii i genezisa peschanykh porod* (Mineralogical and petrochemical classification and genesis of sand rocks). *Litologiya i poleznye iskopaemye*, 1988, No. 2, pp. 8–24.

4. Makeev A. B., Bryanchinina N. I. *Novyi vzglyad na perspektivy alamazonosti Yuzhnykh raionov Respubliki Komi* (New approach to diamond deposits of southern districts of Komi Republic). Vestnik of Institute of geology Komi SC UB RAS, No. 9, 1998, pp. 7–11.

5. Makeev B. A. *Rentgenostrukturnyi analiz glin rifei-devonskoi mezghformatsionnoi zony Dzhdzhimparminskogo podnyatiya* (r. Asyvvovzh, Yuzhnyi Timan) (X-Ray structural analysis of clays of Riphean-Devonian interformation zone of Dzhdzhimparma uplift). *Struktura, veschestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta*: Proceedings. Syktyvkar, Geoprint, 2011, pp. 39–43.

6. Maslov A. V. *Osadochnye poroda: metody izucheniya i interpretatsiya poluchennykh dannykh* (Sediments: methods of study and interpretation of data). Study book. Ekaterinburg, 2005, 289 pp.

7. Sklyarov E. V. et al. *Interpretatsiya geohimicheskikh dannykh* (Interpretation of geochemical data) Study book. Moscow, 2001, 288 pp.

8. Telnova O. P. *Palinologicheskoe obosnovanie stratigrafii i korrelyatsiya devonskih otlozhenii vozvyshtennosti Dzhdzhimparma (Yuzhnyi Timan)* (Palinological confirmation of stratigraphy and correlation of Devonian rocks in Dzhdzhimparma uplift (South Timan)). *Geologiya Evropeiskogo Severa Rossii*. Syktyvkar, 1999, No. 4, pp. 5–11.

9. Shvanov V. N., Frolov V. T., Sergeeva E. I. et al. *Sistematika i klassifikatsiya osadochnykh porod i ih analogov* (Systematics and classification of sediments and their analogues). Saint-Petersburg, Nedra, 1998, 352 pp.

10. Scherbakov E. S. *Usloviya zaleganiya devonskih otlozhenii v karere Asyvvovzh (Yuzhnyi Timan)* (Occurrence conditions of Devonian rocks in Asyvvovzh pit (South Timan)). *Almazы i alamazonosnost Timano-Uralskogo regiona*: Proceedings. Syktyvkar, Geoprint, 2001, pp. 47–48.

11. Yudovich Ya. E. *Kurs geohimii osadochnykh porod (izbrannye glavy)* (Treatise on geochemistry of sediments (selected chapters)). Study book. Syktyvkar, SyktGU, 2001, 284 pp.

12. Yudovich Ya. E., Ketris M. P. *Mineralnye indikatory litogeneza* (Mineral indicators of lithogenesis). Syktyvkar, Geoprint, 2008, 564 pp.

13. Yudovich Ya. E., Ketris M. P. *Osnovy litohimii* (Lithochemistry basics). Saint-Petersburg, Nauka, 2000, 479 pp.

14. Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. *Nature*. 1982, V. 299, pp. 715–717.

15. Visser J. N. J., Young G. M. Major element geochemistry and paleoclimatology of the Permo-Carboniferous glaciogene Dwyka Formation and postglacial mudrocks in Southern Africa. *Palaeogeogr., Palaeoclimat., Palaeoecol.*, 1990, V. 81, pp. 49–57.

Рецензент

к. г.-м. н. Л. И. Ефанова