ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ ДОЛИНЫ РЕКИ ШАРЬЮ (ГРЯДА ЧЕРНЫШЕВА)

И. В. Кряжева¹, Д. В. Пономарев¹, Т. ван Кольфсхотен², Й. ван дер Плихт^{2,3}

¹Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия; *Innageologi@mail.ru*,

²Лейденский университет, Лейден, Нидерланды,

³Центр изотопных исследований, Гронинген, Нидерланды

Голоценовая история фауны мелких млекопитающих представляет интерес как пример трансформации сообществ под воздействием естественной динамики климата. Объектами изучения являлись 2720 щечных зубов мелких млекопитающих из местонахождений долины р. Шарью (левый приток р. Усы), которые исследовались стандартными палеонтологическими методами. Для датирования ископаемых комплексов использовался ¹⁴C УМС-метод. Местонахождения представляют собой зоогенные скопления с массовыми остатками позвоночных животных. В результате описаны две фазы развития микротериофауны гряды Чернышева: субатлантического и современного периодов. Установлено, что в субатлантическое время микротериофауна гряды Чернышева имела типичный лесной облик и была практически идентична синхронным сообществам мелких млекопитающих Приполярного Урала и сильно контрастировала с сообществами восточного макросклона Полярного Урала. Различия в видовых составах костных остатков грызунов из Шарью-2 и Шарью-3, очевидно, связаны с деятельностью разных видов пернатых хищников (дневных хищников и сов). Различия современных комплексов мелких млекопитающих гряды Чернышева и сопредельных территорий объясняется тафономическими причинами.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, поздний голоцен, гряда Чернышева, северо-восток европейской части России.

LATE HOLOCENE SMALL MAMMALS FROM LOCALITIES OF SHARYU RIVER VALLEY (CHERNYSHEV'S RIDGE)

I. V. Kryazheva¹, D. V. Ponomarev¹, T. van Kolfschoten², J. van der Plicht^{2,3}

¹Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktывkar,

²Leiden University, Leiden, Netherlands,

³Center for Isotope Research, Groningen, Netherlands

The Holocene history of small mammal fauna is of interest as an example of transformation of communities under the natural changes of climate. Study object were 2720 molars of small mammals from localities in Sharyu River valley (left tributary of Usa River). Molars were studied by standard palaeontological techniques. ¹⁴C AMS method was used for dating of fossil assemblages. All localities are zoogenic sites with abundant fossil remains of vertebrates. In the result, two phases of micromammalian fauna development in the Chernyshev's Ridge are described: Subatlantic and modern periods. It was revealed that typical taiga forest assemblages of small mammals inhabited the Chernyshev's Ridge during Subatlantic time. This fauna was nearly identical to micromammalian communities of the same interval in the Subpolar Urals but contrasted to tundra assemblages of the eastern slope of the Polar Urals. Species composition differences between Sharyu-2 and Sharyu-3 were caused by the hunting activity of different species of avian predators (diurnal raptors and owls). Alternations between recent micromammalian assemblages of the Chernyshev's Ridge and communities of adjacent territories are linked to differences in taphonomy.

Keywords: small mammals, Late Holocene, Chernyshev's ridge, northeastern part of European Russia.

Введение

Исследования быстро эволюционировавших мелких млекопитающих являются одним из перспективных направлений в палеотериологии. Во всем мире они используются в качестве руководящих ископаемых и индикаторов определенных климатов и ландшафтов при реконструкции природной обстановки прошлого. Их остатки распространены в континентальных отложениях Палеарктики и весьма многочисленны в пещерных местонахождениях Урала.

В результате деятельности хищников и в редких случаях человека в карстующихся палеозойских породах Урала и его предгорий сформировались захоронения костных остатков позвоночных. Пещерные зоогенные скопления костных остатков занимают одно из первых мест по информативности среди других типов захоронений остатков плейстоценовых и голоценовых позвоночных. Остеологический материал накапливается в них, как правило, или на месте гибели животного, или вблизи него, причем ископаемый комплекс воспроизводит видовой состав исходного естественного сообщества в максимально возможной полноте [17, 18].

В данной работе приводятся результаты изучения трех местонахождений гряды Чернышева, расположенных на реке Шарью (левый приток в нижнем течении р. Усы, Усинск, Республика Коми) (рис. 1). Гряда Чернышева оставалась неизученным районом в отношении истории микротериофауны, выявлению специфики которой посвящена настоящая работа.

Материал и методы

Местонахождение Шарью-1 (66°09.186' с. ш., 58°43.792' в. д.) расположено на правом берегу реки, в 1.5 км ниже по течению от геологического памятника природы Окно, в скальном выходе известняков силура, и представляет собой небольшой грот высотой 1 м, шириной 0.8 м и глубиной 2 м (рис. 1).

Разрез рыхлых отложений состоит из двух слоев, представленных алевроитовыми и суглинистыми отложениями (рис. 2). Всего из отложений грота определено 1024 зуба мелких млекопитающих (см. таблицу). Радиоуглеродная датировка, сделанная по костям грызунов из слоя 2 (глубина 17 см), показала возраст

Рис. 1. Карта местонахождений позднеголоценовых мелких млекопитающих

Fig. 1. Locations of Late Holocene small mammals

(1510 ± 35) некалиброванных л. н. (GrA-66862), что приходится на поздний голоцен (субатлантик).

В местонахождении Шарью-1 встречены останки мелких птиц, зайцеобразных, насекомых, грызунов и рыб с преобладанием последних. Раздробленность костей невысокая.

Местонахождение Шарью-2 ($66^{\circ}09.152'$ с. ш., $58^{\circ}43.952'$ в. д.) расположено в 200 м выше по течению от грота Шарью-1 на высоте 30 м от уреза воды. Оно

Количество щечных зубов и соотношение остатков (в скобках, %) мелких млекопитающих из местонахождений р. Шарью

Quantity of cheek teeth and ratio of remains (in brackets, %) of small mammals from locations near Sharyu River

Вид / Species	Шарью-1 Sharyu-1	Шарью-2 Sharyu-2	Шарью-3 Sharyu-3
<i>Sciurus vulgaris</i>	1(0.1)	—	64(11.9)
<i>Sicista betulina</i>	3(0.3)	—	—
<i>Ondatra zibethicus</i>	—	—	18(3.4)
<i>Clethrionomys</i> sp.	344(33.6)	372(32)	60(11.2)
<i>Dicrostonyx</i> sp.	7(0.7)	—	—
<i>Lemmus sibiricus</i>	14(1.4)	—	—
<i>Myopus schisticolor</i>	97(9.7)	—	—
<i>Arvicola amphibius</i>	152(14.8)	—	130(24.3)
<i>Microtus oeconomus</i>	259(25.3)	54(4.7)	21(3.9)
<i>Microtus agrestis</i>	147(14.3)	735(63.3)	242(45.2)
Всего / Total	1024	1161	535

представляет собой скальный выступ под обитаемым гнездом длиной 1 м и глубиной 0.7 м (рис. 4, а). На протяжении всего полевого сезона с этого выступа было собрано 92 погадки, из которых в лаборатории было извлечено и определено 1160 зубов грызунов (см. таблицу).

Местонахождение Шарью-3 ($66^{\circ}09.871'$ с. ш., $58^{\circ}44.654'$ в. д.) расположено на левом берегу р. Шарью, в 2 км выше по течению от устья р. Дурной, в скальном

Рис. 2. Общий вид (а) и план-схема (б) грота Шарью-1: 1 — коренная порода, 2 — четвертичные отложения, 3 — раскоп, 4 — линия продольного профиля АВ

Fig. 2. General view (a) and scheme (b) of grotto Sharyu-1: 1 — bedrock, 2 — Quaternary deposits, 3 — pit, 4 — longitudinal profile AB

Рис. 3. Фото (а) и схематический геологический разрез (б) рыхлых отложений грота Шарью-1: 1 — коренная порода (известняк), 2 — почвенно-растительный слой (ПРС), 3 — суглинок, 4 — неокатанные обломки известняка (0.5—3 см), 5 — костные остатки, 6 — глыбы известняка

Fig. 3. Photo (a) and schematic section (b) of loose sediments of grotto Sharyu-1: 1 — bedrock (limestone), 2 — top soil, 3 — loam, 4 — limestone debris (0.5—3 cm), 5 — bone remains, 6 — limestone blocks

Рис. 4. Местонахождения Шарью-2 (а) и Шарью-3 (б)

Fig. 4. Locations Sharyu-2 (a) and Sharyu-3 (b)

выходе известняков карбона на высоте 20 м от уреза воды. Оно представляет собой небольшую нишу (рис. 4, б), в которой было обнаружено скопление погадок. Рыхлые отложения ниши представлены почвенно-растительным слоем мощностью менее 5 см. Собрано 54 погадки, из которых в лаборатории было извлечено и определено 535 зубов грызунов (см. таблицу). Судя по наличию остатков ондатры, интродуцированной в Республике Коми в 1930-е гг., возраст комплекса остатков не превышает 80 лет [21].

Раскопки в гроте Шарью-1 проводились по стандартным методикам [13–15]. Рыхлые отложения вскрывались условными горизонтами мощностью не более 10 см. Извлечение костных остатков млекопитающих производилось при помощи ручной промывки вмещающей породы на ситах с размером ячеек 0.8–1.0 мм.

Полученная смесь костей и обломков породы высушивалась и из нее вручную отбирались остатки позвоночных.

Ввиду того, что в роде серых полевков наиболее диагностичны только первые нижние коренные зубы, для расчета каждого вида полевков все зубы, определенные как *Microtus* sp., распределялись по видам в соответствии с распределением первых нижних коренных. Морфологически сходные виды, такие как полевка Миддендорфа — темная полевка и лесной лемминг — сибирский лемминг, диагностика которых представляет определенные трудности, разделялись нами по методике, описанной Н. Г. Смирновым с соавторами [19]. Моляры трех видов рода *Clethrionomys* идентифицировались согласно методу, предложенному А. В. Бородиным [4].

УМС ^{14}C -датировка по костям грызунов была выполнена Й. ван дер Плихтом (Центр изотопных исследований университета г. Гронинген, Нидерланды).

Результаты и их обсуждение

Самый древний ископаемый комплекс (субатлантик), обнаруженный в долине реки Шарью, происходит из отложений грота Шарью-1. Здесь были найдены красная и рыжая полевки (вместе 33.9 %), полевка-экономка (21.5 %), водяная полевка (14.8 %), темная полевка (11.2 %), лесной (6.3 %), сибирский (1.4 %) и копытный (0.7 %) лемминги (рис. 5).

На севере Урала сообщества субатлантика известны также из местонахождений Кожым-2 и -4 (западный склон Приполярного Урала) и Янгана-Пе-4 (восточный макросклон Полярного Урала). В ископаемом комплексе из грота Кожым-2 с датировкой (1655 ± 35) некалиброванных л. н. (GrA-49355) были найдены водяная полевка (29.3 %), красная и рыжая полевки (39.5 %), темная полевка (15.6 %), полевка-экономка (5 %), узкочерепная полевка (2.7 %), сибирский (5 %) и лесной (2.9 %) лемминги [7, 10, 11].

В сообществе из грота Кожым-4 (датировка (1620 ± 30) некалиброванных л. н. GrA-66465) были определены красная и рыжая полевки (вместе 34.1 %), темная полевка (24.3 %), водяная полевка (16.2 %), полевка-экономка (11.1 %), лесной (10.8 %), сибирский (3 %) и копытный (0.5 %) лемминги [9, 10].

В фауне из слоя 2 Янгана-Пе-4 с датировкой (1720 ± 120) некалиброванных л. н. найдены сибир-

Рис. 5. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в процентах) в гроте Шарью-1 (а), слое 2 Кожым-2 (б) и Кожым-4 (с) и Янгана-Пе-4 (д)

Fig. 5. Ratio of small mammals remains (percentage) in grotto Shar'yū-1 (a), layer Kozhym-2 (b) and Kozhym-4 (c) and Yangana-Pe (d)

ский (25.2 %) и копытный (24.5 %) лемминги, узкочерепная полевка (11.8 %), рыжие полевки (21.6 %), темная полевка (7.8 %), водяная полевка (3 %), белка (2 %), лесной лемминг (1.6 %) и единичные зубы полевки-экономки [12].

По палинологическим данным, в это время на равнинной территории Республики Коми и в ее горной части получили развитие темновойные леса из ели со значительной примесью сосны. Отличительной чертой того времени для северо-востока европейской части России являлся расцвет еловых лесов, чему способствовало потепление — так называемый малый климатический оптимум [5, 16]. Потепление климата привело к формированию северотаежных еловых лесов с примесью сосны и березы и на Полярном Урале (хребет Енганепэ), о чем свидетельствуют сохранившиеся с начала среднего субатлантического периода реликтовые образования чернично-зеленомошных ельников [6].

Из представленных материалов видно, что в субатлантическое время микротериофауна гряды Чернышева имела типичный лесной облик и была практически идентична сообществам мелких млекопитающих Приполярного Урала, что хорошо согласуется с данными по истории растительности и ландшафтов северо-востока Европы в это время. Различия в составе фауны мелких млекопитающих гряды Чернышева и восточного макросклона Полярного Урала связаны, скорее всего, с меридиональным градиентом природных условий.

Комплексы остатков мелких млекопитающих из погадок Шарью-2 и Шарью-3 дают представление о современной фауне района исследований.

В сообществе Шарью-2 были найдены остатки мелких млекопитающих только из микроразмерной группы — темная полевка (63.3 %), красная и рыжая полевки (вместе 32 %) и полевка-экономка (4.7 %). В фауне Шарью-3 видовой состав более разнообразный — темная полевка (45.2 %), водяная полевка (24.3 %), белка (11.9 %), красная и рыжая полевки (11.2 %), полевка-экономка (3.9 %) и ондатра (3.4 %). Такие существенные различия в составе одновозрастных и близко расположенных друг к другу локальных фаун связаны, скорее всего, с избирательностью отлова разными видами пернатых хищников. Это подтверждает и размер погадок в Шарью-2 — от 2 до 4 см, в то время как в Шарью-3 погадки крупнее — от 4 до 6 см (рис. 6). Также это подтверждается количеством и сохранностью костного материала. Погадки из Шарью-2 принадлежат дневным пернатым хищникам — это было установлено в первую очередь по внешнему виду птенцов в гнезде (рис. 3, а), а во-вторых, по количеству и сохранности костного материала в погадках [8, 23]. Несмотря на маленький размер погадок (от 2 до 4 см), в них содержались зубы от двух и более особей, также было отмечено, что эмаль на зубах частично растворена и эродирована (зубы *Clethrionomys*), а количество костей относительно небольшое.

Рис. 6. Погадки из местонахождений Шарью-2 (а) и Шарью-3 (б)

Fig. 6. Pellets from locations Sharyu-2 (a) and Sharyu-3 (b)

В погадках из Шарью-3 содержались костные остатки от одной, реже двух особей. Эмаль на зубах сохранила гладкость и блеск (зубы *Clethrionomys*, *Sciurus vulgaris* и *Ondatra zibethicus*). Некоторые погадки содержали целые части черепов с зубами (*Arvicola amphibius*, *Clethrionomys*, *Microtus oeconomus* и *Microtus agrestis*) и сочлененные элементы скелета. Все эти признаки указывают на то, что эти погадки, скорее всего, принадлежат ночным пернатым хищникам [8, 23].

В современной фауне Приполярного и Северного Урала наблюдается похожая картина (рис. 7). В местонахождении Кожым-5 [9, 10] были обнаружены темная полевка (37.6 %), водяная полевка (19.9 %), полевка-экономка (19.5 %), лесной лемминг (12.2 %), красная и рыжая полевки (вместе 9.9 %), белка (0.5 %) и

Рис. 7. Соотношение долей остатков мелких млекопитающих (в процентах) в сообществах Шарью-2 (а), Шарью-3 (б), Шежым (с), Кожым-5 (д) и Шугер (е)

Fig. 7. Ratio of small mammals remains (percentage) in community Sharyu-2 (a), Sharyu-3 (b), Shezhym-5 (d) and Shchuger (e)

ондатра (0.4 %). В погадках, собранных в долине реки Шугер [11], были определены полевка-экономка (40.4 %), белка (25 %), темная полевка (12.4 %), лесной лемминг (11 %), красная и рыжая полевки (вместе 6 %) и водяная полевка (4.4 %). В местонахождении Шежым преобладают остатки белки (29.8 %), примерно в равных долях (по 8—11 %) представлены остатки водяной, темной полевки, полевки-экономки, лесного лемминга. Полевки трех видов *Clethrionomys* вместе составили 13 % [20].

Интересен и тот факт, что в погадках, найденных в долине реки Шарью, не было обнаружено остатков лесного лемминга, в то время как в сообществе мелких млекопитающих Приполярного и Северного Урала на их долю приходится более 10 % от всех остатков. Лесной лемминг населяет таежную зону: ельники разного типа, сосново-еловые леса, а также обитает в смешанных лесах и ивняковых зарослях по берегам рек [22]. Такие биотопы в настоящее время наблюдаются на Приполярном, Северном Урале и на территории гряды Чернышева [1—3]. Поэтому можно предположить, что полное отсутствие лесного лемминга в локальных ориктоценозах гряды Чернышева связано с избирательностью пернатых хищников при отлове своих жертв.

Выводы

В результате исследований было установлено, что в субатлантическое время микротериофауны гряды Чернышева и Приполярного Урала были практически идентичными и имели лесной облик, характерный для всех позднеголоценовых сообществ северо-востока Европы, что неудивительно, учитывая географическую близость районов. Эти фауны отличались от сообществ восточного макросклона Полярного Урала, которые имели типичный тундровый состав и экологическую структуру. В современных (последние 80 лет) комплексах мелких млекопитающих гряды Чернышева и сопредельных территорий наблюдаются явные различия, имеющие тафономическую природу.

Авторы благодарны сотруднику Института геологии Коми НЦ УрО РАН А. А. Кряжеву за помощь при проведении полевых работ.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 16-35-00116 мол_а и Программы фундаментальных исследований УрО РАН №15-18-5-38.

Литература

1. Атлас Коми АССР. М., 1964. 112 с.
2. Биоразнообразие водных и наземных экосистем бассейна реки Кожым (северная часть национального парка «Югыд ва») / Отв. редактор Е. Н. Патова. Сыктывкар, 2010. 192 с.
3. Бобрецов А. В., Лукьянова Л. Е., Порошин Е. А. Структура и динамика населения мелких млекопитающих предгорий Северного Урала // Закономерности зональной организации комплексов животного населения Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 2005. С. 5—20. (Тр. Коми научного центра УрО Российской АН, № 177).
4. Бородин А. В. Определитель зубов полевок Урала и Западной Сибири (поздний плейстоцен — современность). Екатеринбург: УрО РАН, 2009. 100 с.
5. Голубева Ю. В. Климат и растительность голоцена на территории республики Коми // Литосфера. 2008. № 2. С. 124—132.
6. Дымов А. А., Загирова С. В., Марченко-Вагапова Т. И. Формирование еловых биогеоценозов на Полярном Урале // Лесоведение. 2011. № 5. С. 12—23.
7. Кряжева И. В. Мелкие млекопитающие позднего плейстоцена и голоцена Приполярного Урала: Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. Сыктывкар. 2012. 18 с.
8. Кряжева И. В. Особенности накопления и сохранности костных остатков мелких млекопитающих в карстовых полостях Приполярного Урала // Вестник Института геологии. Сыктывкар. 2012. № 6. С. 8—10.
9. Кряжева И. В. Позднеголоценовые мелкие млекопитающие из новых местонахождений реки Кожым (Приполярный Урал) // Современная палеонтология: классические и новейшие методы. Москва, 2013. М.: ПИН РАН. С. 24.
10. Кряжева И. В., Пономарев Д. В. Микротериофауна западного склона Приполярного Урала в позднем плейстоцене и голоцене (р. Кожым) // Вестник Института геологии. Сыктывкар. 2014. № 5. С. 3—9.
11. Кряжева И. В., Пономарев Д. В., Т. ван Кольфсхотен, Х. ван дер Плихт. История формирования современных сообществ микромамманий Приполярного Урала // Экология. 2012. № 6. С. 434—441.
12. Кузьмина Е. А., Головачев И. Б. Позднеголоценовые грызуны из местонахождения Ян-гана-Пе-4 на Полярном Урале // Развитие идей академика С. С. Шварца в современной экологии: Материалы конф. Екатеринбург, 1999. С. 100—104.
13. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных отложений. М.: Госгеолтехиздат, 1955. Ч. 2. 486 с.
14. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных отложений. Л.: Недра, 1987. 308 с.
15. Методы изучения осадочных пород. М.: Госгеолтехиздат, 1957. Т. 2. 564 с.
16. Никифорова Л. Д. Динамика ландшафтных зон голоцена северо-востока европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М.: Наука, 1982. С. 154—162.
17. Оводов Н. Д. Палеофаунистическое изучение пещер // Общие методы изучения истории современных экосистем. М.: Наука, 1979. С. 102—128.
18. Смирнов Н. Г. Динамика видов и их комплексов как предмет исследований исторической экологии // Экология. 2006. № 6. С. 452—456.
19. Смирнов Н. Г., Головачев И. Б., Бачура О. П., Кузнецова И. А., Чепраков М. И. Сложные случаи определения зубов грызунов из отложений позднего плейстоцена и голоцена тундровых районов Северной Евразии // Материалы по истории и современному состоянию фауны севера Западной Сибири: Сб. науч. тр. Челябинск, 1997. С. 60—90.
20. Смирнов Н. Г., Садыкова Н. О. Источники погрешностей при фаунистических реконструкциях в четвертичной палеозоологии // Четвертичная палеозоология на Урале. Екатеринбург: Изд. Урал. ин-та, 2003. С. 98—115.
21. Турьева В. В. Эколого-фаунистический обзор мелких млекопитающих западного склона Приполярного Урала // Животный мир западного склона Приполярного Урала (Труды Коми филиала АН СССР). Сыктывкар. 1977. С. 44—101.
22. Фауна Европейского Северо-Востока России. Млекопитающие. СПб.: Наука, 1994. Т. II. ч. 1. 280 с.
23. Mayhew D. F. Avian predators as accumulators of fossil mammal material // Boreas. 1977. Т. 6. № 1. P. 25—31.

References

1. Atlas of Komi ASSR. Moscow, 1964, 112 pp.
2. *Bioraznoobrazie vodnyh i nazemnyh ekosistem basseina reki Kozhym (severnaya chast natsionalnogo parka "Yugyd va")* (Biodiversity of water and land ecosystems of the Kozym River basin (northern part of national park Yugydva)). Ed. E. N. Patova. Syktyvkar, 2010, 192 pp.
3. Bobretsov A. V., Lukyanova L. E., Poroshin E. A. *Struktura i dinamika naseleniya melkih mlekopitayuschih predgorii Severnogo Urala* (Structure and dynamics of population of small mammals of Northern Urals). In: *Zakonomernosti zonalnoi organizatsii kompleksov zhivotnogo naseleniya evropeiskogo Severo-Vostoka* (Regularities of zonal organization of complexes of animal population of European North-East). Syktyvkar, 2005, pp. 5—20.
4. Borodin A. V. *Opredelitel zubov polevok Urala i Zapadnoi Sibiri (pozdnii pleistotsen-sovremennost)* (Guide for teeth of voles from Urals and Western Siberia (Late Pleistocene-modern times)). Ekaterinburg, UB RAS, 2009, 100 pp.

5. Golubeva Yu. V. *Klimat i rastitelnost golotsena na territorii respubliki Komi* (Climate and vegetation in Holocene in Komi Republic). *Litosfera*, 2008, No. 2, pp. 124–132.
6. Dymov A. A., Zagirova S. V., Marchenko-Vagapova T. I. *Formirovanie elovyh biogeotsenozov na Polyarnom Urale* (Formation of fur biogeocenoses in Polar Urals). *Lesovedenie*, 2011, No. 5, pp. 12–23.
7. Kryazheva I. V. *Melkie mlekopitayushchie pozdnego pleistotsena i golotsena Pripolyarnogo Urala* (Small mammals in Late Pleistocene and Holocene in Subpolar Urals). Extended abstract of PhD dissertation (geology and mineralogy). Syktyvkar, 2012, 18 pp.
8. Kryazheva I. V. *Osobennosti nakopleniya i sohrannosti kostnykh ostatkov melkih mlekopitayushchikh v karstovykh polostyakh Pripolyarnogo Urala* (Special features of accumulation and preservation of bone remnants of small mammals in karst voids of Subpolar Urals). *Vestnik of Institute of geology*. Syktyvkar, 2012, No. 6, pp. 8–10.
9. Kryazheva I. V. *Pozdnegolotsenovyie melkie mlekopitayushchie iz novykh mestonahozhdenii reki Kozhym* (Pripolyarnyi Ural) (Late Holocene small mammals from new locations of Kozhym River (Subpolar Urals). In: *Sovremennaya paleontologiya: klassicheskie i noveishie metody* (Modern paleontology: classical and newest methods). Moscow, 2013
10. Kryazheva I. V., Ponomarev D. V. *Mikroteriofauna zapadnogo sklona Pripolyarnogo Urala v pozdnem pleistotsene i golotsene (r. Kozhym)* (Microteriofauna of western slope of Subpolar Urals in Late Pleistocene and Holocene (Kozhym river)). *Vestnik of Institute of geology*. Syktyvkar, 2014, No. 5, pp. 3–9.
11. Kryazheva I. V., Ponomarev D. V., T. van Kol'fshoten, H. van der Pliht *Istoriya formirovaniya sovremennykh soobshchestv mikromammalii Pripolyarnogo Urala* (History of formation of modern communities of micromammals of Subpolar Urals). *Ekologiya*. 2012, No. 6, pp. 434–441.
12. Kuzmina E. A., Golovachev I. B. *Pozdnegolotsenovyie gryzuny iz mestonahozhdeniya Yan-gana-Pe-4 na Polyarnom Urale* (Late Holocene gnawers from location Yanganape in Subpolar Urals). *Proceedings*, Ekaterinburg, 1999, pp. 100–104.
13. *Metodicheskoe rukovodstvo po izucheniyu i geologicheskoi semke chetvertichnykh otlozhenii* (Guide to study and geological survey of Quarternary deposits). Moscow, Gosgeoltekhizdat, 1955, Ch. 2, 486 pp.
14. *Metodicheskoe rukovodstvo po izucheniyu i geologicheskoi s'emke chetvertichnykh otlozhenii* (Guide to study and geological survey of Quarternary deposits). Leningrad, Nedra, 1987, 308 pp.
15. *Metody izucheniya osadochnykh porod* (methods of study of sedimentary rocks). Moscow, Gosgeoltekhizdat, 1957, V. 2, 564 pp.
16. Nikiforova L. D. *Dinamika landshaftnykh zon golotsena Severo-Vostoka Evropeiskoi chasti SSSR* (Dynamics of landscape zones of Holocene in north-western part of European USSR). In: *Razvitiye prirody territorii SSSR v pozdnem pleistotsene i golotsene* (Development of nature of USSR area in Late Pleistocene and Holocene). Moscow, Nauka, 1982, pp. 154–162.
17. Ovodov N. D. *Paleofaunisticheskoe izuchenie pescher* (Paleofaunistic study of caves). In: *Obshchie metody izucheniya istorii sovremennykh ekosistem* (General methods of study of history of modern ecosystems). Moscow, Nauka, 1979, pp. 102–128.
18. Smirnov N. G. *Dinamika vidov i ih kompleksov kak predmet issledovaniya istoricheskoi ekologii* (Species and their complexes dynamics as object of historical ecology). *Ekologiya*, 2006, No. 6, pp. 452–456.
19. Smirnov N. G., Golovachev I. B., Bachura O. P., Kuznetsova I. A., Cheprakov M. I. *Slozhnye sluchai opredeleniya zubov gryzunov iz otlozhenii pozdnego pleistotsena i golotsena tundrovyykh raionov Severnoi Evrazii* (Problems of determination of gnawer species from Late Pleistocene and Holocene deposits of Eurasia tundra). In: *Materialy po istorii i sovremennomu sostoyaniyu fauny severa Zapadnoi Sibiri* (Materials on history and modern state of fauna of northern Western Siberia). Chelyabinsk, 1997, pp. 60–90.
20. Smirnov N. G., Sadykova N. O. *Istochniki pogreshnostei pri faunisticheskikh rekonstruktsiyakh v chetvertichnoi paleozoologii* (Sources of errors at faunistic reconstructions in Quarternary paleozoology). In: *Chetvertichnaya paleozoologiya na Urale* (Quarternary paleozoology in Urals). Ekaterinburg, 2003, pp. 98–115.
21. Tureva V. V. *Ekologo-faunisticheskii obzor melkih mlekopitayushchikh zapadnogo sklona Pripolyarnogo Urala* (Ecological faunistic review of small mammals of western slope of Subpolar Urals). In: *Zhivotnyi mir zapadnogo sklona Pripolyarnogo Urala* (Animal world of western slope of Subpolar Urals). Syktyvkar, 1977, pp. 44–101.
22. *Fauna evropeiskogo Severo-Vostoka Rossii. Mlekopitayushchie* (Fauna of European north-east of Russia. Mammals). V. II. part 1. St-Petersburg, Nauka, 1994, 280 pp.
23. Mayhew D. F. Avian predators as accumulators of fossil mammal material. *Boreas*. 1977, V. 6, No. 1, pp. 25–31.