ПЕТРОГЕНЕЗИС И ГЕОДИНАМИКА ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ВУЛКАНИТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПАЙ-ХОЯ

Т. А. Канева

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

ta_kaneva@mail.ru

До настоящего времени позднедокембрийские магматические образования в составе Амдерминского блока Пай-Хоя в плане минерального и химического составов, их эволюции и палеогеодинамической позиции были недостаточно изучены. В работе приводятся результаты изучения позднедокембрийских магматических образований Северо-Западного Пай-Хоя. Были использованы методы оптической и электронной микроскопии, химического и изотопного анализа. Установлено, что позднедокембрийские магматические образования Северо-Западного Пай-Хоя формировались в островодужной надсубдукционной обстановке и обстановке задугового спрединга. Геологические, петрографические и петрогеохимические данные свидетельствуют о существовании двух пространственно разобщенных палеодуг. Породы морозовской свиты представляют собой фрагменты позднерифейской Морозовской палеоостровной дуги и области задугового спрединга, а вулканы сокольнинской свиты являются реликтами более молодой Сокольнинской палеоостровной дуги рифейско-вендского возраста. Фракционная кристаллизация являлась основным механизмом эволюции расплавов, из которых были сформированы магматические породы морозовской и сокольнинской свит.

Ключевые слова: зона субдукции, островная дуга, вулканогенные породы, клинопироксен, фракционная кристаллизация, Северо-Западный Пай-Хой.

PETROGENESIS AND GEODYNAMICS OF VOLCANIC ROCKS LATE PRECAMBRIAN THE NORTHWEST PAY-KHOY

T. A. Kaneva

Institute of Geology of Komi SC UD of RAS, Syktyvkar

Mineral and chemical composition of the Late Precambrian igneous rocks of northwestern Pay-Khoy, their evolution and paleogeodynamic position to date have been insufficiently studied. The results of the study of the Late Precambrian igneous rocks of northwestern Pay-Khoy are given in the publication. We used the methods of optical and electron microscopy, chemical and isotopic analysis. It was found that the Late Precambrian igneous rocks of northwestern Pay-Khoy were formed in the island-suprasubduction environment and back-arc spreading environment. Geological, petrographic and petrogeochemical data suggested the existence of two spatially separated island arcs. The rocks of morozovskaya suite recorded as early stage of island arc magmatism, and situation back-arc spreading, and sokolninskaya suite - developed stage. Fractional crystallization was the main mechanism of evolution of the melts from which Late Precambrian igneous rocks of northwestern Pay-Khoy were formed.

Keywords: subduction zone, island arc, volcanic rocks, clinopyroxene, fractional crystallization, Late Precambrian igneous rocks, northwestern Pay-Khoy.

Введение

В пределах западного склона Полярного Урала известны выходы вулканогенных пород рифейско-вендского возраста, выделяемые в составе единой островодужной бедамельской серии (RF₃—Vbd). Они распространены фрагментарно в пределах поднятий Оченырда, Манитанырда и Енганепэ. Докембрийские образования Северо-Западного Пай-Хоя, входящие в состав Амдерминского блока, по характеру разреза сопоставляются с полярно-уральскими доуралидами.

Стратиграфическая последовательность верхнерифейско-вендских вулканогенно-осадочных толщ в составе Амдерминского блока Пайхоянского антиклинория до сих пор является предметом многочисленных дискуссий. До настоящего времени позднедокембрийские магматические образования в плане минерального и химического состава, их эволюции и условий формирования были недостаточно изучены.

Аналитические методы

Содержания породообразующих оксидов определялись традиционным весовым химическим методом в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) и анализировались рентгеноспектральным флуоресцентным методом в лаборатории Института геологии Коми НЦ РАН; разделение железа произведено методом мокрой химии.

Редкие и рассеянные элементы изучались методом масс-спектрометрии с индуктивно-связан-

ной плазмой (ISP—MS) во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) и в Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН).

Химический состав порфировых вкрапленников клинопироксена был проанализирован на спектральном электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMN с эдс X-MAX 50mm Oxford Instruments в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик С. С. Шевчук).

Определения изотопного состава Sm-Nd проведены в Институте геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН) (аналитик В. М. Саватенков).

Геологическое положение докембрийских образований

На северо-западе Пай-Хоя расположен Амдерминский блок (рис. 1), в ядре которого на дневную поверхность выступает сложно устроенный комплекс пород, относимый к верхнему докембрию и несогласно перекрытый верхнекембрийско-ордовикскими отложениями [10, 14—16]. Блок представляет собой горст-антиклинорий, северо-восточное крыло которого сложено карбонатными отложениями верхнерифейско-вендской амдерминской свиты [9], а юго-западное — вулканогенно-осадочными (островодужными) и терригенными (орогенными) комплексами

Рис. 1. Схема строения докембрийского выступа в составе Амдерминского блока (по материалам ГДП-200 ЗАО «Поляргео», 2015 г; Кузнецову А. Б. и др., 2016 с изменениями автора).

Условные обозначения: 1 — палеозойские отложения нерасчлененные; 2 — амдерминская свита (RF₃—Vam): кристаллические, микрофитолитовые известняки, редкие линзы кремней, тонкокристаллические углеродистые известняки; 3 — сокольнинская свита (RF₃—Vsk): песчаники, алевролиты, гравелиты, кремнистые сланцы, туфопесчаники, базальты, андезиты, риодациты, риолиты и их туфы, а также субвулканические образования; 4 — морозовская свита (RF₃mr): сланцы глинистые, кремнистые и углеродистые, известняки, доломиты, сланцы по кислым туфам, базальты, андезибазальты, андезиты, риодациты, их туфы, туфопесчаники, а также субвулканические образования; 5 — надвиги; 6 — разрывные нарушения; 7—8 — границы стратиграфических подразделений: 7 — согласные; 8 — несогласные; 9 — точки отбора проб

Fig. 1. Structural scheme of Precambrian bench (Amderminsky unit, north-western Pay-Khoy (based on CDP-200 CJSC «Polyargeo», 2015; by Kuznetsov et. al, 2016; with the author's changes).

Legend: 1 — undifferentiated Paleozoic deposits; 2 — amderminskaya suite (RF₃—Vam): crystalline, microphytolithic limestones, rare silica lenses, fine crystalline carbonaceous limestones; 3 — sokolninskaya suite (RF₃—Vsk): sandstones, siltstones, gravelites, silica shales, tuff sandstones, basalts, andesites, rhyodacites, rhyolites and their tuffs, subvolcanic formation; 4 — morozovskaya suite (RF₃mr): clay, silica and carbon shales, limestones, dolomites, shales on acidic tuffs, basalts, andesites, andesibasalts, rhyodacites, their tuffs, tuff sandstones, subvolcanic formation; 5 — thrusts; 6 — faults; 7—8 — boundaries of stratigraphic units: 7 — conformable, 8 — unconformable; 9 — sample points

пород верхнерифейской морозовской и верхнерифейско-вендской сокольнинской свит [5–8].

Стратиграфических переходов между породами выделяемых картируемых подразделений не выявлено, на большей части площади наблюдается смена с востока на запад пород карбонатной амдерминской свиты на вулканогенно-осадочные образования морозовской и сокольнинской свит. Все три свиты имеют между собой тектонические контакты. При проведении геологического картирования морозовская и сокольнинская свиты были разделены на подсвиты и выделены субвулканические образования.

Петрография

Позднедокембрийские магматические образования как морозовской, так и сокольнинской свит представлены разнообразными вулканогенными породами — эффузивными, эксплозивно-обломочными и субвулканическими.

В составе морозовской свиты присутствует широкий спектр пород — от трахибазальтов до трахиандезитов, их литокристаллокластические и кристаллолитокластические псефито-псаммитовые туфы, а также в подчиненном количестве — андезиты, дациты, риодациты и риолиты.

Породы основного состава характеризуются миндалекаменной текстурой, порфировой и сериально-гломеропорфиновой структурой и микролитовой, гиалопилитовой структурой основной массы. Порфиновые вкрапленники (до 35 об. %) представлены соссюритизированным плагиоклазом (0.1–2.2 мм) и клинопироксеном (0.4–3.2 мм) ряда эндиопсид—диопсид—авгит. Основная масса состоит из тончайших лейст и микролитов соссюритизированного плагиоклаза, эпидот-клиноцоизита, хлорита (пикнохлорита и диабангита), зерен авгита, иголок амфибола (актинолита, магнезильной роговой обманки, барруазита) и лейкоксена.

Андезиты и трахиандезиты имеют микрофиалидальную текстуру, сериально-гломеропорфировую структуру и пилотакситовую структуру основной массы. Вкрапленники (20 об. %) нацело альбитизированного плагиоклаза размером 0.2–2 мм встречаются в виде отдельных табличек и гломеропорфировых сростков. Основная масса состоит из беспорядочно ориентированных тонких лейст альбитизированного плагиоклаза, чешуек хлорита и тонкозернистого агрегата карбонатного вещества.

Породы кислого состава характеризуются сериально-гломеропорфиновой структурой и ориентированной сланцеватой текстурой. Порфиновые вкрапленники составляют 15 об. % и представлены удлиненно-таблитчатыми зернами альбитизированного и слабосерицитизированного плагиоклаза (0.1–5 мм) и идиоморфными или округлыми зернами кварца (0.1–2.5 мм). Основная масса имеет сланцеватую текстуру и состоит из микрозернистого лепидогранобластового кварц-полевошпатового агрегата с небольшим количеством серицита.

Туфы обладают литокристаллокластической и кристаллолитокластической псефито-псаммитовой структурой и обломочной текстурой. Кристаллокласты представлены соссюритизированным плагиоклазом и

клинопироксеном. Литокласты угловатой и изометричной формы являются эффузивами основного состава с порфировой структурой и миндалекаменной текстурой, среднего состава с пилотакситовым строением, кислого состава с афировым и заметно реже мелкопорфировым строением.

Среди эффузивных пород основного состава в составе морозовской свиты в пределах блока Нядейпэ — Няруйпэ выделяется отличающаяся по составу толща, сложенная базальтоидами с микропорфировой и афировой структурой и микроминдалекаменной, реже атакситовой текстурой. Структура основной массы пород апоинтерсерральная. Единичные вкрапленники представлены альбитизированным и серицитизированным плагиоклазом (0.2–1 мм) и клинопироксеном (0.1–0.6 мм), нацело замещенным хлоритом. Основная масса состоит из лейст соссюритизированного плагиоклаза, интерстиции между которыми заполнены микрозернистым агрегатом лейкоксена, хлорита, эпидота и титаномагнетита.

Субвулканические образования морозовской свиты представлены базальтами, трахибазальтами, андезибазальтами и трахиандезибазальтами с обильнопорфировой и сериально-порфировой структурой и миндалекаменной или массивной текстурой. Порфиновые вкрапленники сложены соссюритизированными табличками и лейстами плагиоклаза (0.4–1.4 мм), их гломеропорфировыми сростками, призматическими зернами клинопироксена ряда эндиопсид — диопсид — авгит (до 60 % общего объема вкрапленников, 4–17 мм), в центре нередко замещенными волокнистым хлоритом (пикнохлоритом и рипидолитом), актинолитом, эпидотом, клиноцоизитом. В основной массе лепидонематогранобластовой структуры присутствуют мелкие лейсты альбита, чешуйки хлорита (пикнохлорита и диабангита) и серицита, иголки актинолита и магнезильной роговой обманки, скопления мелких зерен эпидота и клиноцоизита, мелкие ксеноморфные угловатые зерна титанита, апатит.

Вулканогенные породы в составе сокольнинской свиты представлены широким рядом пород — от андезибазальтов до риодацитов, а также кристаллолитокластическими и кристаллолитокластическими псефито-псаммитовыми туфами переменного состава.

Андезибазальты характеризуются сериально-гломеропорфиновой структурой и миндалекаменной, реже массивной текстурой. Вкрапленники представлены нацело альбитизированным и серицитизированным плагиоклазом и редкими зернами клинопироксена. Микролитовая основная масса, сложенная агрегатом альбита и хлорита с микроступочками лейкоксена, нередко сохраняет реликтовую интерсерральную, микролитовую, пилотакситовую или гиалопилитовую структуру.

Трахиандезиты и андезиты имеют сериально-гломеропорфировую структуру и ориентированную текстуру. Вкрапленники представлены альбитизированным, слабохлоритизированным и соссюритизированным плагиоклазом размером 0.2–2.5 мм и редкими зернами клинопироксена размером 0.3–1 мм. Основная масса сложена тонкозернистым агрегатом альбита и хлорита, иногда в ней видны элементы реликтовой интерсеральной структуры.

Породы кислого состава имеют порфировую структуру с лепидогранобластовой реликтовой фельзитовой и микропиклитовой структурами основной массы и нечетко-флюидальную, сланцеватую текстуру. Вкрапленники представлены серицитизированным плагиоклазом удлиненно-таблитчатой формы и кварцем с отчетливыми ровными, порой оплавленными краями. Основная масса с реликтовой фельзитовой и участками микропиклитовой структурой сложена микро- и тонкозернистым агрегатом альбита и кварца с небольшим количеством ориентированных чешуек серицита, подчеркивающих сланцеватость.

Кристаллолитокластические псефито-псаммитовые туфы имеют ориентированную текстуру. Литокластический материал представлен изометричными и вытянутыми обломками афировых и порфировых вулканитов кислого, среднего и основного состава. Во вкрапленниках встречаются зерна альбитизированного плагиоклаза, реже кварца и альбитизированного калиевого полевого шпата.

Кристалловитрокластические алевропелитовые туфы имеют реликтовую слоистую и вторичную сланцеватую текстуру. Породы подверглись послонной карбонатизации и альбитизации, но сохранили мелкообломочное строение и состоят из сохранившего первичную форму кластического пеплового материала и близкого по составу цемента.

Особенности состава клинопироксена

Клинопироксены являются наиболее хорошо сохранившимися, слабо затронутыми вторичным преобразованием порообразующими минералами в из-

ученных магматических породах. Нами были исследованы клинопироксены из базальтов и андезибазальтов покровной фации морозовской свиты и морозовских субвулканических образований, а также из андезибазальтов сокольнинской свиты.

Все изученные клинопироксены относятся к подсемейству кальциевых пироксенов. Вкрапленники базальтов и андезибазальтов покровной фации морозовской свиты, так же как и морозовских субвулканических образований, представлены эндиопсидом, диопсидом и авгитом, зерна основной массы — авгитом. Клинопироксен во вкрапленниках андезибазальтов сокольнинской свиты определяется как эндиопсид, в дацитах — авгит.

В целом состав клинопироксена в вулканитах контролируется составом исходных магматических расплавов и по нему можно судить о составе исходной магмы [26].

Во вкрапленниках клинопироксена в базальтоидах морозовской свиты и морозовских субвулканических образований от центра к краям зерен отмечается уменьшение содержаний SiO_2 и MgO , CaO и увеличение содержаний Al_2O_3 , FeO (рис. 2, а—г). Такой тренд изменения составов соответствует нормальному ходу дифференциации расплава в процессе фракционной кристаллизации при достаточно высоком водном давлении [22], а также низкой для расплава активности кремнезема, которая способствует встраиванию алюминия в решетку клинопироксена [21]. Повышенная железистость каём вкрапленников и микролитов основной массы указывает на быстрое падение температуры в ходе кристаллизации расплава, что может иметь место, когда после быстрого подъема магмы

Рис. 2. Вариационные диаграммы зависимости содержания минералообразующих оксидов от магнезиальности ($\text{Mg\#} = \text{Mg} \cdot 100 / (\text{Mg} + \text{Fe})$) для клинопироксенов. Составы клинопироксенов из базальтоидов: 1 — субвулканических и 2 — покровных образований морозовской свиты

Fig. 2. Variation diagrams of mineral-oxide content with respect to the magnesia ($\text{Mg\#} = \text{Mg} \cdot 100 / (\text{Mg} + \text{Fe})$) for volcanic rocks of late Precambrian of northwest Pay-Khoy. Pyroxene compositions volcanic rocks from: 1 — subvolcanic and 2 — cover coat education of morozovskaya suite

Таблица 1

Представительные химические составы позднедокембрийских магматических образований Северо-Западного Пай-Хоя, мас. %

Table 1

Chemical compositions of Late Precambrian magmatic formations of northwestern Pay-Khoy, wt. %

№ обр.	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	ППП	Сумма	K ₂ O/Na ₂ O
4913/3	50.94	0.37	14.92	1.97	5.74	0.12	10.44	7.46	3.07	1.13	0.06	3.77	99.99	0.41
4915/6	48.27	0.54	18.29	2.66	6.48	0.16	8.73	4.77	3.23	1.88	0.05	4.94	100	0.68
2741-01	51.24	0.36	13.88	1.36	7.67	0.17	6.13	6.98	5.87	0.05	0.082	4.57	99.12	0.84
4708/1	56.57	0.48	6.6	3.53	5.34	0.14	11.67	6.97	4.8	0.42	0.13	3.35	100	0.69
4720/1	50.67	0.33	8.63	0.21	6.85	0.17	14.47	12.53	2.01	0.03	0.05	3.07	100	0.16
4914/3	48.75	0.48	18.41	2.5	8.62	0.1	8.85	2.36	3.96	1.03	0.04	5.18	100.28	1.68
4918/1	51.36	0.31	15.01	0.67	5.15	0.12	5.37	8.1	5.09	1.25	0.14	7.42	99.99	0.63
4920/8	50.51	0.58	15.89	1.6	6.59	0.14	7.37	5.71	4.68	1.19	0.14	5.59	99.99	0.82
4921/5	50.93	0.65	19.49	1.36	7.21	0.12	6.47	3.7	5.45	0.21	0.12	4.27	99.98	1.47
4825 A	48.79	0.49	14.54	0.41	6.24	0.11	10.38	6.38	2.76	0.64	0.09	9.17	100	0.43
4922/2	56.96	0.78	17.04	1.02	5.27	0.08	1.92	4	7.82	0.09	0.16	4.84	99.98	1.96
4460/1	52.36	0.58	16.98	1.89	7.63	0.17	5.45	5.12	5.94	0.23	0.07	3.58	100	1.16
4495/5	62.36	0.25	8.75	2.46	5.6	0.15	7.54	5.39	3.23	0.72	0.03	4.56	101.04	0.60
4810	54.59	0.63	12.35	2.93	4.4	0.12	8.8	5.33	4.21	0.01	0.17	6.44	99.98	0.79
4521/2	49.76	0.8	14.59	3.87	7.05	0.18	7.51	6.77	4	0.59	0.13	4.75	100	0.59
4494/5	51.04	3.41	11.91	7.92	6.13	0.17	5.18	4.63	5.39	0.05	0.44	3.71	99.98	1.16
4810/3	50.6	2.82	10.03	7.17	5.91	0.17	7.92	6.98	4.5	0.24	0.24	3.43	100.01	0.64
4521/1	48.09	2.27	12.69	10.86	4.31	0.14	7.76	5.48	4.11	0.02	0.18	4.1	100.01	0.75
4522/2	47.28	2.11	10.8	4.89	7.75	0.17	10.8	7.59	2.68	0.25	0.16	4.47	98.95	0.35
4498/8	46.24	2.83	14.73	5.33	8.31	0.14	8.8	3.56	3.52	0.58	0.42	5.53	99.99	0.99
4805	61.13	0.48	12.54	1.14	2.98	0.16	2.21	6.41	5.57	1.38	0.11	5.89	100	0.87
4805/5	61.65	0.51	17.41	1.28	4.01	0.08	3.72	1.24	5	1.43	0.13	3.53	99.99	4.03
4904/1	65.49	0.56	13.83	1.91	3.82	0.15	3.26	1.18	5.56	1.55	0.13	2.56	100	4.71
4474/7	52.66	0.77	16.27	2.24	6.42	0.16	6.25	6.02	3.76	1.01	0.09	3.33	98.98	0.62
4017/1	68.78	0.36	10.72	2.11	3.11	0.16	3.5	1.34	3.84	3.36	0.11	2.6	99.99	2.87
4468/1	56.44	0.79	17.1	1.92	5.46	0.15	3.83	3.91	5.65	1.57	0.12	3.06	100	1.45
4482/1	52.61	0.46	12.88	2.43	7.83	0.2	8.89	6.25	1.99	1.41	0.06	4.97	99.98	0.32
4900/4	54.27	0.47	10.75	2.22	7.98	0.2	8.15	7.69	3.67	0.6	0.07	3.92	99.99	0.48

Примечание: 1 – базальты, трахибазальты, андезитбазальты, 2 – андезитбазальты, трахиандезитбазальты, 3 – андезиты, трахиандезиты, 4 – дациты, 5 – туфы.

Таблица 2

Представительные химические составы позднелексембрийских магматических образований Северо-Западного Пай-Хоя, г/т

Table 2

Chemical compositions of Late Precambrian magmatic formations of northwestern Pay-Khoi, ppm

№ пробы	4913/3	2741-01	4720/1	4918/1	4920/8	4921/5	4460/1	4495/5	4810	4521/2	4810/3	4521/1	4805	4904/1	4474/7	4482/1	4900/4	
	Субвулканические образования морозовской свиты			Морозовская свита								Сокольниковская свита						
	V	216,26	232,00	164	218,66	250,60	404,34	356,00	155	178	365	277	207	113,00	121,68	220,00	293,00	303,14
Cr	365,52	865,00	1070	53,17	46,67	25,97	36,10	350	24,50	31,20	313	461	27,50	2,90	66,40	316,00	259,96	
Co	25,78	61,10	51,30	33,42	29,89	28,26	36,80	29,00	19,30	41,70	49,40	70,10	11,30	10,16	30,80	45,10	45,18	
Ni	124,24	295,00	109	52,61	30,60	19,88	17,70	98,80	19,10	24,00	120	465	6,04	0,61	27,30	47,40	39,29	
Zn	45,24	72,60	45,10	97,23	168,89	151,34	67,40	57,90	57,90	78,20	125	91,70	58,90	8,30	71,60	68,30	126,30	
Ga	68,05	13,00	6,48	58,73	66,69	87,71	14,00	12,20	12,30	16,20	19,10	14,80	12,50	97,78	16,30	12,60	87,61	
La	2,49	1,93	2,61	3,99	3,65	1,75	2,74	1,76	8,74	11,20	13,40	9,79	12,40	11,44	5,84	4,78	4,19	
Ce	6,00	5,16	5,55	9,69	8,58	4,89	6,97	3,97	18,90	21,60	33,10	22,50	27,40	25,88	13,80	10,60	9,37	
Pr*	0,87	0,82	0,82	1,43	1,30	0,86	1,10	0,51	2,44	2,99	4,46	3,28	3,42	3,39	1,98	1,45	1,26	
Nd	4,26	4,18	3,71	6,91	6,46	4,92	4,96	2,01	11,50	13,70	22,80	15,30	15,10	14,48	8,70	6,95	5,95	
Sm	1,19	1,20	0,97	1,85	1,98	1,59	1,37	0,70	2,34	3,60	5,75	4,36	3,80	3,49	2,61	1,70	1,48	
Eu	0,37	0,41	0,29	0,56	0,66	0,68	0,51	0,22	0,67	1,22	1,98	1,48	1,02	0,86	0,77	0,56	0,47	
Gd*	1,53	1,17	1,09	2,09	2,66	2,13	1,55	0,79	2,33	3,60	6,62	4,85	4,09	3,75	2,71	1,89	1,88	
Tb	0,24	0,22	0,21	0,31	0,41	0,34	0,28	0,13	0,34	0,59	0,92	0,81	0,59	0,62	0,48	0,29	0,29	
Dy*	1,66	1,44	1,29	2,07	2,66	2,20	1,89	0,94	2,13	3,53	5,39	4,59	4,37	4,13	3,42	2,21	1,98	
Ho*	0,36	0,33	0,25	0,45	0,59	0,49	0,43	0,21	0,44	0,74	0,94	0,84	0,86	0,91	0,85	0,50	0,44	
Er*	1,04	0,96	0,80	1,29	1,75	1,45	1,15	0,69	1,22	2,09	2,63	1,95	2,87	2,76	2,54	1,44	1,30	
Tm*	0,16	0,14	0,12	0,18	0,27	0,20	0,16	0,12	0,20	0,29	0,35	0,25	0,44	0,43	0,33	0,17	0,19	
Yb	1,02	0,93	0,75	1,32	1,86	1,40	1,24	0,76	1,42	1,97	2,12	1,26	3,04	3,12	2,22	1,49	1,37	
Lu	0,14	0,15	0,10	0,17	0,26	0,17	0,18	0,13	0,18	0,29	0,28	0,15	0,47	0,43	0,39	0,20	0,18	
Sr	197,58	98,20	26,30	130,13	124,58	254,21	147	71,60	93,40	1030	348	223	197	149,94	705	52,20	106,58	
Rb	11,86	2,00	2,00	14,57	9,66	2,28	2,93	9,29	2,00	6,41	3,87	2,00	19,90	24,74	17,70	16,90	7,12	
Ba	200,20	74,90	13,70	308,14	371,16	153,74	157	155	24,50	200	35,80	27,80	470	234,05	241	331	139,56	
Th	0,33	0,66	0,49	0,30	0,26	0,12	0,40	0,21	1,32	1,54	1,07	0,66	2,46	2,41	1,10	0,58	0,46	
Ta	0,08	0,10	0,08	0,02	0,07	-0,01	0,10	0,10	0,20	0,10	0,99	0,55	0,21	0,24	0,17	0,10	0,14	
Nb	0,79	1,06	0,97	0,64	1,30	0,40	0,53	1,04	4,25	1,47	18,90	11,80	4,27	3,87	2,38	0,80	1,12	
Zr	19,22	31,60	24,50	23,43	32,29	11,33	14,80	15,80	55,00	35,80	158	46,30	98,20	110,79	65,60	24,70	25,30	
Hf	0,50	0,92	0,65	0,61	0,90	0,36	0,60	0,51	1,57	1,23	3,91	1,73	2,98	2,79	1,91	0,86	0,73	
Y	8,14	8,65	7,77	9,91	13,81	11,40	11,00	6,16	12,40	20,30	26,20	20,60	26,10	22,44	21,70	13,10	10,77

Рис. 3. Состав клинопироксенов из позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя в координатах f – Al_2O_3 . Условные обозначения: 1 — центр и 2 — край вкрапленников из субвулканических образований морозовской свиты; 3 — центр и 4 — край вкрапленников из вулканитов морозовской свиты; $f = (\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+})/(\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+} + \text{Mg}^{2+})$ — железистость. Стрелка указывает на увеличение общей железистости от центра к краю

Fig. 3. The clinopyroxene composition from volcanic rocks of late Precambrian of northwest Pay-Khoy in coordinates f vs. Al_2O_3 . Symbols: 1 — core and 2 — rim of phenocrysts of volcanic rocks of subvolcanic education morozovskaya suite; 3 — core and 4 — rim of phenocrysts of volcanic rocks morozovskaya suite; $f = (\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+})/(\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+} + \text{Mg}^{2+})$ — ferruginosity. The arrow indicates the increase of the total iron content from the center to the edge

формирование каём фенокристаллов и микролитов происходит уже в близповерхностных условиях.

В целом для клинопироксенов из эффузивных базальтоидов морозовской свиты характерны повышенные концентрации FeO и пониженные содержания CaO по сравнению с клинопироксенами из морозовских субвулканических образований, что связано с более низкой температурой кристаллизации вулканитов покровной фации (рис. 2).

В основном вкрапленники клинопироксенов из всех рассмотренных вулканитов характеризуются прямой зональностью, во всех случаях железистость краевых зон возрастает. Этому соответствует и более железистый состав клинопироксенов основной массы (рис. 3).

Химический состав пород

Вулканические породы покровной фации морозовской свиты характеризуются широким спектром составов — от умеренно-щелочных пикробазальтов до низкощелочных риодацитов (табл. 1). По содержанию кремнезема (43.22–78.79 % SiO_2) и суммы щелочей ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} = 2.36\text{--}8.15\%$) породы классифицируются как пикробазальты умеренной щелочности, основные пикробазальты, базальты, трахибазальты, андезибазальты, трахиандезибазальты, андезиты, трахиандезиты, дациты, трахидациты, риодациты и низкощелочные риодациты. Составы основных вулканитов являются преимущественно породами субщелочной серии, а средние и кислые относятся к серии нормальной щелочности.

Вулканиды морозовской свиты, входящие в состав блока Нядейпэ — Няруйпэ, представлены пикробазальтами умеренной щелочности, базальтами, трахибазальтами и трахиандезибазальтами ($\text{SiO}_2 = 44.47\text{--}53.36\%$, $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} = 1.78\text{--}6.95\%$).

Породы, которыми сложены морозовские субвулканические образования, относятся к семействам пикробазальтов, базальтов, трахибазальтов, андезибазальтов и трахиандезибазальтов ($\text{SiO}_2 = 41.27\text{--}55.77\%$, $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} = 2.04\text{--}6.53\%$).

Породы морозовской свиты и морозовских субвулканических образований характеризуются калиево-натриевым и натриевым типами щелочности ($\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O} = 0.01\text{--}2.13$). По содержанию TiO_2 (0.27–1.03 %) они являются низкотитанистыми.

Вулканиды блока Нядейпэ — Няруйпэ являются преимущественно натриевыми породами ($\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O} = 0.01\text{--}0.62$). Они характеризуются заметно повышенной титанистостью ($\text{TiO}_2 = 1.2\text{--}3.41\%$).

Эффузивные вулканиды и туфы сокольниковской свиты по химическому составу соответствуют базальтам, андезибазальтам, трахиандезибазальтам, андезитам, трахиандезитам, трахитам, дацитам, трахидацитам, риодацитам и низкощелочным риодацитам, образуя непрерывно дифференцированную серию ($\text{SiO}_2 = 48.59\text{--}75.74\%$, $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} = 2.98\text{--}10.43\%$). Вулканиды характеризуются калиево-натриевым и натриевым типами щелочности ($\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O} = 0.01\text{--}1.81$) и низкой титанистостью ($\text{TiO}_2 = 0.33\text{--}0.76\%$, единичная проба 1.1 %).

Четкое различие вулканитов морозовской и сокольниковской свит выражено в их нормативном составе. Базальтоиды морозовской свиты являются недосыщенными кремнеземом оливин-нормативными породами, а сокольниковской — кварц-нормативными.

Вариационные диаграммы А. Харкера (рис. 4) иллюстрируют близость эволюции составов вулканитов морозовской и сокольниковской ассоциаций. Фигуративные точки составов пород образуют практически единые тренды, характеризующиеся ростом содержаний SiO_2 и Al_2O_3 и снижением FeO и CaO с падением MgO. Такие закономерности свидетельствуют о том, что рассматриваемые серии пород формировались при кристаллизационной дифференциации, являющейся одним из главных процессов в эволюции магматических пород [19]. Закономерное снижение содержаний в породах FeO, CaO и MgO в ходе дифференциации предполагает фракционирование клинопироксена [2], что подтверждается наличием порфировых вкрапленников этого минерала в изученных породах.

Вулканиды морозовской свиты, развитые в пределах блока Нядейпэ — Няруйпэ, значительно отличаются по составу от вулканитов основной площади развития свиты более высокой титанистостью и ростом железистости при уменьшении магнезиальности пород (рис. 4, б, в).

Концентрации и характер распределения элементов-примесей дают дополнительную информацию для сопоставления рассматриваемых пород. Вулканиды морозовской свиты и соответствующие им субвулканические породы характеризуются невысокими суммарными содержаниями редкоземельных элементов (REE) — 10–107 г/т и 19–29 г/т соответственно. В большинстве пород отмечается слабое обогащение

Рис. 4. Диаграммы Харкера [24] для позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя. Условные обозначения: 1 — субвулканические образования морозовской свиты; 2 — покровные вулканиты морозовской свиты; 3 — вулканиты блока Нядейпэ — Няруйпэ морозовской свиты; 4 — покровные вулканиты сокольнинской свиты

Fig. 4. Harker diagrams [24] for volcanic rocks of late Precambrian of northwest Pay-Khoy. Symbols: 1 — subvolcanic education of morozovskaya suite; 2 — cover coat volcanic rocks of morozovskaya suite; 3 — volcanic rocks unit Nydeipe — Nyruipe of morozovskaya suite; 4 — cover coat volcanic rocks of sokolninskaya suite

Рис. 5. Графики распределения REE для вулканических пород морозовской (а) и сокольнинской (б) свит и соответствующих субвулканических пород. Концентрации REE нормированы к составу хондрита CI [20]. Условные обозначения: 1 — субвулканические образования морозовской свиты; 2 — покровные вулканиты морозовской свиты; 3 — вулканиты блока Нядейпэ — Няруйпэ морозовской свиты

Fig. 5. REE distribution for volcanic rocks of morozovskaya (a) and sokolninskaya suite (b) and related subvolcanic rocks. The concentrations normalized to chondrite composition [20]. Symbols: 1 — subvolcanic education of morozovskaya suite; 2 — cover coat volcanic rocks of morozovskaya suite; 3 — volcanic rocks unit Nydeipe-Nyruipe of morozovskaya suite

LREE (рис. 5, а). Величина La_N/Yb_N составляет 0.8—4.2 в покровных вулканитах и 1.2—2.4 в субвулканических. Для всех пород не характерен дефицит европия, Eu_N/Eu_N^* варьирует в диапазоне 0.7—1.3 в покровных и 0.8—1.14 в субвулканических породах.

Высокотитанистые базальты морозовской свиты, развитые в блоке Нядейпэ — Няруйпэ, характеризуются более высокими суммарными содержаниями REE — 60—266 г/т. Для них характерно более сильное обогащение LREE относительно HREE ($La_N/Yb_N = 2.86—5.24$).

Суммарная концентрация REE в вулканитах сокольнинской свиты и соответствующих субвулканических образованиях в целом немного выше (30—131 г/т) по сравнению с таковой в морозовских вулканитах; в большинстве проб отмечается умеренное обогащение LREE (рис. 5, б), величина La_N/Yb_N варьирует от 0.80 до 6.51. В породах наблюдается четко проявленный небольшой дефицит Eu ($Eu_N/Eu_N^* = 0.55—0.98$), свидетельствующий о том, что в расплаве происходила отсадка плагиоклаза, в который европий обычно входит в виде изоморфной примеси.

В распределении литофильных элементов-примесей в вулканитах основного поля развития морозовской свиты и их субвулканических аналогах отмечаются относительно повышенные содержания крупноионных элементов (Rb, Ba, Sr, Th) и низкие концентрации высокочargedных (Hf, Zr, HREE), отчетливо проявлен Ta-Nb-минимум (рис. 6, а). Высокотитанистые базальты морозовской свиты (блок Нядейпэ — Няруйпэ) более обогащены высокочargedными элементами, для них не характерен дефицит Ta и Nb (рис. 6, а).

Распределение литофильных элементов-примесей в вулканитах сокольнинской свиты и связанных с ними субвулканических телах однотипное для всех изученных пород. Оно характеризуется повышенными содержаниями крупноионных элементов (K, Rb, Ba, Th) и низкими высокочargedных (Hf, Zr, HREE), отчетливо проявлен дефицит Ta и Nb (рис. 6, б).

Геодинамическая интерпретация геохимических данных

Особенности химического состава пород могут быть использованы для реконструкции геодинамических обстановок их формирования. Так, обогащен-

ность вулканических пород, развитых в пределах основного поля морозовской свиты, и вулканитов сокольнинской свиты крупноионными элементами и обедненность высокочargedными свидетельствуют о том, что магматический расплав, из которого кристаллизировались породы, формировался в надсубдукционной островодужной обстановке [17]. Более высокие концентрации крупноионных элементов в породах сокольнинской свиты и связанных с ними субвулканических образованиях по сравнению с породами морозовской свиты свидетельствуют о том, что сокольнинские породы были образованы в обстановке более зрелой островной дуги.

Вулканы морозовской свиты из блока Нядейпэ — Няруйпэ отличаются от островодужных образований заметно более высокими содержаниями высокочargedных элементов. Выплавление таких расплавов могло происходить в зоне задугового спрединга [17].

На диаграммах, применяемых для реконструкции геодинамических обстановок базальтоидов, фигуративные точки пород основного состава морозовской свиты (ее главного района распространения), сокольнинской свиты и связанных с ними субвулканических образований попадают в поля островодужных пород, а точки составов высокотитанистых базальтов блока Нядейпэ — Няруйпэ — в поля базальтов срединно-океанических хребтов (рис. 7, а), обогащенных базальтов срединно-океанических хребтов (E-MORB) (рис. 7, б) или базальтов океанических островов, похожих по химическому составу на E-MORB (рис. 7, в).

Концентрации когерентных элементов, таких как хром и никель, совместимые для оливина, ортопироксена и клинопироксена, уменьшаются с увеличением степени дифференциации расплава, а несовместимые, например цирконий и гафний, накапливаются при фракционной кристаллизации, как было показано для природных и модельных составов Ключевского вулкана [1]. Такая тенденция четко прослеживается в базальтах морозовской (эффузивной и субвулканической фаций) и сокольнинской свит (рис. 8, а—г).

Величины ϵNd , определенные для вулканитов морозовской и сокольнинской свит, очень близки — 4.4—7.2 и 4.3—6.4 соответственно. Они ниже таковых мантийного резервуара DM (деплетированная мантия), из которого образуются расплавы срединно-океанических хребтов, и примерно соответствуют резер-

Рис. 6. Спектры распределения элементов-примесей для вулканитов морозовской (а) и сокольнинской (б) свит. Условные обозначения на рис. 5

Fig. 6. Distribution of trace elements for volcanic rocks of morozovskaya (a) and sokolninskaya suite (b). Symbols as in Fig. 5

Рис. 7. Дискриминационные диаграммы: а — Y vs. Cr [27]: VAB — базальты вулканических дуг, WPB — внутриплитные базальты, MORB — базальты срединно-океанических хребтов; б — Th—Hf/3—Ta [31] с полями базальтов: А — N-тип MORB, В — E-тип MORB и внутриплитных толеитов, С — внутриплитных щелочных базальтов, D — базальтов вулканических дуг; в — Al_2O_3/TiO_2 — $(Gd/Yb)_N$ [12] с полями островодужных толеитов Алеутской дуги (БОД), базальтов срединно-океанического хребта Тихого океана (БСОХ) и плюмовых базальтов Гавайской горячей точки (БОО). Данные по Алеутской дуге взяты из [23], а для БОО и БСОХ — из [30]. Условные обозначения на рис. 4

Fig. 7. Discriminatory diagrams: а — Y vs. Cr [27]: VAB — basalts of volcanic arcs, WPB — intraplate basalts, MORB — basalts of mid-ocean ridges; б — Th—Hf/3—Ta [31] for basalts: А — N-type MORB, В — E-type MORB and intraplate tholeiites, С — intraplate alkaline basalts, D — basalt volcanic arcs [31]; в — Al_2O_3/TiO_2 vs. $(Gd/Yb)_N$ [12], showing different degrees of melting $(Gd/Yb)_N$ and fractional crystallization (Al_2O_3/TiO_2) . Fields for island arc tholeiitic Aleutian arc (БОД), MORB basalts of Pacific ocean (БСОХ) and plume basalts of Hawaiian hotspot (БОО) are shown for comparison. Data on the Aleutian arc taken from [23], and for the БОО and БСОХ — from [30]. Symbols as in Fig. 4

Рис. 8. Бивариантные диаграммы для позднедокембрийских вулканитов Северо-Западного Пай-Хоя. Условные обозначения на рис. 4

Fig. 8. Bivariate diagrams for volcanic rocks of Late Precambrian northwestern Pay-Khoy. Symbols as in Fig. 4

Рис. 9. Диаграмма $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ — Sm/Nd [3] для вулканитов морозовской и сокольнинской свит. Поля базальтов срединно-океанических хребтов (БСОХ), океанических островов (БОО) и щелочных базальтов континентальных областей (ШБК) показаны по [25]. Тонкая сплошная линия — Марианская островная дуга энсиматического типа, пунктирная линия — Курило-Камчатская островная дуга энсиалического типа, данные взяты из [23]. Условные обозначения на рис. 4

Fig. 9. $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ vs. Sm/Nd diagram [3] for volcanic rocks of the morozovskaya and sokolninskaya suites. Figurative fields of basalts of mid-ocean ridges (БСОХ), oceanic islands (БОО) and alkaline basalts of continental areas (ШБК) are shown according to the review [25]. The black solid line — Mariana island arc of ensimatic type, data taken from [23]. The black dotted line — the Kuril-Kamchatka island arc of ensialic type, data taken from [23]. Symbols as in Fig. 4

вуару HIMU [30]. На диаграмме $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$ — Sm/Nd (рис. 9) точки составов изучаемых пород локализуются в той же области, что и составы пород Курило-Камчатской островной дуги энсиалического типа. Породы как морозовской, так и сокольнинской свит обладают практически идентичным изотопным составом неодима, что может указывать на формирование расплавов из единого мантийного резервуара.

Для определения мантийного источника и влияния субдукционного компонента на состав расплавов, сформировавших изучаемые породы, был использован ряд отношений элементов-примесей.

По вариациям показателей Lu/Hf и La/Sm можно определить состав и степень частичного плавления (СЧП) мантийного перидотита. При низком отношении Lu/Hf для гранатового перидотита и высоком для шпинелевого перидотита высокий показатель La/Sm_2 отражают СЧП выше 5 % [28]. Величины отношений Lu/Hf (0.1—0.5) и La/Sm (1.3—2.5) в низкотитанистых вулканитах морозовской и сокольнинской свит соответствуют относительно высокому СЧП шпинелевого перидотита. Для высокотитанистых базальтов морозовской свиты (блок Нядейпэ — Няруйпэ) величина Lu/Hf не превышает 0.09 при том же уровне La/Sm , следовательно, расплав, сформировавший эти породы, образовался при плавлении гранатового перидотита.

Для океанических базальтов было предложено описывать мантийные источники в системе $\text{Th}-\text{Nb}-\text{Ce}$ как смешение трех компонентов: деплетированной мантии (DMM с низкими Th/Nb и высокими Ce/Nb),

субдукционного компонента островных дуг (SDC с высокими Th/Nb и Ce/Nb) и остаточного компонента рециклированной океанической коры, прошедшей через зону субдукции (RSC с низкими Th/Nb и Ce/Nb) [29]. Для высокотитанистых базальтов блока Нядейпэ — Няруйпэ установлены низкие величины Th/Nb (0.05—0.06) и Ce/Nb (1.7—2.3), близкие компоненту RSC. Вулканиты морозовской и сокольнинской свит показывают вариации отношений $\text{Th}/\text{Nb} = 0.20—0.75$ и $\text{Ce}/\text{Nb} = 5.3—15.19$. Наиболее высокие из них близки компоненту SDC.

Выводы

Изучение петрографического состава докембрийских образований Северо-Западного Пай-Хоя позволило выявить, что вулканиты в составе морозовской и сокольнинской свит формируют свои обособленные непрерывные серии — трахибазальт-трахиандезитовую и андезибазальт-риодацитовую соответственно. Ведущую роль при формировании этих серий играли процессы фракционной кристаллизации.

Позднедокембрийские магматические образования Северо-Западного Пай-Хоя формировались в островодужной надсубдукционной обстановке и обстановке задугового спрединга. Геологические, петрографические и петрогеохимические данные свидетельствуют о существовании двух пространственно разобщенных палеодуг. Породы морозовской свиты представляют собой фрагменты позднерифейской Морозовской палеоостровной дуги и области задугового спрединга, а вулканиты сокольнинской свиты являются реликтами более молодой Сокольнинской палеоостровной дуги рифейско-вендского возраста.

На основе анализа изотопных данных и содержания элементов-примесей показано, что низкотитанистые базальтоиды морозовской и сокольнинской свит образовались из сходных по составу верхнемантийных источников с примесью субдукционной компоненты при близких степенях частичного плавления. Высокотитанистые базальты морозовской свиты сформировались из более глубинного мантийного источника с примесью рециклированной компоненты.

Автор выражает благодарность Д. В. Зархидзе (ЗАО «Поляргео») за возможность участия в полевых работах в рамках ГДП-200 листов R-41-XX-XXI и сбора каменного материала для диссертационной работы.

Литература

1. Арискин А. А., Бармина Г. С. Моделирование фазовых равновесий при кристаллизации базальтовых магм. М.: Наука; МАИК; Наука/Интерпериодика, 2000. 263 с.
2. Гибшер А. С., Есин С. В., Изох А. Э., Киреев А. Д., Петрова Т. В. Диопсидсодержащие базальты кембрия Чеповской зоны Горного Алтая: модель фракционирования гибридных магм в промежуточных магматических камерах // Геология и геофизика. 1997. Т. 38 (11). С. 1760—1772.
3. Иванов А. В. Глубинная геодинамика: границы процесса по геохимическим и петрологическим данным // Геодинамика и тектонофизика. 2010. Т. 1. № 1. С. 87—102.
4. Складарев Е. В. и др. Интерпретация геохимических данных: Учеб. пособие. М: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с.

5. Канева Т. А. Геохимическая характеристика пород морозовской свиты (RF_3ms) Пай-Хоя. Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. Т. II. С. 301—304.
6. Канева Т. А. Зональность клинопироксенов вулканитов морозовской свиты (RF_3mr) хребта Пай-Хой. Проблемы и перспективы современной минералогии (Юшкинские чтения — 2014): Материалы минералогического семинара с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 73—77.
7. Канева Т. А. Докембрийские вулканиты Северо-Западного Пай-Хоя: Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии: Материалы XXV молодежной научной конференции, посвященной 100-летию К. О. Кратца. СПб., 2014. С. 86—91.
8. Канева Т. А., Удоратина О. В., Старикова Е. В., Хубанов В. Б. Оценка нижнего возрастного предела неопротерозойской сокольнинской свиты Северо-Западного Пай-Хоя на основе U-Pb-датирования детритных цирконов // Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. геол. 2015. Т. 90, вып. 6. С. 3—10.
9. Кузнецов А. Б., Старикова Е. В., Маслов А. В., Константинова Г. В. Sr-изотопная хемотратиграфия докембрийских карбонатных пород Амдерминского поднятия, Пай-Хой // Докл. АН. 2016. Т. 469. №4. С. 447—451.
10. Кузнецов Н. Б., Натапов Л. М., Белоусова Е. А., Гриффин У. Л., О'Рейли С., Соболева А. А., Куликова К. В., Удоратина О. В., Моргунова А. А. Первые результаты изотопного датирования детритных цирконов из кластогенных пород комплексов протоуралид — тиманид: вклад в стратиграфию позднего докембрия поднятия Енганепэ (запад Полярного Урала) // Докл. АН. 2009. Т. 424. № 6. С. 363—368.
11. Плечов П. Ю. Множественность источников островодужных магм и динамика их взаимодействия: Дис. ... док. геол.-минерал. наук. М., 2008. 250 с.
12. Сафонова И. Ю., Буслов М. М., Симонов В. А., Изох А. Э., Ц. Комия, Курганская Е. В., Т. Оно. Геохимия, петрогенезис и геодинамическое происхождение базальтов из Катунского аккреционного комплекса Горного Алтая (Юго-Западная Сибирь) // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 1. С. 541—567.
13. Симонов В. А., Добрецов Н. Л., Буслов М. М. Бонинитовые серии в структурах Палеоазиатского океана // Геология и геофизика. 1994. Т. 35. № 7—8. С. 182—199.
14. Терешко В. В. Новые данные по стратиграфии верхнепротерозойских отложений Северо-Западного Пай-Хоя // Стратиграфия и палеогеография фанерозоя Европейского Северо-Востока СССР: Труды X Геол. конф. Коми АССР. ИГ Коми НЦ УрО АН СССР. Сыктывкар, 1987. С. 9—12.
15. Терешко В. В. Стратиграфия верхнепротерозойских отложений Северо-Западного Пай-Хоя // Верхний докембрий севера европейской части СССР / ИГ Коми НЦ УрО АН СССР. Сыктывкар, 1983. С. 130—134.
16. Тимонин Н. И., Юдин В. В., Беляев А. А. Палеогеодинамика Пай-Хоя. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 226 с.
17. Фролова Т. И., Бурикова И. А. Магматические формации современных геотектонических обстановок: Уч. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.
18. Эволюция изверженных пород: Пер. с англ./ Под ред. Х. Йодера. М.: Мир, 1983. 528 с., ил.
19. Bowen N. L. The evolution of the igneous rocks. Princeton Univ. Press, 1928.
20. Boynton W. V. Geochemistry of Rare Earth Elements Meteorite Studies // Rare Earth Element Geochemistry. Amsterdam, 1984. P.63—114.
21. Chambers A. D., Brown P. E. The Lilloise intrusion, East Greenland: fractionation of a hydrous alkali picritic magma // Journal of petrology, 1995, V. 36, No. 4, pp. 933—962.
22. DeBari Susan M., Coleman R. G., Examination of the deep levels of an island arc: evidence from the Tonsina ultramafic assemblage, Tonsina, Alaska // Journal of geophysical research, 1989, V. 94, No. B4, pp. 4373—4391.
23. GEOROC (www.georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc)
24. Harker A. The Natural History of the Igneous Rocks. New York, 1909, 384 pp.
25. Kostitsyn Yu. A. Terrestrial and chondritic Sm-Nd and Lu-Hf isotopic systems: Are they identical? // Petrology, 2004, V. 12, pp. 397—411.
26. Nisbet E. G., Pearce J. A. Clinopyroxene composition in mafic lavas from different tectonic setting // Contr. Miner. Petrol., 1977, V. 63, pp. 149—160.
27. Pearce J. A. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries // Thorpe R. S. (ed.) Andesites. Wiley, Chichester, 1982, pp. 525—548.
28. Regelous M., Hofmann A. W., Abouchami W., Galer S. J. G. Geochemistry of lavas from the Emperor seamounts, and the geochemical evolution of Hawaiian magmatism from 85 to 42 Ma // J. Petrology, 2003, v. 44, № 1, p. 113—140.
29. Saunders A. D., Norry M. J., Tarney J. Origin of MORB and chemically-depleted mantle reservoirs: trace element constrains // J. Petrol., Spec. Lithosphere Iss, 1988, p. 415—455.
30. Sun S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the ocean basins / Eds. A. D. Saunders, M. J. Norry. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 1989, V. 42, pp. 313—345.
31. Wood D. A. The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province // Earth Planet. Sci. Lett, 1980, V. 50, pp. 11—30.

References

1. Ariskin A. A., Barmina G. S. *Modelirovanie fazovykh ravnovesiy pri cristallizacii bazaltovykh magm* (Modelling of phase equilibria in the crystallization of basaltic magmas). Moscow, Nauka, 2000. 263 pp.
2. Gibsher A. S., Esin S. V., Izoh A. E., Kireev A. D., Petrova T. V. *Diopsidsodergashie basalty kembriya Ceposhskoy zony Gornogo Altaya: model fraccionirovaniya gibridnykh magm v promegytocnykh magmaticeskih kamerah* (Diopside containing basalts of the Cambrian Cheposhsky zone, Gorny Altai: model of hybrid magma fractionation in intermediate magma chambers) // Geology and geophysics, 1997, V. 38 (11), pp. 1760—1772.
3. Ivanov A. V. *Glybinnaya geodinamika: granicy processa po geohimicheskim i petrologicheskim dannym* (Deep geodynamics: the boundaries of the process by geochemical and petrological data) // Geodynamics and tectonophysics, 2010, V. 1, No. 1, pp. 87—102.
4. Sclyarov E. V. et al. *Interpretaciya geohimicheskikh dannyx* (The interpretation of geochemical data): ychebnoe posobie. Moscow, 2001, 288 pp, il.
5. Kaneva T. A. *Geohimicheskaya harakteristika porod morozovskoi svity (RF_{3ms}) Pai-Hoya* (The geochemical characteristics of the rocks morozovskoi formation (RF_3ms) Pay-Khoy). *Geologiya i mineralnye resursy Evropeiskogo Severo-Vostoka*

Rossii: Materialy XVI Geologicheskogo syezda Respubliki Komi (Geology and mineral resources of the European North-East of Russia: Proceedings of XVI Congress of Geology of the Komi Republic). Vol. 2, Syktyvkar: Institute of Geology of Komi Science Centre, 2014, pp. 301–304.

6. Kaneva T. A. *Zonalnost clinopiroksenov vylkanitov morozovskoi svity (RF_{3ms}) hrebta Pai-Hoy* (The zoning of clinopyroxene of the volcanics morozovskoi formation (RF_{3ms}) Ridge Pay-Khoy). *Problemy i perspektivy sovremennoi mineralogii (Ushkinskie chteniya — 2014)*: Materialy mineralogicheskogo seminara s mezdynarodnym uchastiem (Problems and perspectives of modern mineralogy (Ushcin readings — 2014): proceedings of mineralogical seminar with international participation). Syktyvkar: Institute of Geology of Komi Science Centre, 2014, pp. 73–77.

7. Kaneva T. A. Dokembriiskie vylcanity severo-zapadnogo Pai-Hoya (Precambrian volcanics in northwest northwestern Pay-Khoy). *Actualnye problemy geologii dokembriya, geofiziki i geoecologii. Materialy XXV molodezhnoi konferencii, posvyashchennoi 100-letiy K.O. Kratsa* (Actual problems of Precambrian Geology, Geophysics and Geoecology. Proceedings of the XXV youth scientific conference devoted to 100 anniversary of K. O. Krats). St. Petersburg, 2014, pp. 86–91.

8. Kaneva T. A., Udoratina O. V., Staricova E. V., Khubanov V. B. *Ocenka nignego vozrastnogo predela neoproterozoiskoi sokolninskoi svity severo-zapadnogo Pai-Hoya* (Evaluation of lower age limit of neoproterozoic Sokolii formation in northwestern Pay-Khoy based on detrital zircons U-Pb dating) // *Bulletin of Moscow society of naturalists. Geology series*. 2015, V. 90, No. 6, pp. 3–10.

9. Kuznetsov A. B., Staricova E. V., Maslov A. V., Konstantinova G. V. *Sr-izotopnaya hemostratigrafiya dokembriyskikh karbonatnykh porod Amdermingskogo podnatiya, Pai-Hoy* (Sr Isotopic Chemostratigraphy of Precambrian Carbonate Rocks in the Amderma Rise, Pai-Khoy Ridge) // *Doklady Earth Sciences*, 2016, V. 246, No. 4, pp. 447–451.

10. Kuznetsov N. B., Natapov L. M., Belousova E. A., Griffin U. L., O'Reilly S., Soboleva A. A., Kulikova K. V., Udoratina O. V., Morgynova A. A. *Pervye resulyaty izotopnogo datirovaniya detritnykh zirkonov iz klastogennykh porod kompleksov Protouralid-timanid: vklad v stratigrafiyu pozdnego dokembriya podnatiya Engane-pe* (zapad Polyarnogo Urala) (First results of isotopic dating of detrital zircons from the clastic rocks of the pre-Uralides–Timanides complexes: contribution in the late Precambrian stratigraphy of the Engane-Pe Uplift, Western Polar Urals) // *Doklady Earth Sciences*, 2009, V. 424, No. 6, pp. 363–368.

11. Plecov P. U. *Mnogestvennost istochnicov ostrovodynykh magm i dinamika ih vzaimodeistviya* (The multiplicity of sources of island arc magmas and dynamics of their interaction). Moscow, 2008, pp. 250.

12. Sazonova L. V., Nosova A. A. *Zonalnost clinopiroksenov kak funtsiya uslovii ostyvaniya magmaticheskogo rasplava* (na primere odinitov Urala) // *Geochemistry*, 1999, No. 12, pp. 1268–1284.

13. Safonova I. Yu., Buslov M. M., Simonov V. A., Izokh A. E., T. Komiya, Kurganskaya E. V., and T. Ohno. *Geokhimiya, petrogenezis i geodinamicheskoe proishozhdenie basaltov iz Katynskogo akkrecionnogo kompleksa Gornogo Altaya* (Geochemistry, petrogenesis and geodynamic origin of basalts from the Katun' accretionary complex of Gorny Altai (southwestern Siberia)) // *Geology and geophysics*, 2011, V. 52, No. 1, pp. 541–567.

14. Siminov V. A., Dobrecov N. L., Byslov M. M. *Boninitovyie serii v stryktyrah Paleooziatskogo okeana* (Boninite series in the structures of the Paleo-Asian Ocean) // *Geology and geophysics*, 1994, V. 35, No. 7–8, pp. 182–199.

15. Tereshko V. V. *Novye dannye po stratigrafii verhneproterozoiskikh otlozhenii severo-zapadnogo Pai-Hoya* (New data on the stratigraphy of the Upper Proterozoic sediments northwest of Pai-Khoy) // *Stratigrafiya i paleogeografiya fanerozoia evropeiskogo severo-vostoka SSSR* (Stratigraphy and paleogeography Phanerozoic of the European North-East of the USSR). Tr. X geol. konf. Komi USSR. Inst Geology and Geochemistry Ural Scientific Center of the Academy of Sciences USSR. Syktyvkar, 1987, pp. 9–12.

16. Tereshko V. V. *Stratigrafiya verhneproterozoiskikh otlozhenii severo-zapadnogo Pai-Hoya* (Stratigraphy Upper Proterozoic sediments northwest of Pay -Khoy). *Verhnii dokembrii severa Evropeiskoi chasti SSSR* (Upper Precambrian North European part of the USSR). Syktyvkar, 1983, pp. 130–134.

17. Timonin N. I., Judin V. V., Belyaev A. A. *Paleogeodinamika Pai-Hoya* (Paleogeodynamics of Pai-Khoy). Ekaterinburg: Ural Branch of the Academy of Sciences, 2004, 226 pp.

18. *Evolutsiya izvergennykh porod* (The evolution of igneous rocks): Trans. with Eng./ Ed. H. Yoder. Moscow: Mir, 1983, 528 pp., il.

19. Bowen N. L. *The evolution of the igneous rocks*. Princeton Univ. Press, 1928.

20. Boynton W. V. *Geochemistry of Rare Earth Elements Meteorite Studies* // *Rare Earth Element Geochemistry*. Amsterdam, 1984. P.63–114.

21. Chambers A. D., Brown P. E. The Lilloise intrusion, East Greenland: fractionation of a hydrous alkali picritic magma // *Journal of petrology*, 1995, V. 36, No. 4, pp. 933–962.

22. DeBari Susan M., Coleman R. G., Examination of the deep levels of an island arc: evidence from the Tonsina ultramafic-mafic assemblage, Tonsina, Alaska // *Journal of geophysical research*, 1989, V. 94, No. B4, pp. 4373–4391.

23. GEOROC (www.georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc)

24. Harker A. *The Natural History of the Igneous Rocks*. New York, 1909, 384 pp.

25. Kerrich R., Wyman D. A. Review of developments in trace-element fingerprinting of geodynamic settings and their implications for mineral exploration // *Austral. J. Earth Sci.*, 1997, V. 44, pp. 465–487.

26. Kostitsyn Yu. A. Terrestrial and chondritic Sm-Nd and Lu-Hf isotopic systems: Are they identical? // *Petrology*, 2004, V. 12, pp. 397–411.

27. Mysen, B. O., Boettcher, A. L.: Melting of a hydrous mantle: I Phase relations of natural peridotite at high pressures and temperatures with controlled activities of water, carbon dioxide and hydrogen. *J. Petrol.* 1975, V. 16, pp. 520–548.

28. Nisbet E.G., Pearce J.A. Clinopyroxene composition in mafic lavas from different tectonic setting // *Contr. Miner. Petrol.*, 1977, V. 63, pp. 149–160.

29. Pearce J. A. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries // Thorpe R. S. (ed.) *Andesites*. Wiley, Chichester, 1982, pp. 525–548.

30. Sun S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // *Magmatism in the ocean basins* / Eds. A.D. Saunders, M.J. Norry. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 1989, V. 42, pp. 313–345.

31. Wood D. A. The application of a Th–Hf–Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province // *Earth Planet. Sci. Lett.*, 1980, V. 50, pp. 11–30.