ЗОЛОТОСУЛЬФИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ КАРАВАННОГО (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

С. К. Кузнецов¹, М. Б. Тарбаев², Н. В. Сокерина¹, Т. П. Майорова^{1,3}, В. Н. Филиппов¹

¹Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар; sokerina@geo.konisc.ru

²Коминедра, Сыктывкар

³Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Сыктывкар

На золотосульфидном рудопроявлении Караванном, расположенном в Кожимском районе Приполярного Урала, золото находится в тесной ассоциации со сфалеритом, галенитом и пиритом. Величина частиц золота варьирует от 0.1 до 0.6 мм и в большинстве случаев не превышает 0.2 мм. Преобладают частицы утолщенной, изометричной, сложной формы. Из элементов-примесей в золоте устанавливается серебро, содержание которого колеблется от 2 до 9.8 мас. %. Температура гомогенизации флюидных включений в жильном кварце из рудных зон колеблется от 240 до 400 °С. В составе включений присутствуют вода, хлориды кальция, магния, калия, натрия, уголекислота, азот, метан. Сульфиды характеризуются преимущественно утяжеленным изотопным составом серы с вариациями $\delta^{34}\text{S}$ от 3.7 до 15.6 ‰.

Формирование золотосульфидной минерализации, вероятнее всего, обусловлено позднепалеозойскими гидротермально-метаморфогенными процессами с преимущественной мобилизацией воды, серы и других компонентов из вмещающих пород при относительно слабом участии глубинных флюидов. Зоны вкрапленной и прожилково-вкрапленной сульфидной минерализации, прослеживающиеся в рифейских сланцевых толщах на проявлении Караванном и за его пределами, весьма благоприятны для развития золотоносных кор выветривания, которые могут представлять промышленный интерес.

Ключевые слова: золотосульфидная минерализация, рудопроявление Караванное, Приполярный Урал, изотопия серы, флюидные включения, рудообразование.

GOLD-SULPHIDE MINERALIZATION OF KARAVANNOE ORE OCCURRENCE (SUBPOLAR URALS)

S. K. Kuznetsov, M. B. Tarbaev, N. V. Sokerina, T. P. Mayorova, V. N. Filippov

¹Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar; sokerina@geo.konisc.ru

²Kominedra, Syktyvkar

³Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, Syktyvkar

We have studied the gold-sulphide mineralization of Karavannoe ore occurrence located in Kozhim district of the Subpolar Urals. The sulphides were mainly represented by sphalerite, galena, and pyrite. The gold is closely associated with the sulphides. The size of the gold particles varies from 0.1 to 0.6 mm and in the most cases does not exceed 0.2 mm. The particles with a thickened, isometric, complex shape predominate. The impurity element in the gold is silver, which content varies from 2 to 9.8 wt. %. The temperature of homogenization of fluid inclusions in vein quartz from ore zones ranges from 240 to 400 °C. Water, chlorides of calcium, magnesium, potassium, and sodium, carbon dioxide, nitrogen, and methane are present in the inclusions. Sulphides are characterized mainly by weighted isotope composition of sulfur, $\delta^{34}\text{S}$ varies from 3.7 to 15.6 ‰. The formation of the gold-sulphide mineralization was likely conditioned by the Late Paleozoic hydrothermal-metamorphogenic processes with the predominant mobilization of water, sulphur and other components from enclosing rocks with a relatively low participation of abyssal fluids. The zones of impregnated and vein-impregnated sulphide mineralization in the Riphean shales of Karavannoe occurrence and beyond are very favorable for the development of gold-bearing weathering crusts, which may represent industrial interest.

Keywords: gold-sulphide mineralization, Karavannoe ore occurrence, Subpolar Urals, sulfur isotopy, fluid inclusions, ore formation.

На Приполярном Урале в Кожимском районе известно большое количество проявлений сульфидной и золотосульфидной минерализации, локализованных в рифейских сланцевых толщах. Одним из наиболее крупных и типичных является золотосульфидное проявление Караванное. Это проявление открыто в 1980-х годах в ходе поисковых работ на коренное золото, проводившихся В. И. Ивановым и другими геологами производственного геологического объединения «Полярноуралгеология». На площади рудопроявления выделены геохимические аномалии золота, свинца, цинка, установлены пункты сульфидной и золотосульфидной минерализации, прослежены рудные зоны, дана характеристика геологического строения проявления, руд и вмещающих пород. Сотрудниками Института геологии и геохимии УНЦ РАН В. В. Мурзиным и А. А. Малюгиным [6] изучено золото из рыхлых склоновых отложений и отвалов горных выработок, связанное с зонами развития сульфидной минерализации.

Позднее М. Б. Тарбаевым (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН) выполнены более детальные исследования, включая коренную золотосульфидную минерализацию и золото [10 и др.]. Тем не менее проявление Караванное остается относительно слабоизученным и представляет интерес в связи с установлением региональных закономерностей рудообразования, формированием золотоносных кор выветривания и россыпей. В последнее время нами дополнены сведения о минеральном составе руд, изучены флюидные включения в жильном кварце, определен изотопный состав серы сульфидов.

Методы исследований

Изучение золотосульфидной минерализации проводилось в полевых и лабораторных условиях. Прослеживались особенности локализации сульфидной минерализации, отбирались сколковые пробы руд и вмещающих по-

род. Основной объем аналитических исследований выполнен в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. Минеральный состав руд изучался с использованием электронного микроскопа-микрозонда JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link (аналитик В. Н. Филиппов). Флюидные включения в жильном кварце изучались в дуполированных пластинах на термостатике Lincam TH 600 в температурном интервале от -196 до 600 °С. Состав основных солевых компонентов включений определялся по температуре эвтектики, соленость измерялась по температуре плавления льда [2]. Состав флюидных включений определялся на газовом хроматографе «Цвет-800» (аналитик С. Н. Шанина). Пробы готовились в виде крупки фракции $0.25-0.5$ мм, которая помещалась в специальную ампулу и нагревалась до температуры 600 °С, при которой происходит вскрытие включений и выделение их содержимого в виде газовой фазы. Определялось содержание паров H_2O , CO_2 , CO , N_2 , CH_4 .

Содержание золота и других компонентов в пробах руд и вмещающих пород оценивалось с помощью атомно-абсорбционного и нейтронно-активационного анализов во ВСЕГЕИ и ГЕОХИ РАН. Изотопный анализ серы сульфидов проводился в ЦИИ ВСЕГЕИ (15 анализов) и лаборатории стабильных изотопов ЦКП ДВГИ ДВО РАН (5 анализов) на изотопных масс-спектрометрах Finnigan MAT 253 (ThermoFinnigan, Bremen, Germany) с использованием двойной системы напуска по методике В. А. Гриненко [4]. Соотношение изотопов серы представлено относительно стандарта CDT (троилитовая фаза метеорита Каньон-Дьябло). Анализировались мономинеральные пробы сульфидов массой 10 мг. Погрешность определения $\delta^{34}S$ (2 σ) составляла ± 0.2 ‰.

Геологическое строение

В геологическом строении Приполярного Урала, и в частности Кожимского района, принимают участие осадочные, вулканогенно-осадочные и магматические породы разного состава и возраста — от раннего протерозоя до ордовика. Этот район, входящий в зону Центрально-Уральского поднятия, характеризуется сложной историей геологического развития, включающей интенсивное проявление тектонических, магматических и метаморфических процессов.

В Кожимском районе выделяются Малдинская (западная) и Росомахинская (восточная) рудные зоны, контролирующиеся крупными разрывными нарушениями северо-восточной ориентировки. Рудопоявление Караванное расположено в центральной части Росомахинской рудной зоны на левобережье руч. Южного, впадающего в р. Пелингичей. В пределах Росомахинской зоны наряду с проявлением Караванным находится еще несколько золотосульфидных проявлений (Синильга, Пологое, Лапчавожское, Лебединое и др.). Известны золотоносные россыпи и коры выветривания (проявление Каталамбинское). Непосредственно в районе проявления Караванного широко развиты хрусталеносные кварцевые жилы (проявления Центральная Лапча, Северная Лапча, Южная Лапча и др.). В нижнем течении руч. Южного ранее разрабатывалась богатая золотоносная россыпь с крупным золотом вплоть до мелких самородков.

Площадь проявления Караванного сложена кварц-хлорит-серицитовыми, альбит-кварц-хлоритовыми сланцами с прослоями ортосланцев пуйвинской свиты сред-

него рифея (рис. 1). К северу и северо-востоку они перекрываются кварцитами, кварцевыми гравелитами и конгломератами хобеинской свиты и кварц-мусковит-хлоритовыми сланцами мороинской свиты позднего рифея. Из интрузивных образований присутствуют тела габбро, габбро-диоритов. На некотором удалении к востоку от проявления Караванного находится Хаталамбо-Лапчинский гранитоидный массив. Хорошо выражены зоны интенсивного рассланцевания пород северо-восточного простирания. Прослеживаются разрывные нарушения субширотного и северо-западного простирания, наблюдаются многочисленные мелкие складки. Метаморфизм пород соответствует фации зеленых сланцев.

Сульфидная, золотосульфидная минерализация развита весьма неравномерно. Наибольший интерес представляет участок, находящийся на левобережье руч. Южного. Рудная минерализация здесь контролируется тре-

Рис. 1. Геологическая схема рудопоявления Караванного: 1 — хобеинская свита (R_3hb): кварциты белые и светло-серые полосчатые; 2 — пуйвинская свита (R_2pv): сланцы кварц-альбит-мусковитовые, мусковит-хлорит-кварцевые, кварц-альбит-хлорит-биотитовые, графитоидные, с линзами мраморизованных доломитов; 3 — габброиды, 4 — разрывные нарушения; 5, 6 — пункты и участки развития сульфидной минерализации; 7 — хрусталепооявления; 8 — золотоносная россыпь

Fig. 1. Geological map of Karavannoe ore occurrence. 1 — khobeinskaya suite (R_3hb): white and light gray banded quartzites; 2 — puyvinskaya suite (R_2pv): quartz-albite-muscovite, muscovite-chlorite-quartz, quartz-albite-chlorite-biotite, graphite shales with lenses of marbled dolomites; 3 — gabbroids, 4 — faults; 5, 6 — points and areas of development of sulphide mineralization; 7 — crystal occurrences; 8 — gold bearing placer

щинами, согласными сланцеватости пород, и прослеживается в северо-восточном направлении на десятки метров. Рудные тела представлены сульфидно-кварцевыми жилами, часто с карбонатами, зонами вкрапленной и прожилково-вкрапленной минерализации. Кварцевые жилы и прожилки характеризуются линзовидной, плитовидной, извилистой формой. Мощность их составляет в основном 5—15 см, иногда достигает 30 см. Отмечаются жилы и прожилки, сложенные как мелкозернистым, так и крупнозернистым кварцем. Вблизи рудных тел и рудоконтролирующих нарушений вмещающие породы серицитизированы, хлоритизированы, карбонатизированы.

Золотосульфидная минерализация

Сульфиды представлены в основном сфалеритом и галенитом. Кроме них постоянно в подчиненном количестве отмечаются пирротин, пирит, халькопирит. В табл. 1 приведены содержания золота и других рудных элементов в штучных пробах руд и пород по данным атомно-абсорбционного и нейтронно-активационного анализов. Содержание золота колеблется от 0.2 до 0.9 ppm, повышаясь от вмещающих пород к обогащенным сульфидами участкам кварцевых жил. Наряду с золотом в участках развития сульфидов отмечаются относительно высокие содержания селена, а в околорудных породах — никеля, кобальта и серебра.

Сфалерит развит в кварцевых жилах и непосредственно во вмещающих породах. Наблюдается в виде вкрапле-

ний единичных зерен величиной до 0.5 см, нередко образует практически мономинеральные скопления (гнезда, линзы, прожилки) до нескольких сантиметров в поперечнике (рис. 2). Форма зерен сфалерита сложная, цвет желтовато-коричневый. Сфалерит обрастает зерна пирита, наблюдается в сростаниях с пирротинном и галенитом и в виде включений в галените. Вместе с этим в самом сфалерите нередко присутствуют мельчайшие включения халькопирита и галенита. По сфалериту нередко развивается смитсонит. В табл. 2 приведен состав сфалерита по данным микрозондового анализа. Весьма характерным является присутствие Fe в количестве до 8.7 мас. %.

Галенит обычно сопутствует сфалериту, отмечается в виде практически мономинеральных гнезд, тонких прожилков, вкраплений. Представлен ксеноморфными зернами величиной до 1.5 см, часто в сростаниях со сфалеритом и халькопиритом. Весьма характерно развитие галенита по трещинам в сфалерите. Состав галенита близок к стехиометричному, элементы-примеси не устанавливаются.

Пирит наблюдается в виде единичных, часто идиоморфных зерен или их скоплений. Величина зерен составляет 0.05—1 см. Зерна пирита находятся в сростаниях с пирротинном и другими сульфидами, иногда, как отмечалось выше, инкрустированы сфалеритом. Изредка отмечается поздний пирит, наблюдающийся в виде каём и тонких прожилков, развивающихся по границам зерен сфалерита и по трещинам в жильном кварце. В составе пирита в отдельных случаях устанавливается Co в количестве до 0.7 мас. %.

Таблица 1. Содержание Au и других рудных элементов в породах и рудах проявления Караванного по данным нейтронно-активационного анализа, ppm

Table 1. Content of Au and other ore elements in the rocks and ores of Karavannoe occurrence according to neutron activation analysis, ppm

№ пп	№ проб	Au	Ag	Co	Ni	Se	As	Sb	Th	U	Hf	Ta
2	Г-33	0.84 (0.13)	0.03	2.58	110	0.96	4.5	66.6	9.88	0.81	6.41	3.06
3	Г-34	0.89 (0.82)	0.01	34.6	240	0.97	0.85	0.27	0.35	1.68	0.97	1.87
4	Г-35	0.39 (0.75)	0.01	40.1	150	0.66	—	0.05	—	1.03	0.45	—
5	Г-30	0.09 (0.06)	2.19	50.9	320	0.51	3.82	6.09	2.11	1.85	1.13	—
6	Г-31	0.004 (0.006)	0.01	18.3	—	0.53	7.57	0.26	14.1	1.53	4.8	1.49

Примечание. Г-33, Г-34, Г-35 — жильный кварц с сульфидами (сфалерит, галенит и др.), проба Г-30 — околорудные метасоматиты, проба Г-31 — слабоизмененные кварц-хлорит-серицитовые сланцы. Прочерк — элемент не обнаружен. Анализы выполнены в ГЕОХИ РАН. В скобках приведены результаты атомно-абсорбционного анализа.

Note. Г-33, Г-34, Г-35 — vein quartz with sulphides (sphalerite, galena, etc.), Г-30 — wallrock metasomatites, Г-31 — slightly altered quartz-chlorite-sericite shales. Dash — the element was not found. The results of atomic absorption analysis are given in parentheses.

Таблица 2. Состав сфалерита рудопоявления Караванного по данным микрозондового анализа, мас. %

Table 2. Sphalerite composition of Karavannoe ore occurrence according to microprobe analysis, wt. %

№ обр.	Zn	Fe	S	Сумма	Эмпирическая формула
477	59.76	7.46	32.6	99.82	$Zn_{0.89}Fe_{0.13}S_{0.99}$
497a	60.8	8.66	30.1	99.56	$Zn_{0.91}Fe_{0.13}S_{0.93}$
479	58.47	8.15	31.62	98.24	$Zn_{0.88}Fe_{0.14}S_{0.97}$
577	58.43	6.98	34.75	100.16	$(Zn_{0.85}Fe_{0.12})_{0.97}S_{1.03}$
	61.46	6.82	33.59	101.87	$(Zn_{0.89}Fe_{0.12})_{1.01}S_{0.99}$

Примечание. Анализы выполнены В. Н. Филипповым в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (ЦКП «Геонаука») на электронном микроскопе JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link.

Note. The analyzes were performed at the Institute of Geology of Komi SC UB RAS using JSM-6400 electron microscope with Link energy spectrometer. Operator V. N. Filippov.

Рис. 2. Сульфиды рудопоявления Караванного: а, б — сфалерит, пирит; с–ф — сфалерит в сростаниях с галенитом, прожилки галенита в сфалерите

Fig. 2. Sulphides of Karavannoe ore occurrence: а, б — sphalerite, pyrite; с–ф — sphalerite in nodules with galena, veins of galena in sphalerite

Пирротин представлен таблитчатыми частицами размером 0.1–3 мм, часто находящимися в сростаниях со сфалеритом. По рентгеноструктурным особенностям выделяется три модификации пирротина: гексагональный, моноклинный и смешанный. В составе пирротина иногда устанавливаются Co — до 2.3 мас. % и Ni — до 0.7 мас. %.

Кобальтин обнаружен в виде единичного зерна в сростании со сфалеритом. В составе кобальтина присутствуют Ni (3.3–3.8 мас. %) и Fe (4.4–4.8 мас. %).

По данным атомно-абсорбционного и полуколичественного спектрального анализов, в пирите устанавливается повышенное содержание Pb, Zn, Cu, присутствуют Mo, Bi, V, Co, Ni, иногда отмечается As [10]. В галените присутствуют Bi и Ag (до 0.04 мас. %). Для сфалерита наряду с Fe характерны Cd, Mn, Bi. Содержание Cd колеблется от 0.09 до 0.10 мас. %. В пирротине устанавливаются Pb, Mo, Cu, Zn, Co, Ni.

Золото тяготеет к участкам развития сульфидов преимущественно в жилах мелкозернистого кварца. По данным нейтронно-активационного анализа мономинеральных проб сульфидов, наиболее высокие содержания Au устанавливаются в сфалерите — до 12.6 ppm. В пирите содержание Au достигает 10, в галените — 5.1, в пирротине — 1.9 ppm.

Видимые частицы золота в штуфах и полированных шлифах нами не наблюдались. В основном золото обнаруживается в протоочках штуфных проб (рис. 3). Величина частиц золота варьирует от 0.1 до 0.6 мм и в большинстве случаев не превышает 0.2 мм. Кривая распределения размеров имеет асимметричный характер со сдвигом максимума в сторону классов 0.1–0.15 мм и быстро убывающей частотой встречаемости по мере увеличения крупности. Частицы золота характеризуются разнообразной формой. Преобладают частицы относительно изомет-

Рис. 3. Форма частиц золота рудопоявления Караванное (a, b, c) и ступенчатый фрагмент поверхности (d)
Fig. 3. The gold particles shapes of Karavannoe ore occurrence (a, b, c) and a stepped fragment of the surface (d)

ричной, уплощенной, удлиненной или сложной формы с утолщениями, выступами, неровными краями. На поверхности частиц золота наблюдаются слои роста, бугры, каверны, отпечатки зерен других минералов, гранные поверхности. Встречаются идиоморфные кристаллы, величина которых не превышает 0.1–0.15 мм. Наиболее характерны кристаллы, образованные гранями куба и октаэдра, в единичных случаях ромбододекаэдра. Иногда отмечаются сростки золота с кварцем, сфалеритом, галенитом. В табл. 3 приведены результаты микрозондового анализа состава золота. Из элементов-примесей устанавливается серебро, содержание которого колеблется от 2 до 9.8 мас. %.

Условия минералообразования

Формирование кварцевых жил и наложенной на них золотосульфидной минерализации происходило в гидротермальных условиях, было длительным и стадийным. Жилы, сложенные мелко- и крупнозернистым кварцем, вероятно, являются разновозрастными. Обычно и те и другие жилы залегают в трещинах, согласных сланцеватости вмещающих пород. Вместе с этим в участках, где сланцеватость не совпадает со слоистостью, можно видеть, что прожилки мелкозернистого кварца согласны слоистости пород, смяты вместе с ними в мелкие складки и пересекаются более молодыми жилами крупнозернистого кварца, залегающими в трещинах, согласных сланцеватости пород. Золотосульфидная минерализация отвечает наиболее поздним стадиям формирования квар-

Таблица 3. Состав золота рудопоявления Караванного по данным микрозондового анализа, мас. %

Table 3. Gold composition of Karavannoe ore occurrence according to microprobe analysis, wt. %

№ обр.	Au	Ag	Сумма	Пробность, %о
477-центр	90.93	9.78	100.71	903
то же	87.78	9.82	97.60	899
край	90.99	9.57	100.56	905
492-1-центр	90.16	9.69	99.85	903
то же	89.68	7.78	97.46	920
край	92.16	6.25	98.41	936
492-2-центр	96.49	3.39	99.88	966
то же	95.62	3.27	98.89	967
край	97.88	2.65	100.53	974
492-3-центр	92.59	8.98	101.57	912
то же	92.24	9.14	101.38	910
край	93.15	8.14	101.29	920
492-4-центр	95.36	3.48	98.84	965
то же	95.64	3.54	99.18	964
край	97.21	3.31	100.52	967

Примечание. Анализы выполнены В. Н. Филипповым в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (ЦКП «Геонаука») на электронном микроскопе JSM-6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром фирмы Link.

Note. The analyzes were performed at the Institute of Geology of Komi SC UB RAS using JSM-6400 electron microscope with Link energy spectrometer. Operator V. N. Filippov.

цевых жил, преимущественно сложенных мелкозернистым кварцем.

Судя по взаимоотношениям сульфидов, их кристаллизация происходила в следующей последовательности: пирит + пирротин — сфалерит — галенит. Положение золота в ходе минералообразования определить трудно, так как нам практически не удалось наблюдать его взаимоотношения с другими минералами. Можно предположить, что основное его количество отлагалось совместно со сфалеритом и галенитом, либо несколько позднее.

В жильном кварце присутствует большое количество первичных и первично-вторичных флюидных включений, величина которых обычно не превышает 50 мкм (рис. 4). Для крупнозернистого кварца характерны двухфазовые включения (жидкость + газ) с объемом газовой фазы 15–40 %. Гомогенизация включений происходит в жидкую фазу при температуре 320–400 °С (наиболее высокие температуры гомогенизации характерны для включений с большим объемом газовой фазы). Температура эвтектики водно-солевого раствора составляет $(27.5 \pm 1.5)^\circ\text{C}$, реже $(37.5 \pm 0.5)^\circ\text{C}$, что свидетельствует о присутствии в составе включений солей хлоридов натрия, магния и калия. Концентрация солей равна 8–15 % (NaCl экв.). Для мелкозернистого кварца также характерны двухфазовые включения, однако с несколько меньшим объемом газовой фазы — 10–15 об. %. Гомогенизация включений происходит в жидкую фазу при температуре 240–350 °С. Температура эвтектики водно-солевого раствора составляет 29°C , что свидетельствует о присутствии солей хлорида натрия и магния (11.5–15 %).

Иногда в крупно- и мелкозернистом жильном кварце встречаются двухфазовые флюидные включения с объемом газовой фазы 50–70 %, гомогенизирующиеся в

газовую фазу при температурах 420–600 °С. Присутствие таких включений можно рассматривать как следствие гетерогенизации растворов, вызванной, возможно, резким падением давления при проявлении тектонических подвижек и трещинообразовании.

Методом газовой хроматографии в составе флюидных включений в качестве основных компонентов устанавливаются H_2O и CO_2 (табл. 4). Их содержание колеблется от 13.7 до 65 мкг/г и от 0.5 до 4.8 мкг/г соответственно. Соотношение $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ во включениях в жильном кварце рудных зон немного выше, чем в жильном кварце на удалении от них. Наряду с H_2O и CO_2 фиксируются CO , N_2 , CH_4 , содержание которых незначительное.

Большой интерес представляют результаты анализа изотопного состава серы в галените, пирите и халькопирите. Согласно полученным данным, изотопный состав серы сульфидов изменяется в широких пределах с вариациями $\delta^{34}\text{S}$ от 3.7 до 15.6 ‰ (табл. 6). При этом изотопный состав серы галенита варьирует от 3.7 до 7.1 ‰ (среднее 5.4 ‰, $\Delta\delta^{34}\text{S} = 3.4$ ‰), пирита — от 8.2 до 12.8 ‰ (среднее 11.3 ‰, $\Delta\delta^{34}\text{S} = 4.6$ ‰), сфалерита — от 12.6 до 15.6 ‰ (среднее 14.0 ‰, $\Delta\delta^{34}\text{S} = 3$ ‰). Утяжеление изотопного состава серы сульфидов происходит в ряду галенит—пирит—сфалерит. Все сульфиды отличаются стабильными составами изотопов серы, разница вариации значений $\delta^{34}\text{S}$ не превышает 4.6 ‰. Для галенита выделяется две совокупности значений изотопного состава серы, первая с $\delta^{34}\text{S} = 3.7$ ‰ (наиболее близкая к метеоритному стандарту), вторая с более утяжеленным составом — $\delta^{34}\text{S} = 5.6$ –7.1 ‰.

Нами проведены расчеты изотопного состава серы сероводорода флюида ($\delta^{34}\text{S}_{\text{H}_2\text{S}}$) на базе экспериментальных равновесий в системе “флюид — сульфид” по урав-

Рис. 4. Типичные флюидные включения: а, б — в крупнозернистом кварце; с, д — в мелкозернистом кварце
Fig. 4. Typical fluid inclusions: a, b — in coarse-grained quartz; c, d — in fine-grained quartz

Таблица 4. Состав флюидных включений в жильном кварце рудопоявления Караванного по данным газовой хроматографии, мкг/г

Table 4. Composition of fluid inclusions in vein quartz of Karavannoe ore occurrence according to gas chromatography, mkg/g

Номер пробы	N ₂	CO	CH ₄	CO ₂	H ₂ O	Σ	CO ₂ /H ₂ O
Жильный кварц из рудной зоны (мелкозернистый)							
Г-114-2	0.51	0.38	0.75	4.76	13.68	20.08	0.35
Г-115-4	0.19	0.32	0.2	3.15	18.70	22.56	0.17
Г-115-3/2	0.26	0.29	0.29	3.49	27.44	31.77	0.13
Г-113-4	0.03	0.17	0.17	1.11	20.75	22.23	0.05
Жильный кварц из рудной зоны (крупнозернистый)							
Г-115-3/1	0.13	0.38	0.15	2.30	29.18	32.14	0.08
Безрудный жильный кварц (крупнозернистый)							
Г-118-1	0.19	0.15	0.06	2.04	41.04	43.48	0.05
Г-118-2	0.32	0.15	0.06	1.70	45.22	47.45	0.04
Г-118-4	0.29	0.17	0.12	1.62	65.02	67.22	0.02
Г-113-5	0.26	0.12	0.06	1.19	57.00	58.63	0.02
Безрудный жильный кварц (мелкозернистый)							
Г-118-9	0.13	0.23	0.06	1.02	21.81	23.25	0.05
Г-118-13	0.06	0.41	0.12	2.55	33.93	37.07	0.08
Г-118-14	0.1	0.23	0.03	1.02	41.04	42.42	0.02
Г-113-6	0.03	0.06	0	0.51	50.27	50.87	0.01

Таблица 5. Состав газовых пузырьков во флюидных включениях в жильном кварце рудопоявления Караванного по данным рамановской спектроскопии, мол. %

Table 5. Composition of gas bubbles in fluid inclusions in vein quartz of Karavannoe ore occurrence according to Raman spectroscopy, mol. %

№№	Номер пробы	CO ₂	N ₂	CH ₄	Объем газовой фазы, об. %
Мелкозернистый кварц					
1	464	17.96	17.58	64.49	10—15
2	508	0	96.04	3.96	> 90
3	-/-	0	94.33	5.67	100
4	-/-	0	83.61	16.39	20
Крупнозернистый кварц					
5	512	21.74	78.26	0	50
6	-/-	16.88	83.12	0	20
7	-/-	6.56	92.62	0.82	60
8	-/-	20.55	79.45	0	90
9	-/-	0	100	0	90
10	-/-	8.9	91.1	0	40

нениям фракционирования [7]. По всем сульфидам в целом при температуре 350 °С получены значения $\delta^{34}\text{S}_{\text{H}_2\text{S}}$ в растворе, варьирующие от 5.3 до 15.2 ‰ ($\Delta = \delta^{34}\text{S} 9.9$ ‰), при 100 °С — от 5.3 до 14.8 ‰ ($\Delta = \delta^{34}\text{S} 9.5$ ‰). Таким образом, сера сероводорода флюида имела утяжеленный состав, который оставался стабильным в течение всего процесса минералообразования при понижении температуры растворов от 350 до 100 °С. При этом происходило утяжеление серы сероводорода флюида, равновесного с отлагающимся галенитом (5.3—8.7 ‰ и 8.2—11.6 ‰ соответственно температурам), что компенсировалось облегчением серы сероводорода флюида, равновесного с пиритом (7.2—11.8 ‰ и 5.3—9.9 ‰ соответственно), и между этими сульфидами достигалось изотопное равновесие. Изотопный состав серы сероводорода флюида, равновесного со сфалеритом, при понижении температуры практически не изменялся (12.3—

15.2 ‰ и 11.9—14.1 ‰ соответственно), со слабой тенденцией к облегчению.

В целом сульфиды рудопоявления Караванное имеют утяжеленный изотопный состав серы, что характерно для большинства сульфидов (пирита, сфалерита, халькопирита, галенита) других золоторудных проявлений Приполярного Урала [5]. Однако особенностью сульфидной минерализации этого проявления является широкий диапазон изменчивости изотопного состава серы, перекрывающий весь диапазон полученных значений $\delta^{34}\text{S}$ для сульфидов Приполярного Урала. Утяжеленный изотопный состав серы сульфидов и серы сероводорода флюида свидетельствует о ее преимущественном заимствовании из вмещающих метаморфизованных осадочных пород. Вместе с этим устанавливающийся в отдельных случаях относительно облегченный изотопный состав серы ($\delta^{34}\text{S} = 5.3$ ‰) позволяет допустить участие в рудообразовании серы магматических пород или содержащих серу магматогенных флюидов.

Судить о времени формирования золото-сульфидно-кварцевой минерализации достаточно сложно из-за отсутствия надежных возрастных датировок. Как известно, активизация эндогенных процессов отвечает разным этапам геологического развития региона [8, 9, 12, и др.]. При этом магматические образования, согласно полученным в последнее время изотопно-геохронологическим данным, рассматриваются как доордовикские [1 и др.]. В табл. 10 приведены результаты К-Аг-датирования мусковита из гидротермально измененных пород и рудных жил [10]. Возраст мусковита составляет $(301 \pm 11) - (318 \pm 11)$ млн лет, что соответствует позднему карбону — ранней перми. Это согласуется с существующими представлениями о позднепалеозойской эндогенной активизации региона, проявлении процессов регионального метаморфизма зеленосланцевой фации и гидротермально-метасоматических процессов, обусловивших, вероятно, переотложение различных компонентов, в том числе рудных [3, 11, и др.]. В связи с этим золотосульфидно-кварцевую минерализацию, учитывая результаты изучения изотопного состава серы сульфидов, можно рассматривать как позднепалеозойскую гидротермально-метаморфогенную.

Таблица 6. Изотопный состав серы сульфидов и расчетные значения изотопного состава серы сероводорода флюида в диапазоне 350—200 °С (проявление Караванное)

Table 6. Isotope composition of sulphur of the sulphides and calculated values of the isotope composition of sulphur of hydrogen sulphide within 350—200 °C (Karavannoe ore occurrence)

№ п/п	Номер пробы	Минерал $\delta^{34}\text{S}$, ‰ CDT	$\delta^{34}\text{S}_{\text{H}_2\text{S}}$, ‰ CDT			
		Галенит	350 °C	300 °C	250 °C	200 °C
1	К-1	7.1	8.7	9.0	9.4	9.9
2	К-2	6.8	8.4	8.7	9.1	9.6
3	К-3	3.7	5.3	5.6	6.0	6.5
4	Г-108	5.6	7.2	7.5	7.9	8.4
5	Г-108А	3.7	5.3	5.6	6.0	6.5
		Пирит				
1	К-1	12.8	11.8	11.6	11.3	11.0
2	К-2	12.6	11.6	11.4	11.1	10.8
3	К-3	12.7	11.7	11.5	11.2	10.9
4	Г-108	11.6	10.6	10.4	10.1	9.8
5	Г-108А	9.9	8.9	8.7	8.4	8.1
6	Г-108Б	8.2	7.2	7.0	6.7	6.4
		Сфалерит				
1	К-1	14.8	14.5	14.5	14.4	14.3
2	К-2	15.5	15.2	15.2	15.1	15.0
3	К-3	15.6	15.2	15.2	15.1	15.0
4	Г-113	14.1	13.8	13.8	13.7	13.6
5	Г-113А	12.9	12.6	12.6	12.5	12.4
6	Г-114	14.0	13.7	13.7	13.6	13.5
7		12.6	12.3	12.3	12.2	12.1
8	Г-114А	14.0	13.7	13.7	13.6	13.5
9		12.7	12.4	12.4	12.3	12.2

Примечание. Анализы выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ (15 анализов) и в ЦКП ДВГИ ДВО РАН (5 анализов). Для расчета $\delta^{34}\text{S}_{\text{H}_2\text{S}}$ во флюиде использованы коэффициенты разделения изотопов [7].

Note. Analyses were performed at the Research Center VSEGEI (15 analyzes) and at the CUC of FEGI of FEB RAS (5 analyzes). To calculate $\delta^{34}\text{S}_{\text{H}_2\text{S}}$ in fluid the isotope separation coefficients were used [7].

Таблица 7. Результаты изотопного датирования мусковита из кварц-сульфидных прожилок и метасоматитов рудопрооявления Караванного

Table 7. Results of isotope dating of muscovite from quartz-sulphide veins and metasomatites of Karavannoe ore occurrence

№ пп	№ обр.	Порода	К. мас. %	$^{40}\text{Ar}_{\text{рад}}$, нг/г	Возраст (млн лет)
1	ТП-462	Кварц-альбит-мусковитовый сланец	5.84	140.7	318±11
2	ТП-526	Околорудный метасоматит	6.24	143.7	305±10
3	ТП-474	Кварц-карбонат-сульфидная жила	5.76	130.6	301±11
4	ТП-527	Кварц-карбонат-сульфидная жила	6.60	150.4	302±11

Примечание. При расчете возраста в качестве констант скорости распада калия и изотопной распространенности калия использованы следующие значения: $\lambda_{\text{K}} = 0.581 \cdot 10^{-10} \text{ год}^{-1}$; $\lambda_{\text{B}} = 4.962 \cdot 10^{-10} \text{ год}^{-1}$; $^{40}\text{K}/\text{K} = 0.01167 \text{ атом. \%}$ [13].

Note. To calculate the ages, the following values were used as the rate constants of potassium decay and isotope abundance of potassium: $\lambda_{\text{K}} = 0.581 \cdot 10^{-10} \text{ year}^{-1}$; $\lambda_{\text{B}} = 4.962 \cdot 10^{-10} \text{ year}^{-1}$; $^{40}\text{K}/\text{K} = 0.01167 \text{ at. \%}$ [13].

Основные выводы

Золотосульфидная минерализация рудопрооявления Караванного наложена на кварц-хлорит-серицитовые, альбит-кварц-хлоритовые сланцы пуйвинской свиты среднего рифея, кварцевые жилы и прожилки, выполняющие трещины, согласные сланцеватости вмещающих пород и ориентированные в север-северо-восточном направлении. Сульфиды представлены в основном сфалеритом, галенитом и пиритом. По данным атомно-абсорбционного и нейтронно-активационного анализов, повышенные содержания золота характерны для участков скопления сульфидов. Величина частиц золота из прото-

лочек штуфных проб варьирует от 0.1 до 0.6 мм и в большинстве случаев не превышает 0.2 мм. Преобладают частицы утолщенной, изометричной, сложной форм. Встречаются пластинчатые, проволоковидные частицы и относительно идиоморфные кристаллы с гранями куба и октаэдра. Из элементов-примесей в золоте устанавливается серебро, содержание которого колеблется от 2 до 9.8 мас. %.

Результаты изучения флюидных включений в жильном кварце свидетельствуют о том, что минералообразование происходило в водных растворах при температуре приблизительно 200—350 °С. В состав растворов входили хлориды кальция, магния, калия, натрия, углекислота, азот. Сульфиды рудопрооявления Караванное имеют утя-

желенный изотопный состав серы, что указывает на ее преимущественное заимствование из вмещающих пород. Формирование золотосульфидной минерализации, вероятнее всего, обусловлено позднепалеозойскими гидротермально-метаморфогенными процессами при относительно слабом участии глубинных флюидов.

Рудопоявление Караванное и другие подобные ему проявления даже при относительно низких содержаниях золота в рудах играют важную роль в формировании золотоносных россыпей. Кроме того, зоны прожилково-вкрапленной золотосульфидной минерализации являются благоприятным субстратом для развития золотоносных кор химического выветривания, известных в водораздельной части Росомахинской рудной зоны, и в частности на проявлении Каталамбинском, представляющих промышленный интерес.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-18-5-46 «Минералогия севера Урала и Тимана в связи с закономерностями их геологического развития, основные эпохи рудообразования».

Литература

1. Андреичев В. Л. Геохронология гранитоидного магматизма Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 11. С. 7—12.
2. Борисенко А. С. Изучение солевого состава растворов газовой-жидких включений в минералах методом криометрии // Геология и геофизика. 1977. № 8. С. 16—27.
3. Водолазская В. П., Берлянд Н. Г., Котов К. Н., Шергина Ю. П., Маревичев А. М., Акимов Л. В. Кожимская область тектоно-магматической активизации и ее золотоносность // Руды и металлы. № 4. 1996. С. 16—27.
4. Гриненко В. А. Приготовление двуокиси серы для изотопного анализа // Журн. неорганической химии. 1962. № 7. С. 2578—2582.
5. Майорова Т. П. Изотопия серы и свинца сульфидов золоторудных месторождений севера Урала // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Матер. XV Геол. съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2009. Т. II. С. 274—276.
6. Мурзин В. В., Малугин А. А. Типоморфизм золота зоны гипергенеза (на примере Урала). Свердловск: УНЦ АН СССР, 1987. 96 с.
7. Омото Х., Рай Р. О. Изотопы серы и углерода / Геохимия гидротермальных рудных месторождений. М.: Мир, 1982. 622 с.
8. Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.
9. Пыстин А. М. Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 1994. 208 с.
10. Тарбаев М. Б. Жильный тип золоторудной минерализации Приполярного Урала: Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. Сыктывкар. Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, 1991. 16 с.
11. Фишман М. В. Хронология тектоно-магматических процессов северо-востока европейской части СССР // ДАН СССР. 1990. Т. 310. № 2. С. 422—426.

12. Фишман М. В., Юшкин Н. П. Проблемы металлогении Европейского Северо-Востока. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1980. Вып. 57. 29 с. (Науч. доклады: сер. препр.)

13. Steiger R. H., Jager E. Subcommission on geochronology: convention on the use decay constants in geo- and cosmochronology // Earth Planet. Sci. Lett. 1977. V. 36/ P. 359—362.

References

1. Andreichev V. L. *Geohronologiya granitoidnogo magmatizma Pripolyarnogo Urala* (Geochronology of granite magmatism of Subpolar Urals). Vestnik of Institute of geology Komi SC UB RAS, 2010, No. 11, pp. 7—12.
2. Borisenko A. S. *Izuchenie solevogo sostava rastvorov gazovo-zhidkih vklyucheni v mineralah metodom kriometrii* (Study of salt composition of solutions of gas-fluid inclusions in minerals by cryomethy). Geologiya i geofizika. 1977, No. 8, pp. 16—27.
3. Vodolazskaya V. P., Berlyand N. G., Kotov K. N., Shergina Yu. P., Mareichev A. M., Akimov L. V. *Kozhimskaya oblast tektono-magmaticheskoi aktivizatsii i ee zolotonosnost* (Kozhim area of tectonic-magmatic activation and its gold content). Rudy i metall. No. 4, 1996, pp. 16—27.
4. Grinenko V. A. *Prigotovlenie dyuokisi sery dlya izotopnogo analiza* (Preparation of sulphur dioxide for isotope analysis). Zhurnal neorganicheskoi himii. 1962, No. 7, pp. 2578—2582.
5. Mayorova T. P. *Izotopiya sery i svintsa sulfidov zolotorudnykh mestorozhdenii severa Urala* (Isotope composition of sulphur and lead of sulphides of gold deposits of Northern Urals). *Geologiya i mineralnye resursy evropeiskogo severo-vostoka Rossii*: Proceedings of Geological congress of Komi Republic. Syktyvkar: Institute of Geology Komi SC UB RAS, 2009, V. II, pp. 274—276.
6. Murzin V. V., Malyugin A. A. Typomorphism of gold in the hypergenesis zone (on the example of the Urals). Sverdlovsk: UNSC AS USSR, 1987. 96p.
7. Omoto H., Rai R. O. *Izotopy sery i ugleroda. Geohimiya gidrotermal'nykh rudnykh mestorozhdenii* (Sulphur and carbon isotopy. Geochemistry of hydrothermal ore deposits). Moscow: Mir, 1982, 622 pp.
8. Puchkov V. N. *Geologiya Urala i Priuralya (aktualnye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii)* (Geology of the Urals and adjacent areas (stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)). Ufa: DizainPoligrafServis, 2010, 280 pp.
9. Pystin A. M. *Polimetamorficheskie komplekсы zapadnogo sklona Urala* (Polymetamorphic complexes of western slope of the Urals). St. Petersburg: Nauka, 1994. 208 pp.
10. Tarbaev M. B. *Zhilnyi tip zolotorudnoi mineralizatsii Pripolyarnogo Urala* (Vein type of gold mineralization of Subpolar Urals: Extended PhD abstract. Syktyvkar. Institute of Geology Komi SC UB RAS, 1991, 16 pp.
11. Fishman M. V. *Hronologiya tektono-magmaticheskikh protsessov Severo-Vostoka evropeiskoi chasti SSSR* (Chronology of tectonic-magmatic processes of North-East of European part of the USSR). Doklady Earth Sciences, 1990, V. 310, No. 2, pp. 422—426.
12. Fishman M. V., Yushkin N. P. *Problemy metallogenii Evropeiskogo Severo-Vostoka* (Problems of metallogeny of European North-East). Nauchnye doklady. Komi branch of USSR AS 1980, No. 57, 29 pp.
13. Steiger R. H., Jager E. Subcommission on geochronology: convention on the use decay constants in geo- and cosmochronology. Earth Planet. Sci. Lett. 1977, V. 36, pp. 359—362.