УНИКАЛЬНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РАННИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *PROTOGNATHODUS* (КОНОДОНТЫ) НА ГРЯДЕ ЧЕРНЫШЕВА

А. Н. Плотичин, Д. А. Груздев

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар; anplotitzyn@rambler.ru

В статье рассматривается пограничный девонско-каменноугольный стратиграфический интервал уникального для территории России разреза на р. Изъяль (юг гряды Чернышева) с многочисленными находками представителей конодонтового рода *Protognathodus* Ziegler. Конодонты рода *Protognathodus* на севере Урала распространены в глубоко-водных отложениях внешнего склона карбонатной платформы или внутреннего борта впадин на шельфе аналогично другим известным местонахождениям. Наибольшие концентрации элементов отмечаются в обломочных известняках, имеющих турбидитную природу, где конодонты сконцентрированы гидродинамически. Ввиду узкой фациальной приуроченности и немногочисленности протогнатодид в Североуральском регионе (за исключением посмертного гидродинамического «обогащения») использование *Protognathodus kockeli* в качестве регионального маркера границы между девонской и каменноугольной системами нецелесообразно. В качестве наиболее подходящего регионального интерфациального абиотического маркера могут выступать хорошо распознаваемые в разрезах региона трансгрессия (приоритетнее) или регрессия на уровне Хангенбергского глобального геологического события.

Ключевые слова: фаменский ярус, турнейский ярус, конодонты, *Protognathodus*.

UNIQUE LOCATION OF EARLY *PROTOGNATHODUS* (CONODONTS) ON THE CHERNYSHEV SWELL

A. N. Plotitsyn, D. A. Gruzdev

Institute of Geology Komi SC UB RAS, Syktyvkar

Unique location of numerous early *Protognathodus* Ziegler in the Devonian-Carboniferous boundary interval of Izyayol River section (South of the Chernyshev Swell) is considered in the article. Early representatives of *Protognathodus* in the north of the Urals are common for deep-water sediments of the outer slope of the carbonate platform or the inner side of the depressions on the shelf similarly to other known localities. The highest concentrations of elements are noted in calciturbites, where conodonts are hydrodynamically concentrated. Small number (except for hydrodynamically enriched intervals in calciturbites) and narrow facies range exclude the possibility of using of *Protognathus kockeli* as a North Ural regional D/C boundary biostratigraphical marker. Well recognized in the sections of the region Hangenberg event transgression (priority) or regression can be used as a regional interfacial abiotic boundary marker.

Keywords: Famennian, Tournaisian, conodonts, *Protognathodus*.

Введение

Конодонтовый род *Protognathodus* Ziegler известен с конца 60-х годов прошлого столетия с момента его описания В. Циглером [27]. Однако первый вид — *kockeli* — был описан раньше Г. Бишоффом (1957) [17] в составе рода *Gnathodus*. Первое обобщение данных по роду опубликовано в «Каталоге конодонтов», выпущенном под редакцией В. Циглера (1973) [28], где приведена реиллюстрация голотипов, видовое описание и вероятные филетические связи четырех «ранних» представителей этого рода. В 1980 году описаны еще два вида, так называемых поздних представителей рода [1980]. Таким образом, в настоящее время под этим родовым названием объединено 6 видов, которые, в свою очередь, условно делятся на «ранних» и «поздних» [18]. Ранние представители рода (*Protognathodus meischneri* Ziegler, *Pr. collinsoni* Ziegler, *Pr. kockeli* (Bischoff), *Pr. kuehni* Ziegler et Leuteritz) распространены от самых верхов фаменского яруса верхнего девона (основание конодонтовой зоны *praesulcata*) до нижней части верхнетурнейского подъяруса нижнего карбона (конодонтовая зона *quadruplicata*) [18]. Таксономический состав поздних представителей ограничен видами

Pr. praedelicatus Lane, Sandberg et Ziegler и *Pr. cordiformis* Lane, Sandberg et Ziegler, которые известны из самых верхов турнейского яруса (конодонтовые зоны *quadruplicata-anchoralis* и *typicus-anchoralis* соответственно) [23] (рис. 1). Пристальное внимание уделяется преимущественно ранним представителям рода, появляющимся и распространенным вблизи девонско-каменноугольной границы, что весьма перспективно в связи с проходящим в настоящее время выбором лимитотипа и/или биостратиграфического маркера границы систем (см. обзорные статьи [15, 19] и др.). Кроме того, интерес к этой группе дополнительно подогревается тем, что в качестве рабочей версии нового биостратиграфического маркера нижней границы каменноугольной системы рабочей группой (D/C boundary working group) в 2016 году принято первое появление вида *Protognathodus kockeli* и окончание эвстатической регрессии в пределах Хангенбергского глобального геологического события.

В разрезах, расположенных на территории России, появление ранних представителей рода *Protognathodus* носит скорее спорадический характер по сравнению с западноевропейскими стратиграфическими и фациальными

Рис. 1. Схема филоморфогении и стратиграфическое распространение рода *Protognathodus* (по: [18, 23])

Fig. 1. Phylogeny and stratigraphic ranges of the species of *Protognathodus* (based on [18, 23])

аналогами. Единичные находки отмечаются на Среднем Урале (разрез Широковский на р. Косью) (неопубликованные данные В. Н. Пазухина) и Приполярном Урале (разрезы рр. Сывью и Кожим) [6, 24]. Местонахождения относительно многочисленных ранних представителей рода *Protognathodus* ранее отмечались лишь в разрезах бассейна р. Колымы на северо-востоке страны [21] и на р. Изьяель на гряде Чернышева (Северное Приуралье) [8]. Последнее местонахождение — наиболее представительное из известных на сегодняшний день на территории нашей страны. Ранее оно было описано, но основное внимание в публикации было уделено границе между девонской и каменноугольной системами и следам проявления Хангенбергского глобального геологического события [8]. Таким образом, настоящая статья посвящена детальной литологической и палеонтологической характеристике узкого стратиграфического интервала, включающего многочисленные элементы конодентов рода *Protognathodus*, для выявления причин подобного «обогащения» и решения ряда вопросов палеоэкологии. Кроме того, обсуждаются вопросы регионального положения границы между девоном и карбоном.

Материал и методы

Каменный материал получен в 2015 году авторами во время экспедиционных работ, проводимых Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН в бассейне р. Изьяель (юг

гряды Чернышева). В качестве объекта исследования выступает участок разреза р. Изьяель (фрагмент обнажения GER3), включающий пограничный девонско-каменноугольный интервал общей мощностью около 7 метров. Для получения подробной палеонтологической характеристики, помимо полевых наблюдений и сборов, химической дезинтеграции в уксусной кислоте по стандартной методике было подвергнуто 11 проб карбонатных пород. В общей сложности выделено более 1000 диагностируемых конодонтовых элементов. Литологическая характеристика подкреплена результатами изучения более чем 30 шпифов. Фотографирование конодонтовых элементов производилось при помощи растрового (сканирующего) микроскопа VEGA3 TESCAN (ИГ Коми НЦ УрО РАН).

Краткая литолого-палеонтологическая характеристика

Исследуемый разрез расположен на южном окончании гряды Чернышева и наблюдается в ряде береговых выходов в среднем течении р. Изьяель (левый приток р. Косью). В структурно-тектоническом плане разрез приурочен к Вангырской тектонической чешуе внутри Сынинского блока. Фаменско-турнейская часть разреза представлена в ряде обнажений GER1-GER5 (рис. 2), которые характеризуются глинисто-карбонатными и кремнисто-глинисто-карбонатными отложениями, залегающими с азимутом падения 50° (магнитный) и с углами падения

Рис. 2. Схема расположения разреза на р. Изъяель: А — обзорная схема; В — геологическая схема

Fig. 2. Location of the Iz'yayol River section: A — overview map; B — geological scheme

от 40 до 70° (в исследуемой части разреза — 70°). Непосредственно рассматриваемая в статье часть разреза с многочисленными находками ранних представителей рода *Protognathodus* приурочена к верхней части обнажения GER3 (координаты обнажения — 65°21'53" с.ш.; 58°41'25" в.д.).

Ниже приводится послойное описание погранично-го девонско-каменноугольного фрагмента разреза, включающего интервал с многочисленными находками конодонтов рода *Protognathodus*.

Слой 1 (интервал, включающий пробу 3-81 (рис. 3)). Известняки пелитоморфные, массивные, темно-серого цвета, сильнокремнистые, вплоть до пластовых конкреций, отмечаются тонкие прослои углеродисто-кремнистых аргиллитов. Органические остатки представлены конодонтами, остракодами, сдавленными раковинами брахиопод и члениками криноидей. Диагностированы конодонты *Branmehla inornata* (Branson et Mehl.), *Palmatolepis gracilis sigmoidalis* Ziegler, *Palm. gracilis expansa* Sandberg et Ziegler и *Pseudopolygnathus marburgensis trigonicus* Ziegler. Мощность — 0.5 м.

Слой 2 (интервал, включающий пробы с 3-82 по 3-83е). Известняки пелитоморфные глинистые, с массивной текстурой и аргиллиты известковистые, углеродисто-кремнистые чередуются с редкими, относительно мощными (10–15 см) массивными сероцветными кремнистыми известняками. Органические остатки характеризуются редкими давленными раковинами брахиопод, члениками морских лилий и единичными недиагностируемыми обломками конодонтов. Мощность — 1.12 м.

Слой 3 (интервал, включающий пробы с 3-84 по 3-85b). Тонкое чередование сильноглинистых кремнистых известняков и известковистых, часто углеродисто-кремнистых аргиллитов. Отмечаются единичные прослои серых, кремово-серых глин. Встречены остракоды, радиолярии, брахиоподы, криноидеи и единичные конодонты, среди

которых диагностирован *Palm. gracilis sigmoidalis*. Мощность — 0.46 м.

Слой 4 (интервал, включающий пробы с 3-86 по 3-87). Известняковый песчаник, слабосортированный, массивный (размер кластического материала колеблется от тонкопесчаного до грубопесчаного), серого, светло-серого цвета. Окремнен в различной степени, вплоть до образования кремнистых стяжений различной формы. Органические остатки представлены брахиоподами, редкими аммоноидеями, криноидеями, фрагментами водорослей, рыб, радиолярий, фораминифер и конодонтов. В прикровельной части слоя характерно присутствие конодонтов *Palm. gracilis sigmoidalis*, *Palm. gracilis gracilis* Branson et Mehl., *Br. inornata*, *Apatognathus varians* Branson et Mehl., *Bispathodus aculeatus aculeatus* (Branson et Mehl.) и *Neopolygnathus communis* (Branson et Mehl.). Фораминиферы представлены таксонами *Archaeosphaera minima* Sul., *Septaglomospiranella* ex gr. *primaeva* (Rausser), *Septaglomospiranella crassa* Reitlinger, развернутыми формами *Quasiendothyra* (*Quasiendothyra*) *mirabilis* lata Reitlinger, *Vicinesphaera* sp. и *Cribrosphaeroides* sp. Водоросли характеризуются немногочисленными истертыми *Kamaena*, обломками *Solenopogaseae* (?) и цианобактериями *Girvanella ducii* Whedered. В основании слоя встречаются брахиоподы плохой сохранности, из которых диагностировать удалось *Praewaagenoconcha* sp., *Mesoplica* (?) sp., *Crurithyris* (?) sp., а также отмечены створки продуктидов, ринхоннелид (возможно, *Ripidiorhynchus*) и представителей семейства *Leiorhynchidae*. Мощность — 1.05 м.

Слой 5 (интервал между пробами 3-87 и 3-88). Черноцветные известковистые и углеродисто-кремнистые аргиллиты с пластовыми конкрециями кремней. Органические остатки не обнаружены. Мощность — 0.32 м.

Слой 6 (интервал, включающий пробу 3-88). Сильно кремнистый массивный или пятнистый (вторичная текстура вследствие неравномерного окремнения) известняк

темно-серого цвета, с тонким органогенным шламом и мелкой недиагностируемой биокластикой. Известняк окремнен вплоть до образования крупных, до нескольких десятков сантиметров, стяжений. Мощность — 0.86 м.

Слой 7 (интервал, включающий пробу 3–89). Тонкое чередование зеленовато-серых известковых или темно-серых, черных углеродисто-кремнистых аргиллитов с сильноглинистыми известняками. Встречаются мелкие кремнистые стяжения и маломощные пластовые конкреции. Фауна в наименее глинистых известняках представлена в виде остатков остракод, радиолярий, рыб, губок, брахиопод и недиагностируемых конодонтов. Мощность — 0.62 м.

Слой 8 (интервал, включающий пробу 3–90). Известняки биокластовые серые массивные, с редкими тонкими прослоями темно-серых до черных, в различной степени глинистых известняков. В кровельных частях биокластовых известняков отмечается повышение глинистости, вплоть до тонких аргиллитовых примазок. Органические остатки в обломочных известняках представлены брахиоподами, криноидеями, остракодами, рыбами, гастроподами и конодонтами. Среди конодонтов диагностированы *Bispathodus stabilis* M2 и «*Spathognathodus*» sp. Отмечаются фораминиферы *Quasiendothyra* sp. и красные водоросли *Solenopora* sp. Мощность — 0.62 м.

Слой 9 (интервал, включающий пробы с 3–91 по 3–93). Известковистые, углеродисто-кремнистые аргиллиты с тонкими прослоями сильноглинистых известняков перемежаются с массивными или неотчетливо градационно-слоистыми биокластовыми известняками. Доля глинистости относительно предыдущего слоя значительно возрастает. В обломочных известняках встречаются обильные остатки различных групп фауны: губки, криноидеи, брахио-

поды, фораминиферы, водоросли, рыбы, сколекоднты и конодонты. Обломочные известняки содержат обильные ориктоценозы конодонтов, которые характеризуются такими таксонами, как *Apatognathus varians*, *Bisp. aculeatus*, *Bisp. stabilis* M1, *Bisp. stabilis* M2, *Br. disparilis* (Branson and Mehl.), *Br. inornata*, *Br. werneri* (Ziegler), *Neop. communis* (Branson et Mehl.), *Neop. dentatus* (Druce), *Palm. gracilis sigmoidalis*, *Palm. gracilis gracilis*, *Palm. gracilis expansa*, *Protognathodus meischneri* Ziegler, *Prot. collinsoni* Ziegler, *Prot. kockeli* (Bischoff), *Pol. parapetus* Druce, *Pol. delicatulus* Ulrich et Bassler, *Pol. inornatus* Branson, *Pol. vogesi* Ziegler, *Ps. marburgensis trigonicus* и *Siphonodella praesulcata* Sandberg. Для фораминифер типичен следующий таксономический состав: *Archaesphaera minima* Sul., *Septaglomospiranella* aff. *compressa* Lipina, *Septaglomospiranella kazakhstanica* Reitlinger, *Quasiendothyra* (*Eoendothyra*) *communis* (Rausser), *Quasiendothyra* (*Eoendothyra*) *turbida* (Durkina). Водоросли представлены единичными *Subtifloria* sp. Раковинный детрит состоит преимущественно из пелеципод, отмечаются единичные створки, возможно *Crurithyris* sp. Мощность — 0.78 м.

Более 180 конодонтовых элементов, диагностируемых в качестве *Protognathodus meischneri*, *Prot. collinsoni*, *Prot. kockeli*, а также переходных форм от *Bispathodus* к *Protognathodus* (на широкой по очертаниям каплевидной базальной чашке отсутствует платформоподобное поднятие, характерное для *Protognathodus meischneri*) и от *Prot. collinsoni* к *Prot. kockeli* (значительное количество бугорков на чашке не упорядочены и не формируют параллельные карине ряды) сконцентрированы всего в одной пробе 3–92ф в слое 9 (рис. 4). В общей сложности в пробе 3–92ф обнаружено около 700 диагностируемых конодонтовых элементов (529 Р-элементов, 131 S-элемент и 28 М-элементов).

Рис. 4. Представители родов *Bispathodus* и *Protognathodus* из разреза на р. Изъяель (проба 3–92ф): 1 — *Bispathodus stabilis* (Branson et Mehl., 1934), колл. № 512/7–137; 2 — *Bispathodus* — *Protognathodus*, переходная форма, колл. № 512/7–131; 3 — *Protognathodus meischneri* Ziegler, 1969, колл. № 512/7–133; 4 — *Protognathodus collinsoni* Ziegler, 1969, колл. № 512/9–13; 5 — *Protognathodus collinsoni* Ziegler, 1969 — *Protognathodus kockeli* (Bischoff, 1957), переходная форма, колл. № 512/9–9; 6 — *Protognathodus kockeli* (Bischoff, 1957), колл. № 512/9–4. Длина масштабных отрезков — 0.2 мм

Fig. 4. Some species of *Bispathodus* and *Protognathodus* of the Iz'yayol River section (sample 3–92f): 1 — *Bispathodus stabilis* (Branson et Mehl., 1934), coll. No. 512/7–137; 2 — *Bispathodus* — *Protognathodus*, transition form, coll. No. 512/7–131; 3 — *Protognathodus meischneri* Ziegler, 1969, coll. No. 512/7–133; 4 — *Protognathodus collinsoni* Ziegler, 1969, coll. No. 512/9–13; 5 — *Protognathodus collinsoni* Ziegler, 1969 — *Protognathodus kockeli* (Bischoff, 1957), transition form, coll. No. 512/9–9; 6 — *Protognathodus kockeli* (Bischoff, 1957), coll. No. 512/9–4. Scale bar — 0.2 mm

тов) и 900 недиагностируемых обломков. Всего в пробе на различном уровне диагностировано как минимум (некоторые экземпляры определены только до рода) 27 таксонов (см. таблицу). При этом основу комплекса (37 %) составляют представители рода *Protognathodus* (19 %) и переходные от *Bispathodus* к *Protognathodus* формы (18 %) (рис. 5, А). Учитывая характер взаимоотношения элементов в конодонтовом комплексе пробы 3-92ф (рис. 5, В), напрашивается вывод об их посмертной гидродинамической сортировке. Причем точка взаимоотношения S-, М- и Р-элементов в комплексе исследованной пробы попадает в область, которая характерна для ориктоценозов нижних элементов (а–с) цикла Боума (Журавлев, 2012). В этом случае обычно наблюдается преобладание в комплексе более гидродинамически крупных Р-элементов.

Слой 10 (интервал, включающий пробы с 3-93а по 3-95). В различной степени кремнистые тонкогоризонтальнослоистые, реже массивные биолитокластовые или пелитоморфные известняки. Глинистость к кровле известняков возрастает вплоть до появления тонких аргиллитовых примазок. Встречаются кремнистые стяжения. Фауна представлена криноидеями, остракодами, брахиоподами, радиолариями, рыбами, сколекодонтами и конодонтами. Из последних определены *Bisp. aculeatus aculeatus*, *Bisp. stabilis* M1, *Bisp. stabilis* M2, *Neop. communis*, *Pol. purus* Voges, *Pol. zikmundovae* Zhuravlev, *Ps. dentilineatus* Branson, *Ps. primus* Branson et Mehl., *Siph. praesulcata*, *Siph. sulcata* (Huddle), а также формы, переходные от *Bispathodus* к *Pseudopolygnathus*. Мощность — 1.18 м.

Общая мощность рассматриваемого в работе интервала разреза — около 7.5 м.

Таксономический состав и процентное соотношение конодонтов в пробе 3-92ф

Taxonomical composition and percentage of conodonts from sample 3-92ф

Таксон / Taxon	Кол-во / Quantity	%
« <i>Spathognathodus</i> » sp.	63	12.5
<i>Apatognathus varians</i>	3	0.6
<i>Bisp. — Protognathodus</i>	93	18.5
<i>Bisp. aculeatus aculeatus</i>	1	0.2
<i>Bispathodus stabilis</i> M1	32	6.4
<i>Bispathodus stabilis</i> M2	10	2.0
<i>Branmehla disparilis</i>	5	1.0
<i>Branmehla inornata</i>	15	3.0
<i>Branmehla</i> sp.	2	0.4
<i>Branmehla wernerii</i>	3	0.6
<i>Ligonodina</i> sp.	1	0.2
<i>Neopolygnathus communis</i>	84	16.7
<i>Neopolygnathus dentatus</i>	1	0.2
<i>Palm. gracilis sigmoidalis</i>	63	12.5
<i>Palmatolepis gracilis expansa</i>	2	0.4
<i>Palmatolepis gracilis gracilis</i>	11	2.2
<i>Polygnathus delicatus</i>	1	0.2
<i>Polygnathus inornatus</i>	1	0.2
<i>Polygnathus parapetus</i>	6	1.2
<i>Polygnathus cf. vogesi</i>	2	0.4
<i>Protognathodus collinsoni</i>	33	6.6
<i>Protognathodus kockeli</i>	13	2.6
<i>Protognathodus meischneri</i>	35	7.0
<i>Protognathodus</i> sp.	14	2.8
<i>Ps. marburgensis trigonicus</i>	1	0.2
<i>Pseudopolygnathus</i> sp.	1	0.2
<i>Siphonodella praesulcata</i>	7	1.4
Сумма таксонов / Sum taxons	503	100.0
S-элемент / S-element	131	
M-элемент / M-element	28	
Pb-элемент / Pb-element	26	
Сумма S-, M- и Р-элементов Sum S-, M- и P-elements	688	
Обломки / Debris	922

Рис. 5. Диаграммы соотношения родов конодонтов (А) и Р-, S- и М-конодонтовых элементов (В) в пробе 3-92ф. Условные обозначения: 1 — область соотношения конодонтовых элементов в ориктоценозах элементов цикла Боума а–с; 2 — область соотношения конодонтовых элементов в ориктоценозах элементов цикла Боума е и d (по данным [5]); 3 — соотношение конодонтовых элементов в аппарате

Fig. 5. Proportion of the genera of conodonts (A) and of P-, S-, and M-conodont elements (B) in the sample 3-92ф. Legend: 1 — conodont elements in the orictocoenoses of elements a–c of the Bouma cycle; 2 — conodont elements in the orictocoenoses of the elements e and d of the Bouma cycle (according to [5]); 3 — proportion of conodont elements in the apparatus

Результаты и обсуждение

Верхний девон и нижний карбон южной части гряды Чернышева представлен преимущественно глинисто-карбонатными и кремнисто-глинисто-карбонатными осадками, сформировавшимися в глубоководно-шельфовых обстановках западного борта Кожимской внутришельфовой впадины [1, 8, 10]. Условно комплексы пород впадин на шельфе (на примере Кожимской и Коротаихинской (Предпайхойской) палеовпадин) можно разделить на аллохтонные и автохтонные. Автохтонные, или фоновые, отложения представлены преимущественно бескарбонатными или слабоизвестковистыми аргиллитами, первичными силицитами (чаще радиоляритами и спикулитами) и редко — сильноглинистыми разностями пород карбонатного ряда или пелитоморфными известняками. Аллохтонные отложения представлены обломочными известняками, имеющими турбидитное происхождение или обвально-оползневую природу (характерно для бортов впадин). Турбидитная природа обломочных известняков с пограничного девонско-каменноугольного стратиграфического интервала на р. Изъяель диагностируется благодаря некоторым текстурно-структурным особенностям, характерным для цикла Боума [16]. В рассматриваемой части разреза наиболее характерно присутствие усеченных циклов. Например, в образце GER3-96 наблюдается последовательность литотипов, сопоставимая с элементами с, d и e цикла (рис. 6). Наиболее полные последовательности цикла Боума, характеризующиеся присутствием всех элементов ряда (от а до f), наблюдаются в подстилающей среднефаменской части разреза [1].

Непосредственно пограничные отложения на р. Изъяель в целом можно назвать «обогащенными» микроостатками организмов. Наибольшие концентрации наблюдаются исключительно в обломочных известняках (био- и литокластовые известняки и их вариации) и свя-

зываются авторами с посмертной сортировкой микроостатков и дальнейшим гидродинамическим обогащением. При этом иногда гидродинамическая концентрация микроскопических палеонтологических остатков (чаще ostracods, conodont elements) достигает таких масштабов, что измеряется в процентах от основной массы породы. Например, в основании каменноугольной системы (Cottonwood Canyon Member) в известняках Мэдисон в Монтане (США) количество фосфата (P_2O_5) колеблется от 4 до 15 %, причем в типовом разрезе преимущественно конodontовые элементы являются источником 4–6 % фосфата [25]. Однако процесс образования известняков Мэдисон имеет не турбидитную природу, как это предполагается для обломочных известняков разреза на р. Изъяель, а скорее связан с увеличением концентрации различных фосфатных форменных элементов путем перемива и выноса более тонкой части из отложений на диастемах (так называемый процесс природного шлихования). В отложениях же, образованных плотностными потоками, концентрации конodontовых элементов, в зависимости от granulometрии обломочной части, могут быть на 2–3 порядка выше (до 9000 элементов на кг — устное сообщение А. В. Журавлева), чем в субавтохтонных или автохтонных. При этом концентрации разных по морфологии элементов в различных элементах цикла Боума варьируют. Наибольшие концентрации более гидравлически крупных Р-элементов следует ожидать из нижних частей циклита (а, b и c), как это наглядно демонстрируется в комплексе конodontов пробы 3-92ф, а S- и М-элементы преобладают в верхней части циклита (e) и фоновых осадках (f) [5].

Находки конodontовых элементов рода *Protognathodus* являются типичными в разрезах, отложения которых формировались в пределах внешней части, бровки и внешнего склона карбонатной платформы [22]. Наибольшие концентрации отмечаются в пределах непосредственно внеш-

Рис. 6. Строение карбонатного градиентного циклита (слой 3-96)

Fig. 6. Structure of carbonate graded cycle (bed 3-96)

него склона карбонатной платформы. Аналогичная ситуация отмечается с распространением близкородственных конодонтов рода *Gnathodus* в турне [20]. На севере Урала и в Приуралье многочисленные прогнатодиды были обнаружены в единственном разрезе, который был сформирован в пределах внутреннего склона впадины на шельфе (или в пределах внешнего склона карбонатной платформы) [10, рис. 2]. В разрезах на рр. Кожим и Сывью (Приполярный Урал) отмечаются единичные находки, которые могут быть обусловлены как местом обитания отдельных немногочисленных экземпляров рода в центральной части внутришельфовой впадины (краевая часть ареала?), так и их переотложением с турбидитными потоками с участков бассейна, расположенных гипсометрически выше. При переотложении основным источником карбоната, поступающего в седиментационные системы впадин на шельфе, являлся материал, накопившийся в относительно мелководных условиях на бровке склона, и материал, захваченный на склоне турбидитным потоком [2, 4, 9]. Конодонтовые элементы в таком процессе представляли собой некие структурные единицы (форменные элементы), которые переоткладывались совместно с обломочным материалом. При этом вариации в таксономическом составе «местных» автохтонных комплексов и переотложенных аллохтонных существенны. Это автоматически приводит к погрешностям в биостратиграфических, биофациальных и палеоэкологических построениях [9] и, в частности, ставит вопрос о безоговорочности выводов об условиях обитания представителей рода *Protognathodus* в Североуральском палеобассейне.

Граница девонской и каменноугольной систем в настоящее время устанавливается по появлению конодонтов вида *Siphonodella sulcata*. В частности, в разрезе на р. Изъяель положение границы установлено в средней части слоя 10 благодаря находкам как глобальных биостратиграфических маркеров (*Siphonodella sulcata*), так и региональных (*Polygnathus purus*, *Pseudopolygnathus primus*) в пробе 3-93а [8]. В качестве нового рабочего варианта биостратиграфического маркера границы принят вид *Protognathodus kockeli*, следовательно, положение границы должно быть несколько ниже по разрезу в основании слоя 9 (проба 3-92ф). Однако, учитывая обломочную природу известняков, которые представляют собой единственный в разрезе уровень находки представителей рода *Protognathodus*, не исключается факт диахронного переотложения этих микроостатков, как и всего выделенного комплекса конодонтов на этом уровне. При этом границы биоэональных подразделений и, как следствие, подразделений ОСШ сдвинуты стратиграфически выше.

Выводы

Таким образом, рассмотрен и детально палеонтологически и литологически охарактеризован фаменско-турнейский интервал уникального для нашей страны разреза на р. Изъяель, включающего находки многочисленных элементов рода *Protognathodus*. На севере Урала и Приуралья конодонты рода *Protognathodus* распространены в разрезах, отложения которых формировались в относительно мелководных условиях на шельфе. При этом наибольшие концентрации приурочены к узкому фациальному поясу внешнего склона карбонатной платформы или внутреннего борта впадин на шельфе идентично мировым фациальным и стратиграфическим аналогам. Не исключается вероятность того, что протогнатодиды обитали гип-

сометрически выше (например, на бровке карбонатной платформы), а присутствие их многочисленных элементов на склоне и центральной части внутришельфовой впадины является результатом переотложения и гидродинамического обогащения плотностными потоками, учитывающая турбидитную природу отложений, вмещающих эти конодонтовые элементы. Кроме того, авторы считают целесообразным использование вида *Protognathodus kockeli* в качестве регионального маркера границы между девонской и каменноугольной системами ввиду узкой фациальной приуроченности этой группы конодонтов, а также их немногочисленности (за исключением крайне редких случаев природного «обогащения»). В качестве наиболее подходящего регионального интерфациального абиотического маркера могут выступать трансгрессия или регрессия на уровне Хангенбергского глобального геологического события, которые достоверно опознаются в разрезах Североуральского региона [3, 7, 11 и др.]. Кроме того, все корреляционные построения будут обладать большей достоверностью ввиду изохронности подобных уровней.

Авторы благодарят М. А. Корнея и М. А. Торлопова за совместные полевые исследования; Е. В. Сокиран за предоставленные определения брахиопод; Я. А. Вевель за диагностику фораминифер и водорослей; А. С. Шуйского за качественные фотографии конодонтовых элементов на сканирующем электронном микроскопе. Также авторы выражают искреннюю благодарность А. В. Журавлеву и рецензентам за ценные советы и рекомендации, которые способствовали улучшению статьи.

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00330.

Литература

1. Бушнев Д. А., Плотицын А. Н., Груздев Д. А., Бурдельная Н. С. Органическое вещество фаменских отложений южной части гряды Чернышева (разрез на р. Изъяель) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2017. Т. 12. № 3. http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf
2. Еременко Н. М., Журавлев А. В. Литолого-генетическая типизация среднепалеозойских глубоководных отложений // Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории: Материалы VII Всероссийского литологического совещания. Новосибирск: ИНГ СО РАН, 2013. Т. 1. С. 290—294.
3. Журавлев А. В. Позднедевонское (Хангенбергское) событие // Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России: Метод. пособие. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. С. 41—46.
4. Журавлев А. В. Седиментационная модель области сочленения елецкой и лемвинской формационных зон Приполярного Урала в пограничном девонско-каменноугольном интервале // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. Т. 7. № 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf
5. Журавлев А. В. Тафономия конодонтовых элементов в позднедевонско-раннекаменноугольных турбидитах севера Урала и Пай-Хоя // Литосфера. 2012. № 3. С. 14—21.
6. Плотицын А. Н. Конодонты и стратиграфия верхнефаменско-турнейских отложений севера Урала и гряды Чернышева: Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. Сыктывкар: Геопринт, 2016. 19 с.

7. Плотыцын А. Н. Корреляционные уровни в верхнем фанерозе и турне севера Урала и гряды Чернышева // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. № 7. С. 46—53.
8. Плотыцын А. Н., Груздев Д. А. Граница девонской и каменноугольной систем на р. Изьяель (юг гряды Чернышева) // Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий: Материалы IV Всерос. молодеж. конф. Уфа, 2016. С. 102—107.
9. Плотыцын А. Н., Груздев Д. А., Журавлев А. В. Влияние тафономии на биостратиграфию глубоководно-шельфовых отложений по конодонтам // Современная микропалеонтология — проблемы и перспективы: Труды XVII Всероссийского микропалеонтологического совещания / Отв. ред. М. С. Афанасьева и А. С. Алексеев. М.: ПИН РАН, 2018. С. 339—343.
10. Плотыцын А. Н., Журавлев А. В., Соболев Д. Б., Вель Я. А., Груздев Д. А. Граница девона и карбона на западном склоне севера Урала и Приуралья // Труды Палеонтологического общества / Отв. ред. С. В. Рожнов. М.: ПИН РАН, 2018. Том I. С. 90—107.
11. Седаева К. М., Рябинкина Н. Н., Кулешов В. Н., Валяева О. В. Отражение Хангенбергского глобального геологического события рубежа девона и карбона в разрезах западного склона Приполярного (р. Кожим) и Южного (р. Сиказа) Урала // Литосфера. 2010. № 6. С. 25—37.
12. Соболев Д. Б. Остракоды и биостратиграфия турнейского яруса севера Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 113 с.
13. Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. Вып. 38. 131 с.
14. Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой) / Межвед. страт. комитет России. Екатеринбург, 1993. 151 л. схем.
15. Becker R. T., Kaiser S. I., Aretz M. Review of chrono-, litho- and biostratigraphy across the global Hangenberg Crisis and Devonian—Carboniferous Boundary // Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events / Ed. R.T. Becker, P. Konigshof, C.E. Brett // Geological Society. 2016. № 423. P. 355—386.
16. Bouma A. H. Sedimentology of some flysch deposits // A graphic approach to facies interpretation. Amsterdam: Elsevier, 1962. 168 p.
17. Bischoff G. Die Conodonten-Stratigraphie des rhenoharzynischen Unterkarbons mit Berücksichtigung der Wocklumeria-Stufe und der Devon/Karbon-Grenze // Abh. hessisches Landes. Bodenforsch. 1957. № 19. P. 1—64.
18. Corradini C., Kaiser S. I., Perri M. C., Spalletta C. Protognathodus (Conodonta) and its potential as a tool for defining the Devonian/Carboniferous boundary // Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 2011. V. 117. № 1. P. 15—28.
19. Corradini C., Spalletta C., Mosconi A., Matyja H., Over D.J. Conodonts across the Devonian/Carboniferous boundary: a review and implication for the redefinition of the boundary and a proposal for an updated conodont zonation // Geological Magazine. 2016. № 1. P. 1—15.
20. Dreesen R., Sandberg C.A., Ziegler W. Review of Late Devonian and Early Carboniferous conodont biostratigraphy and biofacies models as applied to the Ardenne shelf // Annales de la Societe geologique de Belgique. 1986. T. 109. P. 27—42.
21. Gagiev M. H., Kononova L. I. The Upper Devonian and Lower Carboniferous sequences in the Kamenka River Section (Kolyma River Basin, the Soviet North-East) Stratigraphic description. Conodonta // Courier Forsch. — Inst. Senkenberg. № 118. P. 83—103.
22. Kalvoda J., Babek O., Malovana A. Sedimentary and biofacies records in calciturbidites at the Devonian—Carboniferous boundary in Moravia (Moravian-Silesian zone, Middle Europe) // Facies. 1999. V. 41. P. 141—158.
23. Lane H. R., Sandberg C. A., Ziegler W. Taxonomy and phylogeny of some Lower Carboniferous conodonts and preliminary standard post-Siphonodella zonation // Geol. Palaeontol. 1980. № 14. P. 117—164.
24. Nemirovskaya T. I., Chermnykh V. A., Kononova L. I., Pazukhin V. N. Conodonts of the Devonian—Carboniferous boundary section, Kozhim, Polar Urals, Russia // Annales de la Societe geologique de Belgique. 1992. V. 115. P. 629—647.
25. Sandberg C. A., Klapper G. Stratigraphy, age, and paleotectonic significance of the Cottonwood Canyon Member of the Madison Limestone in Wyoming and Montana: U.S. // Geological Survey. 1967. Bulletin 1251-B. 70 p.
26. Sandberg C. A., Ziegler W., Leuteritz K., Brill S. M. Phylogeny, speciation, and zonation of *Siphonodella* (Conodonta, Upper Devonian and Lower Carboniferous) // Newsletters on Stratigraphy. 1978. V. 7. № 2. P. 102—120.
27. Ziegler W. Eine neue Conodonten fauna aus dem höchsten Oberdevon // Fortschr. Geol. Rheinl. Westfal. 1969. V. 17. P. 343—360.
28. Ziegler W. Catalogue of conodonts. Vol. 1. Stuttgart: Schweizerische Verlagsbuchhandlung, 1973. 504 pp.
29. Ziegler W., Sandberg C. A. The Late Devonian standard conodont zonation // Courier Forschungs institute Senkenberg. 1990. V. 121. 115 pp.

References

1. Bushnev D. A., Plotitsyn A. N., Gruzdev D. A., Burdelnaya N. S. *Organicheskoe veschestvo famenskih otlozhenij yuzhnoi chasti gryady Chernysheva (razrez na r. Iz'yael')* (Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Izyayol River Section)). *Neftegazovaya Geologiya. Teoriya i Praktika* (Oil gas geology. Theory and practice). 2017, V. 12, No. 3. http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf
2. Eremenko N. M., Zhuravlev A. V. *Litologo-geneticheskaya tipizaciya srednepaleozojskikh glubokovodnykh otlozhenij* (Lithological typization and origin of the Middle Paleozoic deep-water deposits). *Osadochnye bassejny sedimentacionnye i postsedimentacionnye processy v geologicheskoy istorii*. Proceedings of conference. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2013, V. I, pp. 290—294.
3. Zhuravlev A. V. *Pozdnedevonskoe (Hangenbergskoe) sobytie* (Late Devonian (Hangenberg) event). *Ispolzovanie sobytijno stratigraficheskikh urovnej dlya mezhhregionalnoj korrelyacii fanerozoja Rossii* (Use of event stratigraphic levels for interregional correlation of Phanerozoic deposits of Russia). Saint-Petersburg: VSEGEI, 2000, pp. 41—46.
4. Zhuravlev A. V. *Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya eletskei i lemvinskoi formatsionnykh zon Pripolyarnogo Urala v pograničnom devonsko-kamennougol'nom intervale* (Sedimentation model of the transitional zone from the Elets to Lemva formation belts (Devonian—Carboniferous boundary, Cis-Polar Urals)). *Neftegazovaya Geologiya. Teoriya i Praktika* (Oil Gas geology. Theory and Practice). 2012, V. 7, No. 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf

5. Zhuravlev A. V. *Tafonomiya konodontovykh elementov v pozdnedevonsko-rannekamennougol'nykh turbiditakh severa Urala i Pai-Hoya* (Conodont element taphonomy in the Late Devonian—Early Carboniferous turbidites of the north of Urals and Pay-Khoy). *Litosfera*, 2012, No. 3, pp. 14—21.
6. Plotitsyn A. N. *Konodonty i stratigrafiya verhnefamenskoy-turneyskikh otlozheniy severa Urala i gryady Chernysheva* (Conodonts and stratigraphy of the Late Famennian — Tournaisian of the North of Urals and Chernyshev Swell). Extended abstract of PhD dissertation. Syktyvkar: Geoprint, 2016, 19 pp.
7. Plotitsyn A. N. *Korrelyatsionnye urovni v verhnem famene i turne severa Urala i gryady Chernysheva* (Correlation levels in Upper Famennian — Tournaisian deposits of the North of Urals and Chernyshev Swell). *Vestnik IG Komi SC UB RAS*, 2016, No. 7, pp. 46—53.
8. Plotitsyn A. N., Gruzdev D. A. *Granica devonskoj i kamennougolnoj system na r. Izrael (yug gryady Chernysheva)* (Devonian and Carboniferous boundary in the South of the Chernyshev Swell (Izrael river section)). *Geologiya, geoekologiya i resursnyj potencial Urala i sopredelnykh territorij*: proceedings of conference. Ufa: Alfa-reklama, 2016, pp. 102—107.
9. Plotitsyn A. N., Gruzdev D. A., Zhuravlev A. V. *Vliyaniye tafonomii na biostratigrafiyu glubokovodno-shelf'ovykh otlozheniy po konodontam* (Taphonomical influence on the conodont biostratigraphy of the deep-water shelf deposits). *Modern micropaleontology — Problems and Prospects: Proceedings of XVII All-Russian micropaleontological meeting*. Ed. M.S. Afanaseva, A.S. Alekseev. Moscow: PIN RAN, 2018, pp. 339—343.
10. Plotitsyn A. N., Zhuravlev A. V., Sobolev D. B., Vevel Ya. A., Gruzdev D. A. *Granitsa devona i karbona na zapadnom sklone severa Urala i Priural'ya* (The Devonian — Carboniferous boundary in the western slope of the North Urals and Cis-Urals). *Proceedings of Paleontological society*, Ed. S. V. Rozhnov. Moscow: PIN RAN, 2018, V. 1, pp. 90—107.
11. Sedaeva K. M., Ryabinkina N. N., Kuleshov V. N., Valyaeva O. V. *Otrazhenie Hangenbergskogo global'nogo geologicheskogo sobytiya rubezha devona i karbona v razrezakh zapadnogo sklona Pripolyarnogo (r. Kozhim) i Yuzhnogo (r. Sikaza) Urala* (The Hangenberg global geological event on Devon-Carbon boundary strata on the western slope of Prepolar (the Kozhim River) and Southern (the Sikaza River) Urals). *Litosfera*, 2010, No. 6, pp. 25—37.
12. Sobolev D. B. *Ostrakody i biostratigrafiya turneiskogo yarusa severa Urala* (Ostracodes and biostratigraphy of the Tournaisian stage in the North of Ural). Ekaterinburg: UB RAS, 2005, 113 pp.
13. *Sostoyaniye izuchennosti stratigrafii dokembriya i fanerozoia Rossii. Zadachi dalneyshikh issledovaniy* (State of knowledge of stratigraphy of the Precambrian and Phanerozoic of Russia. Tasks for further research). *Postanovleniya Mezhdомstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy*, Saint-Petersburg: VSEGEI, 2008, V. 38, 131 pp.
14. Stratigraphical charts of Urals (Precambrian, Paleozoic). MSK of Russia. Ekaterinburg, 1993, 151 p. charts.
15. Becker R. T., Kaiser S. I., Aretz M. Review of chrono-, litho- and biostratigraphy across the global Hangenberg Crisis and Devonian—Carboniferous Boundary. *Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events*. Ed. R.T. Becker, P. Konigshof, C.E. Brett. Geological Society, 2016, No. 423, pp. 355—386.
16. Bouma A. H. Sedimentology of some flysch deposits. In: *A graphic approach to facies interpretation*. Amsterdam: Elsevier, 1962, 168 p.
17. Bischoff G. Die Conodonten-Stratigraphie des rhenohertzynischen Unterkarbons mit Berücksichtigung der Wocklumeria-Stufe und der Devon/Karbon-Grenze. *Abh. hessisches Landes. Bodenforsch.*, 1957, No. 19, pp. 1—64.
18. Corradini C., Kaiser S. I., Perri M. C., Spalletta C. Protognathodus (Conodonta) and its potential as a tool for defining the Devonian/Carboniferous boundary. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 2011, V. 117, No. 1, pp. 15—28.
19. Corradini C., Spalletta C., Mossoni A., Matyja H., Over D.J. Conodonts across the Devonian/Carboniferous boundary: a review and implication for the redefinition of the boundary and a proposal for an updated conodont zonation. *Geological Magazine*, 2016, No. 1, pp. 1—15.
20. Dreesen R., Sandberg C.A., Ziegler W. Review of Late Devonian and Early Carboniferous conodont biostratigraphy and biofacies models as applied to the Ardenne shelf. *Annales de la Societe geologique de Belgique*, 1986, V. 109, pp. 27—42.
21. Gagiev M. H., Kononova L. I. The Upper Devonian and Lower Carboniferous sequences in the Kamenka River Section (Kolyma River Basin, the Soviet North-East) Stratigraphic description. Conodonta. *Courier Forsch. — Inst. Senkenberg*, No. 118, pp. 83—103.
22. Kalvoda J., Babek O., Malovana A. Sedimentary and biofacies records in calciturbidites at the Devonian-Carboniferous boundary in Moravia (Moravian-Silesian zone, Middle Europe). *Facies*, 1999, V. 41, pp. 141—158.
23. Lane H. R., Sandberg C. A., Ziegler W. Taxonomy and phylogeny of some Lower Carboniferous conodonts and preliminary standard post-Siphonodella zonation. *Geol. Palaeontol.* 1980, No. 14, pp. 117—164.
24. Nemirovskaya T. I., Chernykh V. A., Kononova L. I., Pazukhin V. N. Conodonts of the Devonian-Carboniferous boundary section, Kozhim, Polar Urals, Russia. *Annales de la Societe geologique de Belgique*, 1992, V. 115, pp. 629—647.
25. Sandberg C. A., Klapper G. Stratigraphy, age, and paleotectonic significance of the Cottonwood Canyon Member of the Madison Limestone in Wyoming and Montana: U. S. Geological Survey, 1967, Bulletin 1251-B, 70 p.
26. Sandberg C. A., Ziegler W., Leuteritz K., Brill S.M. Phylogeny, speciation, and zonation of Siphonodella (Conodonta, Upper Devonian and Lower Carboniferous). *Newsletters on Stratigraphy*, 1978, V. 7, No. 2, pp. 102—120.
27. Ziegler W. Eine neue Conodonten fauna aus dem höchsten Oberdevon. *Fortschr. Geol. Rheinl. Westfal*, 1969, V. 17, pp. 343—360.
28. Ziegler W. Catalogue of conodonts, V. 1, Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1973, 504 pp.
29. Ziegler W., Sandberg C. A. The Late Devonian standard conodont zonation. *Courier Forschungs institute Senkenberg*, 1990, V. 121, 115 pp.