ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ САИТОВСКОГО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЮЖНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ)

И. Р. Рахимов

Институт геологии Уфимского ФИЦ РАН, Уфа

rigel92@mail.ru

Статья посвящена изучению осадочных образований среднего — позднего миоцена в Южном Предуралье на примере Саитовского песчано-гравийного месторождения в южной части Ашкардарско-Сухайлинской неогеновой залежи. Представлены первые данные минерально-геохимических исследований лимнических отложений данной залежи. В разрезе карьера месторождения выделены две гравийно-галечные пачки, представленные главным образом обломками кварцитов (до 95 %), и две алевропесчаные пачки, в пелитовой фракции которых методом рентгеновской дифракции установлены глинистые минералы: каолинит, хлорит, иллит. Накопление грубообломочных толщ обусловлено тектонической активностью области сноса. В периоды её затухания мелко- и тонкообломочные породы формировались как за счёт разрушения крупных обломков, так и за счёт участия других источников сноса (древних каолиновых/иллитовых кор выветривания). Высокие значения индекса химического выветривания пород ($CI_A (Al_2O_3 / (Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O))_{molec} \times 100 = 90$) свидетельствуют об их образовании в условиях тёплого гумидного климата. Проведённые исследования позволяют не только охарактеризовать источники сноса миоценовых отложений, но и в целом уточнить геологическую историю Предуралья в миоцене.

Ключевые слова: Южное Предуралье, миоцен, песчано-гравийные отложения, гранулометрический состав, кварциты, глинистые минералы, литохимия.

MATERIAL COMPOSITION OF MIOCENE SEDIMENTS OF THE SAITOVO SAND-GRAVEL DEPOSIT (SOUTHERN PRE-URALS)

I. R. Rakhimov

Institute of Geology of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Ufa

We studied Middle–Late Miocene sediments on the example of representative section in the South part of Ashkadar-Sukhaylya Neogene bed. The first data of mineralogical-geochemistry investigations of Miocene limnic sediments of Saitovo sand-gravel deposit were presented. In the section of quarry of deposit two gravel-pebble and two silt-sandy packs were distinguished. The rocks were mainly composed of quartzite clasts (to 95 %). In the fine fractions of sands with X-Ray diffraction method clay minerals were found: kaolinite, chlorite, illite. The accumulation of gravel-pebble packs reflected formation through tectonically active setting of source of detritus. During stagnant tectonic settings fine-clastic rocks were formed through destruction of coarse material and as well as through other sources (ancient kaolin/illite weathering crusts). High value of chemical weathering index ($CI_A (Al_2O_3 / (Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O))_{molec} \times 100 = 90$) of rocks indicated their formation under warm humid conditions of climate. Completed investigation allowed not only to characterize Miocene sediments source of detritus, but also to define the pre-Urals Miocene geology history.

Keywords: Southern pre-Urals, Miocene, sand-gravel sediments, granulometric constitution, quartzites, clay minerals, lithochemistry.

Введение

Отложения неогена в Южном Предуралье развиты в виде относительно небольших изометричных залежей лимнического генезиса на водоразделах или протяжённых аллювиальных залежей в долинах рек. Пик их изучения приходится на 40–60-е гг. прошлого века [14], и с тех пор сведения о них в опубликованной литературе встречаются крайне редко и в основном лишь в биостратиграфическом аспекте [1]. С ними связаны ценные месторождения бурых углей, стекольных и формовочных песков, огнеупорных глин, а также песчано-гравийного материала [9]. Вместе с тем геологическая история их формирования характеризует важный этап геодинамической эволюции Южно-Уральского региона, определивший современный облик его геолого-геоморфологического строения [6].

Объектом исследований автора является неогеновая залежь, расположенная на Ашкардарско-Сухайлинском водоразделе (рис. 1, а) и вытянутая более чем на 50 км при ширине менее 10 км и максимальной мощности 30–40 м. В данной статье приводятся результаты изучения южной части этой залежи, где в карьере Саитовского месторождения (рис. 1, б) вскрыт наиболее представительный разрез мощностью

до 20 м. Разработка Саитовского месторождения велась в 1960–1980 гг., а полезной толщей служили в основном светлоокрашенные гравийно-галечные отложения. Геологическая информация об объекте известна лишь из производственного отчёта [2], в котором обозначен её среднепозднемиоценовый возраст. Под ней залегают пестроцветные глины нижнего миоцена мощностью не менее 14 м (предположительно — ворошиловская свита).

Цель исследований — изучение литолого-стратиграфических особенностей и вещественного состава отложений Ашкардарско-Сухайлинской неогеновой залежи на примере разреза Саитовского месторождения, которое уточнит геологическую историю Предуралья. Актуальность исследований обоснована тем, что отложения данной залежи практически лишены органических остатков и для установления их стратиграфической приуроченности определяющими становятся минералого-геохимические методы исследований.

Методы исследований

Гранулометрический состав пород определялся с помощью ситового анализа (фракции >10, 10–2, 2–1, 1–0.5, 0.5–0.2, 0.2–0.1 и < 0.1 мм) и отмучивания в ди-

Рис. 1. Геологическая карта района развития Ашкардарско-Сухайлинской неогеновой залежи (обозначена пунктиром) (а) по [4] и спутниковый снимок Google Earth карьера Сaitовского песчано-гравийного месторождения (б).

Условные обозначения: терригенные и терригенно-карбонатные отложения свит: 1 — шешминской (P_1), 2 — нежинской (P_1), 3 — соликамской (P_1), 4 — белебеевской (P_2), 5 — салмышской, гребенской, вязовской и кульчумовской объединённые (P_{2-3}), 6 — ворошиловской и ушкатлинской объединённые (N_1)

Fig. 1. Geological map of Ashkadar-Sukhaylya Neogene strata distribution region (marked by a dotted line) (a) and satellite image Google Earth of Saitovo sand-gravel deposit career (b).

Legend: terrigenous and terrigenous-carbonate sediments of: 1 — Sheshma suite (P_1), 2 — Nezhinka suite (P_1), 3 — Solikamsk suite (P_1), 4 — Belebey suite (P_2), 5 — Salmys, Grebenka, Vyazovka, and Kul'chumovo suites common (P_{2-3}), 6 — Voroshilovka, and Ushkatly suites common (N_1)

стиллированной воде (фракции 0.1–0.05, 0.05–0.005 и < 0.005 мм) по методике [5]. Контроль размерности обломков при отмучивании проводился с помощью предметного стекла на оптическом микроскопе Axioskop 40 A Pol (Carl Zeiss). На этом же приборе изучались полированные шлифы из образцов галек.

Рентгенофлуоресцентный анализ проводился на спектрометре VRA-30 (Carl Zeiss) в ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа) с использованием рентгеновской трубки с W-анодом (30 кВ, 40 мА). Атомно-абсорбционным методом (спектрофотометр «Спектр-5») определялись содержания Cr, Co, Ni, Cu, Zn и Pb. Рентгенофазовый анализ порошковых проб выполнялся на дифрактометре Shimadzu XRD6000 в $CuK\alpha$ -излучении (40 кВ, 30 мА). Съёмка осуществлялась с шагом 0.02° и временем счёта 10 с. Результаты были обработаны в программе «Match!» Crystal Impact.

Литологические критерии определялись с использованием известных коэффициентов: морфология обломков оценивалась по визуальной шкале Рассела и Тэйлора [17]; коэффициент сферичности рассчитывался по формуле Паев $\psi p = \sqrt{b/a}$, где a — длинная ось, b — короткая ось максимальной проекции обломка [11]; степень сортировки S_o вычислялась по методу квартилей ($\sqrt{Q3/Q1}$) П. Траска [19].

Для геохимической характеристики исследуемых пород и палеоклиматической реконструкции обстановок их формирования использовались петрохимические модули Я. Э. Юдовича, М. П. Кетрис [12], а также индекс химического выветривания $CIA = (Al_2O_3 / (Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O))_{molec} \times 100$ [16].

Для удобства использования в графических и табличных данных наименований литологических пачек применялись терминологические сокращения на основе англоязычного названия породы с присвоением номера согласно положению в разрезе (снизу вверх): sand-gravel (SG-1, SG-2), aleurite-sand (A-1, A-2).

Характеристика объекта исследований

В геологическом строении района Сaitовского месторождения участвуют пермские и неоген-четвертичные отложения осадочного чехла Восточно-Европейской платформы [4, 9]. Пермские отложения представлены полимиктовыми песчаниками с прослоями известняков и мергелей, относимых к шешминской, соликамской, белебеевской свитам ранней — средней перми. К неогеновым образованиям отнесены пестроцветные глины (предположительно нижнемиоценовые), светлоокрашенные галечники с прослоями кварцевых песков (предположительно средне- и верхнемиоценовые). Маломощные четвертичные образования развиты вдоль русел рек Ашкардар и Сухайля.

В изученном разрезе автором были выделены 4 литостратиграфические пачки: 2 гравийно-галечные (SG-1 и SG-2) и 2 алевропесчаные (A-1 и A-2) (рис. 2). Подстилающие пестроцветные глины карьером не вскрыты. По геолого-литологическим характеристикам исследуемые образования нами предварительно были отнесены к озёрным отложениям татарской толщи ушкатлинского горизонта среднего — верхнего миоцена (N_1^{2-3} us) [8].

Нижняя пачка (SG-1) мощностью 4–13 м сложена светло-серыми и рыжеватыми гравийными галечниками с прослоями среднезернистых песков. Выше залегает

Рис. 2. Схема литологического расчленения отложений Сaitовского месторождения: 1 — гравийно-галечные отложения, 2 — алевритовые, 3 — глинисто-алевритовые пески, 4 — глины жирные, 5 — жилы и прослои бурых железняков
Fig. 2. Scheme of lithology of Saitovo deposit. Legend: 1 — gravel-pebble sediments, 2 — aleurite-sands, 3 — clay-aleurite-sands, 4 — greasy clay, 5 — brown iron veins and bands

пачка светло-серых и охристо-рыжеватых алевритов (A-1) мощностью от 1.5 до 7 м. Выше вновь развита пачка гравийных галечников (SG-2), аналогичных SG-1, мощностью 3.5 м. Верхняя пачка (A-2) представлена алевритовыми песками буровато-светло-серого цвета мощностью 3–4 м. Кровлей разреза служит неравномерная по мощности современная кора выветривания (0.4–2 м) и почвенно-растительный слой (0.1–0.3 м).

Слоистость в отложениях выражена слабо и связана с незначительным проявлением гранулометрических градиентов. Залегание слоёв имеет субгоризонтальный (~3°) характер, хотя углы варьируют от 0 до 9°. Разрез осложнён системой мелких разрывных нарушений сбросового типа с восточным падением и амплитудой смещения крыльев до 3 м [8].

Результаты исследований

По результатам гранулометрического анализа в гравийно-галечных отложениях выявились некоторые вариации, связанные с переменным преобладанием обломков галечной либо гравийной размерности (табл. 1). Заполнителем обычно служит среднезернистый песок, доля фракции >100 мм не вычислялась, поскольку обломки валунной размерности в толщах немногочисленны. Галька и гравий представлены фрагментами кварцитов (90–95 об. %) и фтанитов (5–10 об. %). Изредка в галечниках встречаются включения-окашки голубовато-серых опесчаненных глин диаметром до 10 см. Обломки кварцитов имеют среднюю и хорошую окатанность (2–4 балла) и высокую степень сферичности (0.9–1), тогда как обломки фтанитов слабо- или среднеокатанны (1–2 балла), степень сферичности низкая (0.7–0.8).

В алевритовых отложениях ведущей является фракция 0.1–0.2 мм (песок мелкозернистый). Количество алевритовой фракции (0.005–0.05 мм) варьирует от 12.4 до 31.8 %, а доля глинистой фракции (< 0.005 мм) — от 4.1 до 31.9 %. Степень окатанности большинства песчаных зёрен по шкале Рассела и Тэйлора — 1. Сортировка отложений характеризуется как средняя и хорошая, коэффициент сортировки S_o варьирует от 1.3 до 1.9. Учитывая широкое распространение в них не просто кварца, а обломков кварцитов, по петрографическим признакам их следует относить к кремнёвым грауваккам и ваккам [10, 13].

В отложениях Сaitовского карьера выявлены многочисленные участки постседиментационного ожелезнения, проявленные в гравийных галечниках в виде тёмно-бурых полос и линз — скоплений тонкодисперсных минералов железа (рис. 3, а). Ширина полос варьирует от 1–5 до нескольких десятков сантиметров. Также встречаются прослои железистых конгломератов (галечник, сцементированный гидроксидно-железистым минеральным матриком) мощностью до 40 см, извилистые пропластки (рис. 3, б) и жилы бурых железняков толщиной до 3–5 см. Проластки имеют субгоризонтальную ориентировку и распространены в гравийно-галечной пачке SG-2, тогда как жильные тела заполняют трещины в алевритовых пачках A-2.

Главным минералом исследуемых отложений является кварц, преобладающий во всех гранулометрических фракциях, кроме глинистой. В галечных, гравийных и песчаных фракциях кварц содержится в количестве не менее 90 % (до 98 %), в алевритовой фракции его доля составляет 80–85 %, в глинистой — 24–35 %. Помимо кварца в песчаной фракции присутствуют полевые шпаты, мусковит, хлорит и другие минералы.

В тонких фракциях псаммитов (0.1–0.05, 0.05–0.005, < 0.005 мм) по результатам рентгенофазового анализа выявлены глинистые минералы групп каолинита, иллита, хлорита (рис. 4). Среди них обычно преобладает каолинит (до 47 мас. % во фракции < 0.005 мм), который идентифицируется по основным рефлексам 7.2, 3.6, 2.4, 2.3, 1.5 Å. Иллит диагностируется по пикам 10.0, 4.5, 3.9, 2.9 Å в пелитовой фракции (до 14 мас. %). Хлорит (до 6 %) также в основном характерен для фракции < 0.005 мм, определяясь по пикам 7.17, 2.49, 2.00 Å. Установлено значительное количество мусковита (до 4 % — в тонкой песчаной фракции, до 6 % — в алевритовой, до 17 % — в пелитовой) с рефlekсами 2.57, 10.0,

Таблица 1. Гранулометрический состав пород Сaitовского месторождения, мас. %

Table 1. Granulometric composition of Saitovo deposit, wt. %

Фракции, мм Fractions, mm	Индексы пачек и № проб / Indices of members and Nos of samples								
	SG-1					A-1			A-2
	D ₅ -29	D ₅ -33	D ₅ -34	D ₅ -35	D ₅ -41	D ₅ -50	D ₅ -51	D ₅ -52	D ₅ -56
10–100	41.59	51.13	35.16	59.59	25.24	0	0	0	0
2–10	27.73	22.64	54.35	29.90	38.45	0.03	0	0	0.04
1–2	4.44	4.49	2.34	1.97	4.27	0	0.03	0	0.01
0.5–1	4.48	4.07	1.13	0.74	4.21	0.03	0.01	0	0.01
0.2–0.5	18.28	12.94	4.57	6.06	22.33	2.22	0.12	2.18	11.29
0.1–0.2	1.99	2.32	0.46	0.59	3.24	29.94	3.10	20.12	42.38
<0.1	1.49	2.42	1.98	1.15	2.25	67.79	96.74	77.71	46.27
0.05–0.1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21.94	33.04	51.48	22.04
0.005–0.05	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23.62	31.80	12.38	20.15
<0.005	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	22.23	31.90	13.85	4.08
Сумма Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Примечание: «n.d.» — фракции не определялись. Представленные в пачках SG-1 и A-1 пробы отбирались снизу вверх через равный интервал.

Note: «n.d.» — fraction was not determined. Samples in SG-1 and A-1 were selected bottom upward through equal interval.

Рис. 3. Полосы ожелезнения (а) и пропластки бурых железняков (б) в гравийно-галечниках Сaitовского месторождения
Fig. 3. Ferriferous bands (a) and seams of ironstone (b) in the Saitovo sand-gravel deposit

4.99, 2.99, 2.00 Å. Мусковит наравне с кварцем уверенно определяется в породах невооружённым взглядом. В небольшом количестве присутствуют полевые шпаты (микроклин, альбит). Во всех исследованных фракциях проявляются чёткие рефлексы кварца (3.34, 4.25, 1.82, 1.54, 1.37 Å).

Главными рудными минералами железистых новообразований являются гётит (30–40 %) и гематит (16–35 %). Содержание FeO_t ($\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$) в железистых конгломератах составляет около 11 %. В жильных рудах алевропесков диагностированы гётит (67 %), гематит (15 %), магнетит (4 %), лепидокрокит (1 %) и др. Содержание FeO_t в жильных рудах достигает 32 %.

Количество кремнезёма в гравийных галечниках составляет 91–96 % (табл. 2), а значение гидролизатного модуля (ГМ) не превышает 0.07 (гипер- и суперсилиты). Алевропески Сaitовского месторождения характеризуются повышенным значением ГМ (0.14–0.27), относясь к классам нормо- и миосилитов. Содержание SiO_2 в них составляет 73.5–83.9 %. Модуль нормированной щёлочности (НКМ) в псефитах сильно варьирует (0.07–0.3), что связано с резкими колебаниями в них содержания Na_2O , тогда как в псаммитах его значение стабильно (0.07–0.09). На диаграмме ГМ – НКМ (рис. 5, а) выражено явное различие пород из разных пачек по типам корреляции индикаторных модулей: отрицательной в грубообломочных и положительной в мелкообломочных.

Разный характер распределения фигуративных точек наблюдается и на диаграмме ЖМ – ТМ, на которой грубообломочные пробы образуют тренд отрицательной корреляции, а алевропесчаные породы образуют компактное поле (рис. 5, б). Обе разновидности пород относятся к нормотитанистым по величине титанового модуля (ТМ) (в среднем 0.07), но сильно различаются по железному модулю (ЖМ): гравийные галечники относятся к супер- и гипержелезистым (ЖМ 0.9–2.5), а алевропески — к гипожелезистым (ЖМ 0.07–0.14) силитам.

Помимо вышеуказанных отличий, грубообломочные и мелкообломочные отложения Сaitовского ме-

Таблица 2. Химический состав пород Сaitовского месторождения и их тонких фракций
(оксиды — в мас.%, элементы — в г/т)

Table 2. Chemical composition of Saitovo deposit and its fine fractions
(oxides in wt. %, elements in ppm)

№ п/п No	№ проб Sample No	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO _t	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	ППП poi	Сумма Total
1	D₅-29	95.62	0.14	1.54	1.50	0.02	0.41	0.16	0.40	0.06	0.04	0.47	100.42
2	D ₅ -29-1	91.35	1.56	3.63	1.77	0.05	0.48	0.07	0.39	0.17	0.06	0.86	100.74
3	D₅-34*	91.53	0.09	1.56	4.05	0.06	0.20	0.04	0.20	0.06	0.14	1.21	99.23
4	D ₅ -34-1*	50.55	0.44	7.68	26.45	0.84	2.61	0.14	0.20	0.26	1.16	9.32	100.90
5	D₅-35*	90.83	0.15	2.45	4.10	0.02	<0.1	0.03	0.10	0.06	0.04	1.50	99.41
6	D ₅ -35-1*	68.44	0.84	7.85	11.74	0.13	3.89	0.12	<0.1	0.29	0.09	5.92	101.03
7	D₅-50	76.84	1.10	16.10	1.77	0.02	0.10	0.15	<0.1	1.25	0.05	3.42	100.96
8	D ₅ -50a	55.36	1.67	26.64	2.33	0.02	1.24	0.35	0.26	2.42	0.09	10.43	100.84
9	D ₅ -50b	86.43	0.87	8.33	0.88	0.01	0.78	0.10	0.27	1.01	0.11	1.42	100.23
10	D ₅ -50c	94.72	0.80	2.24	0.65	0.02	0.34	0.07	0.10	0.17	0.12	0.68	99.91
11	D₅-51	73.55	1.24	17.64	1.28	0.02	1.08	0.19	0.12	1.50	0.06	4.24	100.91
12	D ₅ -51a	56.39	1.85	25.35	2.33	0.02	1.13	0.32	0.12	2.28	0.12	10.84	100.76
13	D ₅ -51b	84.22	1.01	9.37	1.00	0.01	1.07	0.11	0.12	1.26	0.09	1.91	100.18
14	D ₅ -51c	94.91	0.52	1.90	0.46	0.01	1.09	0.07	0.12	0.15	0.11	0.29	99.63
15	D₅-52*	82.97	0.75	10.70	1.62	0.02	<0.1	0.15	0.10	0.67	0.11	3.11	100.23
16	D ₅ -52a*	52.81	1.59	24.53	6.19	0.02	1.55	0.35	0.26	1.94	0.16	11.11	100.53
17	D ₅ -52b*	80.36	1.42	11.81	2.18	0.02	0.22	0.13	0.12	1.24	0.07	3.00	100.58
18	D ₅ -52c*	96.00	0.53	1.88	0.55	0.02	<0.1	0.07	0.10	0.11	0.08	0.35	99.68
19	D₅-56	83.90	0.76	10.42	0.92	0.02	1.04	0.12	0.25	0.55	0.09	2.45	100.53
20	D ₅ -56a	54.51	2.13	25.43	2.45	0.02	2.44	0.22	0.24	1.43	0.21	10.22	99.33
21	D ₅ -56b	71.34	1.30	19.58	1.50	0.02	0.32	0.16	0.24	1.33	0.07	5.05	100.92
22	D ₅ -56c	95.29	0.58	1.83	0.63	0.02	0.73	0.06	0.25	0.09	0.03	0.28	99.81

Продолжение таблицы 2 / Continuation of table 2

№ п/п No	№ проб Sample No	Sc	V	Cr	Co	Ni	Cu	Zn	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Ba	Pb
1	D₅-29	11	32	100	3	16	17	5	<10	41	<10	74	16	<100	10
2	D ₅ -29-1	12	107	1180	<10	39	32	78	10	32	29	1404	12	<100	—
3	D₅-34*	12	106	270	4	120	69	34	<10	40	29	77	16	<100	15
4	D ₅ -34-1*	104	1064	4400	530	1520	470	420	<10	10	76	100	5	375	24
5	D₅-35*	10	49	370	13	72	49	20	16	42	27	86	13	431	24
6	D ₅ -35-1*	52	253	2885	84	220	137	111	13	35	<10	405	19	<100	—
7	D₅-50	9	111	220	5	65	12	13	83	54	32	443	16	244	30
8	D ₅ -50a	15	194	460	13	140	26	41	176	73	37	267	41	425	20
9	D ₅ -50b	13	65	150	<10	8	6	18	52	23	31	447	46	198	8
10	D ₅ -50c	8	35	300	<10	5	7	20	23	<10	20	840	37	122	10
11	D₅-51	15	102	240	7	46	10	20	68	<10	29	410	53	338	8
12	D ₅ -51a	8	175	340	10	110	32	920	161	32	34	287	54	436	24
13	D ₅ -51b	<5	61	160	<10	16	17	56	67	<10	47	454	47	234	12
14	D ₅ -51c	13	24	170	<10	7	8	8	<10	<10	21	461	61	<100	11
15	D₅-52*	10	33	190	11	26	9	21	26	<10	32	307	79	170	5
16	D ₅ -52a*	25	226	440	25	140	57	61	96	<10	42	250	46	266	25
17	D ₅ -52b*	22	84	220	15	23	27	32	57	<10	41	414	34	<100	12
18	D ₅ -52c*	11	12	103	<10	5	5	13	13	<10	31	410	51	<100	7
19	D₅-56	29	41	150	<10	33	7	20	44	11	23	292	41	127	6
20	D ₅ -56a	10	177	450	12	170	67	1100	102	29	37	275	42	195	40
21	D ₅ -56b	9	93	250	6	85	67	43	71	<10	33	370	48	191	9
22	D ₅ -56c	<5	25	220	<10	<5	82	14	<10	<10	16	432	51	<100	6

Примечание: 2, 4, 6 — фракции < 0.1 мм; 8, 12, 16, 20 — фракции < 0.005 мм; 9, 13, 17, 21 — фракции 0.005–0.05 мм; 10, 14, 18, 22 — фракции 0.05–0.1 мм; * — ожелезненные породы.

Note: 2, 4, 6 — fractions < 0.1 mm; 8, 12, 16, 20 — fractions < 0.005 mm; 9, 13, 17, 21 — fractions 0.005–0.05 mm; 10, 14, 18, 22 — fractions 0.05–0.1 mm; * — ferriferous rocks.

Рис. 4. Дифрактограммы порошковых проб тонких фракций песчаных пород Сaitовского месторождения: Q — кварц, K — каолинит, M — мусковит, Ch — хлорит, I — иллит, Mc — микроклин

Fig. 4. XRD powder patterns of the fine fraction of Saitovo deposit sandy rocks: Q — quartz, K — kaolinite, M — muscovite, Ch — chlorite, I — illite, Mc — microcline

Рис. 5. Диаграммы ГМ — НКМ (а) и ЖМ — ТМ (б) для гравийно-галечных (незалитые кружки) и алевропесчаных (залитые кружки) пород Сaitовского месторождения

Fig. 5. Diagrams ГМ — НКМ (a) and ЖМ — ТМ (b) for gravel-pebble (no painted circles) and silt-sandy (painted circles) Saitovo deposit sediments

сторождения различаются по величине алюмокремниевых (0.02 и 0.17 соответственно) и щелочного модулей (1.6–6.6 и 0.06–0.46 соответственно). По уровню средних концентраций микроэлементов гравийные галечники и алевропески значительно отличаются содержаниями Zr (79 против 363 г/т) и Nb (15 против 47 г/т). Для пород характерен высокий индекс химического выветривания CIA: 60–89 в псефитовых и 89–90 в псаммитовых отложениях, что свидетельствует о накоплении осадков в условиях гумидного климата. На это же указывает наличие небольших редких углистых включений в алевропесках.

В тонких фракциях гравийно-галечных и алевропесчаных отложений выявлены повышенные концентрации некоторых редких элементов (табл. 2): Cr (до 4400 г/т), Co (до 530 г/т), Ni (до 1520 г/т), Cu (до 470 г/т), Zn (до 1100 г/т), Zr (до 1404 г/т). Данное обстоятельство прежде всего связывается с минеральным составом тяжелой фракции.

Обсуждение и выводы

Литологический состав отложений свидетельствует как минимум о двух этапах тектонической активности области сноса в период накопления изученного разреза, выраженных в формировании двух грубообломочных пачек. Механизмы переноса обломочного материала включали как гравитационные процессы, так и деятельность водных потоков, имевших высокую транспортирующую способность. В конечном счете материал осаждался в более низких участках рельефа (во впадине размером с крупное озеро), перемывался и разрушался в прибрежных условиях. Механически прочные кварцитовые кластиты испытывали незначительное разрушение и хорошо окатывались, тогда как хрупкие фтаниты активно разрушались на месте осаднения и не успевали хорошо окатываться. В промежутке и после тектонически активных этапов ослабевающие потоки привносили терригенный и глинистый материал из других источников, например из древних кор выве-

тривания. Об этом свидетельствуют литологические и структурно-текстурные особенности отложений (мощность и гранулометрическая выдержанность пачек, морфология обломков, степень сортировки), принципиальные различия минерального и химического состава пород (количество кварца по отношению к минералам-алюмосиликатам и др., величина петрохимических модулей) гравийно-галечных и алевропесчаных пачек. При этом нельзя исключать, что часть каолинита и иллита образовалась *in situ* при разложении полевых шпатов и мусковита [18].

Псефитовые отложения являются практически мономинеральными кварцевыми породами ($Q > 95\%$), но в заполняющих гравийно-галечники песках (их объёмная доля варьирует от 10.5 до 36.3 %) в небольшом количестве присутствуют полевые шпаты, слюды и глинистые минералы. Такой минеральный состав обуславливает низкие значения гидролизатного и алюмокремниевого модулей, а также сильно варьирующие значения модуля нормированной щёлочности. В алевропесках из самостоятельных пачек также преобладает кварц ($Q > 70\%$), но и остальные минералы присутствуют в относительно постоянном количестве: полевые шпаты (2–6 %), слюды (5–9 %), глинистые минералы (13–18 %). Это и объясняет умеренно стабильные показатели многих петрохимических модулей в алевропесчаных отложениях. Вместе с тем и грубообломочные, и тонкообломочные породы имеют сопоставимые значения титанового модуля и индекса химического выветривания, что свидетельствует об однотипных климатических условиях их формирования (тёплый гумидный климат), а также, вероятно, об определённом единстве исходного субстрата. Возможно, грубый материал также содержал обломки не только силицитов, но и менее прочных (в механическом и химическом смысле) полевошпатосодержащих пород, которые подверглись значительному измельчению и разложению.

С аутигенным минералообразованием в отложениях Сайтовского месторождения связано формирование железистых конгломератов и жил, произошедшее при иллювиальном осаждении железа, т. е. в процессе инфильтрации обогащённых гуминовыми кислотами сточных вод, обеспечивших растворение органических остатков и общую светлую окраску отложений [7, 15].

Источником сноса для формирования осадков Сайтовского месторождения могли служить грубообломочные отложения близ гг. Мелеуз, Кумертау и с. Зирган, датированные на геологических картах триасом [4], а также переотложенные продукты древних кор выветривания (каолиновый и гидрохлоритовый горизонты [7]), располагавшихся ближе к складчатому Уралу. В связи с этим изученные отложения можно отнести к гибридной молассово-фалаховой формации [3]. Стоит отметить, что с тектонической активностью Предуральского и Западно-Уральского сегмента в неогене, к примеру, связывается воздымание пермского барьерного рифа, выраженного в виде цепочки шиханов [6].

Таким образом, особенности вещественного состава отложений Сайтовского месторождения свидетельствуют о том, что они формировались в эпоху эпизодической тектонической активизации области сноса. В периоды затухания тектонической активности отлагались алевропесчаные породы (кремнёвые граувакки

и вакки), образовавшиеся как за счёт разрушения местного грубообломочного материала в условиях гумидного климата, так и за счёт постоянного привнесения глинисто-терригенного вещества из других источников (древние каолиновые/иллитовые коры выветривания). В дальнейшем процессы инфильтрации сточных вод при участии гуминовых кислот привели к растворению органического вещества и миграции отдельных химических элементов с образованием железистых рудных тел. Выявленные условия залегания, степень сортировки, а также морфология обломков пород характерны для литеральной и профундальной фациальных зон относительно крупного озера.

Работа выполнена при финансовой поддержке темы № 0252-2017-0012 Госзадания ИГ УФИЦ РАН и РФФИ (проект №18-35-00391). Автор выражает благодарность Р. М. Рахимову за оказанную помощь при полевых работах.

Литература

1. Данукалова Г. А. Стратотипы свит миоцена Южно-Уральского региона // Геологический сборник № 9. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2011. С. 74–90.
2. Дунаев В. Ф. Отчёт о результатах поисков месторождений песчано-гравийного материала для дорожного строительства на участках Сеитовском, Четырмане и Кузьминовском в Фёдоровском районе БАССР, проведённых Стерлитамакской партией в 1961 г. Уфа: БТГУ, 1962. Т. 1. 32 с.
3. Елисеев А. И. Геологические формации и методы формационного анализа. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 36 с.
4. Князев Ю. Г. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000 листа N-40 (третье поколение). СПб.: ВСЕГЕИ, 2011.
5. Никулин И. И. Экспресс-приёмы выделения тонкодисперсных минералов из цемента осадочных пород // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2010. № 1. С. 286–292.
6. Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.
7. Разумова В. Н., Херасков Н. П. Геологические типы кор выветривания и закономерности их размещения // Геологические типы кор выветривания и примеры их распространения на Южном Урале: Труды ГИН АН СССР. М., 1963. Вып. 77. С. 4–34.
8. Рахимов И. Р., Данукалова Г. А. Литология и стратиграфия миоценовых отложений Сайтовского песчано-гравийного месторождения (Южное Предуралье) // Геология. Известия отделения наук о земле и природных ресурсов АН РБ. 2017. № 24. С. 14–23.
9. Сеницын И. И., Сеницына Г. И. Объяснительная записка к геологической карте СССР масштаба 1:200000, лист № 40-XXVI. М.: Министерство геологии, БТГУ, 1965. Т. 1. 170 л.
10. Систематика и классификации осадочных пород и их аналогов / В. Н. Шванов, В. Т. Фролов, Э. И. Сергеева и др. СПб.: Недра, 1998. 352 с.
11. Шванов В. Н. Песчаные породы и методы их изучения. Л.: Недра, 1969. 248 с.
12. Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.
13. Юдович Я. Э., Никулова Н. Ю. Петрографические этюды // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2005. № 7. С. 5–10.
14. Яхимович В. Л., Адрианова О. С. Кайнозой башкирского Предуралья. Уфа, 1959. Т. 1. Ч. 3. 301 с.

15. Jansen B. The mobility of aluminium, iron and organic matter in acidic sandy soils. Amsterdam: IBED, Universiteit van Amsterdam, 2003. 187 p.

16. Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites // Nature. 1982. V. 299. P. 715–717.

17. Russel R. D., Taylor R. E. Roundness and shape of Mississippi river sands. Journ. geol., 1937. V. 45. № 3. P. 225–267.

18. Ruiz Cruz M. D. Genesis and evolution of the kaolin-group minerals during the diagenesis and the beginning of metamorphism / In: Fernando Nieto and Juan Jiménez-Millán, eds. «Diagenesis and Low-Temperature Metamorphism. Theory, Methods and Regional Aspects» Seminarios SEM. 2007. No. 3. P. 41–52.

19. Trask P. D. Origin and environment of source sediments of petroleum. Houston, 1932. 281 p.

References

1. Danukalova G. A. *Stratotipy svit miotsena Yuzhno-Ural'skogo regiona* (The stratotypes of Miocene suites in the South-Urals region). Geologicheskii sbornik No. 9, Ufa: DizaynPoligrafServis, 2011, pp. 74–90.

2. Dunaev V. Ph. *Otchyot o rezul'tatakh poiskov mestorozhdeniy peschano-graviynogo materiala dlya dorozhnogo stroitel'stva na uchastkakh Seitovskom, Chetyrmane i Kuz'minovskom v Fyodorovskom rayone BASSR, provedyonnykh Sterlitamakskoy partiei v 1961 g* (Report on results of searching for sand-gravel materials deposit to road construction through the Seitovo, Chetyrman, and Kuz'minovka sites in the Fyodorovka was being carry out by Sterlitamak party). Ufa: BTGU, 1962. V. 1, 32 pp.

3. Eliseev A. I. *Geologicheskie formatsii i metody formatsionno-go analiza* (Geological formations and techniques of formational analysis). Syktyvkar: Geoprint, 2008, 36 pp.

4. Knyazev Yu. G. *Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:1000000 lista N-40 (tretie pokolenie)* (State geological map of Russian Federation in scale 1:1000000, sheet N-40 (third generation)). St. Petersburg: VSEGEI, 2011.

5. Nikulin I. I. *Ekspress-priyomy vydeleniya tonkodispersnykh mineralov iz tsementa osadochnykh porod* (Express-methods of derivation of fine minerals from sedimentary rocks' cement) // Vestnik VGU, Seriya: Geologiya. 2010, No. 1, pp. 286–292.

6. Puchkov V. N. *Geologiya Urala i Priuraliya (aktual'nye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii)* (Geology of the Urals and Cis-Urals (actual problems of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny). Ufa: DizaynPoligrafServis, 2010, 280 pp.

7. Razumova V. N., Kheraskov N. P. *Geologicheskie tipy kor vyvetrivaniya i zakonomernosti ikh razmeshcheniya. V kn.: Geolo-*

gicheskie tipy kor vyvetrivaniya i primery ikh rasprostraneniya na Yuzhnom Urale (Geological types of weathering crust and their placement regularities. In: Geological types of weathering crust and their placement regularities in the South Urals). Trudy GIN AN SSSR, 1963, V. 77, pp. 4–34.

8. Rakhimov I. R., Danukalova G. A. *Litologiya i stratigrafiya miotsenovykh otlozheniy Saitovskogo peschano-graviynogo mestorozhdeniya (Yuzhnoe Preduralie)* (Lithology and stratigraphy of Miocene sediments of Saitovo sand-gravel deposit (Southern pre-Urals)). Geologiya. Izvestiya otdeleniya nauk o zemle i prirodnykh resursov AN RB, 2017, No. 24, pp. 14–23.

9. Sinitsyn I. I., Sinitsyna G. I. *Obyasnitel'naya zapiska k geologicheskoy karte SSSR masshtaba 1:200000, list № 40-XXVI* (Explanatory note to geological map of USSR scale 1:200000, sheet № 40-XXVI). Moscow: Ministry of geology, BTGU, 1965, V. 1, 170 sh.

10. *Sistematika i klassifikatsii osadochnykh porod i ikh analogov* (Systematics and classification of sedimentary rocks and their analogues). Shvanov V.N., Frolov V.T., Sergeeva Ye.I. et. al. St. Petersburg: Nedra, 1998, 352 pp.

11. Shvanov V. N. *Peschanye породы i metody ikh izucheniya* (Sandy rocks and techniques of their investigation). Leningrad: Nedra, 1969, 248 pp.

12. Yudovich Ya. E., Ketris M. P. *Osnovy litokhimii* (Basics of lithochemistry). St. Petersburg: Nauka, 2000, 479 pp.

13. Yudovich Ya. E., Nikulova N. Yu. *Petrograficheskie etyudy* (Petrographic etudes) // Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2005, No. 7, pp. 5–10.

14. Yakhimovich V. L., Adrianova O. S. *Kaynozoy bashkirskogo Preduraliya* (Cenozoic of the bashkirian pre-Urals). Ufa, 1959, V. 1, Ch. 3, 301 pp.

15. Jansen B. The mobility of aluminium, iron and organic matter in acidic sandy soils. Amsterdam: IBED, Universiteit van Amsterdam, 2003, 187 pp.

16. Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature. 1982, V. 299, pp. 715–717.

17. Russel R. D., Taylor R. E. Roundness and shape of Mississippi river sands. Journ. geol., 1937, V. 45, No. 3, pp. 225–267.

18. Ruiz Cruz M. D. Genesis and evolution of the kaolin-group minerals during the diagenesis and the beginning of metamorphism / In: Fernando Nieto and Juan Jiménez-Millán, eds. «Diagenesis and Low-Temperature Metamorphism. Theory, Methods and Regional Aspects» Seminarios SEM, 2007, No. 3, pp. 41–52.

19. Trask P. D. Origin and environment of source sediments of petroleum. Houston, 1932. 281 p.