ПЕТРОГРАФИЯ ХРОМИТОНОСНЫХ УЛЬТРАМАФИТОВ АГАРДАГСКОГО МАССИВА (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТЫВА)

А. А. Пешков, А. И. Чернышов

Томский государственный университет, Томск

peshkov@ggf.tsu.ru

Объектом исследования являются ультрамафиты Агардагского хромитоносного массива, входящего в состав Южно-Тувинского офиолитового пояса. В работе приведена петрографическая характеристика пород и руд, рассмотрены особенности минералогического состава ультрамафитов. Широким распространением в массиве пользуются гарцбургиты при подчиненной роли дунитов и их серпентинизированные разновидности. Среди дунитов и, реже, гарцбургитов выявлены мелкие тела хромититов с различными типами структур: вкрапленной, густо вкрапленной и сливной. Хромшпинелиды в гарцбургитах и дунитах имеют однородный химический состав и представлены хромитами и редко субферрихромитами. Анализ вариаций состава хромшпинелидов в хромититах позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций. Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры.

Ключевые слова: ультрамафиты, хромититы, хромшпинелиды.

PETROGRAPHY OF CHROMITE-BEARING ULTRAMAFITES OF THE AGARDAG MASSIF (SOUTH-EASTERN TYVA)

A. A. Peshkov, A. I. Chernyshov

Tomsk State University, Tomsk

The object of the study is the ultramafites of the Agardag chromite-bearing massif, which is part of the South Tuva ophiolite belt. The work presents a petrographic characteristic of rocks and ores, and features of the mineralogical composition of ultramafites. Harzburgites with the subordinate role of dunites, and their serpentinized varieties, are widely developed in the massif. Among dunites and, more rarely, harzburgites, small bodies of chromitites with various types of structures were found: interspersed, densely interspersed and drain. Chrome spinelides in harzburgites and dunites have a homogeneous chemical composition and are represented by chromites and rarely subferrichromites. Analysis of variations in the composition of chrome spinelides in chromitites allows us to distinguish two trends in their evolution. The first trend reflects the deep mantle conditions of intense depletion of the substance of the upper mantle in the process of intense plastic deformations. The second trend in the evolution of chrome spinelides in chromitites is conditioned by the metamorphogenic transformations of chromitites, which took place in the process of moving ultramafites to the upper parts of the earth's crust.

Keywords: ultramafites, chromitites, chrome spinelids.

Введение

Целью настоящей работы является петрографическая характеристика пород и руд, а также выявление особенностей минералогического состава ультрамафитов.

Агардагский массив (рис. 1) является наиболее крупным в составе Южно-Тувинского офиолитового пояса и структурно приурочен к зоне сочленения Сангиленского срединного сиалического массива с раннекаледонской Восточно-Таннуольской складчатой зоной [2]. Агардагский массив представляет собой линзообразное тело длиной около 20 км при ширине до 3.5 км, которое вытянуто в северо-восточном направлении согласно с региональной структурой [3]. Контакты массива часто осложнены проникающими в него тектоническими клиньями кристаллических сланцев, а в зонах экзоконтакта нередко отмечаются отторженцы ультрамафитов. Вмещающие породы представлены кристаллическими сланцами с прослоями известняков, кремнистых, терригенных пород и относятся к кускунугской свите ($V-E_1$) [4]. Они имеют северо-восточное простирание с преимущественным падением на северо-запад.

Массив сложен главным образом породами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса с преобладанием гарцбургитов. Дуниты наблюдаются среди гарцбургитов в виде полос, жил, либо неправильных по форме обособлений довольно заметных размеров от 0.3–0.5 до 200–300 м. Эндоконтактовые части обычно сложены серпентинитами, среди которых отмечают-

ся тела клинопироксенитов [1]. В Агардагском массиве выявлены многочисленные небольшие по размерам проявления хромититов, преимущественно среди дунитов и, реже, гарцбургитов [4].

Методы исследования

Петрографическое изучение пород осуществлялось на поляризационном микроскопе AxioScop 40 фирмы Carl Zeiss. Химический состав оливинов, ортопироксенов и хромшпинелидов был определен на электронном сканирующем микроскопе Tescan Vega II LMU, оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с детектором Si (Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск, операторы К. В. Бестемьянова, А. С. Кульков).

Петрографическая характеристика пород и руд

Гарцбургиты представлены относительно свежими и серпентинизированными разностями, нередко переходящими в апогарцбургитовые серпентиниты (рис. 2, а, б).

Структура гарцбургитов средне-, крупнозернистая, текстура обычно однородная, реже директивная. Состав: оливин ~ 70–85 %, энстатит ~ 15–30 %, в акцессорных количествах отмечается хромшпинелид, вторичные минералы представлены серпентином, магнетитом и кальцитом.

Рис. 1. Геологическая позиция и схема геологического строения Агардагского массива (составлена по материалам [2, 3] с дополнениями авторов): 1 — кайнозойский чехол (впадины: УБС — Убсунурская, ДХ — Дусхоль-Чонсаирская, ШН — Шаранурская); 2 — осадочные отложения: среднекислые вулканиты пост- и позднеорогенные (O_3 -D); 3 — гранитоиды пост- и позднеорогенные калиевые и калинатровые (O-D); 4 — Сангиленский сиалический массив и его Верхнебуренский блок-спутник (R_3 - E_1); 5 — Агардагская межблоковая зона (структурные этажи: а — средний кремнисто-базальтоидный, V - E_1 , б — верхний туфогенно-карбонатный, E_1); 6 — массивы инициальных (додеформационных и/или дометаморфических) габброидов и гипербазитов (R_3 , V - E_1) вместе с ассоциирующими габбро-диоритами и плагиогранитами (цифры в кружках): 1 — Агардагский, 2 — Карашатский; 7 — разрывные нарушения: а — поздние, б — ранние субсогласные и кососекущие, включая древние пологие надвиги); 8 — сланцы и кварциты; 9 — ультрамафиты; 10 — габброиды

Fig. 1. Geological position and scheme of the geological structure of the Agardag massif (compiled from materials [2, 3] with the authors' additions): 1 — Cenozoic cover (depressions: UBS — Ubsunurskaya, DH — Dushol-Chonsairsky, SN — Sharanurskaya); 2 — sedimentary deposits of medium-acid volcanics post- and late-orogenic (O_3 -D); 3 — post- and late-orogenic potassium and calinatro granitoids (O-D); 4 — Sangilen sialic massif and its Verkhneburensky satellite block (R_3 - E_1); 5 — Agardagan interblock zone (structural floors: a — medium siliceous-basaltoid, V - E_1 , b — upper tuff-carbonate, E_1); 6 — arrays of initial (pre-deformation and / or pre-metamorphic) gabbroids and hyperbasites (R_3 , V - E_1) together with associated gabbro-diorites and plagiogranites (figures in circles): 1 — Agardagsky, 2 — Karashatsky; 7 — faults: a — late, b — early sub-consonant and cross-cutting, including the ancient gentle thrusts); 8 — slates and quartzites; 9 — ultramafic; 10 — gabbroids

Оливин в гарцбургитах образует субизометричные, иногда вытянутые зерна с плавными и заливообразными границами. Их размер 3–6 мм, редко до 10 мм. Удлиненные зерна часто обнаруживают предпочтительную ориентировку и отражают направление директивности. Для них характерно однородное погасание. Для пластически деформированных зерен оливина отмечается неоднородное погасание и полосы пластического излома.

В серпентинизированных гарцбургитах и серпентинитах оливины обычно интенсивно замещены, часто полностью, поперечно-волокнистыми ленточно-петельчатыми жилками лизардита либо хризотилом, промежутки между которыми выполнены пластинчато-волокнистыми индивидами и крипто-, микрозернистыми агрегатами серпентина. Редко в ядрах петель сохраняются фрагменты исходного оливина. В других случаях оливин полностью замещен антигоритом, который представлен шестоватыми, лучистыми, пластинчатыми индивидами, гребенчатыми жилками, а также крипто- и микрозернистыми агрегатами. Магнетит наблюдает-

ся в виде просечек, жилок, скоплений, приуроченных к участкам интенсивной серпентинизации.

Энстатит наблюдается в виде субизометричных, ксеноморфных, нередко удлиненных индивидов. Последние часто обнаруживают субпараллельную ориентировку, согласно директивности породы. Их размер от 3 до 6 мм. В пластически деформированных индивидах проявляется слабо выраженное неоднородное погасание.

Энстатит в гарцбургитах обычно полностью замещен микрозернистыми агрегатами талька серпентин-оливинового состава, либо агрегатами куммингтонит-серпентин-магнетитового состава с различными вариациями минералов, вплоть до мономинеральных (рис. 2, а, б).

Хромшпинелиды наблюдаются в виде редкой вкрапленности, обычно имеют эвгдральную и неправильную формы. Их размер до 2 мм. Отмечаются удлиненные индивиды, которые вытягиваются вдоль директивности. Центральные части зерен хромшпинелидов просвечивают красно-вишневым и красно-бурым цветом. Большая часть хромшпинелидов имеют черный цвет вследствие замещения магнетитом.

Рис. 2. Породы Агардагского массива: а — гарцбургит (обр. 15010); б — серпентинит апогарцбургитовый (обр. 5001); с — дунит (обр. 15011/4); д — серпентинит аподунитовый, карбонатизированный (обр. 15008). Эн — энстатит, Ол — оливин, Км — куммингтонит, Сер — серпентин, Хр — хромшпинелид, Ка — кальцит. Николи X

Fig. 2. Rocks of the Agardag massif: а — harzburgite (sample 15010); б — apoharzburgite serpentinite (sample 5001); с — dunite (sample 15011/4); д — apodunite, carbonatized serpentinite (sample 15008). Эн — enstatite, Ол — olivine, Км — cummingtonite, Сер — serpentine, Хр — chrome spinelide, Ка — calcite. Nicolì X

Дуниты также представлены как свежими, так и серпентинизированными разновидностями, иногда переходящими в аподунитовые серпентиниты (рис. 2, с, d). Структура дунитов представлена средней и грубозернистой разновидностями, отмечаются пегматоидная, реже порфирокластическая структуры. Текстура обычно однородная, в участках порфирокластеза отмечается наложенная директивность. Состав дунитов: оливин ~ 95–100 %, хромшпинелиды — до 5 %, отмечаются серпентин, магнетит.

Оливин в дунитах обычно имеет неправильную и субизометричную форму с плавными, часто заливообразными границами. Для него характерны значительные вариации размером от 2 до 10 мм, иногда до 30 мм. Зерна оливина обнаруживают однородное погасание. В участках порфирокластеза наблюдаются интенсивные пластические деформации оливина с образованием порфирокластовых и гетерогранокластовых структур. Зерна оливина приобретают резко выраженное неоднородное волнистое и блоковое погасание, появляются многочисленные полосы пластического излома. В участках порфирокластеза образуются удлиненные индивиды, которые ориентируются субпараллельно и отражают наложенную директивность. Вдоль границ деформированных индивидов оливина наблюдаются мозаичные агрегаты мелких зерен, которые образуются в результате синтетектонической рекристаллизации.

Зерна оливина в дунитах насыщены многочисленными хаотичными мелкими трещинками, которые выполнены поперечно-волокнистыми петельчатыми жилками лизардита либо хризотила.

В интенсивно серпентинизированных дунитах наблюдаются мелкие уцелевшие фрагменты исходного оливина. Большая часть серпентинизированных дунитов

замещена антигоритом, который наблюдается в виде микрозернистых, пластинчатых, игольчатых и шестоватых агрегатов, а также гребенчатых жилок, которые интенсивно замещают исходные зерна оливина. При этом серпентинизация сопровождается интенсивным образованием магнетита в виде тонкой и мелкой вкрапленности, а также многочисленных просечек и жилок. Наиболее интенсивно серпентинизация проявляется в зонах порфирокластеза.

Хромшпинелиды обычно наблюдаются в виде отдельных зерен, реже образуют небольшие сростания. Их размеры преимущественно составляют 0.5–1.5 мм. Мелкие зерна обычно субизометричные и эвгедральные, а более крупные индивиды имеют неправильную форму. Удлиненные зерна иногда обнаруживают субпараллельную ориентировку и отражают директивность породы. Хромшпинелиды обычно имеют вишнево-красный, красно-бурый, а по трещинкам и периферии — черный цвет вследствие замещения магнетитом.

Хромититы. По содержанию хромшпинелидов среди хромититов выделяются вкрапленные ~ 30–70 %, густо вкрапленные ~ 70–85 % и сливные ~ 85–100 % разновидности (рис. 2).

Во вкрапленных и густо вкрапленных хромититах (рис. 3, а, б) хромшпинелиды наблюдаются в виде отдельных зерен, которые часто образуют сростания. При этом удлиненные индивиды и сростания нередко ориентируются субпараллельно и отражают директивную текстуру. Зерна хромшпинелидов имеют субизометричную либо неправильную форму. Размер отдельных зерен составляет от 0.5 до 2–3 мм, агрегативных сростаний — от 3–4 мм до 10 мм и более. Разновидностью густо вкрапленных хромититов являются нодулярные рудные образования (рис. 3, с). Нодулы представля-

Рис. 3. Хромититы Агардагского массива: а) вкрапленные (обр. 12009/1); б) густо вкрапленные (обр. 15020); в) нодулярные (обр. 15023/2); д) сливные (обр. 15013/5). Хр — хромшпинелид, Сер — серпентин, Ка — кальцит, Хрз — хризотил, Хл — хлорит. а, б, d) николи II, в) николи X

Fig. 3. Chromitites of the Agardag massif: а) interspersed (sample 12009/1); б) densely interspersed (sample 15020); в) nodular (sample 15023/2); д) drain (sample 15013/5). Хр — chrome spinelide, Сер — serpentine, Ка — calcite, Хрз — chrysotile, Хл — chlorite. а, б, d) nicols II, в) nicols X

ют собой округлые сливные срастания хромшпинелидов. Их размер в диаметре составляет от 15 до 25 мм. Контур нодулей плавные, с заливообразными изгибами. Сливные хромититы (рис. 3, d) представляют собой сплошную массу. Нередко они разбиты трещинками на линзовидные блоки, которые вытягиваются в одном направлении и отражают наложенную директивность. Центральные части зерен и агрегатов хромшпинелидов просвечивают красно-бурым, вишнево-красным цветом, а по периферии и трещинкам замещаются черным магнетитом, иногда полностью.

Цементирующая масса сложена микролепидогранобластовыми агрегатами серпентина, кальцита, хлорита с различными количественными сочетаниями, вплоть до мономинеральных. Серпентин представлен пластинчатыми индивидами и короткими поперечно-волоконистыми жилками хризотила. Кальцит наблюдается в виде микрозернистых агрегатов и мелких жилок. Хлорит представлен фиолетовой хромовой разновидностью — киммереритом, он выполняет трещинки, секущие зерна хромшпинелидов, а также нередко составляет основную массу.

Особенности минералогического состава ультрамафитов

При рассмотрении особенностей минералогического состава ультрамафитов Агардагского массива основное внимание уделялось изучению оливина, ортопироксена и хромшпинелида.

Оливины

В гарцбургитах оливины по химическому составу оказываются очень близкими и соответствуют форстериту ($Fa = 8.31–8.54\%$), при незначительной вариации MgO и FeO (табл. 1). В дунитах оливины по своему

составу также соответствуют форстериту, однако в них наблюдается увеличение вариаций фаялитового минала ($Fa = 6.45–8.61$) в сторону уменьшения железистости, они отличаются также большими вариациями MgO и FeO . В оливинах из гарцбургитов и дунитов отмечаются заметные содержания NiO — $0.25–0.49\%$. Однако CaO и MnO не были обнаружены, что, возможно, связано с их интенсивным рестинованием. По своему составу оливины из гарцбургитов и дунитов Агардагского массива являются практически аналогичными и близкими оливинам из гарцбургитов и дунитов хромитонесущих Кемпирсайского и Калнинского массивов [6, 11].

Ортопироксены

Химический состав ортопироксенов в гарцбургитах отличается высокой магнезиальностью при низкой железистости и глиноземистости (табл. 2). По своему составу ортопироксены соответствуют энстатиту мало-глиноземистого типа ($En = 89.40–91.30$, $Fs = 7.02–8.35$, $Wo = 1.57–2.57$). Одним из информативных параметров для ортопироксенов является Al^{IV}/Al^{VI} . В исследуемых ортопироксенах алюминий в шестерной координации обычно отсутствует. На этом основании можно полагать, что по своему составу и расчетным параметрам ортопироксены относятся к метаморфическому типу, сформировавшемуся при высоких температурах ($750–1200\text{ }^{\circ}C$) и относительно низких давлениях (4–12 кбар) [6]. Они близки энстатитам из гарцбургитов других хромитонесущих массивов — Кемпирсайского и Калнинского [6, 11].

Хромшпинелиды

Хромшпинелиды в гарцбургитах и дунитах Агардагского массива отличаются однородностью химического состава и представлены главным образом хромитами и редко субферрихромитами (рис. 4, а; табл. 3), что,

Таблица 1. Химический состав оливина в ультрамафитах (мас. %)

Table 1. The chemical composition of olivine in ultramafites (wt. %)

Обр. / Sample	15010	15020/1	15025	15011/3	15011/4	15018	15025/2	15027
Породы / Rocks	Гарцбургиты / Harzburgite			Дуниты / Dunite				
SiO ₂	40.27	40.81	41.78	40.95	40.40	41.20	40.61	40.63
MgO	50.86	50.17	49.40	51.54	51.99	49.66	49.89	52.24
FeO	8.42	8.05	8.22	7.22	6.96	8.33	8.04	6.50
NiO	0.25	0.49	0.47	0.31	0.43	0.40	0.41	0.31
Сумма / Total	99.80	99.52	99.87	100.02	99.78	99.59	98.95	99.68
Fa(%)	8.54	8.31	8.45	7.34	6.93	8.61	8.33	6.45

Примечание: Fa — содержание фаялитового минала [Fa (%) = Fe/(Fe+Mg)×100].

Note: Fa — content of fayalite mineral [Fa (%) = Fe/(Fe+Mg)×100].

Таблица 2. Химический состав ортопироксена в гарцбургитах (мас. %)

Table 2. Chemical composition of orthopyroxene in harzburgite (wt. %)

Образец / Sample	15010	15020/1	15020/2	15020/3
SiO ₂	57.25	57.83	57.45	57.21
Al ₂ O ₃	0.74	1.01	0.89	0.99
Cr ₂ O ₃	0.47	0.59	0.61	0.36
FeO	4.94	5.68	5.61	5.57
MgO	35.68	34.05	34.09	34.48
CaO	0.92	0.83	1.07	1.39
Сумма	100	99.99	99.72	100
Числовые характеристики (в %) Quantitative characteristics (in %)				
F	7.14	8.48	8.38	8.24
Wo	1.68	1.57	2.01	2.57
Fs	7.02	8.35	8.21	8.02
En	91.30	90.08	89.78	89.40

Примечание / Note: F=Fe/(Fe+Mg)×100, Wo=Ca/(Ca+Fe+Mg)×100, Fs=Fe/(Ca+Fe+Mg)×100, En = Mg/(Ca+Fe+Mg)×100.

очевидно, связано с одинаковой степенью их метаморфического преобразования в процессе высокотемпературного пластического деформирования. По составу они близки хромшпинелидам из дунитов и гарцбургитов Калнинского и Кемпирсайского массивов [6, 11].

Хромшпинелиды в хромититах отличаются более широкими вариациями состава, чем во вмещающих дунитах и гарцбургитах. Они представлены преимущественно алюмохромитами, хромитами, а также во вкрапленных разностях отмечаются субферриалюмохромиты и хроммагнетиты, в густо вкрапленных — фер-

рихромиты и хроммагнетиты, в сливных — магнетиты (рис. 4, б; табл. 4).

Ранее уже проводилось изучение химического состава хромшпинелидов, итогом которого явилось выделение единого линейного тренда, отражающего уменьшение магнезиальности и глиноземистости при увеличении содержаний хрома и железа [13].

В данной работе в ходе детального изучения отдельных образцов хромититов установлено, что в рудах хромшпинелиды не отличаются постоянством состава и для них часто обнаруживаются вариации состава, иногда существенные (табл. 4).

Во вкрапленных рудах они соответствуют алюмохромитам с незначительной тенденцией возрастания хромистости. В густо вкрапленных и сплошных рудах отмечаются значительные вариации хромистости, которые выражаются в последовательной смене от алюмохромитов к хромитам. Во всех случаях в рудах завершают вариации состава хромшпинелидов хроммагнетиты и магнетиты (рис. 3, б). Анализ вариаций состава хромшпинелидов позволяет выделить два тренда их эволюции [8]. Первый тренд включает алюмохромиты и хромиты с постепенным возрастанием их хромистости. Он отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций и сопровождается предположительно сегрегированием хромшпинелидов в рудные вкрапленные тела. Вероятно, что с увеличением степени пластического деформирования происходило неравномерное «выдавливание» оливина из хромитов с образованием густо вкрапленных и сплошных рудных тел. При этом сопутствующий метаморфизм сопровождался уменьшением магнезиальности и глиноземистости и способствовал формированию высокохромистых хромитов. Подобная эволюция состава

Таблица 3. Химический состав хромшпинелида в ультрамафитах (мас. %)

Table 3. Chemical composition of the chrome spinellide in ultramafites (wt. %)

Образец / Sample	15010	15011/2	15012	15020/1	15024	15011/3	15011/4	15018	15025/2
Породы / Rocks	Гарцбургиты / Harzburgite					Дуниты / Dunite			
Al ₂ O ₃	11.31	4.56	11.64	12.97	7.96	11.16	10.83	8.70	7.47
Cr ₂ O ₃	55.81	59.92	58.80	56.92	61.81	57.99	58.07	59.59	59.94
V ₂ O ₅	—	0.25	0.45	—	—	0.40	0.43	—	—
FeO	22.72	23.75	18.39	19.33	21.23	20.49	19.78	21.77	22.88
MgO	9.92	9.68	10.66	9.59	7.93	9.62	10.59	8.64	8.16
Сумма / Total	99.76	98.16	99.94	98.81	98.93	99.66	99.70	98.70	98.45

Таблица 4. Химический состав хромшпинелида в хромититах (мас. %)

Table 4. Chemical composition of chrome spinellide in chromite (wt. %)

Образец Sample	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	V ₂ O ₅	MnO	FeO	MgO	NiO	Сумма Total
15011	11.86	51.98	0.09	1.03	20.47	13.86	0.19	99.48
15023/1	14.80	55.38	0.19	0.34	13.98	15.04	0.18	99.91
12009/1	2.88	59.38	0.11	0.91	25.11	11.28	—	99.67
12015/19	11.31	58.82	0.11	0.34	17.16	11.77	0.07	99.58
Аг-6	19.43	50.29	—	—	15.27	15.47	—	100.46
Аг-6	18.28	51.55	—	—	16.33	14.82	—	100.98
Аг-6	17.42	52.27	—	—	16.77	14.02	—	100.48
Аг-6	0.58	26.69	—	—	65.30	3.11	2.07	97.75
15013	9.57	63.11	0.10	0.42	15.05	11.54	0.09	99.88
15013/7	9.57	63.11	0.10	0.42	15.05	11.54	0.09	99.88
15016	15.79	55.74	0.18	0.21	14.33	13.43	0.08	99.76
15020	8.48	62.85	0.07	0.09	15.31	13.00	0.10	99.90
12012/3	24.33	44.89	0.05	0.18	15.73	14.51	0.07	99.76
Аг-4	9.88	62.65	—	—	14.49	13.26	—	100.28
Аг-4	7.41	65.01	—	—	16.25	12.10	—	100.77
Аг-4	2.77	69.06	—	—	19.85	8.75	—	100.43
Аг-4	—	13.77	—	—	83.16	0.46	—	97.39
Аг-5	15.63	55.57	—	—	16.71	12.96	—	100.87
Аг-5	3.07	65.50	—	—	24.50	7.29	—	100.36
Аг-5	—	69.72	—	—	27.71	3.60	—	101.03
Аг-5	—	5.95	—	—	90.07	0.80	1.05	97.87
15013/7	6.79	63.07	0.09	0.65	16.20	11.80	0.07	98.67
12004/1	12.24	57.64	0.14	0.50	16.51	12.64	0.15	99.82
12006/1	15.53	55.91	0.04	0.30	15.59	13.82	0.15	101.34
12011/2	4.63	58.44	0.18	1.54	26.02	8.66	0.22	99.69
12004/1	13.65	57.64	—	—	13.51	14.64	—	99.44
12004/1	12.35	59.14	—	—	14.78	13.58	—	99.85
12004/1	11.62	60.57	—	—	15.83	12.35	—	100.37
12004/1	2.10	34.25	—	—	56.52	—	4.51	97.38
15013/7	12.21	57.64	—	—	13.31	15.90	—	99.06
15013/7	3.61	66.64	—	—	17.28	11.19	—	98.72
15013/7	3.11	68.93	—	—	18.00	8.31	—	98.35
15013/7	—	22.75	—	—	69.72	2.50	3.38	98.35

хромититов отмечалась для Харчерузского массива на Полярном Урале [12].

Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое возрастание роли железистой составляющей с одновременным уменьшением Al, Mg и Cr, что в конечном счете привело к образованию магнетитов. Подобные тренды эволюции хромшпинелидов были установлены для хромититового массива Сыум-Кеу на Полярном Урале [5, 9].

Содержания MgO, Al₂O₃, Cr₂O₃ и FeO значительно варьируют, однако их вариации не увязываются со структурными типами. Отмечается тенденция уменьшения MnO от вкрапленных к густовкрапленным и сливным хромититам. Вариации состава хромшпинелидов в хромититах, очевидно, обусловлены их неод-

нородными метаморфогенными преобразованиями в процессе пластического деформирования. К наиболее метаморфизованным относятся хромиты и алюмохромиты, которые отмечаются во всех структурных типах.

Заключение

Детальным петрографическим изучением установлены главные типы пород, слагающие Агардагский массив, представленные главным образом метаморфическими ультрамафитами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса Южно-Тувинского офиолитового пояса. В массиве широко распространены гарцбургиты при подчиненной роли дунитов и их серпентинизированные разновидности. Дуниты и гарцбургиты имеют преимущественно средне-, крупнозернистые структуры, нередко грубозернистые до пегматоидных. Они часто обнаруживают признаки пластических деформаций, что выражается в появлении неоднородного вол-

Рис. 4. Состав хромшпинелидов в гарцбургитах, дунитах (а) и хромититах (б) Агардагского массива на классификационной диаграмме Н. В. Павлова [7]: 1 — хромиты, 2 — субферрихромиты, 3 — алюмохромиты, 4 — субферриалюмохромиты, 5 — ферриалюмохромиты, 6 — субалюмоферрихромиты, 7 — феррихромиты, 8 — хромпикотиты, 9 — субферрихромпикотиты, 10 — субалюмохроммагнетиты, 11 — хроммагнетиты, 12 — пикотиты, 13 — магнетиты

Fig. 4. Compositions of chrome spinelids in harzburgites, dunites (a) and chromitites (b) of the Agardag massif on the classification diagram N. V. Pavlova [7]: 1 — chromites, 2 — subferrichromites, 3 — aluminochromites, 4 — subferrialuminochromites, 5 — ferrialuminochromites, 6 — subaluminoferrichromites, 7 — ferrichromites, 8 — chrome picotites, 9 — subferrichrompicotites, 10 — subaluminochromomagnetites, 11 — chromomagnetites, 12 — picotites, 13 — magnetites

нистого погасания минералов, полос пластического излома и в порфиорокластезе, обусловленном синтетектонической рекристаллизацией.

Среди дунитов и, реже, гарцбургитов Агардагского массива выявлены многочисленные мелкие тела хромитов с различными типами структур: вкрапленной, густо вкрапленной и сливной. Они, очевидно, приурочены к линейным участкам интенсивного рестирования мантийного субстрата, а их образование предположительно обусловлено метаморфической сегрегацией хромшпинелидов в рудные линейно-полосчатые тела в процессе высокотемпературного пластического течения, контролирующего полосчатую структуру массива [10, 11]. В результате прогрессирующей пластической деформации происходило уплотнение хромититов с формированием густо вкрапленных и сливных структур, а сами тела при этом приобрели будинированную форму, часто обтекаемую серпентинитами.

Анализ химического состава хромшпинелидов в породах и рудах позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд характеризует уменьшение магнетизмности и глиноземистости при увеличении содержания хрома и железа. Данное направление отражает изменение составов хромшпинелидов в мантийных условиях [9, 11] и, очевидно, обусловлено степенью рестирования вмещающих ультрамафитов. Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое возрастание роли железистой составляющей с одновременным уменьшением Al, Mg и Cr, что в конечном счете привело к образованию магнетитов.

Литература

1. Асафонов Л. В., Лхамсурэн Ж., Кужугет К. С., Ойдуу Ч. К. Платиноносность ультрамафит-мафитов Монголии и Тувы.

Улаанбаатар: Монгольский государственный университет науки и технологии, 2005. 224 с.

2. Гоникберг В. Е. Роль сдвиговой тектоники в создании орогенной структуры ранних каледонид Юго-Восточной Тувы // Геотектоника. 1999. № 3. С. 89–103.

3. Гончаренко А. И. Деформация и петроструктурная эволюция альпинотипных гипербазитов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. 404 с.

4. Никитчин П. А. К вопросу о геологическом строении и хромитонности Агардагского гипербазитового массива // Материалы по геологии Тувинской АССР. 1969. Вып. 1. С. 43–47.

5. Макеев А. Б., Брянчанинова Н. И. Топоминералогия ультрабазитов Полярного Урала. СПб.: Наука, 1999. 252 с.

6. Малахов И. А. Петрохимия главных формационных типов ультрабазитов. М.: Наука, 1983. 207 с.

7. Павлов Н. В. Химический состав хромшпинелидов в связи с петрографическим составом пород ультраосновных интрузивов // Труды Геологического института РАН. 1949. Вып. 103. 91 с.

8. Пешков А. А., Чернышов А. И. Особенности метаморфизма хромититов Агардагского массива // Петрология магматических и метаморфических пород. Томск: Томский ЦНТИ, 2018. С. 289–292.

9. Плотноков А. В. Анализ перспектив хромитонности массива Сыум-Кеу (Полярный Урал): Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук. Пермь, 2009. 21 с.

10. Савельев Д. Е. Ультрамафитовые массивы Крака (Южный Урал): особенности строения и состава перидотит-дунит-хромититовых ассоциаций. Уфа: Башк. энцикл., 2018. 204 с.

11. Чернышов А. И., Юричев А. Н. Петроструктурная эволюция ультрамафитов Калнинского хромитонного массива в Западном Саяне // Геотектоника. 2013. № 4. С. 31–46.

12. Чернышов А. И., Юричев А. Н. Структурная эволюция дунитов и хромитов Харчерузского массива (Полярный Урал) // Геотектоника. 2016. № 2. С. 62–77.

13. Юричев А. Н., Чернышов А. И., Кульков А. С. Рудная минерализация Агардагского ультрамафитового массива (Республика Тыва) // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. № 1. С. 130–136.

References

1. Agafonov L. V., Lkhamsuren ZH., Kuzhuget K. S., Oydup CH. K. *Platinonosnost' ul'tramafit-mafitov Mongolii i Tuvy* (Platinum-bearing ultramafic-mafits of Mongolia and Tuva). Ulaanbaatar: Mongolian State University of Science and Technology, 2005, 224 pp.
2. Gonikberg V. Ye. *Rol sdvigovoy tektoniki v sozdaniy orogennoy struktury rannikh kaledonid Yugo-Vostochnoy Tuvy* (Role of shear tectonics in creating the orogenic structure of the early Caledonids of South-Eastern Tuva). *Geotektonika*, 1999, No. 3, pp. 89–103.
3. Goncharenko A. I. *Deformatsiya i petrostrukturnaya evolyutsiya al'pinotipnykh giperbazitov* (Deformation and petrostructural evolution of alpine-type hyperbasites). Tomsk: Tomsk University, 1989, 404 pp..
4. Nikitchin P. A. *K voprosu o geologicheskom stroyenii i khromitonosnosti Agardagskogo giperbazitovogo massiva* (Geological structure and chromite-bearing capacity of the Agardagsky hyperbasite massif). *Materials on geology Tuvinskoy ASSR*, 1969, 1, pp. 43–47.
5. Makeyev A. B., Bryanchaninova N. I. *Topomineralogiya ul'trabazitov Polyarnogo Urala* (Topomineralogy of ultrabasites of the Polar Urals). St. Petersburg: Nauka, 1999, 252 pp.
6. Malakhov I. A. *Petrokhimiya glavnykh formatsionnykh tipov ul'trabazitov* (Petrochemistry of the main formation types of ultrabasites). Moscow: Nauka, 1983, 207 pp.
7. Pavlov N. V. *Khimicheskiy sostav khromshpinelidov v svyazi s petrograficheskim sostavom porod ul'traosnovnykh intruzivov* (Chemical Composition of Chrome Spinelids in Connection with the Petrographic Composition of Ultrabasic Intrusive Rocks). *Trudy Geologicheskogo instituta RAN*, 1949, 103, 91 pp.
8. Peshkov A. A., Chernyshov A. I. *Osobennosti metamorfizma khromititov Agardagskogo massiva* (Features of chromitite metamorphism of the Agardag massif). In: *Petrology of magmatic and metamorphic rocks*. Tomsk: Tomskiy TSNTI, 2018, pp. 289–292.
9. Plotnikov A. V. *Analiz perspektiv khromitonosnosti massiva Syum-Keu (Polyarnyy Ural)* (Analysis of the prospects for the chromite-bearing capacity of the Syum-Keu massif (Polar Urals)). Extended abstract of PhD dissertation. Perm, 2009, 21 pp.
10. Savelyev D. Ye. *Ultramafitovyie massivy Kraka (Yuzhnyy Ural): osobennosti stroyeniya i sostava peridotit-dunit-khromititovykh assotsiatsiy* (Ultramaphyte massifs of Krak (South Urals): structural features and composition of peridotite-dunite-chromitite associations). Ufa: Bashk. entsikl., 2018, 204 pp.
11. Chernyshov A. I., Yurichev A. N. *Petrostrukturnaya evolyutsiya ul'tramafitov Kalninskogo khromitonosnogo massiva v Zapadnom Sayane* (Petrostructural evolution of ultramafites of the Kalninsky chromite-bearing massif in the Western Sayan). *Geotektonika*. 2013, No. 4, pp. 31–46.
12. Chernyshov A. I., Yurichev A. N. *Strukturnaya evolyutsiya dunitov i khromitov Kharcheruzskogo massiva (Polyarnyy Ural)* (Structural Evolution of the Dunites and Chromites of the Khartsuzsky Massif (Polar Urals)). *Geotektonika*, 2016, No. 2, pp. 62–77.
13. Yurichev A. N., Chernyshov A. I., Kul'kov A. S. *Rudnaya mineralizatsiya Agardagskogo ul'tramafitovogo massiva (Respublika Tyva)* (Ore mineralization of the Agardagsky ultramafic massif (Republic of Tyva)). *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta*, 2013, V. 323, No. 1, pp. 130–136.