Арктический вектор геологических исследований Arctic vector of geological research

УДК 550.93:549.514.81(234.851)

DOI: 10.19110/2221-1381-2019-6-3-11

РЕЗУЛЬТАТЫ U-Pb-ДАТИРОВАНИЯ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ ИЗ ПЕСЧАНИКОВ МАНИТАНЫРДСКОЙ СЕРИИ НА КРЯЖЕ МАНИТАНЫРД (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

Н. Ю. Никулова, А. А. Соболева

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
nikulova@geo.komisc.ru, aa_soboleva@mail.ru

Показаны результаты впервые проведенного U-Pb-датирования детритовых цирконов из песчаников в составе алевролитно-песчанниковой толщи в основании разреза уралид на кряже Манитанырд. Установлено, что основными источниками терригенного материала при формировании песчаников были ранневендско-раннеордовикские комплексы различных этапов формирования протоуралид-тиманид. Сделан вывод о принадлежности алевролитно-песчанниковой толщи к верхнему элементу разреза манитанырдской серии — малопайпудинской свите среднего ордовика — стратиграфическому аналогу саледакской свиты Приполярного Урала. На основании сопоставления возрастных характеристик обломочных цирконов из различных нижнепалеозойских разрезов Приполярного и Полярного Урала сделан вывод о единой на позднерифейско-раннепалеозойском этапе развития геологической истории северной части Уральской складчатой области.

Ключевые слова: детритовые цирконы, песчаник, обломочный материал, U-Pb-возраст.

DETRITAL ZIRCON U-Pb-DATING FROM SANDSTONES OF THE MANITANYRD SERIES AT THE MANITANYRD RIDGE (POLAR URALS)

N. Yu. Nikulova, A. A. Soboleva

Institute of Geology, Komi SC UB RAS, Syktyvkar

The article presents results of the first U-Pb-dating of detrital zircons from sandstones in the aleurolite-sandstone strata at the base of the Uralides section at the Manitanyrd Ridge. It was established that main sources of terrigenous material for sandstones were Early Vendian to Early Ordovician complexes at various stages of Protouralides-Timanides formation. We made conclusion that the aleurolite-sandstone strata belong to the upper member of the Manitanyrd Group — Middle Ordovician Malopaypudynskaya Formation — a stratigraphic analog of the Saledak Formation at the Subpolar Urals. Based on a comparison of the ages of detrital zircons from various Lower Paleozoic sections of the Subpolar and Polar Urals, we assume that this area had the same geological history in the Late Riphean — Early Paleozoic.

Keywords: detrital zircons, sandstone, clastic material, U-Pb-age.

Введение

Отложения, слагающие основание палеозойского разреза на Полярном Урале, объединены в манитанырдскую серию, расчлененную на две части: нижнюю — красноцветную — и верхнюю — зелено-сероцветную¹. Красноцветная часть разреза включает верхнекембрийско-нижеордовикскую хойдышорскую, локально развитую только в Усинско-Пайпудинском районе, и нижеордовикскую усинскую свиты. Выше согласно залегает алевролитно-песчанниковая зелено-сероцветная толща, выделяемая в малопайпудинскую свиту. Стратиграфическим аналогом усинской свиты на Приполярном Урале является обеизская (теппосская), малопайпудинской — саледакская (хыдейская) свита. В западной части кряжа Манитанырд манитанырдская серия закартирована нерасчлененной и сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами и сланцами.

Алевролитно-песчанниковая толща, залегающая на породах фундамента в обнажении на руч. Голубой, левом притоке р. Нияю в центральной части кряжа Манитанырд, закартирована в качестве нерасчлененной манитанырдской серии, однако отсутствие фаунистических данных, однозначно указывающих на ее нижнепалеозойский возраст, и несогласный контакт с породами енганепэйской свиты ставят под сомнение достоверность определения ее стратиграфического положения.

Проводившая на кряже Манитанырд поисковые работы на золото Л. И. Ефанова² отмечает пространственное тяготение к алевролитно-песчанниковой толще почти всех известных рудопроявлений золота, развитых в полосе енганепэйской свиты, и предполагает возможность экранирования этими породами оруденения и формирования вдоль них минерализации жильного золото-кварц-сульфидного типа. Возраст манитанырд-

¹Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Уральская серия — Лист Q-41 (Воркута). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2007. 541 с.

²Ефанова Л. И. и др. Прогнозно-поисковые работы на золото в пределах хр. Манитанырд и Енганэ-Пэ (Республика Коми). Сыктывкар, 2009 г.

ской серии Л. И. Ефановой принят как позднекембрийско-раннеордовикский, в составе серии выделены две части: нижняя — преимущественно красноцветная — и верхняя — зелено-сероцветная, а также отмечено, что обнаженность этой части разреза недостаточна для достоверного картирования малопайпудинской свиты как самостоятельного подразделения.

В ходе полевого изучения разреза зоны межформационного контакта фундамент/чехол на руч. Голубом мы предположили, что именно верхняя часть разреза манитаньрдской серии — малопайпудинская свита — с несогласием залегает на породах фундамента. Поскольку на севере Урала базальные слои палеозоя обычно представлены мощными толщами конгломератов, вверх по разрезу сменяющимися песчаниками, то разрезы, в которых базальные конгломераты отсутствуют, а на породах фундамента залегают песчаники и алевролиты, совершенно не характерные для этого стратиграфического уровня, заслуживают дополнительного изучения.

Нетипичное положение мелкообломочных пород в основании разреза уралид, отсутствие палеонтологических и структурно-тектонических признаков, позволяющих установить стратиграфическую принадлежность связываемой с золотоносностью толщи, делают необходимым установление возраста отложений с помощью U-Pb-датирования содержащихся в них детритовых цирконов.

Геологическое положение алевролитно-песчаниковой толщи

На крыже Манитаньрд базальные горизонты уралид с угловым и азимутальным несогласием залегают на вулканогенно-осадочных и вулканогенных, субвулканических и интрузивных породах, участвующих в строении комплексов протоуралид-тиманид (рис. 1, А, В). Наиболее древние образования фундамента верхнерифейско-вендской бедмельской серии в пределах крыжа Манитаньрд на более дробные стратиграфические подразделения не расчленены. В нижней части разреза преобладают базальты, андезибазальты, андезиты, трахибазальты, их кластолавы и лавобрекчии, дациты и их туфы, туфоконгломераты и туфогравелиты. Образования бедмельской серии согласно перекрыты отложениями поздневендско-раннекембрийской енганепэйской свиты — переслаиванием серых и зеленовато-серых туфоалевросланцев, мелко-, средне-, крупнозернистых, местами грубозернистых туфопесчаников, туфогравелитов. На породах фундамента с несогласием залегают отложения манитаньрдской серии, относящиеся к Бельско-Елецкой структурно-формационной зоне³.

Разрезом в правом борту долины руч. Голубого (рис. 1, В) вскрыт несогласный контакт вулканогенно-осадочных отложений енганепэйской (V_2-C_1 en) свиты и алевролитно-песчаниковой толщи, относимой к манитаньрдской (C_3-O_2 mn) серии. Азимут падения по-

род енганепэйской свиты 125° , угол падения 40° , манитаньрдской серии — 120° и 70° соответственно. Разрез манитаньрдской серии начинается со слоя зеленовато-серых слюдистых сланцев (0.3 м), перекрытых разнотекстурными розовато-серыми песчаниками (1.3 м). Следующие более 100 м разреза представлены ритмичным переслаиванием темно-серых песчаников и алевролитов с прослоями сланцев. На поверхностях напластования песчаников встречаются мелкие знаки ряби. Породы разбиты многочисленными ветвящимися будинированными кварцевыми жилами мощностью от нескольких миллиметров до 0.7 м.

В песчаниках и ассоциирующих с ними алевролитах обнаружены редкоземельные, редкие и экзотические минералы, в частности муассанит и самородный кремний, а также необычные морфологические разновидности пирита и апатита. Подробное описание литолого-геохимических и минералогических пород алевролитно-песчаниковой толщи проведено нами ранее [9, 21].

Объект и методы исследования

Из слоя мелкозернистого песчаника в 25 метрах от основания разреза была отобрана проба М-19 для изучения детритовых цирконов ($67^\circ 11' 24''$ с. ш., $65^\circ 10' 45''$ в. д.). Песчаник, характеризующийся blastosammittovoy структурой и сланцеватой текстурой, состоит из преимущественно слабо- и среднеокатанных зерен кварца, калиевого полевого шпата и плагиоклаза. Поровый цемент сложен микрозернистым серицит-кварцевым агрегатом, хлоритом или стильпно-меланом. Песчаник имеет следующий химический состав (мас. %): SiO_2 — 78.06, TiO_2 — 0.29, Al_2O_3 — 4.78, Fe_2O_3 — 2.49, FeO — 1.47, MnO — 0.09, MgO — 0.75, CaO — 4.67, Na_2O — 0.54, K_2O — 1.85, P_2O_5 — 0.96, CO_2 — 2.24. По составу породообразующих оксидов и рассчитанных на их основе индикаторных соотношений [16, 17, 20, 22, 25] песчаник относится к субаркозам, образованным в рифтогенной обстановке на незначительной глубине в условиях с неактивной гидродинамикой за счет размыва и переотложения слабоизмененных в холодном климате продуктов разрушения пород преимущественно среднего состава.

После дробления вручную в стальной ступе до размера обломков 0.25 мм с помощью бромформа из пробы была выделена тяжелая фракция, из которой под биноклем выбраны все без исключения зерна циркона и помещены в эпоксидный диск для исследования. Все процедуры проведены в ЦКП «Наука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

Среди детритовых цирконов в изученной пробе преобладают зерна размером 180–220 мкм. Обычно это хорошо окатанные зерна округленно-цилиндрической рисовидной и шаровидной формы, реже встречаются среднеокатанные кристаллы призматического облика. Первые проценты составляют бледно-розовые прозрачные неокатанные короткопризматические и призматические кристаллы. Состав цирконов (мас. %): ZrO_2 — 64.27–68.10, SiO_2 — 30.97–33.60, HfO_2 — 0.96–1.76.

Изотопный масс-спектрометрический анализ выполнен в изотопном центре Marine Analytical Laboratories Университета Калифорнии (г. Санта-Круз, США) на одноколлекторном масс-спектрометре с ионизацией в индуктивно связанной плазме Element XR с

³Палеозойские отложения Полярного и Приполярного Урала принадлежат к палеоконтинентальному сектору уралид и относятся к двум структурно-формационным зонам: Бельско-Елецкой и Сакмаро-Лемвинской. Первая отвечает мелкому шельфу, вторая — глубокому шельфу, континентальному склону и подножию пассивной окраины Восточно-Европейского континента.

Рис. 1. Тектоническая схема (А) Полярного Урала (по: [13]) и схематическая геологическая карта (В) южной части кряжа Манитаньрд (по: Ефанова и др., 2009 г.).

А: 1 — верхнемеловые отложения Косью-Роговской впадины (верхний элемент чехла Печорской плиты), 2 — кайнозойские и мезозойские породы чехла Западно-Сибирской плиты; 3, 4 — верхнекембрийско-пермские комплексы Западно-Уральской мегазоны — уралиты: 3 — аренигско(?) — пермские отложения Елецкой (а) и Лемвинской (б) зон, 4 — верхнекембрийско-нижнеордовикские терригенные толщи (базальные уровни уралитов); 5 — ордовикско-каменноугольные образования (включая офиолиты) Восточно-Уральской мегазоны; 6 — проторуалиты-тиманиды — магматические, осадочные и метаморфические комплексы неопротерозойско-раннекембрийского возраста; 7 — Главный Уральский надвиг (а), граница Лемвинского аллохтона (б), другие крупные разломы (в), 8 — места отбора проб ELM09-U6 (1), ELM09-U7 (2) [13] и М-19 (3). В рамке — район проведения исследований.

В: 1 — четвертичные отложения; 2 — манитаньрдская серия: конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, сланцы; 3 — бедамельская серия: эффузивы основного, среднего и кислого состава и их туфы; 4 — енганепейская свита: туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты; 5 — экструзивно-субвулканические образования одновозрастные бедамельской серии: габбро, габбродолериты, долериты; 6 — вулканыты леквозского комплекса: габбро, долериты, пикродолериты; 7 — разрывные нарушения: а — достоверные, б — предполагаемые, в — надвиги предполагаемые; 8 — изученный разрез

Fig. 1. Tectonic map (А) of the Polar Urals (by [13]) and a schematic geological map (В) of the southern part of the Manitanyrd Ridge (by Efanova et al., 2009).

А: 1 — Upper Cretaceous deposits of the Kosyu-Rogovskaya depression (upper cover element of the Pechora Plate), 2 — Cenozoic and Mesozoic rocks of the cover of the West Siberian Plate; 3, 4 — Upper Cambrian-Permian complexes of the West Ural megazone — uralides: 3 — Arenigsky (?) — Permian deposits of the Yeletskaia (a) and Lemvinskaya (b) zones, 4 — Upper Cambrian-Lower Ordovician terrigenous strata (basal levels of uralides); 5 — Ordovician-Carboniferous formations (including ophiolites) of the East-Ural megazone; 6 — protouralides-timanides — magmatic, sedimentary and metamorphic complexes of Neoproterozoic-Early Cambrian age; 7 — Main Ural thrust (a), Lemvinsky allochthon boundary (b), other major faults (b), 8 — sampling sites ELM09-U6 (1), ELM09-U7 (2) [13] and M-19 (3). The frame indicates the area of research.

В: 1 — Quaternary deposits; 2 — Manitanyrd series: conglomerates, gravelites, sandstones, aleurolites, shales; 3 — Bedamel series: effusives of basic, medium and acid composition and their tuffs; 4 — Enganepe suite: tuff-gravelites, tuff sandstones, tuff-aleurolites; 5 — extrusive-subvolcanic formations of Bedamel series: gabbro, gabbro-dolerites, dolerites; 6 — volcanites of the Lekvozshsky complex: gabbro, dolerites, picodolerites; 7 — faults: a — reliable, b — supposed, в — thrusts supposed; 8 — studied section

высоким разрешением магнитного сектора и на установке лазерной абляции Photon Machines Analyte.N с эксимерным лазером с длиной волны 193 нм и камерой Nelex-2. Диаметр аналитического пятна 30 мкм. Пробоподготовка цирконов для масс-спектрометрического анализа, аналитические измерения и расчеты выполнялись согласно стандартным процедурам [23]. Для датировок моложе 1000 млн лет для интерпретации брался возраст, рассчитанный по величине отношения $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, а для более древних — по $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$.

Результаты датирования цирконов

В пробе М-19 изучено 98 зерен цирконов. Результаты 14 анализов были исключены из-за значительной дискордантности (D). По оставшейся выборке из 74 зерен с $D < |10| \%$ (табл. 1) получен широкий диапазон возрастов — от позднего архея до ранне-

го девона, образующих несколько разновозрастных групп (рис. 2).

Одно наиболее древнее зерно имеет позднеархейский (2728 ± 9 млн лет⁴) возраст.

Группа цирконов с раннепротерозойскими возрастными состоит из шести зерен (8 %) ⁵, образовавшихся в период 1699–2301 млн лет. Ранне- и среднерифейский (1050–1602 млн лет) возраст определен для восьми зерен (11 %), позднерифейский (608–674 млн лет) — для 7 цирконов (9 %). Самая многочисленная (52 зерна, или 70 %) группа объединяет цирконы с возрастными от раннего венда до раннего девона (598–408 млн лет).

⁴Здесь и далее погрешности определения возраста приведены для уровня 1σ [1].

⁵Здесь и далее проценты — это доля цирконов (датировок) от количества датировок с дискордантностью $D < |10|$, т. е. от 74.

Таблица 1. Результаты U-Pb-датирования детритовых цирконов из пробы М-19

Table 1. Results of U-Pb-dating of detrital zircons from sample M-19

№ Зерна Grain No.	Изотопные отношения / Isotope ratios						Rho	Возраст, млн лет / Age, Ma						D, %
	$\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$	1 σ (%)	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}}$	1 σ (%)	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{Pb}}$	1 σ (%)		$\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$	1 σ	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}}$	1 σ	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{Pb}}$	1 σ	
1	0.0873	0.80	0.715	1.19	0.0587	1.02	0.48	540	4	548	5	556	22	2
2	0.0923	0.87	0.836	1.38	0.0655	0.92	0.58	570	5	613	6	790	20	8
3	0.3300	0.68	5.272	0.84	0.1158	0.56	0.67	1843	11	1863	7	1893	10	1
4	0.0888	0.73	0.724	0.90	0.0591	0.58	0.71	548	4	551	4	571	13	1
5	0.0846	0.71	0.686	1.17	0.0590	0.93	0.49	523	4	529	5	568	20	1
6	0.0934	0.70	0.791	0.95	0.0625	0.67	0.55	575	4	593	4	613	15	3
7	0.2225	0.72	2.851	0.74	0.0935	0.59	0.67	1295	9	1368	6	1498	11	6
8	0.0772	0.71	0.610	0.98	0.0581	0.77	0.59	479	3	484	4	534	17	1
9	0.0845	0.71	0.752	1.00	0.0643	0.86	0.43	523	4	568	4	723	19	9
10	0.1951	0.79	2.319	0.91	0.0820	0.73	0.48	1150	9	1216	7	1246	15	6
11	0.0962	0.78	0.817	1.16	0.0579	1.12	0.43	592	4	606	6	526	25	2
12	0.2460	0.71	3.046	0.92	0.0860	0.70	0.63	1416	9	1416	7	1338	14	0
13	0.0943	0.69	0.741	1.01	0.0566	0.83	0.54	581	4	564	5	474	19	-3
14	0.0666	0.83	0.473	0.83	0.0523	0.61	0.57	415	3	393	3	300	14	-5
15	0.0688	0.80	0.498	0.93	0.0536	0.64	0.67	429	3	409	3	356	15	-4
16	0.0842	0.83	0.609	0.99	0.0540	0.76	0.54	521	4	482	4	373	17	-7
17	0.0696	0.86	0.545	1.10	0.0573	0.62	0.71	433	4	441	4	503	14	2
18	0.0821	0.79	0.694	1.44	0.0617	1.05	0.67	508	4	534	6	664	23	5
19	0.1714	0.88	1.763	0.94	0.0743	0.56	0.74	1020	8	1030	6	1050	12	1
20	0.0792	0.82	0.624	0.88	0.0558	0.65	0.72	492	4	491	4	442	15	0
21	0.1793	1.03	1.999	2.23	0.0787	1.91	0.19	1063	10	1092	13	1165	38	3
22	0.0989	0.66	0.838	0.89	0.0594	0.78	0.47	608	4	618	4	583	17	2
23	0.2504	0.74	3.618	0.80	0.1041	0.53	0.69	1441	10	1554	7	1699	10	8
24	0.3039	1.27	4.980	1.31	0.1221	0.57	0.89	1707	19	1808	11	1987	10	6
25	0.0777	0.71	0.614	0.98	0.0584	0.84	0.45	483	3	487	4	543	18	1
26	0.0812	0.80	0.657	1.22	0.0592	1.01	0.51	504	4	511	5	574	22	1
27	0.0953	0.73	0.802	1.12	0.0619	1.13	0.37	587	4	596	5	670	25	2
28	0.0930	0.75	0.803	0.81	0.0629	0.55	0.62	573	4	598	4	703	12	4
29	0.4350	1.15	11.240	1.07	0.1884	0.53	0.88	2324	23	2536	10	2728	9	9
30	0.0925	0.76	0.794	0.88	0.0620	0.72	0.54	570	4	594	4	675	16	4
31	0.4338	0.69	8.830	0.85	0.1461	0.48	0.73	2322	14	2321	8	2301	9	0
32	0.0746	0.80	0.607	0.82	0.0577	0.62	0.64	464	4	481	3	517	14	4
33	0.0851	0.71	0.745	1.14	0.0627	1.04	0.31	526	4	564	5	698	22	7
34	0.0839	0.72	0.733	0.95	0.0618	0.69	0.65	519	4	557	4	666	15	7
35	0.0993	0.81	0.861	0.99	0.0620	0.77	0.55	610	5	630	5	673	17	3
36	0.2289	0.94	3.161	0.98	0.0988	0.66	0.76	1329	12	1447	8	1602	12	9
37	0.0901	0.78	0.791	0.88	0.0624	0.68	0.64	556	4	591	4	687	15	6
38	0.0804	0.75	0.669	1.05	0.0592	0.67	0.69	499	4	519	4	575	15	4
39	0.3699	0.95	7.090	0.92	0.1360	0.81	0.36	2027	17	2121	8	2177	14	5
40	0.1046	0.86	0.882	1.08	0.0605	0.76	0.63	641	5	642	5	623	17	0
41	0.1085	0.92	0.918	1.25	0.0608	1.23	0.32	664	6	659	6	632	27	-1
42	0.0899	1.17	0.790	1.71	0.0633	1.42	0.57	554	6	585	8	718	30	6
43	0.0951	1.26	0.761	1.18	0.0587	0.69	0.78	585	7	576	5	557	15	-2
44	0.0910	0.77	0.775	1.16	0.0614	0.90	0.62	561	4	582	5	653	19	4
45	0.0904	0.77	0.726	0.96	0.0588	0.61	0.65	558	4	554	4	559	13	-1
46	0.0915	0.71	0.722	0.90	0.0575	0.69	0.60	564	4	552	4	510	15	-2
47	0.0845	0.77	0.729	1.03	0.0604	0.65	0.64	522	4	554	4	617	14	6
48	0.0808	0.99	0.675	1.26	0.0636	1.10	0.52	501	5	521	6	728	24	4
49	0.0780	0.71	0.635	0.87	0.0606	0.78	0.54	484	3	500	3	627	17	3
50	0.0999	0.75	0.811	0.86	0.0592	0.62	0.70	614	4	602	4	575	14	-2
51	0.0746	0.94	0.580	1.55	0.0578	1.47	0.38	463	4	465	6	522	32	0
52	0.0788	0.76	0.613	1.06	0.0567	0.86	0.56	490	4	486	4	480	19	-1
53	0.0897	0.72	0.729	0.89	0.0577	0.68	0.59	554	4	555	4	520	15	0
54	0.1114	2.11	1.012	2.82	0.0675	2.22	0.57	674	13	687	13	853	47	2
55	0.0907	1.16	0.782	1.21	0.0631	1.11	0.49	560	6	586	5	712	24	5
56	0.0899	0.78	0.771	1.17	0.0627	1.12	0.26	556	4	579	5	698	24	4

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1

№ Зерна Grain No.	Изотопные отношения / Isotope ratios						Rho	Возраст, млн лет / Age, Ma						D, %
	$\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$	1 σ (%)	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}}$	1 σ (%)	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{Pb}}$	1 σ (%)		$\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$	1 σ	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}}$	1 σ	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{Pb}}$	1 σ	
57	0.1021	0.78	0.849	1.12	0.0617	0.89	0.47	626	5	627	5	664	19	0
58	0.0837	0.78	0.705	1.13	0.0619	0.97	0.52	518	4	541	5	671	21	4
59	0.2294	0.74	2.633	0.87	0.0842	0.65	0.59	1330	9	1310	7	1297	13	-2
60	0.3284	1.04	5.260	0.95	0.1181	0.47	0.86	1828	17	1861	9	1928	9	2
61	0.0973	0.72	0.804	0.93	0.0604	0.74	0.54	598	4	599	4	619	16	0
62	0.0956	0.78	0.788	1.08	0.0606	0.91	0.46	588	4	589	5	625	20	0
63	0.0885	0.85	0.704	0.92	0.0583	0.68	0.68	546	5	541	4	542	15	-1
64	0.0775	0.71	0.606	1.07	0.0572	1.05	0.42	481	3	481	4	499	23	0
65	0.0845	0.71	0.708	0.85	0.0617	0.62	0.69	523	4	544	4	645	13	4
66	0.0973	0.72	0.781	1.15	0.0588	1.11	0.31	598	4	583	5	560	25	-3
67	0.0952	0.79	0.761	1.05	0.0591	0.93	0.53	587	4	575	4	571	21	-2
68	0.0910	0.77	0.801	1.19	0.0655	1.07	0.43	561	4	595	5	790	23	6
69	0.0935	0.80	0.742	1.08	0.0578	0.87	0.56	577	4	562	5	522	19	-3
70	0.0830	0.66	0.661	0.91	0.0584	0.67	0.60	514	3	515	4	543	15	0
71	0.1838	0.79	2.018	0.77	0.0786	0.52	0.67	1087	8	1121	5	1162	11	3
72	0.0772	0.71	0.630	1.03	0.0580	0.82	0.48	479	3	495	4	528	18	3
73	0.0653	0.77	0.529	0.89	0.0562	0.66	0.60	408	3	431	3	461	15	6
74	0.0716	0.77	0.599	0.92	0.0585	0.72	0.59	446	3	477	3	547	16	7

Примечание. Rho — коэффициент корреляции между ошибками определения изотопных отношений $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ и $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$. D — дискордантность: $D = 100 \times [\text{возраст } (^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}) / \text{возраст } (^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}) - 1]$.

Note. Rho — correlation coefficient between errors in the determination of isotopic ratios $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ and $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$. D — discordance: $D = 100 \times [\text{age } (^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}) / \text{age } (^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}) - 1]$.

Рис. 2. Диаграмма Аренса–Везерилла с конкордией. Представлены анализы детритовых цирконов из обр. М-19. Центры эллипсов погрешностей (2 σ) — координаты аналитических точек

Fig. 2. Ahrens-Wetherill diagram with concordia. Analyzed detrital zircons from sample M-19. The centers of error ellipses (2 σ) are the coordinates of analytical points

Среди этих цирконов преобладают зерна с поздневендско-раннекембрийскими и позднекембрийско-раннеордовикскими датировками.

Обсуждение результатов

Наличие в составе изученных песчаников детритовых цирконов с позднеархейскими и раннепротерозойскими датировками (2728–1699 млн лет) указывает на присутствие в составе этих песчаников материала древ-

него кристаллического фундамента остова Восточно-Европейской платформы (Балтики). Архейские и раннепротерозойские кристаллические комплексы входят в состав всех трех коровых блоков, образующих Балтику: Волго-Уралии, Сарматии и Фенноскандии [14]. Магматические и метаморфические комплексы, которые могли поставлять детритовые цирконы с ранне- и среднерифейскими возрастными (1602–1246 млн лет), распространены более локально: породы этого возраста развиты почти исключительно в пределах Фенноскандии, где известны аккреционные и коллизионные магматические комплексы, сформировавшиеся в интервале 1.7–1.4 млрд лет; анортозит-мангерит-чарнокит-гранитные комплексы (1.65–1.38 млрд лет); рифтогенные мафические дайки и граниты рапакиви (1.6–1.5 млрд лет), базиты и бимодальные ассоциации (1.4–1.2 млрд лет) [14]. В пределах Волго-Уралии лишь в Камско-Бельской магматической провинции, расположенной в Волго-Уральской области и на западном склоне Южного Урала в Башкирском антиклинории, развиты магматические породы, сформировавшиеся к концу раннего–началу среднего рифея (1.38–1.30 млрд лет) [11], которые могли быть связаны с рифтогенезом на окраине Волго-Уралии [12].

Источником цирконов с возрастными (1050±12), (1162±11), (1165±38) млн лет мог быть Свеконорвежский аккреционно-коллизионный ороген, сформировавшийся в конце среднего–начале позднего рифея (0.9–1.2 млрд лет) на западе Фенноскандии [14].

Датировки цирконов, попадающие в интервал от позднего рифея до раннего ордовика, отражают, с большой долей вероятности, региональные магматические события. Позднерифейско-ранневендские возрасты цирконов соответствуют времени формирования вулканогенных и плутонических образова-

ний Большеземельской активной окраины Арктиды, а поздневендско-раннекембрийские возрасты — времени проявления коллизионных процессов при формировании орогена протоуралид-тиманид [7]. Источниками зерен с позднерифейско-раннекембрийскими возрастными (674–514 млн лет) могли быть, в частности, плагиограниты и диориты нияюского плутонического комплекса, риолиты лядгейского субвулканического комплекса, габбро и диориты кызыгейского плутонического комплекса, вендские интрузии гранитоидов полярноуральского полихронного комплекса, а также вулканы бедамельской серии и связанные с ними субвулканические образования, широко развитые на западном склоне Полярного Урала и часто непосредственно подстилающие базальные комплексы уралид [2].

Источниками цирконов с датировками, попадающими в интервал от среднего кембрия до раннего-среднего ордовика (508–463 млн лет) могли быть магматические породы, связанные с кембрийским предрифтовым поднятием и рифтогенезом, начавшимся на рубеже кембрия и ордовика и продолжавшимся в ордовике [3, 4, 13, 24] на уральской окраине композитного континента Аркт-Европа [5, 18]. На Полярном Урале с этим этапом связано образование магматических пород леквожского габбродолеритового и пайпудынского риолитового гипабиссальных комплексов, а также раннепалеозойских гранитоидов полярно-уральского полихронного комплекса [2].

Большое количество цирконов с позднекембрийско-раннеордовикскими датировками (12 %) и наличие двух зерен со среднеордовикскими возрастными в обр. М-19 можно интерпретировать как указание на то, что изученные песчаники образовались в конце раннего — начале среднего ордовика.

Из рассмотрения исключены пять зерен циркона (№ 14, 15, 17, 73, 74) с возрастными моложе среднего ордовика — времени, когда на этой территории начала формироваться карбонатная платформа и начиная с которого все отложения представлены карбонатными известняково-доломитовыми и терригенно-карбонатными ассоциациями с обилием фауны. Наличие в исследованной пробе цирконов с силурийскими и девонскими датировками объясняется широким развитием в алевролитно-песчанниковой толще кварцевых прожилков, которые невозможно полностью извлечь из вмещающей породы. Идиоморфные новообразованные цирконы с возрастными в диапазоне 446–408 млн лет, по

Рис. 3. Гистограммы и кривые плотности вероятности распределения возрастов обломочных цирконов их песчаников: а — основания палеозойского разреза кряжа Манитанырд, обр. М-19. Над графиками сплошными и пунктирными отрезками отмечены временные диапазоны основных тектоно-магматических событий (по: [8]); б — манитанырдской серии кряжа Енганепэ, обр. ELM09-U7 [13]; в — саладской свиты Приполярного Урала, обр. CH-17 [10]; г — погурейской свиты Полярного Урала, обр. ELM09-U6 [13]

Fig. 3. Histograms and density curves of probability distribution of the ages of the detrital zircons of their sandstones: а — base of Paleozoic section of the Manitynyrd ridge, sample M-19. Above the graphs of solid and dashed lines the time ranges of the main tectonic-magmatic events are marked (by: [8]); б — Manitynyrd series of Engane-Pe ridge, sample ELM09-U7 [13]; в — Salaed Formation of the Subpolar Urals, sample CH-17 [10]; г — Pogureisk Formation of the Polar Urals, sample ELM09-U6 [13]

всей видимости, отражают различные этапы становления широко развитой в районе полихронной кварцево-жильной метаморфогенно-гидротермальной минерализации.

Мы сравнили полученные датировки детритовых цирконов из обр. М-19 с возрастными цирконами из песчаников других районов западного склона Полярного Урала — основания манитаньрдской серии (обр. ELM09-U7) крыжа Енганепэ и погурейской свиты (ELM09-U6) в верхнем течении р. Ср. Кечпель [13], а также из салецкой свиты (обр. СН-17) Приполярного Урала [10] (рис. 3, а–д).

По характеру распределения и диапазону возрастов детритовые цирконы из песчаников основания палеозойского разреза на крыже Манитаньрд (обр. М-19) очень похожи на цирконы из сравниваемых верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников (рис. 3, а–д). Максимальное сходство наблюдается в области древних возрастов. Применение теста Колмогорова — Смирнова (K-S-теста) для датировок цирконов древнее 1 млрд лет показало (рис. 4, табл. 2), что величины $p(KS)$ во всех случаях существенно превышают минимальное пороговое значение 0.05, что свидетельствует об отсутствии значимых различий распределений (тестируемая гипотеза о сходстве сопоставляемых наборов возрастов валидна с вероятностью 95 %). Наибольшее значение $p(KS)$ 0.85 получилось для обр. М-19 и СН-17 (салецкая свита). Такие результаты свидетельствуют о близости возрастов древних питающих провинций, поставивших обломочный материал на уральскую кон-

тинентальную окраину Аркт-Европы. Для более молодых датировок (< 1 млрд лет) абсолютного сходства нет из-за сильного влияния на состав цирконовых популяций локальных источников, выведенных на уровень эрозионного среза в раннем палеозое.

Отсутствие в основании палеозойского разреза на крыже Манитаньрд базальных конгломератов могло возникнуть при заполнении ордовикскими мелкообломочными осадками понижения в допалеозойском рельефе, расположенного на окраине континента и отделенного от основного водоема участком суши, из-за чего грубообломочные породы здесь не накапливались.

Выводы

Проведенное U-Pb-датирование детритовых цирконов из песчаников алевритито-песчаниковой толщи позволяет предполагать, что мелкообломочные терригенные породы из основания разреза уралит на крыже Манитаньрд имеют среднеордовикский возраст и относятся к малопапудынской свите (верхней части манитаньрдской серии). Песчаник характеризуется типичными для терригенных отложений елецкого структурно-формационного комплекса интервалами распределения возрастов детритовых цирконов. Основными источниками обломочных цирконов могли быть широко представленные в регионе магматические породы Большеземельской активной окраины Арктиды и коллизионных комплексов протоуралит-тиманид. В существенно меньшей степени в формировании вещественного состава песчаников участвовали, вероятно, рециклированные в позднерифейское время продукты разрушения метаморфических и магматических пород древнего фундамента Восточно-Европейской платформы — преимущественно Фенноскандии. Сходство возрастных характеристик детритовых цирконов из песчаников пространственно разобщенных разрезов в различных районах западного склона Полярного и Приполярного Урала свидетельствует о единстве источников обломочного материала и единой истории седиментации в осадочном бассейне, реликты которого сохранились в современной структуре западных районов Полярного и Приполярного Урала.

Авторы выражают благодарность Дж. К. Хоуригану (Университет Калифорнии, г. Санта-Круз, США) за помощь в датировании детритовых цирконов.

Работа выполнена по теме госзадания ГР № АААА-А17-117121270035-0 ИГ Коми НЦ УрО РАН при частичной финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 18-5-5-31).

Литература

1. Андреичев Л. В., Соболева А. А., Довжикова Е. Г. Первые U-Pb-данные о возрасте гранитоидного магматизма фундамента Печорской синеклизы // ДАН. 2014. Т. 458. № 5. С. 559–666.
2. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Уральская серия — Лист Q-41 (Воркута). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2007. 541 с.
3. Голдин Б. А., Калинин Е. П., Пучков В. Н. Магматические формации западного склона севера Урала и их минерогения. Сыктывкар, 1999. 213 с.
4. Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 214 с.

Рис. 4. Графики кумулятивной вероятности возрастов детритовых цирконов

Fig. 4. Graphs of cumulative probability of age of detrital zircons

Таблица 2. Результаты теста Колмогорова — Смирнова для возрастов цирконов древнее 1 млрд лет

Table 2. Kolmogorov–Smirnov Test for zircon ages older 1 Ga

№ обр. Sample No.	М-19	ELM09-U7	ELM09-U6	CH-17
М-19		0.61	0.44	0.85
ELM09-U7	0.61		0.90	0.71
ELM09-U6	0.44	0.90		0.54
CH-17	0.85	0.71	0.54	

Примечание. Построение кумулятивных кривых распределения и проведение K-S-теста выполнены в программе MS Excel (Gyunn, Gehrels, 2010).

Note. Cumulative curves of distribution and K-S-test are made in MS Excel (Gyunn, Gehrels, 2010).

5. Кузнецов Н. Б. Комплексы протоуралид-тиманид и позднедокембрийско-раннепалеозойская эволюция восточного и северо-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы: Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук. М.: ИФЗ РАН, 2009. 49 с.
6. Кузнецов Н. Б., Соболева А. А., Удоратина О. В., Герцева М. В., Андреичев В. Л., Дорохов Н. С. Доуральская тектоническая эволюция северо-восточного и восточного обрамления Восточно-Европейской платформы. Ст. 1. Протоуралиды, тиманиды и доордовикские гранитоидные вулканно-плутонические ассоциации севера Урала и Тимано-Печорского региона // Литосфера. 2006. № 4. С. 3–22.
7. Кузнецов Н. Б., Соболева А. А., Удоратина О. В. и др. Доуральская тектоническая эволюция северо-восточного и восточного обрамления Восточно-Европейской платформы. Ст. 2. Позднедокембрийско-кембрийская коллизия Балтики и Арктиды // Литосфера. 2007. № 1. С. 32–45.
8. Кузнецов Н. Б., Романюк Т. В., Шаццло А. В., Орлов С. Ю., Горожанин В. М., Горожанин Е. Н., Серегина Е. С., Иванова Н. С., Меерт Дж. Первые U/Pb-данные о возрастах детритных цирконов из песчаников верхнеэмской такатинской свиты Западного Урала (в связи с проблемой коренных источников уральских алмазоносных россыпей) // ДАН. 2014. Т. 455. № 4. С. 447–432.
9. Никулова Н. Ю., Швецова И. В. Литология и геохимия нижнепалеозойских отложений в зоне межформационного контакта уралид/доуралид на хр. Манитаньрд (Полярный Урал) / Бюллетень МОИП. 2011. № 3. С. 47–54.
10. Никулова Н. Ю., Филиппов В. Н., Хубанов В. Б. Возраст песчаников салецкой свиты (Приполярный Урал) по результатам U-Pb-датирования детритных цирконов // Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. геол. 2018. Т. 93. Вып. 1. С. 10–18.
11. Носова А. А., Сазонова Л. В., Каргин А. В., Ларионова Ю. О., Горожанин В. М., Ковалев С. Г. Мезопротерозойская внутриплитная магматическая провинция Западного Урала: основные петрогенетические типы пород и их происхождение // Петрология. Т. 20. № 4. С. 392–428.
12. Пучков В. Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.
13. Соболева А. А., Кузнецов Н. Б., Миллер Э. Л., Удоратина О. В., Герцелс Дж. Результаты U-Pb-датирования детритных цирконов из базальных горизонтов уралид (Полярный Урал) // ДАН. 2012. Т. 445. № 5. С. 570–576.
14. Bogdanova S. V., Bingen B., Gorbatshev R., Kheraskova T. N., Kozlov V. I., Puchkov V. N., and Volozh Y. A. The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia // Precambrian Res. 2008. V. 160. P. 23–45.
15. Cox R., Lowe D. R. Controls of sediment composition on a regional scale: a conceptual review / J. Sed. Res. 1995. V. 65. P. 1–12.
16. Harnois L. The CIW index: a new chemical index of weathering / Sed. Geol. 1988. V. 55. No. 3/4. P. 319–322.
17. Herron M. M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data / J. Sed. Petrol. 1988. V. 58. P. 820–829.
18. Kuznetsov N. B., Belousova E. A., Alekseev A. S., Romanuk T. V. New data on detrital zircons from the sandstones of Lower Cambrian Brusov Formation (White-Sea region, East-European craton): unraveling the timing of the onset of the Arctida-Baltica collision // International Geology Review. 2014. V. 56, № 16. P. 1945–1963.
19. Lee Y. I. Provenance derived from the geochemistry of late Paleozoic-early Mesozoic mudrocks of the Pyeongann Supergroup, Korea // Sedimentary Geology. 2002. V. 149. P. 219–235.
20. Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites / Nature. 1982. V. 299. P. 715–717.
21. Nikulova N. Yu., Kozyreva I. V. Moissanite, Native Si and Iron Silicide from the Lower Paleozoic sandstones of the Polar Urals European science review. Vienna. 2015. № 5–6 (May–June). P. 17–18.
22. Roser B. P., Korsch R. J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO₂ content and K₂O/Na₂O ratio. The Journal of Geology. 1986, V. 94. № 5. P. 635–650.
23. Sharman G. R., Graham S. A., Grove M., Hourigan J. K. A reappraisal of the early slip history of the San Andreas fault, central California, USA // Geology. 2013. V. 41. P. 727–730.
24. Soboleva A. A., Udoratina O. V. Neoproterozoic and early Paleozoic A-type rhyolites and granites in the Subpolar and Polar Urals // International Conference on A-type Granites and Related Rocks through Time (IGCP-510). Ramo O.T., Lukkari S.R., Heinonen A.P. (Eds.). Helsinki: Helsinki University Print, 2010. Abstr. Vol. P. 101–103.
25. Verma S. P., Armstrong-Altrin J. S. New multi-dimensional diagrams for tectonic discrimination of siliciclastic sediments and their application to Precambrian basins. // Chem. Geol. V. 355. P. 117–133.

References

1. Andreichev V. L., Soboleva A. A. and Dovzhikova E. G. *Pervye U-Pb dannye o vozraste granitoidnogo magmatizma fundamenta Pechorskoi sineklizy* (First U–Pb Data on Age of Granitoids in the Basement of the Pechora Basin). Doklady Earth Sciences, 2014, V. 458, Part 2, pp. 1207–1214.
2. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiiskoi federatsii. *Masshtab 1:1 000 000 (tret'e pokolenie). Ural'skaya seriya — List Q-41 (Vorkuta). Ob'yasnitel'naya zapiska* (State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 1,000,000 (third generation). Ural series — Sheet Q-41 (Vorkuta). Explanatory note). St. Petersburg: VSEGEI, 2007, 541 p.
3. Goldin B. A., Kalinin E. P., Puchkov V. N. *Magmaticheskie formatsii zapadnogo sklona severa Urala i ih minerageniya* (Magmatic formations of the western slope of the north of the Urals and their minerageny). Syktyvkar, 1999, 213 p.
4. Dushin V. A. *Magmatizm i geodinamika paleokontinental'nogo sektora severa Urala* (Magmatism and geodynamics of the paleocontinental sector of the north of the Urals). Moscow: Nedra, 1997, 214 p.
5. Kuznetsov N. B. *Kompleksy protouralid-timanid i pozdnedo-kembrijsko-rannepaleozoiskaya evolyutsiya vostochnogo i severo-vostochnogo obramleniya Vostochno-Evropeiskoi platformy* (The complexes of the proto-uralid-Timanide and the Late Precambrian-Early Paleozoic evolution of the eastern and northeastern framing of the East European Platform). Abstract of PhD dissertation. Moscow: IFZ RAS, 2009, 49 p.
6. Kuznetsov N. B., Soboleva A. A., Udoratina O. V., Gertseva M. V., Andreichev V. L., Dorokhov N. S. *Dooral'skaya tektonicheskaya evolyutsiya severo-vostochnogo i vostochnogo obramleniya Vostochno-Evropeiskoi platformy. St. 1. Protouralidy, Timanidy i Doordovikskie granitoidnye vulkano-plutonicheskie assotsiatsii severa Urala i Timano-Pechorskogo regiona* (Pre-Urals tectonic evolution of the northeast and east framing of the East European Platform. Art. 1. Proto-Uralides, Timanides, and Pre-Ordovician granitoid volcano-plutonic associations of the north of the Urals and the Timan-Pechora region). Lithosphere, 2006, No. 4, pp. 3–22.

7. Kuznetsov N. B., Sobolev A. A., Udoratina O. V., et al. *Doural'skaya tektonicheskaya evolyutsiya severo-vostochnogo i vostochnogo obramleniya Vostochno-Evropeiskoi platformy. St. 2. Pozdnedokembriisko-kembriiskaya kolliziya Baltiki i Arktidy* (Pre-Urals tectonic evolution of the northeastern and eastern framing of the East European Platform. Art. 2. Late Precambrian-Cambrian collision of the Baltic and Arctida). *Lithosphere*, 2007, No. 1, pp. 32–45.7.
8. Kuznetsov N. B., Romanyuk T. V., Shatsillo A. V., Orlov S. Yu., Gorozhanin V. M., Gorozhanina E. N., Seregina E. S., Ivanova N. S., Meert J. *Pervye U/Pb-dannye o vozrastah detritnykh tsirkonov iz peschanikov verkhneemskoi takatinskoi svity Zapadnogo Urala (v svyazi s problemoi korenykh istochnikov ural'skikhalmazanosnyh rossypei)* (The First U/Pb Data on the Ages of Detrital Zircons from the Sandstones of the Upper Taminskaya Formation of the Western Urals (in connection with the problem of indigenous sources of the Ural diamond-bearing placers)). *DAN*, 2014, V. 455, No. 4, pp. 447–432.
9. Nikulova N. Yu., Shvetsova I.V. *Litologiya i geohimiya nizhnepaleozoiskikh otlozhenii v zone mezhformatsionnogo kontakta uralid/douralid na hr. Manitanyrd (Polyarnyi Ural)* (Lithology and geochemistry of the Lower Paleozoic sediments in the zone of interformational contact Uralides / Douralides on Hr. Manitanyrd (Polar Urals)). *Bulletin MOIP*, 2011, No. 3, pp. 47–54.
10. Nikulova, N. Yu., Filippov, V.N., Khubanov, V. B., *Vozrast peschanikov saleedskoi svity (Pripolyarnyi Ural) po rezul'tatam U-Pb datirovaniya detritnykh tsirkonov* (Age of the Sands of the Saleled Formation (Subpolar Urals) as a result of U-Pb dating of detrital zircons), *Byul. Mosk. Islands of nature testers. Separate geol.*, 2018, V. 93, No. 1, pp. 10–18.
11. Nosova A. A., Sazonova L. V., Kargin A. V., Larionova Yu. O., Gorozhanin V. M., Kovalev S. G. *Mezoproterozoiskaya vnutriplitnaya magmaticheskaya provintsiya Zapadnogo Urala: osnovnye petrogeneticheskie tipy porod i ih proishozhdenie* (Meso-proterozoic intraplate igneous province of the Western Urals: the main petrogenetic types of rocks and their origin). *Petrology*, V. 20, No. 4, pp. 392–428.
12. Puchkov V. N. *Geologiya Urala i Priural'ya (aktual'nye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii)* (Geology of the Urals and the Urals (current issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny). Ufa: DesignPoligraphService, 2010, 280 p.
13. Sobolev, A. A., Kuznetsov, N. B., Miller, E. L., Udoratina, O. V., Gerels, J., *Rezul'taty U-Pb-datirovaniya detritnykh tsirkonov iz bazal'nykh gorizontov uralid (Polyarnyi Ural)* (Results of U-Pb-dating of detrital zircons from the basal horizons of Uralides (Polar Urals)), *DAN*, 2012, V. 445, No. 5, pp. 570–576.
14. Bogdanova S. V., Bingen B., Gorbatshev R., Kheraskova T. N., Kozlov V. I., Puchkov V. N., and Volozh Y. A. The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia. *Precambrian Res*, 2008, V. 160, pp. 23–45.
15. Cox R., Lowe D. R. Controls of sediment composition on a regional scale: a conceptual review. *J. Sed. Res.*, 1995, V. 65, pp. 1–12.
16. Harnois L. The CIW index: a new chemical index of weathering. *Sed. Geol.*, 1988, V. 55, No. 3/4, pp. 319–322.
17. Herron M. M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. *J. Sed. Petrol.*, 1988, V. 58, pp. 820–829.
18. Kuznetsov N. B., Belousova E. A., Alekseev A. S., Romanyuk T. V. New data on detrital zircons from the sandstones of Lower Cambrian Brusov Formation (White-Sea region, East-European craton): unraveling the timing of the onset of the Arctida-Baltica collision. *International Geology Review*. 2014, V. 56, No. 16, pp. 1945–1963.
19. Lee Y. I. Provenance derived from the geochemistry of late Paleozoic-early Mesozoic mudrocks of the Pyeongann Supergroup, Korea. *Sedimentary Geology*. 2002. V. 149. pp. 219–235.
20. Nesbitt H. W., Young G. M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. *Nature*, 1982, V. 299, pp. 715–717.
21. Nikulova N. Yu., Kozyreva I. V. Moissanite, Native Si and Iron Silicide from the Lower Paleozoic sandstones of the Polar Urals European science review. Vienna, 2015, No. 5–6 (May–June), pp. 17–18.
22. Roser B. P., Korsch R. J. Determination of tectonic setting of sandstone–mudstone suites using SiO₂ content and K₂O/Na₂O ratio. *The Journal of Geology*. 1986, V. 94, No. 5, pp. 635–650.
23. Sharman G. R., Graham S. A., Grove M., Hourigan J. K. A reappraisal of the early slip history of the San Andreas fault, central California, USA. *Geology*, 2013, V. 41, pp. 727–730.
23. Soboleva A. A., Udoratina O. V. Neoproterozoic and early Paleozoic A-type rhyolites and granites in the Subpolar and Polar Urals. *International Conference on A-type Granites and Related Rocks through Time (IGCP-510)*. Ramo O.T., Lukkari S.R., Heinonen A.P. (Eds.). Helsinki: Helsinki University Print, 2010, Abstr., V, pp. 101–103.
25. Verma S. P., Armstrong-Altrin J. S. New multi-dimensional diagrams for tectonic discrimination of siliciclastic sediments and their application to Precambrian basins. *Chem. Geol.*, V. 355, pp. 117–133.