ВОЗРАСТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДЕВОНСКОЙ ТУФОГЕННОЙ ТОЛЩИ СРЕДНЕГО ТИМАНА (Р. ПИЖМА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ U-Pb (SIMS)-ДАТИРОВАНИЯ ЦИРКОНОВ

В. С. Цыганко

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
tsyganko@geo.komisc.ru

Важной особенностью девонских отложений Тимана является наличие вулканитов базальтового состава. Изучены обогащенные туфовым материалом прослои в валсовской и устьчиркинской свитах на р. Пижме (Средний Тиман), из которых выделены цирконы. По результатам U-Pb-изотопного датирования цирконов получены датировки 376.8 ± 6.7 млн лет и 372.4 ± 8.3 млн лет соответственно. Эти датировки отвечают позднему франу и раннему фамену, что противоречит биостратиграфическим данным, согласно которым возраст пород позднеживетский и раннефранский. Предполагаемое омоложение возраста цирконов связывается с растянутым во времени процессом формирования самих кристаллов цирконов.

Ключевые слова: Средний Тиман, девон, базальт, туф, песчаник, циркон, возраст отложений.

AGE OF THE UPPER PART OF THE DEVONIAN TUFFOGENEOUS UNIT FROM THE MIDDLE TIMAN (THE PIZHMA RIVER) ACCORDING TO THE RESULTS OF U-Pb (SIMS)-ZIRCON DATING

V. S. Tsyganko

Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

An important feature of the Devonian sediments in the Timan Ridge is that they contain basaltic volcanic rocks. The paper provides results of study of tuff-rich interlayers in the Valsovskaya and Ust'chirkinskaya Formations located in the Pizhma River (Middle Timan) from which zircons were extracted. U-Pb dating of zircons yielded the ages of 376.8 ± 6.7 Ma and 372.4 ± 8.3 Ma respectively. These ages correspond to Late Frasnian and Early Famennian and contradict the biostratigraphic data according to which the age of the rocks is Late Givetian and Early Frasnian. Rejuvenation of the zircon ages is supposed to be related to the time-extended crystallization of zircon crystals.

Keywords: Middle Timan, Devonian, basalt, tuff, sandstone, zircon, age of sediments.

Введение

Одной из важных особенностей девонских отложений Тимана является приуроченность к ним проявлений девонского базальтового вулканизма. Будучи изолированными друг от друга на территориях Северного, Среднего и Южного Тимана, вулканогенные породы занимают в целом огромные площади.

На Среднем Тимане вулканические породы входят в состав валсовской свиты, выделенной А. Е. Цап-линым [6, 7]. Изучением среднетиманских вулканитов в разное время занимались А. А. Малахов [2], В. П. Пономарев, Н. Ф. Иванов, В. Г. Черный, В. И. Шляхов, З. И. Цзю, В. И. Граф, М. И. Осадчук, В. С. Юдин, Л. Т. Белякова, В. А. Калужный, В. М. Пачуковский, Н. В. Опаренков, А. М. Плякин [3], а также А. Б. Маке-ев, В. А. Лебедев и Н. И. Брянчанинова [1] и другие геологи. Большинство исследователей относили девонские вулканические породы к трапповой формации.

Геологическая позиция девонских вулканитов

Осадочно-вулканогенные отложения валсовской свиты трансгрессивно залегают на породах ливен-ничной свиты или, реже, на более древних отложениях среднего девона или на метаморфических образова-ниях верхнего протерозоя. Их мощность и петрографи-ческий состав зависят от положения конкретных раз-резов относительно центров вулканических изверже-ний. Верхняя граница свиты приурочена к основанию базальных песчаников или алевролитов вышележащей цилемской свиты. В составе валсовской свиты выде-

ляются вулканические образования покровной и суб-вулканической фаций. Покровная фация представле-на туфами и туффитами с прослоями туфогенно-оса-дочных и осадочных пород с примесью пирокластики, а также эффузивными породами — гялобазальтами, мандельштейнами и афанитовыми базальтами, слага-ющими лавовые потоки и покровы мощностью от пер-вых десятков сантиметров до 50 м. Афанитовые и мин-далекаменные базальты субвулканической фации сла-гают дайки, неки и силлы. Девонские породы разных вулканических фаций В. И. Граф (1978) относил к раз-ным генетическим фазам — эксплозивной, субвулка-нической и эффузивной.

Вулканогенные образования валсовской свиты вместе с подстилающими породами яранской и ли-ственничной свит, а также перекрывающими отложе-ниями цилемской и устьчиркинской свит ранее отно-сились к нижнему франу в ранге коми надгоризонта [5]. Позже в связи с необходимостью приведения ре-гиональных и местных стратиграфических схем дево-на в соответствие с Международной шкалой девон-ской системы В. С. Цыганко отнес данный интервал разреза к среднему отделу системы [8].

В 1997 г. в ходе изучения разрезов девонской си-стемы в бассейне р. Пижма Печорская В. С. Цыганко были исследованы выходы валсовской и устьчирки-нской свит, сложенные базальтами, их туфами, туффи-тами, туфогенными песчаниками, а также проведено их опробование с целью определения возраста по цир-конам (рис. 1).

Для датирования цирконов было выбрано две пробы — одна (обр. 243) из прослоя песчаных ту-

Рис. 1. Схема геологического строения среднего течения р. Пижмы:

1 — тектонические нарушения: достоверные (а), предполагаемые (б), 2 — обнажения, вскрывающие туфогенные породы (а), обнажения, из которых отобраны пробы для датирования цирконов (б)

Fig. 1. Schematic geological map of the middle course of the Pizhma River:

1 — faults: defined (a), approximate (b); 2 — outcrops of volcanogenic rocks (a); volcanogenic rocks sampled for zircon dating (b)

фов нижней части валсовской свиты (рис. 2, 3), а вторая (обр. 230) — из середины пачки песчаников с примесью туфового материала в нижней части устьчиркинской свиты, отвечающей верхней части тиманского горизонта (рис. 3). В разрезах, содержащих рассматриваемые вулканогенные породы, были встречены отпечатки растений, обломки древесины, миоспоры (определения О. П. Тельновой), филопопы, а также остатки позвоночных (определения А. О. Иванова), обитавших преимущественно в континентальных пресноводных и солоноватоводных водоемах.

Методика

Датирование цирконов из обр. 243 и 230 было выполнено с помощью прецизионного вторично-ионного микрозонда высокого разрешения SHRIMP-II в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ в Санкт-Петербурге. U-Pb-анализ цирконов выполнялся по стандартной методике [10, <http://geochron.vsegei.ru>]. Цирконы изучались в проходящем и отраженном свете, а их внутреннее строение — в катодных лучах. Катодолюминесцентные изображения были получены на CamScan MX2500 с катодолюминесцентной си-

Рис. 2. Выходы песчанистых туфов валсовской свиты в обн. 47

Fig. 2. Outcrops of sandy tuffs of Valsovskaya formation (47)

Ярус	Горизонт	Свита	Мощность, м	р.Печор- ская Пижда, обн. 47	Номера проб	Примечание
Живетский	Тиманский	Цилемская + устьчиркинская	17,0		237	Филлоподы
					236	Филлоподы
					235	
					234	
	Джьерский	Валсовская	> 20,0		239	Туф
					242	<i>Geminospora rugosa</i> <i>Acanthotriletes pusillites</i> <i>Archaeozonotrites reticulatus</i>
					243	<i>Spelaeotriletes bellus?</i> <i>Asterolepis radiata</i>
					244	<i>Geminospora rugosa</i> <i>Geminospora micromanifesta</i> <i>Spelaeotriletes bellus</i>
Яранский	Яранская	Лиственничная	> 5,0			

Горизонт	Свита	Мощность, м	р.Печор- ская Пижда, обн. 46	Номера проб	Примечание
Тиманский	Устьчиркинская	2,8 2,0 5,0		233	Отпечатки растений, редкие кости рыб
				232	
				231	
				230	
	Цилемская	1,5 1,5 2,7		229	Филлоподы, крупные кости рыб <i>Janiosteus sp.</i>

Рис. 3. Стратиграфическая колонка отложений, вскрытых в обн. 47 и 46:

1 — песчаники, 2 — туфогенные песчаники, 3 — алевролиты, 4 — аргиллиты, 5 — глины

Fig. 3. Stratigraphic columns of the outcrop 47 and 46:

1 — sandstone, 2 — tuffaceous sandstone, 3 — siltstone, 4 — mudstone, 5 — clay

стемой CLI/QUA2, Bentham. Построение диаграмм с конкордией и расчет средних конкордантных возрастов осуществлялся с использованием программы ISOPLOT/EX [9].

Результаты датирования цирконов

Цирконы из песчанистых туфов валсовской свиты (обр. 243) представлены идиоморфными, сильно удлинёнными бипирамидально-призматическими кристаллами. Часть их характеризуется хорошо образованными дипирамидными головками. Коэффициент их удлинения составляет от 3 до 7. Католюминесцентные изображения (рис. 4.1—4.12) демонстрируют четкую тонкую осцилляционную зональность роста. В центральных частях некоторых зерен (рис. 4.1—4.3, 4.8, 4.12) видны черные крупные включения или нарушенные участки.

Результаты U-Pb-датирования цирконов из обр. 243 представлены в табл. 1 и на рис. 5, А. Было про-

анализировано 12 зерен (15 аналитических кратеров). Содержания U в цирконах находятся в пределах 68—394 ppm, величина отношения $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$ — 0.38—1.74. Диапазон возрастов, полученных по изотопному отношению $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$, составляет 351—411 млн лет, за исключением зерна № 9 (аналитический кратер 9.1), возраст которого получился средне-рифейским — 1063 ± 23 млн лет. Рассчитанный по 14 анализам средний конкордантный возраст цирконов составляет 376.8 ± 6.7 млн лет (95 %, СКВО = 0.018).

Цирконы из песчаников с примесью туфого материала устьчиркинской свиты (обр. 230) представлены идиоморфными бипирамидально-призматическими кристаллами (рис. 4.13—4.16) с коэффициентом удлинения 2—3. На католюминесцентных изображениях видна тонкая осцилляционная зональность и наличие в трех из четырех исследованных зерен черных нарушенных участков в центральной части цирконов.

Рис. 4. Катодолуминесцентные изображения цирконов с аналитическими кратерами: 1—12 — из обр. 243; 13—16 — из обр. 230. Номера аналитических кратеров соответствуют номерам в таблице

Fig. 4. Cathodoluminescent images of zircons with analytical spots: 1—12 from sample 243; 13—16 — from sample 230. The last two or three digits in the spot number correspond to the numbers in table

Результаты U-Pb-датирования цирконов из пробы 230 представлены в табл. 1 и на рис. 5. Было проанализировано 4 зерна (8 аналитических кратеров). Содержания U в цирконах находятся в пределах 47—245 г/т, величина отношения $^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$ — 0.61—1.20. Полученные по 5 определениям $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ -возрасты образуют интервал 361—389 млн лет со средним конкордантным возрастом 372.4 ± 8.3 млн лет (2σ , СКВО = 0.0098). Для двух зерен (№ 3 и 4) получены ранневендский и раннекембрийский возрасты — 580 ± 12 и 530 ± 12 млн лет соответственно, а возраст краевой части зерна № 1 (кратер 1.3) составляет 327.6 ± 8.8 млн лет, что соответствует раннему карбону.

Обсуждение результатов

Согласно Международной временной геологической шкале (2008 г.), полученные возрастные конкордантные уровни приходятся соответственно на поздний фран и ранний фамен. Однако присутствующие в данных разрезах палеонтологические остатки исключают такую вероятность (рис. 3). В то же время в обоих образцах среди частных замеров возраста имеются результаты, очень близкие к реальным. В обр. 243 это точка 5.1, а в обр. 230 — точки 1.2 и 2.2 (см. таблицу). Одной из возможных причин существенного омоложения конкордантного возраста является растянутый во времени процесс формирования самих кристаллов цирконов в результате значительной продолжительности процесса остывания эффузивов и вмещающих их пород.

Таблица 1. Результаты U-Pb-датирования цирконов из туфогенных пород в бассейне р. Пижмы (Средний Тиман)

Table 1. U-Pb-ages of zircons from tuffogenous rocks in the basin of the Pizhma River (Middle Timan)

Аналитический кратер Analytical spot	206Pb _c , %	U, г/г	Th, г/г	$\frac{^{232}\text{Th}}{^{238}\text{U}}$	206Pb*, г/г	Изотопные отношения / Isotope ratios								Rho	Возраст / Age $\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$ млн лет / Ma
						$\frac{^{238}\text{U}}{^{206}\text{Pb}^*}$	±%	$\frac{^{207}\text{Pb}^*}{^{206}\text{Pb}^*}$	±%	$\frac{^{207}\text{Pb}^*}{^{235}\text{U}}$	±%	$\frac{^{206}\text{Pb}^*}{^{238}\text{U}}$	±%		
						Обр. 243 / Sample 243									
1.1	0.54	200	207	1.07	10.1	17.16	2.3	0.0539	6.6	0.433	7.0	0.0583	2.3	365.2	± 8.2
1.2	0.11	274	340	1.28	15.2	15.50	2.3	0.0552	2.8	0.491	3.6	0.0645	2.3	403.0	± 9.1
2.1	0.36	246	92	0.39	14.0	15.20	2.4	0.0559	4.0	0.507	4.6	0.0658	2.4	410.8	± 9.4
3.1	0.04	128	83	0.67	6.7	16.49	2.4	0.0545	3.5	0.456	4.2	0.0606	2.4	379.5	± 8.9
4.1	0.88	68	70	1.06	3.8	15.78	2.7	0.0489	11.0	0.427	12.0	0.0634	2.7	396.0	± 10.0
5.1	0.35	199	181	0.94	10.6	16.19	2.3	0.0553	4.4	0.471	4.9	0.0618	2.3	386.3	± 8.6
5.2	0.44	208	170	0.85	10.0	17.89	2.3	0.0517	7.0	0.398	7.3	0.0559	2.3	350.7	± 8.0
6.1	0.23	394	606	1.59	20.4	16.65	2.2	0.0538	2.9	0.446	3.6	0.0601	2.2	376.1	± 8.0
6.2	0.75	386	648	1.74	20.3	16.45	2.2	0.0506	6.1	0.424	6.5	0.0608	2.2	380.4	± 8.2
7.1	1.20	105	80	0.78	5.4	17.11	2.6	0.0481	13.0	0.388	13.0	0.0585	2.6	366.2	± 9.4
8.1	0.56	152	109	0.74	8.0	16.53	2.4	0.0516	6.4	0.430	6.8	0.0605	2.4	378.6	± 8.7
9.1	0.00	79	30	0.38	12.2	5.58	2.4	0.0795	2.1	1.965	3.2	0.1792	2.4	1063.0	± 23.0
10.1	0.46	178	272	1.58	8.8	17.49	2.3	0.0551	5.1	0.434	5.6	0.0572	2.3	358.5	± 8.1
11.1	0.58	115	175	1.57	6.0	16.60	2.4	0.0550	6.2	0.457	6.7	0.0602	2.4	377.1	± 8.9
12.1	1.13	57	35	0.64	2.9	16.94	2.8	0.0491	12.0	0.400	13.0	0.0590	2.8	369.7	± 10.0
Обр. 230 / Sample 230															
1.1	1.98	50	53	1.08	2.6	17.25	3.2	0.0460	22.0	0.365	22.0	0.0580	3.2	363.0	± 11.0
1.2	1.81	47	50	1.10	2.6	16.06	3.0	0.0556	17.0	0.477	18.0	0.0623	3.0	389.0	± 11.0
1.3	1.10	68	47	0.71	3.1	19.18	2.8	0.0459	13.0	0.330	13.0	0.0521	2.8	327.6	± 8.8
2.1	0.56	156	93	0.61	8.1	16.78	2.4	0.0584	5.5	0.480	6.0	0.0596	2.4	373.2	± 8.6
2.2	1.44	245	181	0.76	13.0	16.44	2.3	0.0474	11.0	0.398	11.0	0.0608	2.3	380.7	± 8.6
2.3	0.55	197	140	0.73	9.8	17.37	2.3	0.0525	6.1	0.417	6.6	0.0576	2.3	360.9	± 8.2
3.1	0.28	239	277	1.20	19.4	10.63	2.2	0.0599	2.8	0.777	3.6	0.0941	2.2	580.0	± 12.0
4.1	0.46	170	131	0.80	12.6	11.67	2.3	0.0593	4.3	0.700	4.9	0.0857	2.3	530.0	± 12.0

Примечание. Ошибка в калибровке стандарта — 0.68 %. $^{206}\text{Pb}_c$ и $^{206}\text{Pb}^*$ — обыкновенный и радиогенный свинец. Изотопные отношения и содержания ^{206}Pb скорректированы по измеренному ^{204}Pb . Rho — коэффициент корреляции между ошибками определения изотопных отношений $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ и $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$. Приведенные погрешности соответствуют 1σ .

Note. Error in the calibration of standard 0.68 %. $^{206}\text{Pb}_c$ and $^{206}\text{Pb}^*$ — common and radiogenic lead. The isotopic ratios and contents of ^{206}Pb are corrected for the measured ^{204}Pb . Rho — correlation coefficient between errors of determining isotopic ratios $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ and $^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$. Errors correspond to 1σ .

Рис. 5. Диаграммы с конкордией для цирконов из обр. 243 (А) и 230 (В). Средний конкордантный возраст для цирконов: обр. 243 — 376.8 ± 6.7 млн лет (95 %, СКВО = 0.018, N = 14), обр. 230 — 372.4 ± 8.3 млн лет (2 σ , СКВО = 0.0098, N = 5). Эллипсы погрешностей соответствуют 2 σ

Fig. 5. Diagrams with concordia for zircons from sample 243 (A) and 230 (B). Mean concordant age for zircons: sample 243 — 376.8 ± 6.7 Ma (95 %, MSWD = 0.018, N = 14), sample 230 — 372.4 ± 8.3 Ma (2 σ , MSWD = 0.0098, N = 5). Error ellipses are 2 σ

Автор выражает благодарность сотруднику ВСЕГЕИ С. Л. Преснякову за выполненные анализы возраста тиманских цирконов.

Литература

1. Макеев А. Б., Лебедев В. А., Брянчанинова Н. И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2008. 311 с.
2. Малахов А. А. Геология Среднего Тимана и Западного Притиманья. М.-Л.: Гостоптехиздат, 1940. 114 с.
3. Плякин А. М. Магматические комплексы // Тиманский край. Т. 2. Литология. Геофизическая характеристика земной коры, тектоника, минерально-сырьевые ресурсы. Ухта: Ухтинский гос. технический университет, 2011. С. 92—105.
4. Разницын В. А. Тектоника Среднего Тимана. Л.: Наука, 1968. 221 с.
5. Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы. Ленинград, 1988. Девонская система. Л.: МСК, 1990. 60 с.
6. Цаплин А. Е. Основные черты строения яранской и ливенничной свит нижнего франа в северо-западной ча-

сти Среднего Тимана // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1984. № 6. С. 15—20.

7. Цаплин А. Е., Сорокин В. С. Франский ярус Среднего Тимана. Ухта: УГРЭ, 1988. 54 с.

8. Цыганко В. С. Девон Тиманской гряды: основные черты строения и ресурсный потенциал // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 365—384.

9. Ludwig K. R. User's manual for Isoplot/Ex, Version 2.10, A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication No.1a, 2455 Ridge Road, Berkeley CA 94709, USA. 1999.

10. Williams I. S. U-Th-Pb Geochronology by Ion Microprobe. In: McKibben, M. A., Shanks III, W. C. and Ridley, W. I. (eds), Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes, Reviews in Economic Geology. 1998. Vol. 7. P. 1—35.

References

1. Makeev A. B., Lebedev V. A., Bryanchaninova N. I. *Magmatity Srednego Timana* (Magmatites of Middle Timan). Ekaterinburg: Institute of geology Komi SC UB RAS, 2008, 311 pp.
2. Malakhov A. A. *Geologiya Srednego Timana i Zapadnogo Pritimanya* (Geology of Middle Timan and Western Timan). Moscow-Leningrad: Gostoptekhizdat, 1940, 114 pp.
3. Plyakin A. M. *Magmaticheskie komplekсы. Timanskij kryazh. T. 2. Litologiya. Geofizicheskaya harakteristika zemnoj kory, tektonika, mineral'no-syr'evye resursy* (Magmatic complexes. Timan Ridge. V. 2. Lithology. Geophysical characteristics of the earth's crust, tectonics, mineral resources). Uhta: Uhtinskij gos. tekhnicheskij universitet, 2011, pp. 92—105.
4. Raznitsyn V. A. *Tektonika Srednego Timana* (Tectonics of Middle Timan). Leningrad: Nauka, 1968, 221 pp.
5. *Reshenie Mezhdovedstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verhnemu paleozoyu Russkoj platform* (Decision of the Interagency Regional Stratigraphic Meeting on the Middle and Upper Paleozoic of the Russian Platform). Leningrad, 1988, Devonian system. Leningrad: MSK, 1990, 60 pp.
6. Tsaplin A. E. *Osnovnye cherty stroeniya yaranskoy i listvennichnoj svit nizhnego frana v severo-zapadnoj chasti Srednego Timana* (The main structural features of Lower Frasnian Yaranskaya and Listvennichnaya formations in the north-western part of Middle Timan). *Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Geologiya i razvedka*, 1984, No. 6, pp. 15—20.
7. Tsaplin A. E., Sorokin V. S. *Franskij yarus Srednego Timana* (Frasnian stage in Middle Timan). Uhta: UGRE, 1988, 54 pp.
8. Tsyganko V. S. *Devon Timanskoy gryady: osnovnye cherty stroeniya i resursnyj potencial. Problemy geologii i mineralogii* (Devonian rocks of the Timan ridge: main features of structure and resource potential. Problems of geology and mineralogy). Syktyvkar: Geoprint, 2006, pp. 365—384.
9. Ludwig K. R. User's manual for Isoplot/Ex, Version 2.10, A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication No.1a, 2455 Ridge Road, Berkeley CA 94709, USA. 1999.
10. Williams I. S. U-Th-Pb Geochronology by Ion Microprobe. In: McKibben, M. A., Shanks III, W. C. and Ridley, W. I. (eds) / Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes, Reviews in Economic Geology, 1998, V. 7, pp. 1—35.