цианобактериальные инкрустации на крупных органических остатках, как и частая грануляция микробиокластового материала. Выше, после не обнаженного интервала (0.5 м), разрез продолжают горизонтально-тонкослоистые, местами пятнистые, органогенно-обломочные известняковые песчаники (2.5 м) часто с многочисленными членами криноидей.

Таким образом, впервые установлено наличие заметного количества микробных образований в верхневизейских породах бассейна р. Илыч. Эти материалы хорошо согласуются с полученными ранее данными [9, 10]. Так, здесь с середины визе (тульско-алексинское время) происходило постепенное уменьшение глубины и выравнивание дна морского бассейна, что сопровождалось сменой терригенного и терригенно-карбонатного осадконакопления на карбонатное. Дальнейшее обмеление привело к установлению обстановок островного мелководья (михайловское время), которые сохранялись до конца визе (веневское время), но при этом на некоторой части изученной территории водообмен мог быть несколько ограничен [9]. Фактически, после средневизейской трансгрессии происходила постепенная смена сублиторальных условий осадконакопления литоральными и, возможно, участками, супралиторальными. Это способствовало массовому развитию микробных сообществ. В целом можно наблюдать, как микробные сообщества сначала обитали только на осадочных зернах, микритизируя их, но затем начали занимать другие экологические ниши, инкрустируя крупные органические остатки, связывая участки морского дна (образуя небольшие корочки), а далее даже образуя самостоятельные желваки и первые редкие и мелкие строматолиты, ставшие частыми компонентами пород в серпуховском веке [1, 5, 6, 7].

Работа выполнена в рамках темы № АААА-А17-117121270034-3 ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, при поддержке Программы УрО РАН проект № 18-5-5-31.

Литература

1. Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (на примере севера Урала и сопредельных территорий). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.
2. Варсанюфьева В. А. Геологическое строение территории Печорско-Ылычского государственного заповедника // Тр. Печорско-Ылычского гос. заповедника. Вып. 1. М.: 1940. С. 5—214.
3. Елисеев А. И. Формации зон ограничения северо-востока европейской платформы (поздний девон и карбон). Л.: «Наука», ленинградское отделение, 1978. 203 с.
4. Жемчугова В. А. Верхний палеозой Печорского нефтегазоносного бассейна. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1998. 160 с.
5. Калашников Н. В. Нижнекаменноугольные отложения бассейна реки Уньи. // Стратиграфия каменноугольных отложений западного склона Северного и Приполярного Урала. Тр. Ин-та геол. Коми филиала АН СССР. Вып. 11. Сыктывкар: Коми: Книжное издательство, 1970. С. 25—40.
6. Пономаренко Е. С., Иванова Р. М. Литология и стратиграфия верхнесерпуховско-нижебашкирских отложений в разрезе Пача-Шор (р. Илыч, Северный Урал). Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2017. №7. С. 28—37.
7. Пономаренко Е. С., Иванова Р. М., Сандула А. Н. Первые находки *Kamaena* (Chlorophyta) в серпуховских

отложениях (разрез «Уньинская Пещера», Северный Урал) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2015. № 7. С. 3—8.

8. Тимано-Печорский седиментационный бассейн. Атлас геологических карт (литолого-фациальных, структурных и палеогеологических) / Никонов Н. И., Богацкий В. И. и др. ГУП ТП НИЦ, Ухта, 2000.

9. Шадрин А. Н. Верхневизейские отложения р. Илыч (нижний карбон, Северный Урал) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Информ. мат-лы 24-ой научной конф. ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2015. С. 166—169.

10. Шадрин А. Н., Сандула А. Н. Визейские карбонатные отложения в бассейне р. Илыч (Северный Урал): литология, изотопия, эволюция осадконакопления // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2018. №5. С. 13—21.

СПЕЦИФИКА ПАЛЕОЦЕНОЗОВ И ТРОФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВЕРХНЕОРДОВИКСКОГО РИФА БОЛЬШАЯ КОСЬЮ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

Л. А. Шмелёва

THE SPECIFICITY OF PALEOCOENOSIS AND A TROPHIC STRUCTURE OF THE UPPER ORDOVICIAN BOL'SHAYA KOS'YU REEF (NORTHERN URALS)

L. A. Shmeleva

Институт геологии имени академика Н. П. Юшкина
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия;
lyubov.shmeleva@inbox.ru

The study of the spatial-temporal and paleoecological structures of the paleocenoses of the Bolshaya Kosyu reef showed that the sphinctozoic sponges *Amblysiphonelloides reticulata* Rigby & Potter, 1986 and *Corymbospongia* sp. starting from the late Ordovician could settle in sublittoral environments with active hydrodynamics in close connection with cyanobacteria, which played a leading role in the functioning of the trophic structure of this ecosystem. Fossilized biofilms and glycocalyx, tubular and worm-like bacteriomorphs found on the surface of sponges are evidence of active participation of microbial organisms in the life of sphinctozoal sponges.

В мире известно около 200 ордовикских органогенных построек, примерно половина из которых имеет позднеордовикский возраст [28]. В пределах Тимано-Североуральского региона установлено три позднеордовикских рифа (Лек-Елец, Бадъя и Большая Косью), лишь один из которых — риф Большая Косью, расположенный на Северном Урале в приграничной территории Печоро-Илычского биосферного заповедника на р. Б. Косью, правом притоке р. Илыч, — практически не подвергся интенсивным процессам доломитизации [1]. Первые упоминания о присутствии на Северном Урале биогермных известняков верхнего ордовика принадле-

жат А. Г. Кондаин. Позднее риф Большая Косью изучался А. И. Антошкиной, впервые проследившей в структуре рифа смену стадий развития палеосообществ [1]. В результате проведенных автором в 2014—2015 гг. полевых работ впервые в сообществе каркасостроителей рифа были выявлены позднеордовикские сфинктозойные губки [9]. Известно, что сфинктозоа не были типичными каркасостроителями рифов этой эпохи [25, 28] и в основном предпочитали относительно глубоководные сублиторальные обстановки [18, 12, 21, 17], что делает риф Большая Косью уникальным геологическим объектом палеоэкологического изучения развития позднеордовикской рифовой экосистемы.

Важнейшим этапом изучения рифов является выявление пространственно-временной и палеоэкологической структур палеоценозов, поскольку рифы обязаны своим развитием, прежде всего, биоте, поставляющей карбонатный материал и образующей сложную гео-биологическую систему с окружающей средой. Основными каркасостроителями рифа Большая Косью были губки, представленные строматопоридеями и сфинктозоа, известковые водоросли, цианобактерии и гелиолитиды (см. рисунок, 1). Известно, что для позднего ордовика были характерны рифовые постройки строматопоридей, процветавших в то время [16]. Также в это время появились первые кораллы — табуляты и ругозы [4]. Совместно они формировали каркасную основу рифовых построек, заполнявшуюся известковым материалом, который в основном продуцировали водоросли, мшанки и криноидеи [6]. Подобные верхнеордовикские постройки широко распространены в Сибири, Казахстане, Приколымье [5], Канаде [13], Северной Гренландии [23], о-ве Вайгач [7], Полярном и Приполярном Урале [1], Алтае и Салаире [8].

Сфинктозоа рифа Большая Косью, встречающиеся как в скрытых (защищенных от активного волнового воздействия водных масс) межкаркасных полостях, так и в составе каркасостроителей, представлены двумя видами — *Amblysiphonelloides reticulata* Rigby & Potter, 1986 (см. рисунок, 6) и *Corymbospongia* sp., которые часто наблюдаются совместно с цианобактериями *Renalcis* (см. рисунок, 4, 5).

Ранее считалось, что, сфинктозойные губки были важными рифостроителями в средней-поздней перми и среднем-позднем триасе [2, 20]. В настоящее время наиболее древние представители сфинктозоа установлены в теплых низкоэнергетических относительно глубоководных сублиторальных обстановках островодужных террейнов кембрия Южной Австралии и США [14]. Ордовикские сфинктозойные губки в России были известны лишь из среднего ордовика Корякии, где впервые были описаны А. Ю. Журавлёвым из конгломератов эльгеминайской свиты [29]. На Урале и в России в целом не известно примеров участия сфинктозойных губок в формировании рифового каркаса ордовикского возраста. Предполагается, что по крайней мере до начала позднего ордовика низкоэнергетические относительно глубоководные сублиторальные обстановки были предпочтительной средой обитания сфинктозоа [12]. При этом считается, что сфинктозоа обладали более широкой фундаментальной экологической нишей по сравнению с другими многоклеточными и в процессе жизнедеятельности легко приспособлялись к среде обитания [2, 17].

В позднем ордовике происходит первая эволюционная радиация сфинктозоа с более чем двукратным увеличением биоразнообразия на уровне родов и видов по сравнению с кембрием, начинается их географическое расселение [19, 12]. изменялись и их места обитания от уровня дна до рифов. Впервые это было выявлено в структуре позднекарийского сфинктозойно-кораллово-микробного рифа Уай в Китае (Wu'ai reef), также формировавшегося в более глубоководных обстановках сублиторали, неблагоприятных для большинства многоклеточных каркасостроителей, и представляющего собой случай низкоэнергетического рифового сообщества [17]. Палеоценозы рифа Большая Косью, в отличие от рифа Уай, представляют собой новый тип рифового сообщества, развивавшегося в высокоэнергетических обстановках, подобно строматолитово-сфинктозойным рифам позднего силура [22]. Они являются первым палеоэкологическим примером обитания позднеордовикских сфинктозойных губок в сублиторальных обстановках с активной гидродинамикой на глубинах до 20 м.

В результате проведенного анализа распределения по разрезу каркасообразующих организмов была прослежена экологическая сукцессия, состоящая из четырех стадий — стабилизации, колонизации, диверсификации и климакса — характеризующих зрелый экологический риф [9]. Губково-микробная ассоциация *Corymbospongia*—*Renalcis* присутствует на всех стадиях развития рифовой экосистемы за исключением первой (стабилизации), тогда как все остальные группы организмов в процессе экологической сукцессии претерпевали значительные преобразования, выражающиеся в изменении таксономического состава и морфологии каркасостроителей [9, 10]. Присутствие ассоциации губок и цианобактерий в климаксом сообществе, являющемся реакцией экосистемы на изменение внешних (абиотических) факторов среды, а именно смену трансгрессии регрессией в конце среднего катия [11], позволяет говорить о резистентности данной ассоциации к изменению трофности вод и обеднению их биогенами, обусловленными совместными процессами регрессии и спрединга в Палеоуральском океане. В связи с этим возникает необходимость более подробного рассмотрения трофических отношений обитателей рифа, и с этой точки зрения ассоциация сфинктозойных губок и цианобактерий является наиболее интересной.

В общем виде трофическую структуру рифа можно представить следующим образом (см. рисунок, 2): к фототрофам, представляющим первый уровень продуцентов, относятся планктонные и бентосные цианобактерии (*Renalcis*, *Girvanella*, *Botominella*, *Proaulopora* и *Ikella*), известковые зеленые (*Vermiporella*) и красные (*Kozhymella*) водоросли. Помимо образования первичной продукции ОВ они служили пищей для гетеротрофных организмов разных трофических уровней. Второй уровень консументов характеризуют разнообразные губки (строматопоридеи, сфинктозоа, соленопоры), одиночные и колониальные кораллы (гелиолитоидеи, хализитиды, ругозы) и криноидеи, определявшие преимущественно фильтрационный тип гетеротрофной части трофической системы. Третий уровень консументов-зоофагов представляют гидроиды, гастроподы, брахиоподы и трилобиты, которые были детритофагами, об-

скребывателями фитобентоса и илоедами. Четвертый уровень характеризуют бактерии-редуценты — анаэробные гетеротрофы, получавшие энергию при разложении ОВ и образовании неорганических компонентов в процессах сульфатредукции.

Таким образом, ассоциация каркасообразующих сфинктозойных губок с цианобактериями в энергетическом отношении представляет собой сообщество пространственно-сближенных бентосных продуцентов (цианобактерий) и консументов. Выявлено, что в присутствии цианобактерий сфинктозойные губки имеют колонияльные формы роста и становятся значительно крупнее в размере, что может указывать на симбиотические связи данных организмов. Вероятно, в процессе фотосинтеза цианобактерии фиксировали углекислоту, снабжая гетеротрофную губку пищей и одновременно кислородом и энергией (см. рисунок, 3). При этом потери при транспортировке биогенов от продуцентов к консументам оказывались минимальными, а сами консументы в присутствии продуцентов не страдали от изменения трофности вод и обеднения их биогенами. Подобная трофическая структура наблюдается на современных коралловых рифах. Её можно представить в виде двойной петли [3]. По внутренней петле симбиотические водоросли поставляют органику кораллам, а кораллы водорослям биогены. Внутренняя петля может функционировать автономно и не может быть разорвана. Внешняя петля обеспечивает развитие биоразнообразия в коралловом рифе и увеличивает продуктивность кораллов. Исследования последних нескольких лет показали, что современные губки также представляют собой сложный симбиотический комплекс, включающий более сотни различных микроорганизмов [27]. Это стало очевидным после того, как исследователи из Алабамского университета в Бирмингеме (США) определили состав нуклеотидных последовательностей 16S-РНК у губок [26]. По 16S-РНК опознали археобактерий, альфапротеобактерий, актинобактерий, бактерий-нитрификаторов. В общей сложности микромир губок оказался весьма разнообразным: около 100 видов, принадлежащих к 14 типам бактерий, 2 типам археобактерий и нескольким видам эукариот. Многие из этих микроорганизмов встречаются только в губках. Предполагается, что своих симбионтов губка-родитель передает по наследству потомству: в сперматозоидах и в личинках губок обнаружили симбиотических бактерий. Более того, набор симбионтов разных видов губок из разных частей света оказался очень сходным. Это означает, во-первых, что губки приобрели своих симбионтов в самом начале эволюционного пути, что подтверждает наше предположение о симбиотических связях губок и цианобактерий, пусть и не столь тесных, как у их современных представителей. Во-вторых, что жизнеспособность и функционирование такого организма, как губка, требует совершенно определенного набора условий, который обеспечивается специфическим набором симбионтов.

Электронномикроскопические исследования ордовикских сфинктозойных губок рифа Большая Косью выявили присутствие остатков внеклеточного полимерного вещества (гликокаликса) на их поверхности. Выделение внеклеточного полимерного вещества — естественный процесс жизнедеятельности бактерий, оно удерживает клетки вместе, формируя структуру и конструкцию

матрицы биопленки. Минерализованные биопленки в структуре известняков распознаются по «оближенной» форме кристаллов кальцита (см. рисунок, 7—10). Согласно [24], такие формы кальцитовых кристаллов образуются при растворении органическими кислотами инкрустирующих микроорганизмов. В составе гликокаликса присутствуют такие микроэлементы, как Si, Al, K, Mg, Fe, которые говорят о силикатном минеральном веществе, являющимся довольно типичным, поскольку до кальцитизации первым минерализуется гликокаликс в виде аморфного магнезиального силиката. Также важным фактором оказалось обнаружение в минерализованной биопленке трубчатых и червеобразных бактериоморф размером около 10 μm в диаметре (см. рисунок, 13—15), а также распространение разнообразных морфотипов фрамбоидальных пиритов в микробных пленках и матриксе (см. рисунок, 11, 12), которые в настоящее время трактуются как результат пиритизации нанобактерий [15].

Таким образом, изучение пространственно-временной и палеоэкологической структур палеоценозов рифа Большая Косью показало, что впервые обнаруженные в сообществе каркасостроителей рифа сфинктозойные губки, начиная с позднего ордовика, могли поселяться в сублиторальных обстановках с активной гидродинамикой на глубинах до 20 м. При этом в большинстве случаев они находились в тесной ассоциации с цианобактериями, которые снабжали их необходимым потоком органического вещества и играли ведущую роль в функционировании системы пищевых связей данной экосистемы. Широкое распространение фоссилизированных биопленок и гликокаликса, присутствие трубчатых и червевидных бактериоморф на поверхности сфинктозойных губок и вокруг них являются свидетельством активного участия микробных организмов в жизни исследуемых губок в ордовике. Кроме того, их скелет, по всей видимости, был покрыт тонкой органической мембраной, как в современных сфинктозойных губках *Vaceletia*, которая, вероятно, выполняла такие функции, как абсорбция, секретиция, транспорт, выделение и защита.

Автор выражает искреннюю благодарность А. И. Антошкиной за консультации, ценные замечания и полезные рекомендации при подготовке статьи к публикации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00331.

Литература

1. Антошкина А.И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 304 с.
2. Бойко Э.В., Беляева Г.В., Журавлева И.Т. Сфинктозоа фанерозоя территории СССР. М.: Наука, 1991. 224 с.
3. Заварзин Г.А., Рожнов С.В. Рифы в эволюции геобиологических систем. Постановка проблемы // Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. Серия «Гео-биологические системы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2011. С. 4—25.
4. Ивановский А. Б. Ругозы. М.: Наука, 1975. 121 с.
5. Ивановский А. Б., Осипова А. И., Кузнецов В. Г. и др. Рифогенные постройки в палеозое России. М.: Наука, 1997. 157 с.
6. Корольюк И. К., Михайлова М. В. Этапность рифообразования. Фанерозойские рифы и кораллы. М.:

Рисунок. Характеристика палеоценозов и трофической структуры рифа Большая Косью: 1 — видовой состав каркасообразующих организмов; 2 — трофическая пирамида; 3 — схема потоков энергии в губково-микробной ассоциации *Corymbospongia-Renalcis*; 4, 5 — сфинкстоиды *Corymbospongia* sp. (красный треугольник) в ассоциации с цианобактериями *Renalcis* (синий треугольник); 6 — сфинкстоиды *Amblysiphonelloides reticulata*; 7—15 — СЭМ сфинкстоидных губок и матрикса (во вторичных электронах): 7 — сфинкстоиды *Corymbospongia* sp. (Crb) в матриксе (Mt) (обр. БК5/26); 8 — граница губки и матрикса; 9, 10 — минерализованные биопленки, хорошо распознается «облизанная» форма кристаллов кальцита на поверхности губки; 11, 12 — фрамбуиальные пириты в микробных пленках и матриксе (обр. БК 4/22); 13—15 — трубчатые бактериоморфы на поверхности губки (обр. БК5/26)

Figure. Characteristics of paleocenoses and trophic structure of the reef Bol'shaya Kos'yu: 1 — species composition of reef-building organisms; 2 — trophic pyramid; 3 — scheme of energy flows in the sponge-microbial association *Corymbospongia-Renalcis*; 4, 5 — sphinctozooids *Corymbospongia* sp. (red triangle) in association with cyanobacteria *Renalcis* (blue triangle); 6 — sphinctozooids *Amblysiphonelloides reticulata*; 7—15 — SEM of sphinctozooid sponges and matrix (in secondary electrons): 7 — sphinctozooids *Corymbospongia* sp. (Crb) in the matrix (Mt) (sample БК 5/26); 8 — border of the sponge and the matrix; 9, 10 — mineralized biofilms, well recognized «licked» form of calcite crystals on the surface of the sponge; 11, 12 — framboidal pyrites in microbial films and matrix (sample БК 4/22); 13—15 — tubular bacteriomorphs on the surface of the sponge (sample БК 5/26)

Наука, 1986. С. 134–142.

7. Опорный разрез ордовика Пай-Хоя, Вайгача и юга Новой Земли // Сб. статей под ред. В. И. Бондарева. Л.: НИИГА, 1970. 155 с.

8. Сенников Н. В., Обут О. Т., Буколова Е. В., Толмачева Т. Ю. Литолого-фациальная и биоиндикаторная оценки глубины формирования раннепалеозойских осадочных бассейнов Палеоазиатского океана // Геология и геофизика, 2011. Т. 52(10). С. 1488–1516.

9. Шмелёва Л. А. Литолого-палеоэкологическая характеристика верхнеордовикского рифа Большая Косью (бассейн р. Илыч, Северный Урал) // Литосфера, 2016. № 1. С. 154–162.

10. Шмелёва Л. А. Изменчивость губково-микробных сообществ в структуре верхнеордовикского рифа Большая Косью (р. Илыч, Северный Урал) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Матер. 27 научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2018. С. 253–257.

11. Шмелёва Л. А. Изотопно-геохимические вариации как отражение геобиологических факторов в эволюции позднеордовикской рифовой экосистемы Большая Косью (р. Илыч, Северный Урал) // Геологический вестник, 2020. В печати.

12. Carrera M. G., Rigby J. K. Sponges // The great Ordovician biodiversification event (Eds Webby B.D., Paris F., Droser M.L., Percival I.G.). Columbia University Press, New York, 2004. P. 102–111.

13. Copper P. Upper Ordovician and Lower Silurian reefs of Anticosti Island, Quebec // Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir, 1989. No. 13. P. 271–276.

14. Debrenne F., Wood R. A new Cambrian sphinctozoan sponge from North America, its relationship to Archaeocyaths and the nature of early sphinctozoans // Geol. Mag., 1990. No. 127. P. 435–443.

15. Folk R. L. Nannobacteria and the formation of framboidal pyrite: textural evidence // Earth Syst. Sci., 2005. Vol. 114. No. 3. P. 369–374.

16. Hartman W. D. Sponges as reef builders and shapers // Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1977. No. 4. P. 127–134.

17. Li Q., Li Y., Kiessling W. The first sphinctozoanbearing reef from an Ordovician backarc basin // Facies, 2015. No. 61(3). P. 1–9.

18. Rigby J. K., Potter A. W. Ordovician Sphinctozoan sponges from the Eastern Klamath Mountains, northern California // Mem. Paleontol. Soc., 1986. No. 20. P. 1–47.

19. Senowbari-Daryan B., García-Bellido D. C. Fossil 'Sphinctozoa': Chambered Sponges (Polyphyletic) // Systema Porifera: A Guide to the Classification of Sponges (Eds Hooper John N.A., Van Soest Rob W.M.). New York: Kluwer Academic, Plenum Publishers, 2002. P. 1523–1546.

20. Senowbari-Daryan B. Hypercalcified sphinctozoan sponges from Upper Triassic Norian-Rhaetian reefs of the Nayband Formation (central and northeast Iran) // Jahrb. Geol. Bundesanst. 2005. No. 145. P. 171–277.

21. Senowbari-Daryan B., Rigby J. K. Part E, Revised, Volume 4, Chapter 7: Sphinctozoan and Inozoan Hypercalcified Sponges: An overview // Treatise Online. 2011. No. 28. P. 1–90.

22. Soja C. M., Mitchell M., Newton A. J., Vendetti J., Visaggi C., Antoshkina A. I., White B. Paleoecology of sponge-hydroid associations in Silurian microbial reefs // Palaios. 2003. No. 18. P. 225–235.

23. Sonderholm M., Harland T. L. Franklinian Reef Belt, Silurian, North Greenland // Mem. Can. Soc. Petrol. Geol., 1989. No. 13. P. 356–366.

24. Summons R. E., Bird L. R., Gillespie A. I., Pruss S. B., Roberts M., Sessions A. L. Lipid biomarkers in ooids from different locations and ages: evidence for a common bacterial flora // Geobiology, 2013. Vol. 11. No. 5. P. 420–436.

25. Talent J. A. Organic reef-building: episodes of extinction and symbiosis? // Senckenbergian Lethanaea, 1988. No. 3 (4). P. 315–368.

26. Taylor M. T., Radax R., Steger D., Wagner M. Sponge-Associated Microorganisms: Evolution, Ecology, and Biotechnological Potential // Microbiology and molecular biology reviews. 2007. Vol. 71. No. 2. P. 295–347.

27. Vogel G. The Inner Lives of Sponges // Science, 2008. No. 320(5879). P. 1028–1030.

28. Webby B. D. Patterns of Ordovician reef development // Phanerozoic Reef Patterns (Eds Kiessling W., Flögel E., Golonka J.). SEPM (Society for Sedimentary Geology), Tulsa, Oklahoma, 2002. P. 129–179.

29. Zhuravlev A. Yu. Was North America ever a Chukotka terrane? // International Conference on arctic margins. Anchorage, Alaska, 1992. P. 321.