Рис. 2. Фрагмент сейсмического профиля
Fig. 2. Fragment of a seismic profile

(отсутствие регулярных отражений), что, вероятно, обусловлено массивным карбонатным объектом. Особое внимание было уделено изучению переходной зоны от депрессионных фаций к рифогенному барьеру, подробно рассмотрено строение самого барьера (рис. 1). Видно, что граница рифа имеет извилистую форму, выделяются участки выступающие в сторону бассейна, меняется высота органогенных построек. Как раз такие выступающие зоны рассматриваются нами, как наиболее перспективные объекты на данной территории.

Литература

1. Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири, часть I (верхний протерозой и нижний палеозой). Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 1983. 215 с.
2. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Кембрий Сибирской платформы / С. С. Сухов, Ю. Я. Шабанов, Т. В. Пегель и др. Том 1. Стратиграфия. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2016. 497 с.
3. Филиппов Ю. А., Мельников Н. В., Ефимов А. С. и др. Нижне-среднекембрийский рифогенный барьер на севере Сибирской платформы — объект первоочередных нефтегазопроисловых работ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2014. № 2. С. 25–35.

ВЕНЛОКСКИЕ ОРГАНОГЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ НА ПОДНЯТИИ ЧЕРНОВА

В. А. Матвеев, Т. М. Безносова

ORGANOGENIC BUILDINGS FROM THE WENLOCKIAN OF CHERNOV SWELL

V. A. Matveev, T. M. Beznosova

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,
Сыктывкар, Россия; vamatveev@geo.komisc.ru

A description of coral-stromatoporatic and stromatolitic Wenlockian biostromes in the Bezymyanny Brook section in the Chernov Swell is given. Fossil associations allow to date the studied biostromes as Wenlockian.

Выходы карбонатных толщ на ручье Безымянном в бассейне р. Падимейтивис впервые были установлены и описаны Г. А. Черновым в 1941 г. [1]. При повторном изучении этих отложений в 1961 г. им была собрана богатая коллекция фаунистических остатков, которая позволила ему выделить толщу венлокских отложений, включая перерывы, мощностью 80 м. Вопросы стратиграфии венлокских отложений в бассейне р. Падимейтивис, неоднократно пересматривались. Такое разнообразие заключений о возрасте толщи, слагающей разрез Безымянный на поднятии Чернова, свидетельствует о сложности его строения и биоистратиграфического расчленения, как показали наши последующие детальные исследования [2].

Изученный разрез венлока расположен в центральной части поднятия Чернова на правом берегу ручья Безымянного (левого притока р. Падимейтивис) и наращается вверх по течению ручья (рис. А). Нижняя часть разреза мощностью 125 м включает смешанный комплекс фауны, лландоверийско-венлокский комплекс конodontов, изученный П. Мянником [2]. С первого слоя этот разрез, характеризуют представительный комплекс фауны, которую изучали: остракоды — А. Ф. Абушик, Л. Л. Шамсутдинова, строматопороидеи — О. В. Богоявленская, кораллы — В. Ю. Лукин [3], В. С. Цыганко, брахиоподы — Т. М. Безносова. Венлокский возраст терригенно-карбонатных отложений этого разреза, мощностью 200 м определяют брахиоподы *Spirinella nordensis* (Ljashenko), табуляты *Riphaeolites lamelliformis* Klaamann и ругозы — *Phaulactis cyathophylloides* Ryder [2]. Остракоды, по заключению А. Ф. Абушик, характеризуются венлокским комплексом биоцены *Herrmannina insignis*—*Eukloedenella grandifabae* [4].

Впервые в этом разрезе нами была обнаружена органогенная постройка в нижней части разреза, а также толща с органогенными постройками в верхней части разреза, которую формировали преимущественно кораллы, строматопороидеи и строматолиты (см. рисунок). Интервал разреза, разделяющий эти постройки, слагают отложения открытого мелководного шельфа, в режиме преобладания штормовой седиментации и общей регрессивной направленности развития бассейна [2].

Первая органогенная постройка (рисунок, 1) мощностью до 0.5 м, расположенная в нижней части разреза формировалась преимущественно ветвистыми табулятами родов *Parastriatopora* и массивными колониями *Riphaeolites lamelliformis* Klaamann, одиночными ругоза-

Рисунок. Органогенные постройки венлока в разрезе Безымянном на Поднятии Чернова. А — схема местонахождения разреза; В — кораллово-строматопоровый биостром (I) С — толща с органогенными постройками (II); D — ветвистые табуляты *Aulocystella aseptata*; E — караваявидная строматолитовая постройка со строматолитообразующими организмами: 1 — минерализованный чехол трубчатого нитевидного образования, 2 — овальная форма с мелкими порами на поверхности; 3 — шаровидная форма с губчатой поверхностью, 4 — куполообразная форма с многочисленными бугорками и перемычками, 5 — фоссилизированный гликокаликс (?) с округлыми пустотами; 6 — фрагмент микробной биоопленки. Все изображения во вторичных электронах; F — известняк детритовый, биоморфный с полуокатанными хаотичными штормовыми выносами

Figure. Organogenic buildings from the Wenlockian in the Bezmyanny section in the Chernov Swell. A — location of the section; B — coral-stromatoporotic biostrome (I); C — tabulates *Aulocystella aseptata*; E — dome-like stromatolite building with stromatolite-forming organisms: 1 — mineralized cover of a tubular filamentous structures, 2 — an oval form with small pores on the surface; 3 — spherical shape with a spongy surface, 4 — a domical form with numerous tubercles and lintels, 5 — fossilized glycolyx (?) with rounded cavities; 6 — a fragment of the microbial biofilm. All images are in secondary electrons; F — detrital limestone, biomorphic with subrounded chaotic storm cone

ми — *Phaulactis cyathophylloides* Ryder, *Palaeophyllum fasciculum* Kutorga, *P. tubuliferum* Reiman, строматопороидеями *Eclimadictyon fastigiatum* Nikolson. Между колониями кораллов и строматопороидей наблюдаются веточные морские лилии длиной до 5 см и единичные раковины брахиопод *Atrypa reticularis* (Linnaeus) (рис. В). Подобный комплекс ругоз известен из разрезов венлока о. Готланд и Эстонии (о. Саарема) [5, 6]. Строматопороидеи *Ec. fastigiatum* распространены в разрезах лландовери и венлока Горного Алтая, р. Мойеро (Сибирская платформа), Австралии, Англии, Средней Азии Эстонии, Северной Америки [7].

Биостром подстилают тонкослоистые иловые известняки, заключающие брахиоподы *Spirinella nordensis* (Ljashenko), раковинный детрит, прослой кварцевого алеврита и алевритистых мергелей.

Интервал разреза мощностью 116 м, расположенный выше биострома и разделяющий нижний биостром, и толщу с органогенными постройками, слагают известняки глинистые с обломками мшанок и криноидным детритом, известняки с линзами плоскогалецкого конгломерата, биоморфные с полуокатанными хаотичными штормовыми выносами (рис. F), а также ракушечники в виде лома раковин брахиопод, остракод, гастропод, пелелипод и, реже, трилобитов.

Толща с органогенными постройками в верхней части разреза, представлена строматолитовыми постройками и кораллово-строматопоратовыми биостромами общей мощностью 31 м (см. рисунок, интервал II). В этой толще органогенные постройки составляют часть ее объема. Подобные интервалы разреза предложено называть «толщами с органогенными телами (постройками)» [8, с. 54]. В нижней части этой толщи залегают известняки со строматолитами, различными по морфологии постройками: караваевидными, куполовидными и пластовыми, достигающие в диаметре 55 см и высоты 25 см (рисунок, E). Микроскопически строматолиты состоят из пелитоморфного известняка с волнистой прерывистой слоистостью. Слоистость обуславливается чередованием тонкого светлого пелитоморфного кальцита с более темным пелитоморфным кальцитом, которые имеют сгустковую структуру [9]. В этих строматолитах впервые были обнаружены остатки строматолитообразующей биоты [10, 11] (рис. 1—6). Строматолитовые постройки венлока известны на севере Урала, гряде Чернышева, о. Долгий и о. Сааремаа в Эстонии [12, 13, 14].

Выше строматолитов залегают прослой известняков (0.35 м) со строматопороидеями *Syringostromella elegestica* Riab., и трубчатыми табулятами *Aulocystella aseptata* Barskaja, сплетающиеся с ними ветвистыми табулятами *Riphaeolites lamelliformis* Klaamann. Биостром перекрываются известняками тонкоплитчатыми с единичными остракодами и брахиоподами *Atrypoides*, а также известняками с трещинами усыхания. Выше залегает слой известняков с массивными колониями строматопороидей *Ec. fastigiatum*, которые перекрываются известняками тонкоплитчатыми с остракодами, детритовыми и знаками волновой ряби.

Подобное строение интервала разреза венлока, заключающего кораллово-строматопоратовые и строматолитовые биостромы, описаны Д. К. Патруновым с соавторами на о. Долгом [12].

Известно, что строматопороидеи и кораллы (ругозы и табуляты), довольно часто между собой образуют сим-

биотические ассоциации, возможно, таким образом, кораллы приобретали защиту от неблагоприятных условий окружающей среды, в то время как строматопороидеи, лучше приспосабливались и переносили экологические изменения, например, активное воздействие волн [15].

Таким образом, венлокские органогенные постройки могут служить коррелятивными уровнями на огромных расстояниях. Существование изученных органогенных построек свидетельствуют об условиях теплого климата, повышенной циркуляции вод, обеспечивающих поступление питательных веществ необходимых для развития сообществ бентосных организмов, которые принимали участие в формировании органогенных построек в Североуральском морском бассейне в венлокское время.

Литература

1. Чернов Г. А. Силурийские отложения поднятия Чернова // Докл. АН СССР, 1964. С. 843—846.
2. Безносова Т. М., Мянник П., Майдль Т. В., Лукин В. Ю., Матвеев В. А. Условия осадконакопления и биота на рубеже лландовери и венлока (поднятие Чернова) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. № 3. С. 14—18.
3. Лукин В. Ю. Систематическое положение вида *Syringoporinus aseptata* Barskaja, 1967 из силурийских отложений поднятия Чернова (Большеземельская тундра) // Сыктывкарский палеонтологический сборник. № 7. Сыктывкар, 2014. С. 25—30. (Тр. Ин-та геологии Коми научного центра УрО РАН. Вып. 129).
4. Abushik A. F. Silurian-Earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan — Northern Ural Region // Estonian Acad. Sci. Geol., 2000. Vol. 49. No 2. P. 112—125.
5. Силур Эстонии / Под ред. Д. Л. Кальо; Ин-т геологии АН СССР. Таллин: Валгус, 1970. 344 с.
6. Jeppsson, L., Calner, M., Eriksson, M. Locality descriptions. The Dynamic Silurian Earth. Subcommission on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005. 2005. P. 22—47.
7. Нестор Х. Э. Раннепалеозойские строматопороидеи бассейна р. Мойеро. Таллин: Валгус, 1976. 95 с.
8. Ископаемые органогенные постройки, рифы, методы их изучения и нефтегазоносность / И. К. Королук [и др.]. Москва: Наука, 1975. 236 с.
9. Матвеев В. А. Строматолитовые постройки венлока поднятия Чернова: основные морфотипы, микроструктура // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ, 2011. № 11. С. 2—5.
10. Матвеев В. А. Ультрамикроструктуры венлокских строматолитов поднятия Чернова // Доклады академии наук, 2017. Т. 474. №2. С. 206—209. DOI: 10.7868/S0869565217140146
11. Matveev V. A. Biogenic Structures in the Silurian Stromatolites (Timan-Northern Ural Region) // Paleontological Journal, 2019, Vol. 53, No. 8, pp. 92—96. DOI: 10.1134/S0031030119080094
12. Kõrts A. Distribution of calcareous algae, oncolites and stromatolites in Wenlock-Ludlow boundary beds in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology. 1991. Том 40. № 2. С. 43—49.
13. Шебошкин Д. Н., Мянник П. Венлокские отложения южной части гряды Чернышева (Тимано-Североуральский регион) // Литосфера. 2014. № 1. С. 33—40.
14. Патрунов Д. К., Шурыгина М. В., Черкесова С. В. Силур и нижний девон на острове Долгом // Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. Свердловск: УНЦ ФН СССР, 1980. С. 3—26.
15. Kershaw S. Stromatoporoid-coral intergrowths in a Silurian biostrome // Lethaia, 1987. №20. P. 371—382.