САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО И ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ ФОРМИРОВАНИЯ РУДОНОСНЫХ ПОРОД ПРОЯВЛЕНИЯ РАЯЛАМПИ (ХАУТАВААРСКАЯ СТРУКТУРА, ЮЖНАЯ КАРЕЛИЯ)

Ф. А. Гордон¹, А. В. Дмитриева²

¹Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург; *fany.gordon@yandex.ru*

²Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск
dmitrieva-a-v@yandex.ru

В статье рассматриваются результаты исследования самородного золота и флюидных включений в кварце рудопоявления Раялампи (Южная Карелия). Изученное золото характеризуется относительно высокой пробой (от 934 до 964 ‰, в среднем 948 ‰), размером частиц от 0.05 до 0.5 мм и равномерной окраской золотисто-желтого цвета. В сростках с ним преобладают минералы висмута (теллуросеит и тетрадимит), что указывает на возможность осаждения золота из флюида совместно с высокотемпературными висмутовыми соединениями. Термодатиметрические данные впервые получены для рудопоявлений центральной части Хаутаваарской структуры. Результаты исследований флюидных включений показывают, что формирование пород рудопоявления Раялампи происходило в условиях многоэтапной эволюции флюида: наблюдается переход от слабосоленого водного флюида, содержащего хлорид магния и уголекислоту, к хлоридному рассолу и затем вновь к водно-уголекислотному флюиду. Присутствие трехфазовых включений, содержащих флюид высокой солёности — до 40 мас. %-экв. NaCl, в кварце рудоносных пород Раялампи свидетельствует о магматическом источнике рудоносного флюида и соответствии Au-Bi-оруденения Раялампи типу месторождений, связанных с интрузивами.

Ключевые слова: зеленокаменный пояс; золото; минералы висмута; флюидные включения; рудопоявление Раялампи; месторождения, связанные с интрузивами.

NATIVE GOLD AND ORE-FORMING FLUID CHARACTERISTICS OF THE RAJALAMPI ORE OCCURRENCE, HAUTAVAARA STRUCTURE, SOUTH KARELIA

F. A. Gordon¹, A. V. Dmitrieva²

¹Institute of Precambrian Geology and Geochronology RAS, St.-Petersburg

²Institute of Geology KarRC RAS, Petrozavodsk

The results of the study of the native gold characteristics and fluid inclusions in quartz from the Rajalampi ore occurrence, South Karelia, are reported. The gold analyzed displays a relatively high grade (934 to 964 ‰, an average of 948 ‰), a particle size of 0.05 to 0.5 mm and a uniform golden-yellow colour. The intergrowths are dominated by bismuth minerals (telluroseite and tetradimite), suggesting precipitation of gold with high-temperature bismuth compounds. Thermodynamic data for ore occurrences in the central Hautavaara structure were obtained for the first time. Analysis of the fluid inclusions shows that the Rajalampi rocks were formed as a result of multi-stage fluid evolution: a transition from slightly saline aqueous fluid containing Mg chloride and carbon dioxide to chloride brine and then again to hydrous-carbon dioxide fluid was observed. The presence of three-phase inclusions with highly saline fluid — up to 40 wt. % eq NaCl in quartz from Rajalampi ore-bearing rocks can be interpreted like evidence of magmatic source of ore-bearing fluid existence and the consistency of Rajalampi Au-Bi mineralization to an intrusion related type deposits.

Keywords: greenstone belt, gold, bismuth minerals, fluid inclusions, Rajalampi ore occurrence, intrusion-related deposits

Введение

Золоторудные проявления Карелии на протяжении последних 30 лет привлекают особое внимание исследователей высоким рудным потенциалом и близким расположением к научным и производственным центрам западной части России.

По аналогии с другими докембрийскими щитами наибольший интерес вызывают объекты, расположенные в зеленокаменных поясах. При этом основная часть таких месторождений по классификации, предложенной Д. Гровсом [18], относится к орогенному и связанному с интрузивами генетическим типам.

Хаутаваарская зеленокаменная структура находится на юге Балтийского щита, в 80 км к западу от

г. Петрозаводска. В её центральной части известна группа золоторудных проявлений (Центральное, Раялампи и др.) (рис. 1, а), генезис которых является предметом дискуссий: их относят к орогенному, порфиловому или связанному с интрузивами типам [3, 6, 12]. Нами предложена гипотеза [3], согласно которой Au-Bi-оруденение одного из наиболее перспективных проявлений, Раялампи, соответствует типу месторождений, связанных с интрузивами.

Настоящее исследование направлено на выяснение детальных характеристик самородного золота Раялампи и установление физико-химических параметров флюидного режима формирования рудоносных пород для подтверждения предложенного генетического типа оруденения.

Для цитирования: Гордон Ф. А., Дмитриева А. В. Самородное золото и флюидный режим формирования рудоносных пород проявления Раялампи (Хаутаваарская структура, Южная Карелия) // Вестник геонаук. 2020. 5(305). С. 9—16. DOI: 10.19110/geov.2020.5.2.

For citation: Gordon F. A., Dmitrieva A. V. Native gold and ore-forming fluid characteristics of the Rajalampi ore occurrence, Hautavaara Structure, South Karelia. Vestnik of Geosciences. 2020. 5(305). С. 9—16. DOI: 10.19110/geov.2020.5.2.

Рис. 1. Геологическое строение и золоторудные проявления центральной части Хаутаваарской зеленокаменной структуры: а — схема геологического строения центральной части Хаутаваарской структуры, составлена по [6, 13] с использованием данных Карельской экспедиции; б — схема геологического строения района рудопоявления Раялампи [3]: 1—5 — вулканогенно-осадочные толщи хаутаваарской серии: 1 — андезиты, дациты и их туфы (AR_{2vt}), 2 — долеритовые порфиры, амфиболиты, амфибол-плагиоклазовые сланцы (AR_{2lh}), 3 — базальты, андезиты, дациты, риолиты и их туфы, чередующиеся с аренит-силицидами, графитистыми алевролитами и серно-колчеданными рудами (AR_{2ka}), 4 — долеритовые порфиры и амфиболиты (AR_{2kn}), 5 — туфы, кварц-слюдяные и графитистые слюдяно-кварцевые сланцы, метаспесчаники (AR_{2us}); 6—9 — интрузивные комплексы: 6 — габбро-долериты, габбро-амфиболиты, феррогаббро (виетуккалампинский AR_{2v}); 7 — гипербазиты (хюрсюльский AR_{2h}); 8 — граниты, гранитогнейсы (шуйский AR_{2s}); 9 — граносиениты, монцограниты, монцогаббро, монцограниты (хаутаваарский AR_{2ht}); 10 — разрывные нарушения; 11 — зоны расланцевания; 12 — рудопоявления и пункты проявления золотой минерализации

Fig. 1. Geological settings and gold ore occurrences of the central part of the Hautavaara greenstone structure: a — geological map of the central part of the Hautavaara structure, compiled according to [12], using data from the Karelian expedition and [6]; b — geological map of the Rajalampi occurrence area [3]: 1—5 — volcanic—sedimentary rocks of the hautavaara complex: 1 — andesites, dacites and their tuffs (AR_{2vt}), 2 — dolerite porphyrites, amphibolites, amphibole—plagioclase shales (AR_{2lh}), 3 — dacites, rhyolites and their tuffs, layering with arenitic silicites, graphite siltstone and pyrite ores (AR_{2ka}), 4 — dolerite porphyrites and amphibolites (AR_{2kn}), 5 — tuffs, quartz—mica and graphite, metasandstones (AR_{2us}); 6—9 — intrusive complexes: 6 — gabbro—dolerites, gabbro—amphibolites, ferrogabbro (Vietukalampinski AR_{2v}); 7 — hyperbassites (Hursylskij AR_{2h}); 8 — granites, granite gneisses (Shuiskij AR_{2s}); 9 — granosyenites, monzogranites, monzogabbro, monzogranites (Hautavaarskij AR_{2ht}); 10 — faults; 11 — shear-zones, 12 — gold ore occurrences and points of gold mineralization

Геологическая характеристика рудопоявления Раялампи

Хаутаваарская зеленокаменная структура образована верхнеархейскими вулканогенно-осадочными толщами хаутаваарской серии (базальт-андезит-дацит-риолитовые и коматиит-базальтовые ассоциации) и прорывающими их интрузивными комплексами (рис. 1, а). В осевой части структуры расположен Хаутаваарский дифференцированный массив (2.73—2.74 млрд лет [12, 16]), дайковые тела гипербазитов и базитов (2914 ± 9 млн лет [9]).

Хаутаваарский массив сложен двумя магматическими фазами: ранней, включающей монцогаббро и монцодиориты, развитые в эндоконтакте, и поздней — с граносиенитами и монцогранитами, слагающими большую часть массива [5].

Тектоническое строение структуры определяют архейские разломы субмеридионального простирания и более поздние, поперечные к ним системы сбросов и сбрососдвигов. К зонам разрывных нарушений северо-западного простирания приурочены рудопоявления золота, расположенные в краевых частях структуры — Хюрсюля, Коруд, Новые Пески, 77-ЮК [8] (рис. 1, а).

Отдельную группу образуют проявления центральной части зеленокаменной структуры, расположенные в эндо- и экзоконтактовых зонах Хаутаваарского массива — Центральное, Северное, Хаутаваарское-Молибденовое, Виетуккалампи, Раялампи (рис. 1, а). Геологическое строение, гидротермально-метасоматические и рудно-минеральные ассоциации этих проявлений отражают влияние как самого дифференцированного массива, так и систем расланцевания, развитых в его приконтактовых зонах [2, 3].

Рудопоявление Раялампи расположено в южном экзоконтакте Хаутаваарского массива в зоне развития систем расщеливания северо-восточного и северо-западного (70° и 310° соответственно) простирания, секущих дайковое тело феррогаббро и вмещающие метаморфизованные вулканогенно-осадочные толщи (рис. 1, б).

В пределах рудопоявления наблюдается последовательная смена кварц-калишпатовых, эпидот-пропилитовых и карбонат-хлорит-кварцевых / карбонат-серицит-кварцевых метасоматитов. Первые две ассоциации пространственно связаны с породами Хаутаваарского массива и зафиксированы только в его ближайшем контакте, что с учетом минерального состава позволяет относить их к плутогенной формации. Карбонатсодержащие (более поздние) ассоциации, приуроченные к разрывным нарушениям и проявленные в пределах всей Хаутаваарской структуры, отнесены нами к тектогенной формации [2].

На данном этапе исследований рудопоявление разделяют на 2 участка проявления золотой минерализации — Восточное и Западное Раялампи [7].

На участке Восточное Раялампи золотовисмутовая минерализация обнаружена в контактовой части дайкового тела феррогаббро, подвергшегося эпидотовой пропилитизации. Рудная минерализация приурочена к маломощным прожилкам (от 1 до 10 мм) в которых преобладает мелко- и среднезернистый серый кварц. Золото ассоциирует с минералами висмута и теллура, халькопиритом, пиритом. Проба золота колеблется от 893 до 975 ‰, в среднем 949 ‰ ($n = 30$). Содержание Au в ядерной части рудной зоны (по данным штучного опробования) колеблется от 5.6 [3] до 128 г/т [7].

Западное Раялампи представляет собой зону развития золотосодержащей пирит-арсенопиритовой минерализации в феррогаббро, подвергшихся серицит-кварцевым изменениям. Рудоконтролирующей структурой является зона расщеливания северо-западного простирания, рудная минерализация приурочена к тонким (до 2 см) кварцевым прожилкам, выполненным мелкозернистым светло-серым кварцем. Тонкодисперсное золото (1–4 мкм) встречается в арсенопирите, его проба колеблется от 667 до 949 ‰, преобладает относительно низкопробное и умеренно высокопробное золото (770–880 ‰). Содержание Au в центральной части зоны расщеливания составляет 0.2–1.9 г/т [7].

На Западном и Восточном Раялампи, в узлах пересечения систем трещин 310° и 70° формируется позднее золото-серебро-полиметаллическое оруденение, приуроченное к участкам развития карбонат-хлорит-кварцевой гидротермально-метасоматической ассоциации. Благороднометалльная минерализация представлена микровключениями минералов Au-Ag-Te-Se (электрум, аргентопентландит, гессит, акантит и др.), которые ассоциируют с галенитом, пентландитом, сфалеритом, кобальтином и частично замещают предшествующие парагенезисы [3].

Золотовисмутовое оруденение Восточного Раялампи по своим характеристикам сопоставимо с оруденением месторождений, связанных с интрузивами. На это указывает его пространственная связь с породами Хаутаваарского массива, зональное строение и состав ореолов метасоматических изменений, а также ассоциация высокопробного золота с самородным висмутом и висмутсодержащими минералами.

Золото-серебро-полиметаллическое оруденение, выявленное на Восточном и Западном Раялампи, проявляет типичные признаки орогенных объектов докембрийских зеленокаменных поясов: определяющим рудоконтролирующим фактором является расположение в пределах зоны расщеливания; оруденение сопровождается карбонатсодержащими метасоматитами; низкопробное золото ассоциирует с сульфидами As, Co, Pb, Zn и минералами Ag-Te-Se.

Образцы и методы

Характеристики флюидных включений кварца рудоносных пород Раялампи изучались в двусторонне полированных пластинках с помощью светового микроскопа Leica DM2700 P (Санкт-Петербургский горный университет), термодатчиком Linkam THMSG 600 и микроскопа Olympus BX51 (Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, г. Санкт-Петербург).

Солёность и плотность растворов флюидных включений рассчитывалась по температурам плавления льда и растворения кристалла галита с помощью программного пакета Fluids [14]. Состав водной фазы флюидных включений определялся по температуре эвтектики согласно методике, предложенной А. С. Борисенко [1].

Для изучения характеристик самородного золота Раялампи из протолок штучных проб рудоносных пород была отобрана монофракция золота, состоящая из 218 зерен (минералогическая группа ИГГД РАН, аналитик Г. В. Платонова). С помощью оптического микроскопа Leica EZ4D (Санкт-Петербургский горный университет) золотины были детально описаны и сфотографированы. Изучение их химического состава и минерального состава сростков проводилось на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S 3400 N, оснащённом приставкой энергодисперсионного микроанализа OXFORD в ресурсном центре Научного парка СПбГУ «Геомодель» (аналитик Н. С. Власенко).

Полученные результаты

Самородное золото Раялампи

Самородное золото получено из рудоносных пород Восточного Раялампи. Размер выделенных частиц колеблется от 0.05 до 0.5 мм ($n = 218$), преобладает (более 70 % зёрен) тонкое золото (до 0.1 мм).

Зерна всех фракций окрашены в золотисто-желтый цвет, с редкими буроватыми включениями ассоциирующих минералов. Основной объем золотинок тонкой фракции представлен комковидными (75 %) и ксеноморфными (20 %) зернами, встречаются единичные кубические кристаллы и их агрегаты (5 %). Среди более крупных частиц преобладают изометричные и пластинчатые зерна с неровной мелкоступенчатой поверхностью (60 %), встречаются также комковидные индивиды с крючковатыми загибами и уплощенными отростками, поверхность которых покрыта мелкими изометричными выступами и бугорками (40 %) (рис. 2). Большинство выделенных форм соответствует прожилково-трещинному морфогенетическому типу [10].

Золото характеризуется высокой пробой (от 934 до 964 ‰, в среднем 948 ‰, $n = 107$) (рис. 3) и уменьшением примеси Ag в краевых участках зёрен. При этом проба

Рис. 2. Морфология самородного золота рудопроявления Восточное Раялампи

Fig. 2. The gold grains morphology of the East Rajalampi occurrence

Рис. 3. Гистограмма распределения пробы золота, $n = 107$

Fig. 3. The grade histogram of the East Rajalampi gold

золота не зависит от его формы, что так же, как и форма зерен, свидетельствует об определяющей роли морфологии трещинных пустот в процессе кристаллизации.

Золото образует сростания с кварцем, сульфидами и минералами висмутотеллуридной ассоциации (рис. 4). В изученной монофракции наиболее распространена ассоциация золота с теллуридожилеитом Bi_4TeS_2 и тетрадимитом $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}$ (табл. 1).

Флюидные включения

Образцы для исследования флюидных включений были изготовлены из кварца рудоносных пород Западного и Восточного Раялампи, насыщенного многочисленными минеральными и флюидными включениями. Ранняя генерация кварца представлена мелко- и среднезернистым агрегатом от белого до серого цвета, характеризующимся волновым погасанием и гранобластовой структурой. Поздней генерации соответствует мелкозернистый светло-серый и прозрачно-

белый кварц, не несущий следов перекристаллизации. В ядерных частях рудных зон преобладают включения, размер которых не превышает 3 мкм. По соотношению и характеристикам фаз при комнатной температуре их можно разделить на следующие типы:

1 — двухфазовые газово-жидкие, 2 — трехфазовые галитсодержащие газово-жидкие, 3 — водно-углекислотные и 4 — однофазовые газовые и жидкие (рис. 5).

Выделенные типы включений соответствуют первично-вторичным и вторичным флюидным парагенезисам согласно критериям, предложенным Э. Рёдером [11]. Следует отметить, что для большинства докембрийских золоторудных объектов характерно многоэтапное развитие жильных систем, поэтому чаще всего именно первично-вторичные и вторичные флюидные включения являются основными источниками информации о составе рудоносного флюида [20].

Для термодинамических исследований использовались относительно редкие флюидные включения, размер которых превышал 4 мкм, что обеспечивало достоверность и воспроизводимость данных (табл. 2).

Включения 1-го типа (двухфазовые газово-жидкие) зафиксированы во всех изученных пластинках. Это ромбовидные или округлые включения, реже формы отрицательного кристалла, размером до 12 мкм (рис. 5, а). По характеру распределения и микротермометрическим характеристикам их можно разделить на 2 группы:

1а — единичные включения или их группы, не пересекающие границы кварцевых зерен, с температурами гомогенизации до 337 °С, содержащие газовую фазу и слабосоленый водный раствор (до 9.2 мас. %-экв. NaCl), в составе которого определен хлорид магния;

1б — цепочки включений, приуроченные к системам трещин, в большинстве случаев также не выходящих за границы зерен кварца. Отличаются от 1а более низкими температурами гомогенизации (до 195 °С) и меньшей концентрацией солей в растворе (до 5.2 мас. %-экв. NaCl) [4].

Рис. 4. Карты распределения химических элементов в самородном золоте Восточного Раялампи (по данным энергодисперсионного анализа)

Fig. 4. Maps of the chemical elements distribution in the native gold of East Rajalampi (according to energy dispersive analysis)

Таблица 1. Состав висмутовых минералов, образующих сростки с самородным золотом Восточного Раялампи (по данным энергодисперсионного анализа, мас. %, сумма приведена к 100 %)

Table 1. Composition of bismuth minerals identified in intergrowths with native gold, East Rajalampi (according to energy dispersive analysis, wt.%, amount equated to 100 %)

Минерал / Mineral	Bi	Теллуросеит / Telluroseite Bi_4TeS_2							Тетрадимит Tetradimite $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}$	
Зерно / Grain	22	5	7	19	22	23	23	28	8	29
Ag	0.22		0.32	0.24	0.21	0.26	0.31	0.20	0.26	0.19
Au					0.34					
Bi	99.78	73.97	72.29	74.88	76.09	74.74	75.72	74.70	61.22	59.58
Te		23.40	24.24	22.20	20.30	22.39	20.95	22.02	33.66	35.55
S		2.63	3.15	2.67	3.06	2.61	3.02	3.08	4.86	4.68

Включения 2-го типа (трёхфазовые галитсодержащие газовой-жидкие) отмечены только в двух пластинках Восточного и одной пластинке Западного Раялампи. Это единичные полигональные, изометричные, реже округлые трёхфазовые включения размером до 10 мкм, расположенные в краевых частях кварцевых зерен (рис. 5, b). Они имеют температуру гомогенизации до 339 °C. В жидкой фазе включений, вероятно, присутствуют хлориды лития с примесями других солей. Концентрация солей в растворе рассчитана по температуре растворения кристалла галита и составляет 37.2—40.0 мас. %-экв. NaCl.

Темноокрашенные водно-углекислотные включения 3-го типа зафиксированы практически во всех

изученных пластинках. Это изометричные, овальные включения, которые образуют цепочки и скопления, приуроченные преимущественно к трещинам, пересекающим зерна кварца (рис. 5, c). Они имеют температуру гомогенизации до 264 °C, гомогенизация происходит в газовую фазу. По визуальной оценке водная фаза занимает в них не более 10 % от общего объема вакуоли, размер включений колеблется от 2 до 9 мкм (преобладают включения меньше 5 мкм). В составе включений доминирует CO_2 , температура эвтектики от –60.0 до –57.0 °C указывает на примесь других газов, гомогенизация углекислоты отмечена в интервале 5—27 °C (в жидкую фазу).

Таблица 2. Результаты микротермометрических исследований флюидных включений в кварце рудопоявления Раялампи

Table 2. The results of the thermocryometric studies of fluid inclusions in quartz of the Rajalampi ore occurrence

Типы включений Types of inclusions	Количество включений Number of inclusions	Т _{гом} , °С	Т _{эвт} , °С	Т _{пл. л.} , °С	Соленость, мас. % экв. NaCl, Salinity	Плотность, г/см ³ Density, g/cm ³
1a	21 — I	288—337	−34—31	−6.1—5.3	7.9—9.2	0.74—0.83
	5 — II					
1b	6 — I	154—195	−35—32	−0.1—3.7*	0.2—5.2	0.88—0.94
	14 — II					
2	9 — I	290—339	−73—63	−46.5—34	37.2—40.0	1.01—1.06
	2 — II	206—237**				
3	7 — I	171—264	−57—60	—	—	0.94—1.01
	10 — II	5—27***				

Примечание: I — Восточное Раялампи, II — Западное Раялампи; * низкие температуры плавления, возможно, связаны с присутствием в отдельных случаях газогидратов, что могло послужить причиной занижения значений солености; ** — температура растворения кристалла галита; *** — температура гомогенизации CO₂; прочерк — исследования не проводились.

Note: I — East Rajalampi, II — West Rajalampi; * in some cases low ice melting temperatures may indicate gas hydrates presence, which could cause a decrease of salinity values; ** — halite melting temperature; *** — CO₂ homogenization temperature; dash — no measurements.

Рис. 5. Типы флюидных включений в кварце рудопоявления Раялампи: 1a — двухфазовые газово-жидкие включения 1 типа; 2b — трехфазовые галит-содержащие газово-жидкие включения 2 типа; 3, c — водно-углекислотные включения

Fig. 5. Fluid inclusions types in quartz of the Rajalampi occurrence. 1a — two-phase gas-liquid inclusions of type 1; 2b — three-phase halite-bearing gas-liquid inclusions of type 2; 3, c — water-carbon dioxide inclusions

4-й тип представлен однофазовыми газовыми и жидкими включениями размером до 3 мкм, образующими цепочки и скопления, приуроченные к поздним системам трещин. Исследование термодинамических характеристик включений этого типа не проводилось вследствие их малых размеров и предполагаемого отсутствия связи с оруденением.

Обсуждение результатов и выводы

На проявлении Раялампи выделяется 2 этапа формирования золотой минерализации: золотовисмутый, зафиксированный только на Восточном участке, и золотополиметаллический, проявленный в пределах всего рудопоявления.

Полученные результаты исследования самородного золота и флюидных включений кварца рудоносных пород Восточного и Западного Раялампи позволяют сделать следующие выводы.

1. Золотовисмутый этап является наиболее продуктивным и сопровождается образованием высокопробного золота (от 934 до 964 ‰, в среднем 948 ‰) размером до 0.5 мм. Морфологические особенности золотинок указывают на определяющую роль трещинных пустот в процессе их формирования. Золото в изученной монофракции чаще всего образует сростания с теллуридожилитом Bi_4TeS_2 и тетрадимитом $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}_5$. Эти данные свидетельствуют в пользу предложенной нами ранее гипотезы [3] о возможном осаждении золота совместно с высокотемпературными висмутовыми соединениями (например, AuBi_2) в ходе охлаждения флюида, источником которого могли выступать поздние фазы Хаутаваарского массива.

2. Присутствие трехфазовых включений, содержащих высокосолёный флюид (до 40 мас. %-экв. NaCl), в кварце рудоносных пород Раялампи подтверждает гипотезу о магматической природе рудоносного флюида. Подобные включения характерны для месторождений золота, связанных с интрузивами [17, 19].

Орогенные месторождения характеризуются обилием углекислотных включений, сопровождающих рудоносный этап [15, 20]. Подобные включения зафиксированы во всех исследованных пластинках, наибольшее распространение они имеют в кварце ядерной части зоны рассланцевания проявления Западного Раялампи. Этот факт согласуется с предположением о соответствии поздней золотосодержащей минерализации орогенному типу оруденения.

3. Переход от слабосоленого, содержащего углекислоту и хлорид магния, водного флюида к высокосолёному водному, а затем к водно-углекислотному флюиду свидетельствует о многоэтапной эволюции флюидного режима формирования рудоносных пород Раялампи. Такой тренд изменения характеристик флюида (флюидов) мог явиться результатом последовательного поступления эволюционирующего флюида магматического происхождения и/или смешения двух и более флюидов различной природы.

Авторы выражают благодарность к. г.-м. н. Е. В. Толмачевой, М. В. Стифеевой и другим сотрудникам лаборатории изотопной геологии Института геологии и геохронологии докембрия РАН, а также ведущему лабораторией флюидных процессов ИГГД РАН к. г.-м. н. С. А. Бушмину и ведущему инженеру минерало-

гической группы Г. В. Платоновой за всестороннее содействие в ходе проведения исследований.

Авторы признательны к. г.-м. н. Я. Ю. Бушуеву (Санкт-Петербургский горный университет) за консультации и помощь в проведении исследований самородного золота.

Термодинамические исследования флюидных включений выполнены в рамках НИР лаборатории флюидных процессов ИГГД РАН. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00447.

Литература

1. Борисенко А. С. Изучение солевого состава растворов газово-жидких включений в минералах методом криометрии // Геология и геофизика. 1977. № 8. С. 16—27.
2. Гордон Ф. А. Гидротермально-метасоматические ассоциации и рудоносность северо-восточной части Хаутаваарской структуры (Южная Карелия) // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле Российской академии естественных наук. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2016. № 3. С. 9—19.
3. Гордон Ф. А. Поисковые признаки и предпосылки золотого оруденения северо-восточной части Хаутаваарской структуры: дис. ... канд. геол.-минер. наук: 25.00.11. СПб.; 2017. 136 с.
4. Гордон Ф. А., Дмитриева А. В. Первые результаты исследования условий формирования золотого оруденения центральной части Хаутаваарской структуры по данным изучения флюидных включений (Южная Карелия) // Новое в познании процессов рудообразования: Материалы VIII Рос. молодеж. науч.-практ. школы с междунар. участием. М.: ИГЕМ, 2018. С. 115—117.
5. Дмитриева А. В. Металлогенетическая специализация неархейского умереннощелочного магматизма Центральной Карелии: дис. ... канд. геол.-минер. наук: 25.00.11. Петрозаводск, 2016. 130 с.
6. Дмитриева А. В., Кулешевич Л. В., Вихко А. С. Петрохимические особенности и рудная специализация Хаутаваарского массива (Южная Карелия) // Труды КарНЦ РАН. 2016. № 2. С. 52—72.
7. Кулешевич Л. В., Алексеев И. А., Лавров О. Б., Дмитриева А. В. Золото-редкометалльное рудопоявление Раялампи в Хаутаваарской структуре: закономерности локализации и минералогическо-геохимические индикаторы, Республика Карелия // Руды и металлы. 2018. № 4. С. 54—66.
8. Кулешевич Л. В., Слюсарев В. Д., Лавров М. М. Благороднометалльная минерализация Хаутавааро-Ведлозерской площади // Геология и полезные ископаемые Карелии. 2009. № 12. С. 12—25.
9. Носова А. А., Самсонов А. В., Ларионова Ю. О., Ковальчук Е. В., Ларионов А. Н. Архейский возраст габбро и гранат-биотит-амфибол-кварцевых метасоматитов Au-PGE проявления Виетуккалампи в Хаутаваарской структуре // Золото Фенноскандинавского щита: Материалы международной конференции. Петрозаводск. 2013. С. 131—134.
10. Петровская Н. В. Золотые самородки. М.: Наука, 1993. 191 с.
11. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. М.: Мир, Т. 1. 1978. 360 с.; Т. 2. 632 с.
12. Самсонов А. В., Ларионова Ю. О., Носова А. А., Ручьев А. М. Проблемы возрастной позиции и генезиса золоторудной минерализации в архейских зеленокаменных поя-

сах Карельского блока: опыт комплексных реконструкций // Доклады московского отделения РМО, 2011.

13. Серноколчеданные месторождения Карелии / В. И. Робонен, С. И. Рыбаков, Г. В. Ручкин и др.; отв. ред. В. Н. Сухов. Л.: Наука, 1978. 192 с.

14. Bakker R. J. Package FLUIDS 1. Computer programs for analysis of fluid inclusion data and for modelling bulk fluid properties // Chem. Geol. 2003. V. 194. P. 3–23.

15. Bodnar R. J., Lecumberri-Sanchez P., Moncada D., Steele-MacInnis M. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits // Treatise on Geochemistry. Sec. Edn. 2014. Vol. 13. P. 119–142.

16. Bibikova E. V., Petrova A., Claesson S. The temporal evolution of the sanukitoids in the Karelian Craton, Baltic Shield: an ion microprobe U-Th-Pb isotopic study of zircons / E. V. Bibikova, A. Petrova, S. Claesson // Lithos. 2005. V. 79. P. 129–145.

17. Duuring P. Granitoid-associated orogenic, intrusion-related, and porphyry style metal deposits in the Archean Yilgarn Craton, Western Australia // Ore Geology Reviews 32. 2007. P. 157–186.

18. Groves D. I., Goldfarb R. J., Robert F., Hart C. J. R. Gold deposits in metamorphic belts: overview of current understanding, outstanding problems, future research, and exploration significance // Economic Geology. 2003. V. P. 1–30.

19. Vikent'eva O. V., Prokofiev V. Yu., Gamyranin G. N., Goryachev N. A., Bortnikov N. S. Intrusion-related gold-bismuth deposits of North-East Russia: PTX parameters and sources of hydrothermal fluids // Ore Geology Reviews 102. 2018. P. 240–259. doi: 10.1016/j.oregeorev.2018.09.004.

20. Wilkinson J. J. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits // Lithos. 2001. V. 55. P. 229–272. doi: 10.1016/S0024-4937(00)00047-5.

References

1. Borisenko A. S. *Izuchenie solevogo sostava rastvorov gazovo-zhidkikh vklyuchenii v mineralah metodom kriometrii* (Study of salt composition of solutions of gas-fluid inclusions in minerals by cryometry). *Geologiya i geofizika*, 1977, No. 8, pp. 16–27.

2. Gordon F. A. *Gidrotermal'no-metasomaticheskie associatsii i rudonosnost' severo-vostochnoj chasti Hautavaarskoj struktury (Yuzhnaya Kareliya)* (Hydrothermal-metasomatic associations and ore mineralization in the east-north part of the Khautavaara structure (South Karelia)). *Izvestiya of SB RAS (Earth sciences). Geologiya, poiski i razvedka rudnykh mestorozhdenij* (Geology, search and exploration of ore deposits), 2016, No. 3, pp. 9–19.

3. Gordon F. A. *Poiskovyie priznaki i predposylki zolotogo orudeneniya severo-vostochnoj chasti Hautavaarskoj struktury* (Search signs and background of gold mineralization of the northeastern part of the Hautavaara structure): Dissertation of Cand. Sc. (geology-mineralogy): 25.00.11, St. Petersburg, 2017, 136 pp.

4. Gordon F. A., Dmitrieva A. V. *Pervye rezul'taty issledovaniya uslovij formirovaniya zolotogo orudeneniya central'noj chasti Hautavaarskoj struktury po dannym izucheniya flyuidnykh vklyuchenij (Yuzhnaya Kareliya)* (The first results of the gold ore forming conditions research in the central part of the Hautavaara structure using fluid inclusions study (South Karelia)). *Proceedings of conference, IGEM*, 2018, pp. 115–117.

5. Dmitrieva A. V. *Metallogenicheskaya spetsializatsiya neoarhejskogo umerennoshchelochного magmatizma Central'noj Karelii* (Metallogenic specialization of neoaarchean moderately alkaline magmatism in the Central Karelia): Dissertation of Cand. Sc. (geology-mineralogy): 25.00.11, Petrozavodsk, 2016, 130 pp.

6. Dmitrieva A. V., Kuleshevich L. V., Vihko A. S. *Petrohimicheskie osobennosti i rudnaya spetsializatsiya Hautavaar-*

skogo massiva (Yuzhnaya Kareliya) (Petrochemical features and ore specialization of the Hautavaara Massif (South Karelia)). *Proceedings KarSC RAS*, 2016, No. 2, pp. 52–72.

7. Kuleshevich L. V., Alekseev I. A., Lavrov O. B., Dmitrieva A. V. *Zoloto-redkometall'noe rudoproyavlenie Rajalampi v Hautavaarskoj strukture: zakonomernosti lokalizatsii i mineralogogehimicheskie indikatory, Respublika Kareliya* (Rajalampi gold-rare metal occurrence in the Hautavaara structure, Karelia: localization pattern, mineralogical and geochemical indicators). *Rudy i metally (Ores and metals)*, 2018, No. 4, pp. 54–66.

8. Kuleshevich L. V., Sliusarev V. D., Lavrov M. M. *Blagorodnometall'naia mineralizatsiya Khautavaaro-Vedlozerskoj ploschadi* (Noble-metal mineralization of the Hautavaara-Vedlozero prospect). *Geologiya i poleznye iskopaemye Karelii* (Geology and mineral resources of Karelia). Petrozavodsk: KarSC RAS, 2009, No. 12, pp. 12–25.

9. Nosova A. A., Samsonov A. V., Larionova U. O., Koval'chuk E. V., Larionov A. N. *Arhejskij vozrast gabbro i granat-biotit-amfibol-kvarcevykh metasomatitov Au-PGE proyavleniya Vietukkalampi v Hautavaarskoj strukture* (Archean age of gabbro and garnet-biotite-amphibole-quartz metasomatic rocks from Vietukkalampi Au-PGE occurrence in the Hautavaara structure). *Proceedings of conference, Petrozavodsk*, 2013, pp. 131–134.

10. Petrovskaya N. V. *Zolotyie samorodki* (Native gold). Moscow: Nauka, 1993, 191 pp.

11. Redder E. *Flyuidnye vklyucheniya v mineralah* (Fluid inclusions in minerals). Moscow: Mir, 1978, V. 1. 360 pp., V. 2. 632 pp.

12. Samsonov A. V., Larionova U. O., Nosova A. A., Ruch'ev A. M. *Problemy vozrastnoj pozitsii i genezisa zolotorudnoj mineralizatsii v arhejskikh zelenokamennykh poyasakh Karel'skogo bloka: opyt kompleksnykh rekonstrukcij* (The age position and genesis of gold ore mineralization in the Archean greenstone belts of the Karelian block: the experience of complex reconstructions). *Proceedings of Moscow branch of RMS*, 2011.

13. V. I. Robonen, S. I. Rybakov, G. V. Ruchkin et al. *Sernokolchedannye mestorozhdeniya Karelii* (Pyrite deposits of Karelia). Ed. V. N. Sukhov. Leningrad: Nauka, 1978, 192 pp.

14. Bakker R. J. Package FLUIDS 1. Computer programs for analysis of fluid inclusion data and for modelling bulk fluid properties. *Chem. Geol.*, 2003, V.194, pp.3-23.

15. Bibikova E. V., Petrova A., Claesson S. The temporal evolution of the sanukitoids in the Karelian Craton, Baltic Shield: an ion microprobe U-Th-Pb isotopic study of zircons. *Lithos*, 2005, V. 79, pp. 129–145.

16. Bodnar R. J., Lecumberri-Sanchez P., Moncada D., Steele-MacInnis M. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. *Treatise on Geochemistry. Sec. Edn.*, 2014, V. 13, pp. 119–142.

17. Duuring P. Granitoid-associated orogenic, intrusion-related, and porphyry style metal deposits in the Archean Yilgarn Craton, Western Australia. P. Duuring, K. F. Cassidy, S. G. Hagemann. *Ore Geology Reviews* 32, 2007, pp. 157–186.

18. Groves D. I., Goldfarb R. J., Robert F., Hart C. J. R. Gold deposits in metamorphic belts: overview of current understanding, outstanding problems, future research, and exploration significance. *Economic Geology*, 2003, pp. 1–30.

19. Vikent'eva O. V., Prokofiev V. Yu., Gamyranin G. N., Goryachev N. A., Bortnikov N. S. Intrusion-related gold-bismuth deposits of North-East Russia: PTX parameters and sources of hydrothermal fluids. *Ore Geology Reviews* 102, 2018, pp. 240–259. doi: 10.1016/j.oregeorev.2018.09.004.

20. Wilkinson J. J. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. *Lithos*, 2001, V. 55, pp. 229–272. doi: 10.1016/S0024-4937(00)00047-5

Поступила в редакцию / Received 05.03.2020