ПАЛИНОКОМПЛЕКС СЫНИНСКОЙ СВИТЫ (СРЕДНИЙ ТРИАС) ИЗ ОБНАЖЕНИЙ НА РЕКЕ КЫДЗЬРАСЬЮ (БОЛЬШЕСЫНИНСКАЯ ВПАДИНА, ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ РЕГИОН)

Н. В. Ильина¹, В. А. Жарков²

¹Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
ilyina@geo.komisc.ru

²ВСЕГЕИ, Сыктывкарский сектор, Сыктывкар
vladimir.a.zharkov@gmail.com

Представлены результаты палинологического изучения сынинской свиты (средний триас) в естественных выходах по берегам р. Кыдзьрасью. Дополнительно были привлечены данные по палинологии сынинских отложений из фондовых и опубликованных материалов 1960–1990-х годов.

Показано, что видовой состав палинокомплекса свиты на р. Кыдзьрасью в полной мере соответствует комплексу мiospor *Converrucosisporites conferteornatus* — *Florinites pseudostratus* и определяет среднетриасовый, предположительно ладинский, возраст вмещающих пород. По видовому составу мiospor проведена реконструкция наземной растительности. Сделан вывод о том, что в ладинском веке в пределах территории исследований преобладала флора сильно увлажнённых биотопов.

Ключевые слова: споры и пыльца, сынинская свита, средний триас, Большесынинская впадина, Тимано-Североуральский регион.

PALYNOLOGICAL ASSEMBLAGE OF THE SYNIA FORMATION (MIDDLE TRIASSIC) FROM OUTCROPS AT THE KYDZ'RASYU RIVER, BOL'SHAYA SYNIA DEPRESSION, THE TIMAN-NORTHERN URALS REGION

N. V. Ilyina¹, V. A. Zharkov²

¹Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar

²Federal State Budgetary Institution «A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute», Syktyvkar sector

The results of palynological study of the Synia Formation (Middle Triassic) in outcrops along the Kyzd'rasyu River banks are presented. The published and archival results of previous palynological investigations of the Synia deposits were used as an additional record. It was shown that the species composition of the palynological assemblage (PA) of the Synia Formation on the Kyzd'rasyu River fully corresponded to the PA *Converrucosisporites conferteornatus* — *Florinites pseudostratus* and determined the Triassic, Ladinian, age of the enclosing deposits. The results of reconstruction of the growing vegetation testified to the existence of rich and diverse vegetation in the Ladinian Age on the studied territory, where the flora of highly moistened biotopes prevailed.

Keywords: spores and pollen, Synia Formation, Middle Triassic, Ladinian, the Timan-Northern Urals region.

Введение

Сынинская свита венчает разрез среднего триаса в Большесынинской впадине Предуральского краевого прогиба. История выделения свиты и эволюция суждений о её возрасте подробно изложены в ряде публикаций и суммированы в решениях IV Уральского межведомственного регионального стратиграфического совещания [7, 8].

В полном объёме сынинская свита вскрыта бурением в центральной части впадины. Стратотипическим является разрез скв. 239-Вятка (инт. 420–959 м), парастратотипическим — разрез скв. 202-Мишяг (инт. 466–1046 м). В пределах восточного борта впадины на дневную поверхность вдоль берегов рек и ручьёв бассейна р. Бол. Сыня выходит нижняя часть свиты [2, 5, 10], парастратотипами которой выбраны разрез скв. 230-Сыня в интервале 90–190 м, и обнажения 73 и 72 по В. И. Чалышеву [10] в урочище Красный Камень на р. Бол. Сыня (рис. 1).

В 2014 году в рамках госконтракта № 2/2013 «ГДП-200 листа Q-40-XXIX (Вангыро-Сынинская площадь), составление и подготовка к изданию Гостеолкарты-200 листа Q-40-XXIII (Сынинская площадь)» было проведено геологическое доизучение восточной части Большесынинской впадины с целью составления современной геологической основы для планирования геолого-разведочных работ и оценки перспектив территории на поиски полезных ископаемых. В ходе предполетной подготовки была поставлена задача по оценке перспектив титаноносности триасовых отложений в пределах листа Q-40-XXIX.

О прослоях песчаников, обогащённых магнетитом и гематитом, в ниже- и среднетриасовых породах восточного борта Большесынинской впадины (бызовская свита и основание надкраснокаменной свиты соответственно, в их современном понимании) известно из материалов В. И. Чалышева [10]. Впоследствии было определено, что главным минералом в чёрных прослоях является ильменит. Магнетит содержится в под-

Для цитирования: Ильина Н. В., Жарков В. А. Палинокомплекс сынинской свиты (средний триас) из обнажений на реке Кыдзьрасью (Большесынинская впадина, Тимано-Североуральский регион) // Вестник геонаук. 2021. № 1(313). С. 3—13. DOI: 10.19110/geov.2021.1.1.

For citation: Ilyina N. V., Zharkov V. A. Palynological assemblage of the Synia Formation (Middle Triassic) from outcrops at the Kyzd'rasyu River, Bol'shaya Synia Depression, the Timan-Northern Urals region. Vestnik of Geosciences, 2021, 1(313), pp. 3—13, doi: 10.19110/geov.2021.1.1.

Рис. 1. Обзорная карта района исследований. Обнажения № 66–84 по [9]. Обнажения № 1136–1146, из которых В. А. Жарковым отобраны пробы на палинологический анализ (ГДП-200 листа Q-40-XXIX (Вангыро-Сынинская площадь, 2014))

Fig. 1. Map of the study area and location of the sampled outcrops. Outcrops No. 66–84 after [9]. Outcrops No. 1136–1146, where V. A. Zharkov sampled for palynological analysis (ASE-200 of sheet Q-40-XXIX (Vangyro-Syninskaya area, 2014))

чинённых количествах, но его присутствие повышает значения магнитной восприимчивости вмещающих пород, что позволяет проследить потенциально продуктивные слои с помощью магнитометрических методов.

Повышенные концентрации ильменита в нижнетриасовых отложениях Северного и Приполярного Предуралья были определены и в ходе геолого-съёмочных работ масштаба 1:200 000 (отчёты Грибанова, Проскурина, 1958; Муравьева и др., 1962, 1963)¹. Содержания ильменита, близкие к минимальным промышленным, установлены в керне поисковых скважин, пройденных в районе д. Бызовой на правом берегу р. Печоры (отчет Костюшко, 1964)². Высокие (до 100 кг/м³) содержания ильменита были установлены в ходе ГДП-200 в пробах из буро-сероцветных песчаников, выходящих на дневную поверхность по берегам реки Кыздарьсяю (обн. 1136 и 1137 на рис. 1). Эти выходы находятся в поле развития нерасчленённых среднетриасовых отложений [10] и трассируются полями отрицательных аномалий магнитного поля (рис. 2).

Для уточнения стратиграфического положения и возраста буро-сероцветных пород, перспективных на поиски ильменита, В. А. Жарковым были опробованы триасовые отложения в обнажениях по берегам рр. Бол. Сыня, Кыздарьсяю и руч. Вёртный. Предполагалось, что определение стратиграфического положения и фациальных условий формирования известных продуктивных образований поможет в выборе участков для постановки детальных работ.

Ниже приведены результаты исследований по определению стратиграфического положения титаносодержащих горизонтов, их возраста и фациальных условий формирования на р. Кыздарьсяю.

¹Геологическое строение северной части листа О-40-XXIX: Отчёт Верхне-Сынянской партии №187 по работам 1957 г. / ГБУ РК «ТФИ РК». Воркута, 1958. Отв. исполн. Б. В. Грибанов, Г. Ф. Проскурин. Геологическое строение территории северной части листа Q-40-XXVIII: Отчёт Печорской ГПСР за 1961–62 гг. / ГБУ РК «ТФИ РК». Казань, 1962. Отв. исполн. И. С. Муравьёв, Л. А. Кузнецова, Б. В. Буров. Геологическое строение восточной части листа Р-40-IV: Отчёт Вуктыльской ГПСР за 1962 г. / ГБУ РК «ТФИ РК». Казань, 1963. Отв. исполн. И. С. Муравьёв, Л. А. Кузнецова и др.

²Отчёт о поисковых работах на триасовые россыпи титана в Печорском районе Коми АССР. Район среднего течения р. Печоры: Отчёт Бызовской поисковой партии за 1963–64 гг. / ГБУ РК «ТФИ РК». Ухта, 1964. Отв. исполн. В. И. Костюшко.

Литологическое строение и палеонтологическая характеристика сынинской свиты

Сынинскую свиту составляют песчаники буро-сероцветные с подчинёнными прослоями алевролитов и серых глин. В песчаниках установлены линзовидные прослои известкового песчаника, железисто-карбонатные и пиритовые конкреции, прослои угля и углистых глин, многочисленные растительные остатки.

Стратотип нижней части свиты в пределах восточного борта Большесынинской впадины, в обн. 73 и 72 на р. Бол. Сыня (по В. И. Чалышеву [10]) имеет следующее строение (снизу вверх).

Обн. 73. 1. Переслаивание серых и зеленовато-серых алевролитов и глин с редкими прослойками мелкозернистых песчаников мощностью около 20 м. В серых глинах найдены остатки листовой флоры.

2. Линза неотсортированного ожелезненного песчаника с обильными остатками рыб, единичными фрагментами наземных позвоночных, двустворками, гастроподами, с листовой флорой, мощностью до 0.3 м.

3. Породы, аналогичные слою 1, мощностью 20 м. Выше залегает слой крепкого известкового песчаника с мелкой крестчатой слоистостью типа крестчатой слоистости прибрежного мелководья с четко выраженной волноприбойной рябью на поверхностях напластования. Песчаник перекрыт серыми тонкослоистыми глинами с присыпками тонкозернистого песка по плоскостям напластования и редкой чешуёй ганоидных рыб. Мощность слоя около 30 м.

4. Толща средне- и мелкозернистых песчаников серого, зеленовато-серого, чаще желтоватого от ожелезнения цвета. Вся толща песчаников складывается косо-горизонтально-слоистыми сериями мощностью около 1 м. Крестчатая слоистость диагональная и перекрестная. Крестчатые серии по простиранию не выдержаны, залегают в виде крупных клиньев и линз различной протяжённости. На подстилающих сериях залегают с размывом. Песчаники крестчатых серий с глинистой галькой, углефицированными обломками древесины. Для песчаников верхней части толщи характерна более спокойная горизонтальная слоистость. По всей толще наблюдаются прослойки, обогащённые растительным детритом. Мощность около 50 м.

Обн. 72. 5. Ритмичное чередование алевролитов и глин с двумя прослоями мелкозернистых песчани-

Рис. 2. Участок исследования на карте модуля полного горизонтального градиента аномального магнитного поля масштаба 1:200000, лист Q-40-XXIXX (2013 г.). Указаны номера и местонахождение известных обнажений песчаников с повышенными содержаниями ильменита

Fig. 2. Study area on the map of the full horizontal gradient of the anomalous magnetic field at a scale of 1:200000, sheet Q-40-XXIXX (2013). The numbers and locations of known sandstone outcrops with elevated ilmenite contents are indicated

ков мощностью 2.7 и 2.0 м, содержащих редкие песчано-пиритовые конкреции. В верхней части слоя отмечен тонкий прослой углистого сланца. Найдены остатки флоры. Мощность 20 м.

По мнению В. И. Чалышева, формирование охарактеризованных отложений происходило в прибрежных условиях крупного водного бассейна [10]. Можно предположить, что, скорее всего, осадконакопление происходило в условиях верхней литорали и дельты, о чём говорят следующие признаки:

- существенно песчаные породы, подчинённое значение алевролитов и глин;
- песчаники мелкозернистые, мелко- и среднезернистые, прослоями с известковым цементом, с кошой и горизонтальной слоистостью, с глинистой галькой, песчано-пиритовыми конкрециями;
- прослойки углистого сланца и прослойки с растительным детритом;
- углефицированные обломки древесины.

Предположение, высказанное В. И. Чалышевым, поддерживают данные по остаткам тетрапод. Их местонахождение в слое 2 обнажения 73 могло быть сформировано в волноприбойной зоне крупного водного бассейна. Остатки наземных позвоночных представлены неполной ключицей и зубом лабиринтодонта (земноводные). Они слегка окатаны и имеют чёрный цвет, который свидетельствует о восстановительной среде захоронения. Тонкослоистые глины с чешуёй рыб слоя 3 накапливались, вероятно, в условиях относительно глубоководной части бассейна. Определена принадлежность чешуи к палеонискам, лучепёрым ганоидным рыбам, обитавшим в морских и пресноводных бассейнах [7]. Всё вместе позволяет говорить о формировании нижней части сынинской свиты в условиях частой смены водного режима.

На основании фаунистических находок, а также по результатам палинологических исследований (определения Л. М. Варюхиной [10]) эта часть разреза была отнесена В. И. Чалышевым к верхнему триасу [10]. Впоследствии эта датировка была пересмотрена по следующим данным.

Остатки тетрапод в обнажении 73 были определены как *Labyrinthodontia* gen. indet., то есть до подкласса,

остатки рыб — как *Palaeonisci* gen. indet., то есть до отряда. Единичные двустворчатые моллюски из основания свиты (обн. 73) и верхней её части (скв. 202-Мишаяг, глуб. 595.5 м) представлены новым видом *Paleonodularia tshernyschovii* Ch. Kol., а также формами широкого стратиграфического дипазона *Pseudocardinia* sp. и *Anodontophora* sp., определёнными в открытой номенклатуре. Основой для определения возраста такие данные служить не могут.

Многочисленные остатки листовой флоры принадлежат комплексу «сцитифилловой» флоры и определяют ладинско-карнийский возраст вмещающих отложений [1].

Миоспоры из сынинских отложений были изучены наряду с Л. М. Варюхиной палинологами В. С. Дунаевой, О. П. Ярошенко, Л. П. Ильиной и Н. В. Ильиной [3].

В. С. Дунаева в скв. 230-Сыня и О. П. Ярошенко в скв. 202-Мишаяг определили среднепозднетриасовый возраст свиты. Л. П. Ильиной и Н. В. Ильиной сынинские отложения изучены в скважинах 239-Вятка, 202-Мишаяг, 233-Сыня, 238-Субор и в обнажениях на р. Бол. Сыня. Было установлено, что свита охарактеризована палинокомплексом (ПК), известным в литературе как ПК *Converrucosisporites conferteornatus* — *Florinites pseudostratus*, который определяет ладинский возраст вмещающих отложений [3, 8, фондовые материалы]. Эта датировка и была принята за основу.

Буро-сероцветные отложения по берегам р. Кыдзьрасью отнесены В. И. Чалышевым к среднему триасу [10]. Литологический состав пород приведён по описаниям В. И. Чалышева с дополнениями из первичных материалов ГС-200 1957–1964 гг. и ГДП-200 2013–2015 гг.

Отметим, что слабая обнажённость наряду с пологими залеганиями слоёв и отсутствием уверенных маркирующих горизонтов очень затрудняют корреляцию и сопоставление разрезов отдельных обнажений между собой.

Обн. 83 (1136) и 1137. Слой 1. Песчаники кварцевые, желтовато-бурые, сильно ожелезнённые, слабоцементированные, слюистые, с тонкими прослоями красновато-бурых песчаников, сцементированных железистым веществом. Мощность 6 м. В средней части

обнаружен чёрный линзовидный прослой мощностью до 15 см и видимой длиной 4 м, обогащённый ильменитом (естественный шлик). В нижней части разреза встречен обломок ствола окремнённого дерева диаметром около 10 см и длиной свыше 1 м.

Слой 2. Конгломерат мелкогалечный, сильно оже-
лезнённый, слабосцементированный грубозернистым
песком, переслаивающийся с крупногалечным конгло-
мератом. Мощность 2 м.

Выше лежат кайнозойские суглинки, желтовато-
серые, плотные, песчанистые, с угловато-окатанным
гравийно-галечным материалом и редкими небольшо-
ми валунами. Мощность 6,5–7 м.

Обн. 84 (1141). Слой 1. Песчаники желтоватые, сла-
босцементированные, в верхней части с прослоем пес-
чаника более крепкого, среднезернистые, горизонталь-
но- и косослоистые, с тонкими прослойками тонкозер-
нистых и тонкослоистых песчаников и песчаных глин с
растительными остатками, с прослойками угля чёрно-
го, блестящего, хрупкого. Мощность около 3 м.

Слой 2. Пачка серых тонкослоистых сильносло-
дистых песчаников, в верхней части с тонкими про-
слойками песчаных глин, в нижней — с прослоем
крепкого песчаника, представляющего собой, вероят-
но, тот же прослой, что и в слое 1. В нижней и средней
частях отмечаются многочисленные остатки растений.
Мощность около 4 м.

Слой 3. Необнажённый промежуток между обн. 84
и 85 около 160 м.

Обн. 85 (1142). Слой 4. Песчаники среднезерни-
стые, бурые в результате ожелезнения представляют
собой несколько косослоистых серий мощностью до
1 м. В нижней части песчаники сравнительно проч-
но сцементированные, сильно ожелезнённые. Здесь
же встречаются конкреции и линзы песчаника, секу-
щие косую слоистость, более прочно сцементирован-
ные. В нижнем по течению реки конце обнажения в
песчаниках отмечаются линзы различной величины,
состоящие из обломков, иногда очень крупных, зе-
леноцветных и сероцветных глинистых пород. Под
обнажением найден сульфидный желвак сложной
формы, длиной до 5 см. Мощность слоя около 15 м.
Представляется, что обломки зеленоцветных, серо-
цветных и реже пестроцветных глинистых пород при-
надлежат подстилающим среднетриасовым же отло-
жениям, то есть перемывались пестроцветы ниже-
лежащей надкраснокаменной свиты (в современном
её понимании, по [3]).

Обн. 1143 сложено пологозалегающими переслаи-
вающимися песчаниками горизонтально- и косослои-
стыми, буроватыми, слабосцементированными, види-
мой мощностью до 6 м.

Обн. 79. Слой 5. В самом верхнем по течению реки
конце обнажения выходит 2-метровая пачка желтова-
тых, сильно ожелезнённых песчаников, в нижней ча-
сти среднезернистых, а в верхней — мелкозернистых.
Выше залегает слой, состоящий из крупных обломков
глинистых сероцветных пород, который в самом ниж-
нем по течению реки конце обнажения покрывается
песчаниками, аналогичными всем вышеописанным
песчаникам. Мощность от 2 до 10 м.

Слой 6. Необнажённый промежуток между обна-
жениями 79 и 80 около 50 м.

Обн. 80 (1144). Слой 7. В основании — мелкозер-
нистый тонкослоистый песчаник, выше — глинисто-
песчаная сильноожезнённая порода с мелкими кар-
бонатными конкрециями и с обрывками растений пло-
хой сохранности. Мощность около 3 м.

Слой 8. Необнажённый промежуток между обна-
жениями 80 и 81 около 50 м.

Обн. 81. Слой 9. Песчаники зеленовато-серые и
желтоватые от ожелезнения, невыветрелые, голубова-
того цвета, средне- и мелкозернистые, горизонтально-
слоистые. Мощность 30 м.

Слой 10. Алевриты зеленовато-серые с бурова-
тыми пятнами. Мощность 1,6 м.

Слой 11. Необнажённый промежуток между обна-
жениями 81 и 82 около 50 м.

Обн. 82. Слой 12. Песчаники зеленоватого цвета,
сильноглинистые, тонкозернистые, мощностью око-
ло 4 м.

Слой 13. Необнажённый промежуток около 8 м.

Слой 14. Песчаники, аналогичные слою 12, выше
переходящие в зеленоватые алевриты. Мощность
около 6 м.

Обн. 1145. Голубовато-серые алевропесчани-
ки видимой мощностью 6 м, обнажающиеся у уреза
воды в левом борту р. Бол. Сыня, в 850 м ниже устья
р. Кыдзьрасью. Здесь же найдены сульфидные желва-
ки и стяжения, очень похожие на таковые из обна-
ний 84 (1141) и 1137.

Приведённое макроописание песчано-глини-
стых отложений берегов р. Кыдзьрасью позволяет,
по нашему мнению, уверенно сопоставить их с по-
родами, слагающими стратотипические разрезы сы-
нинской свиты р. Бол. Сыня и предположить, что
их формирование происходило в тех же условиях, а
именно в условиях верхней литорали и дельты древ-
ней реки. Водный бассейн располагался, вероятно,
несколько северо-западнее. Но для проведения де-
тального фациального анализа фактического мате-
риала недостаточно.

Материалы и методы

На палинологический анализ были отобраны семь
образцов из обнажений 84 (1141), 85 (1142), 80 (1144)
и 1145 (рис. 1). Техническая обработка образцов про-
ведена в ЦКП «Геонаука» по стандартной методике
ВСЕГЕИ [6]. Палиномацераты изучены на световом
биологическом микроскопе «Биолам-И». Насыщенные
миоспорами палиноспектры получены из двух образ-
цов обнажения 84 (1141), в остальных миоспоры бы-
ли немногочисленны. Изученные образцы хранятся в
лаборатории стратиграфии Института геологии ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН.

Реконструкция растительного покрова по резуль-
татам палинологических исследований проведена по
[11, 12] и с привлечением данных по палинологии три-
асовых отложений Бореальной и Тетической областей,
опубликованных в последние годы [4, 13, 15, 16, 18–
21 и др.]. На основе анализа видового состава выяв-
ленного комплекса миоспор с помощью метода эко-
групп спороморф по [11, 14–17, 19, 20 и др.] были по-
лучены данные об условиях произрастания материн-
ских растений.

Результаты палинологических исследований

Палинокомплекс (ПК) из сынинских отложений на р. Кыдзрасью по составу входящих в него миоспор в полной мере соответствует комплексу миоспор, известному в литературе как ПК *Converrucosporites conferteornatus* — *Florinites pseudostratus*, который определяет ладинский возраст вмещающих отложений [3, 4, 9, 13, 16, 18, 19, 21 и др.].

Первой характерной чертой кыдзрасьюского ПК является количественное преобладание пыльцы над спорами (табл. 1). Второй чертой является присутствие нескольких групп миоспор.

К первой группе отнесены формы широко-стратиграфического диапозона, транзитом проходящие из нижнего триаса в верхний: это пыльца родов *Alisporites*, *Cedripites*, *Chordasporites*, *Cycadopites*, *Ephedripites*, *Falcisporites*, *Gnetaceapollenites*, *Pinuspollenites*, *Piceapollenites*, *Platysaccus*, *Striatoabieites*, *Sulcatisporites*, *Vitreisporites* и споры родов *Apiculatisporites*, *Aratrisporites*, *Calamospora*, *Carnisporites*, *Cyclotriletes*, *Cyathidites*, *Deltoidospora*, *Dictyophyllidites*, *Nevesisporites*, *Osmundacidites*.

Во вторую группу объединены таксоны, составляющие основу среднетриасовых комплексов миоспор. Немногочисленные экземпляры некоторых из них появляются в самых верхах нижнего триаса. В изученном ПК они представлены спорами родов *Converrucosporites*, *Duplexisporites*, видами *Camarozonosporites rudis* и *Lycopodiacidites kuepperi* и пыльцой родов *Accinctisporites*, *Florinites*, *Minutosaccus*, *Podocarpidites*, *Protodiploxypinus*, *Triadispora*, *Votziaceasporites*. Другую часть группы составляют таксоны, появление которых в комплексах миоспор связано с анизийским веком: это споры *Baculatisporites comaumensis*, *Convolutispora* sp., *Microreticulatisporites* sp. и пыльца *Araucariacites* sp., *Chasmatosporites* spp., *Colpectopollis ellipsoideus*, *Eucommiidites* sp., *Ovalipollis pseudoalatus*, *Samaropollenites speciosus*, *Stellapollenites thiergartii*, *Succinctisporites grandior*, *Quadraeculina anellaeformis*. Все перечисленные выше миоспоры переходят в комплексы миоспор ладинского и поздне-триасового возраста.

Из миоспор, появление которых связано с ладинским веком, в кыдзрасьюском ПК определены споры *Tigrisporites halleinis* и *Polypodiisporites* sp. и пыльца *Heliosaccus dimorphus*.

Два единичных экземпляра миоспор, найденных в кыдзрасьюском ПК, следует выделить особо: это споры *Retitriletes* cf. *clavatooides* и пыльца *Dipterella oblatinoides*. Вид *R. clavatooides* первоначально был описан из юрских отложений, известен из верхнетриасовых, рэтских, отложений Западной Европы. Находки этого вида в породах среднего триаса нуждаются в дополнительной проверке, так как его присутствие в кыдзрасьюском ПК может быть обусловлено привнесением поверхностными водами по трещинам из размывов в кайнозойскую эру юрских глин, блоки которых описаны среди мореноподобных суглинков в обрывах рр. Вёртный и Мал. Аранец. Вид *D. oblatinoides* первоначально также был описан из юрских отложений, в верхнем триасе встречается нечасто. Его находка в ПК ладинского возраста может быть неслучайной. Вид *D. oblatinoides* был определен в ПК из местонахождения тетрапод фауны *Mastodonsaurus* в букобайской свите Южного

Приуралья [3, 4, 9, 13, 18, 20 и др.]. Полный список видовых определений приведен в приложении.

Палеоботанические реконструкции

Многочисленные остатки листовой флоры из среднетриасовых пород Большесынинской впадины включены специалистами в список флоры, единый для средне-, верхнетриасовых отложений Тимано-Североуральского региона в целом, так как различия в таксономическом составе макроостатков не существенны и по латерали и по вертикали [1]. По И. А. Добрускиной, в комплексе макрофлоры ведущее положение занимают гинкгофиты, птеридоспермы, членистостебельные, в меньшем количестве представлены папоротники, еще меньше цикадофитов и хвойных.

Видовой состав миоспор кыдзрасьюского ПК позволяет предположить существование в ладинском веке более разнообразной растительности на характеризующейся территории. Авторами проведена реконструкция растительного покрова изученной территории по [11, 12, 15, 16, 19, 20 и др.]. Список флоры дополнили мохообразные, плауновидные и гнетовидные (см. таблицу, рис. 3). Изменился и список ключевых групп. В количественно преобладающей пыльцевой части кыдзрасьюского ПК доминирующей оказалась двухмешковая пыльца, продуцентами которой были хвойные. Немного меньше в ПК пыльцы, которую могли продуцировать как хвойные, так и птеридоспермы. В подчинённом объёме присутствует пыльца собственно птеридоспермов, ещё меньше пыльцы гинкгофитов, цикадофитов, гнетовидных. В споровой части преобладают споры папоротников, значительно меньше спор плауновидных, споры членистостебельных и мохообразных — в подчинённом положении (рис. 3).

Условия произрастания растений-продуцентов реконструированы на основе анализа видового состава

Рис. 3. Количественное распределение миоспор палинокомплекса сынинской свиты из обнажений на р. Кыдзрасью по их ботанической принадлежности [по 11, 12, 15, 16, 19, 20 и др.]:

1 — мохообразные, 2 — плауновидные, 3 — папоротники, 4 — членистостебельные, 5 — птеридоспермы, 6 — хвойные, птеридоспермы, 7 — хвойные, хвойные (?), 8 — цикадовые, 9 — цикадовые, гинкговые, беннетитовые, птеридоспермы, 10 — гнетовидные, 11 — недифференцированные голосеменные.

Fig. 3. Miospore composition in the palynological assemblage of the Synya Formation from outcrops on the Kyzd'ras'yu River, plotted quantitatively on the basis of their botanical affinity [after 11, 12, 15, 16, 19, 20, etc.]:

1 — bryophytes, 2 — lycopsids, 3 — ferns, 4 — sphenophytes, 5 — pteridosperms, 6 — conifers, pteridosperms, 7 — conifers, ?conifers, 8 — cycads, 9 — cycads, ginkgo, bennetitales, pteridosperms, 9 — gymnosperms undifferentiated

Распределение миоспор палинокомплекса сининской свиты из обнажения на реке Кыдзьрасью по их ботанической принадлежности и экогруппам, с заметками о среде обитания [по 11, 12, 14–17, 19, 20 и др.]

Species composition, botanical affinity and ecogroups of miospores in the palynological assemblage of Synya Formation from the outcrop on the Kyzd'rayu River, with environmental remarks [after 11, 12, 14–17, 19, 20, etc.]

Ботаническая принадлежность миоспор (количество экземпляров) Botanical affinity, the number of specimens is indicated in brackets	Видовой состав миоспор (количество экземпляров) Species composition of miospores, the number of specimens is indicated in brackets	Экогруппы миоспор Sporomorph EcoGroups	Среда обитания Habitat
мохообразные (3) Bryophytes (3)	<i>Nevesisporites</i> spp. (2)	влажные низины, речные берега Lowland wet, River	напочвенный покров, болото ground cover, mire
	<i>Retitriteles</i> cf. <i>clavatooides</i> (1)		не установлена unknown habit
плауновидные (23) Lycopods (23)	<i>Aratrisporites</i> spp. (17)	прибрежные области, Coastal	не установлена unknown habit
	<i>Carnisporites</i> spp. (4)	влажные низины, речные берега Lowland wet, River	не установлена unknown habit
	<i>Camarozonosporites rudis</i> (2)	речные берега River	напочвенный покров, болото, ground cover, mire
папоротники (63) Ferns (63)	<i>Apiculatisporites</i> sp. (5)	влажные низины Lowland wet	не установлена unknown habit
	<i>Baculatisporites comaumensis</i> (1) <i>Osmundacidites</i> sp. (6)		торфяные и лесные болота, peat and forest bogs
	<i>Converrucosisporites cameroni</i> (5)		напочвенный покров, болото
	<i>Polypodiisporites</i> sp. (1)		эпифиты epiphytes
	<i>Lycopodiacidites kuepperi</i> (4)	речные берега River	не установлена unknown habit
	<i>Cyclotriteles</i> sp. (1)	речные берега River	не установлена unknown habit
	<i>Duplexisporites gyratus</i> (12)	прибрежные области Coastal	берега крупных водоемов, морских лагун, прибрежные болота large water bodies and sea lagoons shores, marshes
	<i>Cyathidites</i> spp. (4) <i>Deltoidospora</i> sp. (2) <i>Dictyophyllidites</i> spp. (17)	сухие низины Lowland dry	подлесок, болото, сухие участки understory, mire, drier patches
	<i>Convolutispora</i> sp. (1)	речные берега River	не установлена unknown habit
	<i>Microreticulatisporites</i> sp. (1)	не установлена not attributed	не установлена unknown habit
членистостебельные (7) Sphenophytes (7)	<i>Tigrisporites halleinis</i> (3)	не установлена not attributed	не установлена unknown habit
	<i>Calamospora</i> sp. (7)	речные берега River	напочвенный покров, болото, берега рек ground cover, mire, river banks
птеридоспермы (16) Seed ferns (16)	<i>Falcisporites</i> spp. (3)	? внутренние области ? Hinterland	лесной покров canopy
	<i>Sulcatissporites</i> spp. (8)	речные берега River	не установлена unknown habit
	<i>Vitreisporites pallidus</i> (5)	низменность с разной степенью увлажненности Lowland wetter or drier	дельты, поймы, торфяные болота deltaic environments, floodplain, backswamp peats

хвойные, птеридоспермы (74) Conifers, seed ferns (74)	<i>Alisporites</i> spp. (56)	прибрежные области/ влажные низины/ ? внутренние области Coastal/ Lowland wet/ ? Hinterland	мангровые заросли устьев рек, болото, верхний ярус леса mangrove thickets along river mouth, mire, upper canopy
	<i>Platysaccus</i> spp. (10)	прибрежные области Coastal	не установлена unknown habit
	<i>Chordasporites</i> spp. (7)	внутренние области Hinterland	лесной покров canopy
	<i>Striatoabieites aytugii</i> (1)		не установлена unknown habit
хвойные (92) Conifers (92)	<i>Araucariacites</i> sp. (8)	прибрежные области Coastal	верхний ярус леса upper canopy
	<i>Florinites</i> spp. (14)		заросли, подобные камышовым, на дельтовой равнине reed-like vegetation on delta plain
	<i>Protodiploxylinus</i> spp. (17)	прибрежные области/ пионерная флора Coastal/Pioneers	прибрежные мангровые заросли coastal mangrove-like habit
	<i>Ovalipollis pseudoalatus</i> (7) <i>Piceapollenites</i> sp. (11) <i>Pinuspollenites</i> sp. (8) <i>Podocarpidites</i> spp. (8) <i>Triadispora obscura</i> (1) <i>Voltziaceasporites</i> spp. (5) <i>Quadraeculina anellaeformis</i> (1)	внутренние области Hinterland	не установлена unknown habit
	<i>Cedripites</i> sp. (2) <i>Dipterella oblatinoides</i> (1) <i>Minutosaccus</i> spp. (4) <i>Samaropollenites speciosus</i> (2) <i>Stellapollenites thiergartii</i> (1) <i>Succinctisporites grandior</i> (2)	? внутренние области ? Hinterland	не установлена unknown habit
цикадовые (4) Cycads (4)	<i>Chasmatosporites</i> spp. (3)	сухие низины Lowland dry	верхний ярус леса, болото upper canopy, mire
	<i>Eucommiidites</i> sp. (1)		лесной покров canopy
цикадовые, гинкговые, беннетитовые, птеридоспермы (6) Cycads, ginkgos, bennettitales, seed ferns (6)	<i>Cycadopites</i> sp. (6)	сухие низины Lowland dry	верхний ярус леса, болото, сухие участки upper canopy, mire, drier patches
гнетовидные (6) Gnetophytes (6)	<i>Gnetaceapollenites</i> sp. (3)	? влажные низины ? Lowland wet	не установлена unknown habit
	<i>Ephedripites</i> sp. (3)	? сухие низины/?внутренние области ?LD/?HL	
недифференцированные голосеменные (6) Gymnosperms undifferentiated (6)	<i>Heliosaccus dimorphus</i> (3)	сухие низины Lowland dry	не установлена unknown habit
	<i>Accinctisporites</i> sp. (2) <i>Colpectopollis ellipsoideus</i> (1)	не установлена not attributed	не установлена unknown habit

Рис. 4. Количественное распределение миоспор палинокомплекса сининской свиты из обнажений на р. Кыдзьрасью по экогруппам [по 11, 14–17, 19, 20 и др.]:

1 — влажные низины и влажные низины/речные берега, 2 — речные берега, 3 — прибрежные области, прибрежные области/пионерная растительность, прибрежные области/влажные низины/внутренние области (?), 4 — сухие низины и сухие низины (?)/внутренние области (?), 5 — внутренние области, 6 — миоспоры с неустановленной принадлежностью какой-либо экогруппе

Fig. 4. Miospore composition in the palynological assemblage of the Synya Formation from outcrops on the Kydz'rasyu River, plotted quantitatively on the basis of their assignment to the sporomorph ecogroups [after 11, 14–17, 19, 20, etc.]:

1 — Lowland wet and Lowland wet/River, 2 — River, 3 — Coastal, Coastal/Pioneers, Coastal/Lowland wet/?Hinterland, 4 — Lowland dry and ?Lowland dry/?Hinterland, 5 — Hinterland, 6 — miospores, not attributed to any ecogroup

кыдзьрасьюского ПК с помощью метода экогрупп спороморф (SEG-analysis) [11, 14–17, 19 20 и др.]. В основу метода положен принцип актуализма. Первоначально метод разработан для позднелюрской — раннемеловой эпох, но позднее был адаптирован к триасовому периоду [11, 16].

По установленной ботанической принадлежности и условиям произрастания материнских растений миоспоры кыдзьрасьюского ПК собраны в несколько экогрупп, характеризующих определённый тип растительности [по 11, 15, 16, 19, 20 и др.]:

1) пионерная растительность — сообщество прибрежных растений-первопроходцев нестабильной окружающей среды за приливно-отливной зоной мангровых зарослей;

2) прибрежная растительность — сообщество растений прибрежной равнины или вдоль береговой линии участков, не затопленных морем, но испытывающих его воздействие;

3) сухие низины — пойменные сообщества, произрастающие на территории, заливаемой время от времени пресными водами;

4) влажные низины — сообщество пойменных террас, болот, озёр;

5) речные берега — сообщество растений, населяющих речные берега;

6) внутренние области — сообщество растений горной, холмистой местности; местности, удалённой от береговой линии; местности с низким уровнем грунтовых вод, никогда не затопляемой.

Распределение миоспор кыдзьрасьюского ПК по экогруппам показано в таблице и проиллюстрировано рисунком 4, из которых следует, что в изученном ПК преобладают миоспоры растений влажных биотопов и

гораздо меньше миоспор растений, населявших сухие низины и внутренние области.

Мохообразные изученного ПК населяли влажные низины и берега рек. Среди плауновидных преобладают споры растений прибрежных областей водных бассейнов, формировавших береговые мангры.

Триасовые папоротники в целом являются индикатором тёплого (субтропического и тропического) и влажного климата. Основная часть папоротников на территории исследований заселяла влажные низины, берега рек, прибрежные области, а папоротники семейств Dipteridaceae и Cyatheaceae (споры *Cyathidites*, *Deltoidospora*, *Dictyophyllidites*) формировали, вероятно, нижний ярус лесов сухих низин.

Членистостебельные росли по берегам рек и озёр, на болотистых участках поймы.

Птеридоспермы в целом были экологически пластичными растениями и обитали в разных условиях. Произраставшие на территории исследований были в основном любителями влажных биотопов. В частности, группу кейтониювых, продуцировавших пыльцу *Vitreisporites*, многие авторы рассматривают в роли индикаторов тёплых и очень влажных обстановок.

В группе пыльцы, которую могли продуцировать как птеридоспермы, так и хвойные, велико содержание зёрен *Alisporites*. Специалисты предполагают, что их продуцентами, возможно, были крупные кустарники, формировавшие мангровые заросли вдоль устьев рек, затопляемых приливами [11].

Хвойные растения населяли преимущественно территории с холмистым рельефом и территории, удалённые от побережья, но растения, продуцировавшие пыльцу *Protodiploxypinus*, вероятно, были обитателями прибрежных территорий и мангровоподобных лесов.

Гинкофиты и цикадофиты населяли сухие равнинные территории. Для гнетовидных нами принято предположение об условиях их обитания по аналогии с современными представителями, имеющими ограниченные ареалы: гнетум распространён в тропических областях, эфедра — в засушливых областях, на склонах гор.

Из вышеизложенного следует, что в сининское время в условиях тёплого и очень тёплого гумидного климата на территории исследований произрастала разнообразная растительность, пышная и влаголюбивая. Сининская флора, по-видимому, формировалась в пределах прибрежной области крупного водного бассейна с дельтами, лиманами, мангровоподобными зарослями и прилегающей влажной низменной равниной с заболоченными участками, озёрами и болотами (рис. 5).

В кыдзьрасьюском ПК большая часть двухмешковой пыльцы является продуктом растений влажных биотопов и только 21 % — растений, населявших внутренние области. Так как растения — источники двухмешковой пыльцы обладают высокой репродуктивной способностью, а основным способом транспортировки пыльцы является перенос ветром, то присутствие пыльцы растений удалённых территорий в изученном ПК может быть результатом пылевых дождей.

Заключение

Таким образом, изученные по берегам р. Кыдзьрасью буро-сероцветные песчано-глинистые отложения

Рис. 5. Реконструкция предполагаемого пространственного распределения экогрупп миоспор сининской свиты из обнажений на реке Кыдзрасью [по 11, 14–17, 19, 20 и др.]. Экогруппы флоры: 1 — пионерной, 2 — прибрежной, 3 — влажных низин, 4 — речных берегов, 5 — сухих низин, 6 — внутренних областей

Fig. 5. Reconstruction of the hypothetical spatial distribution of sporomorph ecogroups of the Synya Formation from outcrops on the Kyzdrasyu River [after 11, 14–17, 19, 20, etc.]. Sporomorph Ecogroups: 1 — Pioneers, 2 — Coastal, 3 — Lowland wet, 4 — River, 5 — Lowland dry, 6 — Hinterland

с горизонтально- и косослоистыми сериями, с прослоями более крепких песчаников, с прослоями и линзами из обломков глинистых пород, с тонкими прослойками тонкозернистых и тонкослоистых песчаников и песчаных глин с растительными остатками и обломками углефицированной и окремнённой древесины, прослойками и линзочками углей, несомненно, относятся к сининской свите. Формировались они на р. Кыдзрасью, так же, как и отложения на р. Бол. Сыня, в условиях дельты древней реки и верхней литорали водного бассейна, который располагался, вероятно, немного к северо-западу.

Палинокомплекс сининской свиты из её естественных выходов на р. Кыдзрасью по видовому составу в полной мере соответствует комплексу миоспор *Converrucosporites conferteornatus*—*Florinites pseudostratus*, определяющему ладинский возраст вмещающих пород, а также комплексам миоспор из отложений ладинского яруса, датированных фауной аммоноидей.

Результаты палинологического анализа указывают на существование в ладинском веке на изученной территории богатой и разнообразной растительности, в которой преобладала флора сильно увлажнённых биотопов. Реконструкция условий произрастания растений-продуцентов показала, что они представляли собой прибрежную область крупного водного бассейна с дельтами, лиманами и зарослями типа современных мангровых и прилегающую влажную низменную равнину с заболоченными участками, болотами и озёрами. Такая картина согласуется с заключением о формировании сероцветной толщи на р. Кыдзрасью в условиях дельты и верхней литорали и косвенно соотносится с данными по предполагаемым условиям захоронения остатков тетрапод в обн. 73 на р. Бол. Сыня [7]. Предлагаемая модель формирования пород, слагающих изученные обнажения, логично объясняет образование относительно маломощных угольных пластов с промышленными содержаниями редких и рассеянных элементов, а также прибрежно-бассейновых полиминеральных (ильменит, лейкоксен, рутил) россыпей, обнаруженных ранее в ходе геолого-съемочных работ.

Работа выполнена при финансовой поддержке темы НИР ГР № АААА-А17-117121140081-7 «Биогеологические события и стратиграфия фанерозоя субарктической зоны Баренцево-морского региона, Тимана и западного склона Урала».

Литература

1. Добрускина И. А. Триасовые флоры Евразии. Москва: Наука, 1982. 182 с. (Труды ГИН АН СССР; вып. 365).
2. Енцова Ф. И., Калантар И. З. Триасовые отложения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Материалы по геологии востока Русской платформы. Казань: Изд-во Казанского университета, 1966. С. 138–189.
3. Ильина Н. В. Палинотриатиграфия среднего триаса Тимано-Североуральского региона. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 230 с.
4. Ильина Н. В., Константинов А. Г. Палиноассоциации ладинских (средний триас) отложений в разрезе мыса Цветкова, Восточный Таймыр, север Средней Сибири // Эволюция жизни на Земле: Материалы V Международного симпозиума, 12–16 ноября 2018 г., г. Томск / Отв. ред. В. М. Подобина. Томск: Изд. дом Томского гос. ун-та, 2018. С. 153–155.
5. Калантар И. З. Новое в стратиграфии триасовых отложений Полярного Предуралья // Новое в стратиграфии триаса Палеоурала. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. С. 46–61.
6. Методические рекомендации к технике обработки осадочных пород при спорово-пыльцевом анализе. Л.: ВСЕГЕИ, 1986. 77 с.
7. Новиков И. В. Биостратиграфия континентального триаса Тимано-Североуральского региона по фауне тетрапод. М.: Наука, 1994. 139 с. (Труды ПИН РАН; том 261).
8. Объяснительная записка к стратиграфическим схемам Урала (мезозой, кайнозой). Екатеринбург: Уральская геолого-съемочная экспедиция, 1997. 139 с.
9. Твердохлебов В. П., Сенников А. Г., Новиков И. В., Ильина Н. В. Самый молодой триасовый комплекс наземных позвоночных в России: состав и датировка // Палеонтологический журнал. 2020. № 3. С. 87–102.
10. Чалышев В. И., Варюхина Л. М. Биостратиграфия триаса Печорской области. М.-Л.: Наука, 1966. 156 с.

11. Abbink O. A. Palynological identification in the Jurassic of the North Sea region // LPP contribution series. 1998. Vol. 8. P. 1–192.
12. Balme B. E. Fossil in situ and pollen grains: an annotated catalogue // Review of Palaeobotany and Palynology. 1995. Vol. 87. P. 81–323.
13. Hochuli P. A., Roghi G., Brack P. Palynological zonation and particulate organic matter of the Middle Triassic of the Southern Alps (Seceda and Val Gola-Margon sections, Northern Italy) // Review of Palaeobotany and Palynology. 2015. Vol. 218. P. 28–47.
14. Kustatscher E., Van Konijnenburg-Van Cittert J.H.A. The Ladinian flora (Middle Triassic) of the Dolomites: Palaeoenvironmental reconstructions and palaeoclimatic considerations // Geo. Alp. 2005. Vol. 2. P. 31–51.
15. Kustatscher E., Van Konijnenburg-Van Cittert J.H.A., Roghi G. Macrofloras as possible proxies for palaeoclimatic and palaeoecological studies: A case study from the Pelsonian (Middle Triassic) of Kühwiesenkopf/Monte Pra della Vacca (Olang Dolomites, N-Italy) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010. Vol. 290. P. 71–80.
16. Kustatscher E., Heunisch C., Van Konijnenburg-Van Cittert J.H.A. Taphonomical implications of the Ladinian megaflora and palynoflora of the Thale (Germany) // PALAIOS. 2012. Vol. 27. Issue 11. P. 753–764.
17. Kustatscher E., Franz M., Heunisch C., Reich M., Wappler T. Floodplain habitats of braided river systems: depositional environment, flora, fauna of the Solling Formation (Buntsandstein, Lower Triassic) from Bremke and Fürstenberg (Germany) // Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. 2014. Vol. 94. Issue 2. P. 237–270.
18. Kürschner W. M., Herengreen G.F.W. Triassic palynology of central and northwestern Europe: a review of palynofloral diversity patterns and biostratigraphic subdivisions // Lucas S.G. (ed.). The Triassic Timescale. Geological Society, London, Special Publications, 2010; Vol. 334. P. 263–283.
19. Lindström S., Erlström M., Piasecki S., Nielsen L. H., Mathiesen A. Palynology and terrestrial ecosystem change of the Middle Triassic to lowermost Jurassic succession of the eastern Danish Basin // Review of Palaeobotany and Palynology. 2017. Vol. 244. P. 65–95.
20. Paterson N. W., Mangerud G., Mørk A. Late Triassic (early Carnian) palynology of shallow stratigraphical core 7830/5-U-1, offshore Kong Karl Land, Norwegian Arctic // Palynology. 2017. Vol. 41, Issue 2. P. 230–254.
21. Vigran J. O., Mangerud G., Mørk A., Worsley D., Hochuli P. A. Palynology and geology of the Triassic succession of Svalbard and the Barents Sea. Geological Survey of Norway Special Publication 14. 2014. 270 p.
- Ladinian (Middle Triassic) deposits at Cape Tsvetkov section, East Taimyr, northern Middle Siberia). Evolution of Life on the Earth: Proceedings of the V International Symposium, November 12–16, 2018, Tomsk / Editor-in-Chief V.M. Podobina. Tomsk: Tomsk State University Publishing House, 2018, pp. 153–155.
5. Kalantar I. Z. *Novoe v stratigrafii triasovykh otlozhenii Polyarnogo Predural'ya* (New in the stratigraphy of Triassic deposits of the Polar Cis-Urals). New in the Triassic stratigraphy of the Paleourals. Sverdlovsk: UB AS USSR, 1980, pp. 46–61.
6. *Metodicheskie rekomendatsii k tekhnike obrabotki osadochnykh porod pri sporovo-pyl'tsevom analize* (Guidelines for the technique of processing sedimentary rocks in spore-pollen analysis). Leningrad: VSEGEI, 1986, 77 p.
7. Novikov I. V. Biostratigrafiya kontinental'nogo triasa Timano-Severoural'skogo regiona po faune tetrapod (Continental Triassic biostratigraphy of the Timan-North Urals region using tetrapod fauna). Moscow: Nauka, 1994, 139 p.
8. *Ob'yasnitel'naya zapiska k stratigraficheskim skhemam Urala (mezozoi, kainozoi)* (Explanatory note to the stratigraphic schemes of the Urals (Mesozoic, Cenozoic)). Ekaterinburg: Ural Geological Survey Expedition, 1997, 139 p.
9. Tverdokhlebov V.P., Sennikov A. G., Novikov I. V., Ilyina N. V. The youngest Triassic land vertebrate assemblage of Russia: composition and dating. Paleontological Journal, 2020, V. 54, No. 3, pp. 297–310.
10. Chalyshev V. I., Varyukhina L. M. Biostratigrafiya triasa Pechorskoi oblasti (Triassic biostratigraphy of the Pechora region). Moscow-Leningrad: Nauka, 1966, 156 p.
11. Abbink O. A. Palynological identification in the Jurassic of the North Sea region. LPP contribution series. 1998. V. 8, pp. 1–192.
12. Balme B. E. Fossil in situ and pollen grains: an annotated catalogue. Review of Palaeobotany and Palynology. 1995, V. 87, pp. 81–323.
13. Hochuli P. A., Roghi G., Brack P. Palynological zonation and particulate organic matter of the Middle Triassic of the Southern Alps (Seceda and Val Gola-Margon sections, Northern Italy). Review of Palaeobotany and Palynology. 2015, V. 218, pp. 28–47.
14. Kustatscher E., Van Konijnenburg-Van Cittert J.H.A. The Ladinian flora (Middle Triassic) of the Dolomites: Palaeoenvironmental reconstructions and palaeoclimatic considerations. Geo. Alp., 2005, V. 2, pp. 31–51.
15. Kustatscher E., Van Konijnenburg-Van Cittert J.H.A., Roghi G. Macrofloras as possible proxies for palaeoclimatic and palaeoecological studies: A case study from the Pelsonian (Middle Triassic) of Kühwiesenkopf/Monte Pra della Vacca (Olang Dolomites, N-Italy). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010, V. 290, pp. 71–80.
16. Kustatscher E., Heunisch C., Van Konijnenburg-Van Cittert J.H.A. Taphonomical implications of the Ladinian megaflora and palynoflora of the Thale (Germany). PALAIOS, 2012, V. 27, Issue 11, pp. 753–764.
17. Kustatscher E., Franz M., Heunisch C., Reich M., Wappler T. Floodplain habitats of braided river systems: depositional environment, flora, fauna of the Solling Formation (Buntsandstein, Lower Triassic) from Bremke and Fürstenberg (Germany). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2014, V. 94, Issue 2, pp. 237–270.
18. Kürschner W. M., Herengreen G. F. W. Triassic palynology of central and northwestern Europe: a review of palynofloral diversity patterns and biostratigraphic subdivisions. Lucas S.G. (ed.). The Triassic Timescale. Geological Society, London, Special Publications, 2010, V. 334, pp. 263–283.
19. Lindström S., Erlström M., Piasecki S., Nielsen L. H., Mathiesen A. Palynology and terrestrial ecosystem change of the Middle Triassic to lowermost Jurassic succession of the eastern

References

1. Dobruskina I. A. *Triasovye flory Evrasii* (Triassic Floras of Eurasia). Moscow: Nauka, 1982, 182 p.
2. Entsova F. I., Kalantar I. Z. *Triasovye otlozheniya Timano-Pechorskoi neftegazonosnoi provintsii* (Triassic deposits of the Timan-Pechora oil and gas province). Materials on the geology of the east of the Russian platform. Kazan: Kazan University Publishing House, 1966, pp. 138–189.
3. Ilyina N. V. *Palinostratigrafiya srednego triasa Timano-Severoural'skogo regiona* (Palynostratigraphy of the Middle Triassic in the Timan-North Urals region). Ekaterinburg: Uralian Division of RAS press, 2001, 230 p.
4. Ilyina N. V., Konstantinov A.G. *Palinoassotsiatsii ladinskikh (srednii trias) otlozhenii v razreze mysa Tsvetkova, Vostochnyi Taimyr, sever Srednei Sibiri* (Palynological assemblages of the

Danish Basin. Review of Palaeobotany and Palynology, 2017, V. 244, pp. 65–95.

20. Paterson N. W., Mangerud G., Mørk A. Late Triassic (early Carnian) palynology of shallow stratigraphical core 7830/5-U-1, offshore Kong Karl Land, Norwegian Arctic. Palynology, 2017, V. 41, Issue 2, pp. 230–254.

21. Vigran J. O., Mangerud G., Mørk A., Worsley D., Hochuli P. A. Palynology and geology of the Triassic succession of Svalbard and the Barents Sea. Geological Survey of Norway Special Publication 14, 2014, 270 p.

Поступила в редакцию / Received 06.03.2020

Приложение. Алфавитный список миеоспор

Appendix. Alphabetical list of miospores

Спores (Spores)

- Apiculatisporites* sp.
Aratrisporites fischeri (Klaus, 1960) Playford et Dettmann, 1965
Aratrisporites granulatus (Klaus, 1960) Playford et Dettmann, 1965
Aratrisporites paenulatus Playford et Dettmann, 1965
Aratrisporites paraspinosus Klaus, 1960
Aratrisporites scabratus Klaus, 1960
Aratrisporites strigosus Playford, 1965
Baculatisporites comaumensis (Cookson, 1953) Potonié, 1956
Calamospora sp.
Camarozonosporites rudis (Leschik, 1955) Klaus, 1960
Carnisporites mesosoicus (Klaus, 1960) Mädlar, 1964
Carnisporites sp.
Converrucosisporites cameroni (de Jersey, 1962) Playford et Dettmann, 1965
Converrucosisporites cf. Lygodium granulatum Ivanova, 1961
Converrucosisporites cf. Lygodium japoniciforme Ivanova, 1961
Converrucosisporites conferteornatus Pautsch, 1971
Converrucosisporites sp.
Convolutispora sp.
Cyathidites coniopteroides Romanovskaja, 1980
Cyathidites sp.
Cyclotriletes sp.
Deltoidospora sp.
Dictyophyllidites harrisii Couper, 1958
Dictyophyllidites mortoni (de Jersey, 1959) Playford et Dettmann, 1965
Dictyophyllidites sp.
Duplexisporites gyratus Playford et Dettmann, 1965
Duplexisporites problematicus (Couper, 1958) Playford et Dettmann, 1965
Duplexisporites sp.
Lycopodiacidites kuepperi Klaus, 1960
Lycopodiacidites sp.
Microreticulatisporites sp.
Nevesisporites limatulus Playford, 1965
Nevesisporites sp.
Osmundacidites sp.
Polypodiisporites sp.
Retitriletes cf. clavatooides (Couper, 1958) Döring, Krutzsch, Mai et Schulz, 1963
Tigrisporites halleinis Klaus, 1960

Пыльца (Pollen)

- Accinctisporites* sp.
Alisporites australis de Jersey, 1962
Alisporites cymbatus Venkatachala, Beju & Kar, 1967–1968
Alisporites grauvogeli Klaus, 1964
Alisporites landianus Balme, 1970
Alisporites parvus de Jersey, 1962
Alisporites pergrandis (Bolchovitina, 1956) Iljina, 1985
Alisporites perlucidus (Pautsch, 1971) Pautsch, 1973
Alisporites sp.
Araucariacites sp.
Cedripites sp.
Chasmatosporites hians Nilsson, 1958
Chasmatosporites sp.
Chordasporites singulichorda Klaus, 1960
Chordasporites sp.
Colpectopollis ellipsoideus Visscher, 1966
Dipterella oblatinoides Maljavkina, 1949
Ephedripites sp.
Eucommiidites sp.
Falcisporites snopkova Visscher, 1966
Falcisporites stabilis Balme, 1970
Florinites pseudostriatus Kopytova, 1963
Florinites walchius Kopytova, 1963
Ginkgocycadophytus sp.
Gnetaceapollenites sp.
Heliosaccus dimorphus Mädlar, 1964
Minutosaccus crenulatus Dolby, 1976
Minutosaccus potoni Mädlar, 1964
Minutosaccus sp.
Ovalipollis pseudoalatus (Thiergart, 1949) Krutzsch, 1955 emend. Schuurman, 1976
Ovalipollis sp.
Piceapollenites sp.
Pinuspollenites sp.
Platysaccus nitidus (Pautsch, 1971) Pautsch, 1973
Platysaccus queenslandi de Jersey, 1962
Platysaccus sp.
Platysaccus subcarpaticus (Pautsch, 1971) Pautsch, 1973
Podocarpidites keuperianus (Mädlar, 1964) Schuurman, 1977
Podocarpidites sp.
Protodiploxypinus doubingeri (Klaus, 1964) Warrington, 1974
Protodiploxypinus gracilis Scheuring, 1970
Protodiploxypinus sittleri (Klaus, 1964) Scheuring, 1970
Protodiploxypinus sp.
Quadraeculina anellaeformis (Maljavkina, 1949) Iljina, 1985
Samaropollenites speciosus (Goubin, 1965) Dolby et Balme, 1976
Stellapollenites thiergartii (Mädlar, 1964) Clement-Westerhof et al., 1974
Striatoabieites aytugii Visscher, 1966
Succinctisporites grandior Leschik, 1955
Sulcatisporites institatus Balme, 1970
Sulcatisporites krauseli Mädlar, 1964
Sulcatisporites sp.
Triadispora obscura Scheuring, 1970
Vitreisporites pallidus (Ressinger, 1950) Nilsson, 1958
Voltziaceasporites heteromorpha Klaus, 1964
Voltziaceasporites globosus Fisher et Dunay, 1984