УДК: 551.733.33 [282.247.42], 552.541; 551.314

DOI: 10.19110/geov.2021.11.4

Литологические и изотопные ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$) особенности верхнесилурийских отложений зарифовой лагуны бассейна р. Илыч (Северный Урал)

Е. С. Пономаренко

Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
esponomarenko@geo.komisc.ru

Верхний силур широко представлен на Северном Урале разнофациальными отложениями. Фации континентального склона и рифовых отмелей хорошо освещены в геологической литературе, в то время как фации зарифовых лагун ещё не получили детальной характеристики. Объект исследований включает два разреза зарифовых отложений в бассейне р. Илыч. В настоящей работе дается описание типов пород, слагающих разрезы, и их изотопная характеристика. Позднесилурийская зарифовая лагуна отличалась мозаичным распределением фаций, в составе которых выделяются области островного мелководья, между которыми находились участки со спокойным гидродинамическим режимом. В последних отлагались преимущественно иловые карбонаты, представленные сгустковыми фенестровыми известняками. Область островного мелководья характеризовалась широким распространением известняковых песков, обломочный материал был получен из вероятных палеопочвенных карбонатов. Они характеризуются слегка повышенными значениями $\delta^{13}\text{C}$, которые, вероятно, отражают изотопное фракционирование на испарительном геохимическом барьере. Среди вторичных изменений изученных пород описаны доломитизация карстование. Цементолиты интерпретируются как материал заполнения карстовых полостей.

Ключевые слова: верхний силур, Северный Урал, лагунные отложения, изотопия C и O.

Lithological and isotopic ($\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$) features of the Upper Silurian back-reef lagoon deposits of the Ilych River Basin, the Northern Urals

E. S. Ponomarenko

Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktvykar

The Upper Silurian is widely developed in the Northern Urals, where it is represented by various facies. The continental slope facies and the reef shoal facies are well documented in the geological literature, while as back-reef lagoon facies have not yet been characterized in detail. The studied objects included two sections of the back-reef deposits in the Ilych River basin. In this work, we characterize rock types the make up the sections, and their isotopic characteristics. The Late Silurian back-reef lagoon was characterized by a mosaic sediments distribution, which included the island areas between which there were areas with a quiet hydrodynamic regime. In the latter, mainly muddy carbonates were accumulated, represented by clotted fenestral limestones. The area of small islands was characterized by a wide distribution of lime sands, which clastic material was derived from probable paleosoil carbonates. They are characterized by slightly increased $\delta^{13}\text{C}$ values, which, probably, reflects isotopic fractionation at the evaporative geochemical barrier. Dolomitization and karstification are described among secondary alterations in the studied sections. Cementstones is interpreted as karst cavities precipitates.

Keywords: Upper Silurian, Northern Urals, lagoon deposits, isotopes of C and O.

Верхнесилурийские отложения широко развиты на Северном Урале и представлены как мелководными шельфовыми и рифовыми, так и глубоководными склоновыми образованиями. Фации рифовых отмелей и континентального склона были детально изучены

ранее [1, 2, 8]. Фации зарифовых лагун не получили такой детальной характеристики.

Нами лагунные отложения изучались во время полевых работ 2015 года в обн. 101 и 109 (рис. 1). Эти разрезы содержат фауну брахиопод *Conchidium novoseme-*

Для цитирования: Пономаренко Е. С. Литологические и изотопные ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$) особенности верхнесилурийских отложений зарифовой лагуны бассейна р. Илыч (Северный Урал) // Вестник геонаук. 2021. 11(323). С. 43–54. DOI: 10.19110/geov.2021.11.4.

For citation: Ponomarenko E. S. Lithological and isotopic ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$) features of the Upper Silurian back-reef lagoon deposits of the Ilych River Basin, the Northern Urals. Vestnik of Geosciences, 2021, 11(323), pp. 43–54, doi: 10.19110/geov.2021.11.4.

licum Nal. [2], чье распространение ограничено падейтивисским и сизимским горизонтами, коррелируемыми с гористианским ярусом и нижним лудфордом международной стратиграфической шкалы [5, 11]. Они представлены известняками и доломитами, строение и изотопные характеристики которых в геологической литературе освещены ещё достаточно слабо. Целью статьи является краткая характеристика разрезов, описание комплекса пород, вскрытых в изученных разрезах, и их изотопная характеристика.

Материал и методы

Материалом для данной статьи послужили 29 образцов известняков и вторичных доломитов лагунных разрезов верхнего силура р. Илыч. Состав и строение пород изучались в шлифах под поляризационным микроскопом «Полам РП-1». Изотопный состав углерода и кислорода в валовых пробах определялся в 23 образцах (см. таблицу). Образцы для изотопного анализа растирались в агатовой ступке, а затем квартовались. Использовался метод проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) на аналитическом комплексе ThermoFisher Scientific (Бремен, Германия) с системой подготовки и ввода проб GasBench II, соединенной с масс-спектрометром DELTA V Advantage. Значения $\delta^{13}\text{C}$ даны в промилле относительно стандарта PDB, значение $\delta^{18}\text{O}$ — относительно стандарта SMOW. При калибровке использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 19. Ошибка определения составляет $\pm 0.15\%$. Анализы проводились в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН.

Краткая характеристика изученных разрезов

В современном структурном плане разрезы лагунных отложений расположены западнее рифовых.

Рис. 1. Расположение изученных разрезов: А — географическое расположение района на р. Илыч; В — схематическая карта расположения обн. 101 и 109

Fig. 1. Studied sections. A — Geographical location of the area; B — Outcrops 101 and 109

Наиболее близким к рифу Илыч [2] является обн. 109 (см. рис. 1), которое имеет сложное строение (рис. 2). Кроме ступковых биотурбированных известняков, известняковых песчаников и гравелитопесчаников (рис. 2), здесь отмечаются кониатолиты, развитые на поверх-

Значения $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{18}\text{O}$ для пород разрезов 101 и 109 на р. Илыч, Северный Урал
 $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$ values for whole rocks of outcrops 101 and 109 on the Ilych River, Northern Urals

№ обр / Sample No	Тип породы / Rock type	$\delta^{13}\text{C}$, ‰	$\delta^{18}\text{O}$, ‰
П-Ил109/1	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.06	24.44
П-Ил109/2	Известняк сгустковый / Clotted limestone	0.85	24.54
П-Ил109/3	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.22	23.51
П-Ил109/4	Доломит вторичный / Secondary dolostone	1.11	24.69
П-Ил104/4а	Кониатолит / Koniatolite	1.16	24.76
П-Ил109/5	Известняк сгустковый / Clotted limestone	0.95	23.68
П-Ил109/6	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.03	24.49
П-Ил109/7	Известняк сгустковый / Clotted limestone	0.94	24.33
П-Ил109/8	Доломит вторичный / Secondary dolostone	1.12	24.69
П-Ил109/12	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.36	24.43
П-Ил109/13	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.47	24.51
П-Ил109/14	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.72	24.44
П-Ил109/15	Известняковый конгломерат / Lime conglomerate	0.98	24.17
П-Ил109/16	Известняковый песчаник / Calcareous sandstone	2.03	24.17
П-Ил109/18	Известняковый гравелит / Lime gravelite	0.67	2.09
П-Ил101/1	Доломит вторичный / Secondary dolostone	0.82	23.93
П-Ил101/3	Доломит вторичный / Secondary dolostone	0.76	22.76
П-Ил101/4	Доломит вторичный / Secondary dolostone	0.94	22.66
П-Ил101/6	Известняк сгустковый / Clotted limestone	0.61	25.05
П-Ил101/7	Микробный ламинит / Microbial laminite	0.53	25.26
П-Ил101/8	Известняковый песчаник / Lime sandstone	1.37	24.64
П-Ил101/10	Известняк пелитоморфный / Lime mudstone	1.58	24.68
П-Ил101/11	Известняковый гравелитопесчаник / Lime gravelite-sandstone	1.44	24.36

Рис. 2. Литологические колонки обн. 109 (слева) и обн. 101 (справа). Корреляция таких специфических разрезов практически невозможна [21] и проводится условно по слою микробных ламинитов.

Условные обозначения: 1 — известняки; 2 — известняковые песчаники; 3 — доломиты; б — обломки известняков (закрашенные серым — с рифовым дебрисом); с — сгустки; е — раковины гастропод; ф — створки моллюсков; г — дазикладовые водоросли; h — ракообразные; l — онколиты; j — колонии стромахоидей; k — стилолитовые швы; l — крустифицированные корки; m — уровни палеокарста (?); n — осадочные ламиниты; o — пелитоморфный известняк

Fig. 2. Lithological log of section 109 (left) and section 101 (right). Correlation of such specific sections is practically impossible (Pratt et al, 2012), and is carried out relative along the of microbial laminite layer.

Legend: 1 — limestones; 2 — calcareous sandstones; 3 — dolostones; a — ooids; b — limestone clasts (grey — with reefal debris); c — clots; d — fenestrae; e — gastropodes shells; f — brachiopod valves; g — gasyclade algae; h — ostracodes; i — oncolites; j — stromatopore colonies; k — stilolite steams; l — crustified crusts; m — paleokarst(?) levels; n — microbial laminites; o — pelitomorphic calcite

ностях напластования. Кроме того, помимо фенестровых структур, характерных для лагунных отложений [3], в большом количестве встречаются крупные фенестроподобные образования. Из вторичных изменений отмечена доломитизация, более сильно развитая в разрезе обн. 101.

Основные литотипы

Среди изученных пород выделяются известняки сгустковые с пятнистой текстурой (ЛТ-1), известняковые песчаники (ЛТ-2), микробальные ламиниты (ЛТ-3), кониатолиты (ЛТ-4), пелитоморфные известняки с комковатой отдельностью (ЛТ-5), известняковые гравелитопесчаники с неокатанными обломками (ЛТ-6), известняковые конглогравелиты (ЛТ-7), доломиты вторичные (ЛТ-8) и цементоидиты (ЛТ-9).

ЛП-1. Известняк сгустковый с пятнистой текстурой (рис. 3, А, В) является одним из наиболее распространенных в изученном разрезе типов породы, слагающий слои от 0.5 до 1.5 м. Пятнистая текстура образована за счет биотурбации. Сгустки с облаковидными краями (0.05—0.2 мм) являются основным компонентом данного литотипа (см. рис. 3, В). Их количество составляет 60—80 % от объема породы. Иногда сгустки собраны в кластеры (0.5—1.0 мм), из-за чего порода под микроскопом временами напоминает известняковые песчаники. Кроме того, в составе литотипа отмечаются неправильной формы фенестры (высотой до 1.0—3.0 мм и длиной до

Рис. 3. Основные типы пород: ЛТ-1, -2 и -3. А — известняк сгустковый, с редкими и мелкими фенестрами. Шлиф П-Ил109/11-2015; В — известняк сгустковый. Деталь строения. Шлиф П-Ил101/8-2015; С — известняковый песчаник. В правой части изображения — фрагмент раковины брахиоподы. Шлиф П-Ил109/1-2015; D — известняковый песчаник. Деталь строения. Стелками показан подвесковый цемент. Шлиф П-Ил109/14-2015; E — микробильные ламиниты. Полевое фото. Обн. 109, слой 9; F — микробильные ламиниты с клиновидными трещинами. Шлиф П-Ил101/7-2015

Fig. 3. Main rock types: LT-1, LT-2, and LT-3. A — Clotted limestone with rare small fenestrae. Thin-section P.II109/11-2015. B — Clotted limestone. Detail. Thin section P-II101/8-2015. C — Calcareous sandstone. In the right side of image — the brachiopod valve fragment. Thin-section P-II109/1-2015. D — Calcareous sandstone. Detail. Arrows indicate pendant cements. Thin-section P-II109/14-2015. E — Microbial laminites. Field photo. Outcrop-109, layer 9. F — Microbial laminites with wedge-shaped cracks. Thin-section P-II101/7-2015

2.0 см), частью удлиненные по напластованию, частью поперек него. В единичных количествах присутствуют раковины брахиопод (до 1.0 см), фрагменты зеленых дазикладовых водорослей, а также раковины гастропод (до 1.5 см в диаметре) и остракод (до 1.0 мм). В некоторых слоях встречаются единичные онколиты (от 5.0 мм до 5.0 см). Ядра их представлены фрагментами амфиопор, а корки — пелитоморфным кальцитом, частью сгустковым. В редких случаях отмечаются окатанные обломки пелитоморфных и сгустковых известняков (0.8—4.0 мм), иногда со своеобразными «протооидными» образованиями (см. стр. 49). Карбонатные цементы, связывающие осадочные зерна и заполняющие фенестры, представлены двумя типами: кристификационными радиально-фибровыми кальцитами, образующими тонкие (до 0.1 мм, редко до 0.2 мм) корки; друзовым спаритовым кальцитом. В редких случаях внутри фенестр развит крупный (до 2.0 мм), богатый включениями «мутный» доломит.

Интерпретации. Как и в случае с верхнефранским рифовым комплексом Седью [3, 9], сгустковые известняки с фенестрами здесь являются литифицированными осадками зарифовой лагуны. Важным отличием от верхнедевонских аналогов является практически полное отсутствие кальцисфер. Похожие осадки, состоящие из карбонатного ила, а также мягких и сцементированных пеллетов, были описаны на побережье Абу-Даби [15], где они приурочены к защищенным лагунам, областям с подветренной стороны банок и островов, а также к глубоким водам осевого трога Арабского залива. Источником известкового ила там служат обильные цветения и «побеления» (whitings), образованные осаждением карбонатов прямо из толщи воды [15, 17]. С илом на побережье Абу-Даби связаны также «шарики хлопьевидной органической слизи», содержащие цианобактерии, которые впоследствии образуют пелоиды (сгустки) [15].

ЛТ-2. Известняковые песчаники (рис. 3, С) также широко развиты в изученных разрезах, где слагают слои мощностью от первых миллиметров до 1 м. Более 50 % породы сложено окатанными обломками известняков размером от 0.1 до 0.8 мм (редко до 2.5 мм). Резко преобладают фрагменты пелитоморфных известняков (иногда доломитизированных). В некоторых слоях также отмечаются обломки сгустковых и протооидных известняков. Иногда до 30 % породы могут слагать ооиды (0.5—1.2 мм). Их ядра (0.2—0.4 мм) также представлены обломками пелитоморфных известняков, а микрослоистые корки (от 0.1 до 0.7 мм толщиной) характеризуются чередованием темных (0.002—0.01 мм) и светлых (0.02—0.05 мм) ламин. В некоторых слоях ооиды могут быть частично доломитизированными. Органогенный материал, как правило, не превышает 5 % и представлен раковинами остракод (до 1.0 мм), колониями цианобактерий (типа *Hedstroemia* или *Garwoodia*; 1.0x2.5 мм), члениками криноидей (до 0.5 мм), раковинами и отдельными створками брахиопод (от 4.0 мм до 5.0 см), колониями зеленых дазикладовых водорослей. Для этого типа породы также иногда отмечаются фенестры неправильной формы размером до 1.0 см. Зерна иногда не сортированы, иногда отмечается слабо выраженная градиационная или пологая косая слоистость. В некоторых случаях между слоями с разным размером

зерен отмечаются тонкие прослои (<1.0 мм) сгустковых известняков. Осадочные компоненты связаны несколькими генерациями карбонатных цемента: 1) раннедиагенетическим натечным подвесковым цементом* между осадочными зернами (рис. 3, D); 2) раннедиагенетическим цементом типа dog tooth по краю фенестр; 3) позднедиагенетическим друзовым спаритовым кальцитом, залечивающим большую часть межзернового пространства; 4) эпигенетическим крупнокристаллическим (0.5—1.0 мм) доломитом, залечивающим крупные поры.

Интерпретация. Рассматриваемый литотип образован за счет цементации известняковых песков. Важно отметить, что обломки сгустковых известняков, характерные для более глубокой части зарифовой лагуны, в составе кластического материала не встречаются. Преобладающий состав (обломки пелитоморфных известняков) известнякового песка свидетельствует о другом источнике (который будет обсуждаться ниже). По оценке изучавших нижнеордовикские пелоидные песчаники Восточных Прекордильер [21], такие осадки формировали песчаные равнины (sand flats) и/или низкорельефные банки (с течением 0.2 м/с, редко до 0.5 м/с). Времена относительного покоя приводили к межзерновой цементации. Предполагается, что пластовая морфология таких песчаных слоев служит аргументом более или менее постепенной аккреции слоя, а не отдельных высокоэнергичных событий (штормы) [21]. В случае с верхнесилурийскими известняковыми песчаниками наличие подвесковых цемента свидетельствует о крайней мелководности условий их осаждения и о нахождении их иногда выше уровня грунтовых вод (water table). Фенестры здесь могут интерпретироваться с одной стороны, как пузырьки газа, с другой стороны, как структуры типа keystone [13]**.

ЛТ-3. Микробные ламиниты (рис. 3, E, F) редки в изученных разрезах, слагают слои мощностью 0.2—0.3 м. Это очень тонкослоистые породы, в которых микробные слойки часто чередуются с прослоями (иногда до 1.0 см) известняковых песчаников. Слоистость обусловлена неравномерным чередованием ламин пелитоморфных и сгустковых известняков мощностью от 0.5 до 3.0 мм и подчеркивается удлиненными вдоль напластования фенестрами и сутурами. Цемент блоковый спаритовый, иногда гранулярный. Порода в отдельных ламинах пронизана короткими клиновидными трещинами.

Интерпретация. Микробные ламиниты обычно интерпретируются как микробные маты, развитые на литоральных равнинах [13]. Клиновидные трещины аттестуются здесь как трещины усыхания, что подтверждает данную интерпретацию.

* Натечный, или подвесковый цемент (dripstone, или pendant cement соответственно) — это цемент, характеризующийся различной толщиной цементных корок под осадочным зерном или под кровлей внутризерновых и растворенных пустот. Формируется выше поверхности воды в метеорно-вадозной зоне, (литораль, супралитораль, бичроки) [13].

** Структуры keystone называют по аналогии с «замковыми камнями» клиновидными камнями кладки в вершине свода или арки. Проще говоря, keystone — это краеугольный камень, завершающий любую конструкцию.

Рис. 4. Основные типы пород: ЛТ-4—ЛТ-7. А — крустификационные зональные корки. Полевое фото. Обн. 109, слой 6; В — пелитоморфный известняк с комковатой отдельностью. Желтые стрелки указывают на вертикальные, ветвящиеся книзу фенестроподобные образования. Пришлифовка. Обр. П-Ил101/10-2015; С — микрофотография шлифа комковатого пелитоморфного известняка. Шлиф П-Ил101/10-2015; D — деталь (С). Стрелками указаны протооиды; желтая стрелка — ризоидоподобные образования. Шлиф П-Ил101/10-2015; Е — известняковый гравелитопесчаник с неокатанными обломками. Темные участки — примазки гидроокислов железа. Шлиф П-Ил101/11-2015; F — деталь (Е). Крупный обломок пелитоморфных известняков с «протооидами» в верхней половине изображения. Шлиф П-Ил101/11-2015; G — известняковый конгломерателит. Шлиф П-Ил109/15-2015

Fig. 4. Main rock types: LT-4, LT-5, LT-6 and LT-7. A — Crustified zonal crusts. Field photo. Outcrop-109, layer 6. B — The pelitomorphous limestone with nodular jointing. Yellow arrows point to vertical, branching downward fenestral structures. Polished section. Sample P-II101/10-2015. C — The thin-section photomicrography of nodular pelitomorphous limestone. Thin-section P-II101/10-2015. D — Detail of (C). Arrows indicate “proto”-oids; yellow arrow — rhizoid-like structure. Thin-section P-II101/10-2015. E — The lime gravel-sandstone with angular clasts. Dark areas-iron hydroxides. Thin-section P-II101/11-2015. F — Detail of (E). The large clast of pelitomorphous limestones wit “proto”-oids in the upper half o mage. Thin-section P-II101/11-2015. G — The lime conglomeraelite. Thin-section P-II109/15-2015

ЛТ-4. Кониатолиты (рис. 4, А). Эти образования развиты редко, но четко выделяются своей необычностью. В обн. 109 они имеют четкую ровную подошву и неровную кровлю в виде протуберанцев. Кониатолиты представляют собой зональные крустификационные образования толщиной, не превышающей первые сантиметры; в разных частях разреза закреплены на вторичных доломитах, сгустковых известняках и известняковых песчаниках. В обн. 101 они отмечаются единично между отдельными пластами доломитов и доломитизированы сами. Под микроскопом кониатолиты характеризуются тонким неравномерным чередованием мелко- и тонкозернистого (0.05—0.2 мм) гипидиоморфного доломита (толщина 0.2—3.8 мм) и радиально-фибрового кальцита (толщина 0.3—6.0 мм). Размер кристаллов кальцита не превышает 0.2—0.6 мм. Также отмечаются единичные прослои (0.2 мм) спаритового кальцита.

Интерпретация. Кониатолитами называются арагонитовые супралиторальные инкрустации, описанные на Trucial Coast в Персидском заливе [22] и на побережье Абу-Даби [16]. Они инкрустируют исключительно твердые непористые субстраты бичроков.

ЛТ-5. Пелитоморфные известняки с комковатой отдельностью (рис. 4, В, D) вскрываются только в обн. 101, где слагают единственный слой видимой мощностью 1.0 м. Основная масса его представлена плотным пятнистым пелитоморфным кальцитом (более темные и более светлые пятна), который обуславливает комковатую текстуру. Отмечаются небольшие (до первых мм) неправильные участки сгусткового строения. В составе породы встречаются образования (до 10 %), напоминающие ооиды на начальных стадиях развития протоооиды. Они имеют округлые и овальные ядра (0.1—0.5 мм), покрытые очень тонкими (0.05—0.1 мм) корками, сложенными тонкими (до 0.04 мм) ламинами. Органогенный материал не превышает 5 % и представлен исключительно мелкими (0.5—3.0 мм) раковинами остракод. Для этого типа породы характерны фенестроподобные структуры разной формы и размеров (от 0.2 мм до первых сантиметров). В некоторых случаях они ориентированы перпендикулярно поверхностям напластования и иногда разветвляются книзу (рис. 4, В). Залечены они инкрустационным фибровым кальцитом и друзовым спаритовым кальцитом. Внутри некоторых из них также имеются образования, похожие на протоооиды, однако их корка сложена незональным плотным пелитоморфным кальцитом (рис. 4, D).

Интерпретация. Преимущественно пелитоморфная структура, комковатое строение и ооидоподобные образования с большой долей вероятности позволяют отнести данный тип пород к педогенным карбонатам (каliche, калькреты). Об этом свидетельствуют следующие особенности строения литотипа: комковатая текстура, вертикальные и разветвляющиеся книзу фенестроподобные структуры, протоооиды, чье формирование иногда связывается с округло-зернистыми трещинами (circumgranular cracks; [13]). Важно отметить, что состав обломков в известняковых песчаниках (ЛТ-2) указывает на то, что источником кластического материала были именно эти пелитоморфные известняки.

ЛТ-6. Известняковые гравелитопесчаники с неокатанными обломками (рис. 5, Е, F) в обн. 101 покрывают каличеподобные(?) пелитоморфные известняки, образуя слой мощностью 1.5 м. Порода сложена обломками разных размеров (от 0.2 до 5.0 мм). В песчаной фракции преобладают окатанные обломки пелитоморфных известняков и ооидов с ядрами из пелитоморфных известняков. Гравийная фракция (около 30 %) характеризуется фрагментами пелитоморфных известняков разной степени окатанности и протоооидных. Цемент, как правило, представлен друзовым спаритовым кальцитом, участками отмечается менисковый цемент.

Интерпретация. Состав кластического материала указывает на то, что порода сформировалась из дезинтегрированных каличеподобных(?) пелитоморфных известняков (ЛТ-5). Об этом же свидетельствует их тесная ассоциация. Важно отметить, что хорошо окатаны только более мелкие зерна, что указывает на относительно слабые движения вод, способных переносить и окатывать лишь более мелкие (и, следовательно, более легкие) частицы. По всей видимости, каличеподобные(?) пелитоморфные известняки разрушались при растрескивании и более мелкий материал механически быстро окатывался и транспортировался.

ЛТ-7. Известняковые конгломералиты (рис. 4, G) отмечаются в редких случаях лишь в верхней части обн. 109, где слагают слои мощностью от 0.6 до 2.0 м. До 80 % породы сложено обломками известняков (от 1.0 мм до 1.0 см, редко больше) разной степени окатанности. Среди них отмечаются фрагменты сгустковых и биогермных известняков (с фистулеллами и цианобактериями), а также пелитоморфных и протооидных разностей. Более редки обломки колоний табулят, строматопороидей, раковин остракод и гастропод. Единичны овальные онколиты (2.0 × 3.0 см) с цианобактериальными корками. В некоторых случаях отмечается слабозначимая обратная градиционная сортировка осадочных частиц. Верхняя поверхность слоев неровная, часто с алевритовым кальцитом и доломитом в карманах неровностей. Цемент радиально-фибровый вокруг осадочных частиц (толщиной до 0.2 мм) и друзовый спаритовый. Иногда оставшиеся пустоты вместо спаритового кальцита залечены доломитом.

Интерпретация. Различный состав обломков, в котором кроме пелитоморфных и протооидных известняков присутствуют также сгустковые (наиболее глубокой части лагуны) и биогермные, различная окатанность и часто крупные размеры свидетельствуют о том, что это были отложения высокоэнергичных событий, что позволяет относить их к темпеститам. Как правило, они в основном характерны для открыто-морских сред, но могут отмечаться вплоть до озерных [13 и ссылки в нем].

ЛТ-8. Доломиты вторичные (рис. 5, А) развиты в обоих изученных разрезах. Они слагают слои (от 0.4 до 2.0 м) и небольшие участки (от 3 до 10 см) среди известняков. Микроскопически это гипидиоморфные мелко- и среднезернистые (0.12—0.5 мм) незональные доломиты. Теневая структура известняков угадывается редко и только в слабодомитизированных частях. Более или менее в тенях видны только фенестровые структуры (выделяясь на общем фоне более чистым

Рис. 5. Основные типы пород: ЛТ-8 и ЛТ-9. А — слой вторичного доломита с верхней резкой и нижней постепенной границами. Обн. 109, слой 4; В — цементолиты (подчеркнуты пунктирной синей линией) в сгустковых известняках. Полевое фото. Обн. 109, слой 10; С — граница цементолитов (внизу) с вмещающими породами (вверху). Отмечается срезание (из-за растворения?) осадочных зерен. Микрофотография шлифа П-Ил109/6-2015

Fig. 5. Main rock types: LT-8 and LT-9. A — The secondary dolostone bed with flat upper and lower gradual boundaries. Outcrop-109, layer 4. B — Cementstones (underlined with dashed blue line) in clotted limestones. Field photo. Outcrop-19, layer 10. C — Thin-section photomicrography of cementstones (at the bottom) boundary with host rocks (at the top). Cutting (due to dissolution?) of sedimentary grains is noted. Thin-section P-II109/6-2015

и крупнозернистым доломитом). В обн. 109 слой доломитов книзу постепенно переходит в известняковые песчаники, а в обн. 101 видны недоломитизированные участки со сгустковой структурой. Таким образом, нельзя сказать, что доломитизации подверглась какой-то один тип породы.

Интерпретация. Доломиты — полигенные образования, которые могут формироваться в разных условиях и на разных стадиях диагенеза и катагенеза. Принимая во внимание морфологию доломитовых тел и условия образования вмещающих их осадков, к описанному вторичному доломиту подходит Dorag — модель доломитизации при смешении пресных и морских вод [13, 19], или модель доломитизации в нормально-морских водах, описанная на острове Андрос (Багамы) [25] и Северном Белизе [23].

ЛТ-9. Цементолиты (рис. 5, В) достаточно широко развиты в обн. 109, где обычно достигают нескольких дециметров, иногда первых метров, и имеют разную форму (от овальной до извилистой неправильной). Как и кониатолиты, они сложены зональным радиально-фибровым кальцитом с тонкими прослоями мелко- и тонкозернистых доломитов, но рост кристал-

лов кальцита здесь происходит не сверху от поверхностей напластования, а от стенок вмещающих пород к центру, то есть как заполнение полостей. Внешняя граница цементолита, как правило, ровная, причем отмечаются усеченные осадочные зерна вмещающих пород (рис. 5, С).

Интерпретация. Округлая и неправильной формы морфология цементолитов, рост кристаллов кальцита от стенок на границах с вмещающими породами свидетельствуют, что эти образования формировались за счет заполнения карбонатными минералами древних пустот. В этом случае цементолиты можно интерпретировать как породы заполнения карстовых полостей. Согласно авторам [14], растворение карбонатов происходит частично в вадозной зоне, однако преимущественно в зоне смешения вадозных и фреатических вод, когда туда поступают метеорные воды, резко недонасыщенные по отношению к CaCO_3 . Осаждение кристаллического кальцита начинается происходить в тех случаях, когда водная пленка на поверхности стенок карста (если карст находится выше уровня грунтовых вод) насыщается по отношению к карбонатам [13, 14].

Краткая характеристика изотопного состава

Изотопный состав углерода и кислорода изученных карбонатов не имеет значительных вариаций: $\delta^{13}\text{C} = 0.61\text{—}2.03\text{‰}$, $\delta^{18}\text{O} = 22.66\text{—}25.26\text{‰}$. Значения $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{18}\text{O}$ (см. таблицу) будут формировать на принципиальной схеме В. Н. Кулешова [6] маленькое поле, совпадающее по изотопному составу углерода с осадочными морскими карбонатами, но отличающиеся от него более легким изотопным составом кислорода. Правда, по схеме [10] поле «морских карбонатолитов фанерозойского возраста» имеет более широкий диапазон значений $\delta^{18}\text{O}$ (от 14 до 32 ‰). Вероятно, это свидетельствует о том, что воды позднесилурийской зарифовой лагуны сообщались (через проходы в рифах) с водами Палеоуральского океана. По всей видимости, соленость зарифовой лагуны, по крайней мере в более глубоких её частях — местах формирования стустковых осадков, была близкой к нормально-морской. В то же время более облегченные значения $\delta^{18}\text{O}$ (22.66—25.26 ‰) могут свидетельствовать о некотором понижении солености [6]. Однако для ответа на данный вопрос пока недостаточно данных, и мы оставляем его за рамками данной работы до дополнительных исследований.

Более детальный анализ изотопного состава верхнесилурийских лагунных карбонатов позволяет выявить некоторые закономерности распределения $\delta^{13}\text{C}$ (см. таблицу). Так, стустковые известняки характеризуются относительно легкими $\delta^{13}\text{C}$ (0.61—0.95 ‰). Ещё более легкие значения $\delta^{13}\text{C}$ (0.53 ‰) имеют микробные ламиниты. Более тяжелым изотопным составом $\delta^{13}\text{C}$ (1.03—2.03 ‰) характеризуются известняковые песчаники. Схожий с ними изотопный состав имеют также кониатолиты ($\delta^{13}\text{C} = 1.16\text{‰}$), пелитоморфные известняки ($\delta^{13}\text{C} = 1.58\text{‰}$) и известняковые гравелитопесчаники с неокатанными обломками ($\delta^{13}\text{C} = 1.44\text{‰}$), что, возможно, говорит о сходстве условий (но не механизмов!) карбонатакопления.

Фракционирование изотопов углерода и кислорода в карбонатах многофакторно [6, 10]. Так, утяжеленный изотопный состав углерода пелитоморфных известняков и кониатолитов в сравнении со стустковыми разностями можно объяснить следующими механизмами.

1. Поверхностные воды, как правило, обогащены тяжелыми изотопами, а с глубиной происходит постепенно облегчение изотопного состава [18]. Следовательно, карбонат, образованный в приповерхностных и придонных водах, будет отличаться по изотопному составу С и О. Согласно графикам, представленным в работе [18], для разницы изотопного состава CO_2 вод в 0.5 ‰ необходима глубина около 0.5 км. Однако позднесилурийская мелководная зарифовая лагуна вряд ли достигала таких глубин.

2. Широко известен факт относительного обогащения изотопами ^{12}C пресноводных карбонатов [6, 10]. В этом случае разница изотопного состава стустковых и пелитоморфных известняков будет указывать на стратификацию вод по солености позднесилурийской лагуны. Однако этому противоречит тот факт, что известняковые песчаники с вадозными подвесковыми цемен- тами все равно имеют более высокие значения $\delta^{13}\text{C}$.

3. Тяжелый изотопный состав карбонатов может являться результатом удаления CO_2 с легким изото-

пом в ходе фотосинтеза [6, 10]. Это может быть одной из причин более высоких значений $\delta^{13}\text{C}$ в пелитоморфных известняках. Но в этих породах нет явных следов фотосинтезирующих органических остатков.

4. Изотопное фракционирование при испарении водного бикарбонатного раствора приводит к заметному изотопному утяжелению углерода в карбонатах, отлагающихся на испарительном геохимическом барьере [10]. Эта модель хорошо согласуется с интерпретациями, полученными на основании изучения верхнесилурийских лагунных отложений (кониатолиты, пелитоморфные известняки с комковатой отдельностью как палеопочвенные карбонаты).

Здесь, однако, важно отметить, что в случае изотопного фракционирования на испарительном барьере значения $\delta^{13}\text{C}$ должны быть $>2\text{‰}$ [6, 10], что в изученных образцах практически не отмечено (см. таблицу). Это может быть связано с тем, что породы неоднородны по своему строению. В них присутствуют протооиды и оиды с легким изотопным составом ($\delta^{13}\text{C}$ от -3.52 до 0.4‰ [12]), а также отмечаются вадозные цементы, что, вероятно, облегчило изотопный состав валовой пробы породы.

Величины $\delta^{13}\text{C}$ вторичных доломитов более разнообразны и включают значения как $<1.0\text{‰}$, характерные для стустковых известняков, так и $>1.0\text{‰}$ (как, например, у известняковых песчаников). При этом нужно отметить, что более тяжелый углерод характерен для доломитов, переходящих по латерали или по разрезу в известняковые песчаники, а доломиты, в чьем строении отмечается теневая стустковая структура, имеют более облегченный углерод. Это свидетельствует о том, что в данном случае доломитизация, по всей видимости, не изменяла первичный изотопный состав, по крайней мере углерода.

Обсуждение

По основным типам слагающих пород изученные разрезы сходны с верхнефранскими лагунными образованиями Южного Тимана (рифовый комплекс Седью [3, 7]). По интерпретируемому типу осадков и их распределению имеется определенное сходство с современными лагунами Персидского (Арабского) залива [15, 22]. Идеализированная схема верхнесилурийской зарифовой лагуны представлена на рис. 6. Здесь условно выделяются две области, различавшиеся по топографии и составу слагающих их осадков: непосредственно лагуны и мелководная область с небольшими островами (островное мелководье?).

1. Область лагуны характеризовалась спокойно-водным гидродинамическим режимом с накоплением преимущественно иловых карбонатов. Одновозрастный риф Илыч [1, 2] служил барьером (в гидродинамическом плане), отделившим лагуну от вод Палеоуральского океана. Иловые карбонаты в породах представлены в виде стустков, что свидетельствует об их микробном происхождении [13]. Они могли формироваться непосредственно из морской воды во время цветения (по аналогии с лагунами Персидского залива [15, 17]) или быть результатом посмертных тафономических изменений бентосных цианобактериальных сообществ [7, 20, 24]. Вполне возможно, что эти два

Рис. 6. Упрощенная модель формирования верхнесилурийских лагунных отложений. Условные обозначения см. на рис. 2

Fig. 6. Simplified model of Upper Silurian lagoon deposits formation. Legend as in Fig. 2

процесса происходили совместно. Значения $\delta^{13}\text{C}$ ступковых известняков соответствуют нормально-морским карбонатам (см. таблицу), что свидетельствует о сообщении лагуны с водами Палеоуральского океана (возможно, через каналы в рифе). Другими осадочными компонентами были редкие раковины остракод и гастропод, а также рифовый дебрис, сносившийся в лагуну во время штормов и ураганов. Редкие обломки пелитоморфных известняков (иногда с протоооидами) в ступковых известняках открывают еще один источник осадочного материала — область островного мелководья.

2. Область островного мелководья, судя по изученным разрезам, не была постоянной, а представляла собой мигрирующие отмели. Присутствие в известняковых песчаниках подвесковых цементов свидетельствует, что осадки периодически выводились выше уровня моря. Обнаружение кониатолитов указывает, что иногда здесь существовала зона заплесков (супраликтораль). Принимая во внимание тот факт, что современные кониатолиты растут только на твердых поверхностях [22], можно высказать мнение, что в позднесилурийской лагуне существовали, возможно, небольшие каменистые острова.

Комковатые пелитоморфные известняки, отнесенные к педогенным(?) карбонатам, представляли разрушаемый материал, который слагал известняковые пески. На это кроме литологических признаков указывает также сходство изотопного состава углерода (см. таблицу). Более утяжеленный (в сравнении с лагунными ступковыми известняками) углерод, возможно, является результатом изотопного фракционирования на испарительном барьере [10]. Эти карбонаты в первозданном виде практически не оставили следа в геологической летописи. Во-первых, их разрушению способствовало растрескивание, что ха-

рактерно для палеопочвенных горизонтов [13]. Во-вторых, они могли разрушаться медленными приливо-отливными течениями, а их дериваты стали зернами известняковых песков, слагая, таким образом, отмели. Однако, по всей видимости, такие острова были достаточно многочисленны, на что указывает обилие в изученных разрезах известняковых песчанников.

Следует также отметить, что изученные отложения значительно отличаются от устьдурнаюской грации (тип зарифовых лагун) верхнелландоверийско-нижнелудфордской карбонатной субформации верхнеордовикско-нижнедевонской калейдовой формации [4]. Для последней, в частности, характерны строматопоровые и биокластовые доломиты и узорчатые (биотурбированные) известковые доломиты (часто глинистые) с более редкими слоями микрозернистых известняков и известняковых гравелитов [4]. Изученные в обн. 101 и 109 на р. Илыч отложения относятся к более близкой (проксимальной) к рифу части обширной зарифовой лагуны, а устьдурнаюская грация характеризует удаленную от рифа дистальную и более глубоководную её часть.

Заключение

Позднесилурийская дистальная зарифовая лагуна бассейна р. Илыч представляла собой единую осадочную систему сложного строения, которая характеризовалась мозаичным распределением фаций, в составе которых выделяются области островных мелководий, разделенные участками со спокойным гидродинамическим режимом. В последних отлагались преимущественно иловые карбонаты, которые являлись результатом осаждения либо непосредственно из толщи воды (побеления в результате цветения

воды), либо из придонных микробных матов. Они представлены сгустковыми фенестровыми известняками. Изотопные значения их попадают в поле нормально-морских карбонатов.

Область островного мелководья характеризовалась широким распространением известняковых песков, чей обломочный материал был получен из вероятных палеопочвенных горизонтов, которые практически не сохранились в геологической летописи. Другим указанием на существование островов являются кониатолиты — известняковые корки, формирующиеся на каменистой супраликторали. Все эти образования характеризуются слегка повышенными значениями $\delta^{13}\text{C}$ (по сравнению со сгустковыми известняками), что, по-видимому, отражает изотопное фракционирование на испарительном геохимическом барьере.

Среди вторичных изменений в изученных разрезах описаны доломитизация и образования цементоцитов. Доломитизация происходила как по сгустковым известнякам, так и по известняковым песчаникам. В обоих случаях в этих доломитах сохранился изотопный состав углерода первичных пород. Цементолиты интерпретируются здесь как осадки карстовых полосей. Их присутствие в разрезе свидетельствует о том, что породы неоднократно выводились выше уровня моря, что также поддерживает теорию о присутствии островов.

Работа выполнена в рамках проектов Государственной программы № АААА-А17-117121270034-3. Замечания и редакционные правки д. г.-м. н. Г. А. Мизенса и д. г.-м. н. А. И. Антошкиной позволили улучшить текст статьи, за что автор выражает им свою глубокую признательность. Отдельная благодарность студентам Сыктывкарского ГУ (В. М. Михайлов, К. Р. Шилина) и Государственного университета «Дубна» (И. И. Пархета) за неоценимую помощь при проведении полевых работ.

Литература

1. Антошкина А. И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994. 154 с.
2. Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.
3. Антошкина А. И., Пономаренко Е. С., Канева Н. А. Фенестровые известняки как индикатор специфики позднедевонских морей, Тимано-Североуральский регион // Литология и полезные ископаемые. 2014. № 6. С. 493—505.
4. Елисеев А. И., Антошкина А. И., Салдин В. А., Никулова Н. Ю., Козырева И. В., Сандула А. Н. Формации палеозоя северо-восточной окраины Европейской платформы. Сыктывкар, 2006. 72 с. (Научные доклады / Коми НЦ УрО РАН; вып. 481).
5. Зональная стратиграфия фанерозоя России. СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. 256 с.
6. Кулешов В. Н. Эволюция изотопных углекислотно-водных систем в литогенезе. Сообщение 1. Седиментогенез и диагенез // Литология и полезные ископаемые. 2001. № 5. С. 491—508.
7. Пономаренко Е. С. Особенности строения микробных образований в системе «риф—лагуна» (на примере верхнедевонского рифового комплекса Седью, Южный Тиман) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

2019. №8. С. 14—19.

8. Пономаренко Е. С. Нижнелудфордские (верхний силур) склоновые отложения в разрезе Лягадин (р. Ильч, Северный Урал) // Литосфера. 2021. № 6 (в печати).

9. Пономаренко Е. С., Антоновская Т. В. Верхнедевонские разнофациальные отложения Южного Тимана: Путеводитель полевой экскурсии Всероссийского литологического совещания «Геология рифов», 10—14 июня 2015 г. Сыктывкар: Геопринт, 2015. 35 с.

10. Сулаев В. И., Хазов А. Ф. Изотопное диспропорционирование карбонатного углерода в процессах гипергенно-экзогенной перегруппировки вещества земной коры. Сыктывкар: Геопринт, 2003. 41 с.

11. Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий, 38. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. 131 с.

12. Antoshkina A. I., Zhegallo E. A., Isaenko S. I. Microbially Mediated Organomineralization in Paleozoic Carbonate Ooids // Paleontological Journal, 2020. Vol. 54. No 8. pp. 825—834. DOI: 10.1134/S003103012008002X

13. Flügel E. Microfacies of Carbonate Rocks, analysis, interpretation and application. Berlin: Springer Publisher, 2010. 984 pp.

14. James N. P., Choquette P. W. Limestones — the meteoric diagenesis environment // Diagenesis (Ed. by I. A. McIlreath, D. W. Morrow) / Geosci. Canada Reprint Ser., 1990. V. 11, No. 4. P. 161—194.

15. Kendall C. G. St. C., Alsharhan A. S. Holocene geomorphology and recent carbonate-evaporite sedimentation of the coastal region of Abu Dhabi, United Arab Emirates // Int. Assoc. Sedimentol. Spec. Publ., 2011. V. 43. P. 45—88.

16. Kendall C. G. St. C., Sadd J. L., Alsharhan A. Holocene marine cements of beach-rocks of the Abu Dhabi coastline (UAE); Analogs for cement fabrics in ancient limestones // Carbonates and Evaporites, 1994. V. 9. P. 119—131.

17. Kendall C. G. St. C., Shinn G., Janson X. Holocene cyanobacterial mats and lime muds: links to Middle East carbonate source rock potential. Abstract. // Proc. AAPG / SEPM Annual Meeting, Long Beach, 2007.

18. Kroopnik P. M. The distribution of ^{13}C of ΣCO_2 in the world oceans // Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 1985. V. 32. P. 57—84.

19. Morrow D. W. Diagenesis 1. Dolomite — Part 1: The chemistry of dolomitization and dolomite precipitation // Geoscience Canada, 1982, V. 9. P. 5—13.

20. Pratt B. R. The origin, biota and evolution of deep-water mud-mounds // Carbonate Mud Mounds. Their origin and evolution. (Ed. by C. L. V. Monty, D. W. J. Bosence, P. H. Bridges, B. R. Pratt) / Spec. Publ. Int. Assoc. Sedim., 1995. V. 23. P. 49—123.

21. Pratt B. R., Raviolo M. M., Bordonaro O. L. Carbonate platform dominated by peloidal sands: Lower Ordovician La Silla Formation of the eastern Precordillera, San Juan, Argentina // Sedimentology, 2012. V. 59. P. 843—866.

22. Purser B. H., Loreau J. P. Aragonitic supratidal encrustation on the Trucial Coast, Persian Gulf // The Persian Gulf: Holocene Carbonate Sedimentation in a Shallow Epicontinental Sea (Ed. by B. H. Purser). New York: Springer-Verlag, 1973. P. 343—376.

23. Teel C. S., Mazzullo S. J., Bischoff W. D. Dolomitization of Holocene shallow-marine deposits mediated by sulfate-reduction and methanogenesis in normal-salinity seawater,

Northern Belize // Journal of Sedimentary Research, 2000. V. 70. No. 3. P. 649–663.

24. Turner E. C., James N. P., Narbonne G. M. Taphonomic Control on Microstructure in Early Neoproterozoic Reefal Stromatolites and Thrombolites // Palaios, 2000. V. 15. P. 89–111.

25. Whitaker F. F., Smart P. L., Vahrenkamp V. C., Nicholson H., Wogelius R. A. Dolomitization by near-normal seawater? Field evidence from the Bahamas // Dolomites: A Volume in Honour of Dolomieu / Spec. Publ. Int. Ass. Sediment., 1994. V. 21. P. 111–132.

References

1. Antoshkina A. I. *Rify v paleozoye Pechorskogo Urala* (Reefs in the Paleozoic in the Petchorian Urals). St. Petersburg: Nauka, 1994, 154 pp.

2. Antoshkina A. I. *Rifoobrazovaniye v paleozoe (sever Urala i sopredel'nyye oblasti)* (Reef formation in the Paleozoic (northern part of the Urals and adjacent areas)). Ekaterinburg: UB RAS, 2003, 303 p.

3. Antoshkina A. I., Ponomarenko E. S., Kaneva N. A. *Fenestrovye izvestniaki kak indikator spetsifiki pozdnedevonskikh morei, Timano-Severouralskii region* (Fenestral Limestones: Specific Features of Late Devonian Sea in the Timan–northern Ural Region). Lithology and Mineral Resources, 2014, V. 49, No. 6, pp. 461–472.

4. Eliseev A. I., Antoshkina A. I., Saldin V. A., Nikulova N. Yu., Kozyreva I. V., Sandula A. N. *Formatsii paleozoya severo-vostochnoi okrainy Evropeyskoi platformy* (Paleozoic formations of the northeast margin of the European platform). Syktyvkar, 2006, 72 p. (Scientific Reports / Komi SC UB RAS: 481)

5. *Zonalnaya stratigrafiya fanerozoia Rossii* (Zonal stratigraphy of the Phanerozoic of the Russia). St. Petersburg: VSEGEI, 2006, 256 p.

6. Kuleshov V. N. *Evolutsiya izotopnykh uglekislотно-vodnykh system v litogeneze. Soobshcheniye 1. Sedimentogenez i diagenes*. (The isotope carbon dioxide–water system evolution in the lithogenesis. Message 1. Sedimentogenesis and diagenesis). Lithology and mineral resources, 2001, No. 5, pp. 491–508.

7. Ponomarenko E. S. *Osobennosti stroeniya mikronykh obrazovaniy v sisteme rif-laguna (na primere verkhnedevonskogo rifovogo kompleksa Sed'yu, Yuzhny Timan)* (Features of microbial structures in the reef–lagoon system (on example of the Upper Devonian Sed'yu Reef Complex, Southern Timan)). Vestnik of Institute of geology Komi SC UB RAS, 2019, No. 8, pp. 14–19.

8. Ponomarenko E. S. *Nizhneludfordskiy (verkhniy silur) sklonovyye otlozheniya v razreze L'agadin (r. Ilych, Severnyy Ural)* (Lower Ludfordian (Upper Silurian) slope deposits in the Lyagadin section (Ilych River, Northern Urals)). Lithosphere, 2022

9. Ponomarenko E. S., Antonovskaya T. V. *Verkhnedevonskiye raznofacial'nyye otlozheniya Juzhnogo Timana* (Upper Devonian deposits of the Southern Timan). *Putevoditel' polevoy ekskursii Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya «Geologiya Rifov»* (Guidebook of the field excursion of the All-Russian lithological meeting «Geology of Reefs»). Syktyvkar: Geoprint, 2015, 35 pp.

10. Silayev V. I., Khazov A. F. *Izotopnoye disproportcionirovaniye karbonatnogo ugleroda v processakh gipergenno-ekzogennoy peregruppirovki veshchestva zemnoy kory* (Isotopic disproportionation of carbonate carbon in the processes of hypergene-exogenous rearrangement of the Earth crust). Syktyvkar: Geoprint, 2003, 41 p.

11. *Sostoyaniye izuchennosti stratigraphii dokembriya i fanerozoia Rossii. Zadaci al'neyshikh issledovaniy* (The state of knowledge of the stratigraphy of the Precambrian and Phanerozoic in Russia. Challenges for further research) *Postanovleniya Mezhdvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissii* (Resolutions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees), 2008, 38, St. Petersburg: VSEGEI Press, 131 p.

12. Antoshkina A. I., Zhegallo E. A., Isaenko S. I. Microbially mediated organomineralization in Paleozoic carbonate ooids. Paleontological Journal, 2020, V. 54, No 8, pp. 825–834. DOI: 10.1134/S003103012008002X

13. Flügel E. Microfacies of Carbonate Rocks, analysis, interpretation and application. Berlin: Springer Publisher, 2010. 984 pp.

14. James N. P., Choquette P. W. Limestones — the meteoric diagenesis environment. Diagenesis (Ed. by I. A. McIlreath, D. W. Morrow). Geosci. Canada Reprint Ser., 1990, V. 11, No. 4, pp. 161–194.

15. Kendall C. G. St. C., Alsharhan A. S. Holocene geomorphology and recent carbonate–evaporite sedimentation of the coastal region of Abu Dhabi, United Arab Emirates. Int. Assoc. Sedimentol. Spec. Publ., 2011, V. 43, pp. 45–88.

16. Kendall C. G. St. C., Sadd J. L., Alsharhan A. Holocene marine cements of beach-rocks of the Abu Dhabi coastline (UAE); Analogs for cement fabrics in ancient limestones. Carbonates and Evaporites, 1994, V. 9, pp. 119–131.

17. Kendall C. G. St. C., Shinn G., Janson X. Holocene cyanobacterial mats and lime muds: links to Middle East carbonate source rock potential. Abstract. Proc. AAPG / SEPM Annual Meeting, Long Beach, 2007.

18. Kroopnik P. M. The distribution of ^{13}C of ΣCO_2 in the world oceans. Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 1985, V. 32, pp. 57–84.

19. Morrow D. W. Diagenesis 1. Dolomite — Part 1: The chemistry of dolomitization and dolomite precipitation. Geoscience Canada, 1982, V. 9, pp 5–13.

20. Pratt B. R. The origin, biota and evolution of deep-water mud-mounds. Carbonate Mud Mounds. Their origin and evolution. (Ed. by C. L. V. Monty, D. W. J. Bosence, P. H. Bridges, B. R. Pratt) / Spec. Publ. Int. Assoc. Sedim., 1995, V. 23, pp. 49–123.

21. Pratt B. R., Raviolo M. M., Bordonaro O. L. Carbonate platform dominated by peloidal sands: Lower Ordovician La Silla Formation of the eastern Precordillera, San Juan, Argentina. Sedimentology, 2012, V. 59, pp. 843–866.

22. Purser B. H., Loreau J. P. Aragonitic supratidal encrustation on the Trucial Coast, Persian Gulf. The Persian Gulf: Holocene Carbonate Sedimentation in a Shallow Epicontinental Sea (Ed. by B. H. Purser). New York: Springer-Verlag, 1973, pp. 343–376.

23. Teel C. S., Mazzullo S. J., Bischoff W. D. Dolomitization of Holocene shallow-marine deposits mediated by sulfate-reduction and methanogenesis in normal-salinity seawater, Northern Belize // Journal of Sedimentary Research, 2000, V. 70, No. 3, pp. 649–663.

24. Turner E. C., James N. P., Narbonne G. M. Taphonomic Control on Microstructure in Early Neoproterozoic Reefal Stromatolites and Thrombolites. Palaios, 2000, V. 15, pp. 89–111.

25. Whitaker F. F., Smart P. L., Vahrenkamp V. C., Nicholson H., Wogelius R. A. Dolomitization by near-normal seawater? Field evidence from the Bahamas. Dolomites: A Volume in Honour of Dolomieu. Spec. Publ. Int. Ass. Sediment., 1994, V. 21, pp. 111–132.

Поступила в редакцию / Received 08.10.2021