ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека

Препринты ИПМ • Препринт № 35 за 2020 г.

ISSN 2071-2898 (Print)
ISSN 2071-2901 (Online)

Колесниченко А.В.

Термодинамика Бозе-газа и
черного излучения в
неэкстенсивной статистике
Тсаллиса

Рекомендуемая форма библиографической ссылки: Колесниченко А.В. Термодинамика Бозе-газа и черного излучения в неэкстенсивной статистике Тсаллиса // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 35. 28 с. <http://doi.org/10.20948/prepr-2020-35>
URL: <http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2020-35>

О р д е н а Л е н и н а
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
имени М.В. Келдыша
Р о с с и й с к о й а к а д е м и и н а у к

А.В. Колесниченко

**Термодинамика Бозе-газа
и черного излучения
в неэкстенсивной статистике Тсаллиса**

Москва — 2020

Колесниченко А.В.

Термодинамика Бозе-газа и черного излучения в неэкстенсивной статистике Тсаллиса

Аннотация. Целью данной работы является построение термодинамики открытых квантовых неэкстенсивных систем элементарных частиц Бозе-газа в рамках статистики Тсаллиса, основанной на модифицированной квантовой энтропии, зависящей от действительного параметра. Получены обобщенные выражения для термодинамического потенциала, внутренней энергии, свободной энергии, удельной теплоты и давления, а также основные термодинамические уравнения. Обсуждаются модифицированные равновесные распределения Бозе–Эйнштейна для массивных частиц и обобщенные законы Планка, Рэлея–Джинса и Вина для фотонов, которые могут быть применимы к различным физическим задачам, в частности, к описанию космического черного излучения. Исходным основанием подобного рассмотрения фотонного газа является предположение, согласно которому распределение фотонов космического фонового излучения (находящегося в тепловом равновесии) может отличаться от классического распределения Планка из-за влияния дальнедействующего гравитационного воздействия на больших расстояниях. Это влияние, возможно, является отражением того отдаленного во времени факта, согласно которому материя и свет были сильно связаны между собой.

Обобщенная термодинамика фотонного газа может быть использована, в частности, в качестве теоретического обоснования экспериментальных исследований чернотельной радиации внутри разнообразных астрофизических объектов.

Ключевые слова: неэкстенсивная статистика Тсаллиса, дивергенция Брэгмана, квантовая энтропия Бозе.

Aleksandr Vladimirovich Kolesnichenko

Thermodynamics of the Bose gas and black radiation in non-extensive Tsallis statistics.

Abstract. The aim of this work is to construct the thermodynamics of open quantum nonextensive systems of elementary Bose- gas particles in the framework of Tsallis statistics based on modified quantum entropy, which depends on the real number q . Generalized expressions for the thermodynamic potential, internal energy, free energy, specific heat and pressure, as well as the basic thermodynamic equations are obtained. Modified equilibrium Bose– Einstein distributions for bulk particles and generalized Planck, Rayleigh– Jeans, and Wien laws for photons that can be applied to various physical problems, in particular, to the description of black cosmic radiation, are discussed. The initial basis for such a consideration is the assumption that the distribution of photons of cosmic background radiation (in thermal equilibrium) may differ from the classical Planck distribution due to the influence of long-range gravitational effects at large distances. This influence is probably a reflection of the fact remote in time, according to which matter and light were strongly interconnected.

The generalized thermodynamics of photon gas can be used, in particular, as a theoretical justification for experimental studies of ink radiation inside various astrophysical objects.

Key words: non-extensive statistics of Tsallis, Bose quantum entropy, Bregman divergence.

ВВЕДЕНИЕ

Как теперь стало понятно, статистическая механика Больцмана–Гиббса и стандартная термодинамика не являются вполне универсальными теориями, поскольку они имеют ограниченные области применимости. В качестве примера можно привести невозможность в рамках статистики БГ объяснить спектр космических лучей – одной из наиболее важных систем релятивистских частиц.

В физике и в других естественных науках, использующих методы статистической механики, известны многочисленные примеры сложных (аномальных) систем, которым присущи эффекты сильного дальнего действия, нелокальные корреляции между отдельными элементами системы (помнящей свое прошлое), фрактальный характер фазового пространства, немарковское поведение. Сложная пространственно-временная структура подобных систем приводит к нарушению принципа аддитивности для таких важнейших термодинамических характеристик, как энтропия или внутренняя энергия.

В связи с этим исследования в области механики неаддитивных (неэкстенсивных) систем стали в последнее время предметом значительного интереса, что объясняется как новизной возникающих здесь общетеоретических проблем, так и важностью практических приложений. Начало систематического изучения в этом направлении связано с работой К. Тсаллиса (Tsallis, 1988), в которой был введен функционал энтропии $S_q(p) := k_B(q-1)^{-1} \left[1 - \int p^q d\Gamma' \right]$, зависящей от некоторого действительного числа q (так называемого параметра деформации) и обладающей неаддитивностью для совокупности независимых аномальных систем. Важно, что в пределе слабой связи $q \rightarrow 1$ энтропия Тсаллиса переходит в энтропию БГ. Наиболее существенным преимуществом, основанной на энтропии Тсаллиса¹⁾ статистики, по сравнению со статистической механикой БГ, является то, что она приводит к асимптотическому степенному закону распределения вероятностей, который отличен от экспоненциального поведения, порожденного классическим распределением Гиббса.

Неэкстенсивная статистика, в настоящее время интенсивно развивается. Возникают многочисленные новые математические проблемы, требующие своего решения. В научной литературе доступны многочисленные коллекции миниобзоров (см., например, Tsallis, 1999; Abe, Okamoto, 2001; Grigolini и др.,

¹⁾ Заметим, что, хотя эта энтропия получила название энтропии Тсаллиса, в историческом плане появление q -энтропии можно проследить по более ранним работам (Harvda, Charvat, 1967; Daroczy, 1970).

2002; Kaniadakis и др., 2002, 2006; Kaniadakis, Lissia, 2004; Gell-Mann, Tsallis, 2004; Herrmann и др., 2004; Колесниченко, 2019). Эта статистика успешно применяется ко многим природным системам, в частности, к ранней вселенной (Pessah и др., 2001), к космической плазме (Lima и др., 2000), к космологическим проблемам (к трехмерной гравитационной проблеме N-тел), к астрофизическим проблемам (например, при толковании черных дыр, суперструн, темной материи (Leubner, 2005)) и так далее. Моделированию Бозе-газа и чернотельному излучению в рамках неэкстенсивной статистики также посвящено большое число публикаций (см., например, Tsallis и др., 1995; Plastino и др., 1995; Tirnakli и др., 1997; Lenzi, Mendes, 1998; Wang, Le Méhauté, 1998; Wang и др., 1998; Büyükkilic., Demirhan, 2000; Anchrordoqui, Torres, 2001; Martinez и др., 2001, 2002; Chamati и др., 2006; Zaripov, 2009; Rovenchak, 2018; Ma и др., 2019; Kolesnichenko, 2020).

Тем не менее, в настоящей работе вновь предлагается обсудить в рамках формализма Тсаллиса механизм чернотельного излучения применительно к задачам космологии. Исходным основанием подобного рассмотрения является утверждение, согласно которому существующее космическое фоновое излучение (находящееся по предположению в тепловом равновесии) может несколько отличаться от классического закона излучения черного тела Планка из-за влияния дальнодействующего гравитационного воздействия на больших расстояниях (Mather и др. 1994). Это влияние может быть отражением того отдаленного во времени факта, когда материя и свет были сильно связаны между собой, или же оно является результатом еще более замысловатых природных явлений (Sistema, Vucetich, 2005).

Уместность предпринятого здесь обсуждения данной проблемы, по мнению автора статьи, связана со следующим обстоятельством. В статистической механике Тсаллиса возможно осреднение микроскопических физических величин с помощью трех распределений: $p(r)$, $p^q(r)$, $p^q(r)/\int p^q(r)d\Gamma$. Первое осреднение соответствует первоначальной статистике Тсаллиса (Tsallis, 1988), второе (ненормированное) осреднение – статистике Курадо–Тсаллиса (Curado, Tsallis, 1991; Зарипов, 2002, Колесниченко, 2018), третье осреднение – статистике Тсаллиса–Мендеса–Пластино (Tsallis и др., 1998). Эти способы осреднения, каждый из которых имеет, вообще говоря, свои преимущества и недостатки, предопределяют совершенно разные q -термодинамики. По этой причине вопрос об использовании того или иного приема осреднения в физических приложениях носит принципиальный характер, поскольку различия в определении средних значений могут оказаться существенными при обработке эксперимен-

тальных данных.

Вместе с тем получаемые при этом существенные несоответствия могут быть, по мысли ряда авторов, благополучно устранены путём использования статистики Тсаллиса–Мендеса–Пластино, когда осреднение производится по так называемому нормированному эскортному распределению вероятности $P_q(\mathbf{r}) := p^q / \int p^q d\Gamma'$ (см., например, Tsallis и др., 1998; Tsallis, 1999; Martinez и др., 2000). Однако существует и иная точка зрения (которой автор придерживается в данной работе), согласно которой единственно правильным осреднением является осреднение с ненормированным распределением p^q , используемое в аксиоматическом обосновании рассматриваемой неэкстенсивной статистики (см. Havrda, Charvat, 1967; Daroczy, 1970). Она обуславливается, в частности, тем, что только это распределение не приводит к переопределению понятия температуры q -системы, которая в этой статистике является интенсивным параметром (абсолютной температурой T), а не функционалом (так называемой физической температурой T_{ph} , зависящей от энтропии S_q), как это происходит при иных определениях взвешенного среднего. Отметим, что эти и некоторые другие убедительные соображения в пользу осреднения Курадо–Тсаллиса приведены в монографии (Зарипов, 2002).

Возвращаясь к уместности появления данной работы, заметим, что во многих цитируемых выше публикациях по заявленной тематике некоторые авторы (см., например, Tirnakli и др., 1997; Wang и др., 1998; Rovenchak, 2018) в качестве отправной точки использовали обобщенное распределение Планка в виде:

$$\bar{n}_j(T, q) = 1 / \left\{ \left[1 + (q-1) \frac{\hbar\omega_j}{k_B T} \right]^{\frac{1}{q-1}} - 1 \right\}.$$

Можно легко убедиться в том, что к по-

добному распределению собственных частот излучения приводит условие максимума модифицированной энтропии Бозе-газа в статистике Тсаллиса только в том случае, когда осреднение физических величин производится с помощью распределения $p^q(\mathbf{r})$ (Büyükkilic, Demirhan, 2000; Зарипов, 2010). Несмотря на это, те же авторы в своих работах использовали осреднение с распределением $p(\mathbf{r})$, соответствующее оригинальной статистике Тсаллиса. В ряде других публикаций (см., например, Martinez и др., 2002; Ма и др. 2019) за исходное распределение неэкстенсивного фотонного газа принималось обобщенное распределение Планка $\bar{n}_j(T_{ph}, q)$ с физической температурой, что представляется со-

вершено не практичным, поскольку измерение физической температуры T_{ph} нереально, что связано с ее зависимостью от энтропии S_q .

В представленной здесь работе с единых позиций изложен круг вопросов, связанных с конструированием деформированной термодинамики и чернотельного излучения на основе модифицированных для неэкстенсивных систем энтропии Бозе-газа и соответствующей дивергенции Брэгмана. При этом при получении всех термодинамических величин систематически использовано осреднение Курадо–Тсаллиса. Проведенное исследование базируется на свойствах негиббсового канонического ансамбля бозонных систем, полученного из принципа Джейнса (Jaynes, 1963) максимума q -энтропии при заданности усредненной внутренней энергии и полного числа частиц Бозе-газа. Получены обобщенные выражения для термодинамического потенциала, полной и свободной энергии, энтропии, удельной теплоты, давления и теплоемкости, а также дифференциальные термодинамические уравнения для бозонного газа. Показано, что сохраняются принцип максимума равновесной энтропии, лежандрова структура теории и H -теорема обычной статистической механики БГ. Получено статистическое распределение для массивных бозонов, а также обобщение классического закона Планка для теплового спектра космического фонового излучения в рамках статистики Тсаллиса. Показано, что все эти величины восстанавливают свои стандартные выражения в пределе $q \rightarrow 1$.

Результаты работы могут быть использованы, в частности, в качестве теоретического обоснования экспериментальных исследований чернотельной радиации, таких как исследование микроволнового фонового излучения.

1. ЭЛЕМЕНТЫ НЕАДДИТИВНОЙ СТАТИСТИКИ ТСАЛЛИСА

В статистической механике Тсаллиса для непрерывных величин при вероятностной нормировке

$$\int p(\mathbf{r}) d\Gamma' = 1, \quad 0 \leq p < \infty \quad (1)$$

для фазовой функции распределения $p(\mathbf{r})$ (в общем случае эта функция может зависеть от времени t и от внешних параметров $\{a_k\}$) энтропия Тсаллиса для вещества задаётся следующим функционалом (Tsallis, 1988):

$$S_q(p) := \frac{k_B}{q-1} \left(1 - \int p^q d\Gamma' \right). \quad (2)$$

Здесь и далее везде область интегрирования совпадает со всем $6N$ -мерным фазовым пространством $\mathbf{r} := \{q_1, \dots, q_N; p_1, \dots, p_N\}$, безразмерный элемент которого записывается в следующей современной форме $d\Gamma' := (2\pi\hbar)^{-s} d\mathbf{r}$ (где $d\mathbf{r} := \prod_j dq_j dp_j$; $k_B \simeq 1.380662 \cdot 10^{-16}$ эрг/К – постоянная Больцмана; $\hbar = h/2\pi$; $h \simeq 6.626117 \cdot 10^{-27}$ эрг·с – постоянная Планка). Энтропийный индекс q представляет собой вещественное число, принадлежащее области $q \in \mathbf{R}$. Такая деформированная энтропия позволяет учитывать важную особенность поведения аномальных материальных систем с длинной памятью и/или дальнедействующими силовыми взаимодействиями, при которых вероятность реализации $p(\mathbf{r})$ больших значений состояний убывает (при $q > 1$) не экспоненциально, а степенным образом.

Можно показать, что в пределе слабой связи энтропия Тсаллиса (2) переходит в классическую формулу для энтропии S_{BG} в статистике Больцмана–Гиббса. Действительно, в пределе $q \rightarrow 1$ имеем:

$$p^{q-1} = \exp\{(q-1)\ln p\} \rightarrow 1 + (q-1)\ln p,$$

и энтропия S_q сводится к $S(p) = \lim_{q \rightarrow 1} S_q(p) = -k_B \int p \ln p d\Gamma' = S_{BG}$.

Если состояние физической двухкомпонентной системы описывается совместным мультипликативным распределением $p_{12} = p_1 p_2$ с $p_{12} = p_{12}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, $p_1 = p_1(\mathbf{r}_1)$, $p_2 = p_2(\mathbf{r}_2)$, которое может зависеть от времени t , а $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ относятся к двум независимым q -системам, то общая энтропия даётся выражением

$$\begin{aligned} S_q(p_{12}) &= \frac{k_B}{q-1} \left(1 - \iint p_{12}^q d\Gamma'_1 d\Gamma'_2 \right) = \\ &= S_q(p_1) + S_q(p_2) + \frac{1-q}{k_B} S_q(p_1) S_q(p_2). \end{aligned} \quad (3)$$

Соотношение (3) выражает свойство неаддитивности для энтропии совокупной системы в статистике Тсаллиса.

Энтропия Тсаллиса (2) может быть представлена в следующей эквивалентной форме:

$$S_q(p) = -k_B \int p^q \ln_q(p) d\Gamma' = -k_B \langle \ln_q p \rangle_q, \quad (4)$$

при написании которой использовано осреднение с ненормированным распределением p^q (свойственным статистике Курадо-Тсаллиса (Curado, Tsallis, 1991))

$$\langle \mathcal{A} \rangle_q := \int p^q \mathcal{A}(\mathbf{r}) d\Gamma', \quad (5)$$

для произвольной физической величины $\mathcal{A}(\mathbf{r})$, а также так называемый «деформированный логарифм»

$$\ln_q x := \frac{x^{1-q} - 1}{1-q} \quad (x \in \mathbf{R}^+; q \in \mathbf{R}). \quad (6)$$

Экстремальное значение энтропии Тсаллиса. Аналог равновесного распределения Гиббса в статистике Курадо–Тсаллиса может быть получен, как и в классическом случае, из экстремума энтропии (2) при выполнении условия сохранения нормировки (1) и заданном значении средней энергии системы

$$\mathcal{E}_q \equiv \langle \mathcal{H} \rangle_q := \int \mathcal{H}(\mathbf{r}) p^q d\Gamma' = const, \quad (7)$$

где функция Гамильтона $\mathcal{H}(\mathbf{r})$ задаётся математической моделью изучаемых физических процессов. В соответствии с теоремой Лагранжа вероятное распределение $p(\mathbf{r})$, «экстремизирующее» энтропию Тсаллиса $\mathcal{S}_q(p)$, при указанных ограничениях имеет вид (см., например, Колесниченко, 2019):

$$p(\mathbf{r}) = Z_q^{-1}(\beta) \left[1 - k_B^{-1}(1-q)\beta \mathcal{H}(\mathbf{r}) \right]^{1/1-q}, \quad (8)$$

где

$$Z_q = \int \left[1 - k_B^{-1}(1-q)\beta \mathcal{H}(\mathbf{r}) \right]^{1/1-q} d\Gamma' \quad (9)$$

– обобщённый статистический интеграл, определяемый из условия нормировки (1); множитель Лагранжа β (обратная эффективная температура, $\beta = 1/T$) определяется из уравнения, получаемого подстановкой (8) в (7).

Распределение (8) удобно записать в виде, аналогичном классической форме Гиббса

$$p(\mathbf{r}, \beta) = Z_q^{-1} \exp_q \left\{ -k_B^{-1} \beta \mathcal{H}(\mathbf{r}) \right\}, \quad (10)$$

выражая стоящую в (8) степенную функцию $[..]^{1/1-q}$ через так называемую экспоненту Тсаллиса, которая определяется следующим образом (Тсаллис, 2009):

$$\exp_q(x) \equiv [1 + (1-q)x]_+^{\frac{1}{1-q}} = \begin{cases} 0, & \text{если } q < 1 \text{ и } x < -1/(1-q); \\ [1 + (1-q)x]^{1/1-q}, & \text{если } q < 1 \text{ и } x \geq -1/(1-q); \\ [1 + (1-q)x]^{1/1-q}, & \text{если } q > 1 \text{ и } x < -1/(1-q). \end{cases} \quad (11)$$

Здесь выражение, стоящее в квадратных скобках, либо положительно, либо равно нулю, $[y]_+ \equiv \max(y, 0)$. Легко проверить, что в пределе $q \rightarrow 1$ эта функция принимает стандартный вид: $\exp_q(x) = \exp(x)$.
 $q \rightarrow 1$

Используя определения деформированных функций $\ln_q x$ и $\exp_q(x)$, легко можно убедиться в том, что имеют место следующие соотношения:

$$\ln_q(x) = x^{1-q} \ln_{2-q}(x), \quad \ln_q(1/x) + \ln_{2-q}(x) = 0, \quad (\forall x; \forall q), \quad (12)$$

$$\ln_{2-q} x = \frac{x^{q-1} - 1}{q-1}, \quad \ln_q\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^{1-q}} \ln_q x, \quad (\forall x; \forall q), \quad (13)$$

$$\exp_q[\ln_q(x)] = \ln_q[\exp_q(x)] = x, \quad \exp_{2-q}(-x) = 1/\exp_q(x), \quad (\forall x; \forall q), \quad (14)$$

$$\exp_{2-q}(x) = [1 - (1-q)x]^{1/(q-1)}, \quad (\forall x; \forall q), \quad (15)$$

$$\ln_q(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2q + \frac{1}{6}x^3q(1+q) - \frac{1}{24}x^4q(1+q)(2+q) + \dots, \quad (\forall q), \quad (16)$$

$$x \rightarrow 0$$

$$\exp_q(x) = 1+x + \frac{1}{2}x^2q + \frac{1}{6}x^3q(2q-1) + \frac{1}{24}x^4q(2q-1)(3q-2) + \dots \quad (\forall q), \quad (17)$$

$$x \rightarrow 0$$

$$\frac{d}{dx} \ln_q x = \frac{1}{x^q}, \quad \frac{d}{dx} \exp_q(x) = [\exp_q(x)]^q, \quad (x > 0; \forall q). \quad (18)$$

Далее эти соотношения будут широко использованы.

2. ЭНТРОПИЯ БОЗЕ-ГАЗА В СТАТИСТИКЕ БОЛЬЦМАНА–ГИББСА

Бозе-газ состоит из бозонов — частиц, имеющих целый спин и подчиняющихся статистике Бозе–Эйнштейна. Бозе создал статистическую механику для газа фотонов, а Эйнштейн развил её для описания массивных частиц.

Напомним классический вероятностно-статистический способ вычисления энтропии Бозе-газа. С этой целью рассматриваются различные равновероятные группы квантовых состояний $j = 1, 2, \dots$, которыми может быть реализовано изучаемое макроскопическое состояние ансамбля из $\mathcal{N}$ газовых частиц. $6\mathcal{N}$ -мерное фазовое пространство делится на $\mathcal{M}$ ячеек безразмерного объема $g_j := (2\pi\hbar)^{-s}(\Delta q_j \Delta p_j)$, который характеризует максимально возможное число микросостояний в j -ой ячейке, содержащей n_j Бозе-частиц (здесь s — число степеней свободы элементарной частицы). Далее определяется число всех возможных способов заполнения $\mathcal{N} = \sum_j n_j$ частиц по $\mathcal{M}$ ячейкам. Данное число является по определению статистическим весом $\Delta\Gamma$, характеризующим вероятность макроскопического состояния системы. Если теперь каждую группу из n_j частиц рассматривать как независимую подсистему и обозначить посредством $\Delta\Gamma_{n_j}$ ее статистический вес, то можно написать: $\Delta\Gamma = \prod_j \Delta\Gamma_{n_j}$. В классической статистике энтропия выражается логарифмической мерой статистического веса $\mathcal{S} := k_B \ln \Delta\Gamma = k_B \ln \prod_j \Delta\Gamma_{n_j}$. В случае статистики Бозе–Эйнштейна в каждом квантовом состоянии может находиться любое число частиц, так что статистический вес $\Delta\Gamma_{n_j}$ есть число всех способов, которыми можно распределить n_j частиц по g_j состояниям. Статистический вес в статисти-

ке Бозе имеет вид $\Delta\Gamma_{n_j} = \frac{(g_j + n_j - 1)!}{n_j!(g_j - 1)!}$, вытекающий из условия, что в

ячейке может находиться любое количество частиц. Логарифмируя это выражение и воспользовавшись для логарифмов всех трех факториалов приближенной формулой Стирлинга $\ln x! = x \ln(x/e)$, найдем:

$$\mathcal{S}_{\mathcal{N}} = -k_B \sum_j \left\{ n_j \ln n_j + g_j \ln g_j - (g_j + n_j) \ln(g_j + n_j) \right\}. \quad (19)$$

Если записать эту формулу, используя среднее число $\bar{n}_j = n_j / g_j$ частиц в каждом из квантовых состояний j -й группы, то получим известное выражение

для энтропии неравновесного Бозе-газа в классическом случае (см. Ландау, Лифшиц, 1964):

$$\mathcal{S}_{\mathcal{N}} = -k_{\mathcal{B}} \sum_j g_j \left\{ \bar{n}_j \ln \bar{n}_j - (1 + \bar{n}_j) \ln(1 + \bar{n}_j) \right\}. \quad (20)$$

Легко убедиться в том, что условие экстремальности энтропии $\mathcal{S}_{\mathcal{N}}$ приводит к дискретному распределению Бозе–Эйнштейна:

$$\bar{n}_j = \left\{ \exp\left(\frac{\varepsilon_j - \mu}{k_{\mathcal{B}} T}\right) - 1 \right\}^{-1}. \quad (21)$$

Заметим, что величина $\bar{n}_j$ есть дискретный аналог непрерывной функции распределения $D(\mathbf{r}, t)$ по фазовому пространству $\mathbf{r} := \{\mathbf{q}; \mathbf{p}\}$. Переход от дискретного распределения $\bar{n}_j$ к плотности распределения Бозе частиц в фазовом пространстве $D(\mathbf{r}, t)$ осуществляется заменой суммирования по j интегрированием по всему фазовому пространству, безразмерный элемент которого определяется соотношением $d\Gamma := g(2\pi\hbar)^{-S} d\mathbf{r}$ (здесь $g = 2S + 1$, S – спин частицы; $d\mathbf{r} := d\mathbf{q} d\mathbf{p} = d\mathbf{p} d\mathcal{V}_{\mathcal{N}}$)²⁾. В итоге получим следующее выражение для энтропии неравновесного Бозе-газа в случае непрерывных распределений:

$$\mathcal{S}(t) = -k_{\mathcal{B}} \int \left\{ D(\mathbf{r}, t) \ln D(\mathbf{r}, t) - [1 + D(\mathbf{r}, t)] \ln[1 + D(\mathbf{r}, t)] \right\} d\Gamma. \quad (22)$$

Приведем также выражение для так называемой физической информации различия Бозе-газа $\mathcal{I}_{12}$, характеризующей переходы между двумя состояниями неравновесной системы. Величина $\mathcal{I}_{12}$, являющаяся знакоопределенным функционалом (функцией Ляпунова), определяет меру статистической упорядоченности в микросостояниях системы с распределением $\bar{n}_{1j}$ относительно ее состояния с распределением $\bar{n}_{2j}$.

В дискретном случае эта величина имеет вид (см. Зарипов, 2010):

$$\mathcal{I}_{12}[\bar{n}_1 : \bar{n}_2] := k_{\mathcal{B}} \sum_j g_j \left[\bar{n}_{1j} \ln \frac{\bar{n}_{1j}}{\bar{n}_{2j}} - (1 + \bar{n}_{1j}) \ln \left(\frac{1 + \bar{n}_{1j}}{1 + \bar{n}_{2j}} \right) \right] \geq 0, \quad (23)$$

²⁾ Заметим, что часто интегрирование по $d\mathcal{V}_{\mathcal{N}}$ сводится к замене $d\mathcal{V}_{\mathcal{N}}$ на полный объем $\mathcal{V}_{\mathcal{N}}$ газа.

а для непрерывного аналога имеем:

$$\mathcal{I}_{12} := k_B \int \left[D_1 \ln \left(\frac{D_1}{D_2} \right) - (1+D_1) \ln \left(\frac{1+D_1}{1+D_2} \right) \right] d\Gamma \geq 0. \quad (24)$$

3. ЭНТРОПИЯ БОЗЕ–ГАЗА В СТАТИСТИКЕ ТСАЛЛИСА

Обобщенное выражение квантовой энтропии (20) для Бозе-газа, полученное в рамках неэкстенсивной статистики Тсаллиса в работах (Büyükkılıç, Demirhan, 1993, 2004), имеет вид:

$$S_q := \frac{k_B}{q-1} \sum_j g_j \left[-\bar{n}_j^q - 1 + (1 + \bar{n}_j)^q \right]. \quad (25)$$

Энтропию (25) удобно представить в следующих эквивалентных двух формах:

$$\begin{aligned} S_q &= \frac{k_B}{1-q} \sum_j g_j \bar{n}_j^q \left[1 - \left(\frac{1 + \bar{n}_j}{\bar{n}_j} \right)^{q-1} \right] + \frac{k_B}{1-q} \sum_j g_j \left[1 - (1 + \bar{n}_j)^{q-1} \right] = \\ &= k_B \sum_j g_j \left[\bar{n}_j^q \ln_{2-q} \left(\frac{1 + \bar{n}_j}{\bar{n}_j} \right) + \ln_{2-q} (1 + \bar{n}_j) \right] = \\ &= k_B \sum_j g_j (1 + \bar{n}_j)^{q-1} \left[\bar{n}_j \ln_q \left(\frac{1 + \bar{n}_j}{\bar{n}_j} \right) + \ln_q (1 + \bar{n}_j) \right]. \end{aligned} \quad (26)$$

При $q \rightarrow 1$ из (26) вытекает выражение (20) для энтропии неравновесного Бозе-газа для аддитивных систем.

Совершая переход от суммирования к интегрированию в формуле (25), получим выражение для квантовой энтропии в случае непрерывных распределений

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_q &= \frac{k_B}{q-1} \int \left\{ -[D(\mathbf{r})]^q - 1 + [1 + D(\mathbf{r})]^q \right\} d\Gamma = \\ &= k_B \int \left[[D(\mathbf{r})]^q \ln_{2-q} \left(\frac{1 + D(\mathbf{r})}{D(\mathbf{r})} \right) + \ln_{2-q} (1 + D(\mathbf{r})) \right] d\Gamma. \end{aligned} \quad (27)$$

Здесь $D(\mathbf{r})$ – плотность распределения квантовых частиц в фазовом пространстве $\mathbf{r}$. Используя (27), легко показать, что в статистике Тсаллиса энтропия Бозе-газа двух независимых систем не обладает свойством аддитивности.

Экстремум энтропии и равновесные состояния. Равновесные состояния неэкстенсивных систем характеризуются распределениями, которые не меняются с течением времени. В состоянии равновесия энтропия должна иметь максимальное значение. Покажем, каким образом из этого требования можно найти функцию распределения частиц Бозе-газа в состоянии статистического равновесия. Задача заключается в нахождении таких $\bar{n}_j$, при которых квантовая энтропия (25) имеет максимальное значение, возможное при дополнительных условиях

$$\mathcal{E}_q := \sum_j g_j \varepsilon_j \bar{n}_j^q = \text{const}, \quad \mathcal{N}_q := \sum_j g_j \bar{n}_j^q = \text{const}, \quad (28)$$

выражающих постоянство полного числа частиц $\mathcal{N}_q$ и полной энергии $\mathcal{E}_q$ газа. Следуя известному методу неопределенных множителей Лагранжа, надо приравнять нулю первую вариацию функционала

$$\mathcal{L}(\bar{n}_j) := \mathcal{S}_q - \beta \sum_j g_j \varepsilon_j \bar{n}_j^q + \beta \mu \sum_j g_j \bar{n}_j^q, \quad (29)$$

где β и μ – некоторые постоянные. Произведя дифференцирование, найдем:

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \bar{n}_j} = \frac{k_B}{q-1} \sum_j g_j q \left\{ \left[-\bar{n}_j^{q-1} + (1 + \bar{n}_j)^{q-1} \right] - \frac{(q-1)\beta}{k_B} (\varepsilon_j - \mu) \bar{n}_j^{q-1} \right\} = 0, \quad (30)$$

откуда

$$\frac{1 + \bar{n}_{j0}}{\bar{n}_{j0}} = \left[1 - k_B^{-1} (1-q) \beta_0 (\varepsilon_j - \mu_0) \right]^{1/(q-1)} \equiv \exp_{2-q} \left[\frac{\beta_0 (\varepsilon_j - \mu_0)}{k_B} \right], \quad (31)$$

или

$$\bar{n}_{j0} = \frac{1}{\left[1 + (q-1) \frac{\varepsilon_j - \mu_0}{k_B T_0} \right]^{1/q-1} - 1} = \frac{1}{\exp_{2-q} \left(\frac{\varepsilon_j - \mu_0}{k_B T_0} \right) - 1}. \quad (32)$$

Это есть не что иное, как обобщенное распределение Бозе–Энштейна в статистике Тсаллиса. Здесь $T_0 = 1/\beta_0$ – равновесная температура и μ_0 – равновесный химический потенциал Бозе-газа ($\mu_0 < 0$).

С помощью распределения (32) могут быть вычислены равновесные значения полного числа частиц и полной энергии системы:

$$\mathcal{N}_{q0} := \sum_j g_j \bar{n}_{j0}^q = \sum_j g_j \left\{ \exp_{2-q} \left[(\varepsilon_j - \mu_0) / k_B T_0 \right] - 1 \right\}^{-q}, \quad (33)$$

$$\mathcal{E}_{q0} := \sum_j g_j \varepsilon_j \bar{n}_{j0}^q = \sum_j g_j \varepsilon_j \left\{ \exp_{2-q} \left[(\varepsilon_j - \mu_0) / k_B T_0 \right] - 1 \right\}^{-q}. \quad (34)$$

Заметим, что формула (33) определяет в неявном виде химический потенциал $\mu_0(T_0, \mathcal{N}_{q0})$ Бозе-газа как функцию от температуры T_0 и полного числа частиц $\mathcal{N}_{q0}$.

Термодинамические соотношения. Получим теперь экстремальное значение S_{q0} энтропии и основные термодинамические соотношения. Подставляя распределение (31) в выражение (26) для энтропии и используя формулы (14), получим:

$$\begin{aligned} S_{q0} &= k_B \sum_j g_j \left[\bar{n}_{j0}^q \ln_{2-q} \left(\frac{1 + \bar{n}_{j0}}{\bar{n}_{j0}} \right) + \ln_{2-q}(1 + \bar{n}_{j0}) \right] = \\ &= k_B \sum_j g_j \left[\bar{n}_{j0}^q \frac{\beta_0(\varepsilon_j - \mu_0)}{k_B} + \ln_{2-q}(1 + \bar{n}_{j0}) \right] = \\ &= \beta_0(\mathcal{E}_q - \mu_0 \mathcal{N}_q) + k_B \sum_j g_j \ln_{2-q}(1 + \bar{n}_{j0}) = \\ &= \beta_0(\mathcal{E}_{q0} - \mu_0 \mathcal{N}_{q0}) - \beta_0 \Omega_{q0}. \end{aligned} \quad (35)$$

Здесь

$$\Omega_q := \sum_j \Omega_{qj} = -k_B \beta^{-1} \sum_j g_j \ln_{2-q}(1 + \bar{n}_{j0}) \quad (36)$$

– термодинамический потенциал полного числа частиц бозонного газа; Ω_{qj} – термодинамический потенциал частиц в j -ом квантовом состоянии, определяемый соотношением

$$\begin{aligned} \Omega_{qj} &:= -\frac{k_B}{\beta(1-q)} G_j \left[1 - (1 + \bar{n}_j)^{q-1} \right] = -k_B \beta^{-1} g_j \ln_{2-q}(1 + \bar{n}_{j0}) = \\ &= G_j k_B \beta^{-1} \ln_q \left\{ 1 - \left[\exp_{2-q} \left(\frac{\varepsilon_j - \mu_0}{k_B T_0} \right) \right]^{-1} \right\}. \end{aligned} \quad (37)$$

Используя производные по β_0 , μ_0 и ε_j от распределения $\bar{n}_{j0}$

$$\left(\frac{\partial \bar{n}_{j0}}{\partial \beta_0} \right)_{\mu_0} = -k_B^{-1} \{1 + \bar{n}_{j0}\}^{2-q} n_{j0}^q (\varepsilon_j - \mu_0),$$

$$\left(\frac{\partial \bar{n}_{j0}}{\partial \mu_0} \right)_{\beta_0} = -k_B^{-1} \beta_0 \bar{n}_{j0}^q \{1 + \bar{n}_{j0}\}^{2-q}, \quad \left(\frac{\partial \bar{n}_{j0}}{\partial \varepsilon_j} \right)_{\mu_0} = \beta_0 k_B^{-1} n_{j0}^q \{1 + \bar{n}_{j0}\}^{2-q}, \quad (38)$$

и формулы (18), легко получить следующие уравнения равновесной термодинамики для систем с переменным числом частиц:

$$\Omega_{q0} = -k_B \beta^{-1} \sum_j g_j \ln_{2-q}(1 + \bar{n}_{j0}), \quad (39)$$

$$\mathcal{N}_{q0} = -\frac{\partial \Omega_{q0}}{\partial \mu_0}, \quad \bar{n}_{j0}^q = -\frac{\partial \Omega_{qj}}{\partial \mu_0}, \quad (40)$$

$$\partial(\beta_0 \Omega_{q0}) / \partial \beta_0 = \mathcal{E}_{q0} - \mu_0 \sum_j g_j \bar{n}_{j0}^q, \quad \mathcal{S}_{q0} = -\partial \Omega_{q0} / \partial \beta_0^{-1}, \quad (41)$$

$$\beta_0^{-1} d \mathcal{S}_{q0} = d \mathcal{E}_q - \mu_0 d \left(\sum_j g_j \bar{n}_{j0}^q \right). \quad (42)$$

Найдем теперь вторую вариацию функционала (29) $\mathcal{L}(\bar{n}_j)$; в результате получим:

$$\delta^2 \mathcal{L} = -k_B q \sum_j g_j \bar{n}_j^{q-2} \left\{ 1 - \frac{(1-q)\beta}{k_B} (\varepsilon_j - \mu) - \left(1 + \frac{1}{\bar{n}_j} \right)^{q-2} \right\} (\delta \bar{n}_j)^2. \quad (43)$$

Из (43) следует, что при $q > 0$ экстремум соответствует максимуму функционала, $\delta^2 \mathcal{L} < 0$. Таким образом, распределение (32) максимизирует обобщенную энтропию (25) для бозонного газа.

Дивергенция Брэгмана. Рассмотрим теперь спонтанный переход между произвольным неравновесным состоянием $\bar{n}_j(t)$ и равновесным состоянием $\bar{n}_{j0}$ открытой неэкстенсивной квантовой системы. В качестве информации различия далее будем использовать обобщенную меру Брэгмана, порожденную отрицательной функцией $(-\mathcal{S}_q)$ (см. Bregman, 1967; Cichocki, Amari, 2010)

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}_q[\bar{n}:\bar{n}_0] &:= S_{q0} - S_q + \frac{k_B}{q-1} \sum_j g_j (\bar{n}_j^q - \bar{n}_{j0}^q) \frac{\partial S_{q0}}{\partial \bar{n}_{j0}^q} = \\
&= S_{q0} - S_q + \frac{k_B}{q-1} \sum_j g_j (\bar{n}_j^q - \bar{n}_{j0}^q) \left[-1 + \left(\frac{1 + \bar{n}_{j0}}{\bar{n}_{j0}} \right)^{q-1} \right] \geq 0, \quad (44)
\end{aligned}$$

где первый член — это разность квантовых энтропий (сравни с (23)). Дивергенция Брегмана (44), являясь знакоопределенным функционалом, определяет меру статистической упорядоченности в микросостояниях системы с распределением $\bar{n}_j(t)$ относительно равновесного состояния с распределением $\bar{n}_{j0}$. Основные свойства дивергенции Брегмана можно найти в фундаментальной работе (Cichocki, Amari, 2010). Здесь же мы отметим лишь то, что величина $\mathcal{I}_q[\bar{n}:\bar{n}_0]$ является вещественным, положительным, выпуклым (в первом аргументе) функционалом. Кроме этого, поскольку при $\bar{n}_j = \bar{n}_{j0}$ имеет место равенство $\mathcal{I}_q[\bar{n}_0:\bar{n}_0] = 0$, то дивергенция Брегмана является функцией Ляпунова³⁾.

Принцип максимума энтропии равновесного распределения Бозе–Эйнштейна в статистике Тсаллиса. Подставляя в формулу (44) равновесное распределение $\bar{n}_{j0}$ (32), в результате получим

$$\mathcal{I}_q = -(S_q - S_{q0}) + \beta_0(\mathcal{E}_q - \mathcal{E}_{q0}) - \beta_0\mu_0(\mathcal{N}_q - \mathcal{N}_{q0}) \geq 0. \quad (45)$$

Отсюда вытекает следующее дифференциальное уравнение

$$d\mathcal{I}_q = -dS_q + \beta_0(d\mathcal{E}_q - \mu_0 d\mathcal{N}_q). \quad (46)$$

³⁾ Напомним, что функцией Ляпунова называется знакоопределённая функция, которая обращается в нуль в точке равновесия системы. Состояние равновесия является аттрактором, когда производная по времени от функции Ляпунова имеет знак, противоположный знаку самой функции.

Если теперь предположить, что для обоих состояний системы справедливы соотношения $\mathcal{E}_q = \mathcal{E}_{q0}$ и $\mathcal{N}_q = \mathcal{N}_{q0}$ (так называемое, условие Гиббса), то из (45) следует неравенство

$$\mathcal{I}_q(t) = -(\mathcal{S}_q(t) - \mathcal{S}_{q0}) \geq 0, \quad (47)$$

в котором информация различия представлена в виде отрицательного вклада в энтропию и называется негэнтропией. Понятие негэнтропии, т.е. изменения энтропии с обратным знаком, было предложено Э. Шредингером (Шредингер, 1947). В общем случае и для Бозе-газа выполняется негэнтропийный принцип Л. Бриллюэна (Бриллюэн, 1960). Из соотношения (47) следует, что энтропия равновесного состояния $\mathcal{S}_{q0}$ больше, чем энтропия произвольного состояния

$$\mathcal{S}_q, \mathcal{S}_q \leq \mathcal{S}_{q0}.$$

Сравнивая значения энтропий при условии Гиббса, получим из уравнения (46) теорему Гиббса в виде неравенства (47). Таким образом, увеличение энтропии к ее максимальному равновесному значению происходит с потерей информации различия, то есть увеличивается статистическое разупорядочение и понижается статистическое упорядочение микросостояний неэкстенсивной системы. Поскольку информация различия является функцией Ляпунова с фиксированным знаком, то равновесие будет устойчивым, если выполняется неравенство

$$\frac{d}{dt} \mathcal{I}_q(t) = -\frac{d}{dt} (\mathcal{S}_q(t) - \mathcal{S}_{q0}) \leq 0. \quad (48)$$

Таким образом, при стремлении q -системы, состоящей из элементарных частиц Бозе-газа, к равновесному состоянию во временной эволюции информация различия уменьшается. Из (48) следует H -теорема для открытых неравновесных неэкстенсивных q -систем (неравенство для энтропии Тсаллиса)

$$\frac{d}{dt} \mathcal{S}_q(t) > 0, \quad (49)$$

которое справедливо при приближении к состоянию полного статистического равновесия. Эта теорема утверждает, что q -энтропия системы непрерывно растет в направлении равновесия, где энтропия становится максимальной и достигает конечного значения. Таким образом, происходит хаотизация макроскопической системы Тсаллиса при спонтанных переходах.

Заметим, что тот факт, что q -энтропия квазиаддитивна, и энтропия совокупной системы больше, чем сумма энтропий отдельных подсистем, указывает на то, что совокупная система термодинамически более стабильна (Landsberg, Vedral, 1998).

4. ЭНТРОПИЯ СВЕТОВЫХ КВАНТОВ БОЗЕ. ЧЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Электромагнитное излучение, находящееся в тепловом равновесии (так называемое черное излучение) можно рассматривать как фотонный газ. В силу целочисленности момента импульса фотонов этот газ подчиняется статистике Бозе–Эйнштейна. Поскольку фотоны не взаимодействуют друг с другом (принцип суперпозиции для электромагнитного поля), то состоящий из фотонов газ можно считать идеальным. Для возможности установления теплового равновесия в излучении необходимо наличие хотя бы небольшого количества материальной среды (например, газа). Механизм, обеспечивающий установление равновесия, заключается при этом в поглощении и испускании фотонов веществом. Это обстоятельство приводит к существенной специфической особенности фотонного газа – число частиц $\mathcal{N}$ в нем является переменной величиной и само должно определиться из условий теплового равновесия, что приводит к равенству нулю химического потенциала μ фотонного газа (см. Ландау, Лифшиц, 1964).

Следовательно, распределение фотонов по различным квантовым состояниям j (уровням энергии) с определенными энергиями $\varepsilon_j := \hbar\omega_j$ (где ω_j – собственная частота излучения в данном объеме $\mathcal{V}_{\mathcal{N}}$) определяется формулой (32) с $\mu = 0$:

$$\bar{n}_j = \frac{1}{\left[1 + (q-1)\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right]^{1/q-1} - 1} = \frac{1}{\exp_{2-q}\left(\frac{\hbar\omega_j}{k_B T}\right) - 1}. \quad (50)$$

Это есть так называемое обобщенное распределение Планка в статистике Тсаллиса. Считая далее объем системы $\mathcal{V}_{\mathcal{N}}$ достаточно большим, перейдем указанным выше способом от дискретного к непрерывному распределению собственных частот излучения.

$$D_{\omega} = \frac{1}{\left[1 + (q-1)\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right]^{1/q-1} - 1} = \frac{1}{\exp_{2-q}\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (51)$$

Заметим, что в силу определения (11) экспоненты Тсаллиса, второе представление распределения D_{ω} в формуле (51) справедливо в том случае, когда при $q < 1$ имеет место неравенство $\hbar\omega / k_B T < (1-q)^{-1}$, или когда при $q > 1$ и $\hbar\omega / k_B T \geq (1-q)^{-1}$.

Учитывая непрерывное распределение энергии фотонов, плотность квантовых состояний фотонов с частотами собственных колебаний в интервале между ω и $\omega + d\omega$ может быть задана как (см. Ландау и Лифшиц, 1964)

$$d\Gamma = (\mathcal{V}_{\mathcal{N}} \omega^2 / \pi^2 c^3) d\omega, \quad (52)$$

где $c = 2.99792458 \cdot 10^{10}$ см/сек – скорость света в вакууме, а ω – угловая частота. Умножив распределение (51) на эту величину, найдем число фотонов в данном интервале частот:

$$d\mathcal{N}_{rad}(\omega, T, q) = \mathcal{V}_{\mathcal{N}} \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \left[\exp_{2-q}\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1 \right]^{-q} d\omega, \quad (53)$$

а умножив еще на $\hbar\omega$, получим энергию излучения, заключенную в этом же участке спектра:

$$d\mathcal{E}_{rad}(\omega, T, q) = \mathcal{V}_{\mathcal{N}} \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \omega^3 \left[\exp_{2-q}\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1 \right]^{-q} d\omega. \quad (54)$$

Формула (54) для спектрального распределения энергии черного излучения является обобщенной формулой Планка в статистике Тсаллиса. Будучи выражена через длины волн $\lambda = 2\pi c / \omega$, она принимает вид:

$$d\mathcal{E}_{rad}(\lambda, T, q) = -\mathcal{V}_{\mathcal{N}} \frac{16\pi^2 c \hbar}{\lambda^5} \left[\exp_{2-q}\left(\frac{2\pi \hbar c}{k_B T \lambda}\right) - 1 \right]^{-q} d\lambda. \quad (55)$$

Обобщенный закон Планка (51) описывает распределение электромагнитной энергии (или распределение плотности фотонов), излучаемой черным телом при данной температуре T . Закон Планка может быть представлен в различных вариантах, включающих такие параметры, как плотность потока или спектральное распределение. Два предельных случая, а именно, $\hbar\omega \ll k_B T$ и $\hbar\omega \gg k_B T$, заслуживают особого внимания.

Рис.1. Функция $\exp_q(-x)$ для типичных значений q (в $\log-\log$ масштабе). При $q > 1$ она имеет асимптотический наклон, равный $-1/(1-q)$ (Tsallis, 2009).

В низкочастотном или высокотемпературном пределе ($\hbar\omega \ll k_B T$) из соотношения (54), при учете свойства (17) функции $\exp_{2-q}(x) \cong 1 + x + \dots$, получим:

$$\begin{aligned} d\mathcal{E}_{rad}(\omega, T, q) &= \mathcal{V}_N \frac{k_B T}{\pi^2 c^3} \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^{1-q} \omega^2 d\omega = \\ &= \mathcal{V}_N \frac{k_B T}{\pi^2 c^3} \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^{1-q} \omega^2 d\omega = \mathcal{V}_N \frac{\hbar^{1-q}}{\pi^2 c^3} (k_B T)^q \omega^{3-q}. \end{aligned} \quad (56)$$

Эту формулу можно считать аналогом (q -обобщением) классической формулы Рэля–Джинса $d\mathcal{E}(\omega) = \mathcal{V}_N (\pi^2 c^3)^{-1} k_B T \omega^2 d\omega$ в статистике Тсаллиса. Она справедлива, если $1 > q \rightarrow -\infty$. Из (56) видно, что с уменьшением q излучение черного тела излучает меньше энергии по сравнению со стандартным излучением закона Рэля–Джинса.

В обратном предельном случае больших частот ($\hbar\omega \gg k_B T$) соотношение (54) при учете формулы $\exp_{2-q}(x) = 1 / \exp_q(-x)$ дает:

$$d\mathcal{E}_{rad}(\omega, T, q) = \mathcal{V}_N \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \omega^3 \left[\exp_q \left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right) \right]^q d\omega. \quad (57)$$

При написании (57) использовано свойство $\exp_q(-x) = 0$ деформированной экспоненты Тсаллиса (см. Рис.1). Выражение (57) можно рассматривать как q -обобщение классического закона Вина.

Заметим, что в пределе слабой связи $q \rightarrow 1$ формулы (56) и (57) восстанавливают свои стандартные выражения.

Термодинамика черного излучения. Вычислим теперь термодинамические характеристики чернотельного излучения. Интегрируя (54) по всем частотам, получим полную энергию фотонного газа (черного излучения)

$$\mathcal{E}_{rad}(T, q) = \mathcal{V}_N \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^3 \left[\exp_{2-q}(\hbar\omega / k_B T) - 1 \right]^{-q} d\omega. \quad (58)$$

Используя обозначение $x := \hbar\omega / k_B T$, перепишем формулу (58) в виде:

$$\mathcal{E}_{rad}(T, q) = \mathcal{V}_N \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^4 \int_0^\infty x^3 \left[\exp_{2-q}(x) - 1 \right]^{-q} dx. \quad (59)$$

В выражение (59) входит интеграл вида $\int_0^\infty x^3 \left[\exp_{2-q}(x) - 1 \right]^{-q} dx$, который при $q \rightarrow 1$ равен $\pi^4 / 15 \simeq 6.49394$ (см. Ландау, Лифшиц, 1964).

Обозначим интеграл через

$$J_q^{(n)} := \frac{15}{\pi^4} \int_0^\infty x^n \left[\exp_{2-q}(x) - 1 \right]^{-q} dx. \quad (60)$$

(см. формулу (П.6) для его вычисления в Приложении). Тогда для полной энергии излучения будем иметь:

$$\mathcal{E}_{rad}(T, q) = \mathcal{V}_N T^4 \frac{\pi^5 k_B^4}{15 c^3 h^3} J_q^{(3)} = a J_q^{(3)} \mathcal{V}_N T^4 = a_q \mathcal{V}_N T^4, \quad (61)$$

где $a_q := aJ_q^{(3)}$; $a = \frac{1}{15} \frac{\pi^5 k_B^4}{c^3 \hbar^3} = 7,56566(7) \cdot 10^{-15} \frac{\text{эрг}}{\text{см}^3 \text{К}^4}$ – постоянная давления излучения.

Как известно, при $\mu = 0$ термодинамический потенциал $\Omega_{rad}(\mathcal{V}_N, T, q)$ совпадает со свободной энергией $\mathcal{F}_{rad}(\mathcal{V}_N, T, q)$. При использовании формулы (41), в которой положим $\mu = 0$ и перейдем обычным образом от суммирования к интегрированию, для величины $\mathcal{F}_{rad}$ можно получить

$$\beta \mathcal{F}_{rad} = \int_0^\beta \mathcal{E}_q d\beta = a_q \mathcal{V}_N \int_0^\beta \beta^{-4} d\beta = -\frac{1}{3} a_q \mathcal{V}_N \beta^{-3}. \quad (62)$$

Отсюда

$$\mathcal{F}_{rad}(\mathcal{V}_N, T, q) = -\mathcal{V}_N \frac{(k_B T)^4 \pi^5}{45(c\hbar)^3} J_q^{(3)} = -\frac{1}{3} a_q \mathcal{V}_N T^4 = -\frac{1}{3} \mathcal{E}_{rad}. \quad (62^*)$$

Энтропия чернотельного излучения в статистике Тсаллиса равна

$$S_{rad}(\mathcal{V}_N, T, q) = -\frac{\partial \mathcal{F}_{rad}}{\partial T} = \frac{4}{3} a_q \mathcal{V}_N T^3. \quad (63)$$

Она пропорциональна кубу температуры.

Полная энергия излучения, согласно (35), равна

$$\mathcal{E}_q = T S_q + \mathcal{F}_q = a_q \mathcal{V}_N T^4 = -3 \mathcal{F}_q. \quad (64)$$

Таким образом, полная энергия черного излучения пропорциональна четвертой степени температуры (закон Больцмана).

Для теплоемкости чернотельного излучения $C_{rad, \mathcal{V}} := (\partial \mathcal{E}_{rad} / \partial T)_{\mathcal{V}}$ имеем:

$$C_{rad, \mathcal{V}} = 4 \mathcal{V}_N a_q T^3. \quad (65)$$

Наконец, давление и уравнения состояния определяются соотношениями:

$$P_{rad}(T, q) = -\left(\frac{\partial \mathcal{F}_{rad}}{\partial \mathcal{V}_N} \right)_T = \frac{1}{3} a_q T^4, \quad (66)$$

$$P_{rad} \cdot \mathcal{V}_N = \frac{1}{3} \mathcal{V}_N a_q T^4 = \frac{\mathcal{E}_{rad}}{3}. \quad (67)$$

Таким образом, несмотря на зависимость термодинамических величин от параметра деформации q , уравнение для полной энергии излучения (64) и уравнение состояния (67) остаются неизменными и в формализме Тсаллиса.

Для полного числа фотонов в черном излучении согласно (53) и (60), имеем:

$$\mathcal{N}_{rad}(T, q) = \int_0^{\infty} x^2 \left[\exp_{2-q}(x) - 1 \right]^{-q} dx = \mathcal{V}_{\mathcal{N}} \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{c \hbar} \right)^3 J_q^{(2)}. \quad (68)$$

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе даётся логическая схема построения модифицированной термодинамики для неэкстенсивных бозонных систем, основанная на модифицированных энтропии Бозе-газа и соответствующей дивергенции Брегмана. Показано, что обобщенная энтропия бозонного газа подчиняется псевдоаддитивному закону для двух статистически независимых подсистем. Положительность энтропии совокупной системы указывает на существование силы притяжения между отдельными подсистемами, и это взаимодействие явно происходит от взаимодействия между составляющими их бозонными частицами. Найдено универсальное распределение степенного закона на основе максимизации модифицированной энтропии Бозе-газа при заданных ограничениях на усредненные значения энергии и числа частиц q -системы, полученные по ненормированному распределению вероятностей Курадо-Тсаллиса. Используя модифицированное распределение Бозе-Эйнштейна, получены обобщенные выражения для термодинамического потенциала, полной и свободной энергии, энтропии, удельной теплоты, давления и удельной теплоемкости, а также дифференциальные термодинамические уравнения для бозонного газа. Обсуждаются обобщенные законы Планка, Рэлея-Джинса и Вина для фотонов, которые могут быть применимы к различным физическим задачам, в частности, к описанию космического черного излучения. На основе так называемой дивергенции Брегмана сформулированы и доказаны H -теорема и теорема Гиббса, описывающие хаотизацию макроскопической бозонной системы при спонтанных переходах.

Результаты работы могут быть использованы в качестве теоретического обоснования экспериментальных исследований чернотельного излучения, в частности космического микроволнового фонового излучения.

Предпринятое исследование выполнено при частичной поддержке гранта РФФИ № 18-01-00064.

ЛИТЕРАТУРА

- Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.: ИЛ. 1960. 392 с.
- Зарипов Р.Г. Самоорганизация и необратимость в неэкстенсивных системах. Казань: ФЭН. 2002. 251 с.
- Зарипов Р.Г. Принципы неэкстенсивной статистической механики и геометрии мер беспорядка и порядка. Казань: Изд-во Казан. Гос. техн. ун-та. 2010. 404 с.
- Колесниченко А.В. К построению неаддитивной термодинамики сложных систем на основе статистики Курадо–Тсаллиса // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2018. № 25. 40 с.
- Колесниченко А. В. Статистическая механика и термодинамика Тсаллиса неаддитивных систем. Введение в теорию и приложения. М.: ЛЕНАНД. 2019. 360 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. М.: Наука. 1964. 567 с.
- Abe S., Okamoto Y. Eds., “Nonextensive Statistical Mechanics and Its Applications”. Series Lecture Notes in Physics. Springer: Verlag, Berlin, New York. 2001.
- Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? М.: ИЛ. 1947. 147 с.
- Anchordoqui L.A., Torres D.F. Non-extensivity effects and the highest energy cosmic ray affair // Phys. Lett. A . 2001. V. 283. P. 319-322.
- Bregman L.M. The relaxation method of finding the common point of convex sets and its application to the solution of problems in convex programming // USSR computational mathematics and mathematical physics. 1967. V. 7. № 3. P. 200-217.
- Büyükkilic F., Demirhan D. A fractal approach to entropy and distribution functions // Phys. Lett. A. 1993. V.181. P. 24-28.
- Büyükkilic F., Demirhan D. A unified grand canonical description of the nonextensive thermostatics of the quantum gases: Fractal and fractional approach // Eur. Phys. J. B. 2000. V. 14. P. 705-711.
- Chamati H., Djankova A.T., Tonchev N.S. On the application of nonextensive statistical mechanics to the black-body radiation // Physica A. 2006. V. 360. P. 297-303.
- Cichocki A., Amari S. Families of Alpha-Beta- and Gamma-Divergences: Flexible and Robust Measures of Similarities // Entropy. 2010. V. 12. № 6. P. 1532-1568.
- Curado E. M. F, Tsallis C. Generalized statistical mechanics: connection with thermodynamics// J. Phys. A : Mathematical and General. 1991. V. 24. № 2. P. L69-72.
- Daroczy Z. Generalized information function// Inform. Control. 1970. V.16. P. 36-51.

Gell-Mann M., Tsallis C. Eds. "Nonextensive Entropy- Interdisciplinary Applications" // Oxford University Press. 2004. 440 p.

Grigolini P., Tsallis C., West B.J. Eds., "Classical and Quantum Complexity and Nonextensive Thermodynamics" // Chaos, Solitons and Fractals. 2002. 13, № 3. P. 367.

Havrda J., Charvat F. Quantification Method of Classification Processes // Kybernetika. 1967. V. 3. P. 30-35.

Herrmann H.J., Barbosa M., Curado E.M.F. Eds. "Trends and perspectives in extensive and non-extensive statistical mechanics" // Physica A. 2004. V. 344. № 3-4. P. v-vi.

Jaynes E.T. Information theory and statistical mechanics. B c6. Statistical Physics 3, Lectures from Brandeis Summer Institute 1962. New York: W.A. Benjamin, Inc., 1963. p.181.

Kaniadakis G., Lissia M., Rapisarda A. Eds. "Non Extensive Thermodynamics and Physical Applications" // Physica A. 2002. V. 305. № 1-2. P. xv-xvii.

Kaniadakis G., Carbone A., Lissia M. Eds. "News, expectations and trends in statistical physics"// Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2006. V. 365. № 1. P. xi-xi.

Kaniadakis G., Lissia M. Eds. "News and Expectations in Thermostatistics"// Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2004. V. 340. № 1. P. xv-xix.

Kolesnichenko A.V. Jeans Instability of a Protoplanetary Gas Cloud with Radiation in Nonextensive Tsallis Kinetics // Solar System Research. 2020. V. 54. № 2. P. 137-149.

Landsberg P.T., Vedral V. Distributions and channel capacities in generalized statistical mechanics // Phys. Lett. A. 1998. V. 247. P. 211-216.

Lenzi E.K., Mendes R.S. Blackbody radiation in nonextensive Tsallis statistics: Exact solution // Phys. Lett. A. 1998. V. 250. P. 270-274.

Leubner M.P. Nonextensive Theory of Dark Matter and Gas Density Profiles // Astrophys. J. 2005. V. 632. L1-L4.

Lima J.A.S., Silva R. Jr., Santos J. Plasma oscillations and nonextensive statistics // Phys.Rev. E. 2000. V. 61. № 3. P. 3260-3263 .

Ma P., Zheng Y., Qi G. The nonextensive Bose-Einstein condensation and photon gas with parameter transformation // Eur. Phys. J. Plus. 2019. V 134. P. 502 (1-11).

Martinez S., Nicolas F., Pennini F., Plastino A. Tsallis'entropy maximization procedure revisited // Physica A. 2000. V. 286. P. 489-502.

Martinez S., Pennini F., Plastino A., Tessone C. J. Blackbody radiation in a nonextensive scenario // *Physica A*. 2001. V. 295. P. 224-229.

Martinez S., Pennini F., Plastino A., Tessone C.J. q -Thermostatistics and the black-body radiation problem // *Physica A*. 2002. V. 309. P. 85-105.

Mather J.C., Cheng E.S., Cottingham D.A., Eplee R.E., Fixsen D.J., Hewagama T., Isaacman R.B., Jensen K.A, Meyer S.S., Noerdlinger P.D., Read S.M, Rosen L.P., Shafer R.A., Wright E.L., Bennett C.L., Boggess N.W, Hauser M.G., Kelsall T., Moseley S.H., Silverberg R.F, Smoot G.F., Weiss R., Wilkinson D.T. Measurement of the cosmic microwave background spectrum by the COBE FIRAS instrument // *Astrophys. J*. 1994. V. 420. P. 439-444.

Plastino A.R., Plastino A., Vucetich H. A quantitative test of Gibbs' statistical mechanics // *Physics Let. A*. 1995. V. 207. P. 42-46.

Pessah M.E, Torres D.F., Vucetich H. Statistical mechanics and the description of the early universe. (I). Foundations for a slightly non-extensive cosmology // *Phys. A: Statis. Mech*. 2001. V. 297. № 1-2. P. 164-200.

Rovenchak A. Ideal Bose-gas in nonadditive statistics // *Low temperature physics*. 2018. V. 44. №. 10. P. 1025-1031.

Sistema P. D., Vucetich H. Cosmology, oscillating physics, and oscillating biology // *Phys. Rev. Lett*. 1994. V.72. №. 4. P. 454-457.

Tirnakli U., Büyükkiliç F., Demirhan D. Generalized Distribution Functions and an Alternative Approach to Generalized Planck Radiation Law // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*. 1997. V. 240. № 3-4. P. 657-664.

Tsallis C. Possible Generalization of Boltzmann-Gibbs-Statistics // *J. Stat. Phys*. 1988. V. 52. № 1-2. P. 479-487. (a regular updated bibliography is accessible at <http://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm>).

Tsallis C., Sa Barreto F.C., Loh E.D. Generalization of the Planck radiation law and application to the cosmic microwave background radiation // *Physical Rev. E*. 1995. V. 52. № 2. P. 1448-1451.

Tsallis C., Mendes R.S., Plastino A.R. The role of constraints within generalized nonextensive statistics // *Physica A*. 1998. V. 261. P. 534-554.

Tsallis C. Nonextensive Statistic: Theoretical, Experimental and Computational Evidences and Connections // *Brazilian J. Phys*. 1999. V. 29. № 1. P. 1-35.

Wang Q.A., Le Méhauté A. Nonextensive black-body distribution function and Einstein's coefficients A and B // *Phys. Lett. A*. 1998. V. 242. P. 301-306.

Wang Q.A., Nivanen L., Le Méhauté A. Generalized blackbody distribution within the dilute gas approximation // *Physica A*. 1998. V. 260 P. 490-498.

Zaripov R. G. Elementary particle physics and field theory. Evolution of the difference information in the process of the fermi and bose gas self-organization for nonextensive systems // Russian Physics Journal. 2009. V. 52. №. 4. P. 329-336.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вычисление интеграла $J_q^{(n)} := \frac{15}{\pi^4} \int_0^\infty \frac{x^n}{[\exp_{2-q}(x) - 1]^q} dx.$

Преобразуем этот интеграл, сделав подстановку

$$\exp_{2-q}(x) \equiv [1 + (q-1)x]^{1/(q-1)} = 1/z. \quad (\text{П.1})$$

Тогда

$$x = \frac{z^{1-q} - 1}{q-1} = \ln_q z, \quad [\exp_{2-q} x - 1]^q = \frac{(1-z)^q}{z^q}, \quad (\text{П.2})$$

$$dx = \frac{d}{dz}(\ln_q z) dz = z^{-q} dz, \quad J_q^{(n)} := -\frac{15}{\pi^4 (q-1)^n} \int_0^\infty \frac{(z^{1-q} - 1)^n}{(1-z)^q} dz. \quad (\text{П.3})$$

Отсюда следует, что

$$J_q^{(n)} = -\frac{15}{\pi^4 (q-1)^n} \sum_{k=0}^n C_n^k \int_0^1 \frac{z^{(1-q)(n-k)}}{(1-z)^q} dz, \quad (\text{П.4})$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots \leq n = 0, 1, 2, \dots).$

Используя теперь формулу для определенного интеграла

$$\int_0^1 t^p (1-t)^{-q} dt = B(p+1, 1-q) = \frac{\Gamma(1-q)\Gamma(p+1)}{\Gamma(2+p-q)}, \quad (q < 1, \quad p > -1), \quad (\text{П.5})$$

где $p \equiv (1-q)(n-k); \quad B(s, r) = \int_0^1 \frac{t^{s-1}}{(1-t)^{1-r}} dt = \frac{\Gamma(s)\Gamma(r)}{\Gamma(s+r)}$ – интеграл Эйлера пер-

вого рода (Бета-функция); $\Gamma(s)$ – Гамма-функция, получим:

$$J_q^{(n)} = -\frac{15}{\pi^4 (q-1)^n} \sum_{k=0}^n \left[C_n^k B(1-q, (1-q)(n-k) + 1) \right] =$$

$$= -\frac{15 \Gamma(1-q)}{\pi^4 (q-1)^n} \sum_{k=0}^n \left\{ \frac{(n-k)n!}{k!(n-k+1)!} \frac{\Gamma[(1-q)(n-k)]}{\Gamma[(1-q)(n-k+1)]} \right\}. \quad (\text{П.6})$$

В частности,

$$\begin{aligned} J_q^{(3)} &= \frac{15}{\pi^4 (1-q)^3} \sum_{k=0}^3 \left[C_3^k B(1-q, (1-q)(3-k)+1) \right] = \\ &= \frac{90 q \Gamma(-q)}{\pi^4 (q-1)^3} \sum_{k=0}^3 \left\{ \frac{(3-k)}{k!(4-k)!} \frac{\Gamma[(1-q)(3-k)]}{\Gamma[(1-q)(4-k)]} \right\}. \end{aligned} \quad (\text{П.7})$$

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1.Элементы неаддитивной статистики Тсаллиса	6
2. Энтропия Бозе-газа в статистике Больцмана-Гиббса	10
3. Энтропия Бозе-газа в статистике Тсаллиса	12
4 Энтропия световых Бозе квантов. Черное излучение	18
5.Заключение.....	23
Литература	24
Приложение	27