Meio Ambiente

Environment

Cajueiro nas Dunas/Cashew tree on the dunes, 1987
Vatenor de Oliveira Silva

Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia e Unidades de Conservação no Brasil

A Amazônia brasileira é a maior floresta tropical da Terra. Abriga uma proporção substancial da biodiversidade terrestre global (Dirzo e Raven, 2003), armazena grandes estoques de carbono (Gibbs et al., 2007) e desempenha uma função fundamental na regulação do clima global e regional (Foley et al., 2007), entre uma infinidade de serviços ecossistêmicos (MEA, 2005). O desmatamento em combinação com mudanças climáticas representa uma grande ameaça para a biodiversidade da Amazônia, além de colocar em risco a capacidade deste bioma em ofertar serviços ecossistêmicos em longo prazo (Malhi et al., 2008; Nepstad et al., 2008; Marengo e Espinoza, 2016).

O bioma brasileiro Amazônia ocupa quase a metade do território nacional, abrangendo 75,2% da área nacional de florestas naturais (SFB, 2016). Apesar das altas taxas de desmatamento no passado, o bioma ainda mantém 81,7% da sua cobertura florestal original (SFB, 2016).

Environment

Deforestation in the Amazon and Conservation Units in Brazil

The Brazilian Amazon is the largest tropical forest on Earth. It harbors a substantial proportion of global terrestrial biodiversity (Dirzo and Raven, 2003), it stores large stocks of carbon (Gibbs et al., 2007), and it plays a critical function in regulating the global and regional climate (Foley et al., 2007), among a myriad of other ecosystem services (MEA, 2005). Deforestation in combination with climate change represents a major threat to the Brazilian Amazon's biodiversity, in addition to putting at risk the capacity of this biome to deliver ecosystem services in the long run (Malhi et al., 2008; Nepstad et al., 2008; Marengo and Espinoza, 2016).

Brazil's Amazon biome occupies nearly half of the national territory, encompassing 75.2% of the national natural forest area (SFB, 2016). Despite high rates of deforestation in the past, this biome still maintains 81.7% of its original forest cover (SFB, 2016).

Desde 1988, o desmatamento em corte raso (isto é, remoção total da cobertura florestal) tem sido monitorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por meio do projeto PRODES (INPE, 2016). Por sinal, o PRODES recebeu grande reconhecimento internacional pelo seu desempenho no rastreamento do desmatamento e transparência na divulgação dos resultados (Kintisch, 2007). O PRODES emprega imagens de sensoriamento remoto e técnicas de processamento de imagem digital para monitoramento de manchas de desmatamento em corte raso maiores que 6,25 ha (INPE, 2016). Numa base anual, o PRODES relata sua avaliação do desmatamento ocorrido em toda a Amazônia Legal (*a wall-to-wall assessment*), uma região sócio-geográfica, de aproximadamente 521,7 milhões de hectares, na qual o bioma Amazônia está inserido (INPE, 2016).

O desmatamento na Amazônia Legal é espacialmente concentrado em sua fronteira agrícola, ao longo das bordas leste e sul da floresta. Ao longo deste “arco do desmatamento”, a maior parte do desmatamento ocorreu nos eixos das principais estradas, como a rodovia Transamazônica (BR-230) (Fearnside, 2005; Fearnside e Lima de Alencastro Graca, 2006; Banerjee; Macpherson; Alavalapati, 2009). Os estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará possuem 81% de toda a área desmatada acumulada na Amazônia Legal entre 1988 e 2015 (INPE, 2015). Para o estado do Pará, Brito e Barreto (2015) relataram que 39% do território se encontrava em situação fundiária irregular, onde se concentrava 71% da área desmatada acumulada no estado.

Since 1988, clear-cut deforestation (that is, full forest cover removal) has been monitored by the National Institute for Space Research (INPE) through the PRODES project (INPE, 2016). In fact, PRODES has received much international recognition for its deforestation tracking performance and transparency reporting (Kintisch, 2007). PRODES employs remote-sensing images and digital image-processing techniques for monitoring clear-cut deforestation patches larger than 6.25 ha (INPE, 2016). On an annual basis, PRODES reports a wall-to-wall deforestation assessment for the Legal Amazon, a socio-geographic region, of approximately 521.7 million ha, wherein lies the Brazilian Amazon (INPE, 2016).

Deforestation in the Legal Amazon is spatially concentrated in its agricultural frontier, along the eastern and southern edges of the forest. Along this “arc of deforestation”, the vast majority of clearing has occurred along the axes of major roads, such as the Transamazon highway (BR-230) (Fearnside, 2005; Fearnside e Lima De Alencastro Graca, 2006; Banerjee; Macpherson; Alavalapati, 2009). The states of Mato Grosso, Rondônia and Pará accounted for 81% of all the accumulated deforested area in the Legal Amazon from 1988 to 2015 (INPE, 2015). For the state of Pará, Brito and Barreto (2015) reported that 39% of the territory was under irregular land tenure status, and concentrated 71% of the accumulated deforested area in the state.

Com efeito, a regularização fundiária é uma necessidade urgente e vital para a proteção da Amazônia (Duchelle et al, 2014; Reydon et al, 2015). A ausência de direitos de propriedade bem definidos e protegidos na Amazônia é muito propícia para a invasão e especulação de terras, o que é um dos principais indutores ao desmatamento e frequentemente conduz a violentos conflitos por terra (Reydon et al., 2015). O Programa Terra Legal, parte da lei mais abrangente de reforma agrária nº 11.952 / 2009, configura uma das principais iniciativas nacionais para tratar desta questão. O programa tem como meta a regularização fundiária de até 300.000 ocupações informais em terras públicas na Amazônia Legal. É coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e conta com o apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Um de seus grandes desafios é o combate à “grilagem”, o fenômeno generalizado de invasão de terras e subsequente obtenção de títulos falsos de posse (Brito e Barreto, 2011).

A criação de gado e a produção de soja são as formas dominantes de uso da terra para fins agropecuários no Brasil e na sua Amazônia Legal (IBGE, 2016). As pastagens são responsáveis por 65% da área desmatada na Amazônia Legal (Inpe; Embrapa, 2014). Nesta região, o tamanho do rebanho bovino aumentou 70% entre 2000 e 2013, enquanto cresceu apenas 7% no resto do país durante o mesmo período (Barreto, 2015). Atualmente, o desmatamento e a pecuária fazem do Brasil um dos líderes mundiais em termos de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Em 2013, a mudança no uso da terra e a pecuária foram responsáveis por 55% e 24,5%,

In fact, land tenure regularization is a vital and much urgent need in view of protecting the Brazilian Amazon (Duchelle et al., 2014; Reydon et al., 2015). The lack of clear and protected property rights in the Brazilian Amazon is very conducive to land grabbing and speculation, which is a main driver of deforestation and often leads to violent land conflicts (Reydon et al., 2015). The Legal Land (Terra Legal) program, as part of the broader land reform Law 11,952/2009, comprises one of the core national initiatives to address this issue. The program is aimed at expediting land titles up to 300,000 informal occupations in public land in the Legal Amazon. It is coordinated by the Ministry of Agrarian Development and assisted by the Land Reform and Settlement Institute (Incra). A main challenge faced by the program is fighting against “grilagem”, the widespread phenomenon of land grabbing and subsequent registration of false land titles (Brito and Barreto, 2011).

Soybean fields and cattle ranching are the dominant agricultural land use types in Brazil as well as in its Legal Amazon (IBGE, 2016). Pastures account for 65% of the deforested area in the Legal Amazon (Inpe; Embrapa, 2014). In this region, the cattle herd size increased by 70% between 2000 and 2013, while it increased by only 7% in the rest of the country over the same period (Barreto, 2015). Currently, deforestation and cattle ranching render Brazil as one of the leading countries in terms of greenhouse gas emissions (GGE). In 2013, land use change and cattle ranching accounted for 55% and

respectivamente, das emissões de gases de efeito estufa do Brasil (Piatto et al., 2015).

No bioma Cerrado, parte das pastagens foi substituída em grande escala pelo cultivo de soja, o que pode ter motivado o avanço das pastagens sobre o bioma Amazônia, acentuando-se assim o desmatamento. Mais recentemente, outra onda de substituição de pastagens no bioma Cerrado vem ocorrendo, mas desta vez associada especialmente à expansão dos canais (Jepson, 2005; Brannstrom et al., 2008; Lapola et al., 2014). Isso levanta a questão de se a produção de um combustível “ecologicamente correto” (isto é, o álcool de cana-de-açúcar) poderia paradoxalmente contribuir para o desmatamento na Amazônia (Martinelli et al., 2010; de Souza Ferreira Filho e Horridge, 2014).

Quanto à dinâmica temporal do uso da terra, houve um aumento substancial nas taxas de desmatamento anual na Amazônia Legal entre 2001 e 2003 (Gráfico 22.1). À luz da pressão pública aguda, o governo brasileiro teve que entrar em ação (Banerjee; Macpherson; Alavalapati, 2009). Em março de 2014, o governo lançou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm). Pela primeira vez, o desmatamento foi combatido por vários ministérios, sob a coordenação do Chefe de Gabinete da Presidência da República, ao invés de ser uma questão exclusiva do Ministério do Meio Ambiente. No mesmo ano, a capacidade de combate ao desmatamento foi intensificada por meio da criação do programa de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER),

24.5%, respectively, of Brazil’s greenhouse gas emissions (GGE) (Piatto et al., 2015).

In the Cerrado biome, part of the pastures has been replaced by large-scale cropping of soybean, which may have enlarged their domain in the Amazon biome, thereby furthering deforestation (Reydon et al., 2015). More recently, there has been another replacement trend for pastures in the Cerrado biome, only this time by especially sugarcane crop fields. That raises the question whether the production of an “eco-friendly” fuel (that is, sugarcane alcohol) could paradoxically lead to further deforestation in the Amazon (Martinelli et al., 2010; De Souza Ferreira Filho e Horridge, 2014).

As regards the temporal dynamics of land use change, there was a substantial increase in annual deforestation rates in the Legal Amazon between 2001 and 2003 (graph 22.1). In light of acute public pressure, the government was forced into action. In March 2014, the government launched the Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Amazon (PPCDAm). For the first time, several ministries got involved in the fight against deforestation, under the coordination of the President’s chief of staff, and the issue was no longer solely addressed by the Ministry of Environment. At the same year, enforcement capacity was further increased through the creation

um sistema de alerta de desmatamento baseado no sensor do satélite MODIS. No Plano Nacional sobre Mudança do Clima, anunciado na Conferência de Mudanças Climáticas 2009 da ONU em Copenhague, o governo se comprometeu a reduzir o desmatamento em 80% até 2020 (com base na taxa média de desmatamento do período entre 1995 e 2005).

Com efeito, houve um decréscimo considerável nas taxas anuais de desmatamento entre 2004 e 2012 (Gráfico 22.1). Porém, em paralelo às melhorias no monitoramento e aplicação das leis, vários outros fatores podem ter contribuído para esse quadro. Mais especificamente, a expansão das áreas públicas de proteção; flutuações na lucratividade da soja e pecuária; os boicotes nas cadeias de soja e carne contra produtores que promovessem o desmatamento (a “Moratória da Soja” e o “Acordo de Gado”); e a criação do programa Municípios Verdes, que impôs restrições de crédito agrícola para os municípios com as maiores taxas de desmatamento (Macedo et al, 2012; Nepstad et al, 2014; Gibbs et al, 2015).

Também existem indícios de que estas reduções no desmatamento foram superestimadas. Por exemplo, a frequência anual de manchas pequenas de desmatamento em corte raso (6,25-50,00 hectare) permaneceu relativamente inalterada durante o período de avaliação de 2002 a 2009 (Rosa et al., 2012). Considerando-se que o PRODES só detecta manchas de corte raso maiores que 6,25 ha e que o PPCDAm prioriza manchas maiores (> 100 ha), então faz sentido se esperar que os “grileiros” tenham alterado seu

of the “Detection of Deforestation in Real Time” (DETER) program, an alert monitoring system based on the MODIS satellite sensor. The Brazilian National Plan on Climate Change, announced at the 2009 UN Climate Change Conference in Copenhagen, pledged to achieve an 80% deforestation reduction by 2020 (based on the average deforestation rate over the period 1995-2005).

Indeed, there was a sharp decrease in annual deforestation rates between 2004 and 2012 (graph 22.1). Nonetheless, in addition to improving monitoring and enforcement, several other factors may have contributed to this scenario. More specifically, the expansion of protected public areas; fluctuations in the profitability of soy and cattle production; the boycott of soy and beef supply chains against deforesters (the “Soy Moratorium” and the “Cattle Agreement”); and the creation of the Critical County program, which imposed agricultural credit restrictions on the counties with the highest deforestation rates (Macedo et al., 2012; Nepstad et al., 2014; Gibbs et al., 2015).

There are also indications that these declines in deforestation were overestimated. For instance, the annual frequency of small clear-cut patches (6.25–50.00 ha) remained more or less unchanged during an assessment period from 2002 through 2009 (Rosa et al., 2012). Considering that PRODES only detects patches larger than 6.25 ha and that PPCDAm prioritizes larger patches (>100 ha), then it is reasonable to expect that land grabbers may have changed their

comportamento de modo a concentrar o desmatamento em manchas menores (Rosa et al., 2012).

behavior toward concentrating deforestation into smaller patches (Rosa et al., 2012).

A partir de 2012, as taxas de desmatamento voltaram a subir, embora se mantendo bem inferiores àquela de 2004. Estes aumentos podem estar relacionados com a desvalorização da moeda do Brasil, o real, o que torna commodities de exportação mais lucrativas (Fearnside, 2015), e o surgimento de novos mercados de carne, como a Rússia e China (de Souza e de Marco Junior, 2015).

From 2012 onwards, deforestation rates began to rise again, although remaining much lower than that of 2004. These increases might be related to the depreciation of Brazil's currency, the real, which makes export commodity more profitable (Fearnside, 2015), and to the rise of new meat markets, such as Russia and China (De Souza e De Marco Junior, 2015).

Fearnside (2015) advertiu que o desmatamento pode se agravar nos próximos anos, considerando que, entre outras razões, o orçamento do governo no combate ao desmatamento foi reduzido em 72% e planos para estradas e outros projetos de infraestrutura para a Amazônia estavam em andamento, enquanto a criação de novas áreas protegidas estava essencialmente paralisada.

Fearnside (2015) warns that deforestation might aggravate in the years to come considering that, among other reasons, government expenditure on enforcing environmental laws were cut by 72% and plans for Amazonian roads and other infra-structure projects were underway, while the creation of new official protected areas was essentially paralyzed.

As principais áreas protegidas públicas no Brasil são as Terras Indígenas e Unidades de Conservação. O SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), instituído pela Lei nº 9.985 / 2000, estabelece critérios e diretrizes para a criação e gestão de Unidades de Conservação (UCs). Uma característica central do SNUC é a diferenciação entre áreas de uso sustentável e áreas de proteção integral (tabela 22.3). A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) representa a única categoria de proteção no âmbito do SNUC para propriedades privadas. Enquanto a criação de unidades de RPPN funciona numa base voluntária, os proprietários privados

The main public protected areas in Brazil are the Indigenous Lands and the Conservation Units. The SNUC (National System of Conservation Units), instituted by Law No. 9,985/2000, provides criteria and guidelines for the creation and management of Conservation Units. One main feature of the SNUC is the differentiation between sustainable use and strictly protected areas (table 22.3). The Private Natural Heritage Reserve (RPPN) represents the only conservation unit category under the SNUC for privately owned lands. While the creation of RPPN units works on a voluntarily basis, private

devem obedecer ao Novo Código Florestal, instituído pela Lei nº 12,651 / 2012, que dispõe sobre a proteção de áreas de vegetação nativa em terras de propriedade privada.

No Brasil, a área de florestas naturais ocupa 456,1 milhões de hectares (53,7% do território nacional), dos quais 16,7% representa UCs federais (tabela 22.3). Este número sobe para 34% quando se considera o total de UCs federais, estaduais e municipais (SFB, 2016). O bioma Amazônia, sozinho, concentra 73,25% da área total ocupada por UCs. As Terras Indígenas e UCs representam 33,1% e 32,6%, respectivamente, da cobertura florestal natural nesse bioma (SFB, 2016).

Os conflitos fundiários (ocupações irregulares de terras públicas) e a falta de recursos humanos e materiais são os principais obstáculos para a consolidação e efetiva proteção das UCs (Fearnside, 2003; Rylands e Brandon, 2005; Soares-Filho et al, 2010; Nolte et al, 2013). No entanto, as UCs e Terras Indígenas têm contribuído um pouco na redução do desmatamento (Soares-Filho et al., 2010), talvez por desencorajar a especulação de terras, dado que é muito improvável que, no futuro, torne-se possível a reivindicação de posse sobre terras dentro destas áreas protegidas (Nepstad et al., 2014).

Enquanto a Amazônia brasileira abriga uma grande parcela da biodiversidade terrestre do planeta e se destaca na oferta de serviços ecossistêmicos, ela está entre as regiões menos desenvolvidas do país (IBGE, 2016). Aparentemente, o desmatamento não trouxe qualquer melhoria socioeconômica substancial

landowners must abide by the Brazil's New Forest Code, established by Law No. 12,651/2012, which provides for the protection of native vegetation areas on privately owned lands.

Brazil's natural forest area occupies 456.1 million ha (53.7% of the national territory), out of which 16.7% represents federal Conservation Units (table 22.3). This figure adds up to 34% as federal, state and municipal Conservation Units are taken altogether (SFB, 2016). The Amazon biome, alone, contains 73.25% of the total area occupied by Conservation Units. Indigenous Lands and Conservation Units represent 33.1% and 32.6%, respectively, of the natural forest cover in this biome (SFB, 2016).

Unresolved land tenure conflicts (irregular occupations of public areas) and lack of human and material resources are major obstacles to consolidating and effectively protecting Conservation Units (Fearnside, 2003; Rylands e Brandon, 2005; Soares-Filho et al., 2010; Nolte et al., 2013). Nonetheless, Conservation Units and Indigenous Lands have been somewhat active in reducing deforestation (Soares-Filho et al., 2010), perhaps by discouraging land speculation, given that it is very unlikely that, in the future, it will ever be possible to claim ownership over lands within those protected areas (Nepstad et al., 2014).

While the Brazilian Amazon hosts a great share of the world's terrestrial biodiversity and excels at delivering ecosystem services, it is among the least developed regions in the country (IBGE, 2016). Deforestation appears not to have brought any substantial long term socioeconomic improvement for

em longo prazo para os municípios localizados no arco do desmatamento (Rodrigues et al., 2009).

Na Amazônia, a degradação das pastagens ocorre normalmente alguns anos após a instalação (Dias-Filho e Andrade, 2006). É menos dispendioso para os produtores cortar e queimar novas áreas de floresta do que rejuvenescer os solos e replantar campos de pousio (Tollefson, 2015). Assim, o desmatamento avança ao passo que pastagens são abandonadas. (Dias-Filho e Andrade, 2006). Em 2010, o governo lançou o programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC), que financia empréstimos a juros baixos para atividades agropecuárias e florestais, como sistemas agroflorestais, que promovam benefícios socioecológicos tais como o sequestro de carbono, melhorias na capacidade do solo para a fixação de nitrogênio e a reabilitação de pastagens degradadas. No entanto, este programa tem tido muito pouca adesão, o que pode estar atrelado a vários fatores. Por exemplo, a fraca publicidade e a existência de exigências ambientais mais rigorosas do que outros empréstimos agrícolas (Angelo, 2012); a falta de conhecimento técnico necessário para o acesso aos empréstimos (Nepstad et al., 2014); limitações de logística e infraestrutura, falta de assistência técnica e dificuldades para treinar técnicos e produtores (Embrapa, 2016).

Para atividades florestais em propriedades privadas, o Código Florestal exige que os proprietários conservem vegetação nativa em suas propriedades por meio da proteção de uma Reserva Legal (RL), a qual ocupa 80% da área da propriedade no bioma Amazônia. O Código Florestal

the municipalities located within the arc of deforestation (Rodrigues et al., 2009).

In the Amazon, pasture degradation typically occurs a few years after installation (Dias-Filho and Andrade, 2006). It is less costly for farmers to slash and burn forest than to rejuvenate soils and replant fallowed fields (Tollefson, 2015). So deforestation advances as former pasturelands are abandoned (Dias-Filho and Andrade, 2006). In 2010, the government launched the Low Carbon Agriculture program (ABC), which funds low-interest loans for activities, such as agroforestry, that promote socioecological benefits as, for instance, carbon sequestration, improving soil nitrogen uptake and rehabilitating degraded pastureland. Nonetheless, this program has had little uptake so far, which might be associated to several factors. For instance, poor publicity and stricter environmental requirements than other agricultural loans (Angelo, 2012), lack of technical expertise required to access the loans (Nepstad et al., 2014), infrastructure and logistics limitations, lack of technical assistance, and difficulties to train technicians and producers (Embrapa, 2016).

Regarding forest activities on privately owned lands, Brazil's Forest Code requires landowners to conserve native vegetation on their rural properties by setting aside a Legal Reserve (LR), which occupies 80% of the property area in the Amazon. The Forest

prevê também práticas de exploração madeireira na Reserva Legal. Mais especificamente, a exploração de florestas e formações secundárias, em regime de manejo florestal sustentável, seja em áreas de domínio público ou privado, exige a aprovação de um Plano de Manejo Florestal Sustentável pela autoridade florestal competente. Um dos principais obstáculos para o manejo florestal legal na Amazônia é a competição contra a exploração ilegal de madeira. Estima-se que 80% de toda exploração madeireira na Amazônia é ilegal (Sistema Ambiental Paulista, 2016).

Finalmente, mecanismos de incentivos positivos para evitar o desmatamento são urgentemente necessários (Nepstad et al., 2014). Uma iniciativa promissora é a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação em Países em Desenvolvimento (REDD), do programa da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima. Outros programas na temática do REED são novos ou estão em desenvolvimento, incluindo o Fundo Amazônia e o programa de Agricultura de Baixo Carbono. A eficiência, limitações e falhas dessas iniciativas ainda terão de ser avaliadas.

Code also provides for selective logging practices in Legal Reserve. More specifically, exploring forests and secondary formations under a sustainable forest management regime, either within public or private domain, requires approval of a Sustainable Forest Management Plan by the competent forestry authority. A major obstacle for legal forest management in the Amazon is how to be competitive against illegal logging. About 80 percent of all logging in the Amazon is estimated to be illegal (Sistema Ambiental Paulista, 2016).

Finally, mechanisms to provide positive incentives for avoiding deforestation are urgently needed (Nepstad et al., 2014). A promising initiative is the Reduced Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries (REDD) program of the United Nations Framework Convention on Climate. Other REED related programs are new or under development, including the Amazon Fund and the Low Carbon Agriculture programs. The efficiency, limitations and shortcomings of these initiatives are yet to be seen.

Referências/References

ANGELO, C. 2012. Nature News. Brazil's fund for low-carbon agriculture lies fallow. Disponível em/Available from: <http://www.nature.com/news/brazil-s-fund-for-low-carbon-agriculture-lies-fallow-1.11111>.

BANERJEE, O.; MACPHERSON, A.J.; ALAVALAPATI, J. Toward a Policy of Sustainable Forest Management in Brazil - A Historical Analysis. *The Journal of Environment & Development*, v. 18, n. 2, p. 130-153, Jun 2009.

BARRETO, P. (2015). Como reduzir a contribuição da pecuária brasileira para as mudanças climáticas? Belém, Brasil: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.

BRANNSTROM, C. et al. Land change in the Brazilian Savanna (Cerrado), 1986-2002: Comparative analysis and implications for land-use policy. **Land Use Policy**, v. 25, n. 4, p. 579-595, Oct 2008. ISSN 0264-8377. Disponível em/ Available from: < <Go to ISI>://WOS:000256289700011 >.

BRITO, B., & BARRETO, P. (2011). A regularização fundiária avançou na Amazônia? Os dois anos do programa Terra Legal. Belém, Brasil: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.

BRITO, B., & BARRETO, P. (2015). Regularização fundiária no Pará: Afinal qual é o problema? Belém, Brazil: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.

DE SOUZA FERREIRA FILHO, J. B.; HORRIDGE, M. Ethanol expansion and indirect land use change in Brazil. **Land Use Policy**, v. 36, p. 595-604, Jan 2014. ISSN 0264-8377. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000329881400058 >.

DE SOUZA, R. A.; DE MARCO JUNIOR, P. The Red Queen race in Brazilian Amazon deforestation: the necessity of a sustainable economy to zero deforestation. **Natureza & Conservacao**, v. 13, n. 2, p. 190-192, Jul-Dec 2015. ISSN 1679-0073. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000368260400015 >.

DIAS-FILHO, M.B.; ANDRADE, C.M. Pastagens no Trópico Úmido. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2006.

DIRZO, R.; RAVEN, P. H. Global state of biodiversity and loss. **Annual Review of Environment and Resources**, v. 28, p. 137-167, 2003 2003. ISSN 1543-5938. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000220102700005 >.

DUCELLE, A. E. et al. Linking Forest Tenure Reform, Environmental Compliance, and Incentives: Lessons from REDD plus Initiatives in the Brazilian Amazon. **World Development**, v. 55, p. 53-67, Mar 2014. ISSN 0305-750X.

EMBRAPA. (2006). Technical note: ABC Sector Plan – Sector Plan on Climate Change Mitigation and Adaptation to Consolidate a Low-Carbon Economy in Agriculture. Disponível em/Available from: <https://www.embrapa.br/en/tema-agricultura-de-baixo-carbono/nota-tecnica>.

FEARNSIDE, P. M. Deforestation in Brazilian Amazonia: History, rates, and consequences. **Conservation Biology**, v. 19, n. 3, p. 680-688, Jun 2005. ISSN 0888-8892. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000229448100016 >.

FEARNSIDE, P. M. Deforestation soars in the Amazon. **Nature**, v. 521, n. 7553, p. 423-423, May 28 2015. ISSN 0028-0836. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000352866000020 >.

FEARNSIDE, P. M. Conservation policy in Brazilian Amazonia: Understanding the dilemmas. **World Development**, v. 31, n. 5, p. 757-779, May 2003. ISSN 0305-750X. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000182806300001 >.

FEARNSIDE, P. M.; LIMA DE ALENCASTRO GRACA, P. M. BR-319: Brazil's manaus-porto velho highway and the potential impact of linking the arc of deforestation to central Amazonia. **Environmental Management**, v. 38, n. 5, p. 705-716, Nov 2006. ISSN 0364-152X. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000241104500001 >.

FOLEY, J. A. et al. Amazonia revealed: forest degradation and loss of ecosystem goods and services in the Amazon Basin. **Frontiers in Ecology and the Environment**, v. 5, n. 1, p. 25-32, Feb 2007. ISSN 1540-9295. Disponível em/ Available from: < <Go to ISI>://WOS:000244042300021 >.

GIBBS, H. K. et al. Brazil's Soy Moratorium. **Science**, v. 347, n. 6220, p. 377-378, Jan 23 2015. ISSN 0036-8075. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000348225800019 >.

GIBBS, H. K. et al. Monitoring and estimating tropical forest carbon stocks: making REDD a reality. **Environmental Research Letters**, v. 2, n. 4, Oct-Dec 2007. ISSN 1748-9326. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000253653000028 >.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2016. Disponível em/Available from: <https://www.ibge.gov.br/home/>.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2016. Disponível em/Available from: <http://www.inpe.br/>.

INPE/EMBRAPA. Instituto de Pesquisa Espacial do Brasil/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2014. TerraClass (2012). Mapeamento do uso e cobertura da terra na Amazônia Legal brasileira. Brasília: MAPA, MMA e MCTI.

JEPSON, W. A disappearing biome? Reconsidering land-cover change in the Brazilian savanna. **Geographical Journal**, v. 171, p. 99-111, Jun 2005. ISSN 0016-7398. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000230553200001 >.

KINTISCH, E. Carbon emissions - Improved monitoring of rainforests helps pierce haze of deforestation. **Science**, v. 316, n. 5824, p. 536-537, Apr 27 2007. ISSN 0036-8075. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000245983100011 >.

LAPOLA, D. M. et al. Pervasive transition of the Brazilian land-use system. **Nature Climate Change**, v. 4, n. 1, p. 27-35, Jan 2014. ISSN 1758-678X. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000333666600012 >.

MACEDO, M. N. et al. Decoupling of deforestation and soy production in the southern Amazon during the late 2000s. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 109, n. 4, p. 1341-1346, Jan 24 2012. ISSN 0027-8424. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000299412600068 >.

MALHI, Y. et al. Climate change, deforestation, and the fate of the Amazon. **Science**, v. 319, n. 5860, p. 169-172, Jan 11 2008. ISSN 0036-8075. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000252246400030 >.

MARENGO, J. A.; ESPINOZA, J. C. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. **International Journal of Climatology**, v. 36, n. 3, p. 1033-1050, Mar 15 2016. ISSN 0899-8418. Disponível em/ Available from: < <Go to ISI>://WOS:000371541400001 >.

MARTINELLI, L. A. et al. The false dichotomy between preservation of the natural vegetation and food production in Brazil. **Biota Neotropica**, v. 10, n. 4, p. 323-330, Oct-Dec 2010. ISSN 1676-0603. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000208655400037 >.

MEA. Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystem and human wellbeing: synthesis. Washington, DC: Island Press, 2005.

NEPSTAD, D. et al. Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains. **Science**, v. 344, n. 6188, p. 1118-1123, Jun 6 2014. ISSN 0036-8075. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000336791200038 >.

NEPSTAD, D. C. et al. Interactions among Amazon land use, forests and climate: prospects for a near-term forest tipping point. **Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences**, v. 363, n. 1498, p. 1737-1746, May 27 2008. ISSN 0962-8436. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000254577500003 >.

NOLTE, C.; AGRAWAL, A.; BARRETO, P. Setting priorities to avoid deforestation in Amazon protected areas: are we choosing the right indicators? **Environmental Research Letters**, v. 8, n. 1, Jan-Mar 2013. ISSN 1748-9326. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000316998300102 >.

PIATTO, M.; COSTA, C. JR.; PINTO, L. F. G. 2015. Análise das emissões de GEE do setor agropecuário e o impacto das políticas públicas nas mudanças climáticas, São Paulo.

REYDON, B. P.; FERNANDES, V. B.; TELLES, T. S. Land tenure in Brazil: The question of regulation and governance. **Land Use Policy**, v. 42, p. 509-516, Jan 2015. ISSN 0264-8377. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000347018700047 >.

RODRIGUES, A. S. L. et al. Boom-and-Bust Development Patterns Across the Amazon Deforestation Frontier. **Science**, v. 324, n. 5933, p. 1435-1437, Jun 12 2009. ISSN 0036-8075. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000266878700043 >.

ROSA, I. M. D.; SOUZA, C., JR.; EWERS, R. M. Changes in Size of Deforested Patches in the Brazilian Amazon. **Conservation Biology**, v. 26, n. 5, p. 932-937, Oct 2012. ISSN 0888-8892. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000308484500019 >.

RYLANDS, A. B.; BRANDON, K. Brazilian protected area. **Conservation Biology**, v. 19, n. 3, p. 612-618, Jun 2005. ISSN 0888-8892. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000229448100006 >.

SFB. Serviço Florestal Brasileiro. 2016. Disponível em/Available from: <http://www.florestal.gov.br/>

SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA. 2016. Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. **Madeira legal Vs. Madeira ilegal**. Disponível em/Available from: <http://www.ambiente.sp.gov.br/madeiralegal/madeira-legal-vs-madeira-ilegal/>.

SOARES-FILHO, B. et al. Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change mitigation. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 107, n. 24, p. 10821-10826, Jun 15 2010. ISSN 0027-8424. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000278807400011 >.

TOLLEFSON, J. Battle for the Amazon. **Nature**, v. 520, n. 7545, p. 20-23, Apr 2 2015. ISSN 0028-0836. Disponível em/Available from: < <Go to ISI>://WOS:000352027700017 >.

Rafael Kuster Oliveira

Engenheiro Ambiental pela PUCPR. Especialista em Sistema de Gestão Ambiental pela PUCPR. Mestre em Manejo e Ecologia de Florestas pela Universidade de Freiburg, Alemanha. Doutor em Engenharia Florestal pela UFPR. Professor do curso de Engenharia Ambiental da PUCPR desde 2012.

Bachelor in Environmental Engineering from the Pontifical University of Paraná - PUCPR. Specialist in System of Environmental Management from PUCPR. Master in Forest Ecology and Management from the University of Freiburg, Germany. PhD in Forest Engineering from the Federal University of Paraná - UFPR. Professor of the Environmental Engineering course at PUCPR since 2012.

Fabiana De Nadai Andreoli

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (1993), mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo (1996) e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2011). Atua como professora na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pesquisadora dos grupos de pesquisas em Engenharia Ambiental e Educação em Engenharia. Coordenadora do curso de engenharia Ambiental da PUCPR desde 2008. Auditora e Consultora Ambiental. Sócia da empresa de consultoria ambiental Andreoli Engenheiros Associados.

Bachelor in Civil Engineering from the Federal University of Espírito Santo - UFES (1993), Master in Environmental Engineering from UFES (1996) and PhD in Education from PUCPR (2011). She is currently a professor at PUCPR. Researcher of the research groups on Environmental Engineering and Education in Engineering. Coordinator of the Environmental Engineering course at PUCPR since 2008. Environmental auditor and adviser. Partner in Andreoli Engenheiros Associados, an environmental advisory company.

Antonio Riouei Higa

Engenheiro Florestal pela Universidade de São Paulo (1975), Mestre em Ciências Florestais pela Universidade de São Paulo (1980), PhD on Forestry pela The Australian National University (1990) e Pós-Doutor pela Universidade de Freiburg, Alemanha (2008). Chefe geral da Embrapa Florestal (atual Centro Nacional de Pesquisa de Florestas). Desde 1998 é professor da Universidade Federal do Paraná. É bolsista de Produtividade do CNPq (2014-2017).

Bachelor in Forest Engineering from the University of São Paulo - USP (1975), Master in Forest Sciences from USP (1980), PhD in Forestry from the Australian National University (1990) and Post-PhD from the University of Freiburg, Germany (2008). General manager of Embrapa Florestal (currently National Center of Forest Research). He has been a professor at UFPR since 1998. He is currently Fellow Researcher on Productivity of the National Council of Technological and Scientific Development - CNPq (2014-2017).

Cleverson Vitorio Andreoli

Engenheiro Agrônomo (Universidade Federal do Paraná 1980), Mestre em Ciências do Solo (Universidade Federal do Paraná 1989) e Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento (Universidade Federal do Paraná 1999). Atualmente é professor e pesquisador no mestrado profissional em Governança e Sustentabilidade do ISAE/FGV e diretor da empresa de consultoria ambiental Andreoli Engenheiros Associados. Trabalhou 35 anos na SANEPAR.

Bachelor in Agricultural Engineering from the UFPR (1980), Master in Soil Sciences from UFPR (1989) and PhD in Environment and Development from UFPR (1999). He is currently a professor and researcher of the Master Program in Governance and Sustainability at the Higher Institute of Administration and Economy of Mercosur - ISAE/FGV and director of Andreoli Engenheiros Associados. He worked for 35 years at the Sanitation Company of Paraná - SANEPAR.

Tabela 22.1 - Número de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar de PM10, nas Regiões Metropolitanas de Salvador (Camaçari), Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre 1995-2013

Table 22.1 - Number of violations of the national primary standard of air quality of PM10 in the metropolitan areas of Salvador (Camaçari), Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba and Porto Alegre 1995-2013

Anos/ Years	Salvador (Camaçari) (1)	Belo Horizonte	Vitória	Rio de Janeiro	São Paulo	Curitiba	Porto Alegre
1995	...	7	...	...	...	...	...
1996	...	10	...	...	...	...	...
1997	...	11	...	...	162	...	...
1998	...	7	...	...	26	...	...
1999	...	10	...	59	61	...	...
2000	...	4	...	64	38	...	...
2001	...	-	-	33	42	...	...
2002	...	-	-	43	23	-	1
2003	...	1	-	19	28	6	2
2004	1	...	-	11	7	11	3
2005	-	1	-	1	1	4	4
2006	-	2	-	15	2	9	5
2007	-	-	-	11	4	19	1
2008	-	4	-	2	2	24	2
2009	1	-	-	9	1	3	-
2010	-	2	-	10	6	4	-
2011	-	7	-	7	1	6	3
2012	-	...	16	25	-	7	-
2013	...	...	-	23	-	...	...

Fontes/Sources: 1. Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM (MG). 2. Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 3. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler. 4. Instituto Estadual do Ambiente - INEA (RJ). 5. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA. 6. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. 7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Vitória, ES).

(1) Na Região Metropolitana de Salvador, houve monitoramento somente nos municípios vizinhos ao Polo Industrial de Camaçari (10 pontos distribuídos nos municípios de: Câmara, Gravata, Cobre, Sítio, Lamarão, Concórdia, Escola, Machadinho, Leandrino e Areias). / (1) In the Metropolitan Area of Salvador, only the neighboring municipalities of the Camaçari Industrial Complex were monitored (10 points distributed in the municipalities of: Câmara, Gravata, Cobre, Sítio, Lamarão, Concórdia, Escola, Machadinho, Leandrino e Areias).

Tabela 22.2 - Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, em corpos de água selecionados, nas Unidades da Federação de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul - 2003-2013

Tabela 22.2 - Annual Average of Biochemical Oxygen Demand - BOD, in selected water bodies of Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul States - 2003-2013

(continua/to be continued)

Unidades da Federação e e corpos de água selecionados/ <i>Federation Units and selected water bodies</i>	Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (mg/l)/ <i>Annual Average of Biochemical Oxygen Demand - BOD (mg/l)</i>											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Pernambuco												
Bacia do Rio Capibaribe/ <i>Capibaribe River Basin</i>	5,1	3,1	4,3	4,2	4,8	4,2	5,1	4,3	5,5	8,4	10,7	
Bacia do Rio Igarassu/ <i>Igarassu River Basin</i>	26,6	8,3	5,7	3,7	2,4	2,8	1,6	5,6	6,9	5,3	7,1	
Bacia do Rio Ipojuca/ <i>Ipojuca River Basin</i>	15,8	3,9	3,7	4,1	5,1	4,4	7,7	4,5	13,2	10,8	16,1	
Bahia (1)												
Bacia do Rio Paraguaçu/ <i>Paraguaçu River Basin</i>	8,2	12,9	3,7	...	...	8,6	10,0	3,4	5,8	6,4	5,0	
Bacia do Rio São Francisco/ <i>São Francisco River Basin</i>	...	...	...	...	...	3,5	1,9	1,0	2,1	1,9	2,1	
Rio Jequitinhonha/ <i>Jequitinhonha River</i>	...	...	...	...	...	2,8	1,5	1,2	2	2	2,2	
Espírito Santo												
Bacia do Rio Doce/ <i>Doce River Basin</i>	...	...	...	...	1,2	2,5	2,8	4,8	2,0	3,1	...	
Rio Jucu/ <i>Jucu River</i>	...	...	...	...	3,2	1,7	1,9	3,9	1,6	2,0	...	
Rio Santa Maria da Vitória/ <i>Santa Maria da Vitória River</i>	...	...	...	...	1,2	2,4	1,8	6,7	1,9	2,9	...	
Minas Gerais												
Bacia do Rio das Velhas/ <i>Das Velhas River Basin</i>	7,5	5,5	8,0	5,0	6,7	5,7	3,9	2,8	4,2	4,9	...	
Bacia do Rio Doce/ <i>Doce River Basin</i>	1,6	1,6	1,5	1,6	1,3	1,5	1,3	1,1	2,1	2,0	...	
Rio Jequitinhonha/ <i>Jequitinhonha River</i>	2,1	2,6	2,1	2,0	2,1	2,0	2,5	1,4	2,7	2,5	...	
Rio de Janeiro												
Rio Paraíba do Sul/ <i>Paraíba do Sul River</i>	2,3	2,2	2,0	2,1	2,0	2,3	2,1	2,2	2,4	...	...	
São Paulo												
Represa Billings/Alto Tietê/ <i>Billings Dam/Upper Tietê</i>	7,0	5,5	5,1	5,0	5,4	5,6	5,8	7,4	6,9	7,4	10,9	

Tabela 22.2 - Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, em corpos de água selecionados, nas Unidades da Federação de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul - 2003-2013

Tabela 22.2 - Annual Average of Biochemical Oxygen Demand - BOD, in selected water bodies of Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul States - 2003-2013

(conclusão/concluded)

Unidades da Federação e e corpos de água selecionados/ <i>Federation Units and selected water bodies</i>	Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (mg/l)/ <i>Annual Average of Biochemical Oxygen Demand - BOD (mg/l)</i>										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
São Paulo											
Represa Guarapiranga/Alto Tietê/ <i>Guarapiranga Dam/Alto Tietê</i>	4,2	4,2	3,7	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	5,4	4,2	6,8
Zona Metropolitana/Alto Tietê/ <i>Metropolitan Area/Upper Tietê</i>	40,8	36,1	33,2	37,0	35,9	40,9	35,7	35,8	27,7	34,3	39,2
Paraná											
Rio Iguaçu/Zona Metropolitana (2) <i>Iguaçu River/Metropolitan Area (2)</i>	13,8	8,6	9,5	9,0	20,4	13,0	11,3	10,2	6,3	15,4	...
Bacia do Rio Tibagi/ <i>Tibagi River Basin</i>	3,2	4,9	3,7	2,2	2,1	2,4	2,4	2,0	2,2	2,1	...
Rio Grande do Sul											
Rio Caí/ <i>Caí River</i>	1,1	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4	1,2	1,2	2,0	2,1	...
Rio Gravataí/ <i>Gravataí River</i>	2,2	3,2	3,8	4,0	2,9	2,9	3,6	3,0	2,4	2,6	...
Rio dos Sinos/ <i>Dos Sinos River</i>	4,1	2,8	3,2	9,0	2,6	2,7	3,8	3,0	2,8	4,0	...

Fontes/Sources: 1. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA (BA). 2. Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA (ES). 3. Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM (MG). 4. Instituto das Águas do Paraná. 5. Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH (PE). 6. Instituto Estadual do Ambiente - INEA (RJ). 7. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - FEPAM (RS). 8. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.

Nota: Limite CONAMA da DBO para águas destinadas ao abastecimento público, após tratamento convencional: 5 mg/l./Note: CONAMA limit of BOD for public water supply after conventional treatment: 5mg/l.

(1) O INEMA iniciou o monitoramento a partir do mês de julho de 2011./(1) INEMA started monitoring from July 2011. (2) Refere-se ao subsistema 2 da Região Metropolitana, segundo o Instituto das Águas do Paraná./ (2) Refers to subsystem 2 of the Metropolitan Area, according to the Water Institute of Paraná.

DBO menor ou igual a 5 mg/l/
BOD less than or equal to 5 mg/l

DBO maior que 5 mg/l/
BOD greater than or equal to 5 mg/l

Tabela 22.3 - Número e Área das Unidades de Conservação Federais - 2014
Table 22.3 - Number and areas of Federal Conservation Units - 2014

Tipo de Uso e Categorias de Manejo/ <i>Type of Use and Management Categories</i>	Número/ <i>Number</i>	Área (Km²)/ <i>Area (Km²)</i>
TOTAL / <i>Total</i>	954	(1) 763 844
Proteção Integral/ <i>Integral Protection</i>	143	369 164
Estação Ecológica/ <i>Ecological Station</i>	32	74 691
Monumento Natural/ <i>Natural monument</i>	3	443
Parque Nacional/ <i>National Park</i>	71	252 978
Refúgio de Vida Silvestre/ <i>Wildlife Refuge</i>	7	2 017
Reserva Biológica/ <i>Biological Reserve</i>	30	39 034
Uso Sustentável/ <i>Sustainable Use</i>	811	394 681
Floresta Nacional/ <i>National Forest</i>	65	163 913
Reserva Extrativista/ <i>Extractive Reserve</i>	62	124 362
Reserva de Desenvolvimento Sustentável/ <i>Sustainable Development Reserve</i>	2	1 026
Reserva de Fauna/ <i>Fauna Reserve</i>	-	-
Área de Proteção Ambiental/ <i>Environmental Protection Area</i>	32	100 101
Área de Relevante Interesse Ecológico/ <i>Area of relevant ecological interest</i>	16	447
Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN/ <i>Private Reserves of Natural Heritage - PRNH</i>	634	4 831

Fonte/SOURCE: Ministério do Meio Ambiente. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC.

Nota: Dados atualizados até outubro de 2014./Note: Updated data until October 2014.

(1) Considerando sobreposição mapeada a área passa a ser de 758.734 Km²/(1) Considering overlapped mapping, the area is 758 734 km².

Gráfico 22.1 - Desflorestamento bruto anual na Amazônia Legal - 1992-2015

Graph 22.1 - Annual gross deforestation in Legal Amazon - 1992-2015

Fonte/Source: Projeto Prodes: monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, [2015]. Disponível em/Available from: <<http://www.inpe.br/#>>. Acesso em: jan. 2016/Cited: Jan. 2016.

Nota: Dados de 1º de agosto.(1) Dados referentes ao período entre agosto de 1992 e agosto de 1994 (taxa para 2 anos). (2) Dados estimados para o ano de 2015./Note: Data from August 1º.(1) Data for the period between August 1992 and August 1994 (rate for 2 years). (2) Estimated data for 2015.

Gráfico 22.2 - Focos de calor no Brasil, na Amazônia Legal e em Unidades de Conservação e Terras Indígenas - 2008-2015

Graph 22.2 - Hotspots in Brazil, Legal Amazon and in Conservation Units, Indigenous Lands - 2008-2015

Fontes/Sources: 1. Monitoramento de queimadas e incêndios por satélite em tempo quase-real. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, 2016. Disponível em/Available from: <<http://www.inpe.br/queimadas/estatisticas.php>>. Acesso em: jan. 2016/Cited: Jan. 2016. 2. Queimadas: monitoramento de focos. Cachoeira Paulista: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC, 2016. Disponível em/Available from: <<http://www.inpe.br/queimadas/estatisticas.php>>. Acesso em: jan. 2016/Cited: Jan. 2016.

Notas: 1. Os dados de focos de calor foram obtidos pelo satélite AQUA M-T.

2. Para o Brasil, o total corresponde à soma dos focos apresentados por cada bioma.

3. Os focos apresentados como sem informação ou indeterminado não foram computados no indicador.

4. Foram consideradas as Unidades de Conservação federais e estaduais./

Notes: 1. Data about hotspots were obtained by AQUA M-T.

2. For Brazil, the total is the sum of hotspots for each biome.

3. Hotspots presented as not informed or indeterminate were not included in the indicator.

4. Considering federal and state Conservation Units.

Gráfico 22.3 - Comercialização de agrotóxicos e afins, por área plantada - Brasil - 2001/2013

Graph 22.3 - Commercialization of pesticides and the like, by planted area - Brazil - 2001/2013

Fontes/Sources: 1. Relatórios de comercialização de agrotóxicos: boletim anual de produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos no Brasil 2000-2013. Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, [2016]. Disponível em/Available from: <<http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos/pagina-3>>. Acesso em: abr. 2016/Cited: Apr. 2016. 2. Levantamento sistemático da produção agrícola: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil 2000-2005. Rio de Janeiro: IBGE, v. 12-17, 2000-2005. Disponível em/Available from: <<http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=76>>. Acesso em: abr. 2016/Cited: Apr. 2016. 3. Produção agrícola municipal 2009-2013. In: IBGE. Sidra: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em/Available from: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pam/default.asp>>. Acesso em: fev. 2015/Cited: Feb. 2015. 4. Relatórios de comercialização de agrotóxicos: boletim anual de produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos no Brasil. 2009 - 2012. Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, [2016]. Disponível em/Available from: <<http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos/pagina-3>>. Acesso em: abr. 2016/Cited: Feb. 2016.

Nota: Sem informação para os anos de 2006, 2007 e 2008./Note: Data not available for years 2006, 2007 e 2008.

Gráfico 22.4 - Proporção de material reciclado em atividades industriais selecionadas - 1994/2014

Graph 22.4 - Proportion of recycled material in selected industrial activities 1994/2014

Fontes/Sources: 1. Associação Brasileira do Alumínio - ABAL. 2. Associação Brasileira de Papel e Celulose - BRACELPA. 3. Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro - ABIVIDRO. 4. Associação Brasileira da Indústria do PET - ABIPE. 5. Associação Brasileira de Embalagem de Aço - ABEAÇO. 6. Associação Brasileira da Indústria de Leite Longa Vida - ABLV. 7. Compromisso Empresarial para Reciclagem - CEMPRE.

Nota: Não há informação sobre reciclagem de latas de alumínio no ano de 2013. O último ano da informação para reciclagem de vidro é 2011; para reciclagem de papel, embalagens PET e latas de aço é 2012; para reciclagem de embalagem longa vida é 2013 e para reciclagem de latas de alumínio é 2014.
Note: No information available on the recycling of aluminum cans in year 2013. The latest figures on glass recycling date back to 2011; on paper, PET and steel can recycling, to 2012; on long-life packaging recycling, to 2013 and on aluminum can recycling, to 2014.