Meio Ambiente

Environment

Sem título, 1976

Untitled

Valdir Sarubbi

Environment

Ricardo Jorge Amorim de Deus¹

Kleber Raimundo Freitas Faial²

Adaelson Campelo Medeiros³

Rosivaldo de Alcântara Mendes⁴

Kelson do Carmo Freitas Faial⁵

Simonny do Carmo Simões Rolo de Deus⁶

Violations of the national standard of air quality by atmospheric particulate matter pm_{10}

The Earth's atmosphere consists of gases and particles that vary in concentration due to natural sources such as meteorological and/or anthropogenic conditions such as those from industrial and vehicular emissions, causing aggravation of cardiovascular, mutagenic,

¹ Adjunct Professor of UFPA, PhD in Chemistry with Emphasis on Environmental.

² Researcher / Coordinator of the Laboratory of Environmental Toxicology of the Evandro Chagas Institute (IEC), PhD in Chemistry with Emphasis on Environmental Monitoring of Metallic Pollutants (UFPA).

³ Researcher at the Laboratory of Environmental Toxicology of the Evandro Chagas Institute (IEC), PhD in Collective Health with emphasis on Water Resources and Environmental Sanitation (UFRJ).

⁴ Researcher at the Laboratory of Toxicology of the Evandro Chagas Institute (IEC), PhD in Chemistry with Emphasis on Environmental Monitoring of Organic Contaminants (UFPA).

⁵ Researcher at the Laboratory of Environmental Toxicology of the Evandro Chagas Institute (IEC), PhD in Chemistry with Emphasis on Environmental Monitoring of Metal Pollutants (UFPA).

⁶ Doctoral student in Chemistry with Emphasis Environmental Monitoring and Geotechnology (UFPA).

Meio Ambiente

Ricardo Jorge Amorim de Deus¹

Kleber Raimundo Freitas Faial²

Adaelson Campelo Medeiros³

Rosivaldo de Alcântara Mendes⁴

Kelson do Carmo Freitas Faial⁵

Simonny do Carmo Simões Rolo de Deus⁶

Violações do padrão primário nacional de qualidade do ar por material particulado atmosférico MP₁₀

A atmosfera terrestre é composta por gases e partículas que sofrem variações em termos de concentração em função de fontes naturais como condições meteorológicas e/ou antropogênicas como as provenientes de emissões industriais e veiculares, promovendo agravamento de doenças cardiovasculares, mutagênicas,

¹ Professor Adjunto da Universidade Federal do Pará (UFPA), Doutor em Química com ênfase em modelagem ambiental.

² Pesquisador/Coordenador do Laboratório de Toxicologia Ambiental do Instituto Evandro Chagas (IEC), Doutor em Química com ênfase em monitoramento ambiental de contaminantes metálicos (UFPA).

³ Pesquisador do Laboratório de Toxicologia Ambiental do Instituto Evandro Chagas (IEC), Doutor em Saúde Coletiva com ênfase em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

⁴ Pesquisador do Laboratório de Toxicologia do Instituto Evandro Chagas (IEC), Doutor em Química com ênfase em monitoramento ambiental de contaminantes orgânicos (UFPA).

⁵ Pesquisador do Laboratório de Toxicologia Ambiental do Instituto Evandro Chagas (IEC), Doutor em Química com ênfase em monitoramento ambiental de contaminantes metálicos (UFPA).

⁶ Doutoranda em Química com ênfase monitoramento ambiental e geotecnologia (UFPA).

respiratory, neurological and cancerous diseases, especially in the most susceptible population such as children and the elderly (GURJAR, 2008; KAMPA; CASTANAS, 2008). Inhaled particles (PM_{10}) with average aerodynamic diameter of particles up to 10 μm are generally composed of sulfates, nitrates, ammonia, organic substances, ions, hydrogen and metals (Pb, Cd, As, Si, Ca, Mg, Al, Fe, among others), in addition to organic particles such as: carbon dioxide (CO_2), carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (H_nC_m), sulfur oxides (SO_x), nitrogen oxides (NO_x), and O_3 (ozone).

With the implementation of the MP_{10} manual monitoring network, concentration indices of these particles are routinely recorded, and they often exceed the limits of up to 150 $\mu g\ m^{-3}$ for the 24-hour period and 50 $\mu g\ m^{-3}$ per year proposed by CONAMA Resolution n. 3, 28.06.1990 (CONSELHO..., 1990). Although there is still a shortage of observational data to diagnose the flow of PM_{10} in industries, light and heavy vehicle transport, burnings, agricultural activities, trace gases, aerosols and others, the pollution control according to Table 22.1, referring to the number of violations of the PM_{10} national primary air quality standard between 1995-2016 in Metropolitan Regions, showed that the highest number of PM_{10} violations due to the high degree of urbanization and industrialization are recorded in the Southeast Region of Brazil, specifically in the Metropolitan Regions of Rio de Janeiro, with 350 violations between 1999 and 2014, São Paulo with 405 violations between 1997 and 2014 and Belo Horizonte with 72 violations between 1995 and 2012. Thus, the implementation of programs such as PROCONVE (Program for the Control of Air Pollution by Automotive Vehicles) responsible for a 90% drop in the emission limit for light vehicles and 80% for heavy vehicles (SANCHEZ-CCYOLLO et al., 2007), and pointed out as the main factor for the reduction of the mean concentrations of several primary pollutants recorded in large metropolises over the last decade (MARTINS et al., 2004), may have contributed to a significant decrease in the number of MP_{10} violations in Metropolitan Region of São Paulo (162 violations in 1997 for 1 rape in 2014). However, in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro there is an oscillation in the high number of MP_{10} violations, which may be related to the influence of the subtropical South Atlantic anticyclone, the absence of precipitation and the occurrence of thermal inversions in the lower troposphere (SANTOS; CARVALHO; REBOITA, 2016).

respiratórias, neurológicas e cancerígenas, principalmente em população mais suscetível como crianças e os idosos (GURJAR, 2008; KAMPA; CASTANAS, 2008). Partículas inaláveis grossas (MP10) com diâmetro aerodinâmico médio das partículas de até 10 μm , são constituídos em geral por sulfatos, nitratos, amônia, substâncias orgânicas, íons, hidrogênio e metais (Pb, Cd, As, Si, Ca, Mg, Al, Fe, entre outros), além de partículas orgânicas tais como: dióxido de carbono (CO_2), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos não queimados (H_nC_m), óxidos de enxofre (SO_x), óxidos de nitrogênio (NO_x) e o O_3 (ozônio).

Com a implantação da rede manual de monitoramento de MP10, são registrados rotineiramente índices de concentração dessas partículas, que muitas vezes ultrapassam os limites de até 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para o período de 24h e de 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ anual, propostos pela Resolução CONAMA n. 3, de 28.06.1990 (CONSELHO..., 1990). Apesar de que ainda verifica-se escassez de dados observacionais para diagnosticar o fluxo de MP_{10} em regiões industriais, transporte veicular leves e pesados, queimadas, atividades agrícolas, gases-traço, aerossóis e outros; o controle da poluição de acordo com a Tabela 22.1, referente ao número de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar de MP_{10} entre 1995-2016 em Regiões Metropolitanas, demonstraram que os maiores números de violações para MP_{10} em função do alto grau de urbanização e industrialização, encontram-se na Região Sudeste do Brasil, especificamente nas Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro com 350 violações entre 1999 a 2014; São Paulo com 405 violações entre 1997 a 2014 e Belo Horizonte com 72 violações entre 1995 a 2012. Assim, desde a implantação de programas como Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) responsável por uma queda de 90% no limite de emissões por veículos leves e de 80% por veículos pesados (SANCHEZ-CCYOLLO et al., 2007) e apontado como o principal fator para a redução das concentrações médias de diversos poluentes primários registrados em grandes metrópoles ao longo da última década (MARTINS et al., 2004), pode ter contribuído para o decréscimo expressivo do número de violações para MP_{10} na Região Metropolitana de São Paulo (162 violações em 1997 para 1 violação em 2014). Porém, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro ocorre oscilação no alto número de violações para MP_{10} , o que pode estar relacionado com a influência da atuação de anticiclone subtropical do Atlântico Sul, a ausência de precipitação e a ocorrência de inversões térmicas na baixa troposfera (SANTOS; CARVALHO; REBOITA, 2016).

The trend of increase and decrease of the number of MP₁₀ violations in the Metropolitan Regions of Salvador (Polo Camaçari), Vitória and Porto Alegre has not been confirmed in recent years due to a lack of observational data. However, in spite of the lack of information, the Curitiba Metropolitan Region with 96 violations between 2003 and 2013 may be related to meteorological conditions due to the low relative humidity of the air, the dry fog, the thermal inversion and the low speed of the winds that make difficult the vertical and horizontal dispersion of pollutants. This diagnosis, also verified by Azuaga (2000), shows that the damages are not restricted only to the areas where the emission occurred, because through the dispersions arising from the convection currents of the air, the particles cross regional and national borders.

Deforestation in the Legal Amazon

The Legal Amazon was created in 1953 for the purpose of political planning (HOMMA, 2008) and comprehensively comprises the states of Acre (3.04%), Amapá (2.85%), Amazonas (31.29%), Mato Grosso (4.73%), Roraima (4.47%) and Tocantins (5.53%) and partially Maranhão (5.24%) (BRASIL, [2018]; ARAGON, 2013). The process of deforestation in the Legal Amazon is associated with market factors, such as changes in agricultural commodity prices, as well as government policies that encourage or combat this problem. In the case of the Amazon region, the agricultural commodity prices are estimated to be the cause of deforestation both by theoretical works (ANGELSEN; KAIMOWITZ, 1999; ANGELSENAB, 1999; GEIST; LAMBIN, 2002) and by empirical analyzes for the Legal Amazon (ARIMA et al., 2007). Other studies indicate that policies implemented since 2004 have contributed greatly to the reduction of deforestation in the Legal Amazon (ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2012, 2013; SOUZA; MIZIARA; MARCO JUNIOR, 2013; DEFRIES et al., 2013). Within this context, PRODES (Program for the Calculation of Amazon Deforestation) since 1988 has made available the annual and official rate of deforestation for all states of the Legal Amazon, and since 2003 the program has adopted a methodology based on digital image processing (PRODES digital), which made it possible to disclose the dynamics of deforestation (AMAZÔNIA, 2018; PLANO..., 2004; CÂMARA; VALERIANO; SOARES, 2006, INSTITUTO..., 2008). Thus, using PRODES data for the period 1992-2017 (Graph 22.1), it was possible to observe a high deforestation peak in 1995 (29 059 km²) and 2004 (27 772 km²), due to the stability and growth of the internal consumption after the implementation of the

A tendência de aumento e decréscimo do número de violações para MP₁₀ nas Regiões Metropolitanas de Salvador (Polo Camaçari), Vitória e Porto Alegre não pôde ser confirmada nos últimos anos por escassez de dados observacionais. Porém, apesar de escassez de informações, a Região Metropolitana de Curitiba com 96 violações entre 2003 a 2013 pode estar relacionada com condições meteorológicas em função da baixa umidade relativa do ar, a névoa seca, a inversão térmica e a baixa velocidade dos ventos que dificultam a dispersão vertical e horizontal dos poluentes. Este diagnóstico, também verificado por Azuaga (2000), demonstra que os danos não se restringem somente às áreas onde ocorreu a emissão, pois através das dispersões decorrentes das correntes de convecção do ar, as partículas ultrapassam fronteiras regionais e nacionais.

Desflorestamento na Amazônia Legal

A Amazônia Legal foi criada em 1953 para fins de planejamento político (HOMMA, 2008) e compreende integralmente os estados do Acre (3,04%), Amapá (2,85%), Amazonas (31,29%), Mato Grosso (31,29%), Pará (24,86%), Rondônia (4,73%), Roraima (4,47%) e Tocantins (5,53%) e, parcialmente, o Maranhão (5,24%) (BRASIL, [2018]; ARAGON, 2013). O processo do desmatamento na Amazônia Legal está associado a fatores de mercado, tais como variações nos preços das *commodities* agrícolas, bem como às políticas governamentais que incentivam ou combatem esse problema. Os preços das *commodities* agrícolas são apontados como causas do desmatamento tanto por trabalhos teóricos (ANGELSEN; KAIMOWITZ, 1999; ANGELSENAB, 1999; GEIST; LAMBIN, 2002) quanto por análises empíricas para a Amazônia Legal (ARIMA et al., 2007). Outros trabalhos indicam que políticas implementadas a partir de 2004 têm contribuído sobremaneira para a redução do desmatamento na Amazônia Legal (ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2012, 2013; SOUZA; MIZIARA; MARCO JUNIOR, 2013; DEFRIES et al., 2013). Dentro deste contexto, o Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia (PRODES), desde 1988 disponibiliza a taxa anual e oficial do desmatamento para todos os estados da Amazônia Legal e a partir de 2003 o programa adotou uma metodologia baseada no processamento digital de imagens de sensoriamento remoto (PRODES digital), o que possibilitou divulgar também a dinâmica do desmatamento (AMAZÔNIA, 2018; PLANO..., 2004; CÂMARA; VALERIANO; SOARES, 2006, INSTITUTO..., 2008). Assim, utilizando dados do PRODES para o período de 1992-2017 (Gráfico 22.1) foi possível verificar elevado pico de desflorestamento em 1995 (29 059 km²) e 2004 (27 772 km²), em função da estabilidade e crescimento do consumo interno após a implantação do Plano Real em 1994 (FEARNSIDE, 2005)

Real Plan in 1994 (FEARNSIDE, 2005) and the increase in agricultural commodity prices, especially soybean in 2004 (FERREIRA; COELHO, 2015), respectively. Looking at Graph 22.1, we observe that, after the 1995 high deforestation peak, the federal government modified the Forest Code, determining that the legal reserve area would change from 50% to 80% in the Legal Amazon, which may have reduced deforestation in years until the increase in soybean commodities in 2004. Since 2005, with the reduction of soybean prices and with more consistent policy applications, deforestation has decreased drastically (FERREIRA; COELHO, 2015; ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2012, 2013; SOUZA; MIZIARA; MARCO JUNIOR, 2013; DEFRIES et al., 2013), reaching 6 624 km² in 2017. However, according to RIGNOT et al. (1997), vegetation that grows for one year after forest cutting and burning may be able to mask soil response and decrease band return and polarization, which reduces the contrast between forest and deforestation.

Biochemical Oxygen Demand (BOD) in selected bodies of water from Federation Units

BOD represents the amount of dissolved oxygen consumed by microorganisms to decompose the organic matter present in the water. High levels of organic matter introduced into waters used for various purposes can trigger a number of problems, including eutrophication, reduction of dissolved oxygen concentration in water, asphyxiation of aquatic organisms and pollution of water supply (BIOLOGICAL..., 2017). In this sense, population growth in urban areas in the last decades, land use and land use without urban planning, lack of investments in sanitation services together with effective treatments and adequate final destination of the pollutants originated in these urban agglomerations, the installation of industries, deforestation and other factors detrimental to environmental health have contributed to the increase in organic matter and pollution of aquatic ecosystems (SILVA; MORAES, 2012). The average annual concentration of BOD (Table 22.2), referring to the environmental monitoring conducted between 2005 and 2017 in water bodies belonging to the Federations, showed that 25% of the values were outside the Brazilian legislation (CONSELHO..., 2005) on the classification of water bodies and environmental guidelines for their classification (CONSELHO..., 2005). That was mainly observed in São Paulo: Billings/Alto Tietê Dam (5.0 mg L⁻¹ at 10.9 mg L⁻¹), Guarapiranga / Alto Tietê Dam (3.0 mg L⁻¹ at 7.3 mg L⁻¹), Metropolitan

e o aumento de preços das *commodities* agrícolas, especialmente a soja em 2004 (FERREIRA; COELHO, 2015), respectivamente. Observando o Gráfico 22.1, após o pico de desflorestamento elevado de 1995, o governo federal modificou o código florestal, determinando que a área de reserva legal passasse de 50% para 80% na Amazônia Legal, o que pode ter reduzido o desmatamento nos anos seguintes até o aumento das *commodities* da soja em 2004. A partir de 2005, com a diminuição do preço da soja e com aplicações de políticas mais consistentes, o desflorestamento reduziu drasticamente (FERREIRA; COELHO, 2015; ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2012, 2013; SOUZA; MIZIARA; MARCO JUNIOR, 2013; DEFRIES et al., 2013), chegando no valor de 6 624 km² em 2017. Entretanto, a vegetação que cresce durante um ano após o corte e queima da floresta pode ser capaz de mascarar a resposta do solo e provocar a diminuição do retorno em banda e polarização, o que reduz o contraste entre a floresta e os desflorestamentos.

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em corpos de água selecionados de Unidades da Federação

A DBO representa a quantidade de oxigênio dissolvido consumido por microrganismos para decompor a matéria orgânica presente na água. Níveis elevados de matéria orgânica introduzida nas águas utilizadas para diversas finalidades podem desencadear uma série de problemas, dentre eles, a eutrofização, redução da concentração de oxigênio dissolvido na água, asfixia de organismos aquáticos e poluição das águas de abastecimento (BIOLOGICAL..., 2017). Neste sentido, o crescimento populacional em áreas urbanas nas últimas décadas, o uso e ocupação do solo sem planejamento urbano, a falta de investimentos em serviços de saneamento em conjunto com tratamentos eficazes e destino final adequado dos poluentes originados nestes aglomerados urbanos, a instalação de indústrias, desmatamentos e outros fatores prejudiciais à saúde ambiental vêm contribuindo para o aumento da matéria orgânica e poluição dos ecossistemas aquáticos (SILVA; MORAES, 2012). A concentração média anual de DBO (Tabela 22.2), referente ao monitoramento ambiental realizado no intervalo de 2005 a 2017 em corpos hídricos pertencentes às Unidades da Federação, mostrou que 25 % dos valores estiveram fora dos padrões da legislação brasileira (CONSELHO..., 2005) que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento (CONSELHO..., 2005). Principalmente em São Paulo: Represa Billings/Alto Tietê (5,0 mg/L a 10,9 mg/L), Represa Guarapiranga/Alto Tietê (3,0 mg/L a 7,3 mg/L), Zona Metropolitana/Alto Tietê (26,3 mg/L a 40,9 mg/L); Paraná: Rio Iguaçu/Zona Metropolitana (5,4 mg/L a 31,5 mg/L); Minas Gerais: Bacia do Rio das Velhas (2,8 mg/L a 8,7 mg/L) e Pernambuco: Bacia do Rio Capibaribe (4,2 mg/L a 14,8 mg/L), Bacia

Zone / Alto Tietê (26.3 mg L⁻¹ to 40.9 mg L⁻¹); Paraná: Rio Iguaçu / Metropolitan Zone (5.4 mg L⁻¹ to 31.5 mg L⁻¹); Minas Gerais: Basin of the Rio das Velhas (2.8 mg L⁻¹ to 8.7 mg L⁻¹) and Pernambuco: Capibaribe River Basin (4.2 mg L⁻¹ to 14.8 mg L⁻¹), Igarassu River Basin (1.6 mg L⁻¹ to 8.6 mg L⁻¹), Ipojuca River Basin (3.7 mg L⁻¹ to 24.7 mg L⁻¹), which cut large urban areas, cross industrialized areas, or pass through many medium and large-sized cities, with BOD values fluctuating or increasing over time for most rivers, indicating that measures to control and reduce water pollution had no effect. The São Francisco River, which has the Velhas River as one of its most important tributaries, presents, in its middle course, mean annual BOD values below the CONAMA limit for Class 2 waters, which can be used in public supply after conventional treatment. In the Paraíba do Sul River, the stretch used to supply the Metropolitan Region of Rio de Janeiro presents relatively low annual BOD values below the CONAMA limit for class 2 waters. These factors evidence the need to expand the monitoring system and integrated management of water resources to diagnose factors that affect water quality, proposing solutions by means of environmental indicators.

Heat sources in Brazil, in the Legal Amazon and in Conservation Units and Indigenous Lands

The occurrence of fire in protected areas constitutes one of the most important sources of alteration and destruction of flora and fauna, with consequent compromise of the natural resources in these places. In principle, burnings in protected areas would only be of natural origin, caused by lightning as local weather conditions and availability of combustible plant material; or, as established in CONAMA Resolution n. 11, of 14.12. 1988, the use of fire in conservation units is only possible when authorized by Ibama for the construction and opening of firebreaks in order to prevent the spread of fires. Posey (1987) argues that fire is used by Indians, but not to destroy forested areas, or to enlarge fields and savannahs, but to manage the "islands of resources," the so-called *aptes*, of denser and richer vegetation. This transformation comes in the wake of changes in the regional climate, which include the reduction of precipitation by 20% and the temperature jump by 2° to 8° C by the end of the century (NEPSTAD, 2007; COE et al., 2013). According to Figure 22.2, high values of heat sources in Brazil, in the Legal Amazon and in Conservation Units and Indigenous Lands were evidenced in the years 2010, 2012, 2015 and 2017. These events were quantified as

do Rio Igarassu (1,6 mg/L a 8,6 mg/L), Bacia do Rio Ipojuca (3,7 mg/L a 24,7 mg/L); que cortam grandes áreas urbanas, atravessam zonas industrializadas, ou passam por muitas cidades de médio e grande portes, sendo valores de DBO oscilantes ou crescentes ao longo do tempo para a maioria dos rios, indicando que as medidas de controle e redução da poluição hídrica ainda não surtiram efeito. O Rio São Francisco, que tem o Rio das Velhas como um de seus afluentes mais importantes, apresenta, em seu médio curso, valores de DBO média anual abaixo do limite estipulado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para águas de classe 2, que podem ser usadas no abastecimento público, após tratamento convencional. Já no Rio Paraíba do Sul, o trecho usado para o abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresenta valores médios anuais de DBO relativamente baixos, abaixo do limite CONAMA para águas de classe 2. Estes fatores demonstram a necessidade de ampliar o sistema de monitoramento e gestão integrada dos recursos hídricos visando diagnosticar fatores que afetam a qualidade da água, propondo soluções por meio de indicadores ambientais.

Focos de calor no Brasil, na Amazônia Legal e em Unidades de Conservação e Terras Indígenas

A ocorrência de fogo em áreas protegidas constitui uma das mais importantes fontes de alteração e destruição de flora e fauna, com consequente comprometimento dos recursos naturais nestes locais. Em princípio, as queimadas em áreas protegidas seriam apenas de origem natural, causadas por raios conforme as condições meteorológicas locais e disponibilidade de material vegetal combustível; ou ainda, conforme estabelecido na Resolução CONAMA n. 11, de 14.12.1988 (CONSELHO..., 1989), admite-se o uso do fogo em unidades de conservação somente quando empregado com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para a construção e abertura de aceiros visando evitar a propagação de incêndios. Posey (1987) afirma que o fogo é usado pelos indígenas, porém não para destruir áreas florestadas, nem para ampliar os campos e savanas, mas para manejar as “ilhas de recursos”, os chamados apetês, de vegetação mais densa e rica. Tal transformação vem na esteira de mudanças do clima regional que compreendem a redução das precipitações em 20% e o salto da temperatura em 2° a 8°C até o final do século (NEPSTAD, 2007; COE et al., 2013). De acordo com o Gráfico 22.2, valores elevados de focos de calor no Brasil, na Amazônia Legal e em Unidades de Conservação e Terras Indígenas, foram evidenciados nos anos de 2010, 2012, 2015 e 2017. Estes eventos foram quantificados como a seca mais severa ocorrida e o

the most severe drought and the onset was associated with the El Niño event and later potentiated by the Atlantic Multidecadal Oscillation (MARENGO et al., 2011).

Conservation Units in Brazil

Conservation Units (UC) are places where natural characteristics must be preserved, and whose purpose is to ensure the representativeness of significant and ecologically viable samples of the different populations, habitats and ecosystems of the national territory and jurisdictional waters, thus preserving the patrimony biological diversity. As of February 1, 2018, Brazil had 959 Federal Conservation Units located in a total area of 798,061 km² which represents approximately 9.37% of the federal territory, of which 48.3% are considered integral protection areas and 51.7% sustainable use. It is important to note that of the 147 areas for Integral Production, 73 are national parks, 32 are ecological stations, 31 are biological reserves, 8 are Wildlife Refuges and 3 are Natural Monuments. The Sustainable Use Areas are divided into: 635 Private Natural Reserves (RPPN), 67 National Forests, 62 Extractive Reserves, 33 Environmental Protection Areas (EPA'S), 13 Areas of Relevant Ecological Interest and 2 Sustainable Development Reserves (Table 22.3). From 2014 to 2017, Brazil had a satisfactory increase in Conservation Units, where 147 were Integral Protection corresponding to 385 648 km² of area and 812 of Sustainable Use corresponding to 412 413 km² area. However, in spite of satisfactory results, Brazil needs to expand specific and continuous studies to increase and periodically maintain conservation units in order to ensure the management of each unit a natural, local, regional, national and global level.

Commercialization of agrochemicals and related products, by area planted in Brazil

Agrochemicals and related products are defined as the products and agents of physical, chemical or biological processes intended for use in the production, storage and processing of agricultural products, in pastures, in the protection of forests, native or other ecosystems, as well as urban, water and industrial environments, whose purpose is to alter the composition of the flora or fauna, in order to preserve them from the harmful action of living beings considered harmful (CONSELHO..., 1989). The increase in the consumption of agrochemicals in Brazil is directly linked to the incentives for agribusiness growth, with

início foi associado ao evento de El Niño e posteriormente potencializado pela oscilação multidecadal do Atlântico (MARENGO et al., 2011).

Unidades de Conservação no Brasil

As Unidades de Conservação (UC) são locais onde as características naturais devem estar preservadas, e que tem a finalidade em garantir a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do Território Nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Até 01.02.2018 o Brasil apresentava 959 Unidades de Conservação Federais dispostas em uma área total de 798 061 km² o que representa aproximadamente 9,37% do território federal, desses 48,3% são consideradas áreas de proteção integral e 51,7% de uso sustentável. É importante ressaltar que das 147 áreas destinadas à produção integral, 73 são parques nacionais, 32 são estações ecológicas, 31 são reservas biológicas, 8 são refúgios de vida silvestre e 3 são monumentos naturais. Já as de uso sustentável são divididas em: 635 de Reservas Particulares de Proteção Natural (RPPN), 67 florestas nacionais, 62 reservas extrativistas, 33 Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 13 Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e 2 Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) (Tabela 22.3). De 2014 a 2017, o Brasil teve um acréscimo satisfatório em UC, onde 147 foram de proteção integral correspondendo 385 648 km² de área e 812 de uso sustentável correspondendo a 412 413 km² área. Entretanto, apesar de resultados satisfatórios, o Brasil necessita de ampliação de estudos específicos e contínuos para ampliação e manutenção periódica das UC, a fim de garantir a gestão de cada unidade uma junção em níveis naturais locais, regionais, nacionais e mundiais.

Comercialização de agrotóxicos e afins, por área plantada no Brasil

Os agrotóxicos e afins são definidos como os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (CONSELHO..., 1989). O aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil, está diretamente vinculado aos incentivos para o crescimento do agronegócio, com o uso abusivo relacionado à proteção e conservação das culturas de pragas danosas. Em 10 anos, houve um aumento de 100% do

the abusive use related to the protection and conservation of crops of harmful pests. In ten years, there was a 100% increase in the consumption of agrochemicals per planted area that today is around 7 kg ha⁻¹ (Graph 22.3) and this has certainly led to a greater discharge of pesticides into the environment with contamination of the soil and surface waters, with the desire of homes, rivers and water sources of drinking water and animal breeding (DOSSIÊ..., 2012), directly affecting the health of the population. The number of people exposed and intoxication grow every year but the notification is still low, which shows a lack of attention to the intoxication caused by these substances in the Unified Health System as a whole. The intensification of programs such as the Health Vigilance of Exposed Pools (VSPEA) can change this framework in the medium term. The International Agency for Cancer Research (IARC) has classified most of the pesticides used in crops as carcinogenic (PIGNATI et al, 2017). It is estimated that approximately 400.000 deaths each year can be attributed to agrochemical poisoning, with 99% in developing countries (CAMPANHOLA; BETTIOL, 2002; MOREIRA et al., 2002). Agrochemicals banned in first world countries and released in underdeveloped countries can contribute to this. Organic agriculture may be an outlet to alleviate the growing use of agrochemicals, but there is still a lack of incentives for this activity in Brazil.

References

AMAZÔNIA. Disponível em: <<http://g1.globo.com/natureza/amazonia/>>. Cited: Apr 2018.

ANGELSENAB, A. Agricultural expansion and deforestation: modelling the impact of population, market forces and property rights. *Journal of Development Economics*, New York, v. 58, n. 1, p. 185-218, Feb. 1999. Available from: < <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-development-economics/issues>>. Cited: Apr 2018.

ANGELSEN, A.; KAIMOWITZ, D. Rethinking the causes of deforestation: lessons from economic models. *The World Bank Research Observer*, Washington, v. 14, n. 1, p. 73-98, Feb. 1999. Available from:<<https://academic.oup.com/wbro>>. Cited: Apr 2018.

ARAGON, L. E. Há um futuro para o desenvolvimento sustentável na Amazônia? In: _____. *Amazônia: conhecer para desenvolver e conservar: cinco temas para um debate*. São Paulo: Hucitec, 2013. 324 p.

consumo de agrotóxicos por área plantada que hoje está em torno de 7 kg/ha (Gráfico 22.3) e isto certamente acarretou uma descarga maior de agrotóxicos para o ambiente com a contaminação do solo e das águas superficiais, com o despejo próximo a residências, rios e mananciais de água potável e criação de animais (DOSSIÊ..., 2012), afetando diretamente a saúde da população. O número de pessoas expostas à intoxicação cresce a cada ano, mas a notificação ainda é baixa, o que demonstra uma falta de atenção à intoxicação causada por estas substâncias no Sistema Único de Saúde (SUS) como um todo. A intensificação de programas como a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) pode alterar este quadro em médio prazo. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC) tem classificado a maioria dos agrotóxicos utilizados nas culturas como cancerígenos (PIGNATI et al., 2017). Estima-se que aproximadamente 400 000 mortes a cada ano podem ser atribuídas à intoxicação por agrotóxicos, com 99% nos países em desenvolvimento (CAMPANHOLA; BETTIOL, 2003; MOREIRA et al., 2002). Agrotóxicos proibidos em países do primeiro mundo e liberados nos países sub-desenvolvidos podem contribuir para este dado. A agricultura orgânica pode ser uma saída para atenuar o uso crescente de agrotóxicos, mas ainda faltam incentivos para esta atividade no Brasil.

Referências

AMAZÔNIA. Disponível em: <<http://g1.globo.com/natureza/amazonia/>>. Acesso em: abr. 2018.

ANGELSEN, A. Agricultural expansion and deforestation: modelling the impact of population, market forces and property rights. *Journal of Development Economics*, New York, v. 58, n. 1, p. 185-218, Feb. 1999. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-development-economics/issues>>. Acesso em: abr. 2018.

ANGELSEN, A.; KAIMOWITZ, D. Rethinking the causes of deforestation: lessons from economic models. *The World Bank Research Observer*, Washington, v. 14, n. 1, p. 73-98, Feb. 1999. Disponível em: <<https://academic.oup.com/wbro/>>. Acesso em: abr. 2018.

ARAGON, L. E. Há um futuro para o desenvolvimento sustentável na Amazônia? In: _____. *Amazônia: conhecer para desenvolver e conservar: cinco temas para um debate*. São Paulo: Hucitec, 2013. 324 p.

ARIMA, E. Y. et al. Fire in the Brazilian Amazon: a spatially explicit model for policy impact analysis. *Journal of Regional Science*, New York, v. 47, n. 3, p. 541-567, Aug. 2007. Available from: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.14679787>>. Cited: Apr. 2018.

ASSUNÇÃO, J., GANDOUR, C. C.; ROCHA, R. *Deforestation slowdown in the legal Amazon: prices or policies?* Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2012. 37 p. (CPI Working Paper). Available from: <<https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2012/03/Deforestation-Prices-or-Policies-Working-Paper.pdf>>. Cited: Apr. 2018.

_____. *DETERing deforestation in the Brazilian Amazon: environmental monitoring and law enforcement*. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2013. Disponível em: <<https://climatepolicyinitiative.org/publication/detering-deforestation-in-the-brazilian-amazon-environmental-monitoring-and-law-enforcement/>>. Cited: Apr. 2018.

AZUAGA, D. *Danos ambientais causados por veículos leves no Brasil*. 2000. 168 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000. Available from: <<http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dazuaga.pdf>>. Cited: Apr. 2018.

BIOLOGICAL oxygen demand (BOD) in rivers. [Copenhagen]: European Environment Agency, 2017. 1 mapa. Available from: <<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/wise-soe-bod-in-rivers>>. Cited: Apr. 2018.

BRASIL. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. *Legislação da Amazônia*. Brasília, DF: SUDAM, [2018]. Available from: <<http://www.sudam.gov.br/index.php/prda/58-acesso-a-informacao/86-legislacao-da-amazonia>>. Cited: Apr. 2018.

CÂMARA, G.; VALERIANO, D. de M.; SOARES, J. V. *Metodologia para o cálculo da taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal*. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2006. Atualizado por Marisa da Motta. Available from: <<http://www.obt.inpe.br/prodes/metodologia.pdf>>. Cited: Apr. 2018.

CAMPANHOLA, C.; BETTIOL, W. Panorama sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. In: _____. (Ed.). *Métodos alternativos de controle fitossanitário*. Jaguariuna: Embrapa meio Ambiente, 2003. p. 13-51. Available from: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1076531/1/Campanholapanorama.pdf>>. Cited: Apr. 2018.

COE, M.T. et al. Deforestation and climate feedbacks threaten the ecological integrity of south-southeastern Amazonia. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, London, v. 368, n. 1619,

ARIMA, E. Y. et al. Fire in the Brazilian Amazon: a spatially explicit model for policy impact analysis. *Journal of Regional Science*, New York, v. 47, n. 3, p. 541-567, Aug. 2007. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14679787>>. Acesso em: abr. 2018.

ASSUNÇÃO, J., GANDOUR, C. C.; ROCHA, R. *Deforestation slowdown in the legal Amazon: prices or policies?* Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2012. 37 p. (CPI Working Paper). Disponível em: <<https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2012/03/Deforestation-Prices-or-Policies-Working-Paper.pdf>>. Acesso em: abr. 2018.

_____. *DETERing deforestation in the Brazilian Amazon: environmental monitoring and law enforcement*. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative, 2013. Disponível em: <<https://climatepolicyinitiative.org/publication/detering-deforestation-in-the-brazilian-amazon-environmental-monitoring-and-law-enforcement/>>. Acesso em: abr. 2018.

AZUAGA, D. *Danos ambientais causados por veículos leves no Brasil*. 2000. 168 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: <<http://ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dazuaga.pdf>>. Acesso em: abr. 2018.

BIOLOGICAL oxygen demand (BOD) in rivers. [Copenhagen]: European Environment Agency, 2017. 1 mapa. Disponível em: <<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/wise-soe-bod-in-rivers>>. Acesso em: abr. 2018.

BRASIL. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. *Legislação da Amazônia*. Brasília, DF: SUDAM, [2018]. Disponível em: <<http://www.sudam.gov.br/index.php/prda/58-acesso-a-informacao/86-legislacao-da-amazonia>>. Acesso em: abr. 2018.

CÂMARA, G.; VALERIANO, D. de M.; SOARES, J. V. *Metodologia para o cálculo da taxa anual de desmatamento na Amazônia Legal*. São Jose dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2006. Atualizado por Marisa da Motta. Disponível em: <<http://www.obt.inpe.br/prodes/metodologia.pdf>>. Acesso em: abr. 2018.

CAMPANHOLA, C.; BETTIOL, W. Panorama sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. In: _____. (Ed.). *Métodos alternativos de controle fitossanitário*. Jaguariuna: Embrapa meio Ambiente, 2003. p. 13-51. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1076531/1/Campanholapanorama.pdf>>. Acesso em: abr. 2018.

COE, M.T. et al. Deforestation and climate feedbacks threaten the ecological integrity of south-southeastern Amazonia. *Philosophical Transactions of the Royal Society of*

Jun. 2013. Available from: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638426/>>. Cited: Apr. 2018.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução n. 3, de 28 de junho de 1990. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 158, 16 ago. 1990. Seção 1, p. 15518-15519. Available from: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100>>. Cited: Apr. 2018.

_____. Resolução n. 11, de 14 de janeiro de 1988. Dispõe sobre as queimadas no manejo nas Unidades de Conservação. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 1989. Seção 1, p. 13661. Available from: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=75>>. Cited: Apr. 2018.

_____. Resolução n. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 53, 18 mar. 2005. Seção 1, p. 53-63. Available from: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>>. Cited: Apr. 2018.

DEFRIES, R. et al. Export-oriented deforestation in Mato Grosso: harbinger or exception for other tropical forests? *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, London, v. 368, n. 1619, Jun. 2013. Available from: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638436/>>. Cited: Apr. 2018.

DOSSIÊ ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2012. 140 p. Parte 2: Agrotóxicos, saúde, ambiente e sustentabilidade. Available from: <https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/Dossie_Abrasco_02.pdf>. Cited: Apr. 2018.

FEARNSIDE, P. M. Deforestation in Brazilian Amazonia: history, rates, and consequences. *Conservation Biology*, Hoboken, v. 19, n. 3, p. 680-688, Jun. 2005. Available from: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.2005.00101.x>>. Cited: Apr. 2018.

FERREIRA, M. D. P.; COELHO, A. B. Desmatamento recente nos Estados da Amazônia Legal: uma análise da contribuição dos preços agrícolas e das políticas governamentais. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, Piracicaba, v. 53, n. 1, p. 93-108, jan./mar. 2015. Available from: <<http://www.revistasober.org/index.php>>. Cited: Apr. 2018.

GEIST, H. J.; LAMBIN, E. F. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation: tropical forest are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, acting in various combinations in different geographical locations. *BioScience*,

London. *Series B, Biological sciences*, London, v. 368, n. 1619, Jun. 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638426/>>. Acesso em: abr. 2018.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasil). Resolução n. 3, de 28 de junho de 1990. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 158, 16 ago. 1990. Seção 1, p. 15518-15519. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100>>. Acesso em: abr. 2018.

_____. Resolução n. 11, de 14 de janeiro de 1988. Dispõe sobre as queimadas no manejo nas Unidades de Conservação. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 1989. Seção 1, p. 13661. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=75>>. Acesso em: abr. 2018.

_____. Resolução n. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, n. 53, 18 mar. 2005. Seção 1, p. 53-63. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>>. Acesso em: abr. 2018.

DEFRIES, R. et al. Export-oriented deforestation in Mato Grosso: harbinger or exception for other tropical forests? *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, London, v. 368, n. 1619, Jun. 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638436/>>. Acesso em: abr. 2018.

DOSSIÊ ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2012. 140 p. Parte 2: Agrotóxicos, saúde, ambiente e sustentabilidade. Disponível em: <https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2015/03/Dossie_Abrasco_02.pdf>. Acesso em: abr. 2018.

FEARNSIDE, P. M. Deforestation in Brazilian Amazonia: history, rates, and consequences. *Conservation Biology*, Hoboken, v. 19, n. 3, p. 680-688, Jun. 2005. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.2005.00001.x>>. Acesso em: abr. 2018.

FERREIRA, M. D. P.; COELHO, A. B. Desmatamento recente nos Estados da Amazônia Legal: uma análise da contribuição dos preços agrícolas e das políticas governamentais. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, Piracicaba, v. 53, n. 1, p. 93-108, jan./mar. 2015. Disponível em: <<http://www.revistasober.org/index.php>>. Acesso em: abr. 2018.

GEIST, H. J.; LAMBIN, E. F. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation: tropical forest are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, acting in various combinations in different geographical locations.

Washington, v. 52, n. 2, p. 143-150, Feb. 2002. Available from: <<https://academic.oup.com/bioscience/issue/>>. Cited: Apr. 2018.

GURJAR, B. R. et al. Evaluation of emissions and air quality in megacities. *Atmospheric Environment*, New York, v. 42, n. 7, p. 1593-1606, Mar. 2008. Available from: <<https://www.journals.elsevier.com/atmospheric-environment/>>. Cited: Apr. 2018.

HOMMA, A. K. O. Expansão agropecuária e desmatamento na Amazônia: quais os caminhos. In: COELHO, A. B.; TEIXEIRA, E. C.; BRAGA, M. J. (Ed.). *Recursos naturais e crescimento econômico*. Viçosa: Ed. Universidade Federal de Viçosa, 2008. p. 125-176. Contém trabalhos apresentados no XX Seminário Internacional de política Econômica, 15 e 16 de outubro de 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Brasil). *Monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélites: sistemas PRODES, DETER, DEGRAD e Queimadas*, 2007-2008. São José dos Campos: INPE, Coordenação-Geral de Observação da Terra, 2008. Available from: <http://www.obt.inpe.br/prodes/Relatorio_Prodes2008.pdf>. Cited: Apr. 2018.

KAMPA, M.; CASTANAS, E. Human health effects of air pollution. *Environmental Pollution*, New York, v. 151, n. 2, p. 362-367, Jan. 2008. Available from: <<https://www.journals.elsevier.com/environmental-pollution/>>. Cited: Apr. 2018.

MARENGO, J. A. et al. The drought of 2010 in the context of historical droughts in the Amazon region. *Geophysical Research Letters*, Malden, v. 38, n. 12, Jun. 2011. Available from: <<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19448007>>. Cited: Apr. 2018.

MARTINS, M. H. R. B. et al. Evolution of air quality in the Sao Paulo metropolitan area and its relation with public policies. *International Journal of Environment and Pollution*, Geneva, v. 22, n. 4, p. 430-440, 2004. Available from: <<http://www.inderscience.com/info/inissues.php?jcode=ijep>>. Cited: Apr. 2018.

MOREIRA, J. C. et al. Avaliação integrada do impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana em comunidade agrícola de Nova Friburgo, RJ. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 299-311, 2002. Available from: <<http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes>>. Cited: Apr. 2018.

NEPSTAD, D. C. *The Amazon's vicious cycles: drought and fire in the greenhouse*. Gland: World Wide Fund for Nature, 2007. 23 p. Available from: <assets.panda.org/downloads/amazonas_eng_04_12b_web.pdf>. Cited: Apr. 2018.

PIGNATI, W. A. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio

BioScience, Washington, v. 52, n. 2, p. 143-150, Feb. 2002. Disponível em: <<https://academic.oup.com/bioscience/issue>>. Acesso em: abr. 2018.

GURJAR, B. R. et al. Evaluation of emissions and air quality in megacities. *Atmospheric Environment*, New York, v. 42, n. 7, p. 1593-1606, Mar. 2008. Disponível em: <<https://www.journals.elsevier.com/atmospheric-environment>>. Acesso em: abr. 2018.

HOMMA, A. K. O. Expansão agropecuária e desmatamento na Amazônia: quais os caminhos. In: COELHO, A. B., TEIXEIRA, E. C.; BRAGA, M. J. (Ed.). *Recursos naturais e crescimento econômico*. Viçosa: Ed. Universidade Federal de Viçosa, 2008. p. 125-176. Contém trabalhos apresentados no XX Seminário Internacional de política Econômica, 15 e 16 de outubro de 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Brasil). *Monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélites: sistemas PRODES, DETER, DEGRAD e Queimadas, 2007-2008*. São José dos Campos: INPE, Coordenação-Geral de Observação da Terra, 2008. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/Relatorio_Prodes2008.pdf>. Acesso em: abr. 2018.

KAMPA, M.; CASTANAS, E. Human health effects of air pollution. *Environmental Pollution*, New York, v. 151, n. 2, p. 362-367, Jan. 2008. Disponível em: <<https://www.journals.elsevier.com/environmental-pollution>>. Acesso em: abr. 2018.

MARENGO, J. A. et al. The drought of 2010 in the context of historical droughts in the Amazon region. *Geophysical Research Letters*, Malden, v. 38, n. 12, Jun. 2011. Disponível em: <<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19448007>>. Acesso em: abr. 2018.

MARTINS, M. H. R. B. et al. Evolution of air quality in the Sao Paulo metropolitan area and its relation with public policies. *International Journal of Environment and Pollution*, Geneva, v. 22, n. 4, p. 430-440, 2004. Disponível em: <<http://www.inderscience.com/info/inissues.php?jcode=ijep>>. Acesso em: abr. 2018.

MOREIRA, J. C. et al. Avaliação integrada do impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana em comunidade agrícola de Nova Friburgo, RJ. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 299-311, 2002. Disponível em: <<http://www.cienciasaudecoletiva.com.br/edicoes>>. Acesso em: abr. 2018.

NEPSTAD, D. C. *The Amazon's vicious cycles: drought and fire in the greenhouse*. Gland: World Wide Fund for Nature, 2007. 23 p. Disponível em: <assets.panda.org/downloads/amazonas_eng_04_12b_web.pdf>. Acesso em: abr. 2018.

PIGNATI, W. A. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22,

de Janeiro, v. 22, n. 10, p. 3281-3293, out. 2017. Available from:< <http://www.cienciasaudecoletiva.com.br/edicoes/>>. Cited: Apr. 2018.

PLANO de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Brasília, DF: Grupo Permanente de Trabalho Interministerial para a Redução dos Índices de Desmatamento da Amazônia Legal, 2004. 156 p. Available from:< http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAM_fase1.pdf>. Cited: Apr. 2018.

POSEY, D. A. Manejo da floresta secundária, capoeiras, campos e cerrados. In: *SUMA Etnológica Brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1987.

SANCHEZ-CCOYLLO, O. R. et al. The impact on tropospheric ozone formation on the implementation of a program for mobile emissions control: a case study in São Paulo, Brazil. *Environmental Fluid Mechanics*, Dordrecht, v.7, n. 2, p. 95-119, Apr. 2007. Available from:<<https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10652>>. Cited: Apr. 2018.

SANTOS, T. C.; CARVALHO, V. S. B.; REBOITA, M. S. Avaliação da influência das condições meteorológicas em dias com altas concentrações de material particulado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, abr./jun. 2016. Available from:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522016000200307>. Cited: Apr. 2018.

SANTOS, T. C.; CARVALHO, V. S. B.; REBOITA, M. S. Avaliação da influência das condições meteorológicas em dias com altas concentrações de material particulado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 307-313, jun. 2016. Available from:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522016000200307&script=sci_abstract&tlng=pt>. Cited: Apr. 2018.

SILVA, J. G. C. da; MORAES, M. R. L. de (Org.). *Posicionamento da rede da sociedade civil Pró-Fórum em Barcarena*: por uma Barbacena justa, democrática e sustentável. Belém: Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2012. 60 p. Available from: <http://www.iieb.org.br/files/6313/6146/1385/ProforumBarcarena_WEB_1.pdf>. Cited: Apr. 2018.

SOUZA, R. A. de; MIZIARA, F.; MARCO JUNIOR, P. De. Spatial variation of deforestation rates in the Brazilian Amazon: a complex theater for agrarian technology, agrarian structure and governance by surveillance. *Land Use Policy*, New York, v. 30, n. 1, p.915-924, Jan. 2013. Available from: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712001251>>. Cited: Apr. 2018.

Reviewed by: Aline Milani Romeiro Pereira

n. 10, p. 3281-3293, out. 2017. Disponível em: < <http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes>>. Acesso em: abr. 2018.

PLANO de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Brasília, DF: Grupo Permanente de Trabalho Interministerial para a Redução dos Índices de Desmatamento da Amazônia Legal, 2004. 156 p. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80120/PPCDAM_fase1.pdf>. Acesso em: abr. 2018.

POSEY, D. A. Manejo da floresta secundária, capoeiras, campos e cerrados. In: *SUMA Etnológica Brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1987.

SANCHEZ-CCOYLLO, O. R. et al. The impact on tropospheric ozone formation on the implementation of a program for mobile emissions control: a case study in São Paulo, Brazil. *Environmental Fluid Mechanics*, Dordrecht, v.7, n. 2, p. 95-119, Apr. 2007. Disponível em: <<https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10652>>. Acesso em: abr. 2018.

SANTOS, T. C.; CARVALHO, V. S. B.; REBOITA, M. S. Avaliação da influência das condições meteorológicas em dias com altas concentrações de material particulado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, abr./jun. 2016. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522016000200307>. Acesso em: abr. 2018.

SANTOS, T. C.; CARVALHO, V. S. B.; REBOITA, M. S. Avaliação da influência das condições meteorológicas em dias com altas concentrações de material particulado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 307-313, jun. 2016. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522016000200307&script=sci_abstract&lng=pt>. Acesso em: abr. 2018.

SILVA, J. G. C. da; MORAES, M. R. L. de (Org.). *Posicionamento da rede da sociedade civil Pró-Fórum em Barcarena*: por uma Barbacena justa, democrática e sustentável. Belém: Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2012. 60 p. Disponível em: <http://www.iieb.org.br/files/6313/6146/1385/ProforumBarcarena_WEB_1.pdf>. Acesso em: abr. 2018.

SOUZA, R. A. de; MIZIARA, F.; MARCO JUNIOR, P. De. Spatial variation of deforestation rates in the Brazilian Amazon: a complex theater for agrarian technology, agrarian structure and governance by surveillance. *Land Use Policy*, New York, v. 30, n. 1, p. 915-924, Jan. 2013. Disponível em: < <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712001251>>. Acesso em: abr. 2018.

Tabela 22.1 - Número de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar de PM10, nas Regiões Metropolitanas de Salvador (Camaçari), Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre - 1995-2016

Table 22.1 - Number of violations of the national primary ambient air quality standards of PM10 in the metropolitan areas of Salvador (Camaçari), Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba and Porto Alegre - 1995-2016

(continua/to be continued)

Anos/ Years	Número de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar de PM10/ <i>Number of violations of the national primary ambient air quality standards of PM10</i>						
	Salvador (Camaçari) (1)	Belo Horizonte	Vitória	Rio de Janeiro	São Paulo	Curitiba	Porto Alegre
1995	...	7	...	...	...	...	...
1996	...	10	...	...	...	...	...
1997	...	11	...	...	162	...	...
1998	...	7	...	...	26	...	...
1999	...	10	...	59	61	...	...
2000	...	4	...	64	38	...	...
2001	...	-	-	33	42	...	...
2002	...	-	-	43	23	-	1
2003	...	1	-	19	28	6	2
2004	1	...	-	11	7	11	3
2005	-	1	-	1	1	4	4
2006	-	2	-	15	2	9	5
2007	-	-	-	11	4	19	1
2008	-	4	-	2	2	24	2

Tabela 22.1 - Número de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar de PM10, nas Regiões Metropolitanas de Salvador (Camaçari), Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre - 1995-2016

Table 22.1 - Number of violations of the national primary ambient air quality standards of PM10 in the metropolitan areas of Salvador (Camaçari), Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba and Porto Alegre - 1995-2016

Anos/ Years	Número de violações do padrão primário nacional de qualidade do ar de PM10/ <i>Number of violations of the national primary ambient air quality standards of PM10</i>						
	Salvador (Camaçari) (1)	Belo Horizonte	Vitória	Rio de Janeiro	São Paulo	Curitiba	Porto Alegre
2009	1	-	-	9	1	3	-
2010	-	2	-	10	6	4	-
2011	-	7	-	7	1	6	3
2012	-	6	16	26	-	7	-
2013	...	...	-	23	-	3	-
2014	...	...	...	17	1	...	-
2015	...	...	...	...	-	...	-
2016	...	...	...	...	-	...	...

Fontes/Sources: 1. Central de Tratamento de Efluentes Líquidos, CETREL (Região Metropolitana de Salvador/Pólo Industrial de Camaçari). 2. Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM (Região Metropolitana de Belo Horizonte); 3. Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA (Região Metropolitana de Vitória); 4. Instituto Estadual do Ambiente, INEA (Região Metropolitana do Rio de Janeiro); 5. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB (Região Metropolitana de São Paulo); 6. Instituto Ambiental do Paraná, IAP (Região Metropolitana de Curitiba); e 7. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler, FEPAM (Região Metropolitana de Porto Alegre).

(1) Na Região Metropolitana de Salvador, houve monitoramento somente nos municípios vizinhos ao Polo Industrial de Camaçari (10 pontos distribuídos nos municípios de: Câmara, Gravatá, Cobre, Sítio, Lamarão, Concórdia, Escola, Machadinho, Leandrino e Areias)./(1) Monitoring carried out only in the cities near Camaçari Industrial Complex (10 points distributed in the following municipalities: Câmara, Gravatá, Cobre, Sítio, Lamarão, Concórdia, Escola, Machadinho, Leandrino e Areias).

Tabela 22.2 - Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, em corpos de água selecionados, nas Unidades da Federação de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul - 2007-2017

Tabela 22.2 - Annual average of Biochemical Oxygen Demand - BOD, in selected water bodies of Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul - 2007-2017

(continua/to be continued)

Unidades da Federação e corpos de água selecionados/ <i>Federation Units and selected water bodies</i>	Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (mg/l)/ <i>Annual Average of Biochemical Oxygen Demand - BOD (mg/l)</i>											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Pernambuco												
Bacia do Rio Capibaribe/ <i>Capibaribe River Basin</i>	4,8	4,2	5,1	4,3	5,5	8,4	10,7	14,1	14,8	7,9	...	
Bacia do Rio Igarassu/ <i>Igarassu River Basin</i>	2,4	2,8	1,6	5,6	6,9	5,3	7,1	8,6	4,5	5,6	...	
Bacia do Rio Ipojuca/ <i>Ipojuca River Basin</i>	5,1	4,4	7,7	4,5	13,2	10,8	16,1	24,7	11,9	17,5	...	
Bahia (1)												
Bacia do Rio Paraguaçu/ <i>Paraguaçu River Basin</i>	...	8,6	10,0	3,4	5,8	6,4	5,0	2,4	4,0	3,4	4,8	
Bacia do Rio São Francisco/ <i>São Francisco River Basin</i>	...	3,5	1,9	1,0	2,1	1,9	2,1	3,8	3,8	...	...	
Rio Jequitinhonha/ <i>Jequitinhonha River</i>	...	2,8	1,5	1,2	2,0	2,0	2,2	2,0	3,0	2,7	10,0	
Espírito Santo												
Bacia do Rio Doce/ <i>Doce River Basin</i>	1,2	2,5	2,8	4,8	2,0	3,1	3,7	3,5	3,0	...	...	
Rio Jucu/ <i>Jucu River</i>	3,2	1,7	1,9	3,9	1,6	2,0	3,3	3,7	3,7	...	...	
Rio Santa Maria da Vitória/ <i>Santa Maria da Vitória River</i>	1,2	2,4	1,8	6,7	1,9	2,9	3,0	...	...	...	...	
Minas Gerais												
Bacia do Rio das Velhas/ <i>Das Velhas River Basin</i>	6,7	5,7	3,9	2,8	4,2	4,9	7,3	8,7	7,9	5,5	6,6	
Bacia do Rio Doce/ <i>Doce River Basin</i>	1,3	1,5	1,3	1,1	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	
Rio Jequitinhonha/ <i>Jequitinhonha River</i>	2,1	2,0	2,5	1,4	2,7	2,5	2,1	2,1	2,3	2,0	2,0	
Rio de Janeiro												
Bacia do Rio Paraíba do Sul/ <i>Paraíba do Sul River Basin</i>	2,0	2,3	2,1	2,2	2,4	...	2,0	2,1	2,4	2,1	2,1	
Bacia do Rio Guandu/ <i>Guandu River Basin</i>	...	...	...	...	...	...	2,2	13,1	11,2	4,6	3,4	

Tabela 22.2 - Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, em corpos de água selecionados, nas Unidades da Federação de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul - 2007-2017

Tabela 22.2 - Annual average of Biochemical Oxygen Demand - BOD, in selected water bodies of Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul - 2007-2017

(conclusão/concluded)

Unidades da Federação e corpos de água selecionados/ <i>Federation Units and selected water bodies</i>	Média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (mg/l)/ <i>Annual Average of Biochemical Oxygen Demand - BOD (mg/l)</i>										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
São Paulo											
Represa Billings/Alto Tietê/ <i>Billings Dam/Upper Tietê</i>	5,4	5,6	5,8	7,4	6,9	7,4	10,9	9,2	6,9	6,7	6,8
Represa Guarapiranga/Alto Tietê/ <i>Guarapiranga Dam/Alto Tietê</i>	3,4	3,8	4,1	4,5	5,4	4,2	6,8	7,3	4,4	5,4	6,7
Zona Metropolitana/Alto Tietê/ <i>Metropolitan Area/Upper Tietê</i>	35,9	40,9	35,7	35,8	27,7	34,3	39,2	36,2	30,2	26,3	35,4
Paraná											
Rio Iguaçu/Zona Metropolitana (2)/ <i>Iguaçu River/Metropolitan Area (2)</i>	20,4	13,0	11,3	10,2	6,3	15,4	6,5	31,5	5,4	9,1	7,6
Bacia do Rio Tibagi/ <i>Tibagi River Basin</i>	2,1	2,4	2,4	2,0	2,2	2,1	2,0	...	...	4,1	3,6
Rio Grande do Sul											
Rio Caí/ <i>Caí River</i>	1,5	1,4	1,2	1,2	2,0	2,1	1,1	...	1,0	...	...
Rio Gravataí/ <i>Gravataí River</i>	2,9	2,9	3,6	3,0	2,4	2,6	4,2	...	4,0	...	...
Rio dos Sinos/ <i>Dos Sinos River</i>	2,6	2,7	3,8	3,0	2,8	4,0	2,6	...	...	...	...

Fontes/Sources: 1. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). 2. Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). 3. Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 4. Instituto das Águas do Paraná (ÁguasParaná). 5. Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH). 6. Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 7. Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM). 8. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

Nota: Limite CONAMA da DBO para águas destinadas ao abastecimento público, após tratamento convencional: 5 mg/l./Note: CONAMA limit of BOD for public water supply after conventional treatment: 5 mg/l.

(1) O INEMA iniciou o monitoramento a partir do mês de julho de 2011./ (1) INEMA started monitoring from July 2011. (2) Refere-se ao subsistema 2 da Região Metropolitana, segundo o Instituto das Águas do Paraná./ (2) Refers to subsystem 2 of the Metropolitan Area, according to the Water Institute of Paraná.

DBO menor ou igual a 5 mg/l/
BOD less than or equal to 5 mg/l

DBO maior que 5 mg/l/
BOD greater than or equal to 5 mg/l

Tabela 22.3 - Número e Área das Unidades de Conservação Federais, segundo o tipo de uso e as categorias de manejo - 2017

Table 22.3 - Number and areas of Federal Conservation Units, by type of use and management categories - 2017

Tipo de uso e categorias de manejo/ <i>Type of use and management categories</i>	Unidades de Conservação Federais	
	Número/ <i>Number</i>	Área (km ²)/ <i>Area (km²)</i>
Total /Total	959	(1) 798 061
Proteção Integral/Integral Protection	147	385 648
Estação Ecológica/ <i>Ecological Station</i>	32	74 940
Monumento Natural/ <i>Natural monument</i>	3	443
Parque Nacional/ <i>National Park</i>	73	264 897
Refúgio de Vida Silvestre/ <i>Wildlife Refuge</i>	8	2 692
Reserva Biológica/ <i>Biological Reserve</i>	31	42 677
Uso Sustentável/Sustainable Use	812	412 413
Floresta Nacional/ <i>National Forest</i>	67	178 225
Reserva Extrativista/ <i>Extractive Reserve</i>	62	124 724
Reserva de Desenvolvimento Sustentável/ <i>Sustainable Development Reserve</i>	2	1 026
Reserva de Fauna/ <i>Fauna Reserve</i>	-	-
Área de Proteção Ambiental/ <i>Environmental Protection Area</i>	33	103 266
Área de Relevante Interesse Ecológico/ <i>Area of relevant ecological interest</i>	13	341
Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN/ <i>Private Reserves of Natural Heritage - PRNH</i>	635	4 831

Fonte/Source : Ministério do Meio Ambiente, Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC).

Nota: Dados consolidados pelo CNUC em 01.02.2018./Note: Data consolidated by the CNUC on 02.01.2018.

(1) Considerando sobreposição mapeada, a área passa a ser de 792 282 km²./*(1) Considering overlapped mapping, the area is 792,282 km².*

Gráfico 22.1 - Desflorestamento bruto anual na Amazônia Legal - 1992-2017

Graph 22.1 - Annual gross deforestation in Legal Amazon - 1992-2017

Fonte/Source: Projeto Prodes: monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [2018]. Disponível em/Available from: <<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntosptogramas/amazonia/prodes>>. Acesso em: abr. 2018. Cited: Apr. 2018.

Nota: Dados referentes ao período entre agosto de 1992 e agosto de 1994 (taxa para 2 anos)./(1) Data for the period between August 1992 and August 1994 (rate for 2 years).

Gráfico 22.2 - Focos de calor no Brasil, na Amazônia Legal e em Unidades de Conservação e Terras Indígenas - 2008-2017

Graph 22.2 - Hot spots in Brazil, in the Legal Amazon and in Conservation Units and Indian Lands - 2008-2017

Número de focos/Number of hot spots

Fontes/Sources: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Programa Queimadas: monitoramento por satélites. São José dos Campos: INPE, [2018]. Disponível em/Available from: <<http://www.inpe.br/queimadas/portal>>. Acesso em: abr. 2018/Cited: Apr. 2018.

Notas: 1. Os dados de focos de calor foram obtidos pelo satélite AQUA M-T.

2. Para o Brasil, o total corresponde à soma dos focos apresentados por cada bioma.

3. Os focos apresentados como sem informação ou indeterminado não foram computados no indicador.

4. Foram consideradas as Unidades de Conservação federais e estaduais./

Notes: 1. Data about hot spots were obtained by AQUA M-T.

2. For Brazil, the total is the sum of hot spots for each biome.

3. Hot spots presented as not informed or indeterminate were not included in the indicator.

4. Considering federal and state Conservation Units.

Gráfico 22.3 - Comercialização de agrotóxicos e afins, por área plantada - Brasil - 2001/2016

Graph 22.3 - Commercialization of agrochemicals and the like,
by planted area - Brazil - 2001/2016

Fontes/Sources: 1. Relatórios de comercialização de agrotóxicos: boletim anual de produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos no Brasil 2000-2016. Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, [2018]. Disponível em/Available from: <<http://www.ibama.gov.br/relatorios/quimicos-e-biologicos/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos>>. Acesso em: abr. 2018/Cited: Apr. 2018. 2. Levantamento sistemático da produção agrícola: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil 2000-2005. Rio de Janeiro: IBGE, v. 12-17, 2000-2005. Disponível em/Available from: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_Agricola_%5Bmensal%5D/Fasciculo>. Acesso em: abr. 2018/Cited: Apr. 2018. 3. Produção agrícola municipal 2009-2016. In: IBGE. Sidra: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em/Available from: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>>. Acesso em: mar. 2018/Cited: Mar. 2018.

Nota: Sem informação para os anos de 2006, 2007 e 2008./Note: Data not available for years 2006, 2007 e 2008.

Referências

References

ANUÁRIO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA 2017. São Paulo: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2017. Disponível em: <<http://www.virapagina.com.br/anfavea2017>>. Acesso em: abr. 2018.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO AQUAVIÁRIO 2017. Brasília, DF: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, [2018]. Disponível em: <<http://portal.antaq.gov.br/index.php/estatisticas/>>. Acesso em: abr. 2018.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2016. Brasília, DF: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, v. 23, 2016. Disponível em: <<http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/>>. Acesso em: abr. 2018.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE TURISMO 2017. Ano base 2016. Brasília, DF: Ministério do Turismo, v. 44, 2017. Disponível em: <<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-53-05.html>>. Acesso em: abr. 2018.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL 2017. Rio de Janeiro: IBGE, v. 77, 2017. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=720>>. Acesso em: abr. 2018.

BALANÇO energético nacional 2017: ano base 2016. Brasília, DF: Empresa de Pesquisa Energética, 2016. Disponível em: <<https://ben.epe.gov.br>>. Acesso em: abr. 2018.

BOLETIM estatístico [da Confederação Nacional dos Transportes]. Brasília, DF: CNT, out. 2017. Disponível em: <<http://www.cnt.org.br/boletim/boletim-estatistico-cnt>>. Acesso em: abr. 2018.

BRASIL. Secretaria de Comércio Exterior. *AliceWeb*: sistema de análise das informações de comércio exterior. Brasília, DF: Secex, 2017. Disponível em: <<http://aliceweb.mdic.gov.br/>>. Acesso em: jan. 2018.

BRASIL: alunos matriculados e titulados nos cursos de mestrado e doutorado, ao final do ano, 1998-2016. In: BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. *Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação*. Brasília, DF, 2018. tab. 3.5.1. Disponível em: <http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.5.1.html>. Acesso em: abr. 2018.

BRASIL: dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em valores correntes, em relação ao total de P&D e ao produto interno bruto (PIB), por setor institucional, 2000-2015. In: BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. *Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação*. Brasília, DF, 2018. tab. 2.1.3. Disponível em: <http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/recursos_aplicados/indicadores_consolidados/2_1_3.html>. Acesso em: abr. 2018.

BRASIL: instituições, grupos, pesquisadores e pesquisadores doutores, cadastrados no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, 1993/2016. Brasília, DF: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 2017. tab. 3.6.1. Disponível em: <http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.6.1.html>. Acesso em: abr. 2018.

ESTATÍSTICAS de eleitorado. Eleições 2016. In: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. *Eleitor e eleições*. Brasília, DF: TSE, 2018. Disponível em: <<http://www.tse.jus.br>>. Acesso em: abr. 2018.

ESTATÍSTICAS fiscais: notas econômico-financeiras para a imprensa [de] jan. 2017. Brasília, DF: Banco Central do Brasil, 2017. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/htms/infcon/notas.asp?idioma=p>>. Acesso em: abr. 2018.

ESTATÍSTICAS. Repositório de dados eleitorais. In: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. *Eleitor e eleições*. Brasília, DF: TSE, 2017. Disponível em: <<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas>>. Acesso em: abr. 2018.

ESTUDO da demanda turística internacional 2012-2016. Brasília, DF: Ministério do Turismo, 2017. Disponível em: <<http://www.dadosfatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turistica-internacional.html>>. Acesso em: abr. 2018.

EVOLUÇÃO do transporte ferroviário de cargas. Brasília, DF: Agência Nacional de Transportes Terrestres, Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, 2017. Disponível em: <<http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/15884.html>>. Acesso em: abr. 2018.

INDICADORES IBGE. Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e valores correntes. Rio de Janeiro: IBGE, out./dez. 2017. Disponível em: <<https://www.ibge>>.

gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html>. Acesso em: abr. 2018.

ÍNDICE nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA 2017. In: IBGE. *Sidra*: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, [2017]. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca/brasil>>. Acesso em: jan. 2018.

INFORMAÇÕES de saúde (Tabnet). Epidemiológicas e morbidade. Casos de Aids. In: BRASIL. Ministério da Saúde. *Datasus*. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=6930>>. Acesso em: mar. 2018.

INFORMAÇÕES de saúde (Tabnet). Internações hospitalares do [Sistema Único de Saúde - SUS]. In: BRASIL. Ministério da Saúde. *Datasus*. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>>. Acesso em: fev. 2018.

INFORMAÇÕES de saúde. Mortalidade: dados preliminares. In: BRASIL. Ministério da Saúde. *Datasus*. Brasília, DF, [2018]. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def>>. Acesso em: fev. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (Brasil). *Programa Queimadas*: monitoramento por satélites. São José dos Campos: INPE, [2018]. Disponível em: <<http://www.inpe.br/queimadas/portal>>. Acesso em: abr. 2018.

JUSTIÇA em números 2016: ano-base 2015. Brasília, DF: Conselho Nacional de Justiça, 2016. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>>. Acesso em: abr. 2018.

LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA: pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil 2000-2005. Rio de Janeiro: IBGE, v. 12-17, 2000-2005. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Levantamento_Sistematico_da_Producao_Agricola_%5Bmensal%5D/Fasciculo>. Acesso em: abr. 2018.

PARTIDOS políticos registrados no TSE. In: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. *Partidos*. Brasília, DF: TSE, 2017. Disponível em: <<http://www.tse.jus.br>>. Acesso em: abr. 2018.

PESQUISA ANUAL DE COMÉRCIO 2015. Rio de Janeiro: IBGE, v. 27, 2017. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/comercio/9075-pesquisa-anual-de-comercio.html>>. Acesso em: abr. 2018.

PESQUISA da pecuária municipal 2015-2016. In: IBGE. *Sidra*: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, [2017]. tab. 74, 3939, 3940. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2016>>. Acesso em: jan. 2018.

PESQUISA de estoques 2010-2016. In: IBGE. *Sidra: sistema IBGE de recuperação automática*. Rio de Janeiro, [2017]. tab. 255. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/home/estoques/brasil>>. Acesso em: jan. 2018.

PESQUISA INDUSTRIAL ANUAL. Empresa 2015. Rio de Janeiro: IBGE, v. 34, n.1, 2015. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html>>. Acesso em: abr. 2018.

POTENCIAL hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica. In: ELETROBRAS. *Sistema de Informações do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (SIPOT)*. Rio de Janeiro: [2018]. Disponível em: <<https://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS21D128D3PTBRIE.htm>>. Acesso em: abr. 2018.

PRODUÇÃO agrícola municipal 2006-2016. In: IBGE. *Sidra: sistema IBGE de recuperação automática*. Rio de Janeiro, [2017]. tab. 5457. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>>. Acesso em: jan. 2018.

PRODUÇÃO agrícola municipal 2009-2016. In: IBGE. *Sidra: sistema IBGE de recuperação automática*. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>>. Acesso em: mar. 2018.

PRODUÇÃO da extração vegetal e da silvicultura 2015-2016. In: IBGE. *Sidra: sistema IBGE de recuperação automática*. Rio de Janeiro, [2017]. tab. 289, 291, 5930. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/quadros/brasil/2016>>. Acesso em: jan. 2018.

PROJETO Prodes: monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, [2018]. Disponível em: <<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>>. Acesso em: abr. 2018.

RECEITA e despesa cambial turística. Dados e fatos: estudos, pesquisas e dados sobre o setor de turismo. Brasília, DF: Ministério do Turismo, [2018]. Disponível em: <<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/estatisticas-e-indicadores/receita-cambial.html>>. Acesso em: abr. 2018.

RELATÓRIO resumido da execução orçamentária 2016-2017. Brasília, DF: Tesouro Nacional, [2017]. Disponível em: <<https://www.tesouro.fazenda.gov.br>>. Acesso em: abr. 2018.

RELATÓRIOS de comercialização de agrotóxicos: boletim anual de produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos no Brasil 2000-2016. Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, [2018]. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/relatorios/quimicos-e-biologicos/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos>>. Acesso em: abr. 2018.

REPOSITÓRIO de dados eleitorais. In: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. *Eleitor e eleições*. Brasília, DF: TSE, 2018. Disponível em: <<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais>>. Acesso em: abr. 2018.

RESENHA energética brasileira 2016: exercício de 2015. Brasília, DF: Ministério de Minas e Energia, 2016. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/publicacoes-e-indicadores?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2Fweb%2Fguet%2Fpublicacoes-e-indicadores&_3_keywords=resenha+energetica&_3_groupId=0>. Acesso em: abr. 2018.

SCIMAGO Journal and Country Rank. New York: Elsevier, [2017]. Disponível em: <<http://www.scimagojr.com/>>. Acesso em: abr. 2018.

SÉRIES históricas. Despesa da União por grupo de natureza 2012-2017. Brasília, DF: Ministério da Fazenda, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, [2017]. Disponível em: <<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/series-historicas>>. Acesso em: abr. 2018.

SÉRIES históricas. In: BRASIL. Secretaria de Comércio Exterior. *Estatísticas de comércio exterior*. Brasília, DF: Secex, [2017]. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior>>. Acesso em: abr. 2018.

SÉRIES temporais. Tabelas especiais. Dívida líquida e necessidades de financiamento do setor público. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. SGS: sistema gerenciador de séries temporais. Brasília, DF, [2017]. Disponível em: <<http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp>>. Acesso em: abr. 2018.

SÉRIES temporais. Tabelas especiais. Estatísticas fiscais regionalizadas. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. SGS: sistema gerenciador de séries temporais. Brasília, DF, [2017]. Disponível em: <<http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp>>. Acesso em: abr. 2018.

SÉRIES temporais. Tabelas especiais. Setor externo. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. SGS: sistema gerenciador de séries temporais. Brasília, DF, [2017]. Disponível em: <<http://www4.bcb.gov.br/pec/series/port/aviso.asp>>. Acesso em: abr. 2018.

SISTEMA de contas nacionais: Brasil 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>>. Acesso em: abr. 2018.

SISTEMA de Informações do Programa Nacional de Imunizações. In: BRASIL. Ministério da Saúde. *Datasus*. Brasília, DF, [2018]. Disponível em/Available from: <<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/epidemiologicos/si-pni>>. Acesso em: fev. 2018..