Saúde *Health*

Siron Franco

Hospício, [S.d.]
Asylum, [Undated]

Health

Mary Ann Menezes Freire¹
Simone Mendes Carvalho¹

The Unified Health System (SUS) is recognized as one of the most inclusive public policies practiced in Brazil. The ultimate meaning of universal health systems, like SUS, should be to answer the health needs of the population, not only through an integrated network of structured services within the sector, but mainly through inter-sectoral public policies, subordinating the other interests (from the market, from providers, from the industry, etc.) to these needs (BOUSQUAT *et al.*, 2021).

To understand the complex concept of health and SUS, as key elements in the fight for life, poses many challenges. Historical, chronic, urgent challenges. Challenges unveiled and worsened by the current context of the COVID-19 pandemic. We have a universal health system, which reinvents itself in adverse scenarios, especially in the connection, interrelatedness and integration of the health actions and services (BOUSQUAT *et al.*, 2021).

Major causes of deaths

Deaths reveal much about life conditions, socio-cultural relations and the organization of health assistance in a country. In this regard, accessing those indicators can subsidize the development of deep

¹ Nurse. PhD in Sciences from the Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor at the Department of Nursing of Public Health (DESP) of UNIRIO.

Saúde

Mary Ann Menezes Freire¹
Simone Mendes Carvalho¹

O Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido como uma das políticas públicas mais inclusivas praticadas no Brasil. O sentido último de sistemas universais de saúde, como o SUS, deveria ser responder às necessidades de saúde da população, não apenas por meio de uma rede integrada de serviços estruturados dentro do setor, mas sobretudo por políticas públicas intersetoriais, subordinando os demais interesses (do mercado, dos provedores, da indústria etc.) a essas necessidades (BOUSQUAT *et al.*, 2021).

Entender o complexo conceito de saúde e o SUS, como elementos fundamentais para a luta pela vida, coloca em tela muitos desafios. Desafios urgentes, crônicos, históricos. Desafios descortinados e agudizados pelo atual contexto da pandemia de COVID-19. Temos um sistema de saúde universal, que se reinventa nos cenários adversos, especialmente na conexão, capilaridade e integração dos serviços e ações de saúde (BOUSQUAT *et al.*, 2021).

Principais causas de óbitos

Os óbitos revelam muito sobre as condições de vida, as relações socioculturais e a organização da assistência à saúde em um país. Nesse sentido, acessar esses indica-

¹ Enfermeira. Doutora em Ciências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professora do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública (DESP) da UNIRIO.

reflections and debates on the assessment of the health condition of the population and on the assessment of public policies.

In Table 4.1, related to the year of 2019, some patterns can be noticed: more men die than women; diseases of the circulatory system and neoplasias stand out among the major causes of deaths, in both sexes; deaths due to external causes stand out owing to the large occurrence among men, to the point of ranking, in the general chart, as the fourth major cause of death in the Country. Diseases of the respiratory tract and endocrine, nutritional and metabolic diseases stand out in the ranking of the five major causes of deaths in the Country.

This scenario reflects the continuous and complex process of change in the profile of sickness and death of the population, as a result of the historical, socio-cultural and political-economic evolution of the Country, of sciences, of the health field and of the population. These aspects impact on the increase of life expectancy and, consequently, on the increase of non-communicable chronic diseases and their consequences, as well as of violent deaths, which have challenged several sectors in the Country to control this phenomenon. It is important to perceive and understand the magnitude of some specific causes, which highlight the inequalities of the Country and among genders, to point out the need of more attention and investment in public policies, apart from the health sector.

HIV/AIDS

The fourth decade of the Acquired Immunodeficiency Syndrome epidemic (AIDS), an infection by the Human Immunodeficiency Virus (HIV) in Brazil portrays a decrease in the cases diagnosed with HIV/AIDS and points out that men are still more affected by the infection. Graph 4.1 shows that the number of cases has been falling over the years, highlighted by the year of 2020, in which the total number of HIV/AIDS cases was of 11 180, 8 434 among men and 3 442 among women, comparing with 2019, in which we had a total of 37 308 cases diagnosed, being 26 141 men and 11 161 women. Such significant drop can be explained by the context of the COVID-19 pandemic, in which the strategies of lockdown and social distancing used in several cities of the Country in 2020, coupled with the protection measures and fear of infection by the Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars-CoV), kept people away from the routines of health care.

The predominance of men diagnosed with HIV can be explained by the gender category. Historically, the AIDS epidemic was classified

dores pode subsidiar o desenvolvimento de discussões e reflexões profundas sobre a avaliação da situação de saúde da população e a avaliação de políticas públicas.

Na Tabela 4.1, referente ao ano de 2019, observa-se alguns padrões: morrem mais homens do que mulheres; as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias figuram com destaque entre principais causas de óbitos, em ambos os sexos; os óbitos por causas externas se destacam pela grande ocorrência no sexo masculino, a ponto de se manter, no quadro geral, como a quarta principal causa de óbito no País. As doenças do aparelho respiratório e as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas se destacam no *ranking* das cinco principais causas de óbitos no País.

Esse cenário reflete o contínuo e complexo processo de mudança do perfil de adoecimento e morte da população, fruto das evoluções históricas, socioculturais e político-econômicas do País, da ciência, do campo da saúde e da população. Aspectos estes que impactam no aumento da expectativa de vida e, consequentemente, no aumento das doenças crônicas não transmissíveis, assim como suas consequências, além das mortes por violência, que têm desafiado os diversos setores do País para o controle deste fenômeno. É fundamental perceber e compreender a magnitude de algumas causas específicas, que ressaltam as desigualdades do País e entre gêneros, pontuando a necessidade de maior atenção e investimento em políticas públicas, para além do setor saúde.

HIV/AIDS

A quarta década de epidemia da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Acquired Immunodeficiency Syndrome - AIDS) infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (Human Immunodeficiency Virus - HIV) no Brasil retrata uma diminuição dos casos diagnosticados de HIV/AIDS e indica que os homens ainda são os mais afetados pela infecção. O Gráfico 4.1 mostra que o número de casos foi caindo ao longo dos anos com destaque para o ano de 2020, em que o número total de casos de HIV/AIDS foi de 11 180, sendo que 8 434 são homens e 3 442 mulheres, comparando com 2019, em que tivemos um total de 37 308 casos diagnosticados, sendo 26 141, para homens, e 11 161, para mulheres. Essa queda expressiva pode ser explicada pelo contexto da pandemia do COVID-19 onde as estratégias do *lockdown* e do isolamento social, utilizadas por várias cidades do País no ano de 2020, somadas às medidas protetivas e o medo do contágio pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars-CoV), fizeram com que as pessoas se mantivessem mais afastadas das suas rotinas de cuidado e acompanhamento à saúde.

into risk groups, which produced a social stigma. Therefore, the denomination risk behavior was adopted, aiming at highlighting the practices rather than the identities (KNAUTH *et al.*, 2020). As they are not perceived as a risk group, heterosexual men are analyzed by the Epidemiological Surveillance as “general population”, not being considered in prevention actions or policies, unlike women (KNAUTH *et al.*, 2020).

The high investment in public policies to fight, control and prevent HIV/AIDS is responsible for this drop over the decades. The access to rapid tests and early diagnosis, with the immediate beginning of the treatment, explain the drop in the number of deaths and evolution to AIDS. Despite the success in the prevention actions and policies, it is necessary to work on prevention policies based on gender and social vulnerability, since Brazil is a large country with many diversities.

Vaccination coverage

The National Program of Immunization (PNI) is one of the most successful programs in Brazil, since its actions have already eradicated many diseases. Nevertheless, the drop in the coverage of some vaccines has caused concern and resurgence of some diseases that were not prevalent anymore.

Table 4.2 shows a significant drop in the vaccination coverage in several Brazilian states. The Tetra Viral vaccine, which immunizes against measles, rubella, mumps and varicella, showed a low coverage in several states of the Country, especially in the Northeast Region. The analysis of the data also shows a low vaccination coverage in the State of Rio de Janeiro for the BCG (58.12), Hepatitis B (54.67), Polio (54.42), MMR (59.32) and Tetra Viral (10.63) vaccines. Therefore, one can see that the vaccination coverage hit slightly more than half of the population in the first three vaccines that are key in the control of diseases like Tuberculosis and Hepatitis B, including Polio, which was eliminated from the Country in 1989, considering that the other vaccines shown in the table follow the same movement.

A study about the drop in the vaccination coverage for BCG, Polio and MMR in Brazil highlights a trend to reduce immunization in Brazil over the years. In the case of Polio, that value reached a drop of 1.3% in children immunized annually. MMR highlighted the highest reduction in the number of immunized, shrinking 2.7% every year (ARROYO *et al.*, 2020). The authors also highlighted that the surges of Measles occurred in Brazil highlight the consequences of the drop

A prevalência maior de homens diagnosticados com HIV pode ser explicada pela categoria gênero. Historicamente, a epidemia da AIDS foi classificada em grupos de risco, o que gerou um estigma social. Portanto, foi adotado a denominação comportamento de risco com a ideia de destacar as práticas e não as identidades (KNAUTH *et al.*, 2020). Além disso, os homens heterossexuais, por não serem percebidos como grupos de risco, são analisados pela Vigilância Epidemiológica como “população geral” não sendo destacados em políticas ou ações de prevenção, diferentemente das mulheres (KNAUTH *et al.*, 2020).

O alto investimento das políticas públicas no enfrentamento, controle e prevenção do HIV/AIDS, são responsáveis por essa queda ao longo das décadas. O acesso ao teste rápido e a detecção precoce, com início imediato do tratamento, retratam a queda no número de óbitos e de evolução para AIDS. Apesar do êxito nas políticas e ações de prevenção, há uma necessidade de trabalhar em políticas de prevenção baseadas na categoria gênero e vulnerabilidade social, visto que o Brasil é um país de grandes dimensões e diversidades.

Cobertura vacinal

O Programa Nacional de Imunização (PNI) é um dos programas mais bem sucedidos do Brasil, visto que suas ações já resultaram na erradicação de várias doenças. Porém a queda na cobertura de algumas vacinas tem trazido preocupação e um recrudescimento de algumas doenças que já não eram mais prevalentes.

A Tabela 4.2 mostra uma queda expressiva na cobertura vacinal em vários estados do Brasil. Destaca-se a vacina Tetra Viral que imuniza contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela, a qual teve baixa cobertura em vários estados do País, com destaque para Região Nordeste. Analisando os dados, evidencia-se também uma baixa cobertura vacinal no Estado do Rio de Janeiro para as vacinas BCG (58,12), Hepatite B (54,67), Poliomielite (54,42), Tríplice Viral (59,32) e Tetra Viral (10,63). Dessa forma, visualiza-se que a cobertura vacinal atingiu um pouco mais da metade da população nas três primeiras vacinas que são essenciais no controle de doenças como Tuberculose e Hepatite B, incluindo a Poliomielite que foi eliminada do País, em 1989, sendo que as outras vacinas evidenciadas na tabela seguem o mesmo movimento.

Um estudo sobre a queda da cobertura vacinal para BCG, Poliomielite e Tríplice Viral no Brasil, destaca que houve uma tendência de redução de imunizações no Brasil no decorrer dos anos. No caso da Poliomielite, esse valor alcançou 1,3% de queda de crianças vacinadas anualmente. A Tríplice Viral evidenciou o maior valor de redução no número de vacinados, chegando a encolher 2,7% a cada ano (ARROYO *et*.

in the number of immunized, since the coverage rate of MMR, which reached 96.0% of children in 2015, decreased to 84.0% in 2017, which allowed the return of the infection in the Country (ARROYO *et. al.*, 2020).

The success of the PNI in the control of vaccine-preventable diseases can be lost in the case of not counting with surveillance and continuous monitoring of the vaccination coverage. It is necessary to improve the access to immunization and to the health education campaigns, as well as the effectiveness of the vaccines. Fight against wrong, non-reasoned information that produces distrust is fundamental.

Hospital indicators

Health indicators represent essential instruments to assess and monitor health services. Besides aspects related to the service, data on hospitalizations, hospital mortality and average stay at SUS can even contribute to the analysis and planning about the conditions and development of cities, states and countries. The articulation of such information allows one to reflect on health conditions of the population and life quality.

Table 4.3 brings information on hospitalizations, hospital mortality and average stay at SUS related to the major medical specialties that call attention for their occurrences. According to the highest number of hospitalizations, the specialties of Medical Clinic, Surgical Clinic, Obstetrics and Pediatrics stand out. Concerning the hospital mortality rate, the specialties that call attention with their high numbers are Chronic Prolonged Care and Medical Clinic. The wide range of grievances included in those specialties allows one to think, among many issues, in primary health care, quality of this care and its impacts on the people's health.

The highest average stays refer to the specialties of Chronic Prolonged Care, Phthisiology, Psychiatry, Mental Health (day-hospital) and AIDS (day-hospital). There can be several reasons for a high average stay, apart from their clinical causes. Waiting for complementary exams, waiting for medical reports, occurrence of adverse events and hospital infections are some of them. We can also have planning for hospital discharge and a possible out-of-hospital support, as well as family and economic issues. Age is also a factor that can influence a higher average stay (GRALA; ARAÚJO; GUERREIRO, 2020).

It is important to highlight that such analyses can be - and should be - deeper with the articulation of other information, like the profile of

al., 2020). Os autores ainda destacam que os surtos de Sarampo ocorridos no Brasil, evidenciam as consequências da queda do número de vacinados, visto que a taxa de cobertura da Tríplice Viral, que alcançava 96,0% das crianças em 2015, baixou para 84,0%, em 2017, o que possibilitou o retorno da infecção no País (ARROYO *et al.*, 2020).

O êxito do PNI no controle das doenças imunopreveníveis pode ser perdido caso não haja uma vigilância e constante monitoramento da cobertura vacinal. É necessário ampliar o acesso tanto à imunização quanto ampliar as campanhas de educação em saúde quanto a efetividade das vacinas. Combater informações equivocadas, não fundamentadas e que geram desconfiças é fundamental.

Indicadores hospitalares

Os indicadores de saúde representam instrumentos essenciais de avaliação e monitoramento dos serviços de saúde. Além de aspectos relacionados ao serviço, dados sobre internações, mortalidade hospitalar e média de permanência no SUS podem contribuir ainda com análises e planejamentos sobre as condições e o desenvolvimento de cidades, estados e países. Articular tais informações, nos permite refletir sobre condições de saúde da população e qualidade de vida.

A Tabela 4.3 nos traz informações sobre internações, mortalidade hospitalar e média de permanência no SUS relacionadas às principais especialidades que chamam a atenção por suas ocorrências. Observa-se que se destacam, pelos maiores números de internações, as especialidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Obstetrícia e Pediatria. Já no que diz respeito à taxa de mortalidade hospitalar, as especialidades que chamam a atenção com seus maiores números são Cuidados Prolongados Crônicos e Clínica Médica. O amplo leque de agravos que se enquadram nessas especialidades nos permite pensar, dentre muitas questões, em cuidados primários à saúde, qualidade desse cuidado e seus impactos na saúde das pessoas.

Já as maiores médias de permanência referem-se às especialidades de Cuidados Prolongados Crônicos, Tisiologia, Psiquiatria, Saúde Mental (hospital-dia) e AIDS (hospital-dia). Os motivos para uma alta média de permanência podem ser diversos, para além das suas causas clínicas. A espera para realização de exames complementares, aguardo de laudos médicos, ocorrência de eventos adversos e infecções hospitalares são alguns deles. Podemos ter ainda o planejamento da alta e de um possível suporte extra-hospitalar, além de questões econômicas e familiares. A idade também é um fator que pode influenciar em uma média de permanência maior (GRALA; ARAÚJO; GUERREIRO, 2020).

the hospital units, quality of the assistance provided, profile of the grievances within the specialties highlighted and population groups assisted.

Indicators of the COVID-19 pandemic

The first case of COVID-19 in Brazil was confirmed in February 2020 and, since then, the progression and impacts of the dissemination of the disease in the Country have been the aim of several debates and studies. The speed of dissemination, ways of transmission, incubation period and variants signal the dimension of the challenge.

Table 4.4 shows the number of cases, deaths, incidence of cases (per 100 thousand inhabitants) and deaths (per 100 thousand inhabitants) in the Brazilian regions and their states, in the year 2020. The scenario of cumulative cases shows the Southeast Region, highlighted by São Paulo, with more than half of the cases of the entire region, followed by the Northeast, South, Central-West and North regions. Whenever data on the estimate of the incidence of cases are analyzed, reflecting the number of new cases in the population under risk of that place, the regions that stand out change, as well as the reality of the states. The highlights are the Central-West Region (where the Federal District stands out), followed by the North (where Roraima and Amapá calls attention), South, Northeast and Southeast regions.

The table also shows the number of deaths in the regions and states of the Country, highlighting the Southeast Region, with São Paulo with more than half of the deaths in the region, followed by the Northeast, South, North and Central-West regions. However, when mortality rate is analyzed, other regions stand out, in the following order: Central-West (highlighting the Federal District and Mato Grosso), Southeast (with higher values in Rio de Janeiro and Espírito Santo), North, Northeast and South.

Some aspects should be highlighted for a better analysis of the situation of the Country. The initial dissemination of the pandemic in Brazil was lower than the projections based on the expansion occurred in other countries. Testing strategies suitable to the population as a whole, and not only to specific cases have appeared somewhat late, with direct implications on the underreporting of cases. It is also necessary to notice how the characteristics of the virus were understood in the Country and the profile of the index cases, as well as the management and implementation of the epidemiological surveillance model of the respiratory diseases. To notice the non-

Importante destacar que tais análises podem – e devem – ser mais aprofundadas com a articulação de outras informações, tais como o perfil das unidades hospitalares, a qualidade da assistência prestada, perfil dos agravos que figuram dentro das especialidades destacadas e dos grupos populacionais atendidos.

Indicadores da pandemia de COVID-19

O primeiro caso de COVID-19 no Brasil foi confirmado em fevereiro de 2020 e, desde então, a progressão e os impactos da propagação da doença no País têm sido alvo de diversas discussões e estudos. A velocidade de propagação, formas de transmissão, período de incubação, variantes, sinalizam a dimensão do desafio.

A Tabela 4.4 mostra o número de casos, óbitos, incidência de casos (por 100 mil habitantes) e óbitos (por 100 mil habitantes) pelas regiões do Brasil e seus estados, no ano de 2020. O panorama de casos acumulados nos mostra a Região Sudeste, com São Paulo em destaque, com mais da metade dos casos da região toda, seguida das Regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Já quando analisamos os dados sobre o cálculo da incidência de casos, que refletem o número de casos novos na população sob risco do local, as regiões que se destacam mudam, assim como a realidade dos estados. Os destaques são para a Região Centro-Oeste (nela se destaca o Distrito Federal), seguida das Regiões Norte (onde Roraima e Amapá chamam a atenção), Sul, Nordeste e Sudeste.

A tabela mostra ainda o número de óbitos nas regiões e estados do País, evidenciando a Região Sudeste, com São Paulo com mais da metade dos óbitos da região, seguida das Regiões Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Porém, quando analisamos a taxa de mortalidade, ressaltam-se outras regiões, na seguinte ordem: Centro-Oeste (com ênfase no Distrito Federal e Mato Grosso), Sudeste (com maiores valores no Rio de Janeiro e Espírito Santo), Norte, Nordeste e Sul.

Alguns aspectos precisam ser destacados para uma melhor análise da situação do País. A disseminação inicial da pandemia no Brasil foi inferior às projeções realizadas com base na expansão ocorrida em outros países. Estratégias de testagem adequada da população como um todo, e não apenas para casos específicos, surgiram tardiamente, com implicação direta nas subnotificações de casos. É necessário observar também como foram compreendidas as características do vírus no País e o perfil dos casos índices, assim como o processo de gestão e implementação do modelo de vigilância epidemiológica das doenças respiratórias. Observar a não participação da atenção primária, com toda a sua potência, no início da identificação da doença, mesmo conhecendo toda a sua capilaridade nos territórios, também é

participation of the primary health care, with all its power, in the beginning of the identification of the disease, even knowing all its movement in the territories, is also essential to understand the evolution of the problem. All those aspects, coupled with the context of the Country, caused the scenario in relation to the transmission of the COVID-19 to advance in such a way.

References

ARROYO, Luiz Henrique *et al.* Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, v. 36, n. 4, 2020. Available from: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/acervo/acervo_atual. Cited: May 2021.

BOUSQUAT, Aylene *et al.* Pandemia de Covid-19: o SUS mais necessário do que nunca. *Revista USP*, São Paulo, n. 128, p. 13-26, 2021. Available from: <https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/archive>. Cited: May 2021.

GRALA, Ana Paula da Paz; ARAÚJO, Adelita Campos; GUERREIRO, Patrícia Osório. Taxa de ocupação e média de permanência em quatro hospitais de um município sul-brasileiro. *Journal of Nursing and Health*, Pelotas: Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Pelotas, v. 10, n. 3, 2020. Available from: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/issue/archive>. Cited: May 2021.

KNAUTH, Daniela Riva *et al.* O diagnóstico do HIV/aids em homens heterossexuais: a surpresa permanece mesmo após mais de 30 anos de epidemia. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 36, n. 6, 2020. Available from: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/acervo/acervo_atual. Cited: May 2021.

Translated by: La-Fayette Côrtes Neto

fundamental para compreender a evolução do problema. Todos esses aspectos, somados ao contexto do País, foram determinantes para que o cenário em relação à transmissão da COVID-19 progredisse de tal forma.

Referências

ARROYO, Luiz Henrique *et al.* Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, v. 36, n. 4, 2020. Disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/acervo/acervo_atual. Acesso em: maio 2021.

BOUSQUAT, Aylene *et al.* Pandemia de Covid-19: o SUS mais necessário do que nunca. *Revista USP*, São Paulo, n. 128, p. 13-26, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/archive>. Acesso em: maio 2021.

GRALA, Ana Paula da Paz; ARAÚJO, Adelita Campos; GUERREIRO, Patrícia Osório. Taxa de ocupação e média de permanência em quatro hospitais de um município sul-brasileiro. *Journal of Nursing and Health*, Pelotas: Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Pelotas, v. 10, n. 3, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/issue/archive>. Acesso em: maio 2021.

KNAUTH, Daniela Riva *et al.* O diagnóstico do HIV/aids em homens heterossexuais: a surpresa permanece mesmo após mais de 30 anos de epidemia. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 36, n. 6, 2020. Disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/acervo/acervo_atual. Acesso em: maio 2021.

**Tabela 4.1 - Óbitos de residentes, por sexo,
segundo as 10 principais causas - 2019**

Table 4.1 - Deaths of residents, by sex and 10 leading causes of death - 2019

Causas de óbitos/ Causes of death	Homens/ Male	Mulheres/ Female	Total (1)/ Total (1)
Total/ Total	745 519	603 726	1 349 802
Doenças do aparelho circulatório/ Diseases of the circulatory system	191 722	172 385	364 132
Neoplasias (tumores)/ Neoplasms (tumors)	123 285	112 005	235 301
Doenças do aparelho respiratório/ Diseases of the respiratory system	81 975	80 019	162 005
Causas externas/ External causes	114 469	28 136	142 800
Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte/ Symptoms, signs and abnormal findings of laboratory and clinic checkups not elsewhere classified	42 950	31 924	74 972
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas/ Endocrine, nutritional and metabolic diseases	38 829	44 652	83 483
Doenças do aparelho digestivo/ Diseases of the digestive system	41 563	27 202	68 770
Algumas doenças infecciosas e parasitárias/ Certain infectious and parasitic diseases	31 420	25 246	56 670
Doenças do aparelho geniturinário/ Diseases of the genitourinary system	22 430	25 132	47 565
Doenças do sistema nervoso/ Diseases of the nervous system	20 360	24 871	45 235
Outros/ Others	36 516	32 154	68 869

Fonte/Source: Informações de saúde (Tabnet). Mortalidade: dados preliminares. In: Brasil. Ministério da Saúde. Datasus. Brasília, DF, [2021]. Disponível em/ Available from: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>. Acesso em: jan. 2021/ Cited: Jan. 2021.

Nota: As causas de óbitos descritas correspondem ao Capítulo CID-10./

Note: Causes of death presented according to Chapter ICD-10.

(1) Inclusive óbitos de sexo não informado./ (1) Including deaths of unknown sex.

Tabela 4.2 - Cobertura vacinal, por Unidades da Federação - 2020*Table 4.2 - Immunization coverage, by Federation Unit - 2020*

Unidades da Federação/ Federation Units	BCG / BCG vaccine (against tuberculosis)	hepatite B/ Against hepatite B	Poliomielite/ Against Poliomyelitis	Tríplice viral D1/ Triple viral vaccine D1	Tetra viral/ Tetra viral Vaccine
Brasil/Brazil	72,24	76,55	75,47	79,17	20,63
Norte/North	75,75	62,86	64,4	67,78	41,85
Rondônia	70,35	84,89	81,61	82,81	47,29
Acre	69,65	63,73	62,17	58,75	33,73
Amazonas	87,85	64,65	66,87	75,71	33,51
Roraima	92,43	72,58	68,98	64,57	41,82
Pará	67,47	55,03	58,67	61,14	45,77
Amapá	71,15	37,75	40,47	50,35	27,08
Tocantins	88,89	86,86	83,6	81,55	54,61
Nordeste/Northeast	69,23	68,39	71,34	77,55	3,22
Maranhão	61,58	50,34	59,2	62,43	1,58
Piauí	71,94	60,63	71,15	76,51	4,73
Ceará	65,09	82,54	86,3	89,87	1,65
Rio Grande do Norte	76,5	66,5	69,16	77,23	5,8
Paraíba	62,69	71,78	71,97	78,41	5,53
Pernambuco	74,42	69,21	71,15	77,57	3,2
Alagoas	66,66	74,79	71,67	79,9	3,81
Sergipe	61,24	72,76	70,46	74,77	1,44
Bahia	74,09	67,97	69,23	78,14	3,76
Sudeste/Southeast	68,33	81,94	77,1	81,66	4,13
Minas Gerais	81,03	87,93	85,62	92,04	2,33
Espírito Santo	75,45	86,62	80,91	85,37	1,34
Rio de Janeiro	58,12	54,67	54,42	59,32	10,63
São Paulo	65,99	88,91	81,4	85,05	2,39
Sul/South	83,37	86,74	85,43	84,67	57,59
Paraná	87,7	87,2	85,14	84,34	55,75
Santa Catarina	79,1	87,6	87,99	86,14	60,28
Rio Grande do Sul	81,5	85,64	83,96	84,02	57,77
Centro-Oeste/Central-West	78,11	79,36	79,62	78,44	53,19
Mato Grosso do Sul	60,94	81,76	81,41	79,47	55,42
Mato Grosso	82,8	76,4	80,5	81,9	60,7
Goiás	77,59	75,9	77,59	75,26	52,5
Distrito Federal/Federal District	90,48	88,34	81,11	79,9	42,82

Fonte/Source : Informações de saúde (Tabnet). Assistência à saúde. Imunizações desde 1994.

Cobertura. In: Brasil. Ministério da Saúde. Datasus. Brasília, DF, [2020]. Disponível em/ Available from : <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0202>. Acesso em: jan. 2021/ Cited: Jan. 2021.

Tabela 4.3 - Internações, mortalidade hospitalar e média de permanência no Sistema Único de Saúde - SUS - 2020
Table 4.3 - Hospitalization, deaths in hospitals and average length of stay in the Unified Health System - SUS - 2020

Especialidades/ <i>Specialty</i>	Internações/ <i>Hospitalization</i>	Taxa de mortalidade hospitalar/ <i>Death rate in hospitals (%)</i>	Média de permanência/ <i>Average length of stay</i>
Total/Total	10 385 912	5,65	5,4
Clínica cirúrgica/ <i>Surgery</i>	3 060 481	2,57	4,1
Obstetrícia/ <i>Obstetrics</i>	2 072 423	0,03	2,5
Clínica médica/ <i>Internal medicine</i>	4 049 010	11,89	6,4
Cuidados prolongados (crônicos)/ <i>Long-term care (chronic)</i>	20 774	32,94	89,7
Psiquiatria/ <i>Psychiatry</i>	124 225	0,22	34,1
Tisiologia/ <i>Phthisiology</i>	4 508	6,9	39,7
Pediatria/ <i>Pediatrics</i>	892 322	2,03	6,7
Reabilitação/ <i>Rehabilitation</i>	11 395	0,21	10,6
Clínica cirúrgica - hospital dia/ <i>Surgery - day hospital</i>	107 601	0,01	0,1
Aids - hospital dia/ <i>AIDS - day hospital</i>	4 448	0,07	18,3
Pós-transplante - hospital dia/ <i>After transplant - day hospital</i>	6 537	0,12	11,4
Geriatría - hospital-dia/ <i>Geriatrics - day hospital</i>	432	-	5,5
Saúde mental - hospital-dia/ <i>Mental health - day hospital</i>	6 758	0,03	26,7
Saúde mental - clínico/ <i>Mental health - clinical</i>	24 998	0,44	9,9

Fonte/Source : Informações de saúde (Tabnet). Internações hospitalares do [Sistema Único de Saúde - SUS]. In: Brasil. Ministério da Saúde. Datasus. Brasília, DF, [2020]. Disponível em/Available from : <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/sxuf.def>. Acesso em: jan. 2021/
 Cited: Jan . 2021.

Tabela 4.4 - Número, Incidência de casos e óbitos por COVID-19, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2020
Table 4.4 - Number, Incidence of cases and deaths by COVID-19, according to Major Regions and Federation Units - 2020

Grandes Regiões e Unidades da Federação/ Major Regions and Federation Units	Casos / Cases		Óbitos/ Deaths	
	Acumulados/ Cumulative cases	Incidência de casos/100 mil habitantes/ Incidence of cases/100 thousand inhabitants	Total / Total	Óbitos/100 mil habitantes/ Deaths/ 100 thousand inhabitants
Brasil/ Brazil	7 700 578	3 664	195 411	93
Norte/ North	860 671	4 670	18 061	98
Rondônia	95 999	5 402	1 822	103
Acre	41 689	4 727	796	90
Amazonas	201 574	4 864	5 295	128
Roraima	68 710	11 343	787	130
Pará	293 802	3 415	7 199	84
Amapá	68 361	8 083	926	109
Tocantins	90 536	5 756	1 236	79
Nordeste/ Northeast	1 901 857	3 332	47 825	84
Maranhão	200 959	2 840	4 506	64
Piauí	143 179	2 840	4 374	87
Ceará	335 992	3 679	9 993	109
Rio Grande do Norte	118 353	3 375	2 993	85
Paraíba	167 062	4 158	3 680	92
Pernambuco	222 993	2 333	9 666	101
Alagoas	105 091	3 149	2 496	75
Sergipe	113 544	4 939	2 492	108
Bahia	494 684	3 326	9 159	62
Sudeste/ Southeast	2 697 725	3 053	89 463	101
Minas Gerais	546 884	2 583	12 001	57
Espírito Santo	249 260	6 203	5 087	127
Rio de Janeiro	435 390	2 522	25 600	148
São Paulo	1 466 191	3 193	46 775	102
Sul/ South	1 634 682	4 553	22 180	74
Paraná	418 323	3 659	7 993	70
Santa Catarina	494 447	6 901	5 270	74
Rio Grande do Sul	451 912	3 972	8 917	78
Centro-Oeste/ Central-West	875 643	5 373	17 882	110
Mato Grosso do Sul	134 750	4 849	2 347	84
Mato Grosso	179 704	5 157	4 467	128
Goiás	309 112	4 404	6 805	97
Distrito Federal/ Federal District	252 077	8 360	4 263	141

Fonte/ Source : Covid-19. In: Brasil. Ministério da Saúde. Opendatasus. Brasília, DF, [2021]. Disponível em/ Available from: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em/ Cited: Mar. 2021.

Nota/ Note : Data de atualização dos dados em 01/01/2021./ Data updated on January 1, 2021.

Gráfico 4.1 - Casos de Aids por ano de diagnóstico e sexo- 2011-2020

Graph 4.1 - AIDS cases, by year of diagnosis and sex - 2011-2020

Fonte/Source: Informações de saúde (Tabnet). Epidemiológicas e morbidade. In: Brasil. Ministério da Saúde. Datasus. Brasília, DF, [2020]. Disponível em/Available from:

<<http://www2.aids.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/br.def>>. Acesso em: jan. 2021/ Cited: jan. 2021.

Nota: Data de atualização dos dados: 30/06/2020./Note: Data update on June 30, 2020.

(1) Inclusive de sexo não informado./ (1) Including of unknown sex.