**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

**Материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием
(30 ноября 2016)**

Курск, 2016

УДК 616.9(063)

ББК 55.14

И 74

Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (30 ноября 2016) [Электронный ресурс] / Курск. гос. мед. университет; под общ. ред. Л. В. Силиной, В.М. Коломиец, В. Я. Провоторова. - Курск: КГМУ, 2016. - эл. опт. диск (CD-ROM) . - Систем. требования: Windows XP/7 и выше ; Дискковод CD-ROM ; Adobe Flash Player 10.3 r183. 2,76 мб.

В сборнике представлены материалы научных работ, отражающих основные направления научных и клинических исследований участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема», состоявшейся в Курском государственном медицинском университете 30 ноября 2016 года.

Материалы конференции включают научные и клинические исследования по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения инфекционной патологии, встречающейся в практике врачей различных специальностей - дерматовенерологов, фтизиатров, инфекционистов, эпидемиологов, акушеров-гинекологов, педиатров.

doi: <https://doi.org/10.21626/cb.16.infect.proc>

ISBN 978-5-7487-1951-3

© Коллектив авторов, 2016

© ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. <u>Ангалева Е.Н.</u> <u>ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО</u> <u>КОМПЛЕКСА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ У</u> <u>СЕКСУАЛЬНО-АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,</u> <u>ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.....</u>	10
2. <u>Архипина С.А., Мельникова Е.Ф., Архипин С.М.</u> <u>ПРОБЛЕМА РОЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....</u>	14
3. <u>Багишева Н.В., Иванова О.Г., Батищева Т.Л., Лисняк М.В.,</u> <u>Емельянова Ю.А., Ибрагимова М.Р., Ибрагимова А.Р., Гладченко</u> <u>А.С.</u> <u>ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ</u> <u>ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ</u> <u>ЛЕГКИХ.....</u>	17
4. <u>Батищева Т.Л., Руднева С.Н.</u> <u>ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:</u> <u>ПОБЕДА ИЛИ ОПАСЕНИЕ?</u>	22
5. <u>Баздырева Ю.В., Письменная Е.В., Коренева Т.В., Тишина Е.И.</u> <u>КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У</u> <u>ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В КУРСКОЙ</u> <u>ОБЛАСТИ.....</u>	26
6. <u>Барышникова В.А., Ахметзянов Л.М., Ковальчук В.Г., Ахметзянов</u> <u>М.Л.</u> <u>АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО</u> <u>ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ О</u> <u>ВИЧ/СПИД.....</u>	31
7. <u>Белоконова Л.В., Иванова А.П., Одинченко В.Н.</u> <u>ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ</u> <u>ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ ГЕПАТИТАХ.....</u>	38
8. <u>Бибичева Т.В.</u> <u>АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ</u> <u>ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2015гг).....</u>	43
9. <u>Бондаренко В.Н., Буйневич И.В.</u> <u>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ У</u> <u>ПАЦИЕНТОВ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ.....</u>	46
10. <u>Возякова Т.Р., Карзакова Л.М., Еленкина Ж.В., Кудряшов С.И.</u> <u>ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУЛЬФАТА ЦИНКА В</u> <u>КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ</u> <u>ЛЕГКИХ.....</u>	50
11. <u>Гаранин А.В., Авдеева В.В., Коломиец Д.И.</u> <u>ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО</u> <u>ТУБЕРКУЛЕЗА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УСЛОВИЯХ.....</u>	56
12. <u>Гопоняко С.В., Буйневич И.В., Юденко М.А., Холявкин А.А.</u>	

	<u>КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ВИЧ-НЕГАТИВНЫХ И ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.....</u>	<u>60</u>
13.	<u>Демчило А.П., Красавцев Е.Л., Козорез Е.И. ОСОБЕННОСТИ ДАННЫХ МРТ И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ.....</u>	<u>65</u>
14.	<u>Есипова Е.А., Харахордина Ю.Е. ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА НА ТЕЧЕНИЕ ПОЗДНЕЙ КОЖНОЙ ПОРФИРИИ.....</u>	<u>71</u>
15.	<u>Ефременко Е.И., Силина Л. В., Бобынцев И. И. ОЦЕНКА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕННЫМИ ФОРМАМИ СКЛЕРОДЕРМИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ.....</u>	<u>74</u>
16.	<u>Иванова О.Г., Ситникова С.В., Кондря А.В. ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРА ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....</u>	<u>78</u>
17.	<u>Иванова О.Г., Бородкина С.П., Горбатов Е.В., Мордык Д.И. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2015 ГГ.....</u>	<u>84</u>
18.	<u>Иванова А.П., Белоконова Л.В. КЛИНИКО- ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ГРИППА (H1N1) pdm09 В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2015-2016 ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2009-2010 ГГ.....</u>	<u>88</u>
19.	<u>Иванова А.П., Винников В.И. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ГРИППА В ЭПИДСЕЗОН 2015-2016 ГГ. ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕТАЛЬНОСТИ ЭПИДСЕЗОНА 2009 - 2010 ГГ.....</u>	<u>92</u>
20.	<u>Карпова А.В., Баткаев Э.А. ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРИГГЕРНЫХ ФАКТОРОВ И ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОЖИ У ПАЦИЕНТОВ С РОЗАЦЕА И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ В АСПЕКТЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....</u>	<u>95</u>
21.	<u>Киселева В.В., Лесневская И.Ю., Шамара Л.Ф. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ.....</u>	<u>98</u>
22.	<u>Кислюк Г.И., Хохлова Е.А., Смурова И.А.</u>	

	<u>ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.....</u>	<u>102</u>
23.	<u>Клычева О.И., Лазарева Г.А., Хурасева А.Б.</u> <u>ВЗАИМОСВЯЗЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МАРКЕРОВ</u> <u>ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА С ЧАСТОТОЙ</u> <u>ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.....</u>	<u>108</u>
24.	<u>Ковальчук В.Г., Лукашов М.И., Письменная Е.В., Тишина Е.И.</u> <u>ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КУРСКОЙ</u> <u>ОБЛАСТИ.....</u>	<u>115</u>
25.	<u>Ковтун В.Н., Новикова С.Н., Лебедев И.Ю., Шахова Ю.И., Ледовская</u> <u>Т.И., Пастухова Е.А.</u> <u>СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ</u> <u>В УСЛОВИЯХ ПАТОМОРФОЗА, ИНДУЦИРОВАННОГО ВИЧ -</u> <u>ИНФЕКЦИЕЙ.....</u>	<u>121</u>
26.	<u>Козорез Е.И., Демчило А.П., Красавцев Е.Л.</u> <u>ПРИЧИНЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ</u> <u>ТЕРАПИИ.....</u>	<u>125</u>
27.	<u>Коломиец В.М.</u> <u>ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ РЕЖИМОВ</u> <u>ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ -</u> <u>ИНФИЦИРОВАННЫХ: ДИСКУССИОННЫЕ</u> <u>ВОПРОСЫ.....</u>	<u>128</u>
28.	<u>Коломойцева Е.Е., Перевозчиков Б.Г., Провоторов В.Я., Шамара</u> <u>Л.Ф.</u> <u>ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ</u> <u>СИФИЛИСОМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.....</u>	<u>134</u>
29.	<u>Коренева Т.В., Епифанова С.В., Цыпин Л.И., Коломиец В.И.</u> <u>ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ВИЧ-</u> <u>АССОЦИИРОВАННОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ В РЕГИОНЕ.....</u>	<u>138</u>
30.	<u>Красавцев Е.Л, Поварова Д. В.</u> <u>ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЦ С ВЫЯВЛЕННЫМИ аНСV ПРИ</u> <u>ДОНОРСТВЕ.....</u>	<u>142</u>
31.	<u>Лущенко Ю.С., Тимошилов В.И., Сидоров Г.А.</u> <u>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ОБ ИНФЕКЦИЯХ,</u> <u>ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, И ПУТИ ИХ</u> <u>ФОРМИРОВАНИЯ.....</u>	<u>145</u>
32.	<u>Майстренко С.А., Лукашов М.И., Тишина Е.И.</u> <u>ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВИЧ-</u> <u>ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.....</u>	<u>149</u>
33.	<u>Малыхин А.Н., Коломиец В.М., Коломиец Д.И.</u> <u>ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ</u> <u>ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В</u> <u>ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОЧАГАХ</u> <u>ТУБЕРКУЛЕЗА.....</u>	<u>157</u>

34. Мельникова Е.Ф., Архипина С.А., Афонина Е.С.
СЛУЧАИ ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....161
35. Михайлова О.В., Бородин Г.Л., Коломиец В.И.
ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.....165
36. Могилева Е.Ю., Белоносова Е. Н., Эфендиева Н. Н., Архипина С.А.
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ГНЁЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ НА ФОНЕ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ.....171
37. Назарова О.И.
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВОРА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ.....176
38. Ниязи Н.Ф.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АКНЕ ПРЕПАРАТОМ
АКНЕКУТАН.....180
39. Новикова С.Н., Бернштейн М.М., Ковылянская Л.В., Брынцева Н.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМИ
ВНУТРИГРУДНЫМИ КАЛЬЦИНАТАМИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ
АКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА.....184
40. Новикова Л.А., Бахметьева Т.М., Донцова Е.В., Борзунова Л.Н.
КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
СИФИЛИСА.....188
41. Новикова Л.А., Бахметьева Т.М., Бахметьев А.А., Донцова Е.В.,
Борзунова Л.Н.
УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И
КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....190
42. Письменная Е.В., Барышникова В.А., Тишина Е.И.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В
КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ.....192
43. Плотникова К.О., Шварц Н.Е.
ПИЛОБАКТ АМ - ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМАХ
ДЕМОДЕКОЗА.....198
44. Половнева Л.В., Исаенко Т.П.
ОСОБЕННОСТИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КОЖИ У
ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ.....203
45. Лесневская И.Ю., Провоторов В.Я., Иванова А.П., Овсянникова М.С.
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ У РЕБЕНКА
РАННЕГО ВОЗРАСТА.....208
46. Провоторов В.Я., Лесневская И.Ю., Киселева В.В., Овсянникова
М.С.
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДЫ.....211

47. Рогова Ю.А., Титарева Л.В.
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ФЕРРОВИР НА КЛИНИЧЕСКОЕ
ТЕЧЕНИЕ И ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ПРИ
HERPES ZOSTER.....214
48. Романова М.А.
СОМАТИЧЕСКАЯ И ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ ИЗ РАЗНЫХ В СОЦИАЛЬНОМ
ПЛАНЕ СЕМЕЙ.....219
49. Рублева Н.В., Коломиец В.М., Новикова С.Н., Лебедев И.Ю., Шахова
Ю.И., Ледовская Т.И., Ковтун В.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ВИЧ-
АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С НИЗКОЙ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЮ.....224
50. Сафарян М.Д., Азизян Н.Г., Коломиец В.М.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В
ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СТРАН СНГ.....228
51. Силина Л.В., Поехало А., Солянина В.А.
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕА.....232
52. Ситникова С.В.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ
ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ.....236
53. Ташпулатова Ф.К., Абсадыкова Ф.Т.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У
ДЕТЕЙ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....239
54. Титарева Л.В., Лищук Н.Г., Рогова Ю.А.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЯ В
ИММУННОМ СТАТУСЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ РОЖИ.....242
55. Торшина И.Е., Воробьева П.И.
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) У
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК УГРОЗА РЕПРОДУКТИВНОМУ
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.....247
56. Файзуллина Е.В., Давыдов Ю.В., Малеев М.В.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
ТОКСИКОДЕРМИЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН).....252
57. Хомова Н.А., Султанов С.А., Ташпулатова Ф.К.
ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У
БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ.....257
58. Черников А.Ю., Землянских Л.Г.
РЕЦИДИВ САРКОИДОЗА КАК КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....260
59. Шевень М.П., Перевозчиков Б.Г., Провоторов В.Я., Эфендиева Н.Н.

	<u>ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</u>	<u>267</u>
60.	<u>Шевченко О.С., Потейко П.И.</u> <u>ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ:</u> <u>ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ХАРЬКОВСКОЙ</u> <u>ОБЛАСТИ.....</u>	<u>271</u>

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ У СЕКСУАЛЬНО-АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Ангалева Е.Н.

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет
Курск, Россия

Аннотация. Проанализированы особенности формирования фето-плацентарного комплекса в 1 триместре беременности у сексуально-активных женщин 16-26 лет путем изучения элементов плодного яйца после прерывания беременности в сроки от 5 до 11 недель. Полученные данные коррелируют с индексом соматического и гинекологического здоровья и мотивацией на прегравидарную подготовку. Так, при воспалительных заболеваниях нижнего отдела генитального тракта в 92,9% случаев происходит поражение децидуальной ткани, в 67,9% - нарушение формирования хориона.

Ключевые слова: фето-плацентарный комплекс, экстрагенитальные заболевания, гинекологические заболевания, ультразвуковое исследование (УЗИ), морфологическое исследование трофобласта и децидуальной ткани.

PECULIARITIES OF FETO-PLACENTAL COMPLEX DURING THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY AMONG SEXUALLY ACTIVE WOMEN WITH SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE

Angaleva E.N.

Kursk State Medical University
Kursk, Russia

Abstract. The peculiarities of feto-placental complex formation in 1 trimester of pregnancy in 16-26 years old sexually active women by examining the elements of the ovum after medical termination of pregnancy during the period from 5 to 11 weeks. The obtained data are correlated with the index of somatic and gynecological health and motivation to pregravid training. For example, in inflammatory/STD diseases of lower genital tract in 92.9% of cases there is loss of decidual tissue, 67.9% - violation of the formation of the chorion.

Key words: feto-placental complex, extragenital diseases, gynecological diseases, ultrasonography (US), morphological study of trophoblast and decidua tissue.

Актуальность изучаемой проблемы. Адекватная прегравидарная подготовка – единственно верный путь к снижению перинатальных осложнений, одним из важнейших аспектов которых являются проблемы

септического характера, решение последних требует дальнейшего изучения [1]. Качественная прегравидарная подготовка не вошла в повседневную практику акушера-гинеколога и не является значимой для получения здорового ребенка для большинства современных женщин. Факторы риска, связанные с беременностью начинают оцениваться уже по факту наступления беременности и нередко только после 8-12 недель [2]. Однако перинатальная патология неразрывно связана с исходным уровнем состояния здоровья женщины, планирующей беременность, качеством ее жизни. В связи с чем, поиск путей снижения перинатальной заболеваемости и смертности должен начинаться с изучения здоровья репродуктивной части населения [3,4].

Цель исследования. Оценить особенности формирования фето-плацентарного комплекса в 1 триместре беременности у сексуально-активных женщин.

Материалы и методы исследования. Обследованы 96 женщин в возрасте 16-26 лет, которые приняли решение прервать нежелательную беременность в сроки от 5 до 11 недель. Из них 56 (58,3%) пациенток с лабораторными признаками воспалительных изменений нижнего отдела генитального тракта составили 1 (основную) группу. 40 (41,7%) здоровых пациенток составили 2 (контрольную) группу. Проведен анализ жалоб, данных соматического и гинекологического анамнеза, данных общеклинического, специального гинекологического, лабораторного (ПЦР), бактериоскопического, культурального, ультразвукового обследований, а так же цито- и гистологического исследования тканей плодного яйца, соскобов полости матки и цервикального канала. Функциональная активность плодного яйца оценивалась цифрами β -ХГЧ в сыворотке материнской крови.

Результаты с обсуждением. Средний возраст пациенток составил $19,2 \pm 1,3$ года, начала половой жизни $16,8 \pm 1,5$ года. В браке состояло 7 (7,3%) обследованных женщин. У 18 (18,8%) женщин во время беременности отмечались периодические кровянистые выделения, у 22 (22,9%) — боли ноющего характера в нижних отделах живота, у 79 (82,3%) бели. Структура экстрагенитальных заболеваний была представлена преимущественно хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхательной 41 (42,7%) и мочевыделительной системы 25 (26,0%), хроническим гастритом 17 (17,7%), нарушением жирового обмена I-II степени 16 (16,6%). Из гинекологических заболеваний в анамнезе отмечено наличие хронического сальпингоофорита у 25 (26,0%) женщин, цервицита и вульво-вагинита у каждой второй пациентки — 50 (52,1%), нарушения менструальной функции и функциональные кисты яичников — у 31 (32,3%), полипы, эктопии и множественные кисты шейки матки — у 22 (22,9%).

Бактериоскопическое исследование мазков из половых путей показало у 41 (73,%) пациентки 1 группы смешанный характер вагинальной флоры на фоне повышенного содержания лейкоцитов (до 38-40 в поле зрения), у 13 (21,4%) обнаружены грибы рода *Candida*, что в 1,5 раза превышало частоту кандидовагинита и неспецифических вагинитов во 2 группе 10 (25,0%). В 1

группе культуральное исследование позволило выделить умеренный рост условно-патогенных микроорганизмов у каждой третьей пациентки 20 (35,7%), и у 4 (10,5%) диагностировано наличие трихомонад. Во 2 группе отмечался скудный характер роста условно-патогенных микроорганизмов лишь в четверти случаев (9-22,5%). Результаты ПЦР в основной группе женщин были положительными на антигены хламидий, микоплазм – у 3 (7,2%), ВПЧ – у 9 (16,1%) пациенток. Во 2 группе были выделены антигены ВПГ II типа у 1 женщины (2,5%).

По данным УЗИ выявлены следующие особенности: признаки угрожающего выкидыша отмечались у большинства обследуемых в 1 группе 41 (73,2%), и у меньшего количества пациенток 2 группы 8 (20,0%). При этом у 5 (8,9%) женщин 1 группы обнаружены анэмбриония или замершая беременность, у 12 (21,4%) неоднородный хорион с эконегативными включениями и признаками отека, у 7 (12,5%) пациенток отслойка хориона. Уровень β ХГЧ был снижен до 4637 ± 1328 МЕ/мл только в случаях отслойки хориона. Другие признаки нарушений формирования фето-плацентарного комплекса (отсутствие двигательной активности эмбриона, диспропорция амнион/хорион, аномальный желточный мешок) наблюдались только у пациенток 1 группы – 10 (17,8%). В 3 (5,4%) случаях было обнаружено несоответствие сроков беременности сроку гестации на 2 и более недель в 1 группе и у 1 (2,5%) пациентки 2 группы. У 16 (28,6%) женщин 1 группы отмечено сочетание 2 и более ультразвуковых маркеров нарушения формирования и развития плодного яйца.

При морфологическом исследовании слизистой цервикального канала и хориона во 2 группе признаков инфицирования обнаружено не было, за исключением 3 пациенток (7,5%), которые перенесли ОРЗ на 1 месяце настоящей беременности. В данных случаях децидуальная ткань включала участки фибриноидного некроза с лейкоцитарной инфильтрацией, но поражение было поверхностным и связано с местами образования фибриноида. Функциональная активность хориона соответствовала нормативным значениям гестационного срока. При гистологическом исследовании соскобов из цервикального канала пациенток 1 группы во всех случаях имелись воспалительные изменения эндоцервикса, которые характеризовались гиперсекрецией цервикальной слизи, инфильтрацией ее нейтрофилами. В децидуальной ткани отмечалась вакуолизация цитоплазмы клеток, пикноз ядер, отек и некроз стромы в 52 случаях (92,9%). У 38 (67,9%) женщин этой группы в структуре ворсин хориона были выявлены признаки задержки их формирования и в 3 (5,4%) случаях – преждевременное созревание ворсин. В 29 (51,8%) случаях в трофобласте преобладали васкуляризованные ворсины с неравномерной плотностью, отеком стромы, нечетко выраженными стромальными каналами, скудным клеточным составом. Кровеносные сосуды ворсин различных типов у 20 обследованных (35,7%), характеризовались неравномерным кровенаполнением, слабо представленными очагами эритропоэза.

Заключение. Особенности формирования фето-плацентарного комплекса в 1 триместре беременности у сексуально-активных женщин коррелируют с индексом соматического и гинекологического здоровья и мотивацией на прегравидарную подготовку. При воспалительных заболеваниях нижнего отдела генитального тракта в 92,9% случаев происходит поражение децидуальной ткани, в 67,9% - нарушение формирования хориона, в 12,5% - отслойка хориона, что способствует различным нарушениям формирования фето-плацентарного комплекса, развитию первичной фето-плацентарной недостаточности инфекционного генеза.

Список литературы

1. Ангалева Е.Н., Хуцишвили О.С. Новый подход к лечению хронических воспалений матки специфической и неспецифической этиологии. /Сб. научных трудов Российской научной заочной конференции «Актуальные вопросы дерматовенерологии»//Курск. КГМУ. – 30 марта 2011 – С. 278-282.
2. Ангалева Е.Н., Хуцишвили О.С., Зеленский В.В. Воспалительные заболевания шейки матки и влагалища как фактор риска развития патологии плодного яйца в 1 триместре беременности./Материалы VI межрегиональной научно-практической конференции с международным участием для врачей акушеров-гинекологов «Здоровье женщины – здоровье нации». //Белгород . – 21-22 марта 2013 г. – С.43-44.
3. Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н., Ильченко К.Н., Ширина И.Г. Возможности реализации фетоплацентарной недостаточности при воспалительных заболеваниях шейки матки и влагалища. /Всероссийский конгресс «Амбулаторно-поликлиническая практика – новые горизонты». Сб. тезисов. //Москва. – 29 марта – 2 апреля .2010 – С. 340-341.
4. Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н., Мазепкина И.Н., Ильченко К.Н., Толстых Т.Г. К вопросу об особенностях развития плодного яйца у первобеременных./ Материалы XI Всероссийского научного форума «Мать и Дитя» //Москва/ - 28 сентября – 1 октября 2010 – С.268-269.

ПРОБЛЕМА РОЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Архипина С.А.¹, Мельникова Е.Ф.¹, Архипин С.М.²

ФГБОУВО «Орловский государственный университет имени
И.С.Тургенева», медицинский институт¹
БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П.Боткина»²
Орёл, Россия

Аннотация. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей рожи по данным ретроспективного исследования, проведенного в Орловской области. В исследование было включено 363 больных рожей. Проведен анализ предрасполагающих факторов, форм заболевания и других аспектов. В результате проведенного исследования установлено, что рожа, как инфекционное заболевание, остается актуальным в г. Орле.

Ключевые слова: рожа, заболеваемость, антибактериальная терапия.

PROBLEM FACES AT THE PRESENT STAGE

Arkhipina S.A., Melnikova E.F., Arkhipin S.M.

Orel State University named after I.s. Turgenev, Medical Institute, ¹
Oryol region urban hospital. S.p. Botkin ²
Oriol, Russia

Abstract. To study modern clinical-epidemiological aspects of erysipelas according to data of a retrospective study performed in Orel region. The study included 363 of patients with erysipelas. We performed a statistical analysis of predisposing factors, forms of disease and other aspects. As a result of the study, we have found that erysipelas as an infectious disease continues to be highly topical in the Orel.

Key words: erysipelas, incidence, antibacterial therapy.

В настоящее время рожа, как одна из форм стрептококковой инфекции, занимает важное место в группе болезней кожи и подкожной клетчатки [4,9]. Проблема рожи обусловлена постоянным уровнем заболеваемости среди населения, без тенденции к снижению и составляет, по литературным данным 7–25 на 10 000 населения [4,5,7]. Этиологическая роль стрептококка группы А (*S.pyogenes*) в развитии инфекционного процесса при роже подтверждена многими исследованиями [3,6,9]. В мире ежегодно заболевает рожей около 100 миллионов человек. На протяжении долгих лет рожа считалась тяжелой эпидемической болезнью, протекавшей с разнообразными и опасными осложнениями. Успехи антибиотикотерапии привели к изменению представлений об этом заболевании. В настоящее время рожу принято относить

к числу спорадических, малоконтагиозных инфекций с невысокой летальностью. Однако, в связи с тем, что не всегда пациенты с рожей обращаются к специалистам, оценить истинный уровень распространения этой болезни довольно сложно [4,8].

Цель работы: выявить распространенность рожи в Орловской области по данным ретроспективного исследования, проведенного во 2 инфекционном отделении городской больницы им. С. П. Боткина г. Орла.

Нами была проанализирована медицинская документация 363 больных рожей, находившихся на лечении в период с 2011 по 2015 годы: в 2011 году - 73 больных (20,1%), в 2012г. – 94 (25,9%), в 2013г. – 52 (14,3%), в 2014г. – 70 (19,3%), в 2015г. - 74 человека (20,4%).

По данным эпидемиологического анамнеза было выяснено, что важным провоцирующим фактором развития рожи являлись микротравмы, раны, ушибы, в результате чего отмечалось нарушение целостности кожных покровов, способствующее внедрению возбудителя вглубь тканей. С этим связана наиболее частая регистрация болезни у пенсионеров: работа на даче (43,3%) и у лиц, занятых физическим трудом (17,1%). Женщины болели чаще, чем мужчины (73,3%), что согласуется с литературными данными [1,2,7]. По возрасту пациенты распределились следующим образом: 15-19 лет - 2,5%; 20-29 лет – 2,5%; 30-39 лет – 8%; 40-49 лет -10,7%; 50-59 лет – 30,9%; 60-69 лет – 23,1%; 70-79 лет – 15,4%; старше 80 лет – 6,9%. Максимальное число случаев рожи приходилось на лиц, старше 50 лет (76,3%), что свидетельствует о снижении иммунитета в пожилом возрасте, на фоне повторной сенсibilизации к стрептококку [2]. В ходе проведенного исследования была установлена летне-осенняя сезонность заболевания (58,1%).

В большинстве случаев диагноз был поставлен правильно сразу на догоспитальном этапе, процент расхождения направительного и заключительного клинических диагнозов составил всего 4,5%. В зависимости от кратности течения инфекции больные распределились следующим образом: 53,2% составила первичная рожа; 37,7% - рецидивирующая; 9,1% - повторная. Согласно полученным данным наиболее часто встречалась эритематозная форма рожи – 76,3%, далее в порядке убывания: эритематозно-буллезная 21,8%, буллезно - геморрагическая – 1,9%. У 90,5 % больных заболевание протекало в форме средней степени тяжести, пациенты с тяжелым течением составили 8,1%, с легким – 1,4%. У всех больных в клинической картине наблюдался интоксикационный синдром различной степени выраженности. Субфебрильная лихорадка отмечалась у 71,3% больных, фебрильная – у 22,3%; высокая и гиперпиретическая – у 6,4%. Локализация местного воспалительного процесса была представлена следующим образом: рожа нижних конечностей являлась самой распространенной и составила 75,8%; далее в порядке убывания следуют: рожа лица (13,8%), рожа верхних конечностей (8,3%), рожа туловища (2,1%), что согласуется с данными литературы [1,3,7].

Важно подчеркнуть, что современной особенностью рожи является увеличение частоты заболевания на фоне ожирения (16,3%), сахарного диабета,

чаще 2 типа(15,7%), что приводит к длительному заживлению, развитию осложнений, увеличению продолжительности пребывания больного в стационаре [4,5]. Немаловажную роль в развитии инфекционного процесса при роже играют фоновые заболевания. Так при роже нижних конечностей варикозная болезнь составляла 19,3%, посттромбофлебитический синдром – 6,9%. При роже лица – хронические воспалительные заболевания ЛОР - органов - 12,1%, при роже верхних конечностей – мастэктомия в анамнезе - 8,3%. Среди осложнений чаще развивалась токсическая нефропатия в 31,4% и лимфостаз в 1,4% случаев. Среднее пребывание больных в стационаре составило 11 койко-дней.

Выбор адекватной антибактериальной терапии – несомненно важный аспект в лечение больных рожей. Учитывая то, что зачастую в стационар больные попадают после неудачно проведенного амбулаторного лечения или лечения «у бабушек», мы использовали антибиотики цефалоспоринового ряда(цефатоксим, цефтриаксон) в качестве монотерапии у 240 человек (66,1%), в комбинации с макролидами или аминогликозидами у 123 человек (33,9%). После проведенного антибактериального лечения для профилактики рецидивов заболевания всем больным назначался бициллин-5 1,5 млн. ЕД внутримышечно разово, с рекомендациями продолжить бициллинопрофилактику после выписки в течение 6 месяцев при первичной, 12 месяцев – при повторной, 2 лет – при рецидивирующей роже, что соответствует современным тенденциям терапии этого заболевания [5].

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что на сегодняшний день рожа остается актуальной проблемой инфектологии. Заболевание преимущественно встречается у женщин старшего и пожилого возраста, чаще пенсионеров либо работников физического труда в летне-осенний период. Рожа часто развивается на фоне сопутствующих заболеваний, с преимущественной локализацией воспалительного процесса на нижних конечностях. Заболевание протекает с типичной клинической симптоматикой, с преобладанием эритематозных форм над буллезными, первичных - над рецидивирующими и повторными. Назначение антибиотиков цефалоспоринового ряда приводит к купированию основных проявлений инфекционного процесса и выздоровлению больных. Для предупреждения развития рецидивов заболевания необходима бициллино профилактика.

Список литературы

1. Васильева Н.Г., Филина Е.И., Солопова Т.Б., Соболева А.С. Клиника рожи на современном этапе и возможности прогнозирования ее осложненного течения. Сибирский консилиум. 2007, 8(63).
2. Еровиченков А.А., Потекаева С.А., Алленов М.Н., Карманов М.И., Анохина Г.И., Нечаева И.П. и др. Диагностика, лечение и профилактика рожи. Методические рекомендации №17. Правительство Москвы. Департамент здравоохранения. М., 2008.

3. Еровиченков А.А., Потекаева С.А, Анохина Г.И, Малолетнева Н.В, Троицкий В.И. Актуальные аспекты современной клиники, лечения и реабилитации больных рожей. Фарматека. 2012, 20(253).
4. Инфекционные болезни: национальное руководство. Под ред. Ющука Н.Д, Венгерова Ю.Я. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
5. Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням. В 2 т. М.: Фолиант, 2011.
6. Покровский В.И, Брико Н.И, Клейменов Д.А. Распространенность и клинико-эпидемиологическая характеристика заболеваний, вызываемых стрептококками группы А в России. Терапевтический архив. 2009, 81(11).
7. Ратников Л.И., Шип С.А. Современные клинико-лабораторные и гендерные особенности рожи. Эпидемиология и инфекционные болезни, 2013.
8. Стрептококки и стрептококкозы. Под ред. Покровского В.И, Брико Н.И, Ряпис Л.А. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.
9. Черкасов В.Л. Рожа. Руководство по внутренним болезням. Том «Инфекционные болезни». Под ред. Покровского В.И. М., 1996.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Багешева Н.В.¹, Иванова О.Г.¹, Батищева Т.Л.², Лисняк М.В.¹, Емельянова Ю.А.¹, Ибрагимова М.Р.¹, Ибрагимова А.Р.¹, Гладченко А.С.¹

**ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет¹,
КУЗОО Клинический противотуберкулезный диспансер²,
Омск, Россия**

Аннотация. Обследовано 462 пациента, поступивших в противотуберкулезный диспансер с впервые выявленным туберкулезом легких, 266 мужчин (57,6%) и 196 женщин (42,4%). ХОБЛ, как системное воспалительное заболевание, может являться провоцирующим фактором в развитии туберкулезной инфекции. В нашем исследовании риск развития туберкулеза у пациента с ХОБЛ в 14 раз выше риска развития туберкулеза у жителя области.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез легких.

Lung Tuberculosis On The Background Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Bagisheva N.V., Ivanova O.G., Batysheva T.L., Lysnyak M.V., Emelyanova U.A., Ibragimova M.R., Gladchenko A.S.

Omsk State Medical University ,
Clinical TB dispensary ,
Omsk, Russia

Abstract. 462 were examined the patient received TB dispensary with newly diagnosed pulmonary tuberculosis, 266 men (57.6%) and 196 women (42.4%). COPD as a systemic inflammatory disease may be a precipitating factor in the development of tubercular infection. In our study the risk of tuberculosis in a patient with COPD in 14 times higher risk of developing tuberculosis in resident area.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, lung tuberculosis.

Туберкулез (ТБ) представляет собой глобальную угрозу здоровью населения и остается ведущей причиной смерти среди инфекционных заболеваний, особенно в слаборазвитых и развивающихся странах [8]. Хотя туберкулез может возникнуть в любом органе или ткани, поражение органов дыхания является наиболее часто встречающимся [4, 5, 6]. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей с прогрессивным ухудшением функции легких [2]. ХОБЛ и ТБ имеют сходные факторы риска, такие как курение, низкий социально-экономический статус и нарушение иммунной защиты

организма [1, 7, 9]. Туберкулез и ХОБЛ могут взаимоотягощать течение каждого заболевания в отдельности [1, 10]. Туберкулез может являться фактором риска развития, обострения и прогрессирования ХОБЛ, а ХОБЛ, являясь сопутствующим заболеванием, изменять типичное течение туберкулеза, что затрудняет его диагностику и лечение.

Цель исследования: выявление клинико-эпидемиологических аспектов туберкулеза у больных с ХОБЛ для совершенствования тактики ведения пациентов.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты с впервые выявленным туберкулезом. Исследование простое проспективное. Обследовано 462 пациента, поступивших в противотуберкулезный диспансер с впервые выявленным туберкулезом легких, 266 мужчин (57,6%) и 196 женщин (42,4%), средний возраст $46,3 \pm 3,1$ года. Всем больным проводили сбор анамнеза, клинические, лабораторные и инструментальные исследования, обязательным было исследование функции внешнего дыхания. Обследование пациентов проводилось исходно при поступлении в стационар. Диагноз туберкулеза устанавливался на основании клинических, лабораторных и рентгенологических методов исследования с определением формы, наличия или отсутствия бактериовыделения и распада. Результаты лечения туберкулеза оценивались по 6 месяцам курса химиотерапии

Для расчета заболеваемости туберкулезом больных ХОБЛ использованы материалы государственной статистической отчетности по регистрации случаев ХОБЛ и вновь выявленного туберкулеза на территории Омской области [3].

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакетов программ Excel (Microsoft) и STATISTICA, версия 6.0. Принимались во внимание уровни значимости (p) 0,05; 0,01; 0,001.

Результаты и обсуждение. В исследование включались все пациенты с впервые выявленным туберкулезом, поступившие на стационарное лечение в казенное учреждение здравоохранения Омской области Клинический противотуберкулезный диспансер за период с 2011 по 2012, группа исследования составила 462 человека, из них 341 (73,8%) имели больший или меньший стаж курения. Пациенты после дополнительного обследования (сбор жалоб, анамнеза, проведение спирометрии) были распределены на 2 группы: I группа (145 человек; 31,4%) – с диагнозом ХОБЛ, II группа (317 человек; 68,6%) – без ХОБЛ. Распространенность ХОБЛ в пересчете на 1000 больных туберкулезом составила 314,3. Всего в 2012 году на территории Омской области выявлено 1853 больных туберкулезом легких. Можно предположить, что среди них 582 пациента одновременно страдали ХОБЛ. Опираясь на данный отчетности Госкомстата, за этот же период в регионе зарегистрировано 51147 пациентов с ХОБЛ (включая хронический бронхит и эмфизему легких). Расчетная заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч больных с ХОБЛ при этом составила 1241,2 случая, что в 14,4 раз превышает заболеваемость туберкулезом населения области (86,4).

Курение является основным фактором риска ХОБЛ. В I группе курящих было 129 человек (89,2%), стаж курения составил $23,1 \pm 2,3$ года, количество выкуриваемых сигарет 14,7, индекс курения составил 17,6. А в группе без ХОБЛ, курящие составили 67,7% (214 человек), интенсивность и продолжительность из курения были ниже, что к моменту исследования не привело к развитию ХОБЛ. Стаж курения – 15,4, количество выкуриваемых сигарет в сутки 10,1, индекс курения – 12,8.

Для подтверждения диагноза ХОБЛ всем пациентам, независимо от наличия анамнеза курения проводилось исследование функции внешнего дыхания. При изучении показателей спирометрии в I группе среднее значение ОФВ1- $57,2 \pm 2,1$, ФЖЕЛ – $81,1 \pm 2,7$, ОФВ1/ФЖЕЛ – $57,9 \pm 1,4$, что подтверждает диагноз ХОБЛ, кроме того, чаще встречались пациенты с тяжелой и среднетяжелой степенью тяжести заболевания. Во II группе ОФВ1- $73,9 \pm 2,0$ ($p=0,01$), ФЖЕЛ – $76,4 \pm 2,2$ ($p=0,01$), ОФВ1/ФЖЕЛ – $82,5 \pm 0,8$ ($p=0,01$).

При анализе форм туберкулеза, самой частой формой в обеих группах был инфильтративный туберкулез (86,5% и 65,2% соответственно). У пациентов с ХОБЛ чаще встречались распространенные процессы с деструкцией (83,2% против 67,4%; $\chi^2=1,6$, $p=0,2$) и бактериовыделением (92,7% против 73,8; $\chi^2=2,1$; $p=0,15$). В группе пациентов с ХОБЛ чаще имела место лекарственная устойчивость, что требовало назначения более агрессивной медикаментозной терапии: IV режим химиотерапии был назначен 123 пациентам I группы и 54 пациентам II группы ($\chi^2=74,7$; $p=0,00$).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности, как курения, так и ХОБЛ больных туберкулезом. ХОБЛ, как системное воспалительное заболевание, может являться провоцирующим фактором в развитии туберкулезной инфекции. Установлено, что у пациентов с ХОБЛ чаще встречаются распространенные формы с деструкцией и бактериовыделением, при низкой эффективности противотуберкулезной терапии.

Среди пациентов с ХОБЛ чаще встречались среднетяжелые и тяжелые формы заболевания, которые изначально требуют медикаментозной коррекции, которая не проводилась в противотуберкулезных учреждениях, возможно оптимизация подходов к лечению ХОБЛ позволит повысить эффективность лечения туберкулеза и снизить эпидемиологическую опасность у данной категории пациентов.

В нашем исследовании риск развития туберкулеза у пациента с ХОБЛ в 14 раз выше риска развития туберкулеза у жителя области. При условии, что отчетность по ХОБЛ не совершенна и учитываются далеко не все пациенты с диагнозом ХОБЛ на территории региона, а у части пациентов ХОБЛ остается не диагностированной, риск развития туберкулеза у подобных пациентов может оказаться ниже.

Список литературы

1. Бекмухамбетова Н.В. Некоторые особенности клинического течения туберкулеза органов дыхания и сопутствующей соматической патологии // Н.В. Бекмухамбетова, О.Г. Иванова, А.В. Мордык, Н.В. Багишева // Омский научный вестник. - 2014. - № 2 (134). - С. 8-10.
2. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких : пересмотр 2014 г. // Москва : Атмосфера, 2014. – 92 с.
3. Заболеваемость взрослого населения России в 2012 году : стат. материалы [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: www.rosminzdrav.ru.
4. Иванова О. Г. Патогенетические аспекты коррекции нарушения адаптивных реакций организма при инфильтративном туберкулезе легких / О. Г. Иванова, А. В. Мордык // Вестник современной клинической медицины. – 2010. – Т. 3, № 1. – С. 21-26.
5. Иванова О.Г. Эффективность мероприятий по выявлению туберкулеза органов дыхания в Омской области // О.Г. Иванова, А.В. Мордык, Л.В. Пузырева и др. // Кубанский научный медицинский вестник. - 2011. - № 4. - С. 102-104.
6. Лысов А.В. Инфильтративный туберкулез у лиц старше 60 лет / А. В. Лысов, О. Г. Иванова, А. В. Мордык, В. В. Антропова // Туберкулез и болезни легких. – 2008. – Т. 85, № 1. – С. 28-30.
7. Лысов А. В. Факторы, влияющие на эффективность химиотерапии у больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулёзом лёгких / А. В. Лысов, О. Г. Иванова, А. В. Мордык // Вестник Санкт-Петербургской гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова. – 2006. – № 4. – С. 140-143.
8. Мордык А. В. Современные международные и национальные концепции борьбы с туберкулезом / А. В. Мордык, Л. В. Пузырева, Л. П. Аксютин // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2013. – № 22 (22). – С. 92-97.
9. Мордык А.В. Социальный статус пациентов противотуберкулезного диспансера и его влияние на отношение к лечению // А.В. Мордык, Л.В. Пузырева, Т.Г. Подкопаева // Социология медицины. - 2011. - № 2. - С. 44-47.
10. Риск развития туберкулеза у пациентов с ХОБЛ / А. В. Мордык [и др.] // 13 Национальный конгресс по болезням органов дыхания : сб. тр. – Москва, 2013. – С. 386-387.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОБЕДА ИЛИ ОПАСЕНИЕ?

Батищева Т.Л., Руднева С.Н.

**КУЗОО Клинический противотуберкулезный диспансер,
Омск, Россия**

Аннотация. Во многих регионах России эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом снижается, что объясняется активной и плодотворной работы противотуберкулезной службы. Целью исследования явилась оценка изучения заболеваемости на территории Омской области в период с 2001 по 2015 года. Анализ проводился на основании основных статистических отчетных форм. Выявлено, что заболеваемость туберкулезом по России приобрела тенденцию к снижению с 2001 г, а в Омской области – только с 2010 г, что возможно связано с наличием, длительно существующего, очага инфекции. В настоящее время рост заболеваемости по ВИЧ-инфекции на территории области создает дополнительный восприимчивый контингент по туберкулезу. Поэтому утверждать о стабилизации туберкулеза на изучаемой территории преждевременно.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, заболеваемость, очаг инфекции.

THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN OMSK REGION: VICTORY OR CONCERNS?

Batishcheva T.L., Rudneva S.N.

Clinical TB dispensary,
Omsk, Russia

Abstract. In many regions of Russia the epidemiological situation of tuberculosis decreased, due to the active and fruitful work of TB services. The aim of the study was to evaluate the morbidity study in the Omsk region in the period from 2001 to 2015. The analysis was conducted on the basis of basic statistical reporting forms. It was found that the incidence of tuberculosis in Russia has acquired a tendency to decline since 2001, and in the Omsk region - only since 2010, it is possible due to the presence, long-existing, the source of infection. Currently, an increased incidence of HIV infection in the region creates an additional contingent for susceptible tuberculosis. There fore, to argue about the stabilization of TB in the study area prematurely.

Keywords: tuberculosis, HIV infection, morbidity, the site of infection.

За последние пять лет на территории Российской Федерации (РФ) наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу [2]. В

некоторых регионах это выражается в виде стабилизации основных эпидемиологических показателей [4], в других - убедительная тенденция к снижению [6, 9]. Однако, не стоит усыплять свою бдительность, решив, что одержана победа над туберкулезом - одним из старейших инфекционным заболеванием на протяжении многих десятилетий человечества [1, 5]. Внимание к данной инфекции должно оставаться прежним в связи с наличием постоянного источника данной инфекции локализующегося в пенитенциарных учреждениях России. Пенитенциарная система вносит огромный вклад в распространение туберкулеза среди гражданского населения путем постоянного притока в население социально дезадаптированных больных туберкулезом. Многократные незавершенные курсы противотуберкулезной терапии, отрывы от лечения при освобождении, приводят к развитию форм заболевания с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) и как результат к летальному исходу [8]. В исправительных учреждениях локализуются не только не излечимые формы туберкулеза, но и лица с ВИЧ-инфекцией, эпидемия которой ежегодно нарастает во многих регионах страны [2, 3, 7, 10].

Цель исследования: определить динамику заболевания по туберкулезу в Омской области за период с 2001 по 2015 гг.

Материалы и методы. Исследование простое, ретроспективное. Проведен анализ основных эпидемиологических показателей в городе Омске за период с 2001 по 2015 гг., критериев эффективности мероприятий по своевременному выявлению и лечению больных туберкулезом.

Для анализа использованы отчетные формы: форма № 8 «Сведения о заболевании активным туберкулезом», форма № 33 «Сведения о больных туберкулезом», предоставленные сотрудниками организационно-методического кабинета Казенного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер». Также использовалась статистическая форма № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» за исследуемый период. Полученные данные обработаны с помощью программного средства MICROSOFT EXCEL.

Результаты. Заболеваемость туберкулезом в РФ за 15 лет снизилась до 53,2 с 88,5 на 100 тыс. населения, темп снижения составил 39,8%. При этом наибольшая заболеваемость за исследуемый период наблюдалась в 2001 году. На территории СФО, в целом, также отмечается тенденция к снижению заболеваемости со 127,8 в 2001 г. до 88,23 на 100 тыс. населения в 2015 г., темп снижения 30,9%, что оказалось меньше чем по РФ в 1,2 раз. С 2001 года показатель заболеваемости предпринял попытку к снижению, однако к 2005 году, он не только вернулся к прежнему уровню, но и превысил его, составив 133 на 100 тыс. населения. В последующие два года до 2007 года наблюдалось снижение исследуемого показателя, однако в последующем, в 2008 году он вновь увеличился от предыдущего и составил 132,8 на 100 тыс. В дальнейшем, заболеваемость туберкулезом на территории СФО постепенно снижалась.

Заболеваемость туберкулезом всех форм на территории Омской области занимает промежуточное положение, так, в 2001 г. заболеваемость была 110,6,

в 2014 г. – 86,1, а в 2015 г. – 82,4 на 100 тыс. населения. Темп снижения за 15 лет составил 25,5%. Однако, прежде чем достичь указанного результата, в области в течение 8 лет наблюдался неуклонный рост заболеваемости туберкулезом среди всего населения. С 2001 по 2009 гг. прирост заболеваемости на территории Омской области составил 18,1%.

За последние 15 лет эпидемический процесс туберкулезной инфекции имел различные тенденции. Изменение социально-экономических условий жизни населения, увеличение миграционных процессов, рост численности социально - дезадаптированных групп населения и контингентов пенитенциарных учреждений, а также резкое сокращение финансирования лечебных и профилактических противотуберкулезных мероприятий явились основными причинами ухудшения эпидемиологической обстановки. Территориальный показатель первичной заболеваемости населения, при подсчете которого учитываются все новые случаи туберкулеза, независимо от ведомственной принадлежности, характеризовался отсутствием стабильности до 2010 года.

Таким образом, если в РФ тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом среди населения наблюдалась с 2001 г., в СФО с 2009 г., то в Омской области снижение данного показателя заболеваемости возникло только с 2010 года.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории Омской области неуклонно растет, о чем свидетельствуют следующие показатели: с 2006 г. (4,6 на 100 тыс. населения) до 2014 г. (133,2 на 100 тыс. населения), однако в 2015 г. наблюдалось некоторое снижение данного показателя до 123,3 на 100 тыс. населения. Заболеваемость ВИЧ – инфекцией за 9 лет увеличилась на 2580,4%. В связи с этим наблюдается регистрация случаев сочетанной патологии ВИЧ – инфекции и туберкулеза. В 2006 г. заболеваемость туберкулезом у ВИЧ-инфицированных лиц составляла 1,4 на 100 тыс. населения. В дальнейшие исследуемый показатель постепенно увеличивался до 3,6 в 2010 г. (темпы прироста за 5 лет составил – 157,1%), однако, в 2011 г. заболеваемость туберкулезом у ВИЧ-инфицированных увеличилась сразу в 2 раза и составила 7,2 на 100 тыс. населения. Наиболее высокая регистрация случаев заболевания ко-инфекцией была зарегистрирована в 2014 г. (133,2 на 100 тыс. населения).

Заключение. По результатам статистических данных в Омской области наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом среди населения, однако утверждать о наметившейся тенденции, еще немного преждевременно. В связи с ежегодным ростом больных ВИЧ-инфекцией, сохраняется высокий риск заболевания туберкулезом в данной группе. Увеличение регистрации случаев ко-инфекции требует от противотуберкулезной службы решения массы организационных вопросов. Необходима консультация врача-фтизиатра для всех ВИЧ-инфицированных на предмет выявления активного туберкулеза и химиопрофилактики, изоляция ВИЧ-инфицированных от больных туберкулезом, от больных с множественной лекарственной устойчивостью, введение в штат противотуберкулезного учреждения должности врача-

инфекциониста, для консультаций и решения вопросов о своевременном назначении антиретровирусной терапии больным туберкулезом с ВИЧ-инфекцией.

Список литературы

1. Мордык, А.В. Современные международные и национальные концепции борьбы с туберкулезом / А.В. Мордык, Л.В. Пузырёва, Л.П. Аксютин // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2013. - № 22. – С. 92-98.
2. Нечаева, О. Б. Ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции / О. Б. Нечаева // Туберкулез и болезни легких. – 2014. - № 6. – С. 9-15.
3. Оценка эффективности оказания специализированной медицинской помощи при туберкулезе в пенитенциарных учреждениях / Н.В. Рачина [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2015. - № 5. - С. 157-158.
4. Стародубов, Д.С. Прогноз объемов специализированной медицинской помощи в условиях достижения целевых индикаторов / Д.С. Стародубов, Т.И. Малахова, В.М. Коломиец // Туберкулез и болезни легких. – 2015. - № 6. - С. 142-143.
5. Структура и клинические особенности ВИЧ-ассоциированного туберкулеза при стабилизации эпидемической ситуации в регионе / Н.В. Рачина [и др.] // «Университетская наука: взгляд в будущее. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета. В 3-х томах. 2016. С. 177-182.
6. Территориальные различия заболеваемости туберкулезом, в пределах одного округа крупного промышленного центра Западной Сибири / Л.В. Пузырева [и др.] // Сибирское медицинское обозрение. – 2011. – № 6 – С. 44-47.
7. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией на территории Омской области за период с 2008 по 2012 год / А.В. Мордык [и др.] // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 106-109.
8. Факторы риска развития туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя / И.С. Гельберг [и др.] // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2015. - № 1. – С. 17-22.
9. Эпидемическая обстановка по туберкулезу в Омске за период с 1991 по 2009 год. / А.В. Мордык [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2011. – № 8. – С. 23-26.
10. Эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Омской области с 1996 по 2013 гг. / А.В. Мордык [и др.] // Медицинский альманах. – 2014. - № 2 (32). – С. 62-64.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ - ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Баздырева Ю.В.¹, Письменная Е.В.¹, Коренева Т.В.¹, Тишина Е.И.²

ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер»¹

**ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"²
Курск, Россия**

Аннотация. Проведен анализ заболеваемости туберкулезом ВИЧ-инфицированных пациентов. Дана клиническая характеристика течения туберкулеза. Установлена связь генерализованных форм туберкулеза с иммуносупрессией у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Ключевые слова: ВИЧ - инфекция, туберкулез, иммуносупрессия, эпидемия

Clinical Characteristics Of The Course Of Tuberculosis In HIV-positive Patients In Kursk Region

Bazdyreva U.V., Pismennaya E.V., Koreneva T.V., Tishina E.I.

Kursk regional Dermato-venereologic dispensary clinical ¹

Kursk State Medical University ²

Kursk, Russia

Abstract. The analysis of the incidence of tuberculosis in HIV-infected patients has been done. Clinical characteristic of the course of tuberculosis has been given. The connection between the generalized forms of tuberculosis and immunosuppression in HIV-infected patients has been detected.

Key words: HIV-infection, tuberculosis, immunosuppression, epidemy.

Проблема туберкулеза актуальна для всего мирового сообщества. Туберкулез давно стал основной причиной смертности взрослых людей среди всех инфекционных заболеваний. В настоящее время в мире наблюдаются две эпидемии, которые взаимосвязаны друг с другом - туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Анализируя статистические данные, мы пришли к выводу о ежегодном увеличении пациентов с диагнозом ВИЧ - инфекция. Если в 2011 году на диспансерном учете в СПИД Центре Курской области состояло 556 человек, то в 2015 – 1074, т.е число их увеличилось более, чем в 2 раза.

В мире ежегодно возникает более 9 млн. случаев туберкулеза и почти 10% из них сочетаются с ВИЧ - инфекцией. Частота выявления туберкулеза достигает 78% от общего числа всех случаев легочной инфекции у пациентов с иммунодефицитом. По данным экспертов ВОЗ примерно у трети всех ВИЧ-

инфицированных больных на фоне иммунодефицита развивается туберкулез и это усугубляет ситуацию по данному заболеванию в мире в целом. Риск прогрессирования туберкулеза от инфицирования до развития клинически выраженного заболевания повышается при сочетании с ВИЧ - инфекцией от 6 до 26 раз.

В 2015 году в Курской области выявлено 507 больных туберкулезом, показатель заболеваемости составил 45,4 на 100 тысяч населения. Общая распространенность туберкулеза снизилась на 7,6%. Но, сохраняется тенденция к увеличению ко – инфекции - ВИЧ + туберкулез.

На данной диаграмме видно увеличение количества ВИЧ позитивных пациентов с туберкулезом различных форм. В течение 2011 года наблюдалось 36 пациентов с активной формой туберкулеза и 60 случаев – в 2015. Таким образом, рост пациентов с ВИЧ - инфекцией прямо пропорционален увеличению сопутствующего заболевания - туберкулеза.

ВИЧ - инфекция является важным фактором развития туберкулеза в результате активизации латентного процесса. На поздних стадиях ВИЧ - инфекции туберкулез развивается более чем в 50% случаев.

В течение последних лет в Российской Федерации наблюдается нарастание числа случаев туберкулеза среди ВИЧ – инфицированных. Объясняется это увеличением числа пациентов с выраженным иммунодефицитом.

Анализируя структуру заболеваемости туберкулеза за указанные периоды, отмечается доминирование диссеминированных форм.

Из 24-х выявленных пациентов с диагнозом туберкулез различной локализации в 2015 году – все находились в продвинутых стадиях ВИЧ - инфекции (4Б-4В). Из них диагноз: «Генерализованный туберкулез» установлен 5-ти пациентам, что составило 20,8% от всех впервые выявленных больных. За период 2011-2012 года зарегистрированных случаев генерализованного туберкулеза не было. В период 2013 – 2014 годов зарегистрировано по 1 случаю.

В 2015 году отмечалось значительное увеличение заболеваемости сочетанной патологии ВИЧ+ туберкулез. Резкий рост заболевания обусловлен миграцией пациентов - 7 человек прибыли из Украины, 1- житель другой территории РФ.

С 2000-го года ВИЧ – инфекция начала активно распространяться в среде наркопотребителей. За период 2015 года на территории Курской области зарегистрировано 256 пациентов, из них -106 ВИЧ- инфицированных пациентов по 102 коду. Быстрое распространение ВИЧ – инфекции среди наркозависимых людей в России привело к увеличению числа больных туберкулезом среди данного контингента людей, которые в силу своего социального поведения неоднократно в течение жизни попадают в места лишения свободы, где высока заболеваемость туберкулезом. Таким образом, произошло взаимное проникновение двух инфекционных процессов, определяющее возникновение общей группы риска.

Из 24 пациентов, зарегистрированных с сочетанной патологией ВИЧ+ТБ в 2015 году, 9 имели наркозависимость.

В РФ имеет место два варианта развития туберкулеза у ВИЧ – инфицированных больных. Первый вариант характеризуется заражением ВИЧ – инфекцией лиц, длительно болеющих туберкулезом, и характеризует ранние этапы развития эпидемического процесса сочетанной патологией. Второй вариант развития сочетанной патологии реализуется при развитии туберкулеза у ВИЧ – инфицированных больных с выраженным иммунодефицитом.

В Курской области за 2015 год зарегистрировано 10 пациентов первого варианта и 14 пациентов второго.

Туберкулез на ранних стадиях ВИЧ – инфекции существенно не отличается в формах, течении, подходах к диагностике от туберкулеза у пациентов без ВИЧ – инфекции. У больных преобладает поражение органов дыхания. Структура форм туберкулеза органов дыхания близка к таковой у больных туберкулезом без ВИЧ – инфекции. Частота внелегочных локализаций туберкулеза у ВИЧ – инфицированных больных на ранних стадиях заболевания также не отличается от таковой в общей популяции. Туберкулез в этот период представляет собой медленно развивающуюся, склонную к хроническому течению инфекцию. Симптомы заболевания типичны для течения туберкулеза. Это длительный кашель, выделение скудной мокроты, снижение массы тела, субфебрильная либо фебрильная лихорадка при обострении процесса, профузные ночные поты, нарастающая слабость, кахексия.

Исходы туберкулеза на ранних стадиях иммунодефицита аналогичны таковым у пациентов с туберкулезом без ВИЧ – инфекции.

В течение туберкулеза у больных, находящихся на поздних стадиях ВИЧ – инфекции, кардинально отличается от его проявлений на ранних этапах иммунодефицита или у лиц без ВИЧ – инфекции, напоминая картину первичного туберкулеза, протекающего с высокой склонностью к генерализации. В 80 % случаев регистрируют генерализованный туберкулез с поражением как органов дыхания, так и других органов одновременно. При этом изолированное внелегочное поражение наблюдается крайне редко.

Туберкулез у больных с выраженным иммунодефицитом приобретает черты септического процесса, развивается туберкулезный сепсис с молниеносным течением, тотальным поражением внутренних органов, клиникой полиорганной недостаточности, инфекционно – токсического шока и ДВС – синдрома. От дебюта заболевания до развития летального исхода происходит иногда не более 3х – 4х недель. Важно отметить, что скорость развития симптомов коррелирует с выраженностью иммунодефицита. Так, у больных со значительным снижением в крови CD4 – лимфоцитов (менее 100 кл/мкл) регистрируют молниеносное развитие туберкулеза, текущее по типу туберкулозеписа, что приводит к быстрому летальному исходу. В 2015 году в Курской области умерло 3 пациента в течение месяца с момента постановки диагноза.

Туберкулёз является основной причиной смерти при ВИЧ – инфекции. Смертность у больных с ВИЧ – инфекцией в сочетании с туберкулёзом достигает высоких цифр (23-50%). В большинстве случаев летальный исход наступает в результате развития полиорганной недостаточности. Смерть может быть вызвана прогрессированием туберкулёза, но во многих случаях она связана с прогрессированием оппортунистических инфекций.

Анализируя данную диаграмму, отмечается снижение смертности пациентов с сочетанной патологией ВИЧ+ ТБ в 2015.

У больных с выраженным иммунодефицитом отмечается уменьшение более чем в два раза частоты инфильтративного туберкулеза легких, более чем в три раза снижение частоты регистрации фиброзно – кавернозного туберкулеза легких (диаграмма №3).

В связи с неуклонным прогрессированием ВИЧ – инфекции прогноз естественного течения туберкулеза у таких больных пессимистичен. Даже после эффективного курса противотуберкулезной терапии без проведения АРВТ в короткие сроки развиваются обострение и рецидивы туберкулеза, течение которых носит все более остропрогрессирующий характер, что обусловлено снижением иммунной защиты. Риск летального исхода при рецидиве или обострении туберкулеза существенно повышается по сравнению с первичным случаем.

Важным фактором для предотвращения развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов являются качественные профилактические мероприятия.

Профилактика туберкулёза у ВИЧ – инфицированных пациентов заключается в создании системы информирования о туберкулёзе больных с ВИЧ, организации консультирования больных с ВИЧ – инфекцией по вопросам туберкулёза. Диспансерные наблюдения за ВИЧ – инфицированными пациентами должно осуществляться с момента выявления инфицирования ВИЧ – инфекцией по вопросам туберкулёза. Химиопрофилактика туберкулёза у больных с ВИЧ – инфекцией является единственной мерой, позволяющей снизить частоту развития ассоциированной формой заболевания. Профилактическое лечение значительно снижает частоту развития туберкулёза и смертность от него. Важным аспектом химиопрофилактики является полное исключение активного туберкулёзного процесса.

Показаниями к проведению химиопрофилактики туберкулёза у ВИЧ – инфицированных больных являются:

- Наличие иммунодефицита (уровень СД 4 менее 350 кл\мкл), вне зависимости от реакции на пробу Манту и Диаскинтеста.
- Положительная реакция на пробу Манту, Диаскинтеста вне зависимости от выраженности иммунодефицита.
- Принадлежность к группам высокого риска развития туберкулеза вне зависимости от выраженности иммунодефицита и реакции на кожные пробы.

В течение 2015 года химиопрофилактика туберкулеза была назначена 207 пациентам, состоящим на диспансерном учете в Центре СПИД. Из них 164

пациента с впервые установленным диагнозом ВИЧ - инфекция, что составляет 61,2% охвата химиопрофилактикой.

Основным критерием эффективности химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ - инфицированных является отсутствие случаев развития активного туберкулеза в течение 2-х последующих лет. Среди всех лиц, получавших курс химиопрофилактики туберкулеза, случаев выявления активного процесса, зарегистрировано не было.

Выводы: Таким образом, проблема сочетанной инфекции является крайне важной и требует принятия адекватных мер по выявлению данной патологии во всех лечебно - профилактических учреждениях. Раннее выявление туберкулеза у больных с ВИЧ - инфекцией становится первоочередной задачей для своевременного назначения специфического лечения и предотвращения генерализации процесса.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ О ВИЧ/СПИД

Барышникова В.А., Ахметзянов Л.М., Ковальчук В.Г., Ахметзянов М.Л.

**ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»**

Аннотация. В «Курской областной центр по профилактике и борьбе со СПИДОМ и инфекционными заболеваниями» было проведено предварительное тестирование компьютерной программы «Вопросник», что облегчает сбор и обработка информации о ВИЧ-инфекции и СПИДА. Эта программа необходима для распространения знаний о способах профилактики ВИЧ.

Ключевые слова: компьютерная программа «Анкета», профилактика ВИЧ, СПИД.

AUTOMATION OF PROCESSES OF A SOCIOLOGICAL SURVEY OF AWARENESS OF STUDENTS ABOUT HIV/AIDS

**Baryshnikova V. A., Akhmetzyanov L. M., Kovalchuk V. G.,
Akhmetzyanov M. L.**

Kursk oblast clinical dermatological and venereal dispensary
Kursk, Russia.

Abstract. In the "Kursk regional center for prevention and control of AIDS and infectious diseases" was conducted pre-testing of the computer program "Questionnaire", which facilitates the collection and processing of information about HIV infection and AIDS. This program is necessary to disseminate knowledge about ways of HIV prevention.

Key words: computer program "Questionnaire", HIV, AIDS, prevention

Социологическое исследование – как система теоретических и эмпирических процедур, включает специальные методы, направленные на выявление взаимосвязи между объектом и внешней средой. Результат исследования способствует получению нового знания об исследуемом объекте для решения рациональной и целевой организации просветительной работы. Изучение факторов, способствующих заражению ВИЧ-инфекцией, позволило констатировать, что в основном заражение обусловлено «рискованным» поведением (злоупотребление наркотическими средствами, рискованное сексуальное поведение и др.), способствующим реализации ведущих путей передачи вируса от человека человеку – через кровь и половые контакты. Молодежь особенно уязвима к ВИЧ в силу рискованного сексуального поведения, употребления психотропных веществ, отсутствия доступа к

информации о ВИЧ-инфекции и службам профилактики, а также по целому ряду других социальных и экономических причин.

Миф о том, что ВИЧ поражает только бедных людей, быстро рассеялся, когда мир узнал о смерти от СПИДа людей с мировым именем: джаз - музыкант Майл Дэвис, актер Рок Хадсон, философ Мишель Фуко, супермодель мира Джина Каранджи, теннисист Артур Эш, Израильская певица Офра Хаза, балетмейстер и танцор Рудольф Нуриев, вокалист группы Queen Фредди Меркьюри и многие другие.

Об актуальности проблемы указывают следующие данные. По оценкам ВОЗ и ЮНЕЙДС, в конце 2013 года в мире насчитывалось 35 млн. человек с ВИЧ. В 2014 г. в мире около 2.1 млн. человек приобрели инфекцию, а 1.5 млн. человек умерли от причин, связанных со СПИДом. По сообщению руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, профессора Вадима Покровского ситуация тяжелая, когда вместо профилактики у нас предпочитают лечить уже заболевших, считая, что таким образом смогут остановить распространение ВИЧ. Согласен с В. Покровским и директор Петербургского филиала компании «РЕСО-Мед»: «Надеяться, что когда-то у нас расходы на здравоохранение вырастут до 6% ВВП, не стоит – сохранить бы нынешние 3%. Заниматься профилактикой первичному звену некогда – условия для этого за 20 лет так и не созданы. Поликлиники погрязли в рутинной работе» [3].

На пресс-конференции в «Интерфаксе» В. Покровский отметил, что «80-100 случаев заражения женщин ВИЧ в день. Я не шучу: именно в день. Порядка 200 случаев мы регистрируем ВИЧ-инфекций, а заражений может быть и больше. И где-то 49% - это женщины, причем в основном молодые, от 25 до 35 лет».

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2014 г., составило 907607 человек (по предварительным данным на 1.03.2015 г.). Умерло от ВИЧ-инфекции 184148 человек, в т.ч. – 24416 в 2014 году, что на 9,1% больше, чем в 2013 г.

На территории Курской области кумулятивное количество всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных составило 2102 случаев, в том числе: жителей Курской области - 1337 (63,6%) человек, иностранных граждан 342 (16,3%), представителей других регионов РФ 282 (14,1%) человек, 79 - анонимные, 48 – «бомжи». На территории области зарегистрировано 258 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мам. За весь период наблюдения умерло 272 ВИЧ - позитивных лиц, из них 220 местные жители.

В течение 2015 года было зарегистрировано 369 случаев ВИЧ-инфекции, что на 32,7% больше, чем в 2014 г. Среди данной группы 256 человек жители области, 29 –иностранцы граждане, 35 – жители других регионов РФ, 13 –«бомжи», 6 – анонимные. Показатель заболеваемости в 2015 г. составлял 22.9 на 100 тыс. населения, превысив на 61,3% показатель 2014 г. (14,2 на 100 тыс. населения) [2].

Автоматизация основных производственных циклов надежно вошла в практическую деятельность Курского центра СПИД. Лабораторное обследование пациентов на обнаружение начальных признаков заражения ВИЧ-инфекцией, систематический эпидемиологический мониторинг за состоянием здоровья больных ВИЧ/СПИД, регистрация аварийных ситуаций, опасных в отношении заражения медицинского персонала осуществляется с применением дорогостоящих автоматизированных компьютерных систем.

Все сотрудники владеют компьютерной грамотностью, освоили прикладные программы: «Система обработки статистической отчетности» для ведения эпидмониторинга ВИЧ-инфекции, «Система регистрации травм медперсонала РУСОНЕТ», которая представляет электронную систему регистрации аварийных ситуаций, опасных в отношении заражения персонала.

Интернет данные о социологических исследованиях изучаемой проблемы мы получаем из центров СПИД, проводимых в разных регионах страны: Омск, Смоленск, Воркута, Екатеринбург, Хабаровск и др. Отмечаем, что темы исследований были разнообразные: «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИДе?» (2009); «Готовность современных родителей к просвещению детей по проблеме ВИЧ-инфекции» (2010); Эффективность обучения людей, живущих с ВИЧ в рамках программы «Школа пациента» (2011); Социологический опрос по проблеме ВИЧ-инфекции среди условно осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (2012); Изучение поведения, связанного с риском инфицирования ВИЧ женщин, потребителей инъекционных наркотиков (2014).

Например, в Свердловской области в 2014 году опрошено 1779 рабочих в возрасте от 20 до 40 лет. Среди опрошенных было 43,2% мужчин и 56,8% женщин. Большинство респондентов состояло в зарегистрированном (52,5%), либо гражданском (15,4%) браке. Большинство опрошенных имели специализированное образование – высшее (41,2%), либо среднее профессиональное (36,5%). Достаточно большая доля (69%) ответивших не могли с уверенностью сказать, что у них есть риск заражения ВИЧ, 39% из них уверены, что тема ВИЧ/СПИД их не касается. Лишь 10% опрошенных подтвердили, что они и их близкие сталкивались в своей жизни с ВИЧ-инфекцией и только 1,5% респондентов указали на то, что в их окружении есть ВИЧ-инфицированные люди.

Респонденты указали, что распространенные способы передачи ВИЧ – через половые контакты (93,3%) и через использование одного шприца (83,4%), но при этом они же называли такие пути передачи как «укус комара» (13%), «поцелуи» (11%), «посуда» (4%). Толерантность рабочих в отношении ВИЧ-положительных людей низкая: 20% опрошенных считали, что они имеют право отказаться работать в одном коллективе с ВИЧ-положительным человеком, 40% опрошенных затруднялись ответить на этот вопрос. Причем 65% убеждены в том, что работодатель не имеет права уволить ВИЧ-инфицированного сотрудника. Следует отметить, что 55% рабочих отметили, что на предприятиях, где они работают, мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции не проводятся совсем.

В Белоярском многопрофильном техникуме в анкетировании 2012 года приняли участие 115 учащихся. В анкете имелось 15 утверждений, которые нужно было отменить как верные или неверные, или указать "не знаю". Средний показатель уровня знаний составил 55%, неверные ответы или ответ "не знаю" в сумме составили 45%. Наиболее низкими знания оказались по вопросам: «Некоторые насекомые передают ВИЧ» – 30% верных ответов, «Результаты теста на ВИЧ могут быть отрицательны, но человек при этом может быть заражен» – 30% верных ответов.

Родители учащихся школ г. Омска и Омской области хорошо осведомлены о путях передачи ВИЧ-инфекции. При этом только четверть опрошенных респондентов знали, что после рискованной ситуации имеет смысл сдавать тест на ВИЧ через 3-6 месяцев, а не сразу после рискованной ситуации (36,4%).

Большинство участников опроса считали, что чаще всего носители ВИЧ-инфекции встречаются среди лиц, потребляющих наркотики и лиц, занимающихся проституцией, а также среди представителей молодежи. 72,6% родителей, участвующих в опросе, знали, где можно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. 91,9% родителей отметили, что не сталкивались, по их мнению, с ВИЧ-инфицированными людьми на работе или в повседневной жизни, при этом считают, что ВИЧ-положительные, такие же люди, как и все, только контактировать с ними надо более осторожно.

Вместе с тем, обзор социологических исследований показал, что процесс автоматизации не коснулся организации скрининг-исследования по проблеме ВИЧ-инфекции, тем самым обрекая специалистов на малорезультативный, непроизводительный ручной труд.

Кроме того, политика формирования здорового образа жизни детей и подростков, четко прописана в нормативно правовых актах (ФЗ от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ»; «Концепция превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» (2005); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», раздел IX. Гигиеническое воспитание населения; Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» п.4), предписывающих обязательное включение в рабочие программы образовательных учреждений вопросы для изучения ВИЧ-инфекции и путей профилактики.

Это обстоятельство определяет острую необходимость изучения информированности школьников и студентов о ВИЧ/СПИДе, разработке учебного модуля и поиска новых форм обучения с использованием информационно-коммуникативных технологий, в частности автоматизированных обучающих систем.

Изложенные задачи, несомненно, будут малоэффективными, если врач эпидемиолог не будет располагать первичными данными об

информированности изучаемого контингента о ВИЧ/СПИД, путях заражения и основ профилактики.

Принятие в России «Концепции превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» позволило нам выработать единую концептуально-методологическую базу превентивного обучения в области ВИЧ/СПИДа, объединить усилия заинтересованных структур, приступить к изучению информированности о ВИЧ школьников.

Продолжая традицию совместной работы кафедры вуза и Центра СПИД [1], на кафедре была разработана и согласована с врачами Центра программа пилотного регионально-отраслевого исследования:

Программа исследования:

1. Обзор эпидситуации ВИЧ/СПИД в мире, РФ, Курской области.
2. Обзор нормативных правовых документов о ВИЧ/СПИД в РФ.
3. Составление анкеты «Информированность школьников и студентов о ВИЧ-инфекции» по методическим рекомендациям МЗ и СР РФ.
4. Сбор информации (анкетирование).
5. Разработка компьютерной программы по обработке анкет, используя СУБД Access.
6. Анализ результатов социологического исследования.
7. Сравнительный анализ результатов социологического исследования с данными других регионов РФ (обзор).
8. Изучение и оценка автоматизированных обучающих систем для последующего использования в практической работе Центра СПИД.
9. Разработка учебного модуля «ВИЧ-инфекция и пути профилактики» для АОиКС «Spark» и внедрение в НОУ ВПО РОСИ при изучении учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии», «Основы медицинских знаний».
10. Подготовка научных статей для публикации.
11. Участие в НПК.

Необходимо учесть, что если в ручном режиме первичную обработку анкет (группировка по учетным признакам) может осуществлять помощник эпидемиолога, то расчет показателей, графический и интерпретационный анализ осуществляет только врач. Трудоемкость процесса ограничивает применение важного исследования и сводится к программе «min», о чем будет сказано ниже.

Важной частью скрининг-исследования является анкета (вопрос – ответ), глубина исследования (количество вопросов), метод сбора социологической информации (ручной, автоматизированный), прямой (в присутствии анкетера) или заочный (через прессу, почту). Компонентами анкетирования являются: 1) социолог (анкетер); 2) анкета; 3) респондент.

Задачи социологического исследования направлены на выявление количественно-качественных характеристик объекта и предмета анализа.

Таким образом, чрезвычайно важным и самым трудоемким на подготовительном этапе анкетирования является составление социологической анкеты, разработка выходных форм (макеты статистических таблиц), выбор математического аппарата и инструментальных средств для ввода и обработки первичных данных.

При составлении анкеты, которая содержала 47 вопросов, учтены методические рекомендации МЗСР РФ «Мониторинг и оценка эффективности мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции» от 20.09.2007 №6965-РХ.

В пилотном исследовании анкетирование (сбор информации) проводилось по традиционной методике – заполнение анкет вручную. Этот процесс занял очень много времени и его следовало автоматизировать.

С этой целью мы апробировали систему управления базами данных Microsoft Access, имеющуюся в распоряжении Центра СПИД, и начали первичные шаги по разработке прикладной программы «Анкетирование». Все вопросы были сгруппированы по учетным признакам, для них созданы шаблоны статистических таблиц (19) и определены математические методы для расчета. Проведено предварительное тестирование программы «Анкетирование», которая свободно устанавливается на компьютер и заполнение анкеты возможно без бумажного носителя.

В данной статье мы частично представим результаты обработки 334 социологических анкет без комментариев (табл. 1).

Таблица 1

Распределение респондентов, принявших участие в анкетировании «Информированность о ВИЧ/СПИД» по социальному и возрастнополовому признакам (в %)

	Мужчины (104 чел)			Женщины (139 чел)			Оба пола (334 чел)			Всего
	н/с	Средн	высш	н/с	средн	высш	н/с	средн	Высш	
до 19	61,2	2,9	х	84,6	2,4	х	72,5	2,7	Х	75,5
20-21	-	1,8	1,2	-	1,2	4,9	-	1,5	3,0	4,5
22-23	-	2,4	3,5	-	2,4	-	-	2,4	1,7	4,2
23+	-	7,6	19,4	-	2,4	1,8	-	5,0	10,8	15,9
Всего	50,9			49,1			100,0			100,0

Примечание: н/с – незаконченное среднее образование;
 средн – среднее специальное образование;
 высш – высшее образование.

Несомненно, социологическое исследование об информированности школьников о ВИЧ/СПИД представляет важное направление, результаты которого следует обсудить в студенческой среде и совместной разработке предложений по первичной профилактике.

В последующем данная программа предусматривает распространение знаний о путях профилактики ВИЧ, организации системы обучения школьников и студентов правилам здорового образа жизни, нравственного и полового воспитания, используя современные информационно-коммуникативные технологии, так как проблема перестала быть частной и стала государственной задачей.

Список литературы

1. Ахметзянов Л.М., Барышникова В.А., Локтионов С.Н., Ковальчук В.Г. Профилактическая работа в вузах по проблеме ВИЧ-инфекции в связи с особенностями распространения инфекции в Курской области [Статья] // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. Юбилейная МНПК [2-е Виноградовские чтения]. – СПб. 21 – 22 октября 2010 г. – М. Том 3. № 1. 2011. – С. 109-110.
2. Барышникова В.А., Ковальчук В.Г., Малыхина Н.В., Плотникова Е.А. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень № 32(на 31.12.2015 год). Курск: ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер». Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
3. Медицинский вестник, № 12 от 27 апреля 2015 г. – С.4.
4. Походаев Н.Ю., Барышникова В.А., Ковальчук В.Г., Ахметзянов Л.М., научный руководитель – Ахметзянов Л.М. Организация и проведение социологического исследования информированности школьников о ВИЧ/СПИДе и путях профилактики.[Статья] Сборник работ молодых ученых. Курск. Изд-во РОСИ, 2015.С.315-319.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ ГЕПАТИТАХ

Белоконова Л.В.¹, Иванова А.П.¹, Одинченко В.Н.²

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»¹
Минздрава России
ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» Курской области²
Курск, Россия**

Аннотация. Цель исследования — повышение эффективности дифференциальной диагностики острых вирусных гепатитов В и механических желтух на основе изучения уровня сывороточного железа. Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 84 пациента с острым вирусным гепатитом В и 36 больных вторичным холестатическим гепатитом. В соответствии с основными клинико-лабораторными критериями оценки все больные имели среднетяжелое течение заболевания. Содержание железа в сыворотке крови у больных определялось при поступлении на стационарное лечение. Результаты и их обсуждение. Концентрация сывороточного железа у больных с механической желтухой была достоверно ($p < 0,05$) ниже, чем у больных острым вирусным гепатитом В. Заключение. Выявление повышенной концентрации железа в сыворотке крови можно использовать как дополнительный информационный критерий в комплексной дифференциальной диагностике острого вирусного гепатита В и вторичных холестатических гепатитов.

Ключевые слова: вирусные гепатиты, сывороточное железо, вторичный холестатический гепатит.

DIFFERENTIAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF DETERMINATION OF LEVEL OF IRON AT HEPATITISES

Belokonova LV, Ivanova A.P., Odinchenko V. N.
Kursk State Medical University ¹
OBUZ «Oktyabrskaya» CENTRAL Kursk area²
Kursk, Russia

Abstract. Aim of our study was to improve the efficiency differential diagnosis of acute viral hepatitis B and mechanical jaundice based on the study of serum iron level. Material and methods. There were 84 patients with viral hepatitis B and 36 patients with secondary cholestatic hepatitis under our observation. According to the basic clinical and laboratory criteria all patients had moderate disease. The serum iron concentration was studied at admission. Results and discussion. Levels of serum iron in patients with mechanical jaundice was

significantly ($p < 0,05$) below than in patients with acute viral hepatitis B. Conclusion. Detection of high concentrations of iron in blood serum you can use as additional information criterion in the complex differential diagnosis of acute viral hepatitis B and secondary cholestatic hepatitis.

Keywords: viral hepatitis, serum iron, secondary Cholestatic hepatitis.

Дифференциальная диагностика вирусного гепатита и механических желтух была и остается важной и сложной проблемой. Ранняя и своевременная диагностика механических желтух как на почве злокачественных новообразований, так и в связи с холециститом и желчнокаменной болезнью обеспечивает успех при хирургическом лечении. В то же время ошибочный или поздно установленный диагноз, задержка в оказании необходимой срочной медицинской помощи больным механической желтухой, равно как противопоказанное оперативное вмешательство при гепатитах способствуют неблагоприятному, как правило, летальному исходу.

Имеющиеся на вооружении врачей такие методы как маркеры вирусных гепатитов, включая такой метод, как полимеразная цепная реакция (ПЦР), с высокой точностью позволяют поставить диагноз вирусного гепатита, но требуют больших материальных и временных затрат. Поэтому в настоящее время ощущается необходимость в разработке новых лабораторных методик, позволяющих быстро и качественно провести дифференциальную диагностику желтух.

Целью наших исследований было сравнить показатели обмена железа у больных вирусным гепатитом В и больных механической желтухой, сопровождающейся вторичным холестатическим гепатитом и определить возможность использования полученных данных в дифференциально-диагностических целях.

Под нашим наблюдением находилось 84 больных с острым вирусным гепатитом В, получавших стационарное лечение в ОБУЗ ОКИБ им. Н.А. Семашко. Все пациенты обследованы в соответствии со стандартами оказания специализированной помощи больным вирусными гепатитами. По степени выраженности интоксикации, показателям билирубина крови, активности аланинаминотрансферазы (АлАТ), протромбиновому индексу (ПТИ) и другим лабораторным показателям отобранные больные имели среднетяжелое течение.

По имеющимся анамнестическим данным больные направлялись в инфекционную больницу на 5 —10-й день от начала заболевания. Все больные получали только базисную терапию, входящую в стандарты оказания специализированной медицинской помощи, которая включала полупостельный режим, стол № 5, симптоматическую и патогенетическую терапию, внутривенную инфузионную терапию (5% раствор глюкозы, раствор Рингера).

Забор венозной крови для определения уровня железа проводился утром натощак из локтевой вены параллельно с забором крови для проведения рутинных биохимических тестов при поступлении в стационар. В ходе эксперимента нами использовался стандартный набор реагентов «Железо» для

фотометрического определения концентрации ионов железа, относящийся к серии «Био-Ла-Тест». Статистическую обработку результатов исследования проводили путем вычисления средней арифметической (M) и ошибки средней (m). Для установления статистической достоверности различий в сравниваемых величинах мы использовали математический метод построения динамических рядов и параметрический критерий Стьюдента. За уровень достоверности принималась вероятность различия, равная 95% ($p < 0,05$). Коэффициент корреляции сравниваемых величин определяли по Пирсону. Информативность признака вычисляли по формуле Кульбака. Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ «Microsoft Excel-2003» и «Statistica 6.0».

При отборе кандидатов в группы наблюдения, включающих больных вирусным гепатитом, мы придерживались определенных требований. Соблюдались возрастная, половая (только лица мужского пола), диетический (содержание в суточном пищевом рационе примерно 14 мг железа) критерии для всех пациентов. При выборе кандидатов в обследуемую группу не вошли больные вирусным гепатитом, имеющие какие-либо сопутствующие заболевания, так как последние могли повлиять на обмен изучаемого микроэлемента.

При вирусном гепатите В содержание ионов железа в сыворотке крови в период разгара заболевания достоверно выше, чем у здоровых лиц и в среднем составляет - $68,4 \pm 1,2$ мкмоль/л, то есть более чем в 2,5 раза превышает содержание железа у здоровых мужчин ($21,6 \pm 0,9$ мкмоль/л) ($p < 0,05$).

Причем, в разгар вирусного гепатита В даже минимальные значения концентрации ионов железа в сыворотке крови достоверно превышают максимальные показатели контрольной группы.

Увеличение концентрации железа в сыворотке крови можно объяснить нарушением функции печени по депонированию железа. В результате биохимических нарушений ослабевают устойчивость и прочность металлоорганических соединений, они легче и быстрее отдают элемент. Это в определенной степени и обуславливает повышение содержания ионов железа в крови.

Вместе с тем из-за утраты гепатоцитами способности ассимилировать железо разрушающихся эритроцитов происходит его накопление в сыворотке крови. Оба этих процесса вызывают при острых вирусных гепатитах гиперсидеремию.

Для изучения метаболизма железа при вторичных холестатических гепатитах нами было обследовано 36 больных с диагнозом «желчнокаменная болезнь» с явлениями вторичного холестатического гепатита. У всех больных механическими желтухами диагноз был подтвержден лапароскопически и в ходе оперативного вмешательства.

В большей степени нас интересовали больные с остро развившейся манифестной формой желчнокаменной болезни, сопровождавшейся ярко выраженной специфической симптоматикой. Отобраны пациенты без

сопутствующих острых и хронических заболеваний. При сборе анамнеза и объективном обследовании из числа обследуемых мы исключили больных, у которых наличие сопутствующей патологии, в той или иной степени, прямо или косвенно, могло повлечь за собой изменения обменных процессов в организме. В исследуемую группу не вошли пациенты, страдающие нарушениями функции центральной нервной системы, различными формами сердечно-сосудистой патологии, расстройствами функции дыхательной и пищеварительных систем, больные сахарным диабетом, тиреотоксикозом и другими эндокринными заболеваниями. Были исключены лица, страдающие системными заболеваниями, заболеваниями крови (особенно анемиями), почечной патологией.

Определение содержания ионов железа в сыворотке крови проводилось на 2-3-й день пребывания больных в хирургическом отделении, до оперативного вмешательства тем же фотоколориметрическим методом.

У больных желчнокаменной болезнью в первые дни желтухи содержание сывороточного железа превышало максимальные границы показателей контрольной группы в 1,4 раза и составило $30,7 \pm 0,9$ мкмоль/л. Лишь у 4 из 36 больных уровень катиона был в пределах нормы (23-26 мкмоль/л).

У больных вторичным холестатическим гепатитом минимальные показатели концентрации железа в сыворотке крови практически не превышают максимальные показатели контрольной группы. В то время как у больных вирусным гепатитом минимальные показатели концентрации железа достоверно выше максимальных концентраций практически здоровых лиц.

Таким образом, метаболизм железа при механической желтухе страдал меньше, чем при вирусном гепатите В, так как концентрация железа в сыворотке крови у больных желчнокаменной болезнью была достоверно ($p < 0,05$) ниже, чем у больных вирусным гепатитом ($68.35 \pm 1,23$ мкмоль/л), но выше, чем у здоровых ($21,6 \pm 0,93$ мкмоль/л) ($p < 0,05$).

Причинами изменения концентрации железа в сыворотке крови при желчнокаменной болезни, очевидно, являются наличие цитолитического синдрома в печени, нарушение других видов обмена веществ, имеющее место при любой механической желтухе, особенно на фоне болевого приступа.

Нами также вычислялся показатель информативности с целью определения диагностической значимости для вторичного холестатического гепатита уровня повышения ионов железа в сыворотке крови.

В наших наблюдениях концентрация железа в сыворотке крови у больных вирусным гепатитом В в разгар желтухи повышалась более чем в 2 раза по сравнению с нормой, в отличие от вторичного холестатического гепатита, при котором уровень железа был повышен не более чем в 1,4 раза. Учитывая тот факт, что при $p < 0,05$ у 95% больных уровень железа находится в пределах $M \pm 2\sigma$, в качестве дифференциально-диагностического теста можно использовать повышение уровня железа в сыворотке крови выше 43,2 мкмоль/л.

Поскольку информативность повышенного уровня железа в сыворотке крови составила 9,9, этот признак можно рекомендовать в качестве дополнительного теста при дифференциальной диагностике вирусного и вторичного холестатического гепатитов.

Следовательно, несмотря на определенные трудности, разграничение вирусных гепатитов В и вторичных холестатических гепатитов на фоне желчнокаменной болезни возможно при учете анамнестических данных и комплексном обследовании больных с дополнительным исследованием уровня железа сыворотки крови в динамике первых дней желтухи.

Список литературы

1. Белоконова Л.В. Прогнозирование возможной хронизации вирусного гепатита на основе динамической оценки уровня железа в сыворотке крови / Л.В. Белоконова, Л.Ю. Зайцева, Л.В. Титарева // Вестник современной клинической медицины. — 2016. — Т. 9, вып. 3. — С.7—11.
2. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н.Д. Ющук [и др.] — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 160 с.
3. Ивашкин, В.Т. Фиброз печени: монография / В.Т. Ивашкин, Ч.С. Павлов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 168 с.
4. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом В / В.Т. Ивашкин [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2014. — № 3. — С.58—88.
5. Особенности лечебно-диагностической тактики при механической желтухе опухолевого генеза / Ю.Н. Саморуков [и др.] // Росс, журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2006. - Т.16, № 1. - С. 56.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2015гг).

Бибичева Т.В.

**ФГБОУ ВО Курский Государственный Медицинский Университет,
Курск, Россия**

Аннотация. В статье проанализирована динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), в Курской области (2011-2015гг.). Констатируется значительное снижение заболеваемости ИППП, преобладание в общей структуре заболеваемости урогенитального трихомониаза и увеличение доли вирусных ИППП.

Ключевые слова: заболеваемость; инфекции, передаваемые половым путем.

The analysis of disease of sexually transmitted infection in Kursk region (2011-2015).

Bibicheva T.V.

**Kursk State Medical University,
Kursk, Russia**

Abstract. In this article we discuss STD disease dynamics in Kursk region (2011 - 2015). We also show the diminution of STD disease. In structure of disease STD patients with urogenital trichomoniasis prevail. The increase in a share of a viral sexually transmitted infection is stated.

Key words: disease, sexually transmitted disease.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), широко распространены в современном обществе среди молодого трудоспособного населения и подростков. ИППП пагубно влияют на фертильную функцию, и могут быть не только причиной бесплодия у мужчин и женщин, но гибели плода и новорожденного. ИППП способны приводить к развитию иммунодефицитных состояний, потенцировать развитие онкологических заболеваний, участвовать в передаче ВИЧ-инфекции, а также явиться причиной тяжелых осложнений, приводящих к инвалидизации и летальным исходам. Поэтому проблемы заболеваемости, профилактики, ранней диагностики и терапии ИППП остаются одними из наиболее важных и социально-значимых для медицинского сообщества в целом и дерматовенерологической службы в частности.

По материалам учетно-отчетной документации ОБУЗ КОККВД (формы №9 и №34) проведен ретроспективный анализ динамики заболеваемости и общей структуры ИППП за период с 2011г. по 2015г. по Курскому региону.

Следует отметить, что реализация государственных программ - активная профилактическая работа, направленная на предупреждение распространения

социально-значимых заболеваний, внедрение в практику новых современных методов диагностики, лечение позволили значительно снизить количество случаев впервые выявленных ИППП по всем учитываемым нозологиям, как в абсолютных, так и в интенсивных показателях. Так, в 2011г. было выявлено 4398 человек с ИППП, интенсивный показатель заболеваемости составил 385,9 человек на 100 тысяч населения (ИнПЗ-385,9). В 2015г. общая заболеваемость ИППП в отношении к 2011г. достоверно снизилась на 45,79% ($p<0,001$) и составила 2341 случай инфекций, ИнПЗ-209,2.

Заболеваемость сифилисом в период с 2011-2015 гг. снизилась практически в два раза (49,1%), пиков ее повышения не наблюдалось: в 2011г. были впервые выявлены 554 человека (ИнПЗ-48,5), к 2015г. ИнПЗ составил уже 24,7 (277 человек).

Абсолютные числа и интенсивные показатели заболеваемости гонококковой инфекцией (167случаев, ИнПЗ-14,9) и трихомониазом (988 случаев, ИнПЗ-88,2) к 2015г. также достоверно снизились по сравнению с 2011г. (гонорея- 537 случаев, ИнПЗ-47; трихомониаз – 1750 случаев, ИнПЗ-153,3). Снижение по ИнПЗ составило 68,3% и 42,47% соответственно по инфекциям ($p<0,001$). Пики подъема заболеваемости гонококковой инфекцией за анализируемый период времени не наблюдались. Максимальное снижение же заболеваемости трихомониазом приходилось на 2014г. (ИнПЗ - 84), а к 2015г. наблюдалось небольшое повышение до ИнПЗ-88,2, но это увеличение не было достоверным ($p>0,05$).

Положительная динамика в снижении заболеваемости хламидиозом также была значительно выраженной, ИнПЗ к 2014г. снизился на 55,93% и составил 23,9 (268 случаев), по сравнению с ИнПЗ 2011г. – 58,2 (665 случаев). В 2015г.наблюдался незначительный подъем заболеваемости хламидийной инфекцией – ИнПЗ-25,8 (289 случаев), что незначительно отразилось на общем снижении за исследуемый период – снижение ИнПЗ на 55,67%.

Обращает на себя особое внимание факт наименее выраженного снижения по заболеваемости вирусными ИППП. Проанализировав динамику зарегистрированных случаев папилломавирусной инфекции (венерические бородавки) к 2015г. (ИнПЗ-39,5, 442 случая) было отмечено достоверное снижение ИнПЗ на 31,9 %, по сравнению с 2011г. (ИнПЗ-58, 662 случая) ($p<0,001$). Число случаев герпетической инфекции гениталий в 2011г. составляло 230 человек (ИнПЗ-20,9). К 2014г. наблюдалось достаточно выраженное достоверное снижение заболеваемости по ИнПЗ на 30,62% (165 случаев, ИнПЗ-14,5), а затем ее постепенный рост к 2015г. до ИнПЗ-15,9 (178 случаев). Таким образом, достоверное суммарное снижение заболеваемости генитальной герпетической инфекцией по ИнПЗ к 2015г. составило 23,92% ($p<0,001$).

Общая структура заболеваемости ИППП за анализируемый период выглядела следующим образом. Максимальная доля случаев ИППП в каждом году приходилась на трихомониаз и составляла 39,73% в 2011г., несколько увеличившись к 2015г. до 42,2%. Доля пациентов с сифилисом недостоверно

варьировала между минимальным значением 11,13% в 2012 и 2013гг. и максимальным - 12,6% в 2011г., в 2015г. она составила 11,8% от общего числа случаев ИППП. Гонококковая инфекция составляла 12,21% в общей структуре ИППП в 2011г. и в течение последних трех анализируемых лет занимала предпоследнее место, к 2015г. доля ее составила 7%. Хламидийная инфекция занимала на начальном этапе, в 2011г., второе место. Доля ее составляла 15,12%, сместившись на четвертое место в 2014г. (минимальное значение 10,83%), в 2015г. хламидийная инфекция составляла 12,34%.

Первоначально находясь на третьем месте в 2011г., папилломавирусная инфекция переместилась на второе с 2012-2015гг. Герпетическая инфекция гениталий занимала последнее место в течение всего анализируемого периода. Следует особо отметить факт постепенного достоверного увеличения суммарной доли случаев указанных вирусных инфекций в общей структуре ИППП, что в 2011г. составило 20,45% с максимальным достоверным ростом в 2014г. до 29,1% и небольшим снижением в 2015г. – 25,1% ($p < 0,001$).

Если анализировать отдельно, то доля папилломавирусной инфекции постепенно достоверно увеличивалась с 15,13% до 18,88% ($p < 0,001$, увеличение 24,79%), с пиком 22,07% в 2014г. Увеличение же доли герпетической инфекции гениталий в общей структуре ИППП составило к 2015г. 15% (с 5,42% в 2011г. до 6,23% в 2015 г).

Таким образом, проведенный анализ данных позволяет судить о достоверном значительном снижении заболеваемости ИППП в Курской области за 2011-2015гг на 45,79%; в общей структуре ИППП преобладают пациенты с урогенитальным трихомониазом; имеется достоверная тенденция к увеличению доли папилломавирусной и герпетической инфекций в общей структуре ИППП.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ

Бондаренко В.Н.¹, Буйневич И.В.¹

УО «Гомельский государственный медицинский университет»¹
Гомель, Республика Беларусь

Аннотация. Определена этиологическая структура и оценена восприимчивость возбудителей внебольничной пневмонии к антибактериальным препаратам. Установлено, что наиболее частыми возбудителями пневмоний у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, явились *Kl. pneumoniae*, представители семейства Enterbacteriaceae, а также *S. aureus* и *P. aeruginosae*. Изучение спектра лекарственной устойчивости возбудителей пневмоний показало высокую долю штаммов, резистентных к антибиотикам стартовых эмпирических схем и чувствительных к резервным антибактериальным средствам.

Ключевые слова: пневмония, возбудители пневмонии, внебольничная пневмония, микробиологическая диагностика

Microbiological diagnostics of pneumonia in alcohol abused patients.

Bondarenko V.N., Bujnevich I.V.

Gomel State Medical University¹

Gomel, Republic of Belarus

Abstract. We studied etiological structure and antibiotics susceptibility of home pneumonia pathogens. The most frequent etiological agents in alcohol abused patients were found to be *Kl. pneumoniae*, Enterbacteriaceae family, *S. aureus* and *P. aeruginosae*. We found high proportion of pathogens which were resistant to antibiotics of starting empiric combination while sensitive to reserve antimicrobials.

Key words: pneumonia, community-acquired pneumonia, microbiological Diagnostics.

Пневмонии относятся к числу наиболее распространенных острых инфекционных заболеваний. Распространенность внебольничной пневмонии (ВП) в Республике Беларусь в последние годы составляет в среднем 4 на 1000 населения. У 6-10% пациентов отмечается тяжелое течение ВП, требующее госпитализации в отделение интенсивной терапии. Летальность при ВП также до сих пор остается высокой во всем мире: от 5,1 до 36,5% в зависимости от возраста пациента, объема поражения, наличия сочетанной и сопутствующей патологии, а при тяжелом течении с бактериемией неблагоприятный исход возрастает до 48,4–55,3%. Одним из распространенных факторов, обуславливающих тяжелое и затяжное течение ВП, является наличие у пациента синдрома зависимости от алкоголя. Типичными возбудителями ВП являются *S. pneumoniae* (30-50% случаев заболевания), *H. influenzae* (10-20%),

внутриклеточные микроорганизмы – *S. pneumoniae* и *M. pneumoniae* (8-25%), удельный вес остальных возбудителей составляет всего 3-5% [1]. У людей на фоне приема алкоголя увеличивается удельный вес условно-патогенной флоры, к которым в первую очередь относятся *Staphylococcus aureus*, *Enterobacteriaceae*, анаэробы. Особенности этих пневмоний является тяжелое затяжное течение, наличие деструкции в легочной ткани, высокий процент осложнений, плохой ответ на антибактериальную терапию.

Целью исследования явилось изучение клинико-рентгенологической картины ВП у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, определение этиологической структуры возбудителей ВП и оценка восприимчивости возбудителей ВП к антибактериальным препаратам.

По данным 1-го пульмонологического отделения У «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница» за 9 месяцев 2016 года пролечено 373 пациента с ВП. Из них 60 человек (16,1%) – это люди, находившиеся на диспансерном учете по поводу хронического алкоголизма. Средний возраст пациентов составил $46,3 \pm 9,1$ лет (32-69 лет). При этом лиц трудоспособного возраста было 56 (93,3%). Женщин среди этой группы пациентов не было.

Обследование и лечение пациентов проводилось согласно «Клиническому протоколу диагностики и лечения пневмоний» (Приложение 2 к приказу МЗ РБ 05.07.2012 № 768). Исследование мокроты проведено на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK bioMérieux. У 36 пациентов (60,0%) получен рост микроорганизмов, являющихся потенциальными возбудителями пневмоний. Диагностически значимым считался титр 10^6 - 10^7 КОЕ/мл. При выделении патогенного микроорганизма определялась его чувствительность к антибактериальным препаратам. Количество препаратов, к которым определялась чувствительность, зависело от вида выделенного микроорганизма (в соответствии со стандартами микробиологической диагностики). Результат определялся как в виде критических значений (чувствителен; умеренно-устойчив; устойчив), так и в виде значений минимальных ингибирующих концентраций антибиотика (МИК).

Нами было изучено преморбидное состояние пациентов с ВП, злоупотребляющих алкоголем. Установлено, что в 96,7% случаев пациенты курили. Индекс курения составил 11,8 пачек/лет. У 17 (28,3%) пациентов развитию ВП способствовала ВИЧ-инфекция. В 55, 6% случаев пациенты страдали ишемической болезнью сердца, в 44, 4% случаев возникновению ВП способствовала хроническая обструктивная болезнь легких. Важным является факт, что 25 (41, 7%) пациентов были переведены из других стационаров, где они уже проходили лечение по поводу пневмонии. Возможно, такие пациенты явились группой высокого риска присоединения внутрибольничной инфекции.

Все пациенты поступили в стационар в тяжелом состоянии, из них 18 (30,0%) были в крайне тяжелом состоянии. Им требовалось проведение лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациенты поступали в пульмонологическое отделение в среднем через 8-10 дней от начала

заболевания. У 36 пациентов (60%) в период госпитализации диагностирован синдром отмены алкоголя. Это явилось фактором, усугубляющим интоксикацию, и осложнило терапию основного заболевания. Кроме того, поражение внутренних органов, связанное с хронической алкогольной интоксикацией, требовало коррекции белкового состава крови, учета нефро- и гепатотоксичности назначаемых антимикробных препаратов.

В большинстве случаев наблюдалось обширное поражение легочной ткани (не менее доли легкого) с деструкцией. При этом у 12 пациентов (20,0%) в процесс было вовлечено левое легкое, у 22 (36,6%) – правое легкое, у 26 (43,4%) – двустороннее поражение.

В результате исследования мокроты были выявлены возбудители тяжелой ВП, этиологическую структуру которой составили грамотрицательная и грамположительная микрофлора. Наиболее частым возбудителем ВП явилась *Kl. pneumoniae*, составившая 38,9%. Вторая группа представлена семейством *Enterbacteriaceae* – 33,3%. В 22,2% случаев был выделен *S. aureus*. В 5,6% в мокроте высевалась *P. aeruginosa*. У 7 (19,4%) наряду с бактериальной флорой получен рост грибов рода *Candida*. Не выявлено ни одного пациента, у которых в мокроте обнаружена микрофлора, типичная для возбудителей ВП.

При определении чувствительности возбудителей ВП к антибактериальным препаратам установлено, что *Kl. pneumoniae* имеет высокую чувствительность к незащищенным β -лактамным пенициллинам в 71,4% случаев и цефалоспорином – 85,7%, к аминогликозидам в 100% случаев. Возбудители семейства *Enterbacteriaceae* чувствительны к цефалоспорином – 83,3% и аминогликозидам – 100%, но устойчивы к β -лактамным пенициллинам в 83,3% и к левофлоксацину – в 100% случаев. *S. aureus* в 50,0% случаев устойчив к левофлоксацину и кларитромицину. Но отмечается 100% чувствительность к макролидам. Важно, что *P. aeruginosa* в 100% чувствителен ко всем препаратам.

Летальным исходом завершилось течение пневмонии в 4 случаях (6,7%). Полное клиническое и рентгенологическое выздоровление наблюдалось у 6 пациентов (10,0%). У остальных 50 человек (83,3%) произошло формирование пневмофиброза. Средняя продолжительность лечения пневмоний, вызванных *P. aeruginosa*, *Kl. pneumonia* составила $30,0 \pm 5,0$ дней. Лечение пневмоний, вызванных группой *Enterbacteriaceae*, продолжалось в среднем $21,0 \pm 2,0$ день, *S. aureus* – $18,0 \pm 5,0$ дней.

Таким образом, ВП у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя сопровождаются тяжелым затяжным течением, наличием деструкции в легочной ткани, медленным ответом на антибактериальную терапию, фибротизацией легкого в исходе заболевания. Проблема усугубляется нередкими летальными исходами. Госпитализации в специализированные отделения пульмонологического профиля в значительной части случаев предшествовало безуспешное лечение в терапевтических отделениях стационаров.

Наиболее частыми возбудителями ВП у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, явились *Kl. pneumoniae*, представители семейства *Enterbacteriaceae*, а также *S. aureus* и *P. aeruginosa*. Типичных возбудителей ВП не выявлялось. Изучение спектра лекарственной устойчивости возбудителей ВП показало высокую долю штаммов, резистентных к антибиотикам стартовых эмпирических схем и чувствительных к резервным антибактериальным средствам.

Список литературы

1. Trends and significance of antimicrobial resistance in respiratory pathogens / D.E. Low [et al.] // *Curr. Opin. Infect. Dis.* – 2006. – Vol. 13. – P. 145-153.
2. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике / Чучалин А.Г. [и др.] // *Клин. микробиология и антимикроб. химиотерапия* - 2006. - №8. – С. 54-86.
3. Клинико-рентгенологические особенности пневмоний у ВИЧ-инфицированных пациентов в Гомельской области / Е.В. Разумовская [и др.] // *Актуальные проблемы медицины: сб. науч. ст. Респ. науч.-практ. конф. и 21 итоговой сессии Гомельского государственного медицинского университета, Гомель, 16-17 февраля 2012 г.: в 4 т. / Гомел. госуд. мед. ун-т, ред. колл. А.Н. Лызиков [и др.]. – Гомель: ГГМУ, 2012. – Т. 3. – С. 228-230.*
4. Течение и стартовая антибиотикотерапия внебольничных пневмоний с наличием показаний для госпитализации / Н.Е. Дроздовская [и др.] // *Мед. новости.* – 2011. – № 4. – С. 62- 65.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУЛЬФАТА ЦИНКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Возякова Т.Р.¹, Карзакова Л.М.¹, Еленкина Ж.В.², Кудряшов С.И.¹

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н.Ульянова», ¹,

БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер Минздрава
Чувашии»²,
г. Чебоксары, Россия

Аннотация. Химиотерапия больных туберкулезом органов дыхания с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ к основным противотуберкулезным препаратам, у которых выявлена депрессия клеточного механизма адаптивного иммунного ответа, обусловленная дефицитом цинка, малоэффективна. С целью решения проблемы повышения эффективности химиотерапии туберкулеза и сокращения сроков лечения в схему лечения был включен цинк-содержащий препарат – сульфат цинка, в суточной дозе 2,30–3,5 мг/кг. Включение иммунонутриента в лечение туберкулеза сопровождалось увеличением процента закрытия полостей распада в легких и количества абациллированных пациентов в среднем на 20%. Клинический эффект заключался в положительной динамике показателей иммунного статуса у больных к концу курса лечения: произошло увеличение числа CD3⁺-лимфоцитов (с $881,2 \pm 350,2 \times 10^6/\text{л}$ до $1217,9 \pm 337,3 \times 10^6/\text{л}$, $p < 0,001$), CD4⁺-клеток (с $482,2 \pm 205,0 \times 10^6/\text{л}$ до $793,3 \pm 247,0 \times 10^6/\text{л}$, $p < 0,001$). Применение цинка сопровождалось повышением ФГА-индуцированной лимпролиферации – индекс стимуляции на ФГА вырос с исходного значения $10,2 \pm 5,7$ до $23,8 \pm 13,1$ ($p < 0,05$), уменьшением концентраций ЦИК и IgG.

EVALUATION OF ZINC SULPHATE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Vozjakova T.R., Karzakova L.M., Elenkina G.V., Kudryashov S.I.

Chuvash State University named after I.n. Ulyanov, ¹,
Republican dispensary of Ministry of health of Chuvashia, ²
Cheboksary, Russia

Abstract. A chemotherapy of patients with tuberculosis of respiratory organs with the kept drug sensitivity of MBT to the main antituberculous preparations at which the depression of the cell-like mechanism of the adaptive immune answer caused by deficiency of Zincum, ineffectively is revealed. For the purpose of a solution of the problem of increase of effectiveness of a chemotherapy of tuberculosis and reduction of terms of treatment the scheme of treatment included Zincum - the containing preparation – Zinci sulfas, in a daily dose 2,30-3,5¹/₄g/kg. Inclusion of an immunonutrient in treatment of tuberculosis was followed by increase in percent of closing of cavities of destruction in lungs and quantities of undetected patients MBT

on average for 20%. The clinical effect consisted in positive dynamics of indexes of the immune status at patients by the end of a course of treatment: there was an increase in number CD3 of +-lymphocytes (with $881,2 \pm 350,2 \times 10^6/\text{л}$ to $1217,9 \pm 337,3 \times 10^6/\text{л}$, $p < 0,001$), CD4 +-cells (with $482,2 \pm 205,0 \times 10^6/\text{л}$ to $793,3 \pm 247,0 \times 10^6/\text{л}$, $p < 0,001$). Use of Zincum was followed by increase FGA-induced of a limproliferation - the stimulation index grew by FGA from original value $10,2 \pm 5,7$ to $23,8 \pm 13,1$ ($p < 0,05$), decrease of concentration of the CEC and IgG.

Актуальность изучаемой проблемы. С позиций инфекционной сущности туберкулеза основным методом его лечения является химиотерапия. Излечение больных туберкулезом зависит от двух взаимосвязанных факторов: подавления размножающейся микобактериальной популяции с помощью противотуберкулезных препаратов и регрессии туберкулезных изменений в пораженных органах с развитием репаративных процессов.

Лечение больных туберкулезом проводят комплексно в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями [1]. Оно включает химиотерапию (этиотропную противотуберкулезную терапию) в соответствии с лекарственной чувствительностью МБТ, хирургическое лечение и коллапсотерапию, а также патогенетическую терапию и лечение сопутствующих заболеваний. Однако в настоящее время стоит остро проблема повышения эффективного излечения в достаточно короткие сроки лекарственно чувствительного туберкулеза, определенные стандартными режимами химиотерапии в 6 – 8 месяцев. В среднем эффективность химиотерапии с прекращением бактериовыделения и закрытием полостей распада по России не превышает 63%. Добиться клинического излечения больного туберкулезом через год успешной терапии удастся только у 47,9% взятых на учет впервые выявленных больных. [2]. В ряде случаев лечение продолжается 2-3 года и более. Поэтому актуальной является проблема повышения эффективности химиотерапии и сокращения сроков лечения. Кроме того, в настоящее время все большую актуальность приобретает лечение лекарственно устойчивых и быстропрогрессирующих форм туберкулеза, основным патогенетическим звеном развития которых выступает несостоятельность клеточного звена адаптивного иммунного ответа. Изменение соотношения между клеточной и гуморальной составляющими иммунной системы является одним из основных признаков иммунопатогенеза туберкулеза. По мере распространения поражения легких прогрессивно снижается функция Th1 (снижение продукции интерлейкина 2 (ИЛ-2), интерферона –гамма (ИФН- γ), нарушение экспрессии рецепторов к ИЛ-2)) и ухудшаются показатели Т-клеточного звена иммунной системы. Гуморальный ответ, связанный с функцией Th2, напротив, активируется: повышаются уровни ИЛ-4, иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)[3]. Одной из основных причин клеточного иммунодефицита больных может быть дефицит цинка (проживание в цинкдефицитных провинциях, нерациональное

питание с дефицитом животных белков, беременность, подростковый возраст, хронический алкоголизм, хронические заболевания печени, желудочно-кишечного тракта). Определенный вклад в развитие недостаточности клеточного компонента адаптивного иммунного ответа при туберкулезной инфекции вносит усиление апоптоза Т-лимфоцитов, активированного антигенами МБТ и/или индуцированного глюкокортикостероидами. Продукция последних связана с активацией гипоталамус-гипофиз-адреналовой системы в ответ на инфекционный стресс, повреждение тканей и токсины [4]. Ранее нами показано, что химиотерапевтические препараты отрицательно влияют на функциональную активность клеточного звена иммунного ответа, а препарат цинка – сульфат цинка, напротив, обладает иммуномодулирующим действием на клетки иммунной системы [3]. В предыдущих исследованиях показано участие цинка в процессах, связанных с активацией и апоптозом лимфоцитов [5].

Лечение больных, у которых выявлена депрессия клеточного механизма адаптивного иммунного ответа, обусловленная дефицитом цинка, с использованием химиопрепаратами и известными патогенетическими средствами (в том числе иммуномодуляторами) малоэффективно. В таких случаях в лечении больных туберкулезом легких мы включаем цинк-содержащий препарат – сульфат цинка в суточной дозе 2,30–3,5 мг/кг в период интенсивной фазы на фоне адаптации к противотуберкулезным препаратам. Основанием для назначения этого препарата явилось его модулирующее влияние на ФГА – индуцированную лимфопролиферацию больных туберкулезом легких: при добавлении сульфата цинка ($50 \text{ мкмоль Zn}^{2+}$) в среду культивирования у пациентов со сниженным уровнем цинка в сыворотке крови медиана индекса стимуляции пролиферативного ответа лимфоцитов на ФГА достоверно повышалась [6].

Материалы и методы. В исследовании был применен цинк-содержащий препарат – сульфат цинка в суточной дозе 2,30–3,5 мг/кг (0,50 – 0,75 мг/кг/сутки в пересчете на элементарный цинк) в виде двух-трёхкратного приема внутрь курсом 21-28 дней в период основного курса химиотерапии лекарственно чувствительного туберкулеза органов дыхания на фоне адаптации к противотуберкулезным препаратам первого ряда. Пред назначением препарата цинка мы проводили предварительную оценку *invitro* чувствительности лимфоцитов больных к сульфату цинка и назначали препарат лишь тем пациентам, у которых прирост индекса стимуляции в ответ на введение этого соединения в культуру клеток составлял не менее 20 % (первая группа пациентов – 25 чел.). Больных в количестве также 25 чел., лимфоциты которых были инертны к добавлению Zn^{2+} , вели на обычно используемой стандартной химиотерапии (2-я группа).

Наблюдение больных осуществлялось на стационарном этапе (интенсивная фаза лечения), продолжавшемся в среднем 2 месяца, и на амбулаторном этапе (фаза продолжения лечения) в течение 4 месяцев. Общепринятыми критериями эффективности лечения больных туберкулезом являются: исчезновение

клинических и лабораторных признаков туберкулезного воспаления; стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное микроскопическим и культуральным исследованиями; регрессия рентгенологических проявлений туберкулеза (очаговых, инфильтративных, деструктивных); восстановление функциональных возможностей и трудоспособности [7].

Результаты исследования. Анализ результатов лечения с использованием стандартной противотуберкулезной химиотерапии туберкулеза органов дыхания с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ к основным противотуберкулезным препаратам и предложенного нами метода показал, что к концу двухмесячного стационарного лечения во второй группе абациллирование достигнуто лишь у $78,9 \pm 9,3$ % больных, закрытие полости произошло только у 17 больных ($70 \pm 9,2$ %). Больные 2 группы предъявляли жалобы на кашель, потливость, общую слабость в течение $32,3 \pm 6,3$ дней. Туберкулезная интоксикация у преобладающего большинства больных исчезла через 4 мес лечения. Количество койко-дней в интенсивной фазе лечения у больных этой группы составило $103,3 \pm 9,3$ дней. В 1 группе больных, получавших сульфат цинка в сочетании с противотуберкулезной химиотерапией, анализируемые показатели интенсивной фазы лечения были намного лучше, что проявлялось в большем проценте закрытия каверн – $95,6 \pm 4,2$ % и абациллирования – $94,4 \pm 5,4$ %, что в среднем на 20% больше по сравнению с группой 2 ($p < 0,05$). Кроме того в этой группе на 15 дней раньше прекращались жалобы, на 5,6 дней меньше держалась повышенная температура тела, туберкулезная интоксикация прошла через 3 мес. В результате пребывания больных в стационаре на интенсивной фазе лечения сократилось, по сравнению с первой группой, на 28 дней и составило $75,1 \pm 4,3$ койко-дней. Наблюдение больных в фазе продолжения лечения показало, что в группе пациентов, получавших стандартное лечение, к концу четвертого месяца амбулаторного лечения процент закрытия полостей достиг уровня $20,8 \pm 8,2$ %, в то время как в группе, леченной препаратом цинка, к этому периоду произошло закрытие полостей у $69,5 \pm 9,5$ % больных ($p < 0,05$).

Клинический эффект применения сульфата цинка в лечении туберкулеза легких сочетался ярко выраженной положительной динамикой исходно измененных показателей иммунного статуса у больных к концу курса лечения. В частности, достоверно уменьшились средние значения содержания лейкоцитов, нейтрофилов. Произошло увеличение числа лимфоцитов, $CD3^+$ -лимфоцитов (с $881,2 \pm 350,2 \times 10^6/\text{л}$ до $1217,9 \pm 337,3 \times 10^6/\text{л}$, $p < 0,001$), $CD4^+$ -клеток (с $482,2 \pm 205,0 \times 10^6/\text{л}$ до $793,3 \pm 247,0 \times 10^6/\text{л}$, $p < 0,001$). Ликвидировался дисбаланс иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов: иммунорегуляторный индекс, достигнув уровня $1,7 \pm 0,5$, несколько превысил значение аналогичного показателя в здоровой популяции ($1,58 \pm 0,31$). Улучшение количественных параметров Т-системы отразилось на повышении ФГА-индуцированной лимпролиферации: индекс стимуляции на ФГА вырос с исходного значения $10,2 \pm 5,7$ до $23,8 \pm 13,1$ ($p < 0,05$). Исходно сниженный фагоцитарный индекс также повысился в процессе лечения цинксодержащим препаратом.

Первоначально повышенная активность гуморального звена иммунной системы снизилась, о чем свидетельствует уменьшение концентраций ЦИК и IgG.

Иммуномодулирующий эффект восстановленного в процессе лечения сульфатом цинка гомеостаза цинка и устраненного дисбаланса медь/цинк мы объясняем участием цинка в процессах, связанных с активацией и апоптозом лимфоцитов. Устранение дефицита цинка, вероятно, тормозит апоптоз активированных клеток, свидетельством тому является преобладание в группе больных, леченных препаратом цинка, экспрессии маркеров позитивной активации на фоне снижения уровня клеток, несущих рецептор апоптоза Fas.

Исследования по влиянию цинка на активность иммунокомпетентных клеток *in vitro* расширяют представления об иммуномодулирующем действии этого иммунонутриента в организме. Если до начала лечения во второй группе больных добавление Zn^{2+} в культуру лимфоцитов значительно повышало ФГА-индуцированную пролиферацию лимфоцитов, то к концу лечения вырос индекс стимуляции на ФГА, но добавление сульфата цинка *in vitro* уже не оказывало существенного стимулирующего влияния на лимфопротериацию. Видимо, сульфат цинка оказывает стимулирующее влияние на пролиферацию лимфоцитов в зависимости от уровня насыщенности организма цинком. При достижении определенного уровня содержания этого микроэлемента в организме лимфоциты проявляют инертность на добавление его *in vitro*.

Больные, лимфоциты которых были резистентны к добавлению цинка в среду культивирования, получали стандартную химиотерапию. В процессе лечения не повысилась ни пролиферативная активность лимфоцитов этих больных, ни чувствительность клеток к цинку, что, мы объясняем ингибирующим влиянием эспротивотуберкулезных препаратов на активность Т-лимфоцитов.

Заключение. Результаты проведенного лечения показывают, что включение сульфата цинка в суточной дозе 2,30 – 3,5 мг/кг в комплексное лечение больных туберкулезом органов дыхания с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ оказывает существенный клиническо-иммунологический эффект и, как результат, приводит к сокращению длительности химиотерапии. Однако перед использованием препарата у больного требуется определение чувствительности лимфоцитов *in vitro* к иммуномодулирующему влиянию сульфата цинка.

Список литературы

1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания. М., 2015г., 68с.
2. Туберкулез в России в 2012-2013 году, монография / М.В.Шилова. М., 2014. – 244 с.
3. Карзакова Л.М. Иммуногенетические исследования популяции здоровых людей и больных инфекционно-воспалительными заболеваниями легких, проживающих в регионе естественного дефицита цинка: автореф. дисс. доктора медицинских наук / ГОУВПО "Российский государственный медицинский университет". Москва, 2005. – 42 с.

4. ReichlinS. Neuroendocrine-immuneinteractions //N. Engl. J. Med. – 1993. – Vol.329. – P.1246-1253.].
5. Карзакова Л.М. Дефицит цинка индуцирует FAS-опосредованный апоптоз. Медицинская иммунология. 2005.- Т. 7. - № 4. - С. 441-443.
6. Карзакова Л.М., Сусликов В.Л., Мохирева Л.В., Еленкина Ж.В. Способ лечения туберкулеза легких: патент на изобретение RUS 2253460 02.08.2004.
7. О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №109 от 21 марта 2003 г.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Гаранин А.В.¹, Авдеева В.В.¹, Коломиец Д.И.²

МСЧ-46 ФСИН России по Курской области¹, Россия

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»²

Features of HIV-associated tuberculosis treatment in penitentiary conditions

Haranin A.V.¹, Avdeeva V.V.¹, Kolomiets D.I.²

MSCH-46 of the Federal penitentiary service of Russia in Kursk region¹

Kursk State Medical University²

Kursk, Russia.

Abstract. An increase in the proportion of HIV-infected persons in Federal penitentiary service prisons of Kursk region against the clear downward trend in the overall morbidity of prisoners was revealed. Clinical case of focal pulmonary tuberculosis combined with stage 3 HIV and chronic hepatitis "C" was discussed. We analyzed features of clinical course and treatment of HIV-associated tuberculosis in prison conditions. Possible increase of tuberculosis has been marked due to HIV-infected prisoners and the need for HIV check for patients entering for examination and treatment concerning tuberculosis.

Keywords: HIV-associated tuberculosis, the prison tuberculosis, tuberculosis treatment.

В настоящее время эпидемическая ситуация как по туберкулезу, так и по ВИЧ-инфекции остается тревожной и необходима дальнейшая интенсификация специализированной медицинской помощи приоритетно в группах повышенного риска среди населения с учетом сочетания этих инфекции [1,2]. Эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулёзом в учреждениях пенитенциарной системы Российской Федерации медленно улучшается, однако необходима дальнейшая интенсификация противоэпидемических и лечебных мероприятий с учетом конкретных условий [5,6,7]. В настоящее время в патоморфозе и эффективном лечении туберкулёза важное место занимает наличие у больного ВИЧ-инфекции [3]. Достижение клинического излечения больного туберкулёзом путем его эффективного лечения является одной из главных задач и наряду с заболеваемостью является одним из основных показателей выполнения целевых программ, реализация которых в учреждениях ФСИН имеет свои особенности при сравнении с лечением больных в условиях областных противотуберкулёзных диспансеров [4].

Цель исследования – оценка эффективности специализированной медицинской помощи больным ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в пенитенциарных условиях при использовании стандартных режимов антибактериальной терапии и возможные пути её повышения.

Материалы и методы исследования. После реализации Федеральной Целевой Программы (ФЦП) «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007–2012 гг.» и дальнейшего выполнения Национального проекта «Здоровье» в течение трех лет в пенитенциарных условиях учреждений ФСИН наблюдаются больные различными формами, в том числе и ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (ВИЧ-ТБ). Больные обследовались по общепринятым стандартам, включая молекулярно-генетические методы определения свойств возбудителя туберкулеза (МБТ). При лечении в интенсивной фазе основного курса использовали стандартные режимы антибактериальной и антиретровирусной (АРВТ) терапии.

Результаты исследования. В течение наблюдения группы риска, ВИЧ-инфицированные, в пенитенциарных учреждениях ФСИН области медленно увеличивается, составляя 2,04% - 2,68% - 2,77% и 3,95% контингентов осужденных. В тоже время общее количество осужденных и лиц, находящихся под следствием в местах лишения свободы (м.л.с.), за этот же период сократилось почти на 10%.

За этот же период, в этих же пенитенциарных учреждениях было выявлено 20, 29, 38 и за первые 9 месяцев последнего года 31 впервые ВИЧ-инфицированных (заболевших), при этом преимущественно среди находившихся в СИЗО (68,64%). В тоже время количество больных туберкулезом, нуждающихся в проведении основного курса лечения, хотя и не стабильно (91 – 107 – 81 и 63), но все же прослеживается тенденция к снижению болезненности. И несколько по иному рассматривается динамика больных ВИЧ-ТБ - 4 больных (клиническое излечение достигнуто у 2 и один больной умер – 5 (клиническое излечение достигнуто у 4) – 3 (клиническое излечение достигнуто лишь у одного) - 6 (клиническое излечение достигнуто у 2 и 1 умер).

Для наглядности особенностей лечения приведем клинический случай.

Осужденный П. 38 лет, в анамнезе 16 лет назад бытовая травма на уровне L₅ с незначительным парапарезом нижних конечностей, микролитиаз, наложена эпицистостома. Вирусный гепатит «С» у больного диагностирован 5 лет назад и тогда же при пребывании в СИЗО выявлена ВИЧ-инфекция. АРВТ не получал. Аллергоанамнез не отягощён. Стойкая утрата трудоспособности, признан инвалидом II группы. Ранее туберкулезом не болел. При профилактическом осмотре в МСЧ-4 флюорографическим методом выявлены изменения в лёгких, был направлен на дообследование и лечение в туберкулёзное легочное отделение. Диагностирован очаговый туберкулёз верхней доли правого лёгкого, МБТ(–), ГДУ IА и начато лечение в интенсивной фазе третьего стандартного режима химиотерапии (изониазид-0,6; пиразинамид-2,0; этамбутол-1,6; рифабутин-0,6). Уровень CD4 0,765 мм³, уровень CD8 > 2,0 мм³, CD4/ CD8 0,38 (от 17.03.16г.).

Консультирован врачом-инфекционистом 19.04.2016г.: ВИЧ стадия 3, хр. вирусный гепатит «С», рекомендовано продолжить антиретровирусную терапию (АРВТ). Больной от АРВТ отказался.

На фоне лечения 4 противотуберкулезными препаратами в течение 5 месяцев у больного, несмотря на приверженность лечению и отсутствию самовольного прерывания этиотропной химиотерапии, отмечалась отрицательная клинико-рентгенологическая динамика с формированием инфильтративного туберкулеза верхней доли правого лёгкого, нарастание симптомов интоксикации. Больной абациллирован весь период лечения. Повторно консультирован врачом-инфекционистом: ВИЧ стадия 4Б, хр. вирусный гепатит «С», рекомендовано срочное начало АРВТ. Больной согласился на АРВТ и начато лечение ламивудин 0,3, олитид 0,6, регаст 0,6. С учётом сопутствующей патологии изменен режим этиотропной терапии: изониазид-0,6; пиразинамид-2,0; этамбутол-1,6; рифабутин-0,6, амикацин 1,0 в/м (N.60), ПАСК-9,0, витаминотерапия, гепатопротекторы.

В результате отмечается улучшение состояния больного и невыраженная тенденция к формированию туберкуломы. В настоящее время прогноз для выздоровления – благоприятный, не исключено использование хирургических методов лечения.

Анализируя данные о пораженности и особенностях как клинического течения, так и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулёза в пенитенциарных условиях, в целом возможно рекомендовать некоторые конкретные противоэпидемические мероприятия для предупреждения распространения сочетанной патологии в контингентах ФСИН области м.

Приоритетно в этой группе риска необходимо обязательное обследование при наличии у наблюдаемых малейших подозрительных на туберкулёз симптомов, помимо обязательного профилактического осмотра 1 раз в полгода. Использовать лабораторные методы обнаружения ВИЧ-инфекцию при обследовании пациентов, поступающих на обследование и лечение по поводу туберкулёза, если такая проверка не проводилась или сроки предыдущей проверки более одного года.

Обязательное наблюдение ВИЧ-инфицированных больных, у которых подтверждён диагноз туберкулёз, врачом инфекционистом и при наличии у таких больных клинико-лабораторных показаний, обязательное назначение АРВТ. При отказе больного от АРВТ – обязательная фиксация данного факта в медицинской документации (истории болезни). Повторное предложение АРВТ больному через месяц или чаще, в зависимости от его состояния.

Лечение туберкулеза в соответствии с Приказом МЗ РФ №951, при отрицательной клинико-рентгенологической динамике туберкулёзного процесса – коррекция противотуберкулёзного курса химиотерапии решением центральной врачебной контрольной комиссии (ЦВКК) с учетом состояния больного и переносимости им химиотерапии.

После клинического излечения, для профилактики возможного рецидива целесообразно вне зависимости от выраженности остаточных изменений расценивать их как большие и наблюдать ВИЧ-инфицированных, перенесших туберкулёз, в третьей группе диспансерного учёта врачом-фтизиатром в течение трех лет.

Список литературы

1. Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г: Доклад Секретариата Исполнительного комитета ВОЗ. Сто тридцать четвертая сессия EB134/12 29.11.2013. - 35 с.
2. Глобальный доклад: Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2013. - «ЮНЭЙДС/ JC2417R». - 298 с.
3. Коломиец В.М., Гусева В.А., Рублева Н.В., Шахова Ю.И. Особенности клинического течения и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. - №1. С.142-147.
4. Коломиец В.М. Пенитенциарный туберкулез: патоморфоз и эффективность реабилитации // В.М.Коломиец. – Курск: 2014. 248 с.
5. Нечаева О.Б., Белиловский Е.М., Загдын З.М., Щукина И.В. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации //Туберкулез в Российской Федерации, 2012/2013/2014 гг. Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации и в мире. – М., 2015. – С. 177-192
6. Рачина Н.В., Коломиец В.И., Гольев С.С., Пивень П.П. Оценка эффективности оказания специализированной медицинской помощи при туберкулезе в пенитенциарных учреждениях.//Туберкулез и болезни легких.- 2015. -№5. – С.157-158.
7. Фролова О.П. Эпидемическая ситуация по туберкулезу среди больных ВИЧ-инфекцией в России и система мер его профилактики //Проблемы туберкулеза. – 2001. - №5. – С. 31-34

КЛИНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ВИЧ-НЕГАТИВНЫХ И ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Гопоняко С.В.¹, И.В.Буйневич¹, М.А.Юденко¹, А.А.Холявкин²

УО «Гомельский государственный медицинский университет»¹

У «Гомельская областная клиническая туберкулезная больница»²

г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация. С целью оценить результаты клинического мониторинга мультирезистентного туберкулеза легких у ВИЧ - позитивных и ВИЧ - негативных пациентов, переведенных на паллиативное лечение, изучены клинические данные и результаты мониторинга мультирезистентного туберкулеза легких у 45 ВИЧ - позитивных 123 ВИЧ - негативных пациентов, переведенных на паллиативное лечение. Отмечено преобладание клинических форм с подострым течением и вторичной лекарственной устойчивостью микобактерии туберкулеза, в течение первых 12-18 месяцев наблюдения у абациллированных пациентов возобновление бактериовыделения, как правило, не происходит.

Ключевые слова: лекарственно устойчивый туберкулез, паллиативное лечение

Clinical monitoring of multi-drug resistant pulmonary tuberculosis in HIV-positive and HIV-negative palliative care patients.

Goponyako S.V., Buinevich I.V., Yudenko M.A., Kholiavkin A.A.

Gomel State Medical University¹

Gomel regional in-patient TB hospital ²

Gomel, Republic of Belarus

Abstract. In order to evaluate clinical monitoring data in palliative care patients with multi-drug resistant pulmonary tuberculosis, we analyzed monitoring data in 45 HIV-positive and 123 HIV-negative patients with multi-drug resistant pulmonary tuberculosis who had stopped pursuing cure and started palliative treatment. Subacute forms of tuberculosis and secondary drug resistance were found to predominate in palliative care patients. In smear and culture negative patients sputum analyses as a rule did not reverse within the first 12-18 months of observing.

Keywords: drug resistant TB, palliative treatment.

Мультирезистентный туберкулез (устойчивостью возбудителя к изониазиду и рифампицину) является глобальной проблемой наших дней. По оценкам ВОЗ, доля туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) составляет около 3,3% от числа новых случаев и 20% от числа ранее леченных пациентов, причем у 9,7% пациентов с МЛУ-ТБ определяется также устойчивость микобактерии туберкулеза (МБТ) к

нескольким противотуберкулезным лекарственным средствам (ПТЛС) резервного ряда – респираторными фторхинолонами и амикацину/канамицину/капреомицину, т.е. широчайшая лекарственная устойчивость (ШЛУ). Согласно данным ВОЗ, не более половины пациентов с МЛУ-ТБ проходят успешное лечение. Невозможность эффективного этиотропного лечения туберкулеза вынуждает переводить пациентов на паллиативное лечение. Являясь значительной частью резервуара лекарственно устойчивой инфекции, данная категория пациентов требует тщательного мониторинга.

В Республике Беларусь первичная МЛУ определяется у 34% впервые заболевших туберкулезом легких, ШЛУ – у 4% пациентов из числа новых случаев. Среди ранее леченых пациентов вторичная МЛУ возбудителя определяется в 69% случаев. Показатель успешности лечения МЛУ-ТБ в Республике Беларусь в 2015 году составил 54% при объеме когорты более 2500 случаев. Имеющиеся на настоящий момент данные мониторинга позволяют проанализировать закономерности течения заболевания у данной категории пациентов.

С целью изучения данных клинического мониторинга М/ШЛУ-ТБ у ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных пациентов, переведенных на паллиативное лечение, в первые 12-18 месяцев наблюдения были проанализированы медицинские карты стационарных и амбулаторных пациентов, карты лечения пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом, а также данные государственного регистра «Туберкулез».

В исследуемую группу включены 168 пациентов, переведенных на паллиативное лечение в 2014-2015 годах в Гомельской области (141 мужчина и 27 женщин). Первичная М/ШЛУ определялась у 14 пациентов, вторичная М/ШЛУ – у 154 пациентов. ВИЧ- негативный статус имели 123 пациента ВИЧ-позитивный – 45 пациентов. Средний возраст пациентов мужского пола составил $44,9 \pm 10,3$ года, женского – $38,8 \pm 7,2$ лет. Изучены клинические данные – клинико-рентгенологическая форма туберкулеза легких, наличие бактериовыделения, определяемого бактериоскопическим и культуральным методами, спектр лекарственной устойчивости МБТ на момент перевода пациентов на паллиативное лечение (МЛУ, пре-ШЛУ, ШЛУ) и возможность подбора индивидуальной схемы химиотерапии, данные клинического мониторинга в течение 12-18 месяцев.

При проведении исследования Обработка результатов проведена при помощи программы Statistica 6, использованы стандартные методы описательной статистики (вычисление среднего значения и его стандартной ошибки, стандартного отклонения, 95% доверительного интервала – ДИ). Для оценки значимости различий использовали t-критерий Стьюдента, различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

В клинической структуре заболевания как у ВИЧ-позитивных, так и у ВИЧ-негативных пациентов (на момент перевода на паллиативное лечение) значительно преобладали формы с подострым течением ($n=148$), доля

составила 86,3% (95% ДИ 80,1-91,1): инфильтративный туберкулез составил 64,3% (95% ДИ 56,5-71,5), диссеминированный туберкулез – 16,7% (95% ДИ 11,3-23,1), другие формы – 5,4% (95% ДИ 2,4-9,9). Пациенты с хроническими формами туберкулеза (n=20) составили только 11,9% (95% ДИ 7,4 – 17,7) – у подавляющего большинства из них (19 из 20 пациентов) сформировался фиброзно-кавернозный туберкулез. Ни одна из форм ВИЧ-ассоциированного туберкулеза (ВИЧ-ТБ) не была хронической, в остальном клиническая структура заболевания у ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов статистически не отличалась ($p<0,05$).

Доля пациентов с первичной лекарственной устойчивостью МБТ составила 8,3% (95% ДИ 4,6-13,6), со вторичной – 91,7% (95% ДИ 86,4-95,4). Из их числа у 16,6% (95% ДИ 20,8-48,1) изначально определялась ШЛУ, в связи с чем назначение эффективной комбинации ПТЛС было невозможным. У остальных 83,3% (95% ДИ 51,5-97,9) пациентов в равных долях определялась или МЛУ, или пре-ШЛУ, и имелась возможность подбора индивидуальной схемы лечения.

Из числа пациентов со вторичной лекарственной резистентностью МБТ 96,1% (95% ДИ 91,7-98,5) до момента перевода на паллиативное лечение получили курс химиотерапии той или иной продолжительности. Из их числа 35,1% (95% ДИ 28,7-44,7) пациентов были переведены на паллиативное лечение после одного неэффективного курса ПТЛС, 36,4% (95% ДИ 28,7-44,7) – после повторного неэффективного курса (дважды была зафиксирована неудача в лечении), 23,6% (95% ДИ 17,0-31,3) – после отрыва от лечения, кроме этого, 4,7% (95% ДИ 1,9-9,5) пациентов относились к категории «другие» (прибывшие и пр.). Следует отметить, что у всех пациентов на фоне предшествовавших переводу на паллиативное лечение курсов химиотерапии имела место амплификация лекарственной устойчивости МБТ. Возможность подбора индивидуальной схемы ПТЛС сохранялась у 42,5% (95% ДИ 34,2-54,1) пациентов (определялась МЛУ или пре-ШЛУ).

В целом у 49,4% (95% ДИ 41,6-57,2) пациентов с учетом сохранившейся чувствительности МБТ было возможно продолжение этиотропного лечения. Причиной прекращения химиотерапии в 93,9% (95% ДИ 91,1-97,8) случаев явилось отсутствие у пациентов приверженности лечению (отказ от лечения), лишь у незначительной части пациентов имелись медицинские противопоказания.

На момент перевода на паллиативное лечение 32,1% пациента (95% ДИ 25,1-39,7), частично получившие курс химиотерапии, были абациллированы по результатам бактериоскопии и посева (в том числе один случай с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких). Из числа абациллированных пациентов 70,3% (95% ДИ 56,3-82,0) имели ВИЧ-негативный и 29,6% (95% ДИ 17,9-43,6) пациентов ВИЧ-позитивный статус. По результатам мониторинга возобновление бактериовыделения в течение 6 месяцев было выявлено у 5,5% (95% ДИ 1,1-15,3) пациентов (все с инфильтративным ТБ, ВИЧ-негативны), при этом в 3,7% (95% ДИ 0,4-1,2) случаев бактериовыделение определялось как

методом бактериоскопии, так и методом посева, а в 1,8% (95% ДИ 0,04-9,8) – только методом посева. Через 12 и 18 месяцев у обследованных пациентов новых случаев возобновления бактериовыделения выявлено не было, в том числе пациент с фиброзно-кавернозным туберкулезом также оставался абациллярным. Доля пациентов, у которых на момент перевода на паллиативное лечение бактериовыделение определялось только методом посева, составила 33,3% (95% ДИ 26,2-41,0), из них 67,8% (95% ДИ 54,0-79,7) имели ВИЧ-негативный статус, 32,1% (95% ДИ 20,2-45,9) – ВИЧ-позитивный. У 23,2% (95% ДИ 12,9-45,9) из этих пациентов уже в первые 6 месяцев мазок мокроты вновь стал положительным, при этом доля таких пациентов через 12 месяцев практически не изменилась. Частота и сроки возобновления бактериовыделения у ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов статистически не различались ($p>0,05$).

По итогам наблюдения в первые 12-18 месяцев смертность от туберкулеза в изучаемой группе составила 9,5% (95% ДИ 5,5-15,0). Кроме этого, у 2,3% (95% ДИ 0,6-5,9) причиной смерти явилась ВИЧ-инфекция, что составило 8,8% (95% ДИ 2,4-12,2) от числа пациентов с ВИЧ-ТБ. Уровень летальности у ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных пациентов статистически не различался ($p>0,05$).

Таким образом, получены следующие результаты мониторинга:

1. В структуре заболевания у пациентов, переведенных на паллиативное лечение, преобладают формы туберкулеза легких с подострым течением.

2. У подавляющего большинства пациентов, переведенных на паллиативное лечение, лекарственная устойчивость МБТ является вторичной, причем спектр резистентности расширяется в процессе неэффективных курсов лечения.

3. Практически у половины пациентов изучаемой группы – у 49,4% (95% ДИ 41,6-57,2) –сохранялась возможность подбора индивидуальной схемы ПТЛС, и причиной прекращения химиотерапии является отсутствие приверженности лечению.

4. Около трети пациентов на момент перевода на паллиативное лечение бактериовыделение не определялось ни методом бактериоскопии, ни посевом мокроты – лишь у небольшой части таких пациентов бактериовыделение возобновлялось в первые 6-12 месяцев. При сочетании отрицательного мазка мокроты с положительным посевом на МБТ массивность бактериовыделения почти у четверти пациентов возрастала уже в первые 6 месяцев. Частота и сроки возобновления бактериовыделения у ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов статистически не различались ($p>0,05$).

5. Смертность от туберкулеза в первые 12-18 месяцев наблюдения у пациентов, переведенных на паллиативное лечение, составила 9,5% (95% ДИ 5,5-15,0), уровень летальности у ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных пациентов в первый год наблюдения статистически не различался ($p>0,05$).

Список литературы

1. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data [Electronic resource]: Global tuberculosis report 2015. 20th edition. – Mode of access: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_eng.pdf?ua=1. – Date of access: 3.06.2016.
2. Холявкин, А.А. Лечение пациентов с МЛУ-ТБ в Гомельской области, 2009-2010 гг. / А.А. Холявкин, Д. Фальзон, Г.Л. Гуревич, Д.А. Климук, А.С. Ширяев, В.З. Русович, Е.М. Скрыгина // Современные проблемы диагностики и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза: Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы мультирезистентного туберкулеза в Беларуси и пути их решения», Минск, 10-11 окт. 2013 г. / ред. коллегия: Г.Л. Гуревич (председатель) [и др.]. – 2013. – С. 195-198.
3. Бондаренко, В.Н. Оценка эффективности лечения туберкулёза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью / В.Н. Бондаренко, М.А. Юденко, И.В. Буйневич, А.А. Холявкин // Актуальные проблемы туберкулёза: Материалы 5 межрегиональной научно-практической и учебно-методической конференции с международным участием под общей ред. А.В. Асеева. – Тверь, 2016. – С. 50-56.
4. Primary drug resistance of mycobacterium tuberculosis in HIV-positive patients [Электронный ресурс] / N. Burinsky, V. Bondarenko, I. Buynevich, A. Holyavkin, S. Goponyako. – Режим доступа: <http://www.ers-education.org/events/international-congress/london-2016.aspx?idParent=151703>. – Дата обращения: 12.10.2016.

ОСОБЕННОСТИ ДАННЫХ МРТ И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Демчило А.П., Красавцев Е.Л., Козорез Е.И.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация. Изучены особенности данных МРТ и клиническая картина при поражении головного мозга у 51 ВИЧ-инфицированных пациентов.

Диагноз токсоплазмоза устанавливался на основании результатов магнитно-резонансного сканирования головного мозга и подтверждён обнаружением Ig G к токсоплазмам в сыворотке крови с помощью ИФА. Клиническая картина характеризовалась проявлением множественных поражений мозга — очаговой неврологической симптоматикой, поражением сенсорной системы, атаксией, дисметрией, нарушениями когнитивной функции.

Диагноз ПМЛ устанавливался на основании клинической картины (жалобы на слабость, головную боль, нарушение речи, головокружение, заторможенность, плохую память, шаткость при ходьбе, онемение конечностей, нарушение координации движений, дезориентацию, галлюцинации, снижение зрения, потери сознания) и результатов магнитно-резонансного сканирования головного мозга.

При поступлении пациентов с неуточненным диагнозом отмечались жалобы на слабость, головную боль, головокружение, смазанность речи, онемение конечностей. Среднее значение CD4 составило 505,3 клеток/мкл, (ИКР 373 – 442), что достоверно выше, чем при токсоплазмозе ($p < 0,05$). Объективно неврологическая симптоматика была не выражена. По данным МРТ дифференцировка образований в головном мозге затруднена.

MRI FEATURES and clinical PICTURE of BRAIN LESIONS in HIV-infected.

Demchilo A.O., Handsome E.L., Kozorez E.I.

Gomel State Medical University,
Gomel, Republic of Belarus

Abstract. Studied features data MRI and clinical picture of the impact of the brain near the 51 HIV-infected patients.

Diagnosis of toxoplasmosis is installed based on the results of the MRI scan of the brain and confirmed the discovery of Ig G to toksoplazmam in serum using ELISA. The clinical picture was characterized by the expression of multiple lesions of the brain — focal neurological symptoms, lesions of the sensory system, ataxia, impaired cognitive function, dismetriej.

Diagnosis of PML is installed based on the clinical picture (complaints of weakness, headache, impaired speech, dizziness, lethargy, poor memory,

Unsteadiness in walking, numbness of limbs, impaired coordination, disorientation, hallucinations, decreased vision, loss of consciousness) and the results of the MRI scan of the brain.

When enrolling patients with unconfirmed diagnosis there were complaints of weakness, headache, dizziness, slurring speech, numbness of the extremities. The average value of CD4 cells/ μ l 505.3 amounted (IQR 373-442), that higher than toxoplasmosis ($r < 0.05$). Objectively neurological symptomatology was not expressed. According to the MRI differentiation of entities in the brain is complicated.

Поражение центральной нервной системы (ЦНС) у ВИЧ-инфицированных пациентов встречается в 30–90% случаев. У 40–90% из них заболевание проявляется психической или (и) неврологической симптоматикой, которая становится очевидной, как правило, в терминальном периоде развития заболевания. Изменения головного мозга у ВИЧ-инфицированных могут быть обусловлены различными факторами, такими как оппортунистические инфекции, опухолевым процессом, цереброваскулярными заболеваниями, демиелинизирующим процессом, а также непосредственным действием вируса иммунодефицита, причём поражения ЦНС могут развиваться как одновременно с ВИЧ-инфекцией, так и спустя некоторое время после инфицирования. Оппортунистические инфекции у больных СПИДом встречаются наиболее часто (примерно у 30% больных). К ним относятся токсоплазмоз, герпетическая, цитомегаловирусная, криптококковая, туберкулезная инфекции. Однако клинические проявления поражения головного мозга при СПИДе в большей степени зависят от локализации изменений в ЦНС, чем от этиологии.

Основными наиболее информативными методами нейровизуализации в настоящее время являются рентгеновская компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако, при КТ диагностике СПИДа, как правило, или не выявляется каких либо изменений со стороны вещества головного мозга, или обнаруживается лёгкая атрофия с участками пониженной плотности в белом веществе. МРТ отличается более высокой чувствительностью и базируется, прежде всего, на оценке прямых признаков патологического процесса и характера усиления сигнала.

Токсоплазменный энцефалит является наиболее распространенной оппортунистической инфекцией ЦНС у больных СПИДом и без специфической терапии приводит к летальному исходу. Антимикробную терапию назначают эмпирически. Улучшение у 85% больных наступает уже через 2 недели лечения, но рентгенологическая картина начинает меняться только через 4–6 недель. Если улучшения нет, возможен другой диагноз, в первую очередь — лимфома головного мозга. Лимфома встречается у 2–15% случаев, характеризуется неспецифической картиной, зависящей от локализации образования. Отсутствие четкого клинического улучшения через 2 недели и положительного эффекта по результатам контрольной МРТ

через 4 недели от начала эмпирической терапии токсоплазмоза, отсутствие антител класса IgG к *T.gondii* в крови и, возможно, наличие высокой концентрации ДНК ВЭБ в ликворе может свидетельствовать в пользу лимфомы.

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) встречается примерно у 5% больных СПИДом. Не существует средств с доказанной эффективностью для лечения ПМЛ. После появления первых симптомов ПМЛ прогрессирование неизбежно и летальный исход наступает не позднее 6 месяцев. Описаны единичные случаи некоторого улучшения на фоне антиретровирусной терапии. Примерно в 20% случаев причина поражения ЦНС остается нерасшифрованной. Посмертная расшифровка природы патологических изменений в головном мозге у больного ВИЧ-инфекцией только по морфологическим данным также затруднена.

Цель работы: изучить особенности данных МРТ и клиническую картину при поражении головного мозга у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Материалы и методы: истории болезни 51 пациента с ВИЧ-ассоциированным поражением головного мозга, проходивших лечение Гомельской областной инфекционной клинической больницы в 2013–2015 гг.. Среди пациентов были 26 женщин и 25 мужчин в возрасте от 27 до 56 лет. У всех пациентов установлена 4 клиническая стадия ВИЧ-инфекции (по классификации ВОЗ 2012г). Длительность ВИЧ-инфекции у данных пациентов достоверно определить невозможно, т.к. инъекционный путь и время инфицирования указаны только у 12 пациентов, а у 16 пациентов (31,4%) ВИЧ-инфекция впервые установлена на 4 клинической стадии при выявлении поражения головного мозга. Уровень CD4 был определен 49 пациентам, среднее значение составило 138 клеток/мкл, (ИКР 30,5 – 163). Доля пациентов с уровнем CD4 менее 100 кл/мкл составила 60,4%. Антиретровирусную терапию получали 17 пациентов, еще 30 пациентам АРТ была назначена во время пребывания в стационаре. Синдрома реконструкции иммунной системы после назначения АРТ не было.

Пациентам были поставлены следующие диагнозы: токсоплазмоз головного мозга — у 28 пациентов (54,9%), ПМЛ — у 12 пациентов (23,5%), лимфома головного мозга — у 3 пациентов (5,9%), криптококковый менингит — у 1 пациента (1,9%), менингоэнцефалит неуточненной этиологии — у 1 пациента (1,9%). У 6 пациентов (11,7%) диагноз был не уточнен: токсоплазмоз / лимфома?, токсоплазмоз / ПМЛ?, токсоплазмоз / ЦМВ-энцефалит, токсоплазмоз / лимфома? / ПМЛ?

Результаты исследования и их обсуждение. Для сравнения пациенты были разделены на 3 группы: с токсоплазмозом головного мозга, с ПМЛ и пациенты с неуточненным диагнозом.

Диагноз токсоплазмоза устанавливался на основании результатов магнитно-резонансного сканирования головного мозга и подтвержден обнаружением Ig G к токсоплазмам в сыворотке крови с помощью ИФА. Также в сомнительных случаях, при невозможности достоверно

дифференцировать токсоплазмоз и другие поражения головного мозга, одним из критериев установления диагноза был выраженный положительный эффект от пробного лечения ко-тримоксазолом. Среднее значение CD4 составило 77,5 клеток/мкл, (ИКР 19 – 81). Доля пациентов с уровнем CD4 менее 100 кл/мкл составила 75%.

При поступлении пациенты предъявляли жалобы на слабость, головную боль, головокружение, заторможенность, апатию, плохую память, шаткость при ходьбе, онемение конечностей, нарушение координации движений. При обследовании выявлялись выраженные нарушения когнитивной функции, моторная афазия — расстройство продукции речи в связи с поражением головного мозга при сохранении артикуляционного аппарата, гемипарезы, поражение сенсорной системы, атаксия — нарушение согласованности движений различных мышц при условии отсутствия мышечной слабости, движения были неловкими, неточными, нарушалась их преемственность и последовательность, равновесие при стоянии и ходьбе. Характерна была также дисметрия — нарушение координации движений вследствие утраты чувства расстояния, соразмерности и точности двигательных актов. Движения больных размашистые, увеличены в объеме, недостаточно точны, нарушен почерк вплоть до невозможности писать. Данные клинические симптомы являются проявлением множественных поражений мозга.

С помощью МРТ в различных областях головного мозга (в лобной доле, височно-теменной области свода черепа, в затылочной доле, в ножке мозга, в белом веществе мозга на уровне заднего рога левого бокового желудочка, на уровне базальных ядер, в гемисферах мозжечка, в таламусе, серпе) определяли наличие множественных полиморфных разновеликих полостных образований чаще кольцевидной формы с гетерогенным содержимым диаметром от 7 мм до 43 мм. В режиме T2-ВИ очаги гиперинтенсивные, на T1-ВИ — гипоинтенсивные. Контур очагов неровные, но достаточно четкие. Перифокальный отек вокруг образований был достаточно выраженным — до 120 мм. Вследствие больших размеров образований у 5 пациентов имелось смещение срединных структур, компрессия желудочков головного мозга.

Всем пациентам была назначена комбинация сульфаметоксазола и триметоприма (ко-тримоксазол) в дозировке 20 мг/кг массы тела по триметоприму. Курс лечения: 21 день высокодозная терапия, в дальнейшем — пожизненный прием поддерживающей дозы ко-тримоксазола по 2 таблетки 2 раза в день ежедневно. Положительная динамика практически у всех больных наблюдалась уже через 2 недели лечения в виде улучшения памяти, координации движений, уменьшении выраженности парезов. Только одна пациентка с токсоплазмозными абсцессами в базальных структурах и теменной доле выписана для паллиативного лечения на амбулаторном этапе.

Диагноз ПМЛ устанавливался на основании клинической картины и результатов магнитно-резонансного сканирования головного мозга. Среднее

значение CD4 составило 118,7 клеток/мкл, (ИКР 44,5 – 125,75). При поступлении пациенты предъявляли жалобы на слабость, головную боль, нарушение речи, головокружение, заторможенность, плохую память, шаткость при ходьбе, онемение конечностей, нарушение координации движений, дезориентацию, галлюцинации, снижение зрения, потери сознания. При обследовании также, как и при токсоплазмозе, выявлялись выраженные нарушения когнитивной функции, контакт с некоторыми пациентами был затруднен. Более выраженными были гемипарезы.

С помощью МРТ в различных областях головного мозга определяли небольшие гиперинтенсивные на T2-ВИ, гипоинтенсивные на T1-ВИ очаги с неровными контурами. В отличие от токсоплазмозных очагов не были выявлены перифокальный отек и смещение срединных структур.

При поступлении пациентов с неуточненным диагнозом отмечались жалобы на слабость, головную боль, головокружение, смазанность речи, онемение конечностей. Среднее значение CD4 составило 505,3 клеток/мкл, (ИКР 373 – 442), что достоверно выше, чем при токсоплазмозе ($p < 0,05$). Объективно неврологическая симптоматика была не выражена. По данным МРТ дифференцировка образований в головном мозге затруднена. Возможно, это связано с тем, что данные изменения были выявлены в ранней стадии или с другим генезом поражения ЦНС (токсические, сосудистые поражения).

Выводы: Токсоплазмоз головного мозга является наиболее распространенной оппортунистической инфекцией ЦНС у ВИЧ-инфицированных пациентов. Диагноз токсоплазмоза устанавливался на основании результатов магнитно-резонансного сканирования головного мозга и подтвержден обнаружением Ig G к токсоплазмам в сыворотке крови с помощью ИФА. Клиническая картина характеризуется проявлением множественных поражений мозга — очаговой неврологической симптоматикой, поражением сенсорной системы, атаксией, дисметрией, нарушениями когнитивной функции. Диагноз ПМЛ устанавливался на основании клинической картины (жалобы на слабость, головную боль, нарушение речи, головокружение, заторможенность, плохую память, шаткость при ходьбе, онемение конечностей, нарушение координации движений, дезориентацию, галлюцинации, снижение зрения, потери сознания) и результатов магнитно-резонансного сканирования головного мозга. При поступлении пациентов с неуточненным диагнозом отмечались жалобы на слабость, головную боль, головокружение, смазанность речи, онемение конечностей. Среднее значение CD4 у этих пациентов составило 505,3 клеток/мкл, (ИКР 373 – 442), что достоверно выше, чем при токсоплазмозе ($p < 0,05$). Объективно неврологическая симптоматика была не выражена. По данным МРТ дифференцировка образований в головном мозге затруднена.

Список литературы

1. Мельничук, П.В., Шульман, Д.Р. Неврологические проявления ВИЧ-инфекции. Болезни нервной системы / П.В. Мельничук, Д.Р. Шульман. – М., Медицина, 2003. – С.399–408.
2. Покровский, В.В. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство / В. В. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 608 с.
3. Распространение токсоплазмоза и методы его лабораторной диагностики / Т.П. Пашина, Г.М. Напалкова, И.И. Корсакова, В.В. Мананков // Мед. Паразитология и паразитарные болезни. – 2005. – №1. – С.51-54.
4. Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни: национальное руководство / Н. Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – М.: GEOTAR-Media, 2009. – 1056 с.

ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА НА ТЕЧЕНИЕ ПОЗДНЕЙ КОЖНОЙ ПОРФИРИИ

Есипова Е.А., Харахордина Ю.Е.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Курск, Россия**

Аннотация. Влияние вирусного гепатита на течение поздней кожной порфирии

Поздняя кожная порфирия относится к редким заболеваниям. В последние годы все большее внимание, уделяется вирусному гепатиту как фактору, провоцирующему позднюю кожную порфирию. Ввиду полиэтиологичности порфирии особенно важно выявление специфики течения данного заболевания.

Ключевые слова: поздняя кожная порфирия, вирусный гепатит

IMPACT OF VIRAL HEPATITIS ON THE COURSE OF LATER DERMAL PORPHYRIA

Esipova E. A., Kharakhordina J. E.

Kursk State Medical University,
Kursk, Russia

Abstract. Influence of viral hepatitis on the course of porphyria cutanea tarda.

Porphyria cutanea tarda is a rare disease. Recently increasing attention is paid to viral hepatitis as a factor provoking the porphyria. Is particularly important to identify the specifics of the course of porphyria due the polyetiology of the disease.

Keywords: late cutaneous porphyria, viral hepatitis.

Актуальность изучаемой проблемы: поздняя кожная порфирия относится к редким заболеваниям с наследственной предрасположенностью. По данным статистики, поздняя кожная порфирия чаще других порфирий регистрируется в России. Начиная с 70-х годов в различных регионах России констатируется увеличение количества больных поздней кожной порфирией, а в общей патологии эта форма занимает значительный удельный вес, составляя в среднем от 2,0 до 4, 0 на 100000 населения. По данным Doss, у 10-13% больных с активно протекающим хроническим гепатитом и циррозом формируются специфические для поздней кожной порфирии нарушения порфиринового обмена. В последние годы все большее внимание, уделяется вирусному гепатиту как фактору, провоцирующему позднюю кожную порфирию.

Ввиду полиэтиологичности заболевания особенно важно выявление специфики течения поздней кожной Порфирии.

Вирусный гепатит в качестве исследуемого этиологического фактора выбран не случайно. Данное заболевание не только чаще остальных факторов ведет к развитию поздней кожной порфирии у лиц с наследственной предрасположенностью, но и является актуальной проблемой для города Курска и Курской области, поскольку согласно данным статистики за 2015 год Курская область входит в десятку регионов в Центральном Федеральном округе по показателям заболеваемости вирусными гепатитами.

Цель исследования: изучение особенностей течения, выявление особенностей клинических проявлений и лабораторных показателей больных поздней кожной порфирией с вирусом гепатита в анамнезе.

Материалы и методы исследования: были проанализированы истории болезни 9 пациентов, находившихся на стационарном лечении в ОБУЗ "Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер в период с 2010 по 2015 год с диагнозом: «Поздняя кожная порфирия.», пациенты были разделены на две группы, первая группа - 4 пациента формировалась на основании отсутствия в анамнезе вирусного гепатита, вторая группа включала 5 пациентов с вирусным гепатитом в анамнезе.

Результаты исследований: на основании проведенного анализа получены следующие данные: средний возраст больных в первой и второй группах составил 58 лет и 53,4 года соответственно. Длительность пребывания больных в стационаре составила 11,25 койко-дней в первой группе и 13,8 койко-дней во второй. Клинические проявления в первой группе носили генерализованный характер у 25% пациентов, а во второй у 60%. Локальный характер высыпаний выявлен у 75% больных в первой группе и 40% – во второй. Сопутствующая патология выявлена у 100% больных. Все пациенты второй группой больны вирусным гепатитом. Хронический гломерулонефрит выявлен среди пациентов второй группы в первой возрастной группе в 40% случаев. Хронический катаральным бронхитом страдает 33,3% больных во второй группе, туберкулез был выявлен у 50% пациентов первой группы. В результате изучения лабораторных показателей получены следующие данные: лейкоцитоз выявлен у 25% больных в первой группе и у 60% больных во второй, что на 35% больше, относительно первой группы. Лейкоцитопения и анемия отмечается в 20% случаев во второй группе. Увеличение СОЭ выявлено единично в первой группе, что составило 25% от всех пациентов, во второй группе данный показатель составил 100%. Увеличение показателей АлТ и АсТ обнаружено как в первой, так и во второй группах в 25% и 40% случаев соответственно.

Выводы: по результатам исследований можно сделать следующие выводы: возрастной и половой специфики во второй группе обнаружено не было. Анализ длительности пребывания больных в стационаре дает право достоверно утверждать, что пациентам второй группы необходимо больше

времени на лечение, что может обуславливать более тяжелое течение болезни, относительно первой группы. Данное утверждение подтверждают и клинические проявления, носившие во второй группе в большинстве случаев генерализованный характер, тогда как в первой группе чаще имели место локальные высыпания. Как известно, в результате нарушения обмена порфиринов поражаются не только кожные покровы, но и внутренние органы и системы. Наличие подобных поражений может определять степень проявления и тяжесть течения заболевания. О более тяжелом течении поздней кожной порфирии среди пациентов второй группы свидетельствуют и лабораторные показатели. Большинство патологических состояний регистрируется исключительно в данной группе (лейкоцитопения, анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, и увеличение АлТ и АсТ отмечается в обеих группах, однако во второй группе частота встречаемости данных показателей достоверно выше значений в первой группе.

Таким образом, поздняя кожная порфирия у больных с вирусным гепатитом в анамнезе отличается специфическим течением и имеет более тяжелые клинические проявления, относительно данной патологии у лиц, не страдающих вирусным гепатитом. Подобное заключение может являться основанием к пересмотру подходов лечения поздней кожной порфирии у исследуемой категории больных.

Список литературы

1. Агеева Т.А., Поспелова Т.И., Шкурупий В.А. Морфологические особенности хронических вирусных гепатитов у больных ге-мобластомами // Россг. журнал гастроэнт., гепатол., колопрокт.-тол.-2000.-Т.10.-N1.-С.5.
2. Беляева Н.М. Вирусные гепатиты прошлое и будущее // Русск. мед. журнал. БОП.-2002.-Т.4.-N2.-С.39.
3. Болезни печени и желчевыводящих путей-: Руководство для врачей / Под ред. В.Т. Ивашкина.-М. ООО «Издат.Дом «М-Вести», 2002.-416 с.
4. Мочалова Н.Н. Клинико-патогенетическая оценка функциональной активности С1-С5 компонентов системы комплемента при хронических диффузных заболеваниях печени ././ Дисс. .канд. мед. наук.-2000.-114 с.
5. Мураднзарова Т.Б., Кумшиев Н.К., Мухамедова М.Б. Клинико-иммуногенетические -особенности хронического гепатита В у детей // Мир вирусных гепатитов,-2002,-N5,-С- 12-15,

ОЦЕНКА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕННЫМИ ФОРМАМИ СКЛЕРОДЕРМИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ.

Ефременко Е.И.¹, Силина Л. В.¹, Бобынцев И. И.¹

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет¹
Курск, Россия**

Аннотация. Локализованная склеродермия это хроническое заболевание соединительной ткани с первичной поражением кожи и подлежащих тканей, которые может быть затруднено психоневрологической патологией, приводит к функциональным нарушениям в других органах и системах, что осложняет лечение кожных заболеваний. Изучение психо - эмоционального статуса различными методами показали, что пациенты с склеродермии находятся в состоянии повышенной невротизм, средний или высокий уровень тревоги, субдепрессивные, депрессия средней и высокой тяжести. После лечения психо - эмоционального состояния пациентов значительно улучшились, что подтверждает снижение уровня тревоги, переход пациентов из состояния умеренной депрессии в мягкой форме, а кто-то и в состоянии полного эмоционального благополучия, но несмотря на общее улучшение психо - эмоционального состояния небольшой процент людей в тяжелой депрессии или в состоянии невротизм , что свидетельствует о том, что необходимо проконсультироваться терапевт, а затем третья.

Ключевые слова: локализованные склеродермии, психо эмоциональное состояние, депрессия, subdepressive, высокий уровень тревоги и невротизм.

EVALUATION OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH LIMITED FORMS OF SCLERODERMA BEFORE AND AFTER TREATMENT.

Efremenko E.I., Silina L. V., Bobyntsev I. I.

Kursk State Medical University ¹

Kursk, Russia

Abstract. Localized scleroderma is a chronic disease of connective tissue with a primary lesion of the skin and underlying tissues, which may be complicated by neuropsychiatric pathologies, leading to functional disorders in other organs and systems, which complicates the treatment of skin diseases. The study of psycho-emotional status by different methods showed that patients with scleroderma are at a heightened state of neuroticism, medium or high level of anxiety, subdepressive, depression of medium and high severity. After treatment of psycho-emotional condition of patients improved significantly, which confirms the decrease of anxiety level, the transition of patients from a state of moderate depression in a milder form, and someone and in a state of complete emotional well-being, but despite a General improvement of psycho-emotional state a small percentage of people in severe

depression or in a state of neuroticism, which suggests that it is necessary to consult a therapist followed by treatment.

Key words: localized scleroderma, psycho-emotional status, depression, subdepressive, high level of anxiety and neuroticism.

Локализованная (ограниченная) склеродермия — хроническое заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением кожи и подлежащих тканей, характеризующееся появлением очагов склероза на фоне воспалительных явлений (эритемы, отека) и последующим присоединением атрофии и гипо/гиперпигментации кожи.

Как и любой из дерматозов, склеродермия часто осложняется сопутствующей нервно-психической патологией, которая значительно изменяет, а часто и ухудшает течение болезни. Психоэмоциональные переживания могут вызвать функциональные расстройства в сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, вегетативной нервной и других системах. Изменения со стороны психики приобретают для больного и лечащего врача особую важность и значимость, поскольку нервно-психические переживания наслаиваются и усиливают у больных их физические страдания, а врачам затрудняют лечение основного кожного заболевания.

Целью нашего исследования является определить изменения психоэмоционального состояния больных ограниченными формами склеродермии.

Перед нами стояли следующие задачи:

1. Провести оценку психоэмоционального статуса больных склеродермией до и после проведения традиционной терапии.
2. Выявить наиболее информативные методики оценки этих изменений.
3. Определить показания для фармакологической коррекции выявленных нарушений.

Результаты исследования:

Нами были обследованы 50 пациентов с локализованной формой склеродермии, среди которых 47 пациентов — женщины. 3 пациента — мужчины. Возраст от 15 до 78 лет. Средний возраст в группе — 49,7.

Каждому из пациентов было предложено пройти тесты на изучение психоэмоционального статуса до и после стандартного лечения.

В процессе исследования до проведения стандартного лечения по тесту на изучение нейротизма и психотизма Айзенка были получены следующие данные: 56% испытуемых до лечения находились в состоянии, характеризующемся нестабильностью, то есть повышенного нейротизма. Для данных пациентов были характерны эмоциональная неустойчивость, а также лабильность вегетативной нервной системы. В общении выявлена повышенная раздражительность. Для некоторых пациентов из данной группы были характерны чувства виновности и беспокойства, озабоченности, рассеянность внимания, неустойчивость в стрессовых ситуациях, 44 % испытуемых обладали стабильностью в поведении и отношении к окружающему миру.

Из них экстравертами являются 17 пациентов, что составляет 34% исследуемых, интровертами 33 пациента - 66 %.

В контрольной группе преобладали люди со стабильностью в поведении – 18 человек, что в процентном соотношении составляет 90% . 10% здоровых людей, а это всего лишь двое человек находились в состоянии повышенного нейротизма. Статистическая достоверность в данном случае равна 0,033.

По шкале тревожности Джорджа Тейлора по методике Норакидзе получены следующие данные: среди 50 обследованных 2 человека (4%) от общего количества набрали по шкале лжи более 6 баллов, что свидетельствует об относительной недостоверности полученных данных; 10 человек - 20% от общего количества обследованных имеют средний уровень тревоги с тенденцией к низкому уровню, которым не обладает ни один из обследованных. 34% имеют уровень тревоги средний в тенденции к высокому, в котором находятся 40% исследуемых (20 человек), которых большинство. И только 1 пациент (2%) набрал более 40 баллов, рассматриваемые как показатель очень высокого уровня тревоги.

Во второй группе высоким уровнем тревоги не обладал никто, средним уровнем тревоги с тенденцией к низкому – 2 человека (10%), средним уровнем тревоги с тенденцией к высокому – 1 человек (5%), 17 человек обладали низким уровнем тревоги, что составляет большинство – 85 %; $p=0,038$.

Также в тестировании использовалась шкала депрессивности А. Бэка, разработанная для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии.

Отсутствие депрессивных симптомов наблюдалось у 1 пациента мужского пола, что составляет 2% от исследуемой группы. 18 пациентов – (среди них 2-е мужчин) находились в состоянии субдепрессии, 16 человек (32%) в состоянии умеренной депрессии 36%, 12 пациентов – выраженная депрессия, 3 человека (6%) – тяжёлая депрессия.

В контрольной группе по шкале Бэка были получены следующие данные: 1 человек находился в состоянии умеренной депрессии, 2 человека – в состоянии субдепрессии, 17 человек без проявлений депрессии; $p=0,04$.

Благодаря Шкале Цунга, позволяющей определить уровень депрессивности у больных, были получены следующие результаты: нормальное состояние у 2 пациентов или 4% общего количества испытуемых, у 15 испытуемых наблюдалась легкая депрессия, 27 человек находились в умеренной и 6 человек в тяжёлой депрессии.

Во второй группе в состоянии без признаков депрессии находились 18 человек, 2 здоровых человека были в состоянии легкой депрессии; $p=0,045$.

Опрос исследуемых на уровень тревоги по шкале Гамильтона показал, что 15 человек находятся в психо-эмоциональном благополучии, у 7- депрессивное расстройство легкой тяжести, 20 имеют депрессивное расстройство средней степени тяжести, 5 - в депрессивном расстройстве тяжёлой степени, и 3 человека – крайне тяжёлая степень тяжести. Статистическая достоверность в данном случае равна 0,036.

В контрольной исследуемой группе из 20 человек – 19 в психоэмоциональном благополучии, 1 - в депрессии легкой степени тяжести. После проведенного лечения было проведено контрольное тестирование пациентов и получены следующие данные:

Тест Айзенка показал, что 40 человек стали стабильно относиться к окружающему миру, это составляет 80 % от изучаемой группы, 10 человек остались в состоянии повышенного нейротизма, с агрессивной настроенностью к окружающим. Показатели теста на экстраверсию не изменились. Этот факт можно объяснить тем, что интроверты хуже переносят стресс, а в теории возникновения локализованной склеродермии имеется нейрогенная составляющая, что может свидетельствовать о том, что интроверты болеют чаще, чем экстраверты.

Шкала тревожности Джорджа Тейлора продемонстрировала, что среди 50 обследованных 4 человека (8%) от общего количества набрали по шкале лжи более 6 баллов, что свидетельствует об относительной недостоверности полученных данных; 20 человек - 40% от общего количества обследованных имеют средний уровень тревоги с тенденцией к низкому уровню, низким уровнем тревоги стали обладать 20 человек, что свидетельствует о равном соотношении пациентов с низким уровнем тревоги с пациентами, средний уровень тревоги которых с тенденцией к низкому уровню. 7 человек (14%) имеют уровень тревоги средний в тенденции к высокому. Высоким уровнем тревоги обладают 3 человека (6%). Очень высокий уровень тревоги не был выявлен ни у одного пациента после лечения.

По шкале депрессивности А. Бэка, отсутствие депрессивных симптомов наблюдалось у 15 пациентов, что составляет 30% от исследуемой группы. 20 (40%) пациентов – (среди них 1 мужчина) находились в состоянии субдепрессии, 10 человек (20%) в состоянии умеренной депрессии 36%, 4 пациента в состоянии выраженной депрессии, 1 человек (2%) в тяжелой депрессии.

Последний опрос свидетельствует о том, что пациентам с умеренной, выраженной и тяжелой депрессией необходимы консультация и наблюдение у врача – специалиста (психотерапевта) с соответствующим лечением.

Шкала уровня депрессии Цунга, после проведенного опроса, продемонстрировала следующую картину полученных результатов: психоэмоциональное состояние нормализовалось у 16 больных, что составляет 32% от испытуемой группы. Пациентов с легкой формой депрессии стало 24 (48%), а количество больных, находящихся в умеренной депрессии сократилось до 9 (18%), в тяжелой же депрессии остался лишь один испытуемый.

Уровень тревоги, исследуемый по шкале Гамильтона, у исследуемых пациентов стал следующим: в психоэмоциональном благополучии находятся 23 исследуемых, 20 в депрессивном расстройстве легкой тяжести, в средней тяжести 5 и в тяжелом психоэмоциональном состоянии остались 2 пациента.

Кроме выше перечисленных тестов исследовался дерматологический индекс качества жизни, который выявил, что кожное заболевание не влияет на жизнь

только 1 пациента; на 12 человек заболевание оказывает незначительное влияние; умеренное влияние на жизнь у 17 пациентов; 17 человек находятся под сильным влиянием со стороны заболевания; чрезвычайно сильно страдают 3 человек; $p=0,03$.

По результатам большинства тестов было выявлено, что пациенты с локализованной формой склеродермии находятся в состоянии повышенного нейротизма, среднего или высокого уровня тревожности, субдепрессии, депрессии средней и высокой степени тяжести.

После проведенного классического лечения психо - эмоциональное состояние больных значительно улучшилось, что подтверждает переход пациентов из состояния умеренной депрессии в более лёгкую форму депрессии, а у кого-то и в состояние полного эмоционального благополучия; уровень тревоги снизился с высокого до умеренного или низкого.. Кроме того большинство исследуемых стали стабильно относиться к окружающему. В общем состояние улучшилось.

Но, несмотря на общее улучшение показателей психо-эмоционального состояния, небольшой процент людей остались в состоянии выраженной депрессии или в состоянии нейротизма, что говорит о том, что необходима консультация психотерапевта с последующим лечением.

Из всех проводимых тестов наиболее информативными по изучению психоэмоционального состояния является шкала Бэка и шкала тревожности Джорджа Тейлора в модификации Норакидзе, так как можно оценить количество недостоверных ответов.

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРА ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Иванова О.Г.¹, Ситникова С.В.², Кондра А.В.¹

ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский университет"¹,
КУЗОО "Клинический противотуберкулезный диспансер № 4"²,
Омск, Россия

Аннотация. Проведено простое, ретроспективное, сравнительное исследование с целью установления частоты, характера нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты. В исследование были включены 343 пациента: 213 больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких (1-я группа) и 130 больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких (2-я группа). Установлено, что у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные препараты встречались в 3,5 раза чаще, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции. Высокий удельный вес лекарственных поражений печени (40,4%) у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких, вероятно, обусловлен наличием у этой группы пациентов вирусных гепатитов В и С, а также влиянием сочетанной антиретровирусной терапии, также способствующих возникновению лекарственных поражений печени.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ - инфекция, противотуберкулезные препараты, непереносимость, неблагоприятные побочные реакции

FREQUENCY AND STRUCTURE OF ADVERSE REACTIONS TO ANTITUBERCULOSIS DRUGS IN PATIENTS WITH HIV-ASSOCIATED TUBERCULOSIS

Ivanova O.G., Sitnikova S.V., Kondrya A.V.

Omsk State Medical University, ¹

Clinical dispensary № 4²

Omsk, Russia

Abstract. A simple retrospective, comparative study to determine the frequency and the nature of undesirable adverse reactions to anti-TB drugs. The study included 343 patients: 213 patients with HIV-associated pulmonary tuberculosis (group 1) and 130 patients with newly diagnosed infiltrative pulmonary tuberculosis (group 2). It was found that patients with HIV-associated pulmonary tuberculosis undesirable side reactions to anti-TB drugs occurred 3.5 times more frequently than in TB patients without HIV infection. A high proportion of drug-induced liver lesions (40.4%) in patients with HIV-associated pulmonary tuberculosis, probably due to the presence in this group of patients of viral hepatitis B and C, as well as the influence of combined antiretroviral therapy, also contribute to the emergence of drug-induced liver lesions.

Keywords: tuberculosis, HIV infection, TB drugs, intolerances, adverse reactions.

Эпидемия ВИЧ-инфекции является глобальной проблемой здравоохранения в мире и России [1, 2, 4, 8]. В настоящее время туберкулез – основная причина смерти у больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях болезни [3, 6; 9]. Эффективность противотуберкулезной терапии у больных с ВИЧ-инфекцией изучают многие ученые, однако результаты различных исследований зачастую противоречивы [3, 7, 10]. Сложность интерпретации полученных данных можно связать с неоднородностью изучаемых групп больных по исходному уровню CD 4+-лимфоцитов. Многие авторы отмечают, что эффективность противотуберкулезной терапии сопоставима с результатами лечения больных без ВИЧ-инфекции, но летальность в группе ВИЧ-позитивных значительно выше [1, 3, 5, 8]. У больных, получающих комбинированную противотуберкулезную терапию и антиретровирусную терапию (АРВТ), возникает больше проблем, связанных с лечением, так как увеличивается количество принимаемых лекарственных препаратов, возникает опасность их неблагоприятного взаимодействия, это в значительной степени оказывает влияние на частоту развития нежелательных побочных реакций (НПР) [3, 7, 9, 10]. По данным небольшого количества исследований, посвященных переносимости комбинированной терапии, НПР на противотуберкулезные препараты (ПТП) в сочетании с АРВТ встречаются от 25,7% до 42,6%, причем большинство из них проявляются в первые 2 месяца лечения и частота их возрастает при повторных курсах химиотерапии [3, 7].

Цель: анализ частоты, характера клинических проявлений нежелательных побочных реакций противотуберкулезных препаратов у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в сравнении с пациентами без ВИЧ-инфекции.

Материал и методы: исследование простое, ретроспективное, сравнительное. В исследование были включены больные с впервые выявленным туберкулезом легких. Пациенты были разделены на две группы: 1-ю группу составили 213 пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией, 2-ю группу - 130 больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких. Все пациенты находились на стационарном лечении в КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4». Анализировали данные анамнеза, результаты клинических, рентгенологических, бактериологических, молекулярно-генетических (ПЦР) методов исследования. Информацию получали путем выкопировки данных из учетной формы № 3 (карта стационарного больного).

Полученные результаты были обработаны с помощью стандартных статистических методик: рассчитывали показатели описательной статистики (M – среднее, m – стандартная ошибка среднего, σ – стандартное отклонение), критерий Стьюдента (для количественных величин), критерий χ^2 . Различия считали достоверными при $p < 0,05$. Расчеты осуществляли с помощью программы Biostat для персональных компьютеров.

Результаты исследования и их обсуждение. В 1-й группе количество пациентов мужского пола более чем в 3 раза превышало количество женщин – 166 (77,93%) и 47 (22,06%), во 2-й группе – 79 (60,7%) мужчин и 51 (39,3%) ($\chi^2 = 10,829$; $p = 0,0001$). Обращает на себя внимание высокий удельный вес заболевших в возрасте от 18 до 39 лет 143 (67,14%) в 1-й группе, во 2-й группе таковых было 45 (34,6%) ($\chi^2 = 33,170$; $p = 0,0001$), доля пациентов в возрасте от 40 до 59 в 1-й группе составляла 78 (37%) случаев, во 2-й группе – 54 (41,5%) ($\chi^2 = 0,630$; $p = 0,427$), от 60 до 79 лет – 13 (6,57%) и 31 (23,8%) ($\chi^2 = 22,379$; $p = 0,0001$). Люди молодого возраста являются группой наиболее высокого риска заболевания ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, а значит можно предположить, что у пациентов этой возрастной группы частота НПР на ПТП будет наиболее высокой. У пациентов 1-й группы были установлены следующие стадии ВИЧ-инфекции: 2Б – 6 (2,81%), 2В – 21 (9,86%), 3 – 29 (13,61%), 4 А – 72 (33,8%), 4Б – 10 (4,69%), 4В – 35 (16,43%), у 40 (18,8%) больных стадия ВИЧ-инфекции не была определена из-за краткости пребывания в стационаре.

В 1-й группе 195 (91,54%) пациентов проживали в городе, 18 (8,45%) в селе, во 2-й группе – 117 (90%) и 13 (10%) больных, соответственно ($\chi^2 = 0,085$; $p = 0,771$). Следует отметить, среди пациентов 1-й группы неработающими были 171 (80,3%), во 2-й группе – 86 (66,1%) ($\chi^2 = 7,841$; $p = 0,005$).

Алкоголизмом страдали 87 (41%) больных в 1-й группе, во 2-й группе диагноз алкоголизма подтвержден врачом наркологом у 10 (7,7%) ($\chi^2 = 42,128$; $p = 0,0001$). У пациентов в 1-й группе выявлены следующие сопутствующие заболевания: вирусный гепатит В – 32 (15%), вирусный гепатит С – 147 (69%), язвенная болезнь желудка – 32 (15%), прочие заболевания желудочно-кишечного тракта – 22 (10,3%), сахарный диабет – 9 (4,2%), хроническая обструктивная болезнь легких – 47 (22%), эпилепсия – 8 (3,7%), энцефалопатия – 4 (1,9%), заболевания сердечно-сосудистой системы – 40 (18,8%) случаев. Во 2-й группе были диагностированы: вирусный гепатит В – у 3 (2,3%) ($\chi^2 = 12,892$; $p = 0,0001$), вирусный гепатит С – у 5 (3,8%) ($\chi^2 = 136,306$; $p = 0,0001$), язвенная болезнь желудка – у 9 (6,9%) ($\chi^2 = 4,293$; $p = 0,038$), прочие заболевания желудочно-кишечного тракта – у 22 (16,9%), сахарный диабет – у 11 (8,5%) ($\chi^2 = 1,923$; $p = 0,165$), хроническая обструктивная болезнь легких – у 17 (13,1%) ($\chi^2 = 3,726$; $p = 0,054$), энцефалопатия – у 2 (1,5) ($\chi^2 = 0,037$; $p = 0,848$), заболевания сердечно-сосудистой системы – у 30 (23,1%) больных ($\chi^2 = 0,672$; $p = 0,412$). Из представленных данных видно, что у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом достоверно чаще встречаются вирусные гепатиты, язвенная болезнь желудка, хроническая обструктивная болезнь легких.

В структуре клинических форм у пациентов в группах сравнения преобладал преобладал инфильтративный туберкулез легких: 135 (63,4%) – в 1-й группе и 90 (69,2%) – во 2-й ($\chi^2 = 0,979$; $p = 0,322$). Фиброзно-кавернозный туберкулез был установлен у 14 (6,6%) больных в 1-й группе, и у 12 (9,2%) – во 2-й ($\chi^2 = 0,479$; $p = 0,489$), диссеминированный туберкулез – у 9 (4,2%) и 18 (13,8%) ($\chi^2 = 9,020$; $p = 0,003$), очаговый туберкулез – у 7 (3,3%) и 3 (2,3%) больных, соответственно ($\chi^2 = 0,037$; $p = 0,848$). Экссудативный плеврит выявлен у 3 (1,4%) пациентов в 1-й группе и у 2 (1,5%) – во 2-й ($\chi^2 = 0,135$; $p = 0,714$), туберкулема – у 2 (0,9%) и у 3 (2,3%) ($\chi^2 = 0,316$; $p = 0,574$), казеозная пневмония – у 2 (0,9%) и 2 (1,5%) больных ($\chi^2 = 0,0001$; $p = 0,987$), соответственно. У больных в 1-й группе так же встречались: туберкулез внутригрудных лимфоузлов – у 4 (1,9%); туберкулез плевры, цирротический туберкулез легких, туберкулезный менингит – по 1 случаю. При бактериологическом исследовании мокроты МБТ выделены у 76 (35,7%) пациентов в 1-й группе и у 101 (77,7%) – во 2-й ($\chi^2 = 55,383$; $p = 0,0001$).

Все пациенты, включенные в исследование, получали комплексное лечение, включавшее противотуберкулезную химиотерапию (4-6 ПТП), терапию сопровождения (дезинтоксикационная терапия, витамины, гепатопротекторы), а также, при наличии рекомендаций врача инфекциониста и согласия пациента – АРВТ. АРВТ получали 65 (30,5%) больных, у 21 (9,9%), по мнению инфекциониста, показания к назначению АРВТ отсутствовали, (59,6%) больных получать АРВТ отказались. Нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные препараты зарегистрированы у 201 (94,4%) пациентов 1-й группы и у 56 (43,1%) – во 2-й ($\chi^2 = 110,328$; $p = 0,0001$). У больных в 1-й группе были выявлены следующие НПР: лекарственные поражения печени – у 86 (40,4%), нейротоксические реакции – у 51 (23,9%), кардиотоксические – у 21 (9,9%), лекарственный нефрит – у 24 (11,3%), вестибуло-кохлеарный неврит – у 4 (1,9%), аллергические реакции – у 15 (7,04%). Во 2-й группе лекарственные поражения печени диагностировали у 30 (53,6%) больных от общего числа пациентов с развившимися НПР ($\chi^2 = 1,645$; $p = 0,200$), нейротоксические реакции – у 28 (50%) ($\chi^2 = 11,346$; $p = 0,0001$), кардиотоксические – у 5 (8,9%) ($\chi^2 = 0,007$; $p = 0,934$), неврит вестибуло-кохлеарного нерва – у 6 (10,7%) ($\chi^2 = 6,734$; $p = 0,009$), лекарственный нефрит – у 4 (7,1%) ($\chi^2 = 0,603$; $p = 0,437$), аллергические реакции – у 11 (19,6%) ($\chi^2 = 5,869$; $p = 0,015$) больных.

Заключение. У больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные препараты встречались в 3,5 раза чаще, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции. Высокий удельный вес лекарственных поражений печени (40,4%) у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких, вероятно, обусловлен наличием у этой группы пациентов вирусных гепатитов В и С, а также влиянием сочетанной антиретровирусной терапии, также способствующих возникновению лекарственных поражений печени. Большая (хоть и не достоверно) частота развития лекарственных нефритов у больных с ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом легких, возможно, объясняется наличием у пациентов инфекций, вызываемых вирусами семейства Herpesviridae, способствующих возникновению патологии почечной ткани.

Список литературы

1. Гусева В.А. ВИЧ-инфицированные как группа риска по туберкулезу / В.А. Гусева, В.М. Коломиец, С.М. Кудинов, Ю.И. Шахова // Туберкулез и болезни легких. – 2011. - № 4. – С. 114-115.
2. Довгополук Е.С. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Сибирском Федеральном округе в 2014 году / Е.С. Довгополук, Л.В. Пузырева, А.Д. Сафонов, А.В. Мордык [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2016. – № 2. – С. 37-41.
3. Зимина, В.Н. Эффективность химиотерапии у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией / В.Н. Зимина, И.А. Васильева, Ф.А. Батыров, А.Г. Самойлова // Туберкулез и болезни легких. – 2013. - № 3. – С. 15-21.
4. Коломиец В.М. Сравнительная характеристика эпидемической ситуации по туберкулезу и ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в приграничных регионах СНГ / В.М. Коломиец, Е.Н. Алексо, И.В. Бубневич, О.С. Шевченко // Туберкулез и болезни легких. – 2015. - № 5. – С. 84-85.
5. Мордык, А.В. Современные международные и национальные концепции борьбы с туберкулезом / А.В. Мордык, Л.В. Пузырева, Л.П. Аксютин // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. - 2013. - № 22 (22). - С. 92-97.
6. Мордык, А.В. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией на территории Омской области за период с 2008 по 2012 год / А.В. Мордык, Л.В. Пузырева, С.В. Ситникова, О.Г. Иванова // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2014. - Т. 6. - № 2. - С. 106-109.
7. Мордык, А.В. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией: причины неудач в лечении / А.В. Мордык, О.Г. Иванова, С.В. Ситникова // Омский научный вестник. - 2015. - № 144. - С. 23-26.
8. Нечаева, О.Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Российской Федерации / О.Б. Нечаева, Н.В. Эйсмонт // Социальные аспекты здоровья населения [Электронный научный журнал]. - 2012. - № 2 (24).
9. Пузырева Л.В., Сафонов А.Д., Мордык А.В. Заболевания органов дыхания при ВИЧ-инфекции / Л.В. Пузырева, А.Д. Сафонов, А.В. Мордык // Журнал инфектологии. – 2016. – Т. 8, № 2. – С. 17-25.
10. Ситникова, С.В. Учет личностных особенностей больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции при организации процесса лечения / С.В. Ситникова, Т.Ю. Удалова, А.В. Мордык // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 7. - С. 129-131.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2015 ГГ.

Иванова О.Г.¹, Бородкина С.П.², Горбатов Е.В.², Мордык Д.И.²
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»¹,
Главное бюро МСЭ по Омской области²,
Омск, Россия

Аннотация. Проведен анализ показателей инвалидности вследствие туберкулеза в Омской области за период с 2013 по 2015 гг. Изменение подходов к определению инвалидности у больных туберкулезом и улучшение качества работы по выявлению туберкулеза обусловило уменьшение числа пациентов, которым была определена инвалидность вследствие туберкулеза. Основными причинами, ведущими к стойкой утрате трудоспособности у пациентов, являются: несвоевременное выявление туберкулезного процесса, наличие сопутствующей патологии, множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза, отсутствие у пациента приверженности к лечению, что требует совершенствования системы мероприятий по организации и тактике лечения больных разработка и внедрение в практику индивидуальных программ реабилитации.

Ключевые слова: туберкулез, первичная инвалидность, программа реабилитации.

DYNAMICS OF DISABILITY CAUSED BY TUBERCULOSIS IN OMSK REGION FOR THE PERIOD FROM 2013 TO 2015

Ivanova O.G., Borodkina S.P., Gorbatykh E.V., Mordyk D.I.
Omsk State Medical University ¹,
The main Bureau of ITU on the Omsk Field²,
Omsk, Russia

Abstract. We was analysis of indicators of disability due to tuberculosis in the Omsk region in the period from 2013 to 2015. Changing approaches to the definition of disability in patients with tuberculosis and improving the quality of work on the identification of tuberculosis resulted in a decrease in the number of patients who have been identified disability due to tuberculosis. The main causes leading to permanent disability in patients who are late detection of tuberculosis process, the presence of comorbidities, multiple drug resistance of Mycobacterium tuberculosis, the lack of patient adherence to treatment, which requires improving the system of measures for the organization and tactics of treatment development and implementation the practice of individual rehabilitation programs.

Keywords: tuberculosis, disability, the program of rehabilitation

Несмотря на стабилизацию отдельных эпидемиологических показателей, Российская Федерация по-прежнему относится к странам с высоким уровнем

заболеваемости туберкулезом [3, 5, 9], а показатели, характеризующие инвалидность по туберкулезу во многих регионах страны, остаются высокими [9]. Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, туберкулез составляет 13% [1, 2]. Показатель инвалидности, обусловленной туберкулезом, отражает все аспекты оказания противотуберкулезной помощи: своевременность выявления, уровень диагностики, эффективность лечения и диспансерного наблюдения больных туберкулезом [4, 6, 7, 8].

Цель исследования: изучить динамику показателей инвалидности вследствие туберкулеза в Омской области за период с 2013 по 2015 гг.

Материал и методы. Проведен анализ показателей инвалидности вследствие туберкулеза в Омской области за период с 2013 по 2015 гг. Исследование простое, ретроспективное. Для анализа использованы материалы отчетов по клинко-экспертной работе ГБ МСЭ по Омской области? Для анализа использованы отчетные формы форма № 8 «Сведения о заболевании активным туберкулезом», форма № 33 «Сведения о больных туберкулезом», материалы отчетов по клинко-экспертной работе, амбулаторные карты больных, которым инвалидность по туберкулезу определена впервые.

Результаты исследования и их обсуждение. Всего в 2013 г впервые признано инвалидами в Омской области 382 человека, в 2014 г – 545 и в 2015 г – 435. Доля туберкулеза всех локализаций среди всех впервые освидетельствованных была, соответственно: 51,8% - в 2013 г., 34,1% - в 2014 г., 48,7%. Туберкулез органов дыхания стал причиной стойкой утраты нетрудоспособности у 49,2% освидетельствованных специализированным Бюро МСЭ пациентов в 2013 г., у 32,3% - в 2014 г., и у 42,3% - в 2016 г. У больных, признанных инвалидами повторно, в 2013 г. туберкулез был непосредственной причиной инвалидности в 50,6% случаев, в 2014 г. – в 43,9%, и в 2015 г. – в 54,4%; туберкулез органов дыхания, соответственно – в 48,2%, 41,1%, 50,8% случаев. При анализе динамики первичной инвалидности по туберкулезу у взрослых по возрастным категориям отмечено снижение первичной инвалидности среди лиц трудоспособного возраста от 97,9% в 2013 г. до 77,4% в 2015 г. (в целом, на 20,5%). Среди повторно признанных инвалидами больных туберкулезом прослеживается аналогичная тенденция – к 2015 г. число лиц с повторно установленной стойкой нетрудоспособностью в возрасте 18-54 лет (у женщин) и 18-59 лет (у мужчин) уменьшилось на 36,5% от 93,7% в 2013 г. до 57,2% - в 2015 г., преимущественно, за счет пациентов в легочными формами туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом населения Омской области за период с 2010 по 2015 гг. снизилась с уровня 115,2 до 82,4 случаев на 100 тыс. населения в 2015 г., однако данный показатель почти в 1,5 раза превышал таковой в целом по России (57,7 на 100 000 населения) и был на 6,8 % ниже, чем в среднем по СФО (88,4 на 100 000 населения). Показатель распространенности туберкулезом в 2015 г. составил 176,7 на 100 000 населения (в СФО на 26,7% выше – 241,1). Показатель смертности от туберкулеза постоянного населения составил 13,0 на 100 000 населения (в СФО на 23,9% выше – 17,1). Доля бактериовыделителей в 2013 г. среди впервые

выявленных больных, в Омской области составляла 52,1%. В 2015 г. удельный вес бактериовыделителей в Омской области, увеличился на 2,1%. По результатам анализа эффективности лечения впервые выявленных больных в 2013 г. были абациллированы 71,1% бактериовыделителей, в 2015 г. – 74,1%. Полости распада в 2013 г. были закрыты у 57,3% пациентов, в 2015 г. – у 60,9%. Для выявления возможных причин стойкой утраты трудоспособности, проанализированы амбулаторные карты 1233 пациентов, которым была установлена первичная инвалидность по туберкулезу в 2013-2015 гг.

Несвоевременное выявление заболевания отмечено у 1008 (81,7%) человек. Сопутствующие заболевания, создающие определенные проблемы для полноценной противотуберкулезной химиотерапии (ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и др.) имели место у 1112 (90,2%) пациентов. Наличие противопоказаний к хирургическому лечению (обусловленных сопутствующими заболеваниями, распространенностью туберкулезного процесса) отмечено у 86% больных, 14% - отказались от операции. Множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза зарегистрирована у 452 (36,6%) больных. Нежелательные побочные реакции на прием противотуберкулезных препаратов отмечены нами у 67,8% впервые выявленных больных туберкулезом легких, 55,4% больных с рецидивом туберкулеза, 78% пациентов с хронически текущими формами туберкулеза. Серьезную проблему для врачей фтизиатров как на стационарном, так и на амбулаторном этапах лечения создает отсутствие у пациента приверженности к лечению (по данным наших наблюдений, у 650 (52,7%) больных, которым впоследствии была определена группа инвалидности). Основными причинами инвалидизации больных туберкулезом, согласно наших наблюдений явились: социальная дезадаптация пациента ($\chi^2=9,2$; $p=0,04$), несвоевременное выявление заболевания ($\chi^2=6,3$, $p=0,001$), низкая приверженность к лечению ($\chi^2=12,5$; $p=0,015$).

Заключение. Улучшение качества работы по выявлению и лечению туберкулеза в Омской области обусловило уменьшение количества деструктивных форм туберкулеза легких у впервые выявленных больных, улучшению результатов лечения впервые выявленных больных и, как следствие – уменьшение показателей инвалидности больных туберкулезом. Увеличение количества больных пенсионного возраста, признанных инвалидами вследствие туберкулеза требует усиления контроля за своевременным обследованием на туберкулез данной категории больных, более активной работы по привлечению к профилактическим флюорографическим обследованиям лиц пожилого возраста из групп риска по развитию туберкулеза.

Список литературы

1. Вишневская Л.К. Роль причинных факторов в инвалидности по туберкулезу и стабилизации ситуации: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Л.К. Вишневская. – Москва, 2004. – 23 с.
2. Вишневская Л.К. Причинные факторы инвалидности вследствие туберкулеза легких / Л.К. Вишневская // Проблемы туберкулеза – 2005. - № 7. – С. 13-15.
3. Коломиец В.М. Современные оценки эпидемической ситуации по туберкулезу / В.М. Коломиец // Туберкулез и болезни легких. – 2011. - № 4. – С. 200-201.
4. Коломиец В.М., Рублева Н.В. Запущенный туберкулез легких: проблемы и эффективность реабилитации / В.М. Коломиец, Н.В. Рублева // Научный результат. Серия: Медицина и фармация. – 2016. – Т. 2, № 1 (7). – С. 3-9.
5. Мордык, А.В. Современные международные и национальные концепции борьбы с туберкулезом / А.В. Мордык, Л.В. Пузырева, Л.П. Аксютин // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. - 2013. - № 22 (22). - С. 92-97.
6. Мордык А.В., Батищева Т.Л., Пузырёва Л.В. Выявление социальных, эпидемиологических, клинических предикторов неблагоприятного исхода инфильтративного туберкулеза у впервые выявленных больных/ А.В. Мордык, Т.Л. Батищева, Л.В. Пузырёва // Жизнь без опасностей. Здоровье. Профилактика. Долголетие. - 2014. - № 3. - С. 46-51.
7. Мордык, А.В. Социальный статус пациентов противотуберкулезного диспансера и его влияние на отношение к лечению / А.В. Мордык, Л.В. Пузырева, Т.Г. Подкопаева // Социология медицины. -2011. - № 2. - С. 44-47.
8. Мордык А.В. Роль личности пациента в процессе выявления и лечения туберкулеза органов дыхания / А.В. Мордык [и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. – 2011. - № 4. – С. 148-151.
9. Нечаева О.Б. Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость и смертность / О.Б. Нечаева // Медицинский алфавит. Эпидемиология и Гигиена. - 2013. - № 4 (24). - С. 7-12.

**КЛИНИКО- ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕТАЛЬНОСТИ
ОТ ГРИППА А (H1N1) pdm09 В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2015-2016 ПО
СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА
2009-2010**

Иванова А.П.¹, Белоконова Л.В.¹

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,¹
Курск, Россия**

Аннотация. В статье дан сравнительный анализ больничной летальности от гриппа А (H1N1) pdm09 эпидемических сезонов 2009-2010 и 2015-2016. Обсуждены клинические особенности течения заболевания, частота осложнений и причины летальности.

Ключевые слова: грипп А (H1N1), летальность, эпидемический мониторинг.

**CLINICAL EPIDEMICAL MONITORING
OF INFLUENZA A (H1N1) pdm09 MORTALITY IN 2015-2016
COMPARED TO THE PERIOD 2009-2010**

Ivanova A.P., Belokonova L.V.

**Kursk State Medical University ¹,
Kursk, Russia**

Abstract. A comparative analysis of hospital mortality of influenza A (H1N1) pdm09 epidemical seasons of 2009-2010 and 2015-2016 is presented. the clinical features of The disease, the frequency of complications and causes of mortality arealso discussed.

Key words: influenza A (H1N1), mortality, epidemic monitoring

Грипп и другие острые респираторные заболевания занимают ведущее место в структуре инфекционных болезней. В России ежегодно отмечают от 27,3 до 41,2 млн. заболевших гриппом и другими ОРЗ[1,6].

Особенностью гриппа является невероятная быстрота распространения – большой город охватывается заболеванием за 1,5-2 недели, огромная страна – за 3-4 недели. При эпидемических вспышках заболевает до 30-50% населения пораженного региона, что приводит к огромным экономическим потерям. По данным ВОЗ во время ежегодных сезонных эпидемий гриппа во всем мире ежегодно регистрируется от трех до пяти миллионов тяжелых случаев гриппа и от 250000 до 500000 смертельных исходов [2,4]. Грипп считается респираторной инфекцией с трудно предсказуемым течением и быстро развивающимися жизнеугрожающими осложнениями, особенно среди лиц средних лет, и как результат, развитие дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдром [2,4,5]. Результаты изучения причин летальных исходов у пациентов с тяжёлой формой гриппозной инфекции, в частности, антигенных и

молекулярно-генетических свойств штаммов вируса гриппа А (H1N1) pdm09, выделенных из аутопсийного материала, выявили у них увеличение авидности к $\alpha 2'-3'$ -сиалозидам, в то время как штаммы от пациентов с лёгкими и среднетяжелыми формами инфекции имели большую авидность к $\alpha 2'-6'$ -сиалозидам.[3].

Смена рецепторной специфичности с $\alpha 2'-6'$ - на $\alpha 2'-3'$ -сиалозиды влечёт за собой и повышение тропности вируса к нижним отделам респираторного тракта и следовательно – повышение вероятности развития первичных вирусных пневмоний.[3]

Цель исследования: проанализировать и сравнить данные по больничной летальности от гриппа в эпидемический сезон 2015-2016 гг. с показателями летальности эпидемического сезона 2009-2010 гг. по ОБУЗ ОКИБ им. Н.А. Семашко.

Материалы и методы. Истории болезни пациентов ОБУЗ ОКИБ им. Н.А. Семашко, умерших от гриппа А(H1N1) сезона 2009-2010 гг., 2015-2016 гг. Были изучены статистические данные по эпидемическим сезонам гриппа, проведен сравнительный анализ, а также определена зависимость показателей от различных факторов по данным управления эпиднадзора Роспотребнадзора РФ, 2016г.

Результаты исследования. Характеристика эпидсезона 2015-2016 гг.:

- Широкое географическое распространение заболеваемости гриппом, с включением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения, с умеренной его интенсивностью в большинстве субъектов РФ;
- Раннее (на 2–3-й неделе) вовлечение в эпидемический процесс южных регионов страны, что было связано с эпидемическим неблагополучием по гриппу на Украине;
- Умеренная (3–4 нед.) длительность эпидемического подъема заболеваемости в большинстве субъектов РФ;
- Доминирование в течение всего подъема заболеваемости одного типа вируса гриппа – А(H1N1)2009, не претерпевшего серьезных мутаций и активно не циркулировавшего в течение последних 3 лет, что обусловило накопление в популяции не иммунных к нему контингентов;
- Умеренная заболеваемость привитых против гриппа лиц (2,6% от числа заболевших) и отсутствие регистрации у них тяжелых форм при соответствии циркулирующих вирусов вакцинным;
- Умеренная летальность, обусловленная в основном поздним обращением и наличием сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая сердечно-сосудистая патология, бронхиальная астма, ожирение, хронический гепатит и др.);

Следует отметить, что в эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ 2009-2010 гг., когда также отмечалось доминирование вируса гриппа А(H1N1)2009, интенсивность эпидемического процесса была существенно выше, длительность эпидемического подъема составляла около 7-9 недель. Только гриппом (не включая ОРВИ) переболели около 4,1% населения.

По данным ОБУЗ ОКИБ им. Н.А. Семашко число верифицированных случаев гриппа в эпидемическом сезоне 2009-2010 гг. было выше, чем в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. (102 и 68 случаев соответственно). При этом число летальных исходов одинаково (6 случаев). Из них 2 мужчин и 4 женщин в 2009-2010 гг. и 6 мужчин в 2015-2016 гг. Средний возраст умерших составил 39 лет в 2015-2016 и 40,8 в 2009-2010 гг. Все пациенты поступали в стационар на поздних сроках заболевания в 2009-2010 гг. - 6,5 дня от начала заболевания (5-7 сутки), в 2015-2016 гг. - 5,2 дня от начала заболевания (2-8 сутки). Распределение летальных случаев по месту жительства: в 2009-2010 гг. все пациенты (6) из сельской местности, в 2015-2016 гг. - 3 из села, 3 из города. Все пациенты поступали напрямую в ОРИТ в 2009-2010 гг., в 2009-2010 гг. 4 пациента поступили сразу в ОРИТ, 2 – переведены в ОРИТ в первые сутки лечения в профильном отделении. Средняя продолжительность заболевания составила в 2009-2010 гг. - 5,7 дня (1 - 12 дней), в 2009-2010 гг. - 6,7 дня (2 - 23 дня). Общий показатель летальности в 2009-2010 гг. составил 5,9% от общего числа выбывших с верифицированным диагнозом «Грипп», в 2015-2016 гг. - 8,8%. Случаев досрочной летальности не было. Все летальные случаи в 2009-2010 и в 2015-2016 гг. сопровождались развитием вирусной субтотальной/тотальной пневмонии с последующими осложнениями: респираторным дистресс-синдромом и прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Во всех случаях отмечено совпадение клинического и морфологического диагнозов. Важно, что по данным эпидемического сезона 2009-2010 и 2015-2016 гг. все умершие не были вакцинированы против гриппа.

Заключение. Интенсивность эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2015-2016 гг. была существенно ниже, чем в период пандемии гриппа 2009-2010 гг. что, вероятно, обусловлено наличием иммунной прослойки населения, в том числе за счет высокого охвата профилактическими прививками к доминирующему в эпидемическом сезоне вирусу гриппа А(Н1N1)2009.

Причиной летальных исходов в большинстве случаев являлось:

- Позднее обращение за медицинской помощью (самолечение, недооценка тяжести состояния на амбулаторном этапе);
- Отсутствие вакцинации от гриппа;
- Отсутствие/позднее начало/несоблюдение режима противовирусной терапии
- Несвоевременное/некорректное назначение системной антибактериальной терапии;
- Наличие в 85% случаев коморбидной патологии.

Список литературы

1. Богданова, А.В. Этиология респираторных вирусных инфекций нижних дыхательных путей у детей: современное состояние

- проблемы(литературный обзор)/А.В. Богданова [и др.]// Научно-практический журнал «Журнал инфектологии».- 2010. – Т8, №2. - С. 5-9.
2. Жданов, К.В. Клинический случай тяжелой формы гриппаА(Н1N1) / К.В. Жданов [и др.] //Научно- практический журнал «Журнал инфектологии».- 2010. - Т2, №3. - С. 28-31.
 3. Чучалин, А.Г. Методические рекомендации по диагностике и лечению гриппа/ А.Г. Чучалин [и др.]// Москва.- 2016.-29с.
 4. Покровский, В.И. Пандемический грипп А(Н1N1)/ В.И. Покровский, О.И. Киселев.- СПб: Изд. «Росток». 2010.
 5. Анализ летальных исходов гриппаА(Н1N1) в Ставропольском крае в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг./Л.В. Ртищева [и др.]// Материалы всероссийского ежегодного конгресса «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение, профилактика».- Санкт-Петербург, 2016. - Т.8, №3.-С.119-120.
 6. Denholm J.T., Gordon C.L., Johnson P.D. et al. Hospitalised adult patients with pandemic (H1N1) 2009 influenza in Melbourne, Australia/ MJA. 2010.- 192 (2).-P.84-86.

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ
ОТ ГРИППА В ЭПИДСЕЗОН 2015-2016 ГГ. ПО СРАВНЕНИЮ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕТАЛЬНОСТИ ЭПИДСЕЗОНА 2009-2010 ГГ.**

Иванова А.П.¹, Винников В.И.²

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет¹,
ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А.
Семашко»²,
Курск, Россия**

Аннотация. ОРВИ и грипп занимают основное место по частоте и количеству случаев в мире и составляют 95% всех инфекционных заболеваний. При эпидемических вспышках заболевает до 30-50% населения пораженного региона, что приводит к огромным экономическим потерям. В связи с этим были изучены статистические данные по эпидемическим сезонам гриппа, проведен сравнительный анализ, а также определена зависимость показателей от различных факторов. После чего сделан вывод о причинах и последствиях эпидемий гриппа.

Ключевые слова: грипп, анализ, эпидсезоны, летальность, статистика.

**ANALYSIS OF THE PROPORTION OF HOSPITAL DEATHS
FROM THE INFLUENZA SEASON 2015-2016 YEARS IN
COMPARISON WITH THE MORTALITY RATE OF THE EPIDEMIC
SEASON 2009-2010 YEARS**

Ivanova A.P., Vinnikov V.I.

*Kursk State Medical University ¹,
Regional clinical infectious diseases hospital. N.A. Semashko ²,
Kursk, Russia*

Abstract. SARS and influenza dominate the frequency and number of cases in the world and make 95% of all infectious diseases. When outbreaks ill 30-50% of the population of the affected region, leading to huge economic losses. In this regard, were studied statistical data on epidemic influenza seasons, a comparative analysis, as well as the dependence of indicators on different factors. Then the conclusion is made about the causes and effects of epidemics of influenza.

Ключевые слова: грипп, анализ, эпидсезоны, летальность, статистика.

ОРВИ и грипп занимают основное место по частоте и количеству случаев в мире и составляют 95% всех инфекционных заболеваний. В России ежегодно отмечают от 27,3 до 41,2 млн. заболевших гриппов и другими ОРВИ. Практически каждый человек хотя бы раз в жизни болел гриппом. Эпидемии гриппа приходят каждый год обычно в холодное время года и поражают до 15% населения Земли.

Человек, периодически болея гриппом, теряет суммарно около 1 года своей жизни. Средняя продолжительность жизни человека сокращается благодаря гриппу и ОРЗ на несколько лет. Это происходит из-за подрыва сердечно-сосудистой системы. Так, при тяжелом процессе гриппа часто появляются необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менингоэнцефалиты.

Еще одной особенностью этой инфекции является невероятная быстрота распространения – большой город охватывается заболеванием за 1,5-2 недели, огромная страна – за 3-4 недели. При эпидемических вспышках заболевает до 30-50% населения пораженного региона, что приводит к огромным экономическим потерям. [1,2]

Цель исследования: проанализировать и сравнить данные по больничной летальности от гриппа в эпидсезон 2015-2016 гг. с показателями летальности эпидсезона 2009-2010 гг.

Материалы и методы. Были изучены статистические данные по эпидемическим сезонам гриппа, проведен сравнительный анализ, а также определена зависимость показателей от различных факторов.

Результаты исследования. Характеристика эпидсезона 2015-2016 гг.:

- Широкое географическое распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ, с включением в эпидпроцесс всех возрастных групп населения, с умеренной его интенсивностью в большинстве субъектов РФ;
- Раннее (на 2–3-й неделе) вовлечение в эпидпроцесс южных регионов страны, что было связано с эпид неблагополучием по гриппу и ОРВИ на Украине;
- Умеренная (3–4 нед) длительность эпидемического подъема заболеваемости в большинстве субъектов РФ;
- Доминирование в течение всего подъема заболеваемости одного типа вируса гриппа – А(Н1N1)2009, не претерпевшего серьезных мутаций и активно не циркулировавшего в течение последних 3 лет, что обусловило накопление в популяции не иммунных к нему контингентов;
- Умеренная заболеваемость привитых против гриппа лиц (2,6% от числа заболевших) и отсутствие регистрации у них тяжелых форм при соответствии циркулирующих вирусов вакцинным;
- Умеренная летальность, обусловленная в основном поздним обращением и наличием сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая сердечно-сосудистая патология, бронхиальная астма, ожирение, хронический гепатит и др.);

Следует отметить, что в эпидсезоне гриппа и ОРВИ 2009-2010 гг., когда также отмечалось доминирование вируса гриппа А(Н1N1)2009, интенсивность эпидпроцесса была существенно выше, длительность эпидподъема составляла около 7-9 недель. Только гриппом (не включая ОРВИ) переболели около 4,1% населения.

Число верифицированных случаев гриппа в эпидсезон 2009-2010 гг. было выше, чем в эпидсезон 2015-2016 гг. (102 и 68 случаев соответственно). При этом число летальных исходов одинаково (6 случаев). Из них 2 мужчин и 4 женщин в 2009-2010 гг. и 6 мужчины в 2015-2016 гг. Важно, что по данным эпидемического сезона 2015-2016 гг. все умершие не были вакцинированы против гриппа.

Таким образом, интенсивность эпидсезона гриппа и ОРВИ 2015-2016 гг. была существенно ниже, чем в период пандемии гриппа 2009-2010 гг. что, вероятно, обусловлено наличием иммунной прослойки населения, в том числе за счет высокого охвата профилактическими прививками к доминирующему в эпидсезоне вирусу гриппа А(Н1N1)2009.

Причиной летальных исходов в большинстве случаев являлось:

- Позднее обращение за медицинской помощью (самолечение, недооценка тяжести состояния на амбулаторном этапе);
- Отсутствие вакцинации от гриппа;
- Отсутствие/позднее начало/несоблюдение режима противовирусной терапии
- Несвоевременное/некорректное назначение системной антибактериальной терапии;
- Наличие в 85% случаев коморбидной патологии.

Список литературы

1. Denholm J.T., Gordon C.L., Johnson P.D. et al. Hospitalised adult patients with pandemic (H1N1) 2009 influenza in Melbourne, Australia. MJA. 2010; 192 (2): 84-86.
2. Покровский В.И., Киселев О.И. Пандемический грипп H1N1. Изд. «Росток». СПб. 2010.

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРИГГЕРНЫХ ФАКТОРОВ И ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОЖИ У ПАЦИЕНТОВ С РОЗАЦЕА И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ В АСПЕКТЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

А.В. Карпова, Э.А. Баткаев

РУДН, кафедра клинической микологии и дерматовенерологии ФПКМР
РУДН, г. Москва

Аннотация. В рамках наших исследований 50 пациентов с розацеа были исследованы с помощью «Академика» (акустической кожи анализатора). Измерение скорости акустической кожи проводимости позволяет подтвердить диагноз розацеа или предрасположенность к ней, чтобы объективно оценить состояние кожи на различных этапах лечения во избежание травмы кожи.

Ключевые слова: розацеа, акустической кожи анализатор, акустической кожи проводимости.

REVEALING THE TRIGGER FACTORS AND PHYSIOMETRICAL OPTIONS' CHANGES IN PATIENTS WITH ROSACEA AND PREDISPOSITION IN THE ASPECTS OF EARLY DIAGNOSTICS, PREVENTION AND PROGNOSING THE COURSE OF THE DISEASE.

Karpova A.V., Batkaev E.A.

PFUR, Department of clinical dermatovenereology Mycology and FPKMR, Moscow, Russia

Abstract. Within our research 50 patients with rosacea have been investigated by means of "ACA" (acoustical skin analyser). Measuring a velocity of acoustical skin conductivity enables to confirm the diagnosis of rosacea or predisposition to it, to estimate objectively the condition of skin during different stages of treatment avoiding the skin injury.

Key words: rosacea, acoustical skin analyzer, acoustical skin conductivity.

Розацеа - хронический полиэтиологический дерматоз, реализующийся патологической реакцией сосудов лица под влиянием вазоактивных пептидов, антител, циркулирующих иммунных комплексов и характеризующийся рецидивирующим течением, стадийностью и проявляющийся гиперэемией лица, папулами, пустулами, телеангиэктазиями, гиперплазией сальных желез и соединительной ткани [1].

Актуальность исследования обусловлена увеличением частоты манифестации розацеа в молодом возрасте, склонностью к постоянно рецидивирующему, торпидному течению, в том числе и из-за нерациональной терапии, недообследования функционального состояния других органов и систем, патология которых может отражаться на течении дерматоза, и самолечения. Снижение качества жизни молодого работоспособного населения

связано с развитием тяжелых эстетических недостатков (ринофима, конглобатная розацеа).

Диагностика розацеа в основном визуальная, основывается на типичной локализации очагов поражения – щеки, подбородок, лоб, нос, а так же по результатам обследования и обнаружения *D. Folliculorum*.

Однако, современные тенденции ведения пациентов с заболеваниями кожи, особенно в условиях частных медицинских центров и косметологических клиник, требуют оценки качества терапии и возможности прогнозирования течения заболевания, основываясь на инструментальных видах диагностики, позволяющей объективно оценить состояние кожных покровов на разных этапах терапии.

Гистологические, гистохимические и электронно-микроскопические исследования точны, но их применение ограничено травматичностью и возможностью провоцирования обострения процесса и чаще используются для научных исследований [2,3]. Тепловизионный контроль требует не только специальной аппаратуры, но и специально оборудованного кабинета. Метод, осуществляемый с помощью прибора «АСА» (acoustical skin analyser), позволяет измерять скорость распространения поверхностных сдвиговых волн, которая отражает распределение механического напряжения в исследуемой коже. Скорость акустической проводимости зависит от структуры рогового слоя эпидермиса, локализации, возраста, содержания воды, барьерной функции кожи, васкуляризации, температуры и значительно изменяется при развитии дерматозов[4].

Цель исследования: Оценить состояние органов и систем, работа которых связана с этиопатогенезом розацеа и может влиять на его течение.

Оценить состояние кожных покровов по изменению скорости поверхностных сдвиговых волн у больных с розацеа в эритематозной стадии и предрасположенностью к розацеа с целью совершенствования диагностики, оценки результатов терапии и возможности профилактики у людей с предрасположенностью к развитию данного дерматоза.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 50 человек, 20 мужчин и 30 женщин в возрасте от 45 до 70 лет. У 34 (68%) человек эритематозная стадия розацеа, . У 28(56,7%) человека течение дерматоза осложнено *D. Folliculorum* (подтверждённый лабораторно).

У 16 (32%) имеется предрасположенность в виде отягощенной наследственности по этому дерматозу.

Ранее лечение получали 35(70%) человек, с рецидивами до 3 случаев в год.

Для выявления патологии со стороны желудочно – кишечного тракта всем больным проводилась фиброгастродуоденоскопия. В процессе обследования проводили визуальную оценку состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. У 39(78%) человек обнаружены различные формы гастродуоденальной и гастроэзофагальной патологии.

При исследовании клеточного и гуморального иммунитета у больных с розацеа отмечены снижение абсолютного и относительного содержания В –

лимфоцитов, увеличение содержания С3 компонента комплемента, повышение содержания IgA, М, G. В сыворотке крови отмечено содержание провоспалительных цитокинов (ИНФ γ , ИА – 8, ИЛ - 1 β , И – 6, ИЛ – 17).

У 11(21,6%) обследуемых женщин констатированы повышение тестостерона, ДЭА, ЛГ. При ультразвуковом исследовании органов малого таза выявлены поликистозные изменения в яичниках.

Вегето – сосудистая дистония в анамнезе у 24(48,6%) человек.

Всем исследуемым было выполнено измерение акустической проводимости кожи в области патологических изменений с помощью прибора «АСА» (acoustical skin analyser), в области правой щеки, который позволяет измерять скорость распространения поверхностных сдвиговых волн, которая отражает распределение механического напряжения в исследуемой коже. При нормальных значениях $V_y = 5,5$ м/с, $V_x = 6$ м/с (для кожи области щек у 40 - 60 летних женщин и мужчин) нами были получены следующие результаты: у женщин с эритематозной стадией розацеа проводимость увеличилась на 24%, с предрасположенностью на 18%, у курящих на 21%. У мужчин с эритематозной стадией розацеа акустическая проводимость кожи увеличилась на 21%, с предрасположенностью на 16%, у курящих – на 20%.

Выводы: Обследование пациентов с розацеа, выявление сопутствующей патологии органов и систем, изучение и анализ взаимодействия факторов, участвующих в патогенезе розацеа, позволят усовершенствовать методы лечения и прогнозирование течения заболевания.

Измерение скорости акустической проводимости кожи позволят инструментально, без нарушения целостности кожных покровов, подтвердить наличие заболевания или предрасположенности к нему, объективно оценить состояние кожных покровов на разных этапах терапии.

Список литературы

1. Потекаев Н.Н. Акне и розацеа. – М; Бином.-2007
2. Фаустова Е.Е. Оценка эффективности методов косметической коррекции с учетом акустических свойств кожи. Дисс. канд. мед. наук, Москва, 1999 (in Russian).
3. Федорова В.Н., Кравец В.И., Омельченко К.А., Фаустова Е.Е. Акустическая оценка челюстно-лицевой травмы. Наука и технология в России №1 (31), 1999,с.28.
4. Sarvazyan A.P.et al., Method and device for acoustic testing of elasticity of biological tissues, United States Patent, N 4, 947851, 14. 08. 1990

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Киселева В.В.¹, Лесневская И.Ю.¹, Шамара Л.Ф.¹

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет¹,
Курск, Россия**

Аннотация. Проведено простое, ретроспективное, сравнительное исследование с целью анализа суммарной заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городах Курск и Железногорск отличающихся по уровню напряжённости геомагнитного поля при относительно сходных других параметрах. Также проводилось исследование заболеваемости сальмонеллезом и шигеллезом как наиболее значимых в сравниваемых регионах в аналогичных группах за аналогичный период времени. Установлено, что динамика заболеваемости вне зависимости от анализируемой нозологической формы, места проживания и возраста пациентов имеет волнообразный характер, заболеваемость носит циклический характер. Наиболее высокие ее показатели наблюдаются у жителей города Железногорска, проживающих в центре региона Курской магнитной аномалии с повышенным значением напряженности геомагнитного поля. Полученные данные могут свидетельствовать о волнообразной активности патогенных микроорганизмов.

Ключевые слова: кишечные инфекции, заболеваемость, уровень геомагнитного поля.

THE MORBIDITY OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN REGIONS WITH DIFFERENT LEVEL OF GEOMAGNETIC FIELD.

Kiseleva V.V., Lesnevskaya I.U., Shamara L.F.

**Kursk State Medical University ¹,
Kursk, Russia**

Abstract. The research is simple, retrospective, comparative. It was made to assess the summary morbidity of acute intestinal infections in Kursk and Zheleznogors, which are different in voltage value of the geomagnetic field with approximately similar other parameters. Also there was a research of salmonellosis and shigellosis morbidity as the most significant issues in comparable regions in analogous groups during analogous periods. It was discovered that the dynamic of morbidity has an undulating character whether is the analyzed nosology form, place of residence and age of the patients. Morbidity has a cyclic character. The highest values of morbidity are in the researching group from Zheleznogorsk- the centre of KMA region with an increased voltage value of the geomagnetic field. The received data may indicate a wavelike activity of pathogenic microorganisms.

Key words: intestinal infections, morbidity, level of geomagnetic field.

Здоровье населения во многом определяется его санитарно-эпидемиологическим благополучием. Предупреждение массовых и sporadических инфекционных заболеваний, связанных с водопотреблением, питанием населения и действием экологических факторов, является важнейшей задачей государства. [6;8].

Острые кишечные инфекции (ОКИ), возникновение и распространение которых тесно связано с факторами окружающей среды, до настоящего времени занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии. Высокий уровень инфекционной заболеваемости, активизация природно-очаговых и социально обусловленных инфекций, представляющих угрозу жизни и здоровья населения, вызывают очевидную необходимость проведения углубленного анализа эколого-эпидемиологической ситуации.

Курск и Железнодорожск – два крупных промышленных города Курской области, расположенных в одном климатическом поясе и географическом регионе в 100 км друг от друга. При сопоставлении прочих условий проживания, напряженность геомагнитного поля в г. Железнодорожске, расположенном на территории Курской магнитной аномалии (КМА), превышает таковую в г. Курске, находящемся в условиях ее фоновых значений, в 4-5 раз. [1;2;4].

Влияние магнитных полей на живые объекты находят подтверждение в работах многих авторов. Они могут изменять защитные реакции организма в зависимости от их направленности и других характеристик. [3;8].

При длительном воздействии магнитного поля в организме возникают выраженные изменения гуморального и клеточного иммунитета. [3;8]

Цель: изучение заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями в городах Курске и Железнодорожске, различающихся по уровню напряженности геомагнитного поля.

Материалы и методы: исследование простое, ретроспективное, сравнительное. Материалами исследования послужили статистические данные заболеваемости, публикуемые управлением Роспотребнадзора по Курской области. Проводился анализ суммарной заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городах Курск и Железнодорожск. Также проводилось исследование заболеваемости сальмонеллезом и шигеллезом как наиболее значимых в сравниваемых регионах в аналогичных группах за аналогичный период времени.

Статистическая обработка цифровых данных произведена с применением стандартного пакета прикладных программ Microsoft Excel STANISNIKA 6.0 for Windows.

Результаты исследования и их обсуждение. Оценивая общий уровень заболеваемости ОКИ в Курске необходимо отметить, что наблюдается некоторая цикличность изменения показателей. Суммарная заболеваемость ОКИ в Курске постепенно нарастала, имея цикличность изменений с выраженными максимумами. Суммарная заболеваемость ОКИ в г. Железнодорожске за тот же период времени значительно отличалась от таковой в

в г. Курске. Это проявлялось, прежде всего в более высоких значениях анализируемого показателя. Кроме того, пиковые значения показателей не совпадали с таковыми по Курску. Относительные показатели заболеваемости в Железнодорожске или незначительно снижались или нарастали от цикла к циклу. Согласно ежегодным отчетам Управления Роспотребнадзора по Курской области уровень влияния неблагоприятных экологических факторов региона проживания оставался на прежнем уровне, поэтому такие изменения могут являться результатом эволюционирования имеющихся патогенов в сторону усиления их вирулентности.

Общая картина суммарной заболеваемости сальмонеллезом в г. Железнодорожске значительно не отличалась от таковой по Курску, однако значения анализируемого показателя в 6-10 раз превышали показатели по Курску.

Общая заболеваемость бактериальной дизентерией диагностировалась в Курске и Железнодорожске почти в три раза чаще, чем сальмонеллез, и являлась отражением ситуации в области. При этом в количественном выражении значение изучаемого показателя в г. Железнодорожске превышало значение того же показателя в г. Курске в 2-5 раз.

Наиболее высокие показатели заболеваемости сальмонеллезом и шигеллезом отмечаются в популяции людей, проживающих в г. Железнодорожске – центре региона КМА с повышенным значением напряженности геомагнитного поля. В сопоставлении с уже имеющимися данными литературы, полученные данные косвенно указывают на волнообразную активность патогенных микроорганизмов – возбудителей ОКИ. При этом нельзя исключать и участие факторов защиты организма человека, среди которых при кишечных инфекциях большое значение принадлежит нормальной микрофлоре кишечника, обеспечивающей, наряду с другими факторами, его колонизационную резистентность.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что динамика заболеваемости вне зависимости от анализируемой нозологической формы, места проживания и возраста пациентов имеют волнообразный характер.

Заключение. Заболеваемость ОКИ в обоих исследуемых городах носит циклический характер с периодами максимумов и минимумов. Динамика заболеваемости имеет волнообразный характер. При этом, наиболее высокие ее показатели наблюдаются в группе обследуемых, проживающих в городе Железнодорожске – центре региона Курской магнитной аномалии с повышенным значением напряженности геомагнитного поля. Полученные данные косвенно указывают на волнообразную активность патогенных микроорганизмов – возбудителей ОКИ. При этом нельзя исключать и участие в этих процессах факторов защиты организма человека, среди которых при кишечных инфекциях большое значение принадлежит нормальной микрофлоре кишечника.

Список литературы

1. Бельский В.В. Особенности экологической обстановки Курской магнитной аномалии / В.В.Бельский, П.В.Калуцкий, В.В.Киселёва // Экология и

- безопасность жизнедеятельности: сборник материалов III Междунар. науч. конф.- Пенза. - 2003 - С.19-21.
2. Бельский В.В. Особенности экологической обстановки Курской магнитной аномалии и их связь с повышенной заболеваемостью населения: актовая речь на заседании ученого совета КГМУ. – Курск.- Изд.: КГМУ.- 2007. - 22с.
 3. Беседин А.В. Лабораторные показатели врожденного иммунитета крыс, как маркеры воздействия электромагнитного поля и геомагнитного поля аномальных значений / А.В. Беседин, П.В. Калущкий // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Окружающая среда и здоровье». - Рязань. -2007.- С. 9-11.
 4. Биофизические медико-биологические аспекты магнитобиологии / В.В.Бельский, М.П.Попов, П.В.Калущкий, В.В.Киселёва - Курск. - 1997.- 147с.
 5. Азанова А.В. Влияние магнитного поля промышленной частоты как экологического фактора, изменяющего концентрацию малонового диальдегида и оксида азота в крови человека // А.В. Азанова, Е.Ю. Сергеева, Ю.А. Фефелова, Н.В. Сергеев, Н.В. Цугленок // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – Красноярск. – 2012.- №5.- С. 257-259.
 6. Вершинина Н.И. Обострение гипертонической болезни и возмущенность геомагнитного поля / Н.И. Вершинина, Н.А. Петраченко, Ю.С. Шумилов // Клиническая медицина. – 1997.- №3.- С.19-20.
 7. Алексанян Г.К. Разработка метода выделения влияющих на организм человека возмущений геомагнитного поля / Современные проблемы науки и образования. – Таганрог. - 2012.- №3- С. 25-29.
 8. Медведева О.А. Сравнительная характеристика этиологической структуры дисбактериоза населения разных возрастных групп, проживающих в регионах с различными значениями напряженности геомагнитного поля. // О.А. Медведева, П.В. Калущкий, Жилиева Л.В., Климова Л.Г., Неман. М. Абдулькадер. // Известник Самарского научного центра Российской академии наук. – Курск. - № 1-7. – Том 13. - 2011.- С.1737-1740.
 9. Медведева О.А. Сравнительная характеристика количественного и качественного состояния микробиоценоза толстого кишечника у детей первого года жизни, проживающих в регионах с различными значениями напряженности геомагнитного поля.// О.А. Медведева, П.В. Калущкий, Жилиева Л.В., Беседин А.В., Медведева С.К., Остап Е.В., Иванов А.В.- Кубанский научный медицинский вестник.- Курск.- №4.- 2011.- С.145-148
 10. Калущкий П.В. Анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения различных возрастных групп регионов с повышенным и фоновым уровнями напряженности геомагнитного поля. // О.А. Медведева, П.В. Калущкий, Л.Ю. Зайцева // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН- Курск. - №3.- 2012.- 11с.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Кислюк Г.И.¹, Хохлова Е.А.¹, Смурова И.А.¹

Кафедра педиатрии и детской хирургии ФПО

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет¹,
Курск, Россия**

Аннотация. Проведено исследование 210 новорожденных детей, получивших лечение в областной инфекционной больнице г. Курск за период 2014-2015 гг. Определено, что в структуре постнатальной острой инфекционной патологии у детей 1 месяца жизни кишечные инфекции составляют 28,6% и занимают 2 место после ОРВИ. Наиболее значимыми возбудителями ОКИ у новорожденных являются ротавирусы-53,3% и стафилококки-33,3%; сальмонеллы, микст-инфекция и клостридии встречаются эпизодически. Обнаружено, что в 89% у новорожденных имело место среднетяжелое течение заболевания с умеренно выраженным инфекционным токсикозом, синдромом срыгиваний и рвоты (44,4%) и диареей (100%). У детей с ротавирусной инфекцией дополнительно отмечались признаки катара дыхательных путей. Около 2/3 детей с ОКИ имели фоновую патологию (перинатальную энцефалопатию- 36,6%, ЗВУР-28,3%, анемии-15%); 30% больных получили антибактериальную терапию после рождения в отделениях 1 и 2 этапа выхаживания новорожденных. Почти 40% новорожденных с ОКИ была выявлена сопутствующая инфекционно-воспалительная патология: ОРЗ-11%, инфекция мочевых путей- 8,3%, кожи и слизистых оболочек -19,4%.

Эффективная профилактика острых кишечных инфекций у новорожденных должна быть направлена на санитарно- просветительную работу среди матерей и эффективное лечение фоновой патологии.

Ключевые слова: новорожденные дети, ОКИ, ротавирусная и стафилококковая инфекция.

ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN NEWBORNS

Kisluk G.I. Khokhlova E.A., Smurova I.A.

Department of Pediatrics and Pediatric Surgery FPO

Kursk State Medical University ¹,

Kursk, Russia

Abstract. The study involved 210 infants who received treatment in the Kursk regional infectious diseases hospital. It was found that determined that the children of the first months of life with intestinal infections, constitute 28,6% and ranked second after acute respiratory viral infection. The most common causative agents of acute intestinal infection in newborns are rotaviruses (53,3%) and staphylococcus (33,3%), whereas salmonella, clostridium, and mixed-infections are extremely rare. In 89% of newborns has been a moderate course of disease with moderate infectious toxically

syndrome of regurgitation and vomiting (44,4%) and diarrhea (100%). Children with rotavirus further showed signs of catarrh of the upper respiratory tract. About 66% of children with acute intestinal infection had a background pathology (perinatal encephalopathy – 36,6%, intrauterine growth retardation – 28,3%, anemia – 15%). More than 30% of patients received antibiotics after birth at the offices of the first and second phase of nursing infants. Nearly 40% of infants with acute intestinal infection were related infectious and inflammatory pathology: acute respiratory disease – 11%, urinary tract infection – 8,3%, infection of the skin and mucous membranes – 19,4%.

Thus, the effective prevention of acute intestinal infections in infants should be directed to the sanitary and educational work among mothers and effective treatment of the background pathology.

Keywords: newborn babies, OKI, rotavirus and Staphylococcus infection.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают второе место после острых респираторных вирусных инфекций, чаще регистрируются в летние месяцы, до 60-70% среди заболевших составляют дети. Высокая заболеваемость в летнее время напрямую связана с несоблюдением правил личной гигиены, благоприятными условиями для развития патогенных микроорганизмов в плохо обработанных продуктах питания, в некипяченой воде.

Среди возбудителей кишечных инфекций у детей чаще встречаются сальмонеллы, шигеллы, патогенные штаммы кишечной палочки, стафилококки, иерсинии, кампилобактер, ротавирусы и др. Большинство микроорганизмов очень живучи во внешней среде и могут длительно сохраняться на разных предметах (посуде, мебели, дверных ручках), а также в почве и воде, особенно в летнее время. Путь передачи орально-фекальный и контактно-бытовой - от больных людей или носителей. В детских коллективах имеет значение контактно-бытовой путь передачи - через загрязненные игрушки, посуду, полотенца, руки персонала [2].

Клиническая картина ОКИ у детей зависит от вида возбудителя, локализации поражения (симптомы гастрита, энтерита и колита) и степени токсинемии (кишечного токсикоза) и эксикоза. Инфекционный гастрит проявляется тошнотой, рвотой, болью в эпигастрии, энтерит-схваткообразными болями в животе и диареей; колит- частым стулом со слизью, кровью, спастическими болями в животе. Проявлением интоксикации у детей является повышение температуры тела, фебрильные судороги, слабость, вялость, капризность, отказ от еды. Самым опасным симптомом кишечной инфекции является обезвоживание и водно-электролитный дисбаланс. К ранним признакам эксикоза у ребенка относятся: жажда, уменьшение частоты мочеиспусканий и количества мочи, темный цвет мочи, ее резкий запах, вязкая, густая слюна. Затем появляется сухость губ и слизистых, снижение эластичности кожи. При тяжелой степени обезвоживания ребенок становится

вялым, сонливым, заостряются черты лица, у грудничков западает родничок, отсутствует мочеиспускание в течение 6 часов, плач без слез.

Возникновение кишечной инфекции зависит от взаимодействия трех факторов: состояния макроорганизма, свойств микроорганизмов и условий внешней среды. Все они в значительной степени складываются не в пользу ребенка.

Частота ОКИ у новорожденных и детей раннего возраста определяется незрелостью желудочно-кишечного тракта (недостаточная кислотность желудочного сока, дефицит секреторных иммуноглобулинов А, сапрофитной флоры, а также слоя слизи, защищающего стенки кишечника), а также неправильным питанием (молочная диета, нейтрализующая кислую среду желудка), приемом антибиотиков, усугубляющих транзиторный дисбактериоз кишечника [1,3,5].

Большое значение в возникновении воспалительных заболеваний у новорожденных имеют внутрибольничные инфекции, вызванные госпитальными, высоко вирулентными и резистентными к антибиотикам, штаммами микроорганизмов, которые выделяются у 50% заболевших [1,2,4].

Возбудителями ОКИ могут быть самые разнообразные микроорганизмы, однако, в последние годы в этиологической структуре инфекционных заболеваний новорожденных, наряду с бактериальной инфекцией, стали чаще регистрироваться вирусные инфекции, в том числе ротавирусы [1, 2, 3].

Степень риска инфицирования новорожденного прямо пропорциональна состоянию здоровья матери, течению родов и состоянию самого ребенка, так как главными источниками заражения являются мать и персонал родильных домов и детских больниц. При этом инфицирование происходит при использовании инфицированных питательных смесей и воды, предметов ухода, медицинского инструментария, лекарственных препаратов [1, 2, 5].

Особенностью инфекционного процесса у новорожденных является слабая выраженность специфического токсикоза, что проявляется менее выраженной температурной реакцией и отсутствием характерных симптомов для данной инфекции. Течение заболевания также отличается своеобразием. У новорожденных детей выражена тенденция к присоединению осложнений, негладкому течению болезни [1,4,5].

В доступной литературе недостаточно освещены и противоречивы сведения об этиологии и клинической картине постнатальных кишечных инфекций у новорожденных детей.

Целью исследования: изучение особенностей ОКИ у новорожденных детей

Материалы и методы исследования: Нами проведено исследование историй болезни 210 новорожденных детей, получивших лечение в областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, г. Курск в 2014-2015 году. Проведена выкопировка данных анамнеза, клиники, лабораторных методов обследования и лекарственной терапии

Результаты с обсуждением: Нами определено, что наиболее частой причиной госпитализации новорожденных детей были острые респираторные заболевания – 148 (70,4%), на 2 месте – ОКИ – 60 (28,6%); стафило-стрептодермии – 10 (4,7%); менингит, коклюш - по 1 случаю (0,48%). Нами отмечена четкая сезонность ОКИ у новорожденных детей с пиком заболеваемости в летние -25 (41,7%) и осенние 18 (30%) месяцы; на зимне-весенний период пришлось только 17 (28,3) случаев. Наличие контакта с инфекционными больными выявлено только у 11 (18,3%) детей.

Все заболевшие новорожденные были доношенными, преимущественно - мальчики 39 (65%), дети из сельской местности 32 (53,3%). У 72% обследованных детей имел место отягощенный преморбидный фон: перинатальная энцефалопатия (ПЭП)-22 (36,6%), задержка внутриутробного развития легкой степени (ЗВУР)-17 (28,3%), конъюгационная желтуха -8 (13,3%), анемия 1 степени- 9 (15%), у 2 (3,3%) детей были пороки развития почек, у 1 (1,6%) - внутриутробная пневмония. У десяти детей (16,6%) было по 2-3 фоновых заболевания. Восемнадцать (30%) детей получили лечение в отделениях 1 и 2 этапа выхаживания новорожденных, включающее антибактериальную терапию.

Нами определено, что кишечная инфекция у новорожденных детей чаще манифестировала в возрасте 21,6+-6,8 дней: до 6-7 дней - 3 (5%), до 2 недель - 12 (20%), до 3 недель- 8 (13,3%), до 4 недель- 37(61,7%).

В течение 1 суток болезни были госпитализированы 29 (48,3%) детей. Лечение на дому (энтеросорбенты, биопрепараты, цефекон, фурадонин) в течение 2 дней до госпитализации получили 17 (28,3%), в течение 3-6 дней - 10 (16,6%) младенцев. Четверо детей (6,8%) были переведены из ЦРБ по тяжести состояния.

В этиологии кишечных инфекций у новорожденных детей лидирующее значение имеют ротавирусы- 32 (53,3%), стафилококки-20 (*S. aureus*)-33,3%, причем у 13 (21,7%) детей выявлена сочетанная ротавирусно-стафилококковая инфекция. Сальмонеллы, микст-инфекция (сочетание энтеровирусов, герпес- и ротавирусов) и клостридии (*Cl. defficile*) были выделены по одному случаю (1,6%). Этиологию заболевания не удалось идентифицировать - у 17 (28,3%).

У всех больных был инфекционный токсикоз (средней степени-89%, тяжелой-11%):гипертермия (37,6+-0,81 гр), вялость, нарушение самочувствия (70%), срыгивания и рвота (44,4%), диарея, патологические примеси в кале (слизь, зелень, лейкоциты) - 100%. У части (14,5%) детей (с ротавирусной инфекцией) параллельно имел место катар дыхательных путей: кашель (8,3%), насморк (13,9%), жесткое дыхание в легких (11,1%).

Инфекционный гастроэнтерит был у зарегистрирован в 31 (51,7%), энтероколит - в 17 (28,3%), энтерит - в 10 (16,7%), септическое течение – в 2 (3,3%) случаев.

У 39% больных на фоне ОКИ была выявлена сопутствующая воспалительная патология (ОРЗ -11%, инфекция мочевых путей – 8,3%, пузырчатка, кандидоз кожи и слизистых-19,4%), гепатит и сепсис- по 3,3%.

Сочетанные инфекционные заболевания чаще (44%) регистрировалась у детей с фоновой патологией.

Нами выявлена прямая зависимость между тяжестью течения ОКИ и сопутствующими и фоновыми заболеваниями: интранатальной асфиксией ($r=0,88$, $p<0,001$), перинатальной энцефалопатией ($r=0,92$, $p<0,001$), задержкой внутриутробного развития ($r=0,91$, $p<0,001$), ОРЗ ($r=0,98$, $p<0,0001$), инфекцией мочевых путей ($r=0,92$, $p<0,001$); с отягощенным антенатальным анамнезом: инфекционными заболеваниями матери во время беременности ($r=0,88$, $p<0,01$), оперативным родоразрешением ($r=0,82$, $p<0,001$).

Обращал на себя внимание тот факт, что большинство (69,4%) детей находились на грудном вскармливании, однако среди детей с тяжелым течением ОКИ на естественном вскармливании было только 33,3%. Возможно, поэтому в группе обследованных детей не было случаев токсикоза с эксикозом.

Основой лечения кишечных инфекций у детей является восстановление водно-электролитного баланса- оральная регидратация или внутривенное введение растворов, применение энтеросорбентов (смекта, энтеросгель, полифепан и другие), использование антибактериальной и противовирусной и иммунотерапии [1,2].

Нами определено, что в инфузионной терапии нуждалось только 8,3% детей. Антибактериальную терапию получили 70% больных: цефалоспорины 3 и 5 поколения, аминогликозиды, метрогил, меронем, ванкомицин), противовирусные препараты- 53%, КИП -25%, все дети получили энтеросорбенты и биопрепараты.

Длительность стационарного лечения в среднем составила $6,3\pm 2,7$ суток, при тяжелом течении – 15-22 дня.

У всех младенцев имел место благоприятный исход ОКИ, с выпиской на участок 97,2%; одному новорожденному с вторичным пиелонефритом на фоне гидронефроза потребовалось продолжение лечения в соматическом стационаре.

Выводы:

1. В структуре постнатальной острой инфекционной патологии у детей 1 месяца жизни кишечные инфекции составляют 28,6 и занимают 2 место после ОРВИ.
2. Среди идентифицированных возбудителей (71,7% случаев), ведущее значение в этиологии ОКИ у новорожденных имеют ротавирусы-53,3%, стафилококки-33,3%; сальмонеллы, микст-инфекция (сочетание энтеровирусов, герпес- и ротавирусов) и клостридии составили соответственно – по 1,6%.
3. Клинические проявления ОКИ у новорожденных детей характеризуются инфекционным токсикозом: гипертермия ($37,6\pm 0,81$ гр) с нарушением самочувствия (69,4%), синдромом срыгиваний и рвоты (44,4%) и диареей (100%). У детей с ротавирусной инфекцией параллельно выявлены катаральные изменения со стороны дыхательных путей с кашлем (8,3%), насморком (13,9%), жестким дыханием в легких (11,1%).

4. Кишечной инфекцией чаще болеют новорожденные мальчики (65%), дети из сельской местности (53,3%), пик заболеваемости – лето - осень (72,2%).
5. Чаще ОКИ у новорожденных протекает в виде гастроэнтерита (51,7%), реже- в виде энтероколита- у 28,3%, энтерита - 16,7%; септическое течение отмечено в 3,3% случаев.
6. У 72% детей кишечная инфекция развивалась на фоне: перинатальной энцефалопатии- 36,6%, ЗВУР-28,3%, конъюгационной желтухи- 13,3%, анемии-15%, пороков развития почек-3,3% внутриутробной пневмонии-1,6%. Причем у 16,6% имелось по 2-3 фоновых заболевания. При этом 30% больных получили антибактериальную терапию после рождения в отделениях 1 и 2 этапа выхаживания новорожденных.
7. Почти у 40% новорожденных с ОКИ была выявлена сопутствующая инфекционно-воспалительная патология: ОРЗ-11%, инфекция мочевых путей- 8,3%, кожи и слизистых оболочек -19,4%
8. Выявлена прямая зависимость между тяжестью течения ОКИ и сопутствующей патологией: интранатальной асфиксией ($r=0,88$, $p<0,001$), перинатальной энцефалопатией ($r=0,92$, $p<0,001$), задержкой внутриутробного развития ($r=0,91$, $p<0,001$); отягощенным антенатальным анамнезом: инфекционные заболевания матери во время беременности ($r=0,88$, $p<0,01$), оперативное родоразрешение ($r=0,82$, $p<0,001$); характером вскармливания ($r=0,85$, $p<0,01$).
9. Среднетяжелое течение ОКИ у 92% больных, отсутствие признаков эксикоза, благоприятный исход заболевания отражают особенность течения кишечных инфекций у новорожденных детей на современном этапе.

Заключение

Среди постнатальной инфекционно-воспалительной патологии ОКИ занимают 2 место и регистрируются в 1/3 случаев. Заболевание имеет сезонность с пиком в летне-осенние месяцы; чаще (65%) регистрируется у мальчиков, у новорожденных с отягощенным преморбидным фоном (63,7%): перинатальной энцефалопатией, с задержкой внутриутробного развития, анемией, конъюгационной желтухой и др. У этих младенцев, даже при наличии грудного вскармливания, имеет место риск возникновения ОКИ при несоблюдении матерью санитарно - гигиенического режима. Следовательно, профилактика острых кишечных инфекций должна быть направлена на санитарно- просветительную работу среди матерей, и эффективное лечение фоновой патологии у новорожденных детей.

Список литературы

1. Хазанов А.И. Клиническая неонатология, СПб, Гиппократ.- 2009.- 362-406
2. Тимченко В.Н., Леванович В.В., Михайлов И.Б. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций. С-Пб., ЭЛБИ-СПб. -2007. – С. 377

3. Кислюк ГИ. Структура внебольничных инфекций у новорожденных детей/ Е.А. Хохлова Е.А., Л.В. Никитина, В.Н. Снопков, В.Г. Бречка // Матер. Всероссийского ежегодного конгресса «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика». СПб. - 2010. - С. 98-99.
4. Кислюк Г.И. Биологические факторы, формирующие группы риска у новорожденных в периоде ранней неонатальной адаптации / Барышев Ю.В., Пошибайлова А.В.// Материалы Международной научно-практической конференции. - Курск, 2012. – С 84-88.
5. Кислюк Г.И. Показатели здоровья у детей с задержкой внутриутробного развития / О.Я. Янчук, Е.Т. Кириленко// Матер. I Межд. Конгресса по перинатальной медицине, посвященного 85-летию академика РАМН В.А. Таболина, и VI Ежегодного Конгресса специалистов перинатальной медицины, 2011. -С. 71.

**ВЗАИМОСВЯЗЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МАРКЕРОВ
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА С ЧАСТОТОЙ
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ**

Клычева О.И., Лазарева Г.А., Хурасева А.Б.

Кафедра акушерства и гинекологии ФПО

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия**

Аннотация. Внутриутробное инфицирование занимает одно из первых мест среди причин формирования патологии перинатального периода. Проведено обследование 120 беременных женщин, родивших в сроки от 22 до 37 недель гестации. Выявлены наиболее часто встречаемые ультразвуковые маркеры внутриутробного инфицирования плода.

Ключевые слова: внутриутробное инфицирование плода, фетоплацентарная недостаточность, ультразвуковая диагностика.

**CORRELATION OF ULTRASOUND MARKERS OF INTRAUTERINE
INFECTION OF THE FETUS WITH A FREQUENCY OF
OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS**

Klichiova O.I., Lazareva G.A., Huraseva A.B.

Department of obstetrics and Gynecology FPO,

Kursk State Medical University,

Kursk, Russia

Abstract. Intrauterine infection is one of the first places among the reasons for the formation of perinatal pathology. The study involved 120 pregnant women who gave birth in the period from 22 to 37 weeks of gestation. Identified most frequent ultrasound markers of intrauterine infection of the fetus.

Key words: intrauterine infection of the fetus, fetoplacental insufficiency, ultrasound.

На сегодняшний день заболевания, передающиеся половым путем, чрезвычайно распространены во всем мире. Следствием заражения ими становятся воспалительные заболевания половой системы, которые являются одной из самых частых причин обращения женщин к гинекологам. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), оказывают множество неблагоприятных воздействий на здоровье женщин, но самым значительным является урон, наносимый репродуктивной функции. Прежде всего возникают сложности с зачатием, а также с течением беременности и развитием плода. Существует множество ИППП, виновниками которых могут быть бактерии, вирусы и простейшие. К основным видам, влияющим на течение беременности и развитие плода, относятся: гонококки, бледная трепонема, трихомонада, а

также хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, цитомегаловирус, генитальный герпес и вирус папилломы человека [2, 4].

В большинстве случаев основной причиной внутриутробного инфицирования (ВУИ) можно назвать восходящее бактериальное инфицирование, которое является пусковым механизмом и способствует развитию прогрессирующего воспаления в плаценте, что может быть серьезной угрозой для дальнейшего благополучного развития беременности на любом ее сроке и отрицательно сказывается на здоровье плода [1, 3]. При патологическом течении беременности всегда в той или иной степени отмечается фетоплацентарная недостаточность (ФПН). Синдром задержки роста плода (СЗРП) является одним из клинических проявлений ФПН и ВУИ, и определяет высокий уровень перинатальной заболеваемости и смертности. СЗРП является второй после недоношенности причиной рождения детей с низкой массой тела и осложняет течение 2,4-17% беременностей. В России, по сравнению с европейскими странами, ВУИ занимает одно из первых мест среди причин перинатальной смертности и достигает 65,6%, причем в последнее десятилетие отмечается прогрессивное увеличение. Насчитывается более 2500 возбудителей, способных вызвать внутриутробное инфицирование плода и их количество неуклонно растет [6, 7].

В условиях сниженной неспецифической резистентности материнского организма, развитие экссудативного воспаления в плодных оболочках, плаценте и пуповине очень часто сочетается с инфицированием непосредственно плода, возникновением внутриутробной пневмонии, задержки внутриутробного развития и других патологических процессов [2, 5].

На разных сроках беременности под влиянием одного или нескольких инфекционных агентов происходит активация функций плаценты, повышение компенсаторно-приспособительных процессов. Существует ряд патогномичных признаков внутриутробной инфекции и фетоплацентарной недостаточности, определяющихся при ультразвуковом исследовании (УЗИ) [6, 7].

Целью данного исследования был анализ взаимосвязи ультразвуковых маркеров ВУИ и ИППП.

В настоящей работе представлены результаты клинко-лабораторного исследования течения беременности и родов у 120 женщин в сроки от 22 до 37 недель гестации. Использовался клинко-anamнестический анализ, ультразвуковое и доплерометрическое исследование плода и плаценты (ультразвуковой прибор «Aloka SSD-1700»), кардиотокография (фетальный монитор: интранатальный автоматизированный кардиотокограф G6B /G6B PLUS+), бактериологическое исследование микрофлоры влагалища, патоморфологическое исследование последов, бактериологические посевы с последов.

Критериями включения пациенток в наше исследование являлось наличие одноплодной беременности в сроки от 22 до 37 недель гестации, подтвержденный диагноз ФПН и ВУИ, наличие синдрома задержки развития

плода 1 степени, наличие синдрома задержки развития плода 2 степени, ассиметричная форма задержки развития плода.

Критерии исключения: синдром задержки развития плода 3 степени, симметричная форма задержки развития плода в силу высокой частоты хромосомных аномалий у плодов и бесперспективности коррекции данной патологии, экстрагенитальная патология у беременной женщины в стадии декомпенсации, диагностированные пороки развития плода.

Полученные результаты обработаны с помощью пакета стандартных программ Excel for Windows; при использовании критерия Стьюдента различия между сравниваемыми величинами признавали статистически достоверными при значении $p < 0,05$.

Корреляционный анализ проводился при помощи непараметрического метода Спирмена (r). Связь оценивалась как сильная при абсолютном значении коэффициента корреляции $r > 0,7$, как имеющая среднюю силу при $r = 0,3-0,69$ и как слабая – при $r < 0,29$.

По нашим данным, среди обследованных женщин преобладали пациентки в возрасте 26-30 лет – 66,7%, старше 30 лет – 20%, моложе 26 лет – 13,3%.

Инфекционный процесс при ВУИ подразделяется на три группы синдромов: инфицирование околоплодных вод (амнионит); инфицирование плаценты (плацентит); инфицирование плода. В связи с этим ультразвуковые маркеры были разделены на соответствующие группы.

К эхографическим маркерам амнионита относятся: многоводие, маловодие, гиперэхогенная взвесь в околоплодных водах, синдром амниотических тяжей. При оценке объема и качества околоплодных вод были выявлены следующие закономерности. Данная патология определялась у 24 (20,0%) пациенток, из них у 20 (16,7%) в виде умеренно выраженного многоводия с индексом амниотической жидкости 185 ± 25 мм, у 4 (3,3%) – в виде умеренно выраженного маловодия с индексом амниотической жидкости 110 ± 10 мм. Примеси в околоплодных водах и амниотические тяжи не были обнаружены у обследуемых женщин.

По данным ультразвукового исследования структурной организации плаценты получены следующие результаты. Нарушения зарегистрированы у 41 (34,2%) женщин, из них у 16 (13,3%) была выявлена плацентомегалия, толщина плаценты в среднем составляла $45,5 \pm 4$ мм. В 10 (8,3%) случаях были обнаружены мелкоочечные гиперэхогенные кальцификаты, как следствие воспалительного процесса в плаценте. Доля преждевременного созревания плаценты у пациенток с ВУИ составляла 39,2% (47 человек), которое регистрировалось с 33-34 недель беременности. Гипоплазия плаценты была у 14 (11,7%) женщин, толщина плаценты - $27,3 \pm 3$ мм. Сочетание признаков наблюдалось в 12 (10,0%) случаях, причем, наиболее частыми сочетаниями были преждевременное созревание плаценты и мелкоочечные гиперэхогенные кальцификаты.

К УЗ-маркерам инфекционного поражения плода относится пиелозктазия, расширение петель кишечника, гепатоспленомегалия, кальцификаты в печени, кардиомегалия с гидроперикардом, гидроторакс, плевральный выпот, венрикуломегалия, появление линейных гиперэхогенных включений перивентрикулярных зон головного мозга плода, неиммунная водянка, синдром задержки развития плода. В ходе нашего исследования у плодов было выявлено 10 случаев (8,3%) пиелозктазии, 4 случая (3,3%) расширения петель кишечника, 2 (1,7%) – венрикуломегалии и 2 (1,7%) – кардиомегалии.

Анализ показателей доплерометрии маточно-плацентарно-плодового кровотока в 64 (53,3%) случаях не выявил нарушений КСК (изменения частоты отраженного сигнала, регистрирующихся в виде кривых скоростей кровотока). У 42 (35,0%) пациенток диагностирована фетоплацентарная недостаточность, соответствующая нарушению гемодинамики I А степени, у 14 (11,7%) – фетоплацентарная недостаточность, соответствующая нарушению гемодинамики I Б степени. Субкомпенсированной и декомпенсированной ФПН, наблюдающейся при выраженных гемодинамических нарушениях, у беременных зафиксировано не было.

На кардиотокограммах отмечалось снижение вариабельности сердечного ритма у 75 плодов, что составляет 62,5%. Децелерации регистрировались у 12 (10,0%). В то же время у 45 плода (37,5%) с ВУИ зарегистрирована нормальная КТГ.

При бактериологическом исследовании отделяемого цервикального канала в 78,3% случаев высевалась условно-патогенная и патогенная флора. В структуре выделенной флоры преобладали представители *Ureaplasma* – 22,3%, *Mycoplasma* – 26,4%, *E. coli*, *Enter. Faecalis* – 18,2% и 17,9% соответственно и *C. Albicans* – 15,2%. Бактериальный вагиноз был диагностирован у 26,6% (32) беременных женщин, кандидоз – у 15,8% (19), хламидиоз – у 25,0% (30) женщин, уреаплазмоз – у 5,0% (6), токсоплазмоз в I группе был у 5,8% (7) женщин. Хроническое вирусоносительство: вирус простого герпеса I и II типа у 5,0% (6) беременных; вирус папилломы человека у 4,2% (5) беременных; цитомегаловирусная инфекция у 8,3% (10). Впервые диагностированный сифилис во время данной беременности был у 1,7% (2) пациенток. В анамнезе 6,7% (8) женщин имели первичный сифилис, но к моменту наступления настоящей беременности были сняты с учета и имели справку из ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер» о том, что в дополнительном лечении не нуждаются. Моноинфекция была диагностирована в 31,6%, в остальных случаях (68,4%) были выявлены ассоциации микроорганизмов.

Патоморфологическое исследование последов показало, что в 46,7% (56) случаях микроскопически ворсины зрелые, пуповина и плодные оболочки обычной гистоструктуры (зрелая плацента), 34,2% (41) – ворсины незрелого и промежуточного типов, диффузные участки афункциональных зон, псевдоинфаркты плаценты, 19,2% (23) – ворсины мелкого калибра с выраженными компенсаторными изменениями, отложения фибриноида на

поверхности ворсин. То есть в 53,4% было выявлено отставание в развитии и созревании плаценты.

Бактериологические посевы с последов выявили условно-патогенную и патогенную флору. Преобладали представители *E. Coli* – 62,4%, *Acinetobacter* - 46,2%, *Enterobacter* - 24,7%, *Streptococcus faecalis* - 31,3%, *Staphylococcus epidermidis* - 23,3%, *Staphylococcus aureus* - 27,2%, *Candida* и *Klebsiella* - 11,3% и 14,9% соответственно и прочие микроорганизмы составляли 10,0%.

По данным нашего исследования можно сделать вывод, что наиболее частым ультразвуковым маркером ВУИ является преждевременное созревание плаценты 39,2%, на втором месте – многоводие 16,7%, на третьем – плацентомегалия – 13,3%. Эхографическими маркерами собственно инфекционного поражения плода были пиелозктазия 8,3%, расширение петель кишечника 3,3%, венрикуломегалия 1,7% и кардиомегалия 1,7%. Вышеперечисленные маркеры ВУИ являются наиболее значимыми для диагностики данной патологии беременности.

Наличие микробного обсеменения последа приводит к выраженным морфологическим изменениям в маточно-плацентарно-плодовом комплексе. Степень патологического поражения плаценты коррелирует с наличием бактериальных и/или бактериально-вирусных ассоциаций ($r>0,7$). Сочетание бактериального и вирусного поражения последа вызывает необратимые нарушения приспособительных свойств плацентарного комплекса, что и оказывает негативное влияние на течение беременности и внутриутробное развитие плода.

Список литературы

1. Макаров О.В., Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В. Диагностическое значение исследования амниотической жидкости при внутриутробном инфицировании // Акушерство и гинекология. - 2003. - №4. - С.3-4.
2. Новиков Е.И., Глуховец Б.И., Кравченко П.Б. Клинико-морфологические особенности поздних самопроизвольных выкидышей сопровождающихся системной воспалительной реакцией // Журнал «Инфекции в хирургии». –2010. - Том 8. - № 1. - С.9-13.
3. Радзинский В.Е., Ордиянц И.М., Четвертакова Э.С. Двухэтапная терапия вагинальных инфекций // Акушерство и гинекология. - 2011. - №5. - С. 78-81.
4. Рогожина И. Е., Махова Г. Е., Проданова Е. В. Перспективы применения нормобарической интервальной гипоксической тренировки в лечении фетоплацентарной недостаточности (обзор литературы)// Саратовский научно-медицинский журнал.-2010.-№3.-С.20-25.
5. Савичева А. М., Шипицына Е. В. Перинатальные инфекции: проблемы и пути решения // Акушерство и гинекология. - 2009. - №3. - С. 33-38.
6. Тирская Ю.И. Современная оценка состояния плода у матерей с высоким риском внутриутробной инфекции// Проблемы здоровья женщин

репродуктивного возраста (материалы межрегиональной научно-практической конференции). - Омск, 2009.-С.120-124.

7. Юрасова, Е.А. Эффективность антимикробной терапии у беременных женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы в различные сроки гестации // Дальневосточный медицинский журнал. – 2008. - № 2 – С.57-60.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ковальчук В.Г.¹, Лукашов М.И.¹, Письменная Е.В.¹, Сироткина Е.И.²
ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»¹

ФГБОУ ВО Курский Государственный Медицинский Университет²,
Курск, Россия

Аннотация. Предотвращение распространения ВИЧ - инфекции является сложной многофакторной задачей, которая требует сотрудничества медицинских и социальных учреждений, а работа с группами риска населения имеет чрезвычайно важное значение. По результатам проведенного анализа анонимных анкет за 2014 и 2015 годы установлено, что в 2015 году удельный вес информированности населения области о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах ее профилактики увеличился против показателей 2014 года на 12,1% и составил 43,3%.

Ключевые слова: ВИЧ - инфекция, методы профилактики, группы риска.

THE FEATURES OF HIV-INFECTION PROFYLAXIS IN KURSK REGION

Kovalchuk V.G., Lukashov M.I., Pismennaya E.V., Tishina E.I.

Kursk oblast clinical dermatological and venereal dispensary,
Kursk State Medical University
Kursk, Russia

Abstract. The prevention of HIV-infection's spreading is a complex, multifactorial task, which requires a cooperation of health and social institutions, work with the risk groups of population is extremely important. The results of anonymous questionnaires' analysis through 2014-2015 years reflect increasing the index of awareness (in 2015 it's 12,1% higher compare to 2014 which makes 43,3% totally) among the population of Kursk region concerning the routes of affection and methods of profylaxis of HIV-infection.

Key words: HIV-infection, methods of profylaxis, risk groups.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Курской области, как и в целом по Российской Федерации, продолжает разрастаться, неуклонно увеличивается количество людей, живущих с ВИЧ. Болезнь поражает людей в молодом, репродуктивном и наиболее трудоспособном возрасте, носит пожизненный характер, приводит к негативным социальным, экономическим и демографическим последствиям. Несмотря на значительные успехи в лечении ВИЧ-инфицированных с применением высокоактивной антиретровирусной терапии, к сожалению, заболевание остается не излечимым. Отсутствие

специфической профилактики не позволяет сдерживать данное заболевание в обществе.

На этом фоне, обеспечение лечением и уходом ВИЧ-инфицированных лиц становится все более затратной статьей расходов в бюджете Российской Федерации, в том числе и в Курской области. Поэтому, самым эффективным, самым экономическим и самым мощным ответом общества эпидемии ВИЧ-инфекции, является создание условий, ограничивающих распространение заболевания, то есть – проведение профилактических мероприятий. Накопленный мировой опыт борьбы с ВИЧ-инфекцией показывает, что в настоящее время альтернативы профилактике нет, и только просвещение и обучение населения поведению, безопасному в плане заражения ВИЧ, могут радикально повлиять на изменение сложившейся обстановки.

Борьба с ВИЧ-инфекцией – это проблема не только здравоохранения. Это сложная и многосторонняя проблема, затрагивающая социальную, экономическую, образовательную, культурную жизнь общества, вопросы нравственности и морали. Следовательно, и меры противодействия эпидемии должны быть многоаспектными и не ограничиваться только медицинскими. Задача предупреждения распространения ВИЧ/СПИД не может и не должна решаться отдельным ведомством.

ВИЧ-инфекция относится к разряду социальных заболеваний, в борьбе с которыми профилактика занимает одно из ведущих мест и ее необходимо проводить повсеместно и широкомасштабно, охватывая все населения, особенно наиболее уязвимые его группы.

Работа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции регламентируется правовыми документами РФ и Министерства здравоохранения РФ, и в Курской области предусматривает следующие методы профилактики:

Первичная – информационно-профилактическая работа среди всего населения на специфические причинные факторы, способствующие повышению риска заражения. На этом этапе проводят пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения и потребления наркотиков, безопасный секс. Осуществляется массовый скрининг.

Вторичная – информационно-профилактическая работа среди групп риска (ПИН, КСР, МСМ и т.д.) по ВИЧ-инфекции. В этих целях проводится поисковый скрининг среди данных групп, ранее выявление и специфическое лечение больных ВИЧ-инфекцией.

Третичная – информационно-профилактическая работа среди инфицированных ВИЧ. Научить жить ВИЧ-инфицированных людей в обществе, не распространяя заболевание, обеспечить их специфическим лечением и реабилитацией.

В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции в Курской области вышла за пределы уязвимых групп и все сильнее затрагивает самые широкие слои населения. В 66,7% случаев составляет половой путь заражения. За последние 5 лет, в связи с изменением наркологической сцены в области, культурой приема наркотических препаратов, с каждым годом увеличивается доля ВИЧ-

инфицированных с наркотическим путем заражения (с 20% в 2011 г. до 41,4% в 2015 г.). В динамике растет удельный вес ВИЧ-инфицированных в возрасте 20-39 лет. По социальному положению случаи ВИЧ-инфекции в группе работающих встречаются в 41,6% , в группе не работающих – 39,9% случаев. Одним из факторов, способствующих распространению заболевания, является недостаточный охват населения профилактическими программами и услугами и как следствие, отсутствие знаний о механизмах распространения эпидемии и низкое осознание людьми собственного риска заражения.

Основные группы населения, на которые направлена и ориентирована профилактическая работа по ВИЧ/СПИД, являются: население региона в целом, трудовые коллективы, подростки и молодежь, медицинские работники, представители уязвимых групп (потребители наркотиков, работники коммерческого секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами и др.), лица, живущие с ВИЧ-инфекцией.

Обучение населения навыкам предупреждения заражения ВИЧ-инфекции осуществляется разными формами и методами профилактики:

Массовая – обеспечивается распространение общей информации о рисках заражения и способах предотвращения заражения ВИЧ среди больших масс населения. В этих целях используются средства массовой информации: телевидение, радиовещание, периодическая печать, интернет-сайты; плакаты, видеопанели развлекательно-торговых комплексов, авто- и железнодорожных вокзалов; уличные рекламные видеопанели, баннеры, массовые молодежные акции и форумы. На молодежных акциях, форумах проводится анонимное анкетирование участников мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, наглядная экспресс оценка уровня знаний вопросов ВИЧ-инфекции. В рамках выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 г. № 1585 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранение» для обеспечения информационно-профилактической работы медицинскими организациями области по профилактике ВИЧ-инфекции было освоено в 2015 г. более 2 663 тыс. руб. Разработано 13 наименований печатной продукции и напечатано 67 000 шт., изготовлено 4 видео и 4 аудио ролика. Все изготовленные ауди- и видеоролики записаны на 1260 электронных дисках. Информационные материалы, согласно распоряжений комитета здравоохранения Курской области, были распространены среди лечебных учреждений области с целью их распространения среди населения, трудовых и учебных коллективов области. Аудио и видео материалы транслировались через региональные теле- и радиокomпании, на видеопанелях и радио торгово-развлекательных комплексов, в ночных клубах досуга населения, авто и железнодорожном вокзалах, на уличных рекламных видеопанелях и баннерах, с сентября по декабрь 2015 г. В 2014 г. информационная компания через СМИ проводилась только в декабре. На массовых молодежных акциях и форумах

распространялись печатные информационные материалы, проводился экспресс опрос и анонимное анкетирование по определению в населения уровня знаний вопросов профилактики ВИЧ-инфекции, проанкетировано 522 человек. На массовых мероприятиях специалистами Центра СПИД было охвачено профилактической работой более 7000 человек (в 2,2 раза больше 2014 г.).

Групповая - представление информации, направленной на однородную группу населения. Данный метод информационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции использовался среди учащейся молодежи, педагогов, работников здравоохранения, родителей, военнослужащих, работающего населения. Групповое обучение проводится в форме лекций, бесед, обсуждение в группах (дискуссии, мозговые штурмы), обучение практикой действия (ролевые игры, игровые ситуации, практические занятия), диспутов, круглых столов, семинаров, тренингов. В виде наглядных материалов используются презентации, видеофильмы, видеоролики, плакаты, при работе в подгруппах используется флешкарты. После проведенных занятий распространяются специальные информационные материалы (брошюры, буклеты, памятки, листовки). Перед проведением информационной работы среди слушателей проводится анонимная проверка «входного уровня знаний» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в виде анкетирования, аналогичное анкетирование по тем же вопросам проводится в конце занятия - «выходной уровень знаний». Данная методика позволяет определить качество проведенного занятия.

В рамках групповых занятий специалистами Центра СПИД охвачено более 2300 учащейся молодежи (на 7% больше чем в 2014 г), проведено более 80 занятий. Данная профилактическая работа проводится при активном участии Комитета по делам молодежи и туризму Курской области. Отделом молодежи Сеймского округа г. Курска ежегодно разрабатывает план график занятий по вопросам негативных явлений в молодежной среде. В данных мероприятиях участвуют представители Госнаркомконтроля по Курской области, Центра СПИД, ОБУЗ «Областная наркологическая больница». Государственное учреждение «Областной центр молодежных программ» ежегодно разрабатывает областную программу «Твой выбор - Твоя жизнь», которая носит межведомственное взаимодействие. По программе ежемесячно по разным районам области в районных домах культуры проводятся информационные мероприятия для молодежи и населения районов по профилактике наркопотребления, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передаваемых половым путем, табакокурения, алкоголизма. В летний период данные мероприятия проводятся в детских оздоровительных лагерях Курской области. При активном участии ОГБУ ДПО «Курского института развития образования» проводятся курсы лекций для преподавателей. Во время работы призывной комиссии Курского областного комиссариата проводится информационная работа с призывниками на областном призывном пункте. На «Днях специалистов» для работников здравоохранения, по утвержденному графику, доводится информация по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции, где

особое внимание уделяется ежеквартальной подготовке доверенных врачей по ВИЧ-инфекции. По двухстороннему соглашению между ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» специалисты Центра СПИД еженедельно участвуют в подготовке декретированного населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, профилактической работой охвачено более 30778 человек. В Региональном открытом социальном институте г. Курска профессор, д.м.н. Л.М.Ахметзянов разработал и внедрил в работу электронный ресурс в разделе «Безопасность жизнедеятельности». Данная электронная программа позволяет в режиме обучения и тестирования уровня знаний готовить студентов данного учебного заведения и принимать зачеты по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты Центра СПИД непосредственно участвуют в подготовке студентов по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции и её профилактике, охвачено и проанкетировано 350 учащихся. По трехстороннему соглашению между Курским государственным медицинским университетом, ОБУЗ «Курский кожвендиспансер» и Курским региональным объединением ЛЖВС «Мельница» создано и работает более 10 лет волонтерское движение «Свобода в жизни», куда входит волонтерский отряд «STOP-СПИД» из числа студентов медицинского университета. Волонтеры отряда принимают активное участие в проведении массовых и групповых мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции по первичной профилактике на уровне «равный-равному». Для представителей реабилитационных центров в г. Курске, по согласованному графику, проводятся информационные мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в виде семинаров-тренингов, распространяются информационные материалы. По их желанию проводится обследование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис.

Индивидуальная – когда информация касается особенностей жизни и поведения отдельного человека. Данная профилактическая работа является наиболее эффективной, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на особенностях поведения и проблемах отдельно взятого обучаемого лица. Недостаток ее – малый одномоментный охват населения.

Индивидуальный метод профилактики используется медицинскими работниками при проведении до- и послетестового консультирования при тестировании на ВИЧ-инфекцию, данный метод закреплен ст. 4 ФЗ от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Индивидуальное консультирование – это важный элемент общей профилактической работы с населением. В Курской области в 2015 г. протестировано на ВИЧ-инфекцию 17,9% жителей области. Учитывая, что проведению диагностики ВИЧ-инфекции в законодательном порядке предшествует дотестовое консультирование, а после получения результатов лабораторного исследования - послетестовое консультирование, то 17,9% населения области получило конфиденциальную, квалифицированную, доступную и полную информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции, способах

защиты от заражения, а при необходимости даны рекомендации о изменении поведения, рискованного в плане заражения ВИЧ. Большое внимание данному методу профилактики уделяется при проведении третичной профилактики – во время оказании медицинских услуг ВИЧ-инфицированным, где принимают участия не только медицинские работники но и психолог, специалист по социальной работы, равные консультанты из числа ЛЖВС.

Проведение профилактической работы на разные группы населения имеет свои плюсы и минусы, поэтому конечный эффект достигается только при одновременной работе на все три группы населения (первичная, вторичная и третичная профилактика).

По результатам проведенного анализа анонимных анкет за 2014 и 2015 годы установлено, что в 2015 году удельный вес информированности населения области о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах ее профилактики увеличилась против показателей 2014 года на 12,1% и составил 43,3%.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ПАТОМОРФОЗА, ИНДУЦИРОВАННОГО ВИЧ- ИНФЕКЦИЕЙ

*Ковтун В.Н.², Новикова С.Н.¹, Лебедев И.Ю.¹, Шахова Ю.И.²,
Ледовская Т.И.², Пастухова Е.А.¹*

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет ¹
ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер"²
Курск, Россия**

Аннотация. 62 пациентов с ВИЧ ассоциированным ТБ были определены социального статуса и социальной деятельности с помощью специального вопросника, а затем его результаты были сопоставлены с данными из контрольной группы. Больных туберкулезом с ВИЧ инфекцией были определены низкого уровня доходов, плохая адаптация к новым условиям жизни, неспособность поднять уровень образования и квалификации, отсутствие спроса на рынке труда. Все эти факторы снижения социального статуса, перемещение больных людей к нижней и даже маргинальных сегмент населения, из-за угрозы для общества, как это имеет высокий риск эпидемии.

Ключевые слова: ВИЧ ассоциированного ТБ, социальная активность, социальный статус.

The social activity of the TB patients with HIV-infection.

**Novikova S.N., Pastuhova E.A., Lebedev I.Y., Shahova Y.I., Ledovskaya T.I.,
Kovtun V.N.,**

**Kursk State Medical University ¹
Regional clinical TB dispensary ²
Kursk, Russia.**

Abstract. 62 patients with HIV-associated TB were determined social status and social activities with the help of a special questionnaire, and then its results were compared with data the of control group. TB patients with HIV-infection were determined low level income, poor adaptation to new conditions of life, the inability to raise the level of education and skills, lack of demand in the labor market. All these factors decrease the social status, move sick people to the lower and even a marginal segment of population, due to a threat to society, as this has a high epidemic risk.

Keywords: HIV-associated TB, social activity, social status.

Рост заболеваемости ВИЧ-ассоциированным туберкулезом ставит вопрос о совершенствовании индивидуального подхода к этой категории больных, с учетом оценки их социальной активности (СА) [1,3]. Реализуя потребности в социальном участии, превращая личность в субъект социального действия и общественных отношений, СА повышает удовлетворенность жизнью, помогает

пациенту оставаться мотивированным в трудных жизненных ситуациях, решать многочисленные задачи, связанные с лечением [4,6]. В то же время, низкая СА сопровождается эмоциональным дискомфортом, приводит к практике девиантного, антиобщественного поведения, депрессии и алкоголизму, затрудняет оказание медицинских услуг, снижает эффективность проводимых лечебных мероприятий.

Данные литературы об изучении социальной активности при туберкулезе немногочисленны [2,5] Ее изменения у пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в условиях его патоморфоза нуждаются в дальнейшем изучении.

Цель исследования: социальная активность больных туберкулезом легких в условиях его патоморфоза, индуцированного ВИЧ-инфекцией

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 62 впервые выявленных больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (40 муж. и 22 жен.), в возрасте от 20 до 60 лет, проходивших лечение в противотуберкулезном стационаре (1 группа). В качестве контроля обследована 2-я группа (62 чел.) впервые выявленных больных туберкулезом легких без ВИЧ-инфекции, идентичная 1-й по полу возрасту и формам заболевания. Больным обеих групп проводилось традиционное клинико-рентгенологическое и лабораторное исследование, включая компьютерную томографию органов грудной клетки, бактериологическое и иммунологическое исследование, пробу Манту с 2 ТЕ и ДИАСКИНТЕСТ. С помощью опроса исследовались социальный статус и социальная активность пациентов по специальной анкете. В дополнение к опросу было проведено глубинное интервью с больными ВИЧ-индуцированным туберкулезом легких специалистами в области социальной психологии.

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено, что по социальной структуре контингент больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом существенно отличался от больных туберкулезом легких без ВИЧ-инфекции. Так, неработающие лица трудоспособного возраста составили 59,7 и 41,9%, рабочие соответственно - 20,9 и 22,6% пенсионеры - 9,6 и 17,7%. В обеих группах более 50% составляли мужчины в возрасте 30-39 лет. Контакт с больными туберкулезом в семье отмечали 4,8 и 9,7%, с друзьями и сослуживцами - 1,3 и 7,4%. 38,7 и 17,3% пациентов соответственно группам наблюдения ранее пребывали в местах лишения свободы. Больных со сроком первичного ВИЧ - инфицирования до 3 лет было 70,9% .

Анализ данных социологического опроса показал следующие результаты. Профессию имели 22 (35,5%) больных 1-й - и 15 (24,2%) 2-й группы. В то же время на момент заболевания не работали соответственно 17 (27,4%) и 23 (37,0%) чел. Большинство обследованных имели рабочие специальности и лишь 6 чел. в обеих группах имели высшее образование. Неудовлетворенность своей работой испытывали пациенты обеих групп, но в 1-й группе она обнаруживалась значительно чаще - у 59,7%, а во 2 группе - у 32,2% ($p \leq 0,05$).

Пациенты с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в 62,5% случаев не пытались улучшить условия своей работы или пройти профессиональную переподготовку, хотя интенсивность трудовой деятельности у большинства из них была высокой (63,7%), а умственное напряжение - низким (у 95,7%). Во 2-й группе интенсивность трудовой деятельности и умственное напряжение были низкими, но в то же время 31,5% работающих пациентов пытались улучшить условия своего труда. Полученные данные в определенной степени свидетельствуют о низкой социальной активности больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. На это же указывает отсутствие интереса к посещению концертов и выставок (43,7%), нежелание интересоваться политическими событиями (72,3%), полное отсутствие каких-либо увлечений у больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. У 57,8% больных 2-й группы в той или иной мере проявлялся интерес к развлекательным мероприятиям, а у 36,7% - политическим событиям. Кроме того, треть из больных 2-й группы имела увлечения, имеющие хозяйственный характер. Неудовлетворенность материальным положением испытывали пациенты обеих групп, но в 1-й группе она была существенно выше, чем во 2-й группе (52,6 против 22,6% соответственно; $p \leq 0,05$). Финансовые затруднения чаще отмечали больные с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (80,0 против 36,8%; $p \leq 0,05$). 56,2% пациентов 1-й группы не пользовались дневным отдыхом, а все свободное время предпочитали проводить уединенно (43,7%), употребляя алкоголь или наркотические вещества. Больные 2-й группы отводили на дневной отдых 3 ч в день и более, тратя свободное время на увлечения (21,0%) и алкоголь (36,8%). Следует отметить невнимание к здоровью и безразличие к своему заболеванию у 66,2% больных 1-й и 36,8% больных 2-й группы ($p \leq 0,05$).

Данные исследования клинико-рентгенологических особенностей туберкулеза легких дают основание считать, что больные ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких - это, прежде всего, лица с распространенными, деструктивными формами заболевания (инфильтративный, диссеминированный, фиброзно-кавернозный туберкулез легких), среди которых соотношение мужчин и женщин 2:1. Давность их заболевания больше, чем при туберкулезе легких, а некоторые симптомы (лихорадка, явления бронхита, преобладание экссудативной воспалительной реакции в легких) более выражены и позволяют заподозрить иммунодефицит уже в первые дни от момента выявления заболевания. Этим же пациентам присуща низкая социальная активность, отсутствие интереса к развлекательным мероприятиям и политическим событиям, а также стремление к уединению, злоупотреблению спиртными напитками или наркотиками, невнимание к своему здоровью и полное безразличие к сопутствующему заболеванию, представляющему серьезную социальную угрозу. Это особенно характерно для больных-наркоманов. Подозрение на ВИЧ-ассоциированный туберкулез легких является основанием для проведения углубленного клинического и психологического исследования с целью целенаправленного планирования и реализации адекватных лечебно-реабилитационных программ..

Анализ основных сфер социальной активности пациентов (трудовая или общественно-политическая деятельность, активность в сфере образования, досуга и быта), показал ее внутреннюю неоднородность. и зависимость от социально-экономического положения, состояния здоровья, окружения больных, их индивидуального самочувствия и настроения В целом, чем выше уровень социальной активности, тем успешнее проходил процесс лечения. Больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом нельзя рассматривать как некий однородный социально-демографический слой, так как они являются членами различных социальных групп: малых и больших, первичных и вторичных, формальных и неформальных, в том числе, состоящих не только из лиц, заболевших туберкулезом.

Заключение. Низкий уровень доходов больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, слабая адаптация к новым условиям жизни, невозможность повысить уровень образования и квалификации, невостребованность на рынке труда в связи с заболеванием существенно снижают их социальный статус, переводят больных людей в нижний и даже в маргинальный слой населения, что создает особую угрозу обществу, учитывая высокую эпидемическую опасность этого заболевания.

Литература

1. Бондаренко В.Н., Рузанов Д.Ю. ВИЧ-ассоциированный туберкулез (литературный обзор) // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - №3 (17). – С.41-46.
2. Кетова Н.А., Лебедев И.Ю. Влияние медико-социальной реабилитации больных туберкулезом легких на социальную активность и качество жизни / Мат. VI Всеросс. дист. интернет-конф. с межд. участием «Окружающая среда и здоровье населения». - ISBW 978-5-7487-1929-2.
3. Коломиец В.М., Гусева В.А., Рублева Н.В., Шахова Ю.И. Особенности клинического течения и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. - №1. С.142-147.
4. Коломиец В.М., Коноркина Е.А., Шпак А.В. Социально-психо-логическая реабилитация психически больных как метод неспецифической профилактики туберкулеза.//Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2013. - №3. – С. 19-22
5. Лебедев, Ю.И. Социальная активность больных лекарственно-устойчивым туберкулезом легких / Ю.И. Лебедев, Ю.А. Блинков, С.Н. Новикова, А.В. Пастухова // Туберкулез и болезни легких. — 2011. — № 5. — С.21.
6. Сухова Е.В. "Фтиза-школа" - система комплексного воздействия на больного туберкулезом // Пробл. туб. и болезней легких. - 2004. – №.12. - С.35-40.

ПРИЧИНЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Козорез Е.И., Демчило А.П., Красавцев Е.Л.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация. Исследована частота и причины отказа от приема АРТ у 494 ВИЧ-инфицированных пациентов Гомельской области. Зарегистрировано в течение 96 недельного периода наблюдения 9,7% случаев прекращения лечения. Основными причинами прекращения терапии были активное употребление наркотических веществ и алкоголя, что необходимо учитывать при назначении АРТ. Большая часть (82%) пациентов прекратили прием во время первого года и только 18% - в течение 2 года. Пациенты с уровнем CD4+-лимфоцитов менее 200 клеток в мкл и 4 стадией по классификации ВОЗ значимо чаще отказывались от продолжения приема АРТ.

REASON FOR DISCONTINUATION OF ANTIRETROVIRAL THERAPY

Kozorez E.I., Demchilo A.P., E.L. Beauties

Gomel State Medical University,
Gomel, Republic of Belarus

Abstract. We investigated the frequency and causes of refusal 494 art HIV-infected patients. Registered for 96 week period observations 9.7% cases, discontinuation of treatment. The main reasons for discontinuation were actively use drugs and alcohol, which must be taken into account when appointing ART. The majority (82%) patients stopped reception during the first year and only 18% within 2 years. Patients with CD4 + lymphocyte level less than 200 cells per μL and 4 stage on the who classification significantly more frequently refused to continue receiving ART.

Антиретровирусные (АРВ) препараты, применяемые в настоящее время в клинической практике для лечения ВИЧ-инфекции, необходимо принимать в течение всей жизни. Успешное лечение снижает вирусную нагрузку ВИЧ до неопределяемого уровня. Если лечение прекратить, то контроль над вирусной нагрузкой утрачивается, и уровень ВИЧ в организме опять начинает стремительно повышаться. Однако жесткие графики приема препаратов, беспокойство по поводу серьезных побочных эффектов в долгосрочной перспективе, а также хорошее самочувствие могут привести к тому, что пациенты обращаются к врачу по поводу прекращения приема АРВ-препаратов.

Залогом успеха антиретровирусной терапии (АРТ) являются: максимальная приверженность пациентов лечению, рациональный выбор схемы терапии с учетом особенностей образа жизни пациента, выбор первоначального режима с возможностью использования в последующем

максимального числа антиретровирусных препаратов, учет возможности наличия у пациента устойчивых к лекарствам штаммов ВИЧ.

Целью исследования был анализ частоты и причин отказа от приема АРТ у ВИЧ-инфицированных пациентов Гомельской области.

Материалы и методы. В исследование были включены 494 пациента, начавших прием АРТ с 1 января 2013 г. по 1 января 2014 г. Средний возраст больных составил 36 лет, из них 270 мужчин и 224 женщины. У 296 (60%) больных инфицирование ВИЧ произошло при внутривенном введении наркотических средств, у 196 (39,5%) – при сексуальных контактах, у 2 (0,5%) – путь не уточнен. В соответствии с классификацией ВИЧ-инфекции у взрослых, предложенной ВОЗ в 2012 году, на начало терапии в стадии I находилось 99 (20%) пациентов, II – 176 (36%), III – 135 (27%), IV – 84 (17%). Больные наблюдались в течение 2 лет после начала АРТ.

Показанием к началу АРТ явились или клинические симптомы СПИДа, или иммуносупрессия (количество CD4+ клеток менее 350 в мкл).

Результаты и обсуждение. В течение 96 недельного срока наблюдения АРТ перестали принимать 48 (9,7%) пациентов, в том числе 26 (54%) мужчин и 22 (46%) женщины. Срок приёма АРВ-препаратов составил: у 16 (34%) человек - менее 3 месяцев, у 23 (48%) - менее года, у 9 (18%) - менее 2 лет. Среди прекративших прием АРТ – лица, заразившиеся путем введения наркотических веществ, составляют 31 (65%), половым путем – 17 (35%).

В 54% случаев (26 пациентов) причиной прекращения лечения явилось активное употребление наркотиков, в 27% (13 пациентов) – злоупотребление алкоголем. У 6 (12,5%) пациентов, несмотря на терапию, отмечалось неуклонное прогрессирование основного и сопутствующего заболевания, закончившееся летальным исходом. 3 (6,5%) пациента объяснили причину отказа хорошим самочувствием.

Была исследована связь отказа пациентов от продолжения АРТ со следующими факторами: пол, возраст (до 30 лет и старше), путь инфицирования (внутривенный, половой), уровень CD4 клеток (менее и более 200 клеток в мкл), стадия ВИЧ по классификации ВОЗ (4 и 1,2,3).

Выявлена связь отказа от АРТ с первоначальным уровнем CD4 клеток и стадией заболевания. Пациенты с уровнем CD4+-лимфоцитов менее 200 клеток в мкл и 4 стадией по классификации ВОЗ значительно чаще отказывались от продолжения приема АРТ.

Заключение. В течение 96 недельного срока наблюдения за 494 больными, получающими АРТ, установлено 9,7% случаев прекращения лечения. Основными причинами прекращения терапии были активное употребление наркотических веществ и алкоголя, что необходимо учитывать при назначении АРТ. Большая часть (82%) пациентов прекратили прием во время первого года и только 18% - в течение 2 года. Пациенты с уровнем CD4+-лимфоцитов менее 200 клеток в мкл и 4 стадией по классификации ВОЗ значительно чаще отказывались от продолжения приема АРТ.

Список литературы

1. Либман, Г. ВИЧ-инфекция / Г. Либман, Х.Дж. Макадон. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 560 с.
2. Бартлетт, Дж. Клинические аспекты ВИЧ-инфекции 2012 / Дж. Бартлетт, Дж. Галлант. – М.: Р. Валент, 2012. – 528 с.
3. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ и СПИД национальное руководство / В.В. Покровский [и др.]; под общ. ред. В.В. Покровского. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2013. – 630с.
4. ВИЧ-инфекция у взрослых и детей. Оппортунистические инфекции и заболевания / Н.В. Матиевская [и др]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 400с.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ РЕЖИМОВ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ.**

Коломиец В.М.

**ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"
Курск, Россия**

Аннотация. Химиопрофилактики ВИЧ инфицированных ТБ является перспективным методом, но его режимы не совершенствуется. Предлагается определить приоритетность химиопрофилактика с двумя или более антимикробных агентов, только с учетом факторов риска.

**EFFICACY OF CHEMOPROPHYLAXIS REGIMENS OF TB IN HIV-
PATIENTS: DISCUSSION QUESTIONS.**

Kolomiets V. M.

Kursk State Medical University
Kursk, Russia

Abstract. Chemoprophylaxis of HIV-infected's TB is a promising method, but its modes are not perfected. It is proposed to prioritize chemoprophylaxis with two or more antimicrobial agents only considering the risk factors.

В отличие от эпидемической ситуации по туберкулезу, в Российской Федерации не удастся стабилизировать ситуацию по ВИЧ-инфекции, хотя по докладу министра здравоохранения на последней специальной сессии ВОЗ (2016) она и остается под контролем. Так, по данным В.В. Покровского, резервуар Вич-инфекции постоянно увеличивается и только в 2014 году было выявлено 85 252 впервые инфицированных человек (ВичИ). В таких условиях ВичИ становятся приоритетной группой риска по туберкулезу (ТБ) и необходимо решать вопрос о наиболее результативных методах его профилактики в этой группе.

Для предотвращения развития туберкулеза у инфицированных и больных ВИЧ-инфекцией помимо мероприятий, направленных на предотвращение инфицирования их микобактериями (МБТ) и своевременно начатой антиретровирусной терапии, применяется и назначение противотуберкулезных препаратов - химиопрофилактика туберкулеза (ХП) [3,5]

Целью исследования является анализ эффективности рекомендуемых в настоящее время режимов ХП в группе риска населения - ВичИ.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ нормативно-правовой базы по рекомендациям проведения специфической химиопрофилактики туберкулеза (ХП) противотуберкулезными препаратами (АБП).

Результаты с обсуждением. До настоящего времени в отечественной фтизиатрии не всегда придерживаются единого определения сущности ХП. Так, в Национальном руководстве ХП определена как «применение противотуберкулёзных препаратов с целью предупреждения развития заболевания у лиц, подвергающихся наибольшей опасности заражения туберкулёзом» [4] и утверждается, что «применение противотуберкулёзных препаратов с профилактической целью снижает вероятность заболевания туберкулёзом в 5-7 раз». При этом выделяется первичная ХП с целью предупреждения инфицирования, и вторичная ХП, назначаемая «инфицированным микобактериями туберкулёза людям (с положительной реакцией на туберкулин) без клинически и рентгенологических признаки активного ТБ и пациентам с остаточными изменениями в органах.

Между тем, в действующего и сейчас Приказе №109 не рассматривается отдельно первичная и вторичная ХП, но четко регламентируется ее проведение, как и в национальном Руководстве, «по показаниям», с учетом факторов риска.

Следующее положение касается количества антибактериальных препаратов (АБП) для проведения ХП. Если в Приказе №109 об этом ничего не говорится, то в Национальном руководстве достаточно четко указывается, что первичная ХП проводится одним АБП, вторичная же – только 2 АБП.

Здесь же определены отдельно и показания к ХП у ВИЧ-инфицированных лиц. При этом выделяются опять таки определенные критерии (показания) для проведения ХП — размер папулы, появляющейся в ответ на внутрикожное введение туберкулина в стандартном разведении (2 ТЕ), характера контакта ВИЧ-инфицированного лица с больным туберкулёзом и сроков выживания таких лиц при проведении терапии и без неё, принадлежность пациента к группе повышенного риска (ВИЧ-инфицированные наркоманы с положительными реакциями на 2 ТЕ ППД-Л или с отсутствием реакции на туберкулин).

Сроки проведения химиопрофилактики и очередность приёма препаратов не определены. Наиболее обоснованными считают 6-месячные курсы приёма изониазида ВичИ при количестве CD4-лимфоцитов в крови 200 в мм³ и менее.

В Приказе №951, разумеется, нет указаний о ХП, однако в пункте 4.6. указывается «При невозможности проведения полного спектра диагностических мероприятий у больных ВИЧ-инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии, с выраженным иммунодефицитом при СБ4 <100 клеток в мкл, проводится **тест-терапия** туберкулеза по решению врачебной комиссии медицинской организации с обязательным участием врача-фтизиатра» (здесь, как и далее, выделено нами).

Как же обстоит дело с ХП в «Инструкции по химиопрофилактике туберкулеза у взрослых больных ВИЧ-инфекцией», которая предназначена для врачей Центров по профилактике и борьбе со СПИД, врачей-фтизиатров, врачей-инфекционистов и организаторов здравоохранения, участвующих в системе оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией? Ее целью является «снижение риска развития туберкулеза в результате заражения

(первичного или повторного) и/или реактивации латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ)», т.е. речь идет о вторичной ХП. И далее прямая ссылка на рекомендации ВОЗ (2014) «взрослым и подросткам, живущим с ВИЧ, при неизвестном или положительном результате туберкулиновой кожной пробы (ТКП), и при малой вероятности наличия активного ТБ, независимо от уровня иммуносупрессии следует назначить профилактическое лечение изониазидом в течение не менее 6 месяцев». При этом авторы ссылаются на данные нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях (Akolo C, et al., 2010 г.), в которых показана эффективность лечения латентной туберкулезной инфекции (то есть прием **каких-либо противотуберкулезных препаратов**) у людей, живущих с ВИЧ.

Уместно подчеркнуть, что последние рекомендации ВОЗ касаются **лечения** туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, но не ХП. К последней отношению ВОЗ известно – в программах ВОЗ о структурах, политике, целях и задачах борьбы химиопрофилактика, как специфический метод предупреждения туберкулеза, не значится (Программа ВОЗ по туберкулезу, 1996).

Остановимся на рекомендациях по методике проведения ХП ВичИ. Прежде всего регламентируется назначение режима ХП – она проводится врачом-инфекционистом или врачом-фтизиатром по решению Врачебной комиссии (**какой?**) после получения письменного информированного согласия пациента.

Показаниями для проведения ХП туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией считаются снижение количества CD4+-лимфоцитов до 350 клеток/мкл и менее; положительные внутрикожные пробы с туберкулином, аллергеном туберкулезным рекомбинантным или лабораторные тесты вне зависимости от выраженности иммунодефицита и принадлежность к группам высокого риска развития туберкулеза **вне зависимости** от количества CD4+-лимфоцитов и реакции на иммунологические тесты. К последним отнесены все переболевшие (в том числе и спонтанно излеченные) туберкулезом и лица с предполагаемым контактом с больными туберкулезом. По-существу, имеется ввиду опять таки вторичная ХП, но назначаемая как при наличии факторов риска, так и без них инфицированным туберкулезом.

Что же касается режимов ХП, то выдаются весьма странные, на наш взгляд, рекомендации. Больному ВИЧ-инфекцией может быть назначен один из режимов ХП, **сопоставимых по эффективности** и безопасности:

изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25 мг/сутки) - 6 месяцев,

изониазид (5 мг/кг) и витамин В6 (15-25 мг/сутки) + рифампицин (10 мг/кг) или рифабутин (5 мг/кг) - 3-4 месяца;

изониазид 900 мг и витамин В6 (15-25 мг/сутки) + рифапентин 900 мг (для пациента с массой тела более 50 кг) один раз в неделю в течение трех месяцев.

Здесь возникает сразу несколько вопросов.

1. Если режимы *сопоставимы по эффективности*, то тогда когда и кому их назначают (а ведь с практической точки зрения различия между ними имеются – и по стоимости, и по переносимости).

2. Чем обусловлены различные дозировки рекомендуемых препаратов, которые в одном случае предопределяются весом пациента, в другом – частотой приема, возраст пациента не принимается во внимание.

3. Почему при противопоказаниях к назначению рифампицина, рифабутина, рифампентина в альтернативных схемах (каких?) рекомендуется назначать все тот же препарат (изониазид), но в заниженных дозах.

4. Как должна быть «задокументирован» известная устойчивость (МЛУ МБТ) возбудителя, чтобы назначать резервные препараты (сколько, когда, длительность).

5. Когда же высокий уровень заболеваемости и возможный риск контакта с больным туберкулезом в местах лишения свободы является показанием для проведения ХП изониазидом в течение 36 месяцев.

6. Почему при проведении ХП необходимо контролировать функциональное состояние печени (уровень аминотрансфераз, общего билирубина) через 1 месяц после начала ХП и далее 1 раз в 3 месяца при монотерапии изониазидом, и 1 раз в месяц при комбинированной схеме профилактического лечения.

7. Кто является региональным координатором по проблемам сочетанной туберкулез/ВИЧ инфекции, на которого возлагается ответственность за организацию ХП ТБ пациентам с ВИЧ-инфекцией.

Вызывает недоумение утверждения, что основным критерием эффективности ХП является отсутствие случаев развития активного туберкулёза у лиц, получивших ХП, в течение 2-х последующих лет, что далеко не соответствует истине.

Очевидна целесообразность рекомендации о проведении ХП через 1 год в зависимости от состояния иммунитета (количества CD4+лимфоцитов у пациента не превышает 350 клеток в мкл), но здесь опять таки следует детализировать режим ХП. Наиболее обоснованными представляются показания к интегрированной ХП+АРВТ.

Таким образом, в разработанной Инструкции по химиопрофилактике туберкулеза у взрослых больных ВИЧ-инфекцией рекомендуется проведение вторичной ХП, преимущественно в группах риска и несколькими режимами. При этом факторы риска, кроме содержания CD4+лимфоцитов, по приоритетности четко не определены. В то же время, многочисленными исследованиями до настоящего времени доказано, что и вторичная ХП наиболее эффективна, когда она проводится строго по показаниям – выявление фактора риска и назначение не менее двух и более АБП, что тоже является своеобразной тест-терапией [2].

Принимая во внимание такое дифференцированное воздействие ХП, вряд ли безоговорочными выглядят рекомендации о ее проведении одним из препаратов группы ГИНК в течение двух - трех месяцев. Ведь для развития

реактивации решающее значение имеет не столько выраженность остаточных изменений, сколько степень снижения иммунологической резистентности под влиянием различных факторов риска, включая суперинфекцию, и функциональное состояние микобактерий в остаточных изменениях. При подозрении на вторичный туберкулез с учетом приведенных показателей профилактическое лечение одним препаратом будет запоздалым и этиологически неполноценным. Здесь необходимо назначение не менее двух антибактериальных препаратов, наиболее целесообразен их прием интермиттирующим методом, а в случае выявления рецидива - начинать основной курс лечения. Наконец, химиопрофилактика в этих случаях является, по существу, пробной терапией. Что такие варианты не исключены, свидетельствуют не только приведенные здесь, но данные и других авторов о качестве обследования носителей остаточных изменений. Сообщалось, что вследствие плохого обследования носителей ОИЛ в УП группе часто наблюдались лица с неизлеченным туберкулезом, у которых реактивация наступала значительно чаще. К таким выводам пришли авторы [1,2], которые давно и углубленно занимались изучением химиопрофилактики среди носителей остаточных изменений. Они также убедились, что препараты с профилактической целью наиболее целесообразно назначать в первые два года наблюдения в УП группе, причем на первом году в течение шести месяцев, а в дальнейшем с учетом факторов риска. Вполне очевидно, что просматривалась надежда на эффект пробной терапии. Так не лучше ли в подобных случаях именно начинать химиопрофилактику двумя препаратами? Как и в тех случаях, когда обнаружено однократно бактериовыделение, а активность не подтверждается другими данными обследования. Это положение особенно важно в связи с ростом лекарственной устойчивости МБТ, в том числе начальной, и, прежде всего, с возможностью ее выявления у ранее клинически излеченных с нарушениями в проведении им антибактериальной терапии.

Не вызывает сомнений, что при наличии стольких факторов риска, обусловивших снижение иммунологической специфической резистентности, только благодаря целенаправленному совместному наблюдению специалистов удалось если и не предупредить развитие рецидива и реактивации, то хотя бы выявить их относительно своевременно.

Конечно, обосновывая необходимость применения режимов химиопрофилактики с преимущественным использованием двух препаратов, не следует забывать при этом о ее возможных осложнениях. В целом частота побочных реакций, среди которых преобладали токсико-аллергические, была почти одинаковой при различных режимах и не превышала более 3,2% в отдельных группах, подвергнутых ХП. Количество побочных реакций резко уменьшилось при интермиттирующем приеме антибактериальных препаратов и, что особенно важно, при их правильном, показанном назначении с учетом сопутствующих заболеваний, которые выступали в этих случаях как факторы риска.

Пожалуй, можно привести лишь один случай тяжелого и необычного осложнения как следствие непродуманной тактики химиопрофилактики.

Выводы. Министерством и департаментам здравоохранения субъектов РФ рекомендуется издать внутренние нормативные документы по организации и проведению ХП туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией с указанием ответственных лиц, в составе представителей головных противотуберкулезных учреждений регионов и Центров по профилактике и борьбе со СПИД.

Список литературы

1. Белякова Н.В. Совершенствование профилактики туберкулеза у больных Вич-инфекцией в пенитенциарных учреждениях: автореф. дис.. канд. мед.наук: 14.00.16М. - 2010. 26 с.
2. Коломиец В.М. Реактивация туберкулеза легких и ее профилактика при формировании групп повышенного риска: автореф. дис. докт-ра мед. наук. – К., 1982. – 28 с.
3. Фролова О.П. Эпидемическая ситуация по туберкулезу среди больных ВИЧ-инфекцией в России и система мер его профилактики // Проблемы туберкулеза. – 2001. - №5. – С. 31-34.
4. Фтизиатрия. Национальное руководство/под ред. М.И.Перельмана. – М.- ГЭОТАР-Медиа.- 2007. 512 с.
5. World Health Organization. Preventive therapy against tuberculosis in people living with HIV // Weekly Epidemiological Record. – 1999. – V. 74. – P. 385-398.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

*Коломойцева Е.Е., Перевозчиков Б.Г., Провоторов В.Я.,
Шамара Л.Ф.*

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"
Курск, Россия

Аннотация. Ретроспективный анализ заболеваемости по Курской области в период: с 1991 по 2015 гг. С использованием ретроспективного эпидемиологического анализа, оперативного эпидемиологического анализа, определения факторов риска. Отмечается снижение заболеваемости сифилисом в 2015 г. на 88,5 % по сравнению с 1997 г. Наиболее выраженными факторами риска развития эпидемического процесса являются: беспорядочная половая жизнь, незащищенный половой акт, пользование противозачаточными, гомосексуальные связи, употребление наркотических препаратов. В проведении противоэпидемических мероприятий приоритетное значение должно иметь своевременное выявление источника инфекции – больного человека, а в группах риска среди населения необходимо проведение просветительной работы и наблюдение за гомосексуалистами и употребляющими наркотические препараты.

Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, факторы риска.

Analyzing the incidence of syphilis in the Kursk region.

Kolomojceva E.E., Perevozchikov, B.G., Provotorov V.J., Shamar L.F.
Kursk State Medical University
Kursk, Russia

Abstract. Retrospective analysis of morbidity of Kursk region in period: from 1991 to 2015 timeframe. Using retrospective epidemiological analysis, operational epidemiological analysis, determination of risk factors. There was a reduction in the incidence of syphilis in 2015, 88.5% compared with 1997 г. the most acute risk factors of epidemic process are: indiscriminate sexual activity, unprotected sex, use birth control, homosexuality, the use of drugs. In carrying out anti-epidemic measures priority must be the timely identification of the source of infection is a sick person, and at risk groups among the population to conduct voter education and monitoring of homosexuals and consume narcotic drugs.

Key words: syphilis, morbidity, risk factors.

В настоящее время эпидемическая ситуация по распространенности сифилисом продолжает оставаться неустойчивой, как в РФ за 2015 год (22,93 на 100 тыс. населения), так и в Курской области (25,46 на 100 тыс. населения),

при чем инфицированность по России на 10% ниже чем в Курской области [1,2].

Этому способствует широкая популяризация нетрадиционных форм сексуальных отношений, миграция населения, пропаганда асоциального образа жизни, а так же омоложение контингента больных [4,6,7,8,10,11].

В современных условиях система первичной профилактики недостаточно учитывает санитарные и социальные факторы риска развития заболевания, не отлажен механизм эпидемиологического надзора, как в целом по стране, так и в Курской области, за лицами, которые не относятся к общепризнанным группам риска, но имеют вероятность заражения сифилисом - социально адаптированные женщины и мужчины. [5,9,12,13].

Цель исследования. Изучение и анализ заболеваемости сифилисом в Курской области в течение 1997-2015 гг. и детализация факторов риска, характеризующих особенности эпидемического процесса.

Материалы и методы исследования. В работе использованы статистические данные о заболеваемости сифилисом Роспотребнадзора по Курской области, которые обработаны методами эпидемиологической диагностики, позволяющие смоделировать эпидемическую ситуацию, сделать прогноз распространенности и определить факторы риска.

Собственно исследование: Используя методы формальной логики, выявлено, что сифилис на протяжении 20 лет устойчиво занимает одно из лидирующих мест среди ИППП.

К группам риска относятся люди: ведущие беспорядочную половую жизнь, занимающиеся незащищенным половым актом, женщины, пользующиеся противозачаточными, ЛГБТ, употребляющие наркотические препараты.

При анализе многолетней динамики заболеваемости сифилисом в регионе установлено, что в течение 19 лет тенденция снижения распространенности инфекции среди населения умеренная ($T=-3,8\%$).

Заболеваемость сифилисом в 1991 году составляла 7,2 на 100 тыс. населения, уже к 1993 году частота встречаемости возросла почти в 5 раз и составляла 32,4 на 100 тыс. населения. В конце 90х годов инфицированность сифилисом стала резко возрастать и в 1997 году достигла пика (278 на 100 тыс. населения). Такой резкий подъем связан с тем, что перестала проводиться целенаправленная работа по контролю заболеваемости ИППП. В Курской области с 1997 по 2015 г. отмечена стойкая тенденция к снижению распространенности данной инфекции. В 1997г. число инфицированных составляла 278 случаев на 100 тысяч населения, к 2015г. Частота встречаемости снизилась на 91 % и составляет 25,46 на 100 тыс. населения. С помощью регрессионного анализа проведено математическое моделирование заболеваемости сифилисом, которое выражено в виде формулы $\hat{Y}=13,9+(2,8*B)$, что позволило определить ближайший прогноз $\hat{Y}$ 2016г. = 30,7 на 100 тыс. населения, отдаленный прогноз, при неизменных условиях, определяется по

формуле $\hat{Y} = 11,6 + (-1,2 * B) + 0,23 * C^2$ и составит на 2019 г. 22,6 на 100 тыс. населения.

В течение года действуют постоянные причины, обуславливающие круглогодичную заболеваемость. Выраженность тенденции составляет 0,9%, что расценивается как умеренное возрастание. Проявление тенденции сезонной заболеваемости составляет - 6,6%, что характеризует выраженное снижение. Сезонная заболеваемость колеблется от 2,3 до 29, и её продолжительность варьируется от 2 месяцев в 2007 году до 5 месяцев в 2011 году. На протяжении ряда лет определяется рост круглогодичной тенденции заболеваемости сифилисом и снижение сезонной.

Принятые меры по снижению распространенности ИППП в целом по стране позволили к 2011 году достигнуть показателей заболеваемости сифилисом 30,8 на 100 тыс. населения, что всё же превышает данные за 1991г. в 7,2 раза. Однако снижение частоты встречаемости сифилисом однозначно свидетельствует не столько о благополучии и успешности мер первичной профилактики, сколько говорит о том, что пациенты стали чаще обращаться в негосударственные клиники и частнопрактикующим врачам с целью диагностики и лечения, а так же не проведения эпидемиологического обследования очагов и не выявления источников инфекции [3,5,7,12].

Эпидемиологический анализ с использованием статистических методов обработки по установлению факторов риска показал, что пол и возраст не являются причинами или условиями заболеваемости сифилисом ($t=-0,8$ и $t=0,08$ соответственно). Гомосексуализм является фактором риска ($t=0,4$). Выраженное влияние оказывает заражение плода от больной матери ($\chi^2=6,9$, что $< 3,84$) и незащищенный половой акт ($\chi^2=5,5$, что $< 3,84$). Выявлена корреляционная зависимость между заболеваемостью сифилисом и беспорядочными половыми связями.

Выводы. Наиболее выраженными факторами риска развития инфекционного процесса и формирования эпидемической ситуации в регионе являются: гомосексуализм, незащищенный половой акт, беспорядочные половые связи, а так же заражение плода от матери. Следовательно, приоритетное значение в проведении противоэпидемических мероприятий должно иметь своевременное выявление источников инфекции – больных людей, из групп риска среди населения региона.

Список литературы

1. Материалы государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Курской области в 2015 году»
2. Материалы государственного доклада «Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-декабрь 2015 года»
3. «Глобальной стратегии профилактики инфекций, передаваемых половым путём, борьбе с ними, 2006-2015 гг.»

4. Аравийская Е. Р. Анализ факторов, связанных с рискованным сексуальным поведением в подростковой субпопуляции // Российский журнал дерматологии и венерологии. – 2001. – № 5. – С. 61-65.1.
5. Баринаева А. Н. Понятие о группах риска инфекций, передающихся половым путём, и ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. // Российский семейный врач. – 2012. – Т. 16. – № 1. – С. 33-39.
6. Вислобоков А. В. Некоторые организационные факторы, влияющие на уровень заболеваемости ИППП // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2006. – № 2. – С. 49-52.
7. Кубанова А. А. Анализ эпидемиологической ситуации и динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путём, и дерматозами на территории российской федерации / А. А. Кубанова, И. Н. Лесная, А. А. Кубанов, Л. Е. Мелехина, М. А. Каспирович // Вестник дерматологии и венерологии. - 2010. - № 5. - С. 4-21.
8. Кунгуров Н. В., Сырнева Т. А., Бердичкая Л. Ю. Эпидемиологические аспекты заболеваемости сифилисом беременных и новорождённых. // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2008. - № 1. - С. 56-58.
9. Лосева О. К., Кравец Т. А. Динамика факторов риска среди подростков. // Профилактика заболеваний и укрепления здоровья. – 2001. – № 5. – С. 26-27.
10. Плавинский С. Л. Сексуальное поведение лиц группы риска и его значение для поддержания неблагоприятной ситуации заболеваемостью ИППП / С. Л. Плавинский, А. Н. Баринаева, А. В. Бобрик, К. М. Ерошина // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2011. – Т. 3. № 2. – С. 49-56
11. Сырнева Т. А. Сексуальное поведение и уровень информированности об инфекциях, передаваемых половым путём (ИППП), различных субпопуляций молодёжи / Т. А. Сырнева, Н. А. Долженицына, М. А. Захарова, П. Б. Нехамкин, С. В. Глуховская, Н. О. Лысенко, В. В. Федотовских // Уральский медицинский журнал. – 2004. – № 3. – С. 24-26
12. Тихонова Л. И., Сафарова Э. А., Салахов Э. Р. Масштаб распространения, определяющие факторы и последствия врождённого сифилиса в Российской Федерации: результаты оценки в пяти регионах // Вестник дерматологии и венерологии. – 2006. – № 5. – С. 41-43
13. Эпидемиология сифилиса в современных условиях / Н. Н. Потекаев [и др.] // Клиническая дерматология и венерология : научно-практический журнал. - 2015. - N 1. - С. 22-34 : ил., табл. - Библиогр.: с.33-34. - Реферирована.

**ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ПО ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ В РЕГИОНЕ**
Коренева Т.В.¹, Епифанова С.В.¹, Цыпин Л.И.¹, Коломиец В.И.²
ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер"¹
ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"²
Курск, Россия

Аннотация. Эпидемиологическая ситуация в Курской области ВИЧ-ТБ был проанализирован. При оценке динамики заболевания в течение последних 5 лет мы видели увеличение заболеваемости ВИЧ-ТБ в случаях женщин. Распространенность случаев распространения туберкулеза было выявлено в формах заболеваний. Были определены основные тенденции в формировании эпидемиологической ситуации ВИЧ-ТБ в регионе. Оценка обстоятельств обнаружения ВИЧ-ТБ пациентов показал значительную роль скрининговых обследований населения. Существует неблагоприятная структура клинических случаев сопутствующие заболевания, который имеет крайне негативное влияние на эффективность лечения.

Ключевые слова: ВИЧ ассоциированного туберкулеза, ВИЧ, связанных ТБ, эпидемиологической ситуации ВИЧ ассоциированного туберкулеза.

Features of the epidemiological situation on HIV-associated tuberculosis in the region

Koreneva T.V. ¹, Yepifanov S.V. ¹, Tsypin L.I. ¹, Kolomiets V.I. ²
Regional clinical TB dispensary ¹
Kursk State Medical University ²
Kursk, Russia

Abstract. Epidemiological situation in the Kursk region of HIV-TB was analyzed. When evaluating the dynamics of disease within the last 5 years we have seen an increase in the incidence of HIV-TB in women's cases. The prevalence of cases of disseminated tuberculosis was revealed in forms of diseases. The main trends in the formation of the epidemiological situation of HIV-TB in the region were determined. Evaluation of the circumstances of detection of HIV-TB patients showed a significant role of screening examinations of population. There is an unfavorable structure of the clinical cases of comorbidity, which has an extremely negative impact on the effectiveness of treatment.

Keywords: HIV-associated tuberculosis, HIV associated TB, the epidemiological situation of HIV-associated tuberculosis.

В результате реализации Федеральной Целевой Программы (ФЦП) «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007–2012 гг.» и Национального проекта «Здоровье» эпидемическая ситуация по туберкулезу хотя и стабилизировалась, но еще далека от прогнозируемой и

необходима дальнейшая интенсификация противоэпидемических мероприятий [1,5]. Так, в регионе (Курская область) удалось достичь не только стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу, но отмечается и тенденция к ее постепенному улучшению, показатель заболеваемости туберкулезом за последние 5 лет снизился в 2011 – 2015 гг. с 51,9 до 45,2. В то же время эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции стабилизировать не удастся [2,6,8]. К примеру, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекции в регионе резко повысился с 8.8 до 22.9 в 2015 г. Среди контингентов больных ВИЧ-инфекцией увеличивается число пациентов, у которых развиваются поздние стадии ВИЧ. Это приводит к тому, что все чаще у больных ВИЧ-инфекцией, инфицированных микобактериями туберкулеза, на фоне иммунодефицита прогноз развития заболевания туберкулезом все чаще пессимистичен [3,7]. Таким образом, контингенты ВИЧ-инфицированных становятся основной группой повышенного риска среди населения и особенно в его отдельных контингентах [4], а своевременное выявление больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (ВИЧ-ТБ), тем более предупреждение его развития, одной из задач здравоохранения.

Эпидемическая ситуация в регионе по ВИЧ-ТБ нестабильная и во многом предопределяется миграционными процессами. Так, за анализируемый период составила 0.97-0.71-0.98-0.72-1.7, при этом резкое повышение заболеваемости в последний год вполне объяснимо прибытием мигрантов из ближнего зарубежья, так как из 19 в/в больных 5 были жителями Украины.

Интересно отметить изменения в динамике заболеваемости ВИЧ-ТБ в последние годы. Так, если в начале анализируемого периода заболевшие женщины составляли 18%, то в настоящее время частота случаев заболевания женщин достигла 31, 5% и продолжает увеличиваться. По возрасту преобладают пациенты от 30 до 40 лет, которые составили 39,6%. В возрасте более 45 лет наблюдали лишь 3,4%.

По формам выявленного туберкулеза преобладают случаи заболевания диссеминированным туберкулезом, больные с этой формой, составили от 23% до 75%. В последние годы постоянно, с частотой до 30% выявляют больных с инфильтративной формой, случае поражений периферических лимфатических узлов, плевры, очагового ТБ и туберкулом единичные. Следует отметить, что не снижается частота заболеваний генерализованным ТБ, включая единичные случаи и острейшего сепсиса. В целом же деструктивные формы ВИЧ-ТБ выявляются у от 30 до 50 %. в/в больных, при этом с такой же частотой выявляется и бактериовыделение.

Возможно констатировать и следующие тенденции в формировании эпидемической ситуации по ВИЧ-ТБ. Из двух вариантов выявления сочетанной патологии, что, очевидно, связано с изменениями патогенеза, увеличивается частота выявления ВИЧ-инфекции у больных ТБ, а точнее практически одновременно. И именно в этих случаях выявляются, как правило, деструктивные процессы, с бактериовыделением и сомнительным прогнозом. Имеет место несвоевременное выявление сочетанной патологии. Случаи же

выявления ТБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на учете в СПИД-центре, постоянны, это больные с более благоприятным и клиническим течением заболевания, и его прогнозом. Случаи посмертного выявления ВИЧ-ТБ единичны в отдельные годы, это крайне запущенные в социальном отношении больные, числа мигрантов.

В связи с этим следует внимательно анализировать обстоятельства выявления случаев ВИЧ-ТБ для анализа качества диспансеризации этих больных и проверочных осмотров населения в целом. Так, при проведении последних увеличилось число выявляемых случаев ВИЧ-ТБ 36,3% до 52,6%. Однако высокий удельный вес выявляемых больных по самообращению может свидетельствовать и достаточно высокой эффективности диспансеризации, здесь необходим анализ клинической структуры заболеваемости.

Неблагоприятная клиническая структура случаев заболевания сочетанной патологией крайне отрицательно влияет на эффективность лечения. Так, удалось достичь клинического излечения в течение наблюдаемого периода лишь у 45.5% - 12.5% - 18.2% - 11.1% - 21% в/в больных. При этом, при достаточно высокой смертности больных ВИЧ-ТБ в 18.2% - 37.5% - 18.2% - 77.7% и 15.8% из умерших неблагоприятный исход наступил в течение первого года после выявления и начала лечения. Необходимо отметить и еще один, крайне неблагоприятный факт – увеличение количества бактериовыделителей с МЛУ МБТ

Заключение. Эпидемическая ситуация по сочетанной патологии в регионе продолжает оставаться крайне нестабильной, а особенности выявления и лечения больных ВИЧ-ТБ требуют интенсификации конкретных противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения сочетанной патологии в группах риска среди населения.

Список литературы

1. Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г : Доклад Секретариата Исполнительного комитета ВОЗ. Сто тридцать четвертая сессия ЕВ134/12 29.11.2013. - 35 с.
2. Глобальный доклад: Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2013. - «ЮНЭЙДС/ JC2417R». - 298 с.
3. Коломиец В.М., Гусева В.А., Рублева Н.В., Шахова Ю.И. Особенности клинического течения и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. - №1. С.142-147.
4. Коломиец В.М. Пенитенциарный туберкулез: патоморфоз и эффективность реабилитации // В.М.Коломиец. – Курск: 2014. 248 с.
5. Нечаева О. Б., Стерликов С.А., Хуриева Н.Б. Целевые индикаторы и показатели государственной программы развития здравоохранения России до 2020 года. //Туберкулез и болезни легких. – 2014. - №12. С.200-201.

6. Нечаева, О.Б. Ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в России / О.Б. Нечаева // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 6. - С. 9-15.
7. Нечаева О.Б., Белиловский Е.М., Загдын З.М., Щукина И.В. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации //Туберкулез в Российской Федерации, 2012/2013/2014 гг. Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации и в мире. – М., 2015. – С. 177-192
8. Фролова О.П. Эпидемическая ситуация по туберкулезу среди больных ВИЧ-инфекцией в России и система мер его профилактики // Проблемы туберкулеза. – 2001. - №5. – С. 31-34

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЦ, С ВЫЯВЛЕННЫМИ aHCV, ПРИ ДОНОРСТВЕ

Красавцев Е.Л., Поварова Д. В.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация. Изучено изменение структуры лиц с выявленными антителами к вирусу гепатита С (aHCV) среди 2235 доноров Гомельской областной станции переливания крови по полу и возрасту за 1993-2016 год. Отмечается возрастание количества женщин в 2011-2016 гг. и регистрируется возрастание количества лиц до 20 и уменьшение доли лиц 21-40 лет. Доля лиц с выявленными aHCV старше 40 лет среди доноров за прошедшие периоды статистически значимо не изменялась. Выявленные изменения, вероятно, отражают изменения путей передачи в этот период времени.

CHANGING the STRUCTURE of persons with identified aHCV, with DONATION

Krasavtsev, E. L., Povarova D. V.

Gomel State Medical University,
Gomel, Republic of Belarus

Abstract. The change of the structure of persons with identified antibodies to hepatitis c virus (aHCV) among donors 2235 Homel regional blood transfusion station by sex and age, covering the years 1993-2016 year. Notes the increase in the number of women in the 2011-2016 timeframe. and the increase in the number of registered persons under 20 and a decrease in the proportion of 21-40 years. The proportion of persons with identified over 40 years aHCV among donors for past periods was statistically significantly unchanged. Identified changes probably reflect changes in transmission during that period.

Введение. Многофункциональная медицинская помощь, характеризующаяся расширением круга специалистов, вовлеченных в процесс ее оказания, значительно повышает риск возникновения неблагоприятных последствий трансфузионной терапии. Высокий уровень распространения трансфузионных инфекций в общей популяции населения регионов, обуславливает возможность обращения к донорству крови лиц, инфицированных этими инфекциями, находящимися в инкубационном периоде, либо не знающих своего статуса инфицированности. С ростом заболеваемости вирусными гепатитами большое эпидемиологическое значение приобретает инфицированность доноров, обращающихся в центры крови для сдачи крови. Доноры крови составляют 36,5 % среди всех выявленных носителей HCV-инфекции. Не зная о факте своего инфицирования, они

представляют собой потенциально опасную группу по распространению гепатита С как парентеральным, так и половым путем.

До 1990-х гг. контакт с зараженной кровью и инъекционное потребление наркотиков были основными причинами передачи HCV-инфекции. С введением жесткого контроля препаратов донорской крови и их применения в странах Западной Европы почти исчезли случаи инфицирования через переливание крови и, таким образом, инъекционное потребление наркотиков осталось основной причиной передачи вируса. В последние годы установлены значительные изменения в возрастной структуре заболевших этими гепатитами, в структуре путей передачи гепатотропных вирусов

Цель исследования. Изучить изменение структуры лиц с выявленными антителами к вирусу гепатита С (aHCV) среди доноров Гомельской областной станции переливания крови по полу и возрасту.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были использованы данные о 2235 доноров, у которых выявили в крови анти-HCV за 1993-2016 год. В первом периоде (1993- 2000 гг.) общее количество таких лиц было 320, во втором периоде (2001-2010) – 1560, в третьем период (2011-2016) -355 человек. Для сравнения изменений в структуре по полу и возрасту в эти периоды использовались методы непараметрической статистики (таблица 2х2, критерий χ^2).

Результаты и обсуждение. В первом периоде (1993- 2000 гг) среди лиц с выявленными aHCV среди доноров Гомельской областной станции переливания крови было 70,3% (225) мужчин и 29,7% (95) женщин. Причем 82% (262 человек) узнали ,что имеют анти-HCV при обследовании в течении первого месяца после регистрации как донора. Количество лиц до 20 лет в этом периоде было 16 (5%), в возрасте 21-40 лет – 264 (82,5%), старше 40 лет - 40 (12,5%),.

Втором периоде (2001-2010) лиц с выявленными aHCV среди доноров Гомельской областной станции переливания крови мужчин 70,3% (896) и женщин 29,7% (332) . 56,5 % (883 доноров) впервые был поставлен диагноз при обследовании в течении первого месяца после регистрации как донора. Количество лиц до 20 лет в этом периоде было 207 (13,3%), в возрасте 21-40 лет – 1116 (71,5%), старше 40 лет - 237 (15,2 %).

Третьем периоде (2011-2016) лиц с выявленными aHCV среди доноров Гомельской областной станции переливания крови 61,1 % (217) мужчин и 38,9% (138) женщин. 71,3% (253 человек) узнали о заболевании при обследовании в течении первого месяца после регистрации как донора. Количество лиц до 20 лет в этом периоде было 128 (36%), в возрасте 21-40 лет – 188 (53%), старше 40 лет - 39 (11 %).

При сравнении структуры лиц с выявленными aHCV среди доноров Гомельской областной станции переливания крови по полу отмечается возрастание количества женщин в 2011-2016 гг. до 38,9% по сравнению с другими периодами ($p < 0,02$, $\chi^2 = 2,43$ при сравнении с первым периодом, $\chi^2 = 3,28$ при сравнении со вторым периодом). Также регистрируется возрастание

количества лиц до 20 лет с 5% в 1993-2000 гг. до 36% в 2011-2016 гг. ($p < 0,001$, $\chi^2 = 9,74$) и уменьшение доли лиц 21-40 лет (в 1993-2000 гг. 82,5% и в 2011-2016- 53%, $p < 0,001$, $\chi^2 = 6,14$).

Выводы. При сравнении структуры лиц с выявленными аHCV среди доноров Гомельской областной станции переливания крови по полу отмечается возрастание количества женщин в 2011-2016 гг. и регистрируется возрастание количества лиц до 20 и уменьшение доли лиц 21-40 лет. Доля лиц с выявленными аHCV старше 40 лет среди доноров за прошедшие периоды статистически значимо не изменялась. Выявленные изменения, вероятно, отражают изменения путей передачи в этот период времени.

Список литературы

1. Демин, Н. А. Вирусные гепатиты и донорство крови / Н. А. Демин // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения . - 2012. - №2, Т. 7. – С.522-523.
2. Фазылов, В. Х. Этиологические и патогенетические аспекты диагностики и лечения вирусных гепатитов/ В. Х. Фазылов // Казанский медицинский журнал. -2013. -№6, Т.94. – С.785-792.
3. Златьева, Н. В. Результаты изучения возможных путей заражения и распространенности вирусного гепатита с в одном из районов Санкт-Петербурга / Н. В. Златьева, Н. И. Кузнецов, С. Л. Плавинский, О. Ю. Кузнецова // Российский семейный врач. – 2006. -№4 Т. 10. – С.10-14.
4. Медицинская помощь больным с хроническими вирусными гепатитами в г.Москве – основные аспекты (по данным Консультативно-диагностического центра Инфекционной клинической больницы №1) / Е.А. Нурмухаметова и [др]. //Инфекционные болезни. -2014 - №4 – с.88-98.
5. Хронический вирусный гепатит: прошлое, настоящее и будущее./В.В. Нечаев, С.Л. Мукомолов, В.Ю. Назаров и др.// Эпидемиология и инфекционные болезни -2013 -№3 -С.4-8.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, И ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Лущенко Ю.С., Тимошилов В.И., Сидоров Г.А.

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"

Курск, Россия

Аннотация. Здоровье молодежи рассматривается на государственном уровне как прогностического фактора применительно к демографической ситуации. Одним из основных компонентов работы по повышению качества превентивных мер по предотвращению заболеваний, передающихся половым путем является изучение результатов этой деятельности, учитывая, как недостатки используемых мер и положительной стороны.

Ключевые слова: молодежь, профилактика, передающихся половым путем

THE VIEW OF MEDICAL STUDENTS ABOUT SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AND WAYS OF THEIR FORMATION

Lushenko Y.S., Timoshilov V.I., Sidorov G.A.

Kursk State Medical University,

Kursk, Russia

Abstract. The health of young people is considered at the state level as a prognostic factor in relation to the demographic situation. One of the main components of work to improve the quality of preventive measures to prevent sexually transmitted infections is the study of the outcome of this activity, considering how the shortcomings of the used measures and the positive side.

Keywords: youth, prevention, sexually transmitted infections

На уровне ВОЗ здоровье нации, прежде всего, определяется здоровьем лиц фертильного возраста и их способностью к воспроизводству. Доказано, что 40-60% бездетных пар не имеют детей по причинам, прямо или косвенно связанными с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). Наиболее эффективно реализуемыми мерами профилактики ИППП признаны санитарно-просветительная работа и санитарно-противоэпидемические мероприятия, наибольшие проблемы имеют место в сфере ранней диагностики, полного выявления и лечения больных, а также в сфере тематической подготовки организаторов профилактических мероприятий [4].

Цель исследования – изучение представлений студентов-медиков об ИППП и путей их формирования до изучения клинических дисциплин.

Нами был проведен опрос 144 студентов 2-3 курсов ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и 106 студентов 2 курса МФК КГМУ – всего 250 единиц наблюдения. Студенты-медики до изучения клинических дисциплин могут рассматриваться как специфическая категория, т.к. по сравнению с молодежью

в целом имеют более глубокие знания по биологии, микробиологии, эпидемиологии, большее представление о жизненном цикле и путях передачи возбудителей, но профессиональных знаний об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечению соответствующих заболеваний еще не получили.

Из источников первичного информирования о проблеме ИППП самым часто упоминаемым у студентов-медиков являются средства массовой информации (33,2%). Далее следуют знания, полученные на занятиях (27,6%) и 20% опрошенных впервые узнали об ИППП от родственников. У 5,6% опрошенных первичным источником информирования выступил Интернет. Следует отметить, что профессиональные профилактические мероприятия и распространяемые в ходе их проведения материалы стали первыми источниками информации о данной проблеме для всего 10,8% опрошенных. При этом информация от врачей была первой только для 4% респондентов.

Из числа мероприятий по профилактике ИППП, в которых респонденты сами участвовали в течение 3 последних лет, самыми распространенными оказались лекции врачей, посещавших учебное заведение – на участие в таковых указали 52% студентов. Менее распространенными мероприятиями являются использование Интернет-ресурсов (39,2%), лекции психологов, педагогов, социальных работников по вопросам полового воспитания (38%) и изучение соответствующих тем в рамках занятий (34,8%). Менее 25% указали на просмотр видеоматериалов (24%), чтение специальной литературы (23,2%), профилактические обследования, пройденные по собственной инициативе (20,4%).

При выделении мероприятия, которое оказало наибольшее влияние на представления о проблеме ИППП, лидируют лекции врачей, посещавших учебное заведение (31,6%). Следующую позицию заняли изучение соответствующих тем на учебных занятиях (16%), лекции психологов по вопросам полового воспитания (14,8%), просмотр видеоматериалов (12%), использование Интернет-ресурсов (11,2%) и чтение специальной литературы (8,4%). Мероприятия с долей ответов менее 5% являются редкими и мало влияют на результаты информационной кампании в целом. В их число входят индивидуальные консультации у врача, самостоятельное изготовление агитационных материалов и участие в волонтерских акциях, флешмобах.

Для выделения наиболее информативных каналов просвещения студентов по вопросам ИППП мы оценили соотношение между охватом частотой указания источника информации в качестве наиболее информативного и определяющего и охватом соответствующей формой работы. Чем ближе такое соотношение к 1, тем более информативным следует считать соответствующее мероприятие [1].

Информативными мероприятиями по оценкам 50% и более участников являются лекции врачей (0,6) просмотр видеоматериалов (0,5), учебные занятия (0,5). Как менее информативные мероприятия следует оценивать Лекции психологов, педагогов по вопросам полового воспитания (0,4), чтение специальной литературы (0,4), использование Интернет-ресурсов (0,3).

Эффективность информационно-образовательной работы в плане достижения объективных представлений о проблеме оценивалась нами по аналогии с ранее выполненными работами в сфере наркопредрасположенности [2,3]. Адекватными представлениями о проблеме инфекций, передающихся половым путем следует считать убежденность в глобальности проблемы, т.е. существования риска заражения для каждого живущего половой жизнью, признания для себя вероятности заболевания, готовность обследоваться с профилактической целью, в случае возникновения симптомов заболевания обращаться за помощью к врачам государственных медицинских учреждений и частных клиник, информировать и мотивировать к обследованию и лечению полового партнера. Оцениваемый таким образом эффект, рассматриваемый как положительный результат профилактики, достигнут у 53,2%.

Среди заблуждений относительно риска заражения ИППП, встречались мнения о том, что риск существует только при частой смене половых партнеров (14,4%), о том, что половые инфекции – проблема ограниченного круга социально неблагополучного населения (2,8%), о неэффективности каких-либо мер профилактики (1,2%). В целом, студенты-медики оценивают риск заражения достаточно объективно: доля признающих всеобщий характер проблемы составляет 81,6%, а удельный вес всех ошибочных суждений составляет всего 18,4%.

В целом за профессиональной помощью врачей при возникновении заболеваний или их симптомов готовы самостоятельно обращаться 95,6% опрошенных. При этом доверие государственным клиникам несколько выше (63,2% готовых обращаться против 54,8% для частных), а 22,4% студентов готовы обращаться к нескольким специалистам в разные учреждения. Рассматривая заинтересованность в выборе предпочтений в получении помощи, следует отметить, что 2,8% студентов-медиков готовы заниматься самолечением, в том числе обращаться к непрофессиональной информации (народные средства, помощь родственников, интернет), а рекомендациям работников аптек доверяют 1,6%.

Отдельно следует обратить внимание, что заинтересованы проходить обследования с целью раннего выявления и профилактики ИППП всего 67,6%, чего явно недостаточно для полного охвата массовым скринингом.

При этом студенты-медики проявляют высокую сознательность в отношении половых партнеров: в совместных действиях с партнером по обследованию и лечению заинтересованы 97,2%.

Таким образом, наиболее распространенными мероприятиями по профилактике ИППП оказались лекции врачей, посещавших учебное заведение (52%), наиболее информативными – лекции врачей (0,6) просмотр видеоматериалов (0,5), учебные занятия (0,5). В целом, студенты – медики благополучная категория в плане информированности по инфекциям, передающимся половым путем, т.к. 81,6% опрошенных имеют объективную самооценку рисков заражения. За профессиональной помощью врачей при возникновении заболеваний или их симптомов мотивированы самостоятельно

обращаться более 95%. Необходимость совместного лечения с партнером осознают 97,2% опрошенных. Проблемой является низкая мотивация студентов-медиков к прохождению обследования с целью раннего выявления ИППП.

Список литературы

1. Тимошилов В.И., Фисюк А.А. Оценка путей информирования студентов-медиков I курса об инфекциях, передаваемых половым путем // Проблемы медицины в современных условиях: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. - Казань: Инновационный центр развития образования и науки, 2016. С. 93-96.
2. Тимошилов В.И., Сидоров Г.А. Концепция формирования наркопредрасположенности молодёжи // Кубанский научный медицинский вестник – 2010. -№3-4. -С. 183-187.
3. Тимошилов В.И., Сидоров Г.А. Проблема индуцированной наркопредрасположенности у студентов Курской области// Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2013. № 2. С. 261-264.
4. Экспертная оценка качества полового воспитания молодежи и профилактики инфекций, передаваемых половым путем / Коробцова Ю.С., Кнышенко О.А., Яценко Д.В., Грудина А.В., Парахина А.Н., Тимошилов В.И. // Миссия современного преподавателя: духовность, патриотизм, профессия: Сборник научных трудов участников Международной конференции молодых ученых светских и духовных учебных заведений «Молодой преподаватель вуза -доверенное лицо государства» в рамках Международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество - 2015». – Курск: ООО АПИИТ «Гиром», 2015. – С. 203- 206.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Майстренко С.А.¹, Лукашов М.И.¹, Тишина Е.И.²

ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер»¹

ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"²
Курск, Россия

Аннотация. По данным литературных источников, материалам собственных исследований и обобщенного опыта профессиональной деятельности рассмотрены некоторые вопросы социальной работы с ВИЧ-инфицированными лицами в условиях Центра по борьбе со СПИД.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированные, социальная работа, социально-медицинская работа.

The Features Of The Social Work With HIV-infected Patients: The Regional Aspect

Maystrenko S.A.¹, Lukashov M.I.¹, Tishina E.I.²

Kursk oblast clinical dermatological and venereal dispensary¹

Kursk State Medical University²

Kursk, Russia

Abstract. Few issues of the social work with the HIV-infected patients of the AIDS centre have been considered basing on the data of literary sources, materials of the own investigations and generalized occupational experience.

Key words: HIV-infected patients, social work, social medical work.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) /СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) - одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством в конце 20 века. ВИЧ/СПИД относится к числу заболеваний, уносящих наибольшее число жизней на планете, влияющих не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом.

По данным Центра СПИД ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер» общее количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в Курской области на 01.02.2016г. составило 2121 человек, в том числе местных жителей - 1357 человек (из них в возрасте до 29 лет – 638 (47,0%) человек). Следует отметить, что изменения в характере эпидемии делают сообщество людей с ВИЧ все более разнородным, включающим самые разные слои и возрастные группы населения, имеющие различные проблемы и потребности в связи с заболеванием.

П.Д. Павленок отмечает, что люди, инфицированные ВИЧ являются объектом социально-медицинской работы, так как эти лица имеют выраженные медицинские и социальные проблемы, которые взаимно потенцируют друг

друга и решение которых затруднительно в рамках односторонних мероприятий [1].

По мнению М.А. Беляевой, верным шагом в этом направлении является введение специалистов социальной работы непосредственно в штат многопрофильных больниц и специализированных клиник [2].

Н. Берковитц, Л. Дженкинс полагают, что целью социальной работы в здравоохранении является обеспечение профессиональной помощи людям, чьи возможности социального функционирования в сообществе с другими людьми нарушены или могут быть нарушены вследствие заболевания, ограничения возможностей или несчастного случая; при этом главная задача социальной работы в области здравоохранения в том, чтобы помогать больным и их семьям справляться с социальными и эмоциональными проблемами, сопровождающими заболевание и состояние ограниченных возможностей [3].

В Центре СПИД ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер» социальную поддержку ВИЧ-инфицированным лицам курирует специалист социальной работы.

В 2014 году нами было проведено социологическое исследование среди ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в Центре СПИД ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

Цель настоящего исследования - выявление нуждемости в социальной помощи и знаниях о таковой у ВИЧ-инфицированных пациентов.

В анонимном анкетировании приняли участие 109 респондентов в возрасте от 16 до 35 лет: 42 (38,5%) мужчины и 67 (61,5%) женщин. Из них: 59,8% - работают; 8,03% - учатся; 34,1% - не работают и не учатся.

Анализ результатов анкетирования показал, что 82,6% опрошенных специалистом социальной работы была предоставлена информация о возможности (в случае необходимости) обращения за социальной помощью в Комплексные центры социальной защиты населения г. Курска и Курской области.

Большинству респондентов (89,9%) ни разу не приходилось обращаться в Комплексные центры социальной защиты населения г. Курска и Курской области. Обращавшиеся же пациенты - 10,1% опрошенных - получали в вышеуказанной организации следующие виды помощи: трудоустройство (9,1%), оформление документов (54,5%), устройство ребенка в дошкольное образовательное учреждение (9,1%), материальная помощь (27,3%). Следует отметить, что большинство опрошенных лиц осведомлены о местонахождении Центра социальной защиты по месту жительства (56,9%), 30,3% - ответили отрицательно, 12,8% - затруднились ответить. Интересно, что в большинстве случаев (74,1%) при обращении за социальной помощью в Комплексный центр социального обслуживания населения, ВИЧ-инфицированные люди предпочитают не раскрывать свой ВИЧ-статус. Отношение же специалиста социальной работы характеризуют как доброжелательное (40,8%) и внимательное (57,5%), лишь в 1,7% случаев - как негативное.

67,2% участвовавших в анкетировании ВИЧ-положительных пациентов уверены в достаточности оказываемой им медицинской помощи. На вопрос: «По Вашему мнению ВИЧ/СПИД больным оказывается достаточная социальная помощь» 48,6 % респондентов – ответили утвердительно, 44,9% затруднились ответить.

Следует отметить - по мнению большинства пациентов (72,5%), принявших участие в анкетировании, ВИЧ-инфицированные лица нуждаются в социальной помощи, 27,5% затруднились ответить на поставленный вопрос. Отрицательно не ответил никто.

Среди видов социальной помощи, в которых нуждаются опрошенные лица, потребности разделились следующим образом: оформление документов - 9,8%; трудоустройство - 17,1%; облегчение доступа к оказанию необходимой медицинской и социальной помощи - 25,2%; консультация по правовым (юридическим) вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции - 13%; не нуждались на момент проведения исследования - 34,4% респондентов.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ВИЧ-инфицированные пациенты нуждаются в оказании не только квалифицированной медицинской, но и социальной помощи.

По мнению авторов (Бородкина О.И., 2004, Ванюков А. А., 2006, Островский Д. В., 2006), к основным трудностям развития системы социальных услуг для ВИЧ-инфицированных относятся прежде всего: недостаток финансирования программ социальной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом людей, кадровые проблемы - большинство СПИД-центров в российских регионах не имеют в своем штате социальных работников (во многих из них имеется психолог, но его функции по оказанию социальной помощи чрезвычайно ограничены)

Основными задачами социальной работы с ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом являются:

1. Создание условий, при которых пациенты могут осуществить все положенные по закону гарантии.
2. Помощь в создании условий жизнедеятельности, в которых пациент чувствовал бы себя востребованным, включенным в реальные дела, в социум.
3. Увеличение степени самостоятельности пациентов, их способности контролировать свою жизнь и более успешно разрешать возникающие проблемы.
4. Создание условий, в которых пациенты могут в максимальной мере проявить свои возможности и на их основе адаптироваться к новым условиям жизни в обществе.
5. Достижение такого результата, когда необходимость в помощи специалиста социальной работы у пациента отпадает [4].

Для достижения обозначенных целей специалист социальной работы выполняет следующие обязанности:

- Сбор психосоциального анамнеза (ведение социального паспорта пациента).

- Оказание эмоциональной и психологической поддержки ВИЧ-инфицированного пациента и членов его семьи в критические моменты (при постановке диагноза, в случае неблагоприятного прогноза исхода заболевания - инвалидизации или угрозы гибели).
- Координация решения социальных вопросов.
- Защита интересов пациента в органах здравоохранения, социальной поддержки.
- Консультация по правовым вопросам, касающихся ВИЧ-инфекции, совместный поиск путей решения юридических проблем.
- Помощь в решении проблем трудоустройства.
- Вовлечение ближайшего окружения ВИЧ-инфицированного пациента в процесс помощи пациенту (например, формирование приверженности к приему лекарственных препаратов и т.д.).
- Предупреждение и разбор конфликтных ситуаций, возникающих между пациентом и его окружением (медперсонал, другие пациенты, родственники).
- Обучение пациента необходимым навыкам, облегчающим самообслуживание при ВИЧ-инфекции.
- Участие в принятии сложных «этических» решений (например, определение позиции родственников по отношению к ВИЧ-инфицированному ребенку).
- Образование групп взаимопомощи, установление связей между ВИЧ-инфицированными пациентами (например, находящимися на начальных стадиях преодоления заболевания и имеющих длительный опыт жизни с ВИЧ).
- Организация позитивных контактов со службами наркологической и психиатрической помощи, реабилитационными центрами и др.

Данный перечень мер социальной терапии является далеко неполным списком обязанностей, выполняемых специалистом социальной работы в условиях Центра СПИД.

Специфической задачей специалиста социальной работы в профессиональной деятельности с ВИЧ-инфицированными пациентами является помощь человеку в поиске ответа на экзистенциальные вопросы: почему это случилось именно со мной? как это изменит мою жизнь? сколько я еще проживу? Подобные вопросы не только истощают силы и жизненную энергию человека, подрывая его прежнее мировоззрение, но и угрожают депрессией и суицидальными попытками. Медицинский персонал часто недооценивает, не придает значения подобным экзистенциальным переживаниям, считая, что их миссия – облегчение физической, а не экзистенциальной боли.

По мнению М.А. Беляевой, специалист социальной работы должен заниматься именно страданиями пациента (имеются ввиду не столько физические страдания, сколько страдания душевные, в основе которых лежат сомнения, угрожающие безопасности личности как сложной социальной и биологической сущности, а не только сущности биологической), облегчение и преодоление которых повышает эффективность проводимого лечения [2, с.30].

Л.Г.Гуслякова говорит о том, что «Социальная работа как практическая деятельность в главном как раз и направлена на поддержание, развитие и реабилитацию индивидуальной и социальной субъектности, которые в единстве характеризуют жизненные силы человека. Социальная субъектность понимается нами как накопление и реализация индивидом своей способности к жизнеосуществлению во всех основных сферах общества ».

В способах осуществления социальной деятельности в работе с ВИЧ-позитивными людьми на первый план выходит оказание, прежде всего, социально-психологической поддержки, создание специальной активизирующей среды, в которой появляются условия для самоидентификации и самоактуализации личности инфицированного человека с учетом потенциальных (сохраненных и компенсаторных) возможностей. В организационном смысле же – доминанта деятельности специалиста по социальной работе смещается от традиционных функциональных обязанностей (провести консультирование, патронаж, реабилитационные мероприятия) в сторону общепсихологической и педагогической работы (формирование адекватных потребностей, расширение спектра интересов, складывание позитивной Я-концепции и др.)

Специалист по социальной работе должен быть подготовлен уметь видеть и чувствовать реабилитационный потенциал конкретного человека в ходе организационного взаимодействия создавать условия для активизации его жизненных сил.

Многолетнее изучение особенностей социально-психологической адаптации людей, живущих с ВИЧ, на различных этапах их жизни показало, что существует взаимосвязь между тем, как протекает заболевание, и тем, как люди приспосабливаются к новым условиям жизни. Эти периоды позволили выделить три основных периода в жизни людей, инфицированных ВИЧ, когда они особенно психологически уязвимы и нуждаются в социальной поддержке и социальном сопровождении [5, с.13-15].

Первый период: *установление ВИЧ-положительного статуса*. Факт установления наличия у человека ВИЧ-инфекции – чрезмерно тяжелый стрессовый фактор. В этот период на первый план выступают эмоциональные переживания, которые могут привести к повышению риска развития различных форм суицидального поведения. Человек испытывает:

- тревогу (по поводу нарушения конфиденциальности, невозможности что-то изменить);
- страх (по поводу возможного заражения ВИЧ близких или угрозы преждевременной смерти);
- чувство жизненной несправедливости;
- чувство вины (по отношению к людям, которых он мог заразить);
- угрызения совести (из-за собственного поведения, приведшего к инфицированию) и т.д.

Второй период: *проявление клинических признаков заболевания*. Закономерность течения ВИЧ-инфекции такова, что рано или поздно наступает

этап прогрессирования заболевания. Впервые ВИЧ-положительный человек начинает «ощущать присутствие вируса». Серьезные болезненные симптомы, необходимость стационарного лечения становятся тяжелым испытанием. Ухудшение состояния здоровья и пребывание в медицинском учреждении зачастую вынуждают человека оставить работу, прекратить учебу, изменить привычный круг занятий и общения. В этот период психологический кризис усугубляется рядом социальных проблем: меняются социальные роли в семье, рушится профессиональная карьера, возникают реальные материальные и финансовые трудности и т.д. Может угнетающе воздействовать необходимость начать регулярный прием АРВТ (антиретровирусных) препаратов. Мысли о возможности приближения собственной смерти нередко приводят к эмоциональному кризису.

Третий период: *терминальная стадия ВИЧ-инфекции*. Период, когда развиваются тяжелые необратимые последствия. На терминальной стадии заболевания (несмотря на имеющиеся нарушение памяти, замедление темпа протекания психически процессов) большинство пациентов сохраняет мучительные переживания по поводу своей скорой смерти и нуждается в психологической и социальной помощи. В каждый из перечисленных периодов ВИЧ-положительному приходится решать различные проблемы. Например, для женщины важно, что подумают о ней окружающие, как будут восприняты ее объяснения по поводу того, как она получила инфекцию и т.д.

Кроме работы с пациентом, следует сказать о другом важном поле деятельности - работе с ближайшим окружением пациента, его семьей. Инфицирование ВИЧ (при возможном наличии ранее сопутствующих заболеваний таких как - алкоголизм, наркомания) одного из членов семьи серьезно усугубляют ее функционирование, причиняя беспокойство и страдания всем ее членам (поставленным пациентом в известность о своем диагнозе), заставляя осваивать новую роль - роль «семьи ВИЧ-инфицированного пациента». Следует отметить, что роль ближайшего окружения возрастает еще сильнее, если инфицируется ВИЧ - ребенок. В этом случае не только пациент нуждается в поддержке, но и его ближайшее окружение. Важную роль в поддержке семей ВИЧ-положительных лиц играет консультативная помощь, проводимая специалистом социальной работы. Данный вид помощи представляет собой симбиоз образовательной, психологической, посреднической помощи, позволяющий осознать и выполнять обязанности, которые необходимо выполнять ближайшему окружению в процессе лечения пациента (например: помощь ближайшего окружения в выработке у пациента приверженности: к приему АРВТ (антиретровирусной терапии); своевременному посещению Центра-СПИД и т.д.). Перечисленные направления деятельности специалиста социальной работы в условиях Центра по борьбе со СПИД дают представление о многоплановости проводимой работы по социальному сопровождению пациента в ходе осуществления социально-медицинской работы.

Не маловажным является тот факт, что ВИЧ-инфекцию сопровождают предвзятое отношение общества, стигма и дискриминация. Когда основное количество людей, инфицированных ВИЧ, находится в бессимптомной стадии заболевания, общество в целом отказывается признавать для себя проблему ВИЧ-инфекции, оно отрицает ее наличие и влияние на социально-экономическую ситуацию в стране.

Как показали результаты опросов ВИЧ-инфицированных пациентов, среди разнообразных услуг, связанных с ВИЧ/СПИДом, ожидаемых от специалиста по социальной работе, наиболее распространенными являются: социально-психологическая помощь, направленная на снижение психологических последствий заражения ВИЧ и следующих за этим социальной изоляции, стигматизации, дискриминации, которые чаще всего выражаются в депрессии, страхе и беспокойстве; помощь в поиске и получении социальных услуг, связанных с обеспечением жильем, уходом за больными, заботой о детях; помощь в решении проблем, связанных с оказанием медицинских услуг; помощь в осознании своих гражданских прав и их защите, прежде всего, против дискриминации в связи со статусом ВИЧ-инфицированного, в том числе при приеме на работу (Звоновский В. Б., 2008, Беляева В.В., 2009, Решетников А.В., 2009).

Среди других трудностей, связанных с социальной работой с ВИЧ-инфицированными, множество морально-этических конфликтов. Большинство людей данной категории принадлежат к социальным группам, демонстрирующим неодобряемое в обществе поведение (потребители инъекционных наркотиков, проститутки, гомосексуалисты), отсюда возможные конфликты между социальными нормами и ценностями, которых придерживается социалист по социальной работе.

Распространенные в обществе мифы и стереотипы по поводу СПИДа присущи и специалистам по социальной работе, в результате чего у многих возникает страх и нежелание работать с ВИЧ-инфицированными и членами их семей. Поэтому, прежде всего, необходима образовательная подготовка самих специалистов по социальной работе по клиническим и практическим вопросам, связанным со СПИДом. Для поддержания и сохранения психологического здоровья работников социальной сферы требуется создание специальных групп поддержки во всех социальных организациях, обслуживающих ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, которые должны помочь им справиться со страхом, преодолевать собственные предрассудки по поводу СПИДа, психологически готовиться к возможной смерти пациента.

Таким образом, развитие системы социальных услуг для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом требует решения вопроса о специальном ценностно-ориентированном тренинге и защите (включая меры психологической защиты) самих социальных работников.

В качестве заключения важно отметить, что, социальная работа с ВИЧ-инфицированными лицами в условиях Центра СПИД является составной частью медико-социальной работы и представляет собой деятельность по

социальному сопровождению пациентов в целях повышения комфортности их пребывания в лечебном учреждении и, как следствие, повышение эффективности проводимых медицинских мероприятий. Нами четко установлено, что становление и развитие социальной работы в Центрах по борьбе со СПИД позволит решать соматические проблемы ВИЧ-инфицированного человека через рассмотрение его как целостного социального субъекта, каждая из четырех составляющих личности которого: соматическая, духовная, эмоциональная и ментальная - играет важную роль в поиске жизненных сил для преодоления последствий заболевания, стремления жить и интеграции в социальное общество.

Список литературы

1. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под ред. проф. П. Д. Павленка: Учебное пособие. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 596с.
2. Беляева М.А. Осмысление содержания понятия «медико-социальная работа»// Педагогическое образование. – 2008г. - №1.- С. 25-33.
3. Берковитц, Н. Практика социальной работы в стационарах: биопсихосоциальные аспекты / Н. Берковитц // Гуманистический подход к охране здоровья / пер. с англ. под ред. К.В. Григорьева. – М., 1998.
4. Кольцова О.В. Роль специалиста по социальной работе в построении общей помощи пациентам «Центра СПИД» // Мультипрофессиональный подход в лечении и уходе за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом: Практика совместного консультирования и лечения / под ред. Д.В. Островского – М.: РОО «СПИД инфосвязь», 2005 - С. 43-49.
5. Медико-социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей: Пособие для социальных работников.- Москва, 2006. – 114 с.

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕПРРИЯТИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗА.

Малыхин А.Н.,¹ Коломиец В.М.,² Коломиец Д.И.²

ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»¹
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»²

Курск, Россия

Аннотация. Были получены положительные результаты использования картографического управления территориальных источников туберкулеза среди населения. В результате выявления случаев и способности проводить целенаправленные ответные меры в конкретных областях (контингенты) города увеличилось. Опыт является основой для реализации этого метода во всем регионе.

Ключевые слова: туберкулез, территориальная источник, картографического управления.

The prospect of cartographic control of antiepidemic activities in the territorial sources of co-infection.

Malykhin A.N.¹, Kolomiets V.M.² Kolomiets D.I.²

Regional clinical TB dispensary¹

Kursk State Medical University²

Kursk, Russia

Abstract. Positive results of using cartographic control of territorial sources of tuberculosis among the population were obtained. As a result detection of cases and the ability to conduct targeted counter-measures in specific areas (contingents) of the city increased. Experience is the basis for the implementation of this method in the whole region.

Key words: tuberculosis, a territorial source, cartographic control.

В результате реализации национального проекта «Здоровье» и Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» эпидемическую ситуацию по туберкулезу хотя и удалось стабилизировать, однако Россия продолжает находиться в числе стран Европейского региона с высоким риском распространения туберкулеза [8]. Решение проблем туберкулёза обозначено в указе Президента РФ от 07.05.2012 № 598 как одна из приоритетных задач здравоохранения и индикаторные показатели эффективности противоэпидемических мероприятий являются важнейшими для государственной программы «Развитие здравоохранения» и, соответственно, всех региональных программы [3,6].

Основным противоэпидемическим мероприятием при туберкулезе в здравоохранении является выявление источника инфекции (больной человек) и его реабилитация (излечение). С этой целью проводится регулярный мониторинг выявляемости туберкулеза лечебно-профилактическими учреждениями, при этом основное внимание уделяется осмотрам населения в группах риска [7]. Среди последних в настоящее время акцентируется внимание на ВИЧ-инфицированных, так как риск развития туберкулеза у них выше даже сравнительно с такими группами, как контингенты пенитенциарных учреждений и психически больные [4,5].

Одним из основных критерием оценки качества работы по своевременному выявлению туберкулеза является удельный вес больных, выявленных при плановых обследованиях (проверочных осмотрах населения флюорографическим методом). В условиях здравоохранения г. Курска при реализации программы ФЦП и Нацпроекта «Здоровье» в 2008-2015 годах удалось повысить выявляемых при профилактических осмотрах больных с 58,7% до 64,4%. В 2015 году отмечается уменьшение количества ФГ по всем поликлиникам г. Курска, увеличение осмотров произошло в ОБУЗ ГП № 4 (+12%) и ОБУЗ ГП №6 (+30%), в ОБУЗ ГП №5 (на 15%) отмечалось значительное снижение ФГ – на 20%). Если учесть, что среди городского населения, обслуживаемого первыми двумя ОБУЗ ГП удельный вес выявленных бактериовыделителей вырос с 46,2% до 51,5%, а ОБУЗ ГП №5 значительно выше при высоких цифрах заболеваемости (35.2), то сделан вывод о не благополучной эпидситуации в районе обслуживания этого ЛПУ. Среди впервые выявленных ТБ преобладали больные из неорганизованного населения, студентов, работников мелких предприятий (66,3%).

С целью интенсификации проверочных осмотров населения, что позволяет предотвратить развитие запущенных, наиболее опасных в эпидемиологическом отношении случаев заболевания туберкулезом, в лечебно-профилактических учреждениях г. Курска внедряется проект – мониторинг осмотров картографическим методом. Этот метод использован в отдельных регионах, наиболее целенаправленно в поликлинических учреждениях г. Москвы, где на территории одного округа в течение более пяти лет выявлены именно при использовании картографического своеобразные «зоны риска» - дворы, на территории которых зарегистрировано от 8 до 13 % очагов туберкулеза [1,2]. Используя этот же метод, возможно формировать и территориальные очаги, что позволит опять таки интенсифицировать проверочные осмотры и проводить целенаправленно противоэпидемических мероприятия [7],

Помимо случаев семейного туберкулеза, выявлены территориальные очаги, где рядом с источником заболел сосед по лестной площадке, что обуславливает необходимость расширения спектра обследуемых контактных. Введение в практику компьютерной программы «Карта участка» позволит проводить эпидемиологический мониторинг окружающей территории при

выявлении больного туберкулезом и определять спектр обследуемых контактных лиц в каждом конкретном случае.

В современных социальных условиях, пристального внимания требуют территории с высокой плотностью населения, имеющие единую коммунально-бытовую структуру. В этих дворах, кварталах больные тесно общаются и повседневно с другими жителями, в том числе – с детьми. Даже при появлении одного бактериовыделителя формируются контакты очень высокой плотности. В связи с этим в число контактных должны входить все жители дома или группы домов, имеющие общие внутримногомногоквартирные территории.

С целью изучения особенности распространения туберкулеза в зоне обслуживания ОБУЗ №5 внедряется мониторинг очагов ТБ с использованием картографического контроля. Метод картографирования широко применяется в эпидемиологии, в отечественной фтизиатрии в последнее время его использовали в отдельных регионах (Тверская и Белгородская области, МНПЦБТ). На карте-схеме территории, при использовании информационных баз здравоохранения, идентифицируются все территориальные очаги с динамическими данными о всех активных больных и инфицированных детей и подростков, .

Указанный метод позволяет: аргументированное формирование территориальных очагов туберкулеза с расширением их границ и путей передачи инфекции; определить эндемические очаги туберкулеза и их согласование по участкам общелечебной сети; определение степени эпидемической опасности очагов с целью разработки дифференцированных противоэпидемических мероприятий; интенсифицировать профилактические обследования населения на участке.

Картографирование территориальных очагов имеет существенное значение для прогнозирования вспышек туберкулеза и принятия оперативных решений при возникновении эпидемиологической опасности. Однако следует подчеркнуть, что наиболее значимо и эффективно использовать картографирование очагов при работе с общелечебной сетью здравоохранения (семейные и врачи общей практики, врачебные офисы, участковая терапевтическая служба) и администрацией территорий. Из опыта внедрения картографирования приведем пример, когда после ознакомления с данными по территории обслуживания ОБУЗ ГП №5 на отдельных территориях (улицы, дома, кварталы) администрацией округа города и поликлиники были организованы (точнее, мобилизованы) все заинтересованные службы и проведено сплошное обследование населения, приоритетно группы повышенного риска. Существенное значение имеет анализ данных картографирования при выяснении причин первичной множественной лекарственной устойчивости.

Полученные положительные результаты картографического контроля на отдельной территории города территориальных очагов являются основанием для внедрения этого метода в целом регионе.

Список литературы

1. Гусева Н. Н., Дитятков А. Е., Мишин В. Ю. Медико-социальная характеристика заболевших в семейных очагах туберкулеза / // Клиническая геронтология: Научно-практический рецензируемый журнал. - 2013. - т. 19, № 7/8. - С. 43-47 .
2. Дитятков А. Е., Гусева Н. Н. Визуализация эпидемической обстановки по туберкулезу как средство помощи участковым фтизиатру и терапевту в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий /А. Е. Дитятков, Н. Н. Гусева // Клиническая геронтология: Научно-практический рецензируемый журнал. - 2014. - т. 20, № 1/2. - С. 63-65 .
3. Касаева Т.Ч., Габассова Л.А., Васильева И.А., Москалев А.А. Совершенствование организации борьбы с туберкулезом в Российской Федерации в рамках Государственной программы развития здравоохранения и Глобальной стратегии ВОЗ. /Туберкулез в Российской Федерации, 2012/2013/2014 гг. Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации и в мире. – М., 2015. – С. 11-14.
4. Коломиец В.М., Коноркина Е.А., Шпак А.В. Социально-психо-логическая реабилитация психически больных как метод неспецифической профилактики туберкулеза.//Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2013. - №3. – С. 19-22
5. Коломиец В.М. Пенитенциарный туберкулез: патоморфоз и эффективность реабилитации.- Курск. – 2014. – 248 с
6. Нечаева О.Б., Стерликов С. А., Хуриева Н. Б. Целевые индикаторы и показатели Государственной программы развития здравоохранения России до 2020 г. // Туберкулёз и болезни лёгких. 2014. № 12. С. 25-34.
7. Эффективность мониторинга региональных программ предупреждения распространения туберкулеза» /под ред. проф. Коломиец В.М./ Курск.: КГМУ. - 2014.- 400 с.
8. Global Tuberculosis Report 2013. Geneva, World Health Organization (WHO) Library Cataloguing-in-Publication Data. (WHO /HTM/TB/2013.11).

СЛУЧАИ ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мельникова Е.Ф.¹, Архипина С.А.^{1,2}, Афонина Е. С.¹

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет

им. И.С.Тургенева», медицинский институт,¹

**БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина»²,
г. Орёл, Россия.**

Аннотация. В статье представлены результаты собственного исследования этиологии, эпидемиологии, особенностей клинической симптоматики, а также диагностики и терапии Лайм-боррелиоза в Орловской области.

Ключевые слова: лайм-боррелиоз, особенности этиологии, эпидемиологии, клиники и лечения

Cases of Lyme borreliosis in the Oryol region

Melnikova E.F., Arkhipina S.A., Afonina E.S.

Orel State University. I.s. Turgenev, Medical Institute,¹

BOOZE Oryol region urban hospital. S.p. Botkin»²,

Oryol, Russia.

Abstract. The present study contains the results of the researchs etiology, epidemiology, clinical, diagnosis and treatment of Lyme borreliosis. The article represents an observation of age structure and severity of illness.

References.

Key words: Lyme borreliosis, particularly the etiology, epidemiology, clinic and.

Болезнь Лайма имеет глобальное распространение в рамках обитания иксодовых клещей и характеризуется высокой заболеваемостью. В РФ клещевой боррелиоз официально внесен в реестр инфекционных заболеваний с 1992г. Иксодовые клещевые боррелиозы в настоящее время являются актуальной проблемой инфекционной патологии в России и Орловской области. Меняющиеся условия внешней среды: глобальные изменения климата, выразившиеся заметным потеплением зим (повышением средней температуры зимних месяцев и сокращением периода с отрицательной температурой воздуха), изменение качественных характеристик антропогенного воздействия повлияли на рост численности основного переносчика. На территории Орловской области находятся многочисленные лесопокрываемые зоны, которые интенсивно посещаются населением. Значительная их часть заселена клещами, которые проникают и в город по парковым коридорам. В настоящее время заболевание приобретает все большее значение в связи с расширением ареала распространения иксодовых клещей, содержащих боррелии. Спонтанная

инфицированность клещей боррелиями в природных очагах может составлять от 10 до 70% и более [1]. Лайм-боррелиоз характеризуется большим полиморфизмом клинических проявлений, что иногда может усложнять диагностику. Разнообразные клинические симптомы заболевания требуют проведения дифференциальной диагностики, а также применения специфических лабораторных методов диагностики. Однако преимущественное поражение кожи в сочетании с фактом обнаружения клеща у пациента позволяет предположить наличие заболевания и начать раннюю этиотропную терапию [1, 2, 3].

Целью нашего исследования явилось выявление клинико-эпидемиологических особенностей Лайм-боррелиоза у взрослых пациентов, госпитализированных в городскую больницу им. С.П. Боткина в период с 2004г. по 2016г. Для анализа детально изучили 63 архивных истории болезни взрослых пациентов. У всех наблюдаемых больных при поступлении был собран тщательный эпидемиологический анамнез. Все пациенты отмечали пребывание в эндемичной местности (лес или лесопосадка) и укус клеща. Также при поступлении и в динамике болезни проводилось рутинное лабораторное обследование - клинический анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови.

Динамика распределения госпитализированных больных по годам представлена следующим образом: по 1 пациенту в 1999, 2002, 2004 гг., 2 - в 2016г., 3 - в 2011г., 4 – в 2014г., по 5 - в 2003, 2005, 2009, 2013гг., по 6 – в 2006, 2007, 2008гг., 7 – в 2015г. В 2000 и 2001г. больных, нуждающихся в госпитализации, не выявлено. Исследование распределения случаев заболеваний по месяцам показало, что на период с мая по октябрь приходится 63,5% всех выявляемых в течение года случаев заболеваний. Таким образом, наблюдается выраженная сезонность, связанная с периодом активности клещей, что соответствует современным литературным данным [1]. Анализ историй болезни показал, что минимальный возраст заболевших 20 лет и максимальный – 75 лет. При этом установлено, что 82,5% пациентов были в возрасте от 40 лет и старше. Анализируя половой состав пациентов, установили, что число заболевших мужчин и женщин было практически равным – 50,8% и 49,2% соответственно. Среди всех больных 58,7% являлись жителями села, 41,3% – жителями города. При проведении детального анализа направительных диагнозов было выявлено, что при направлении в стационар диагноз «системный клещевой боррелиоз» был поставлен 60 пациентам (95,2%) и лишь в 3 случаях заболевание диагностировалось как рожистое воспаление. Преобладали пациенты с острым течением клещевого боррелиоза (93,6%). Кольцевидная мигрирующая эритема преимущественно локализовалась в области туловища (47,6%) и нижних конечностей (30,1%). Во всех случаях заболевания эритема была характерной – кольцевидной, мигрирующей, с более светлым центром, диаметром от 4см до 35см, имела яркую гиперемию с четкой границей по периферии. Эритема сочеталась с умеренными симптомами интоксикации в 52,4% случаев: головная боль у 12,7% пациентов,

субфебрильная температура тела у 28,6%, общая слабость у 93,6%. У госпитализированных пациентов клинические проявления соответствовали I стадии заболевания и проявлялись в средней степени тяжести.

Лабораторная диагностика заключается в обнаружении в крови обследуемых пациентов антител к боррелиям, которые появляются на I стадии заболевания. Однако по данным современных авторов примерно у 30% больных боррелиозом с кольцевой мигрирующей эритемой специфические антитела на первой стадии заболевания могут не определяться [2, 3]. В нашем исследовании диагноз подтвердился обнаружением антител к антигенам *B. burgdorferi* методом иммуноферментного анализа в 69,8% случаев. Остальным пациентам диагноз поставлен по клинико-эпидемиологическим данным.

Лечение болезни Лайма было комплексным. Этиотропную терапию получали все больные. По данным современных авторов, если лечение антибактериальными препаратами начато уже на I стадии заболевания при условии отсутствия признаков поражения нервной системы, сердца, суставов, то значительно снижается вероятность развития неврологических, кардиальных и артралгических осложнений. В 2004-2016 гг. больным назначалась монотерапия препаратами цефалоспоринового ряда в средне-терапевтической дозировке. Так же применялась патогенетическая (дезинтоксикационные, антигистаминные средства) и симптоматическая терапия (жаропонижающие и витамины). На фоне лечения эритема, а так же другие симптомы заболевания угасали в течение 4– 16 дней.

Заключение. По официальным данным, в нашей стране ежегодно регистрируется около 8 тысяч больных Лайм-боррелиозом, однако по предварительным расчетам их количество может быть существенно больше. На протяжении последних лет проблема Лайм-боррелиозов продолжает оставаться актуальной и для Орловской области. Климатогеографические условия Орловской области (умеренный климатический пояс, преобладание степных и лесостепных ландшафтов), широкое распространение клещевого боррелиоза среди населения позволяют говорить о существовании его активных природных очагов в нашем регионе. Результаты наблюдений позволяют выявить тенденцию к росту заболеваемости болезнью Лайма в Орловской области. Практическое отсутствие расхождений направительного и заключительного диагнозов свидетельствуют о достаточной настороженности медицинских работников в отношении данного заболевания. За период 2004-2016 гг. отмечалось преобладание лиц в возрасте старше 40 лет, преимущественно сельских жителей. У госпитализированных пациентов преобладали эритемные формы болезни средней степени тяжести, с преимущественной локализацией на туловище и нижних конечностях. Применение этиотропной и патогенетической терапии приводило к купированию основных клинических симптомов заболевания. Для лечения больных важно раннее назначение антибиотиков цефалоспоринового ряда.

Таким образом, на территории Орловской области распространены активные природные очаги Лайм-боррелиоза, основная роль в формировании

которых принадлежит зараженности переносчиков, что обуславливает эпидемическое проявление природных очагов и заболеваемость населения. Для контроля эпидемической ситуации и снижения риска заражения населения необходимо дальнейшее совершенствование надзора за клещевыми боррелиозами, включающее мониторинг заболеваемости и определение уровня инфицированности клещей.

Список литературы

1. Болезнь Лайма у взрослых. Клинические рекомендации/ Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Профильной комиссией Минздрава России по специальности "инфекционные болезни" на заседании 25 марта 2014 года.
2. Безбородов Н.Г., Половинкина Н.А., Попова С.П. Клинические особенности локализованной стадии клещевого боррелиоза (болезни Лайма) / Земский врач. – 2013. - №3(20). – с. 32-35.
3. <http://www.epid.ru/docs/infdoc10.html>

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Михайлова О.В.¹, Бородин Г.Л.¹, Коломиец В.И.²

**УО «Белорусский государственный медицинский университет»¹,
г. Минск, Республика Беларусь**

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»²,
Курск, Россия**

Аннотация. Он был изучал эпидемиологические данные о заболеваемости туберкулезом в Республике Беларусь и в одном из регионов России. Было проведено исследование особенностей курса 160 ТБ больных с ВИЧ-инфекцией и / или хронический вирусный гепатит.

Клиническая структура была неблагоприятными в случаях с различными Коморбидные патологией, с преобладанием destructives, распространены и генерализованных форм ТБ с устойчивостью МБТ препаратами.

Наличие сопутствующих иммуносупрессивных заболеваний негативно влияет на сроки прекращения МБТ и результатов лечения.

INFLUENCE OF COMORBID PATHOLOGY ON CLINICAL COURSE OF PULMONARY TUBERCULOSIS.

Mikhailova O.V.¹, Borodina G.L.¹, Kolomiets V.I.²

Belarusian State Medical University¹,

Minsk, Republic of Belarus

Kursk State Medical University²,

Kursk, Russia

Abstract. It was studied epidemiological data about of TB incidence in the Republic of Belarus and in one of the regions of Russia. It was conducted research concerning the features of the course of 160 TB patients with HIV infection and / or chronic viral hepatitis.

The clinical structure was unfavorable in cases with various comorbid pathology, with prevalence of destructives, disseminated and generalized forms of TB with MBT drugs resistant.

The presence of concomitant immunosuppressive diseases a negative influence on the timing of the termination of MBT and results of treatment.

Введение. Туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты (ХГВ) являются глобальными проблемами мирового здравоохранения [1,8]. Эпидемическая ситуация по хроническим вирусным гепатитам (ХГВ) вызывает особую тревогу, так как отмечается выраженная тенденция к их широкому распространению [5]. И при неуклонном повышении заболеваемости вирусными гепатитами особенное положение, аналогично с эпидемической

ситуацией по туберкулезу, занимают контингенты, где создаются наиболее благоприятные условия для распространения болезни [6]. Больные (вирусоносители) ХГВ и ВИЧ-инфицированные лица становятся одной из основных групп риска по заболеваемости туберкулезом. Что неудивительно, так как вирусный гепатит может отрицательно влиять на течение туберкулеза из-за возникновения или усугубления иммунологических нарушений вследствие дисфункции печени, которая активно участвует в формировании защитных реакций как врожденного, так и адаптивного иммунитета [7,9]. Негативное влияние оказывает ВИЧ- и ХГВ-ассоциированный туберкулез (ВИЧ/ТБ и ХГВ/ТБ), количество таких пациентов увеличивается в связи с очень быстрым ростом ВИЧ-инфицированных [2,3,4].

Цель исследования: провести анализ влияния коморбидной патологии (ВИЧ – инфекции и хронических вирусных гепатитов) на клиническое течение туберкулеза.

Материалы и методы: В соответствии с планами межвузовского сотрудничества вузов Союзного Государства изучены статистические данные о распространении туберкулеза и ВИЧ/ТБ в Республике Беларусь и одном из регионов России (Курская область) за последние 8 лет. При изучении особенностей течения туберкулеза с наличием ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов проведено простое открытое пилотное исследование 50 и 110 больных туберкулезом вирусоносителей, находившихся на лечении в стационарных отделениях клинических баз. Использованы стандартные диагностические методы и режимы лечения туберкулеза.

Результаты и обсуждение. С 2008 по 2014 годы уровень заболеваемости туберкулезом в Республике Беларусь снизился на 25,4% (с 45,3 до 33,8 на 100 тыс. населения), а уровень смертности от туберкулеза снизился на 45,3% (с 8,6 до 4,7 на 100 тыс. населения). Аналогичные изменения эпидемической ситуации по туберкулезу отмечается и в регионе Российской Федерации, где в результате реализации Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007 - 2011», в т.ч. подпрограммы «Туберкулез», удалось снизить заболеваемость туберкулезом до 59,5 за год (против 85,1 на 100 000 населения в 2008 году) и в целом стабилизировать эпидемическую ситуацию [2].

В то же время эпидемическая ситуация по сочетанной патологии выглядит несколько иначе. Так, в РБ в 2015 году было выявлено 3119 пациентов с туберкулезом и зарегистрировано 236 новых случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. И хотя в 2015 году впервые отмечено снижение числа пациентов ВИЧ/ТБ, по состоянию на 01.01.2016 года кумулятивное число пациентов ВИЧ/ТБ в Республике Беларусь составило 2916 человек.

В Курской области с 1995 г. распространенность носительства вирусного гепатита В характеризуется волнообразными колебаниями из года в год, с достижением максимального уровня в 2004 г. (97,7 на 100 000 населения), а к 2011 г. сократилась на 51,7% - до 47,2 на 100 000. В этот же период удалось

стабилизировать эпидемическую ситуацию по туберкулезу на уровне заболеваемости 53,7 на 100 000. Частота впервые выявляемого вирусоносительства в целом составляла 4,8-4,9% ежегодно среди этой группы или 285/100.000, в то время как среди всего населения не превышает 60/100.000 населения.

При анализе результатов наблюдения группы больных РБ с коморбидной патологией выявлено, что среди пациентов с сопутствующими ХГВ преобладали мужчины (83,3%), а в группе с сопутствующей ВИЧ-инфекцией мужчин и женщин было поровну (50%/50%). В группе пациентов с сочетанием вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции вновь доминировали мужчины (85%).

Средний возраст пациентов с сопутствующими хроническими вирусными гепатитами составил 44 года, с сопутствующей ВИЧ-инфекцией – 48 лет, с сочетанием ВИЧ и хронического вирусного гепатита – 44 года.

Среди пациентов с ХГВ в г. Минске зарегистрированы 11 пациентов, 5 человек проживали в других регионах республики, 2 пациента являлись гражданами РФ; 10 пациентов с ВИЧ-инфекцией проживали в г. Минске, 2 пациента – из других областей республики; 17 пациентов с сочетанием ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов были зарегистрированы в г. Минске, 3 пациента – из других регионов РБ. 37 пациентов (74%) не имели постоянного места работы, 13 (26%) – имели частичную или полную занятость.

На фоне туберкулеза легких, который являлся основным диагнозом, специфические изменения в других органах обнаружены у 4 пациентов (8%), в том числе поражение ЦНС – 2 чел. (4%), кости и суставы – 1 чел. (2%), почки – 1 чел. (2%). Сопутствующей патологией у всех пациентов с экстраторакальным туберкулезом была ВИЧ-инфекция.

У пациентов с хроническими вирусными гепатитами в преобладающем большинстве (94%) диагностирован инфильтративный туберкулез легких и лишь в одного (6%) выявлен фиброзно-кавернозный процесс. В тоже время среди пациентов с ВИЧ/ТБ почти с одинаковой частотой диагностировали инфильтративный и диссеминированный (у 58% и 42% соответственно), а у пациентов с наличием ВИЧ/ТБ и гепатитов обнаруживали и очаговый туберкулез легких (соответственно у 69%, 30% и 10%).

Впервые диагноз туберкулеза установлен в 39 случаях (78%), у 11 пациентов (22%) зафиксирован рецидив туберкулеза (5 пациентов с ВИЧ-инфекции и хронические вирусные гепатиты, 5 – с диагнозом хронического вирусного гепатита, 1 пациент с диагнозом ВИЧ-инфекции).

При наличии коморбидной патологии ТБ процесс протекал в 74% случаев с распадом легочной ткани. Наличие бактериовыделения зафиксировано у 98% пациентов, методом бактериоскопии – у 44%. У 1 пациента (2%) выделения *M.tuberculosis* в анализах мокроты за весь период лечения не установлено.

У 27 пациентов (54%) *M. tuberculosis* были устойчивы к противотуберкулезным препаратам, в 23 случаях (46%) чувствительность сохранена.

Анализ коморбидной патологии показал, что из 12 пациентов (24%) с ВИЧ/ТБ ВИЧ-инфекция 3ст. диагностирована у 8 пациентов и 4ст. – 4 чел.

Хронический вирусный гепатит различной давности (от впервые установленного до 15-20 лет) обнаружен у 18 пациентов (36%): ХВГ С – 15 случаев, ХВГ В – 2 случая, ХВГ В+С – 1 случай. Наличие ко-инфекции в виде сочетания ВИЧ и ХВГ установлено у 20 пациентов (40%): ВИЧ+ХВГ С – 17 пациентов (34%), ВИЧ+ХВГ В+С – 2 пациента (4%), ВИЧ+ХВГ В+С+Д – 1 пациент (2%). У 3 пациентов (6%) выявлен гепатит Е: у 1 пациента при наличии ХВГ С 7-ми летней давности, у 1 пациента при наличии ХВГ В 2-х летней давности, у 1 пациента с впервые установленным ХВГ С).

В анализируемой группе 25 пациентов (50%) были либо по настоящее время являются инъекционными наркоманами, 25 (50%) - злоупотребляют алкоголем.

Из 32 пациентов с наличием ВИЧ-инфекции 17 пациентов (53%) получали антиретровирусную терапию.

Выявлены различия между группами по срокам абациллирования пациентов на фоне лечения. Бактериовыделение у пациентов с сопутствующим ХГВ в 50% случаев прекратилось через 1 месяц после начала терапии, 50% пациентов с сопутствующей ВИЧ-инфекцией абациллированы на 2-ом месяце лечения. У 63% пациентов с наличием ВИЧ и ХГВ бактериовыделение сохранялось до 8 месяцев от начала химиотерапии. Самые длительные периоды бактериовыделения отмечались у пациентов с наличием 4 стадии ВИЧ-инфекции и ХГВ.

Сравнительный анализ результатов исследования в группе больных из региона РФ показал, что клиническая структура является так же прогностически неблагоприятной не только с учетом форм, но и характера процесса - фаза распада выявлена у 68 больных (61,8%) и бактериовыделение отмечалось в 50% случаев. Оказалась неодинаковой клиническая структура и среди носителей различного типа вирусов: среди вирусоносителей В процесс в фазе распада определялся в 77,8% , в то время как у вирусоносителей С – 58,7%, а бактериовыделение соответственно в 61,1% и 47,8% случаев. Необходимо отметить, что при установлении вирусоносительства по данным лабораторных исследований не всегда возможно верифицировать заболевание гепатитом, так как клинические проявления могут быть обусловлены туберкулезом, а изменения данных лабораторных исследований (прежде всего функции печени) могут трактоваться как токсический гепатит вследствие антибактериальной терапии или сопутствующих заболеваний. Действительно, 29,1% больных злоупотребляли алкоголем, в том числе у 10% больных установлен диагноз хронической алкогольной интоксикации, а из 20,9% больных, прекративших лечение самовольно, большая часть также употребляли алкоголь. Прежде всего, у больных туберкулезом выявляли впервые вирусоносительство С – 83,6% больных. Наиболее часто вирусоносительство обнаруживали среди больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких - в 37,7% и 27,2% случаев соответственно, у больных фиброзно-кавернозным - 16,3%, плевритом - 5,4%, туберкулезом - 4,5%, казеозной пневмонией – 1,7% и очаговым в 7,2% случаев.

Эффективность лечения больных туберкулезом вирусоносителей была неодинаковой и с учетом клинической структуры значительно ниже сравнительно с контрольной группой (свободные от носительства больные). Результативным, т.е. определялась положительная динамика процесса, возможно было считать лечение лишь у 12,7% носителей вируса В и только у 47,3% носителей вируса С. При этом следует отметить, что одной из причин явно низкой эффективности была недостаточная длительность интенсивной фазы и постоянные нарушения режима в течение основного курса лечения, особенно злоупотребление алкоголем, а также высокая частота токсических реакций при проведении антибактериальной терапии вследствие снижения функционального состояния печени.

Выводы:

1. В условиях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу ВИЧ-инфицированные составляют одну из приоритетных групп риска, больные же туберкулезом являются группой повышенного риска хронического носительства вирусов гепатита В и С.

2. Среди больных с коморбидной патологией, преимущественно мужчин в возрасте 31-40 лет, высокий удельный вес социально-дезадаптированных лиц – не работающих, злоупотребляющих алкоголем и являющихся инъекционными наркоманами.

3. Клиническая структура случаев сочетанных заболеваний является неблагоприятной, с преобладанием деструктивных форм туберкулеза и бактериовыделения лекарственноустойчивых видов возбудителей.

4. Наличие сопутствующей иммуносупрессивной патологии отрицательно сказывается на результатах лечения пациентов (63% пациентов с ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусными гепатитами от 3 до 8 месяцев оставались бациллажными).

Список литературы

1. Глобальный доклад: Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2013. - «ЮНЭЙДС/ JC2417R». - 298 с.
2. Касаева Т.Ч., Габасова Л.А., Васильева И.А., Москалев А.А. Совершенствование организации борьбы с туберкулезом в Российской Федерации в рамках Государственной программы развития здравоохранения и Глобальной стратегии ВОЗ. /Туберкулез в Российской Федерации, 2012/2013/2014 гг. Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации и в мире. – М., 2015. – С. 11-14.
3. Коломиец В.М., Гусева В.А., Рублева Н.В., Шахова Ю.И. Особенности клинического течения и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. - №1. С.142-147.
4. Коломиец В.М., Алексо Е.Н., Буйневич И.В., Шевченко О.С. Координация противоэпидемических мероприятий по ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в приграничных регионах СНГ //Туберкулез и болезни

- легких.- 2015. -№5. – С.84-85.
5. Нечаев В.В., Мукомолов С.Л., Назаров В.Ю., Пожидаева Л.Н., Чахарьян В.В. Хронические вирусные гепатиты: прошлое, настоящее и будущее. //Эпидемиология и инфекционные болезни. -2013. - №3. –С. 4-9
 6. Петренко Т.И. Туберкулёза легких в сочетании с хроническими гепатитами: диагностика, лечение, прогноз. Автореф. дисс. докт. Новосибирск. - 2008. 34 с.
 7. Шахтильдян И. В., Михайлов М. И., Онищенко Г. Г. Парентеральные вирусные гепатиты. - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2003. – 383 с.
 8. Global Tuberculosis Report 2013. Geneva, World Health Organization (WHO) Library Cataloguing-in-Publication Data. (WHO /HTM/TB/2013.11).
 9. Kuntz E, Kuntz II. Hepatology. - Berlin: Springer, 2006. -P. 367-416.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ГНЁЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ НА ФОНЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Могилева Е.Ю.¹, Белоносова Е. Н.¹, Эфендиева Н. Н.¹, Архипина С.А.²

**БУЗ Орловской области «Орловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»¹**

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет»¹

им. И.С. Тургенева,²

Орел, Россия

Аннотация. В статье описаны два клинических случая гнездной алопеции у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРВТ), регрессировавшей при смене одного из антиретровирусных препаратов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, гнездная алопеция, антиретровирусная терапия, CD4-клетки, хронический вирусный гепатит С.

Clinical cases of alopecia areata on the background antiretroviral therapy

Mogilleva E.J.¹, Belonosova E.N.¹, Efendiyeva N.N.¹, Arkhipina S.A.²

**ORYOL regional center on preventive measures and struggle with AIDS and
infectious diseases¹**

Orel State University. I.s. Turgenev²

Orel, Russia

Abstract. This article describes two clinical cases of alopecia areata in HIV-infected patients receiving ARTV, regressed when you change one of the antiretroviral drugs.

Key words: HIV infection, alopecia areata, antiretroviral therapy, of CD4-cells, chronic viral hepatitis C.

Гнездная алопеция—хроническое заболевание с нерубцовым выпадением волос, начинающееся, как правило, с круговидных очагов на голове с возможностью распространения на другие участки волосяного покрова, вплоть до тотального облысения. Аутоиммунный характер заболевания подтверждает аномальная экспрессия в волосяном фолликуле тканевых антигенов двух классов главного комплекса гистосовместимости. Предполагается мультифакторная природа генетической предрасположенности к заболеванию (комплекс гистосовместимости, гены цитокинов, иммуноглобулинов). Значительную роль отводят функциональным нарушениям нервной системы и внутренних органов, эндокринной патологии (щитовидной железы), расстройствам баланса микроэлементов (особенно цинка) и аминокислот (уменьшение количества серосодержащих аминокислот - метионина, цистеина, аминокислот-антиоксидантов - глицина, глутаминовой

кислоты, цистеина), гемодинамики и транскапиллярного обмена кислорода с признаками тканевой гипоксии, изменений реологических свойств крови. Заболеваемость гнездной алопецией составляет 3-5% от общего количества дерматозов. Заболевание чаще встречается у детей и молодых взрослых в возрасте до 30 лет, мужчины и женщины болеют одинаково часто. У большинства пациентов рост волос возобновляется. Прогностически неблагоприятными признаками являются: тотальная, универсальная алопеция, частые рецидивы, очаги облысения на затылке (офиазис), дистрофические изменения ногтевых пластинок. В литературе встречаются единичные описания случаев гнездной алопеции у ВИЧ-инфицированных пациентов. В этиопатогенезе уделяют внимание аутоиммунному процессу, при котором ВИЧ индуцирует выработку аутоантител или изменяет баланс между Т-хелперами и Т-супрессорами с появлением измененных промежуточных клеток иммунитета, воздействующих на волосяной фолликул.

Мы наблюдали два клинических случая гнездной алопеции, дебютировавшей с области бороды у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих АРВТ в течение длительного времени, и полностью регрессировавшей при смене схемы специфической терапии.

Пациент Е., мужчина, 1980 г. р., диагноз ВИЧ-инфекции 3 ст. установлен в 2005 г., начал получать АРВТ в 2012 г. с диагнозом ВИЧ-инфекция, 4б стадия. В анамнезе – аногенитальные кондиломы, неспецифический уретрит, кандидозный баланит, орофарингеальный кандидоз, опоясывающий герпес, генитальный герпес, распространенный фолликулит, аллергический ринит, вторичная гипохромная анемия. Сопутствующая патология: хронический вирусный гепатит С, (с 2001 г.) репликативная фаза (с 2012 г.), генотип 1.

17.12.2014 г. обратился в центр с жалобами на потерю волос в области бороды в течение 1 месяца. В течение 5 мес. (с 18.07.14 г.) получает схему АРВТ: абакавир 0,3 (1табл. 2 раза в день), ламивудин 0,15 (1т. 2раза вдень), атазанавир 0,2(2 капсулы утром). Терапию переносит хорошо, вирусная нагрузка не определяется, CD4 $0,316 \cdot 10^9/\text{л}$. Объективно: в области бороды множественные очаги облысения округлой формы диаметром 1-5 см, кожа в проекции очагов спокойная, проба с потягиванием волос по периферии очагов отрицательная, свечения в лучах лампы Вуда нет. Из результатов анализов: в соскобе кожных чешуек с очагов области бороды на мицелий гриба методом микроскопии – мицелия гриба не обнаружено; кровь на микрореакцию отрицательная; гормоны щитовидной железы в пределах нормы. РНК ВИЧ менее 50 коп./мл; Т-help (CD3, CD4) 21,7% - $0,316 \cdot 10^9/\text{л}$, биохимический анализ крови – АЛТ 55 ед/л (↑), АСТ 40 ед/л (↑), билирубин общий 29,7 мкмоль/л (↑), билирубин прямой 8,5 мкмоль/л (↑), глюкоза 5,06 ммоль/л. В биохимическом анализе крови отмечалось повышение печеночных ферментов. Динамика показателей иммунного статуса: Т- help (CD3, CD4) 21,7% - $0,316 \cdot 10^9/\text{л}$; 16,1% - $0,198 \cdot 10^9/\text{л}$; 18,8% - $0,218 \cdot 10^9/\text{л}$. Был выставлен диагноз: HIV-инфекция, 4б стадия, ремиссия на фоне АРВТ. Хронический вирусный гепатит С, репликативная стадия. Очаговая алопеция, стационарная стадия. Пациенту

назначены: АРВТ (абакавир, ламивудин, атазанавир), инъекции глюконата кальция, витамины В1 и В6 внутримышечно №10, наружно – спрей Регейн.

Через месяц (26.01.2015 г.) очаги облысения в области бороды не увеличились, роста волос в очагах нет. Пациент продолжает получать АРВТ (абакавир, ламивудин, атазанавир), а также инъекции никотиновой кислоты внутримышечно №10, наружно – гель циклоферон, крем цинокап. Результаты анализов от 21.04.2015 г. - Т- help (CD3, CD4) 16,1% - $0,198 \cdot 10^9/\text{л}$; РНК ВИЧ менее 50 коп./мл, биохимический анализ крови без существенных изменений (см. табл. 1,2).

В течение полугода состояние пациента стабильное, вирусная нагрузка не определяется, количество CD4-клеток значительно не уменьшается, очаги облысения в области бороды сохраняются в неизменном виде, рост волос не возобновляется. 10.06.2015 г. произведена смена АРВТ: абакавир 0,3 1т. 2 раза в день, ламивудин 0,5 1 т. 2 раза в день, калетра 0,25 2 т. 2 раза в день.

2.11.2015г. рост волос в области бороды возобновился, объективно отмечены vellus-волосы в очагах, свежих очагов облысения нет, по периферии очагов волосы при потягивании не выпадают. Диагноз: HIV-инфекция, 4б стадия, ремиссия на фоне АРВТ. Хронический вирусный гепатит С, репликативная стадия. Гнездная алопеция, очаговая форма, фаза регресса. В настоящее время признаков гнездовой алопеции у пациента Е. нет, волосы в области бороды полностью восстановлены, эпизодов выпадения в последующем не отмечалось.

Пациент О. 1980 г. р., мужчина. Состоит на учете в центре СПИД с 2002 г., в 2013 г. выставлен диагноз ВИЧ-инфекции 4в стадия, назначена АРВТ, лечение переносит хорошо. В анамнезе: узловатая чесуха, вульгарные бородавки кистей, латентная ВПЧ-инфекция уретры, кандидоз полости рта. Сопутствующая патология: хронический вирусный гепатит С, репликативная фаза (генотип 3), остеохондроз поясничного отдела позвоночника, грыжи L5-S1, дисциркуляторная энцефалопатия, ВИЧ-ассоциированная демиелинизация с поражением белого вещества головного мозга.

Пациент О. обратился в центр 28.01.2015г. с жалобами на очаги облысения в области бороды в течение 1 месяца. В течение 2-х месяцев пациент получает схему АРВТ: зидовудин 0,3 (1т. 2 раза в день), ламивудин 0,15 (1 т. 2 раза в день), калетра (лопинавир, ритонавир) 0,25 (2т. 2 раза в день), терапию переносит хорошо. Объективно: в области бороды множественные очаги депигментированных волос диаметром 1-2,5 см, со слов, беспигментные волосы выросли в зонах облысения, по периферии очагов проба с потягиванием отрицательная, кожа в проекции очагов спокойная чистая, свечения в лучах лампы Вуда нет. Из результатов анализов: соскоб кожных чешуек и волос в очагах на бороде на мицелий гриба методом микроскопии – мицелия гриба не обнаружено, кровь на микрореакцию отрицательная, гормоны щитовидной железы в пределах нормы, РНК ВИЧ-1 менее 50 копий на мл, Т- help (CD3, CD4) 8,7%- $0,223 \cdot 10^9/\text{л}$. В биохимическом анализе крови пациента отмечалось повышение печеночных ферментов. Динамика показателей иммунного статуса:

T- help (CD3, CD4) 8,7%-0,223*10⁹/л; 10,6%- 0,194*10⁹/л; 8,2%- 0,144*10⁹/л; 9,8%- 0,214*10⁹/л. Диагноз: HIV-инфекция, 4в-стадия, на фоне АРВТ. Хронический вирусный гепатит С, фаза репликации. Гнездная алопеция, очаговая форма, фаза регресса. Лечение: АРВТ (зидовудин, ламивудин, калетра), внутримышечные инъекции кальция глюконата, витаминов В1 и В6 №10, наружно – гель циклоферон.

19.03.2015 г. жалобы на выпадение волос сохраняются. Объективно: свежие очаги облысения на волосистой части головы, в теменной и височных областях различного диаметра округлые очаги (от 3 до 6 см), с участками депигментированных волос в височных областях, в области бороды площадь депигментированных волос увеличилась (очаги диаметром до 4 см). Из результатов анализов: T- help (CD3, CD4) 10,6%- 0,194*10⁹/л, РНК ВИЧ-1 менее 50 копий на мл. Диагноз: HIV-инфекция, 4в-стадия, на фоне АРВТ. Хронический вирусный гепатит С, фаза репликации. Гнездная алопеция, очаговая форма, прогрессирующая стадия. Лечение: АРВТ (зидовудин, ламивудин, калетра), наружно: крем Цинктерал, мазь Элоком. С 27.04.2015 изменена схема АРВТ (T- help (CD3, CD4) 8,2%- 0,144*10⁹/л): зидовудин 0,3 1 т. 2 раза в день, вилдесуовин (диданозин) 1 т. 1 раза в день, калетра 2 т. 2 раза в день.

16.06.2015 г. свежих очагов облысения нет, депигментированные волосы в области бровей и ресниц, на волосистой части головы очагов облысения нет, имеются vellus-волосы в проекции очагов, на других участках – обесцвеченные. Диагноз: HIV-инфекция, 4в - стадия, на фоне АРВТ. Хронический вирусный гепатит С, фаза репликации. Гнездная алопеция, субтотальная форма, стадия регресса. Назначен наружно шампунь с миноксидилом. 26.10.2015 г. свежих очагов облысения нет, рост волос в очагах на волосистой части головы возобновился, брови, ресницы, волосы в подмышечных впадинах, груди, руках и ногах депигментированы полностью. Иммунологический статус от 12.08.15 г. T- help (CD3, CD4) 9,8%- 0,214*10⁹/л. Диагноз: HIV-инфекция, 4в - стадия, на фоне АРВТ. Хронический вирусный гепатит С, фаза репликации. Гнездная алопеция, субтотальная форма, стадия регресса.

Несмотря на ограниченное количество наблюдений, можно выделить некоторые закономерности в развитии данных клинических случаев:

- оба пациента болеют ВИЧ-инфекцией более 10 лет, получают АРВТ в течение 2-3 лет,
- сопутствующей патологией у обоих является хронический вирусный гепатит С в фазе репликации,
- дебют гнездной алопеции у пациентов возник на фоне неопределяемой вирусной нагрузки, отсутствия ухудшения со стороны гепатита С и без видимых триггерных факторов,
- поражение началось с области бороды, возникло в один временной промежуток, сохранялось до замены АРВТ и регрессировало через несколько месяцев после смены одного из препаратов АРВТ,

- в обоих случаях смена терапии обусловлена снижением CD4-клеток (до $0,198 \cdot 10^9/\text{л}$ у пациента Е. и до $0,144 \cdot 10^9/\text{л}$ у пациента О.), а восстановление иммунного статуса наблюдалось при возобновлении роста волос в очагах облысения.

В инструкции к препаратам: ламивудин, калетра, атазанавир, диданозин в редких побочных эффектах указана алопеция без уточнения формы, у абакавира и зидовудина такого побочного эффекта нет. В первом случае в схеме АРВТ заменен атазанавир, во втором – ламивудин, следовательно, нельзя с уверенностью утверждать, что данная форма гнездной алопеции, возникшая практически в один временной промежуток у пациентов с ВИЧ-инфекцией, является побочным эффектом одного антиретровирусного препарата.

Проанализировав вышеуказанные данные, мы пришли к выводу, что гнездная алопеция является проявлением иммунологических нарушений на фоне ВИЧ-инфекции и гепатита С, а также одним из побочных эффектов атазанавира и ламивудина, указанных в инструкции к препаратам как редкие. Тотальное поседение у одного из пациентов мы расценили как регрессирующую стадию гнездной алопеции с последующей репигментацией.

Список литературы

1. Хоффман К, Рокштро Ю.К. Лечение ВИЧ- инфекции, 2009 г.
2. Бартлетт Дж., Галлант Дж., Фарм П. Клинические аспекты ВИЧ- инфекции, 2012г.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИКВОРА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Назарова О.И.

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»,
Омск, Россия

Аннотация. ВИЧ-инфекция поражает центральную нервную систему в 70,0% случаев, что проявляется различной неврологической симптоматикой. В работе описан результат исследования ликвора методом полимеразной цепной реакции к различным инфекционным возбудителям. Иногда, в спинномозговой жидкости выявлялось несколько инфекционных агентов. Таким образом, для правильной постановки диагноза необходимо не только лабораторное исследование ликвора, но и знание клинических проявлений в сочетании с другими инструментальными методами исследования.

Ключевые слова: ликвор, токсоплазмоз, туберкулез, ВИЧ-инфекция.

RESULT OF THE RESEARCH OF LIQUOR AT PATIENTS WITH HIV INFECTION

NAZAROVA O. I.

Centre for prevention and control of AIDS and infectious diseases
Omsk, Russia

Abstract. HIV infection affects the central nervous system in 70,0% of a case that is shown by various neurologic symptomatology. In work the result of a research of liquor by method of a polymerase chain reaction to various infectious originators is described. Sometimes, in cerebrospinal fluid several infectious agents were taped. Thus, the correct diagnosis requires not only a laboratory research of liquor, but also knowledge of clinical implications in combination with other tool methods of a research.

Key words: liquor, toxoplasmosis, tuberculosis, HIV infection.

ВИЧ-инфекция уверенно «наступает» во многих регионах России [4, 5], в том числе и в Омской области. Если в 2006 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией была 4,6 на 100 тыс. населения, то в 2014 г. - 133,2 на 100 тыс. населения. В 2015 г. наблюдалось некоторое снижение данного показателя до 123,3 на 100 тыс. населения. Заболеваемость ВИЧ – инфекцией за 9 лет увеличилась на 2580,4% [3, 6, 9].

Согласно литературным данным, до 70% ВИЧ-инфицированных пациентов имеют различные неврологические симптомы, развивающиеся на всех стадиях заболевания. При патоморфологическом исследовании поражения нервной системы выявляются у 80–90% умерших от СПИДа. У 40-55% пациентов неврологические симптомы выступают в качестве инициальных

симптомов ВИЧ-инфекции, у 30-35% больных развивается туберкулезный менингит, при снижении CD4 лимфоцитов менее 250 клеток/мкл [1, 2], а в некоторых случаях в сочетании с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза [7, 8].

В каждом случае требуется проведение специфической и симптоматической терапии, поэтому уточнение характера патологического процесса является весьма важным [10].

Ежегодное увеличение заболеваемости и высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией диктует необходимость в создании алгоритма диагностики исследования спинномозговой жидкости у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Цель: проанализировать результат исследования ликвора у ВИЧ-инфицированных пациентов с неврологической симптоматикой.

Материалы и методы. Использовались данные лабораторного исследования спинномозговой жидкости (СМЖ), по материалам БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в количестве 50 результатов. Критерии включения: установленный диагноз ВИЧ-инфекции, наличие любой неврологической симптоматики, добровольное согласие пациента на исследование.

В работе применялся метод качественного определения ДНК цитомегаловируса (ЦМВ), токсоплазмоза, туберкулеза, вируса простого герпеса 1,2 (ВПГ), вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в ликворе.

Среди включенных в исследование мужчин было 38 (76,0%), женщин – 12 (24,0%). Большая часть пациентов была в возрасте от 21 до 32 лет. Средний возраст мужчин составил $28,8 \pm 0,4$, женщин $27,8 \pm 1,3$ года.

Статистическая обработка материала проведена с помощью методов вариационной статистики на основе анализа абсолютных и относительных величин. Количественные данные в виде $M \pm m$, где M - среднее арифметическое, m - ее стандартная ошибка. Обработка материала проводилась с использованием программы Microsoft Office Word Excel 2007.

Результаты и обсуждения. Как уже было сказано выше, все ВИЧ-инфицированные пациенты имели различную неврологическую симптоматику. Нарушение сознания в виде sopora было выявлено у 38,0% больных, ступор – у 18%, кома 1 степени – у 16,0%, кома 2 степени – у 8,0% пациентов. Неадекватность поведения наблюдалась у 52,0%, явления дезориентации – у 68,0% больных. Все исследуемые предъявляли жалобы на головную боль, умеренного характера – 64,0%, постоянную, нестерпимую – 10,0%, периодическую – 26,0%. Тошнота центрального генеза беспокоила 32,0% больных, рвота наблюдалась у 38,0% ВИЧ-инфицированных. У 84,0% пациентов наблюдалась лихорадка от 38°C до 41°C , слабость у 88,0%.

Из менингеальных симптомов, ригидность затылочных мышц наблюдалась у 62,0%, положительный симптом Кернига у 48,0%. Светобоязнь и звукобоязнь беспокоили 20,0% больных, парез лицевого нерва наблюдался у

24,0%, офтальмоплегический синдром – у 22,0%. Гемипарез был выявлен у 38,0%, парез верхней конечности у 4,0% пациентов.

При исследовании 50 проб СМЖ было выявлено следующее. ВЭБ был выявлен в 33 случаях (66,0%), ЦМВ – у 11 больных (22,0%). Подтверждение наличия микобактерии туберкулеза в ликворе было 12 (24,0%) больных, токсоплазмоз – у 15 (30,0%), ВПГ – у 3 (6,0%). Однако, у 11 больных исследование к изучаемым инфекционным заболеваниям было безрезультатным.

У пациентов, с выявленным ВЭБ вирусная нагрузка в крови на момент исследования составила $401070,058 \pm 1223,45$ копий/мл крови, СД4+ лимфоцитов – $166,41 \pm 163,1$ кл/мкл. У больных с наличием в ликворе ДНК ЦМВ вирусная нагрузка была $605101 \pm 213,4$ копий/мл, СД4+ лимфоциты – $141,09 \pm 96,5$ кл/мкл. В группе пациентов с верифицированным туберкулезом ЦНС вирусная нагрузка была $1370541,25 \pm 311,6$ копий/мл, СД4+ лимфоциты – $273,3 \pm 54,2$ кл/мкл. Токсоплазмоз был выявлен у пациентов с ВИЧ-инфекцией, имеющих средние значения вирусной нагрузки $946689,4 \pm 398,4$ копий/мл, СД4+ лимфоцитов – $273,73 \pm 64,4$ кл/мкл. ВПГ был выявлен в трех случаях со средним значением вирусной нагрузки – $44253,33 \pm 34,19$ копий/мл, СД4+ лимфоцитов – $445,666 \pm 35,1$ кл/мкл.

В некоторых случаях встречалось сочетание нескольких инфекционных агентов. ВЭБ в сочетании с ЦМВ был выявлен у 4 больных (8,0%), в сочетании с туберкулезом – у 3 (6,0%) пациентов, и с ВПГ у 1 (2,0%). У одного пациента был диагностирован туберкулез с ВЭБ и токсоплазмозом (2,0%), у другого токсоплазмоз с туберкулезом и ЦМВ-инфекцией (2,0%).

При верификации туберкулеза все пациенты были переведены в специализированное медицинское учреждение. Всем другим проводилось лечение в условиях стационара этиотропными средствами.

Таким образом. Диагностика поражений ЦНС у пациентов с ВИЧ-инфекцией сложна, однако при наличии результатов исследования необходимо осуществлять клинический подход к верификации диагноза, используя знания клиники и других методов исследования. Клинические проявления у пациентов с ВИЧ-инфекцией разнообразны, иногда не известна этиология, что диктует необходимость создания алгоритмов диагностики в данной группе больных.

Список литературы

1. Заболеваемость туберкулезным менингитом в Омской области за 5 лет / А.В. Мордык [и др.] // Вестник Ивановский медицинской академии. - 2015. - № 1. - Т. 20. - С. 9-12.
2. Мордык, А.В. Влияние иммунного статуса, стадии и терапии ВИЧ-инфекции на исход стационарного этапа лечения у пациентов с сочетанной патологией туберкулез / ВИЧ-инфекция / А.В. Мордык, С.В. Ситникова, Л.В. Пузырёва // Инфекция и иммунитет. – 2016. – № 1. – Т. 6. - С. 81-86.
3. Мордык, А.В. Современные международные и национальные концепции борьбы с туберкулезом / А.В. Мордык, Л.В. Пузырёва, Л.П. Аксютин //

Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2013. - № 22. – С. 92-98.

4. Нечаева, О. Б. Ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции / О. Б. Нечаева // Туберкулез и болезни легких. – 2014. - № 6. – С. 9-15.
5. Стародубов, Д.С. Прогноз объемов специализированной медицинской помощи в условиях достижения целевых индикаторов / Д.С. Стародубов, Т.И. Малыгина, В.М. Коломиец // Туберкулез и болезни легких. – 2015. - № 6. - С. 142-143.
6. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией на территории Омской области за период с 2008 по 2012 год / А.В. Мордык [и др.] // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 106-109.
7. Факторы риска развития туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя / И.С. Гельберг [и др.] // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - 2015. - № 1. – С. 17-22.
8. Эпидемическая обстановка по туберкулезу в Омске за период с 1991 по 2009 год. / А.В. Мордык [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2011. – № 8. – С. 23-26.
9. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе в 2014 году / Е.С. Довгополук [и др.] // ЖМЭИ. – 2016. - № 2. – С. 37-41.
10. Эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Омской области с 1996 по 2013 гг. / А.В. Мордык [и др.] // Медицинский альманах. – 2014. - № 2 (32). – С. 62-64.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АКНЕ ПРЕПАРАТОМ АКНЕКУТАН

Ниязи Н.Ф.

ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»,
Курск, Россия

Аннотация. Представлен собственный положительный опыт применения новой формы изотретиноина-препарата акнекутан для лечения 65 больных акне. И дана оценка эффективности и переносимости препарата, выраженность побочных эффектов, и приведены методы их профилактики и коррекции.

Experience in the treatment of patients with Acne Drug aknekutan

Niyazi N.F.

Center for preventive medicine
Kursk, Russia

Abstract. The author describes her own positive experience of using a new form of isotretinoin, the acnekutan drug, for the treatment of acne patients, the author provides the drug efficacy and tolerability assessment, describes the frequency and intensity of adverse effects and discloses the methods for their prevention and elimination.

Вульгарные угри являются самым распространенным заболеванием аппарата сальных желез, поражающим до 93% людей в возрасте от 12 до 30 лет. В последнее время некоторые исследователи отмечают тенденцию к «взрослению» акне и указывают на то, что данной нозологией болеют около 85% молодых людей в возрасте 12-24 лет, но у 12% женщин и 3% мужчин заболевание длится в среднем до 44 лет.

До сих пор нет полной ясности в вопросах его этиологии и патогенеза. К возникновению акне приводит взаимодействие четырех основных факторов:

- гиперстимуляция функции сальных желез андрогенами или повышенная чувствительность к ним сальных желез, что сопровождается увеличением продукции и изменением состава кожного сала;
- гиперкератоз в области выводных протоков сальных желез, приводящий к закупорке сальных желез и нарушению эвакуации их содержимого;
- пролиферация нормальной микрофлоры в сальноволосяных фолликулах, особенно *Propionibacterium acnes*;
- воспаление.

В развитии акне не исключена роль и генетических факторов.

Иммунному механизму в развитии акне долгое время отводилась второстепенная роль, так как первичным этапом патогенеза считали формирование открытых и закрытых микрокомедонов. Однако более поздние работы показали, что некоторые иммунные изменения возникают задолго до

начала образования комедона. Важность иммунных механизмов при акне подчеркивает и тот факт, что уровень колонизации *P. acnes* не влияет на степень тяжести заболевания.

Фолликулярный гиперкератоз при угревой болезни является следствием иммунного ответа и обусловлен ультраструктурными изменениями кератиноцитов, т. е. изменениями кератиносом, клеточных стенок, содержания липидов и межклеточного вещества, а также ускоренным делением кератиноцитов. Все эти изменения происходят в верхней части фолликула и приводят к расширению нижней его части. При разрыве нижней части фолликула в ответ на выделение кератина и секрета сальных желез начинает работать иммунный механизм.

В патогенезе акне остается еще много нерешенных вопросов. Так, в настоящее время определен ряд противомикробных белков, защищающих кожу от инфицирования бактериями и грибами, среди которых следует упомянуть дефензины, кателицидин, гранулизин. Однако роль этих антимикробных пептидов в развитии угревой болезни изучена недостаточно. Отдельными авторами было показано, что при акне содержание дефензина-2 в сальных железах снижается, что, вероятно, ослабляет защиту кожи.

Тип акне, который впоследствии возникает у пациента, зависит от воспалительного ответа. Так, если в очаге поражения скапливаются нейтрофилы, развивается гнойная пустула, если доминируют Т-хелперы и гигантские клетки, то процесс клинически проявляется папулами, узлами и кистами. Тип иммунного ответа влияет и на развитие рубцов: чем дольше длится воспалительный процесс, тем более вероятно образование рубцов.

Существует более 25 методов (индексов) оценки степени тяжести угревой болезни. Для практического применения наиболее удобна классификация, предложенная Американской академией дерматологии, в модификации отечественных дерматологов. I степень характеризуется наличием комедонов (открытых и закрытых) и до 10 папул; II степень — комедоны, папулы, до 5 пустул; III степень — комедоны, папулопустулезная сыпь, до 5 узлов; IV степень отличается выраженной воспалительной реакцией в глубоких слоях дермы с формированием множественных болезненных узлов и кист.

Схема терапии угревой болезни, учитывающая тяжесть заболевания и наличие тех или иных воспалительных элементов, разработана в 2003 г. на заседании глобального альянса по оптимизации терапии акне. По рекомендациям альянса единственной альтернативой для терапии тяжелых форм акне остается системное применение изотретиноина.

Изотретиноин (ИТ) в Европе применяют с 1971 г. Спустя 12 лет он был зарегистрирован как препарат роаккутан для лечения угревой болезни тяжелой степени, резистентной к терапии. В настоящее время показания к применению ИТ расширяются и включают также резистентные к терапии среднетяжелые формы акне, граммотрицательный фолликулит, атипичные формы акне

(фульминантные угри, хлоракне и болезнь Морбигана). Низкие дозировки ИТ используют при более легких формах акне.

Ведущим механизмом действия ИТ является взаимодействие его активных метаболитов, 4-оксо-13-цисретиновой и 4-оксо-9-цисретиновой кислоты с ретиновыми рецепторами, что вызывает атрофию сальной железы, уменьшение деления базальных клеток и соответственно снижение выработки кожного сала. Также нормализуется процесс кератинизации и уменьшается количество *P. acnes*.

Длительное время единственным препаратом изотретиноина на отечественном фармацевтическом рынке был Роаккутан. В 2009 г. этот препарат под названием акнекутан зарегистрирован на отечественном рынке. Данные клинических исследований позволяют сделать вывод о том, что капсула акнекутана 8 мг биоэквивалентна капсуле роаккутана 10 мг, а капсула 16 мг — капсуле 20 мг, причем очевидно снижение количества принимаемого внутрь ИТ на 20%, что приводит к уменьшению суточной и курсовой дозы ИТ. Терапевтическая дозировка акнекутана составляет 0,4 — 0,8 мг/кг в сутки и кумулятивная доза 100 — 120 мг на 1 кг массы тела.

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности и переносимости ИТ для системного применения с экстрабиодоступностью (препарата акнекутан) в терапии больных акне.

Объектом исследования стали пациенты со среднетяжелой, тяжелой и резистентной к стандартной терапии формами акне. До лечения, через 1 мес. после его начала и далее ежемесячно, изучались биохимические параметры: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, общий холестерин, триглицериды, щелочная фосфатаза, креатинин. Первые 1-2 мес. лечения акнекутан применялся в дозе 0,4 мг/кг 1 раз в сутки, вечером после еды, с последующим увеличением до 0,6-0,8 мг/кг в сутки при хорошей переносимости. Препарат принимался в течение 4-6 мес. до достижения кумулятивной дозы из расчета 120 мг на 1 кг массы тела. Местную терапию не проводила. Оценивались критерии клинической эффективности препарата: уменьшение салоотделения, снижение комедонообразования, регресс элементов, динамика поствоспалительных изменений. Излечением считали полный регресс высыпаний. Проведено лечение 65 пациентов (35 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 14 до 36 лет и давностью заболевания от 1 года до 11 лет. Папулопустулезная форма имела у 15 (27,0%) пациентов, индуративная — у 23 (36,5%), узловатокистозная — у 15 (20,3%), конглобатная — у 9 (12,2%), инверсные акне — у 3 (4,0%).

Результаты: излечение достигнуто у 56 (86,5%) пациентов. На фоне лечения чаще всего регистрировала следующие нежелательные явления: хейлит — у 65 (100%) больных, дерматит лица — у 33 (44,6%), сухость слизистой носа — у 18 (24,3%), сухость кожи — у 16 (21,6%), кожный зуд — у 11 (14,9%). указанные нежелательные явления хорошо корригировались применением различных эмоленов и бальзамов для губ. Другие побочные эффекты наблюдались значительно реже. Так, дерматит кистей развился только

у 4 (5,4%) пациентов, сухость конъюнктивы глаз — у 3 (4,0%), кровоточивость слизистой носа — у 2 (2,7%), миалгии и атралгии — у 2 (2,7%). следует отметить, что дерматит кистей локализовался преимущественно на тыльной поверхности кистей. Это нежелательное явление успешно устранялось при применении космецевтических средств, специально разработанных для сопутствующей терапии пациентов, принимающих системные ретиноиды. Для предупреждения сухости конъюнктивы глаз больным рекомендовали использование препаратов искусственной слезы. Боли в мышцах и суставах развились лишь у 4 пациентов, профессионально занимавшихся спортом, и нивелировались после уменьшения нагрузки и коррекции дозы препарата. Значительных отклонений лабораторных показателей выявлено не было: транзиторное повышение активности трансаминаз отмечено у 1 (1,4%) пациента, уровня холестерина — у 6 (8,1%) больных. Выявленные нарушения успешно устранялись диетой с уменьшенным содержанием жиров и применением гепатопротекторов. Важно отметить, что на фоне приема акнекутана мною не отмечены такие побочные эффекты, как алоpecia, головная боль, депрессия, паронихии, рвота, тошнота, боли в эпигастрии.

Таким образом, исследование показало высокую эффективность и хорошую переносимость терапии акне препаратом акнекутан. Для оценки стабильности достигнутых результатов и окончательных выводов наблюдение за пациентами будет продолжено в течение года после окончания терапии. Представляется перспективным дальнейшее изучение использования акнекутана в лечении акне.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМИ ВНУТРИГРУДНЫМИ КАЛЬЦИНАТАМИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ АКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА

Новикова С.Н.¹, Бернштейн М.М.³ Ковылянская Л.В.², Брынцева Н.М.²

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»¹,
ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер"²,**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области³,**

Курск, Россия

Аннотация. Комплексное обследование 136 детей, имеющих внутригрудного обызвествления было сделано чтобы узнать какие-либо признаки активного туберкулеза. Принимая во внимание особенности социального положения в их семьях, данные ранее определенных аллергических тестов и результаты собственных оригинальных методов расследования инфекционной аллергии авторы подтвердили отсутствие активного туберкулеза и сократили число зарегистрированных пациентов на 21% за три года наблюдений.

Ключевые слова: активный туберкулез, кальцификация, аллергические кожные пробы.

Characteristics of the children with newly diagnosed intrathoracic calcifications but with no signs of tuberculosis activity.

Novikova S.N., Bernstein M.M., Kovylyanskaya L.V., Bryntseva N.M.

Kursk State Medical University ¹,

Regional clinical TB dispensary ²,

Federal service for surveillance in consumer rights protection and human well-being

Lei Kursk region ³,

Kursk, Russia

Abstract. Comprehensive survey of 136 children having intrathoracic calcifications has been done to know any signs of active TB. Taking into account the peculiarities of the social situation in their families, data of previous specific allergic tests and the results of the own original investigation methods of infectious allergy the authors have confirmed the absence of active TB and have reduced the number of registered patients by 21% over three years observation.

Key words: active tuberculosis, calcification, allergic skin tests.

Одним из важных критериев общей эпидемической ситуации по туберкулезу в России является детская заболеваемость, которая к настоящему времени стабилизировалась на уровне 14,7–15,3 на 100 тыс. детей [1]. Туберкулез у детей младше 7 лет, протекает с преимущественным поражением нутригрудных лимфатических узлов, но при этом необходимо качественная

комплексная оценка данных лучевых методов обследования [2,3]. Бактериовыделители среди детей в возрасте 0–14 лет составляют 5%, однако, множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) среди них достигает 22,5% [5]. Более того, одна треть инфицированных детей выявляется несвоевременно, демонстрируя кальцинаты или фиброз в зоне спонтанного излечения. Причем, их доля по отношению к впервые выявленным детям последние годы колеблется в пределах 23–25% [1]. Существует множество факторов, препятствующих своевременному выявлению тубинфицирования и оценке активности остаточных изменений после спонтанного заживления первичного туберкулеза. Это технические погрешности в постановке и чтении проб, угнетение иммунологической реактивности организма на фоне сопутствующих заболеваний, первичный иммунодефицит и т.п. [6,7]. Однако, объективные причины ошибок, ведущих к несвоевременному выявлению тубинфицирования, создают лишь фон, а реализация каждой конкретной ошибки происходит в результате субъективных причин. Это дает реальную возможность сократить количество ошибок путем совершенствования диагностической работы врача-педиатра, применения четких алгоритмов в обследовании ребенка, учета его индивидуальных особенностей, влияющих на течение кожной аллергологической реакции [4]. Нередко это приходится делать в условиях нехватки времени, а иногда и возможностей, хотя решение должно быть принято немедленно. Врачу предстоит самому решать: закончить или продолжать процесс диагностики. Еще Гиппократ писал: «Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, суждение трудно. Людские нужды заставляют нас решать и действовать». Все это придает актуальность, изучению особенностей спонтанного излечения первичной туберкулезной инфекции и оценки активности остаточных туберкулезных изменений первичного периода.

Цель исследования: характеристика детей с впервые выявленными внутригрудными кальцинатами и совершенствование диагностики их активности в условиях Курского региона.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 136 детей с внутригрудными кальцинатами без признаков активности туберкулезного процесса, доказанного в ходе комплексного обследования и динамического наблюдения. Дети были впервые выявлены среди населения Курского региона в 2012-2014 годы. Мальчиков было 78, девочек - 58 чел. Основная масса детей была в возрасте 7-12 лет (93 чел или 68,4%). Всем детям выполнено комплексное клинико-рентгенологическое исследование, включающее компьютерную томографию органов грудной клетки, пробу Манту с 2 ТЕ, диаскинтест. При интерпретации туберкулиновых проб в комплексное исследование включались алгоритм дифференциальной диагностики вакцинальной и инфекционной аллергии (рацпредложение №584) и способ диагностики инфекционной аллергии (а.с.№1700474). Тщательно исследовался анамнез и результаты туберкулиновых проб прошлых лет.

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено, что признаков активности туберкулезного процесса

у детей обнаружено не было. Более половины из них не предъявляло никаких жалоб, у одной четверти были нечеткие проявления интоксикации, связанные с побочными заболеваниями: хроническим бронхитом вне обострения, хроническим тонзиллитом, ринитом, глистной инвазией и др. Изменения в анализах крови обнаружены у одной пятой пациентов и были связаны с сопутствующей патологией.

Кальцинаты располагались преимущественно в лимфатических узлах (101 чел 74,2%), у остальных - в легочной ткани, преимущественно в латеральных отделах 2-го сегмента (19 чел, или 13,9%). В выявлении кальцинатов важную роль сыграла компьютерная томография. Более 30% таких изменений были обнаружены только на компьютерных томограммах. Большой интерес представляла локализация лимфоузлов, в которых обнаружены кальцинаты. Так, в бронхопульмональной группе лимфоузлов они обнаружены у 81 чел (59,5%), в трахеобронхиальной, паратрахеальной и бифуркационной группах - у 20 чел. (14,7%). Фиброзные изменения выявлены у 17,6% детей в виде деформации бронхо-сосудистого рисунка вблизи корней легких, реже - в легочной ткани вблизи кальцинатов. Плевральные спайки обнаружены у 15% пациентов.

Туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ оказалась положительной у 89%, сомнительной - у 11% детей. Диаскинтест был положительным в 45% случаев. Его отрицательные результаты сыграли немаловажную роль в исключении активной фазы заболевания. Гиперергия к туберкулину в исследуемой группе детей не обнаружена.

Для уточнения причин несвоевременного выявления раннего периода первичной туберкулезной инфекции проведено тщательное исследование анамнеза. Обнаружено, что данные о вакцинации БЦЖ отсутствовали у 31% детей, кожный знак БЦЖ не обнаружен у 18%, положительные туберкулиновые пробы за 2-3 года до выявления кальцинатов выявлялись у 48% пациентов, но они рассматривались как проявление поствакцинальной аллергии, так как размеры папулы были менее 11 мм.

Контакт с больными туберкулезом был установлен у 38% детей, причем, всего у 8% с больными открытой формой заболевания. Важно отметить, что 82% детей были из неполных или неблагополучных семей. В 41% случаев родители злоупотребляли алкоголем, поэтому 17% детей находились в интернате. Социальная структура семей, из которых происходили дети, была представлена в 31,9% случаев неработающими лицами трудоспособного возраста, в 9,6% - инвалидами; 17,3% родителей ранее пребывали в местах лишения свободы.

Заключение. В ходе комплексного обследования детей с учетом их социальных условий, данных клинико-рентгенологических, лабораторных и иммунологических исследований при интерпретации туберкулиновых проб и оценке активности туберкулезных изменений подтверждено отсутствие

активного туберкулеза у данной категории пациентов. На 21% снижено количество детей, взятых на диспансерный учет в связи с впервые выявленными кальцинатами, (по данным годовых отчетов, с 62 чел в 2012 году до 49 чел в 2014 году; $P < 0,05$).

Список литературы

1. Аксенова В. А. Инфицированность и заболеваемость туберкулезом детей как показатель общей эпидемиологической ситуации по туберкулезу в России // Проблемы туб. 2002. № 1. С. 6–9.
2. Гольев С.С., Коломиец В.М. Парадоксы внедрения новых методов лучевой диагностики туберкулеза. //Материалы IX Конгресса ЕАРО и VII Конгресса АПЦА. Ташкент, 2016. С. 292.
3. Копылова И. Ф., Лукашова Е. Н., Пьянзова Т. В. Структура клинических форм активного туберкулеза у детей и подростков в динамике за 20 лет // Туб. и болезни легких. - 2014. - № 8. - С. 57-58.
4. Старшинова А. А., Гаврилов П. В., Довгалюк И. Ф. Диагностика туберкулеза у детей из семейного очага инфекции с применением современных иммунологических и лучевых методов // Практ. медицина. - 2012. - № 1. - С. 74-76.
5. Chiang S. S., Swanson S. D., Jeffrey R. S. New diagnostics for childhood tuberculosis review // Infect. Dis. Clin. North Am. - 2015. - Vol. 29, Iss. 3. - P. 477-502.
6. Esmail H., Barry C. E. III, Wilkinson R. J. Understanding latent tuberculosis: the key to improved diagnostic and novel treatment strategies // Drug Discovery Today. - 2012. - Vol. 17, Iss. 9-10. - P. 514-521.
7. Panchal R. K. et al. The effectiveness of primary care based risk stratification for targeted latent tuberculosis infection screening in recent immigrants to the UK: a retrospective cohort study // Thorax. - 2014. - Vol. 69, № 4. - P. 354-362.

КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИФИЛИСА

Новикова Л.А., Бахметьева Т.М., Донцова Е.В., Борзунова Л.Н.

**ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко» МЗ РФ,
г.Воронеж, Россия.**

Аннотация. Анализ курса сифилиса в городе Воронеже в 2015 году определила распространенность ранних форм заболевания (97,8%), включая скрытый сифилис (61,8%). Анализ заболеваемости в гендерных групп, преобладание мужского населения (70,3%) было выявлено. Ведущее место принадлежит к возрастной группе 40 лет и старше (38,5%).

Epidemiological and clinical features of the course of syphilis.

Novikova L.A., Bahmeteva T.M., Dontsova E.V., Borzunova L.N.

**Voronezh State Medical University. N.n. Burdenko,
Voronezh, Russia.**

Abstract. The analysis of syphilis rate in Voronezh city in 2015 has determined the prevalence of the early forms of the disease (97,8%), including latent syphilis (61,8%). Analyzing a disease rate in gender groups the predominance of male population (70,3%) has been revealed. The leading position belongs to the age group 40 years and over (38,5%).

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости сифилисом в Российской Федерации проблема эпидемиологии заболевания сохраняет актуальность. В последние годы отмечается изменение структуры заболеваемости сифилисом в сторону увеличения доли скрытых и поздних форм сифилиса, среди которых все более заметным становится рост нейросифилиса и висцерального сифилиса с клиническими проявлениями, как в России, так и в отдельных регионах [1,2].

Цель исследования – выявить клинико-эпидемиологические особенности заболеваемости сифилисом населения г. Воронежа.

Материалы и методы. Проведен анализ уровня и характера заболеваемости сифилисом населения г. Воронежа за 2015 год, который осуществлялся на основании данных Федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» по данным БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи». Диагноз сифилиса основывали по клинической картине и подтверждали результатами лабораторных исследований (темнопольная микроскопия бледной трепонемы, диагностика ДНК бледной трепонемы методом ПЦР, серологическая диагностика с использованием

нетрепонежных и трепонежных реакций) в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями Российского общества дерматовенерологов и косметологов поведение больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (2012) [1].

Результаты: в 2015 году в г. Воронеже зарегистрирован 91 больной сифилисом, что составило 15,5% среди всех заболеваний ИППП. Все больные были субъектами РФ. В общей структуре заболевших сифилисом больных с ранними формами было 89 человек (97,8%), среди них 62 мужчин (69,7%) и 27 женщин (30,3%) . В структуре заболевших ранним сифилисом первичный сифилис зарегистрирован у 6 человек (6,3%), у 5 мужчин (83,3%) и у 1 женщины (16,7%). Вторичный сифилис диагностирован у 27 человек (30,3%), у 22 мужчин (81,5%) и у 5 женщин (18,5%). С диагнозом ранний скрытый сифилис в 2015 году пролечено 53 человека (59,5%), мужчин – 33 (62,3%), женщин – 20 (37,7%). Больных с ранним неуточненным сифилисом в 2015 году было 2 (2,2%, оба мужчины), с ранним нейросифилисом – 1 человек (1,1%). Число пациентов с поздними формами сифилиса среди всех зарегистрированных больных в 2015 году составило 2,2 % (2 человека, 1 мужчина и 1 женщина). Среди них поздний скрытый сифилис установлен у 1 женщины (50%), поздний нейросифилис – у 1 мужчины (50%).

В 2015 году число больных сифилисом в возрастной группе 18-29 лет составило 31 человек (34,1%), 30-39 лет – 25 (27,5%), 40 лет и старше – 35 (38,5%). Мужчин в возрасте 18-19 лет было 20 человек (22%), 30-39 лет – 17 (18,7%), 40 лет и старше – 27 (29,7%). Женщин в возрастной группе 18-29 лет было 11 (12,1%), 30-39 лет – 8 (8,8%), 40 лет и старше – 8 (8,8%). Анализ распределения больных по социальным группам показал, что среди больных сифилисом работающих было 18 (19,8%), неработающих – 69 (75,8%), студентов – 3 (3,3%), пенсионеров – 1 (1,1%).

Выводы. Анализ заболеваемости сифилисом показал, что в г.Воронеже среди заболевших сифилисом в 2015 году преобладают ранние формы заболевания (97, 8%) с большим удельным весом среди них скрытых форм (61,8%). За анализируемый период отмечены гендерные особенности заболеваемости сифилисом с перевесом заболевших в сторону мужского населения (70,3%). Лидирующую позицию среди заболевших сифилисом заняли больные возрастной группы 40 лет и старше (38,5%). Больные в возрасте 19-29 лет оказались на втором месте (34,1%), 30-39 лет – на третьем месте (27,5%). Среди заболевших преобладали неработающие (75,8%).

Список литературы

1. Инфекции, передаваемые половым путем. Клинические рекомендации. Дерматовенерология / Под ред. Кубановой А.А. М.: ДЭКС-Пресс, 2012
2. Новикова Л.А., Бахметьева Т.М., Буравкова А.Г., Донцова Е.В. Сифилис: этиология, клиника, диагностика, лечение: учебное пособие . – Воронеж: издательство «Истоки», 2012.-162с

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Новикова Л.А., Бахметьева Т.М., Бахметьев А.А., Донцова Е.В.,
Борзунова Л.Н.*

**ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко» МЗ РФ,
г.Воронеж, Россия**

Аннотация. Некоторые особенности курса и курс уrogenитального хламидиоза были указаны в различных возрастных и гендерных групп города Воронежа. В ходе расследования был поставлен диагноз хламидиоза в 143 больных в городе Воронеже, который 24,3% от общей заболеваемости ЗППП. Уrogenитального хламидиоза преобладали в женщинах (67,7%) в возрасте от 18 до 29 лет (71,3%).

Ключевые слова: уrogenитального хламидиоза, возраст и гендерные группы.

Urogenital chlamydiosis, epidemiological and clinical characteristics.

**Novikova L.A., Bahmeteva T.M., Bahmetev A.A., Dontsova E.V.,
Borzunova L.N.**

**Voronezh State Medical University. N.n. Burdenko,
Voronezh, Russia**

Abstract. Some features of the rate and the course of urogenital chlamydiosis have been specified in different age and gender groups of Voronezh city. During the investigation chlamydiosis has been diagnosed in 143 patients in Voronezh city, which is 24,3% of the total STD incidence. Urogenital chlamydiosis prevailed in females (67,7%) aged 18 to 29 years (71,3%).

Key words: urogenital chlamydiosis, age and gender groups.

Хламидийная инфекция-инфекционное заболевание человека, вызываемое *Chlamydia trachomatis*, является одной из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) [1,2,3]. В Российской Федерации показатели заболеваемости уrogenитальным хламидиозом в последние годы находятся на втором месте после показателей заболеваемости уrogenитальным трихомониазом. Социально-экономическое значение хламидийной инфекции обусловлено также значительным риском развития серьезных осложнений, таких как воспалительные заболевания органов малого таза, отрицательное влияние на репродуктивную функцию вплоть до бесплодия.

Цель – установление особенностей заболеваемости и течения хламидийной инфекции в разных возрастных и гендерных группах населения г. Воронежа.

Материалы и методы. В работе использованы данные Федерального государственного статистического наблюдения форма №9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями», а так же амбулаторные карты и истории болезней больных, получавших лечение по поводу уrogenитального хламидиоза в 2015 году в поликлиническом отделении и дневном дерматовенерологическом стационаре БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи». Верификация диагноза хламидийной инфекции базировалась на результатах клинического и лабораторных исследований молекулярно-биологическими методами, направленными на обнаружение ДНК и / или РНК *C. trachomatis*.

Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что в 2015 году в городе Воронеже хламидийная инфекция (А 56.0-4.8) диагностирована у 143 больных, что составляло 24,3% от всех зарегистрированных ИППП. Среди пациентов урогенитальным хламидиозом женщин было 50 (35%), мужчин – 93 (65%). Работающие составили 69 человек (48,2%), неработающие – 66 (46,1%), студенты – 8 человек (5,6%).

Анализ возрастных групп показал, что удельный вес больных в возрасте 15-17 лет составил 1,4% (2 пациента): 1 мужчина и 1 женщина. Больных в возрасте 18-29 лет было 102 (71,39%), мужчин – 33 (32,3%), женщин – 69 (67,6%), 30-39 лет – 28 человек (19,6%), 12 мужчин – (42,8%) и 16 женщин – (57,1%), 40 лет и старше – 11 человек (7,7%), 4 мужчины (36,4%) и 7 женщин (63,6%). Клинические симптомы у мужчин были представлены уретритом, чаще малосимптомным, у женщин – цервицитом, уретритом. У ¼ пациентов (36 больных 25,2%) наблюдались осложнения (простатит, эпидидимит у мужчин, воспалительные заболевания органов малого таза – у женщин). У большинства больных (101 больной, 70,65%) продолжительность болезни к моменту установления диагноза составляла более 6 месяцев. Обращает на себя внимание частое отсутствие указаний на источник заражения и высокое количество половых контактов.

Выводы. Проведенное исследование показало, что среди больных урогенитальным хламидиозом отмечается преобладание женщин (67,7%). Наиболее часто урогенитальный хламидиоз регистрируется в возрастной группе 18-29 лет (71,3%).

Список литературы

1. Кубанова А.А. Методические материалы по диагностике и лечению наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и заболеваний кожи. Протоколы ведения больных, лекарственные средства. М, 2003.
2. Молочков В.А. Урогенитальный хламидиоз. М.: Изд. БИНОМ 2006.
3. Рахматулина М.Р., Попов Д.В., Нечаева И.А., Плахова К.И. Анализ факторов риска и современных клинико-лабораторных особенностей неосложненных и осложненных форм урогенитальной хламидийной

инфекции у мужчин. – Вестник дерматологии и венерологии. – 2012 .- №4. – С.55-63.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Письменная Е.В.¹, Барышникова В.А.¹, Сироткина Е.И.²

**ОБУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»¹,
Курский Государственный Медицинский Университет²,
Курск, Россия**

Аннотация. Распространенность ВИЧ-инфекции в Курской области значительно ниже, чем в России в целом. Регистрация первых случаев заболеваний отмечалась среди иностранных граждан, в том числе из стран Ближнего зарубежья у лиц, являющихся потребителями наркотических средств, однако, начиная с 2000г. среди вновь зарегистрированных случаев преобладал половой путь инфицирования. В 2015г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась на 61,3% и более значительный рост инфекции среди потребителей наркотических средств. Все это говорит о необходимости расширения мероприятий, направленных на обучение и информирования всего населения; особое внимание уязвимым группам. Все это требует вмешательство многих министерств и ведомств, привлечение общественных организаций.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, уязвимые группы, потребители наркотических средств.

The Peculiarities Of The HIV Epidemy's Development In Kursk Region

Pismennaya E.V., Baryshnikova V.A., Tishina E.I.

**Kursk Regional Clinical Dermatovenereological Dispensary
Kursk State Medical University¹
Kursk, Russia**

Abstract. HIV infection's rate in Kursk region is significantly lower compare to Russia in total. At first cases of the disease were registered among foreign citizens, including the drug addicted citizens of the former USSR republics. However since year 2000 sexual route of transmission became prevalent. In 2015 HIV-infection rate has increased by 61,3% altogether with the tendency to spreading of the infection in the drug users' groups. This alarming tendency indicates the necessity of measures focused on educating and informing the population; special care should be provided for vulnerable risk groups. Generally it requires a cooperation of ministries and departments with social organizations.

Key words: HIV infection, vulnerable risk groups, drug users.

Цель исследования: Анализ в динамике эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Курской области и мероприятия по стабилизации заболеваемости.

Материалы и методы. Проведен конъюнктурный обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Курской области. Объектом послужили основные показатели заболеваемости, выявляемости по Курской области кумулятивно и конкретно за 2015 год. Проведен анализ динамики заболеваемости, особенностей развития эпидемического процесса на территории области.

Результаты и обсуждения. В Курской области ситуация по ВИЧ-инфекции долгое время оставалась спокойной и единичные случаи ВИЧ-инфекции регистрировались у иностранных граждан из стран Дальнего и Ближнего Зарубежья. Первые два случая заражения зарегистрированы в ноябре 1994 года, когда были выявлены двое студентов из Танзании, имевшие половые контакты на родине. За 1995-1996гг. были выявлены 2 человека, которые являлись жителями соседнего с нами государства - Украины.

Выявление случаев ВИЧ-инфекции среди местных жителей началось с 1997 года, когда были выявлены 13 человек, из них местных жителей - 3. Всего за период с 1994 года по 1999 год было зарегистрировано 41 случай ВИЧ-инфекции, в том числе 15 из числа местных жителей (35,5%).

В 2000 году ситуация ухудшилась. Зарегистрировано 41 случай ВИЧ-инфекции и связано это было с тем, что почти 67% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных составили внутривенные потребители наркотиков. Ситуация была вполне сравнима с развитием эпидемии в России в целом. Однако, уже с 2002 года, основным путем заражения ВИЧ-инфекцией в Курской области является половой. В период с 2002 по 2010 г. половой путь заражения вырос с 62,5% до 80%. В это же время по России основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией продолжает оставаться внутривенное введение наркотиков.

Ежегодный прирост случаев ВИЧ-инфекции среди жителей области на протяжении последних лет составляет 15-20%. Однако, по сравнению со многими регионами России по пораженности населения Курская область относится к регионам со средним уровнем распространенности инфекции (показатель пораженности на 31.12.2015 г. составил 95,3 на 100 тыс. населения, по России - 541,8). Коэффициент прироста пораженности на 100 тыс. жителей составил – 14,9%, в 2014г. – 21,4%.

Кумулятивное число всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных на момент регистрации возросло до 2102 случаев, в том числе: жителей Курской области - 1337 (63,6%) человек, 342 (16,3%) случая среди иностранных граждан, 296 (14,1%) случаев среди представителей других регионов, 79 - анонимных, 48 – бомжи. Умерло 272 (12,9%) человека. На территории области зарегистрировано 258 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

Пораженность и заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Курской области

Из всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных на территории области, 289 (13,4%) человек были выявлены в местах лишения свободы. На 31.12.2015 г. в местах лишения свободы находилось 143 человека, из них курские жители – 46 человек.

Из зарегистрированных 1337 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей области, соотношение инфицированных мужчин и женщин составляет 1,3 : 1. Половой путь заражения составляет от общего числа зарегистрированных случаев 764 случая (66,6%), инъекционный путь заражения при потреблении наркотиков – 381 случай (28,5%), вертикальный – 10 случаев (0,7%), не установлен – 56 (4,2%). Мужчины заражаются ВИЧ-инфекцией при потреблении наркотиков инъекционным путем в 2,6 раза чаще женщин, женщины чаще подвергаются заражению половым путем (на 24,9%).

По причине выявления в 518 случаях (38,7%) ВИЧ-инфекция у местных жителей устанавливалась при клинических обследованиях (113 код), в 193 случаях (14,4%) – при эпидемиологических расследованиях (120 код), в 131 случай (9,8%) у беременных (109 код), в 122 случаях (9,1%) у лиц, находящихся в местах лишения свободы (112 код), в 115 случаях (8,6%) – у больных с заболеваниями, передаваемыми половым путем (104 код).

Выявляемость ВИЧ-инфекции среди жителей области за весь период наблюдения

Доминирующий путь заражения ВИЧ-инфекцией среди жителей Курской области в 2015г. по прежнему остается половой - 48,0% (2014 г. – 62,3%), наркотический – 41,4%, (2014 г. – 30,2%). Среди мужчин причиной их заражения в 45,9% случаев является внутривенное введение наркотиков (2014 г.- 39,8%), а половой путь в 40,9% случаев (2014 г. – 54,8%). Среди женщин превалирует половой путь заражения и составил в 2015 г. 59,8 % (2014г. - 72,7 %), наркотический - 34,0% (2014г. – 16,7%). Вертикальный путь передачи составил 1,5% (4 ребенка), причем трое детей родились на территории других регионов России.

Распределение случаев ВИЧ-инфекции в динамике по путям заражения среди жителей Курской области

В возрасте с 15 до 49 лет инфицировано 1274 человека (95,3%). Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных, среди общей возрастной структуры на момент инфицирования, отмечается в возрасте 25-29 лет - 24,9%. В возрастной структуре 15-19 лет женщины в 3,3 раза чаще выявляются с ВИЧ-инфекцией, чем мужчины. В возрастной структуре свыше 30 лет чаще с ВИЧ-инфекцией выявляются мужчины. В динамике в 2015

году по сравнению с 2014 годом выросла доля ВИЧ-инфицированных в возрасте 30-34 года на 4% и составила 28,5% против 24,5% соответственно, а также было выявлено 5 детей в возрасте до 5 лет и 4 человека в возрасте 15-19 лет. Увеличилось количество ВИЧ-инфицированных мужчин и соотношение между мужчинами и женщинами составило 1,7:1 (2014 г. – 1,4:1).

Распределение ВИЧ-инфицированных среди жителей области по полу и возрасту на время регистрации

По социальному положению наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции встречается среди работающего населения - 556 человек (41,6%), среди них служащие составляют 228 человек (41,0%); не работающее население 39,9%, 8,8% составляют лица, находящиеся в местах лишения свободы, 3,9% - учащиеся и 5,8% с неизвестным социальным статусом. В динамике с 2013 по 2015 г.г. увеличилась доля инфицированных в группе неработающих в 2,3 раза по сравнению с 2013 г., а также среди работающего населения и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Уменьшается доля инфицированных среди служащих.

Заключение.

Курская область по распространенности ВИЧ-инфекции среди населения относится к регионам со средним уровнем и показатель пораженности на 100 тысяч населения более чем в 5 раз ниже среднего по России (95,3 на 100 тыс.населения, Россия – 541,8). Однако вызывает беспокойство тот факт, что в 2015 году, как и в России в целом, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться и темпы прироста новых случаев растут. Коэффициент прироста пораженности на 100 тысяч жителей в 2015г. составил 14,9%. Более значительно выросла заболеваемость и составила 22,9 на 100 тыс.населения, в 1,6 раза больше, чем в 2014 году.

Отмечается с 2013 года тенденция увеличения удельного веса регистрации ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотических средств и в 2015 году он составил 41,4%, а среди мужчин – 45,9%, что требует более адресной работы с данной группой населения, внедрения низкопороговых программ для формирования у наркозависимых приверженности к антиретровирусной терапии.

Смещение эпицентра эпидемии ВИЧ-инфекции в старшие возрастные группы населения, в отношении которых использование возможностей профилактической работы в образовательных учреждениях малоэффективно, актуализирует проблему развертывания профилактических программ на рабочих местах.

ПИЛОБАКТ АМ - ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМАХ ДЕМОДЕКОЗА

Плотникова К.О., Шварц Н.Е.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

Аннотация. Применяются новые методики лечения осложнённых форм демодекоза и оценивается их эффективность. В одну из схем лечения входит Пилобакт АМ, относящийся к группе противоязвенных препаратов. Рассматриваются преимущества сочетанного воздействия карбонового лазерного пилинга и системной антибактериальной терапии на *Demodex folliculorum*.

Ключевые слова: демодекоз; Пилобакт АМ; карбоновый лазерный пилинг.

Pilobact AM - application in complicated forms.

Plotnikova K. O., Schwartz N.E.

Kursk State Medical University,
Kursk, Russia

Abstract. Apply new methods of treatment of complicated forms of demodicosis and their effectiveness evaluated. In one of the treatment regimens include Elobact AM referring to a group of anti-ulcer drugs. Discusses the advantages of the combined impact of carbon laser peel and systemic antibacterial therapy for *Demodex folliculorum*.

Key words: facial; Pilobakt Am; carbon laser Peel.

Актуальность изучаемой проблемы: дерматозы с поражением кожи лица — одна из актуальных проблем косметологии. Нозологическими формами преимущественно являются акне и акнеподобные дерматозы.

На сегодняшний день наблюдается учащение случаев обращения пациентов к дерматологу и дерматокосметологу с жалобами на папуло-пустулезные высыпания на коже лица, что связано с популяризацией высоких эстетических требований к внешнему виду, ухудшением экологической ситуации, а также хроническими стрессами. Чаще всего причиной обращений становятся такие хронические дерматозы кожи лица, как себорейный дерматит, угревая болезнь, розацеа, периоральный дерматит, которые в большинстве случаев сочетаются с демодекозом [2].

Демодекоз относится к числу распространенных хронических дерматозов. Возбудителем заболевания является клещ рода *Demodex*. Заболеваемость данным дерматозом составляет от 2% до 5% и стоит примерно на седьмом месте по частоте среди кожных болезней. Ю.С. Бутов и соавт. (2002) считают,

что в структуре всех кожных заболеваний демодекоз занимает 2,1%, что составляет примерно 39 человек на 100 000 населения в год. Вопрос о степени патогенности клещей дискутируется. По мнению ряда авторов, *D. folliculorum* наиболее часто регистрируется при розацеа, акне и периоральном дерматите. Согласно данным эпидемиологического исследования в России, его распространенность составила 10% [1].

Актуальность темы данной работы обусловлена высокой распространенностью демодекоза и его рецидивирующим течением, ограниченным выбором акарицидных препаратов, обладающих недостаточной эффективностью и большим числом побочных эффектов, в том числе токсико-аллергических реакций. А также в эстетическом плане демодекоз является довольно тяжелым заболеванием, поскольку локализуется, главным образом, на лице у молодых женщин (наибольшее количество больных – в возрасте от 20 до 40 лет), что влияет на социальное благополучие, психику и качество жизни больных [2].

Цель исследования: описание новых схем лечения осложнённых форм демодекоза и оценка их эффективности.

Материалы и методы исследования: в исследование были включены 50 больных (38 женщин и 12 мужчин) папуло-пустулёзной формой демодекоза лица в стадии обострения. Возраст пациентов составил от 21 до 45 лет (в среднем 32,5 года), длительность заболевания от 6 мес. до 3 лет. Для реализации первого этапа исследования все пациенты были разделены на 2 группы на основании плана лечения. Схема лечения 1-ой группы предусматривала прием препарата Пилобакт АМ в течение 10 дней и процедуры лазерного карбонового пилинга Innovatione (1р/3 нед N.3). Пилобакт АМ относится к группе противоязвенных препаратов. Для лечения пациентов 2-ой группы были назначены метронидазол 500 мг (по 1 таб 2 р/с), юнидокс солютаб 200 мг (в первый день лечения 2 капс сразу, со 2 по 10 – по 1 капс 2 р/сут), энзимно-кератолитический пилинг (1 р/10 дн – 6 процедур), в течение 10 дней. На втором этапе исследования была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов с демодекозом в 1-ой и 2-ой группах.

Результаты исследования: после полного курса проведенной терапии клиническое и лабораторное выздоровление отмечено у 74% пациентов 1-ой группы, у 64% пациентов 2-ой группы; положительная клиническая динамика отмечалась у 24% пациентов 1-ой группы и 19% пациентов 2-ой группы; отсутствовал эффект от проводимой терапии у 2% пациентов 1-ой группы, у 17% пациентов 2-ой группы исследуемых, отрицательной динамики не наблюдалось.

В 1-ой группе пациентов, получавших лазерную коррекцию в дополнение к основной схеме медикаментозной терапии получены следующие результаты: уменьшение количества элементов – 89%, снижение активности воспалительных процессов – 88%, рассасывание узлов – 70%, снижение жирного блеска Т-зоны и щек – 76%, отсутствие эрозивных процессов – 82%,

рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраженности глубоких рубцов – 69%, нормализация пигментации кожи – 75%.

Во 2-ой группе пациентов, проходивших керато-энзимную терапию в дополнение к основной схеме медикаментозной терапии получены следующие результаты: уменьшение количества элементов – 63%, снижение активности воспалительных процессов – 60%, рассасывание узлов – 44%, снижение жирного блеска Т-зоны и щек – 65%, отсутствие эрозивных процессов – 69%, рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраженности глубоких рубцов – 24%, нормализация пигментации кожи – 66%.

Отмечено, что при использовании лазерного карбонового пилинга у пациентов 1-ой группы реже появлялась эритема и шелушение, а количество процедур, необходимых для достижения положительного эффекта, меньше. Процедура не имеет особых противопоказаний, возрастных ограничений и не требует реабилитационного периода, а также не ограничивает ежедневную активность пациентов и может проводиться в любое время года.

Карбоновый лазерный пилинг кожи – это новейшая методика лазерного пилинга с использованием углеродного усилителя.

Данный вид воздействия нормализует метаболизм всех структур кожи за счет:

- бактерицидного действия на кожу;
- сдвигания старого эпидермиса;
- стимуляции регенерации клеток дермы;
- синтеза коллагеновых и эластических волокон;
- сужения пор;
- уничтожения патогенной микрофлоры;
- нормализации липидного обмена кожи;
- улучшения и выравнивания цвета кожи;
- лечения пигментных пятен.

Использование карбонового лазера основано на том, что луч мягко воздействует на кожу, в результате чего, происходит сдвигание рогового слоя эпидермиса, сужение расширенных пор, нормализация липидного обмена кожи, стимуляция пролиферативных процессов дермы.

Воздействие лазера оказывает бактерицидный эффект, уничтожает условно патогенную микрофлору, паразитирующую на поверхности кожи и глубоко в сальных, потовых железах, эффективно устраняет акне и воспалительные процессы в коже.

Кратковременный наносекундный фототермолиз, усиленный карбоновым катализатором, стимулирует микроциркуляцию дермального слоя кожи, что приводит к сужению просвета выводных протоков сальных желез. Это явление в синергии с бактерицидным эффектом лазерного воздействия оказывает выраженный противовоспалительный эффект.

Впервые в лечении осложнённых форм демодекоза был использован и изучен препарат, который успешно применяется для эрадикационной терапии *H. pylori* при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. При

этом он сочетает в себе все компоненты, которые входят в стандарты оказания медицинской помощи больным, страдающим акне и демодекозом. Препарат Пилобакт АМ имеет стабильную дозу апробированных препаратов (омепразол, амоксициллин, кларитромицин) и одобрен Европейской гастроэнтерологической группой по изучению *H. pylori* в качестве средства первой линии эрадикационной терапии.

Выводы: выявлена выраженная клиническая эффективность лечения демодекоза лица с применением комплексной терапии, включающей препарат Пилобакт АМ и карбоновый лазерный пилинг Innovatione.

Высокий процент клинических улучшений при использовании карбонового лазера обусловлен фототермолизом, сужающим расширенные поры, разрушением патологических элементов без повреждения кожного покрова, рассасыванием узлов и выравниванием атрофических рубцов до уровня рубцовой ткани с последующим приподниманием дна рубца до уровня здоровой ткани. Все эти эффекты наблюдались и при кератолитической терапии, но не столь выраженно.

Также было выявлено, что вариант с использованием карбонового лазера более комплаентен для пациентов с демодекозом, так как после сеанса нет шелушения и эритемы, присутствует выраженный накопительный эффект, чего не наблюдалось при керато-энзимной терапии. Кроме того, количество процедур лазерной коррекции, требующихся на курс лечения меньше, чем при керато-энзимной терапии.

Препарат Пилобакт АМ, ранее применявшийся только в качестве эрадикационной терапии *H. pylori*, в качестве медикаментозного лечения демодекоза лица оказывает положительный клинический и лабораторный эффект, удобен в использовании. Лекарственные средства, входящие в его состав, фармакокинетически сбалансированы, легко переносятся пациентами, практически отсутствуют побочные действия.

Приведенные в исследовании данные по лечению пациентов с осложнёнными формами демодекоза лица показывают, что применяемые нами способы дают хорошие результаты и обеспечивают у значительного числа пациентов стойкий клинический эффект, а также элиминацию клещей демодексов более, чем в 70-80% случаев.

Эффективность лазерной терапии в сочетании с препаратом Пилобакт АМ, ее удобство использования, длительность эффекта и отсутствие побочных явлений ставит вопрос о включении такой комплексной терапии в общую практику лечения осложнённых форм демодекоза лица.

Список литературы

1. Верхогляд И.В. Современные представления о демодекозе // Лечащий врач. 2011, №5, с.34-35.
2. Кубанов, А.А. Демодекоз / А.А. Кубанов //Лечащий врач. - 2014.-N 11.- С.7-11
3. Потемкина, Н.М. Демодекоз - возможности лечения / Н.М. Потемкина, Е.А. Ульянова // Здравоохранение Дальнего Востока. - 2013.-N 2.-С.44-45

4. *Сирмайс, Н. С.* Демодекоз: патогенетические аспекты при различных дерматозах лица. Метод пособие / *Н.С. Сирмайс, Г.А. Абесадзе, М.В. Устинов.* - М., 2013. 26 с.
5. Сюч Н.И. Паразитарные болезни кожи. Демодекоз: этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика // *Consilium-Medicum.*-2004.-Т. 6.- №3. - С. 191-194.

ОСОБЕННОСТИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ КОЖИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Половнева Л.В., Исаенко Т.П.

ФГБОУ ВО Курский Государственный Медицинский Университет
Курск, Россия

Аннотация. Папилломавирусная инфекция (ПВИ), вызываемая вирусом папилломы человека, - одна из наиболее часто встречающихся вирусных инфекций у детей. Доказанная ведущая роль вируса папилломы человека в патогенезе развития рака шейки матки, а также частые рецидивы и хроническое течение воспалительных поражений половых органов, ухудшающие прогноз в отношении репродуктивной функции, определяют актуальность изучения папилломавирусной инфекции у детей.

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция кожи, дети, геомагнитное поле.

ESPECIALLY CHILDHOOD PAPILLOMA VIRUS INFECTION OF THE SKIN LIVING IN REGIONS WITH DIFFERENT LEVEL OF GEOMAGNETIC FIELD

Polovneva L.V., Isaenko T.P.

Kursk State Medical University,
Kursk regional Dermato-venereologic dispensary,
Kursk, Russia

Abstract. Human papillomavirus infection (PVI) caused by human papillomavirus, is one of the most common viral infections in children. Proved the leading role of human papillomavirus in the pathogenesis of cervical cancer, as well as frequent relapses and chronic inflammatory lesions of the genital organs, worsening the prognosis for reproductive function, determine the relevance of studying human papillomavirus infection in children.

Key words: human papillomavirus infection of the skin, children's geomagnetic field.

Актуальность темы. За последние годы в практике дерматологов заметно возросло количество детей, страдающих папилломавирусной инфекцией. Основным и единственным методом лечения бородавок является их механическое удаление, но такой метод имеет ряд недостатков, а именно: плохо переносится детьми, не всегда положительно воспринимается родителями, часто приводит к рецидивированию и прогрессированию заболевания [2]. Развитие папилломавирусной инфекции тесно связано с иммунным статусом инфицированного организма. Инфекция вызывает иммунодефицит и снижает противовирусную защиту, что способствует персистенции вируса папилломы человека [1]. Рядом исследователей дается разноречивая оценка роли

различных звеньев иммунитета, как гуморального, так и клеточно-опосредованного, в развитии данного заболевания [4,6].

Проведенный нами анализ современной литературы показывает, что наиболее эффективным методом лечения бородавок можно считать комбинированный метод, включающий деструкцию видимых поражений и иммунотерапию [5,7]. Несмотря на множество предложенных локальных методов лечения остается высокой частота рецидивирования патологического процесса, что диктует необходимость поиска лекарственных средств, повышающих эффективность лечения.

Таким образом, высокая частота встречаемости папилломавирусной инфекции среди маленьких пациентов, отсутствие надежных методов лечения и частое рецидивирование инфекции делают данную проблему в дерматологии одной из наиболее актуальных.

Литературные данные свидетельствуют о тесной зависимости состояния здоровья детей от региональных экологических условий. До настоящего времени малоизученным остается вопрос о воздействии аномальных геомагнитных полей, возникающих в регионах с крупными подземными залежами железосодержащих руд, такими как Курская магнитная аномалия, где значения магнитного поля превышают фоновые в других регионах в 4-5 раз [3]. Наиболее восприимчивым к действию аномальных абиотических факторов в силу физиологической незрелости адаптационных систем является растущий организм. Магнитное поле оказывает негативное влияние на функциональное состояние многих систем детского организма и изменяет характер и интенсивность его ответной реакции.

Характер течения папилломавирусной инфекции в условиях воздействия аномальных магнитных полей и особенности реакции иммунной системы при этом практически не изучены. Представляет интерес также разработка методов фармакологической коррекции, позволяющих скомпенсировать влияние этих факторов на организм.

Цель исследования: оценить клиническую эффективность комплексной терапии папилломавирусной инфекции кожи у детей, проживающих в регионах с различным уровнем геомагнитного поля.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 120 больных, которые соответствовали следующим критериям: дети в возрасте от 3 до 9 лет были поделены на две категории: от 3 до 5 лет и от 7 до 9 лет, в связи с возрастными различиями иммунологических показателей. В каждую категорию входило по 60 детей с установленным диагнозом папилломавирусная инфекция кожи D 23, не получавших терапию препаратами цитокинов (интерлейкинами 1 и 2, эритропоэтином, интерфероном и его индукторами) в течение одного предшествующего месяца, с отсутствием потребности в системном назначении глюкокортикостероидов и отсутствием терапии глюкокортикостероидами в течение 1 предшествующего месяца.

В группу контроля вошли 30 клинически здоровых детей в возрасте от 3 до 5 лет и 7-9 лет, проживающих в городе Курске при фоновых значениях геомагнитного поля.

Родители всех детей заполняли информированное согласие на участие ребенка в исследовании. На первом этапе были изучены индивидуальные карты развития детей, амбулаторные карты, собран анамнез, проведен анализ данных клиничко-параклинического обследования, целенаправленное анкетирование детей и родителей.

Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст детей составил 6,5 лет. Из них девочек было 48 (40 %), мальчиков – 72 (60%), что указывает на более частую заболеваемость среди мальчиков кожными формами папилломавирусной инфекции, в то время как проявления папилломавирусной инфекции на слизистых оболочках чаще наблюдаются среди девочек. Длительность заболевания на момент взятия под наблюдение составляла от 2 месяцев до 1 года.

Тяжесть заболевания оценивалась по распространенности патологического процесса, то есть по количеству морфологических элементов на коже. Наличие 1 элемента расценивалось как легкое течение, 2-5 - как средней тяжести, более 5 - как тяжелое течение. Больные распределились следующим образом: у 15% детей отмечалось легкое течение заболевания, у 50% – средняя тяжесть и у 35% детей – тяжелое течение.

Клиническая картина проявлений ПВИ на коже была разнообразна и представлена в виде пятнистых, гиперпигментированных очагов. Высыпания с умеренной или незначительной инфильтрацией (плоские бородавки), наблюдались в 15%, опухолевидные образования с ворсинчатой поверхностью (вульгарные бородавки) в 55%, образования в виде натоптышей с локализацией на подошвах (подошвенные) в 25% и опухолевидные образования на ножке (папилломы) в 5%.

Наиболее часто патологический процесс локализовался на коже ладоней и подошв 72,5%, на туловище 15%, на лице и шеи 7,5%, на конечностях 5%.

Анализ проведенного лечения показал, что у детей после удаления бородавок методом криодеструкции, который предполагает только механическое удаление, наблюдается высокая частота рецидивов (47%) в течение полугода, причем бородавки в большинстве случаев возникают на тех же участках кожи, что и раньше. Это, вероятно, объясняется нарушением не только общего, но и местного иммунитета. Эти данные указывают на низкую эффективность лечения ПВИ кожи традиционными методами.

Детям с папилломавирусной инфекцией кожи, проживающим в городах Курске и Железногорске, с целью иммунокоррекции ректально вводили препарат интерферона «Генфероном Лайт» по следующей схеме: по 1 суппозиторию 2 раза в день с 12-часовым интервалом в течение 10 дней до деструкции и в течении 10 дней по 1 суппозиторию 2 раза в день после деструкции. Затем в течение 1-3 месяцев – по 1 суппозиторию ректально на

ночь через день. Разовая доза для детей старше 7 лет «Генферон Лайт» составляла 250 000 МЕ, до 7 лет 125 000 МЕ.

Переносимость «Генферон Лайт» в использованных дозах была хорошей у всех детей. Побочных реакций выявлено не было. Положительная динамика иммунологических показателей сопровождалась благоприятными изменениями клинических симптомов.

Клинические особенности течения папилломавирусной инфекции у детей, проживающих в Курске и Железнодорожном, характеризуют большей манифестацией заболевания в младшем школьном возрасте. Наиболее часто заболевание проявляется в виде вульгарных бородавок (55%) с локализацией в области ладоней и подошв (72,5%), а также характеризуется наследственной отягощенностью по папилломавирусной инфекции, чаще по линии матери (19%). Установлено, что развитие папилломавирусной инфекции у детей, проживающих в регионе Курской магнитной аномалии в условиях постоянного воздействия геомагнитного поля повышенной напряженности, приводит к возникновению более выраженных нарушений иммунной защиты по сравнению с пациентами региона с фоновым значением геомагнитного поля.

Выводы. Папилломавирусная инфекция у детей, проживающих в городе Железнодорожном по сравнению с детьми региона с фоновыми значениями геомагнитного поля – в городе Курске, характеризуются более длительным и тяжелым течением заболевания, частыми рецидивами.

Традиционный метод лечения (криодеструкция в качестве монотерапии) не является эффективным в виду высокой частоты рецидивов в течение полугода (47%).

Включение иммуномодулятора Генферон Лайт в комплексное лечение больных детей в регионах с фоновым и повышенным уровнями напряженности геомагнитного поля повышает эффективность терапии по сравнению с традиционным методом, что проявляется в сокращении сроков регресса эритемы и отека кожи, отторжения корок, регресса субъективных ощущений и улучшении детского дерматологического индекса качества жизни.

Список литературы

1. Асламазян Л.К., Мазитова Л.П. Современные особенности течения папилломавирусной инфекции у детей // Педиатрическая фармакология. - 2006.-Т.3, №4.- С. 9-10 .
2. Калущий П.В., Бельский В.В. Воздействие геомагнитного поля Курской магнитной аномалии на биологические объекты // Курский научно-практический вестник: «Человек и его здоровье». – 1998. - № 1. – 43-50 с.
3. Кубанов А.А. Характеристика интерферонового и иммунного статуса у больных с папилломавирусной инфекцией// Вестник дерматологии и венерологии. –2005.- № 2. - С. 9-14.
4. Кулаков В.И., Аполихина И.А., Прилепская В.Н., Сухих Г.Т. Современные подходы к диагностике папилломавирусной инфекции гениталий женщин и их значение для скрининга рака шейки матки //Гинекология. - 2000. - Т.1, № 2. – С. 4-8.

5. *Перламутров Ю.Н., Соловьев А.М.* Комбинированная терапия рецидивирующих аногенитальных бородавок// Вестник дерматологии и венерологии. –2003.- № 6. - С. 50-52.
6. *Шперлинг, Н.В.* Клинико – иммунологическое обоснование тактики ведения больных с папилломавирусной инфекцией// Клиническая дерматология и венерология. –2008.- № 5. - С. 22-25.
7. *Arany I.* Status of local cellular immunity in interferon- responsive and - nonresponsive human papillomavirus-associated lesions Text. /1. Arany, S.K. Tying // Sexually Transmitted Diseases.- 1996.- vol. 23. - № 6.- P. 475-480.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА

Лесневская И.Ю.¹, Провоторов В.Я.¹, Иванова А.П.¹, Овсянникова М.С.²

ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница

им.Н.А. Семашко »¹,

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,²

Курск, Россия

Аннотация. Представлен клинический случай опоясывающего лишая у ребенка раннего возраста. Инфицирование ребенка варицелла зостер произошло внутриутробно (на 7 месяце беременности у матери). Спустя 2 года заболевание возникло остро, после перенесенного ОРВИ. Проявлялось высокой температурой тела, интоксикацией, беспокойством, наличием герпетических высыпаний с характерной локализацией в области грудной клетки справа. Отмечался быстрый положительный эффект от проводимой этиотропной терапии.

Ключевые слова: опоясывающий лишай, варицелла зостер.

A RARE CASE OF HERPES ZOSTER IN THE CHILD IN EARLY CHILDHOOD

Lesnevskaya I.Y., Provotorov V.J., Ivanova A.P., Ovsyannikova M.S.

Kurskaya oblast Clinical Hospital infectious diseases N.a. Semashko ¹

Kursk State Medical University²

Kursk, Russia

Annotvcija. A clinical case of herpes zoster in young children. Infection with varicella zoster child was in utero (in the 7 month of pregnancy the mother). After 2 years the disease has arisen sharply, after suffering acute respiratory viral infections. It exhibits a high body temperature, intoxication, anxiety, the presence of herpetic lesions with characteristic localization in the rib cage on the right. It notes the positive effects of the rapid ongoing causal treatment.

Key words: herpes Zoster, varicella zoster.

Опоясывающий лишай (Herpes zoster) - спорадическое заболевание, возникающее в результате активизации латентного вируса ветряной оспы. Характеризуется воспалением задних корешков спинного мозга и межпозвоночных ганглиев, а также появлением лихорадки, общей интоксикации и везикулёзной экзантемы по ходу вовлеченных в процесс чувствительных нервов.

Заболевание вызывает вирус варицелла зостер(вирус герпеса 3 типа), который одновременно является возбудителем и ветряной оспы. Если ветряная оспа – первичная экзогенная инфекция преимущественно детского возраста, то опоясывающий лишай следует рассматривать как вторичную эндогенную

инфекцию по отношению к ветряной оспе. Заболевание может возникать у лиц всех возрастных групп- от детей первых месяцев жизни до людей пожилого и старческого возраста, при этом более половины всех случаев опоясывающего лишая приходится на лиц старше 60 лет.

Ветряная оспа передается воздушно–капельным путем, но, как и другие герпесвирусы, варицелла зостер может проникать через плацентарный барьер.

В нашей клинике на лечении по поводу опоясывающего лишая находилась девочка 2014 года рождения (1 год 11 мес.). Она поступила в клинику на пятый день болезни в марте 2016 года с жалобами со стороны матери на беспокойство, повышение температуры тела до высоких цифр(до 38,9), плохой аппетит, слабость, высыпания на коже туловища. Вышеуказанные жалобы появились через неделю после перенесенного ОРВИ. Объективно при осмотре у ребенка состояние средней тяжести, кожные покровы обычной окраски, справа в области грудной клетки по ходу межреберий отмечались обильные со склонностью к слиянию везикулезно - пустулезные высыпания, гиперемия и отек кожи, локализующиеся на спине, боковой и передней поверхности груди. Слизистые зева умеренно гиперемированы. Лимфатические узлы пальпировались мелкие шейные и подчелюстные до 0,5см, безболезненные, плотной эластичной консистенции. Легкие и сердце без особенностей.

В течение последующих двух суток температура тела у девочки оставалась высокой (38-38,5), герпетические высыпания активно подсыхали, образуя корочки. С 7 дня болезни температура тела стойко нормальная, ребенок активный, улыбается, появился аппетит, герпетические высыпания все в виде корок, которые с 9 дня болезни начали отпадать. Везикул и пустул нет, эффекта подсыпания в течение болезни не было.

Из анамнеза известно, что мать ребенка на 7 месяце беременности перенесла ветряную оспу.

Данные лабораторного обследования: ОАК- эр.-4.0, НВ- 119, ЦП-0.9, лей- $7.8 \cdot 10^9$, п-1, с- 46, лим.-43, м-10, СОЭ-3.Бх крови- без особенностей .ОАМ- в пределах нормы.

Исследование сыворотки крови методом ИФА: ЦМВ(IgG)(+), ВЭБ-NA(IgG)(+), HHV-6-(IgG)(+)

Получала лечение: ацикловир 60мг х 2 раза в день в/в капельно в растворе NaCl 0.9%-50ml,свечи виферон 2 раза в день, фенистил 10 кап х 3 раза в день, местно - обработка высыпаний раствором бриллиантовой зелени 2 раза в день.

После проведенного лечения отмечалась положительная динамика, на 9 день ребенок выписан с улучшением по просьбе матери на амбулаторное долечивание под наблюдением инфекциониста и участкового педиатра по месту жительства. В дальнейшем динамическое наблюдение за ребенком провести не удалось, в связи с его отъездом к месту постоянного проживания в один из районов области.

Выводы:

1. Вероятно, ребенок был инфицирован варицелла зостер внутриутробно, а опоясывающий лишай возник спустя 2 года, в связи со снижением иммунитета, связанным с перенесенной острой респираторной вирусной инфекцией.
2. Этиотропное лечение (ацикловир в/в капельно + виферон в свечах) в средних терапевтических дозах имело быстрый положительный клинический эффект и может быть рекомендована к применению для лечения больных ветряной оспой и опоясывающим лишаем.

Список литературы

1. Полный медицинский справочник/Пер. с англ. Е. Махияновой и И. Древаль.- М.: АСТ, Астрель, 2006.- 1104 с
2. Инфекционные болезни. Национальное руководство. Ющук Н. Д. ГЭОТАР-Медиа, 2015-1030с.
3. *Хэбиф Т.П.* Кожные болезни: диагностика и лечение. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – С. 218-223
4. В.А. Исаков, Е.А. Архипова, Д.В. Исаков –Герпесвирусные инфекции человека –руководство для врачей СПб СпецЛит -2006.-304с.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2010-2015 ГОДЫ

Провоторов В.Я.¹, Лесневская И.Ю.², Киселева В.В.¹, Овсянникова М.С.²

ОБУЗ "Областная клиническая инфекционная больница

им. Н.А. Семашко"²

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» ¹

Курск, Россия

Аннотация. Проведен анализ 190 случаев летальных исходов ВИЧ-инфицированных по Курской области в период с 2010 по 2015 год. Ведущими оппортунистическими заболеваниями у больных ВИЧ-инфекцией, является туберкулез- 46%, цитомегаловирусная инфекция -25%, токсоплазмоз-8%, пневмоцистная пневмония-7%, кроме того отмечались единичные случаи криптоспоридоза, генерализованный микоплазмоза, лимфомы и смерти, не связанные, с ВИЧ-инфекцией.

Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных пациентов, употреблявших внутривенные наркотики, страдали хроническим вирусным гепатитом С.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД ассоциированные заболевания, аутопсия.

ANALYSIS of MORTALITY of HIV-infection in the KURSK REGION for the PERIOD 2010-2015 YEARS

Pravotorov V.J. ¹, Lesnevskaya I.Y. ², Kiseleva V.V. ¹, Ovsyannikova M.S. ²

Kurskaya oblast clinical infectious diseases hospital. N.a. Semashko ²

Kursk State Medical University ¹

Kursk, Russia

Abstract. An analysis of 190 cases of deaths of HIV-positive people in the Kursk region in the period from 2010 to 2015. The leading opportunistic disease in patients with HIV infection is tuberkulez- 46% , 25% cytomegalovirus infection, toxoplasmosis, 8% of pneumonia Pneumocystis 7%, also noted isolated cases kriptosporidoza, generalized mycoplasma, lymphoma and death, not related with HIV infection.

The vast majority of HIV-infected patients, intravenous drug users with chronic hepatitis C.

Key words: HIV, AIDS associated diseases, autopsy.

С каждым годом увеличивается число пациентов на поздних стадиях инфекции с развитием различных СПИД ассоциированных заболеваний. Именно эти заболевания являются основной причиной летальных исходов у больных на стадии СПИД.

Цель исследования. Провести анализ случаев летальных исходов у ВИЧ-инфицированных больных в Курской области.

Материалы и методы. Для анализа были взяты истории болезни, медицинские карты, протоколы вскрытия умерших по данным ОБУЗ "Областной клинической инфекционной больницы им Н.А.Семашко", ОБУЗ "Кожвендиспансер", отделение профпалогии и борьбы со СПИД, ОКПТД. Во всех случаях аутопсий проводили полное макроскопическое и микроскопическое исследование с использованием широкого спектра гистологических окрасок, бактериологических и вирусологических методов.

Результаты и обсуждения. В период с 2010-2015 годы от ВИЧ-инфекции скончались 190 человек. Летальность была зарегистрирована во всех возрастных группах, кроме детей, 60% составили лица в возрасте от 30 до 45 лет. Среди умерших больных 75% были мужчины. В 2010 году общее число умерших составляло 27 человек, в 2011-24, в 2012 -28, в 2013 -23, в 2014-40, а к 2015 году число умерших достигло 48. Очевидно, что смертность с 2010 по 2013 была на одном уровне, а в 2014 - 2015годы выросла практически вдвое.

В структуре СПИД ассоциированных заболеваний, приведших к летальному исходу у ВИЧ-инфицированных лиц, за период наблюдения ведущую роль играл туберкулез, частота которого среди умерших больных составила 46% (61 человек). Туберкулез в подавляющем большинстве случаев имел генерализованный характер и нередко протекал по типу туберкулезного сепсиса с вовлечением в патологический процесс 4-5 органов, чаще всего лимфатических узлов, легких, печени, головного мозга, селезенки.

Второе место занимает цитомегаловирусная инфекция - 25% случаев. Важным звеном патогенеза ЦМВИ у больных ВИЧ -инфекцией является генерализованное поражение цитомегаловирусом эндотелия сосудов, встречающееся во всех пораженных органах и приводящие к хронической ишемии. Также характерной особенностью заболевания следует считать развитие распространенного фиброза с различными вариантами дисрегенераторных и предраковых изменений.

Третье место принадлежит токсоплазмозу- 8% наблюдений, который был диагностирован у 20 умерших больных, 17 из которых имели поражение головного мозга. У пациентов, страдающих токсоплазмозом, обращала на себя внимание полиорганность патологического процесса с необычно глубоким разрушением пораженных органов. При патоморфологических исследованиях в головном мозге обнаруживали множественные очаги некроза коры, белого вещества и наиболее часто подкорковых образований. В легких выявляли участки коагуляционных некрозов и геморрагических инфарктов.

Пневмоцистная пневмония была диагностирована в 7% случаев. В 2013-2014 не зафиксировано ни одного случая летального исхода от пневмоцистной пневмонии, что вероятно связано с профилактикой данного заболевания и эффективной этиотропной терапией. У единичных больных были диагностированы криптоспоридоз, генерализованный микоплазмоз, лимфомы.

Характерной чертой для больных на поздних стадиях ВИЧ- инфекции явилось частое наличие сразу нескольких тяжелых инфекционных заболеваний одновременно.

Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных пациентов, употреблявших внутривенные наркотики, страдали хроническим вирусным гепатитом С. Известно, что вирусный гепатит С у больных ВИЧ- инфекцией протекает более злокачественно и срок от заражения вирусом гепатита С до развития цирроза печени составляет не более 8 лет. Вероятно, по этой причине в 2015 году значительно возросла летальность, связанная с развитием декомпенсированного цирроза печени, у больных в начальных стадиях ВИЧ-инфекции 2В-3А.

Из 190 случаев летальных исходов 50 приходятся на смерть, не связанную с ВИЧ-инфекцией (отравление неуточненными наркотическими веществами, отравление этиловым спиртом, ДТП, внезапная коронарная смерть, остановка сердца, легочно-сердечная недостаточность, левожелудочковая недостаточность, утопление и др.).

Выводы:

1. В период с 2010-2015 годы летальность была зарегистрирована во всех возрастных группах, кроме детей. 60% составили лица в возрасте от 30 до 45 лет. Среди умерших больных 75% были мужчины.
2. В 2010-2015 годах ведущей причиной летальных исходов у больных ВИЧ-инфекцией был туберкулез - 46%.
3. В 2015 году отмечалось увеличение случаев декомпенсированного цирроза печени как причины летального исхода у больных, на начальных стадиях ВИЧ - инфекции 2В-3А, в 2 раза.

Список литературы

1. Национальное руководство/ Под ред.Н.Д. Ющука, Ю.Я.Венгерова-М.:Гэотар-Медиа. - 2015.-1065с.
2. 2.Малый В.П. ВИЧ. СПИД. Новейший медицинский справочник. — М.: Эксмо, 2009.
3. Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
4. 4.Мазус А.И., Мартынов Ю.В., Панкова Г.Ю. ВИЧ-инфекция: эпидемиологического процесса //Рос.мед.журн.-2011-624с.
5. John G. Bartlett, Joel E. Gallant. Medical Management of HIV infection // Gallant of the Johns Hopkins University.-07-2007. -P.455

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ФЕРРОВИР НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ПРИ HERPES ZOSTER

Рогова Ю.А., Титарева Л.В.

**ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет"
г. Курск, Россия**

Аннотация. В исследование включено 80 больных опоясывающим герпесом с различными вариантами лечения в остром периоде заболевания. Целью данной работы явились изучение терапевтической эффективности иммуномодулятора ферровир при лечении больных опоясывающим лишаем на основании клинического анализа болевого синдрома. Применение иммуномодулятора приводит к укорочению общеинфекционного синдрома, более короткому периоду везикулязации и формированию корок, эпителизации. В результате проведенной терапии показана высокая эффективность ферровира в лечении больных опоясывающим герпесом.

Ключевые слова: герпес опоясывающий, иммуномодуляторы, лечение, ферровир, иммуномакс.

INFLUENCE OF IMMUNOMODULATOR FERROVIR ON CLINICAL PROGRESSION AND FREQUENCY OF RELEPSES OF HERPES ZOSTER .

Rogova Y.A., Titareva L.V.

**Kursk State Medical University
Kursk, Russia**

Abstract. The research examined 80 patients with herpes zoster, who had undergone different variants of management in acute period of disease. This work studies therapeutic efficacy of immunomodulator ferrovir for the treatment of herpes zoster using pain syndrome as clinical estimate. Immunomodulator application induced shorter infection syndrome and reduced the time of vesicle and crust formation as a better epithelization. Ferrovir was shown to be highly effective in treatment of herpes zoster infection.

Key words: herpes zoster, immunomodulators, treatment, ferrovir.

Лечение пациентов, страдающих опоясывающим герпесом, продолжает оставаться актуальной проблемой медицины, несмотря на постоянно пополняющийся арсенал специфических и неспецифических противогерпетических препаратов. В современной медицине выделяют три основных аспекта терапии герпетической инфекции: применение противовирусных химиопрепаратов, иммунотерапия или комбинация этих методов. В связи с этим поиск и клиническая оценка эффективности

иммуномодуляторов для лечения больных опоясывающим герпесом являются актуальными и перспективными.

Целью данной работы явились изучение терапевтической эффективности иммуномодулятора ферровир в комплексной терапии опоясывающего герпеса на основании клинического анализа болевого синдрома, очага поражения и частоты возникновения рецидивов.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 80 пациентов, страдающих опоясывающим герпесом различной локализации:

Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины в возрасте от 41 до 60 лет; отсутствие обострений соматических заболеваний на момент обследования; отсутствие онкологических заболеваний, заболеваний крови, сахарного диабета; наличие эритематозных, эрозивных, эрозивно-язвенных поражений кожи; среднетяжелое течение заболевания.

В ходе исследования пациенты были рандомизированы на две группы методом случайной выборки. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, площади поражения кожи и срокам обращения за медицинской помощью. Мужчин было 36, женщин - 44. Нами были исключены лица старше 60 лет по причине несопоставимости у них показателей состояния иммунной системы с лицами более молодого возраста и абсолютного преобладания в этой популяции хронических соматических заболеваний, длительно протекающих, требующих постоянного фармакологического лечения и искажающих необходимые нам результаты. Лица молодого возраста также не входили в группу исследования по причине высокой активности иммунитета.

1 группу составили 40 больных, получавших стандартную терапию – ацикловир в дозе 400мг 5 раз в сутки внутрь. Ацикловир является синтетическим аналогом пуриновых нуклеозидов. Обладает противовирусным, противогерпетическим действием.

2 группу составили 40 пациентов, получавший стандартную терапию (ацикловир) и ферровир в течение 5 дней по 5 мл препарата 1 раз в сутки внутримышечно. Ферровир (ЗАО ФП “Техномедсервис”, Россия) – противовирусный и иммуностимулирующий препарат для применения в комплексной и монотерапии острых и хронических инфекционных заболеваний, вызываемых различными РНК- и ДНК-содержащими вирусами.

Ацикловир назначался с момента первичного обращения, ферровир – после нормализации температуры тела (через 5-7 дней с момента клинических проявлений и кожных высыпаний). Также пациенты получали нестероидные противовоспалительные средства, дезинтоксикационную терапию. С целью купирования выраженного болевого синдрома назначался лидокаин 5%-ый местно – до 3 пластырей в день. Местное лечение проводилось поэтапно: мазь «Ацикловир» - в первые часы появления высыпаний, растворы анилиновых красителей (растворы Кастелляни, бриллиантовой зелени) - при везикулезной сыпи, паста Лассара – в стадии корок. В среднем, длительность применения наружных лекарственных форм составляла от 10 до 12 дней (в зависимости от

возраста больных, площади высыпаний). Глубокие эрозивно-язвенные поражения (с вовлечением в процесс дермы) эволюционировали дольше и требовали применения эпителизирующих мазей (солкосерил, актовегин).

Пациенты обращались за медицинской помощью в первые 3-4 дня от начала заболевания. Диагноз устанавливался на основании жалоб пациентов на возникшие высыпания на коже, анамнеза заболевания, объективных данных – появление на коже и слизистых единичных или сгруппированных везикул на гиперемизированном отечном фоне. В дальнейшем диагноз подтверждался положительными реакциями ИФА и ПЦР сыворотки крови. Все пациенты проходили полное клинико-физикальное обследование, которое включало жалобы, анамнез жизни и заболевания, данные клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования. Все пациенты давали письменное информированное согласие на участие в исследовании и публикацию результатов диагностики и лечения при сохранении конфиденциальной информации о самом пациенте.

Для оценки трансформации локального статуса нами был использован дерматологический индекс шкалы симптомов (ДИШС). ДИШС является субъективным индексом оценки степени негативного влияния Herpes Zoster на различные аспекты жизни больного, характеризующие в целом качество его жизни. Подсчет производился простым подсчетом баллов. Максимальное значение индекса – 30 баллов, минимальное – 0 баллов. Чем больше баллов, тем большее влияние оказывает заболевание на качество жизни.

Интерпретация тяжести заболевания проводилась по модифицированной нами схеме, ранее предложенной Л.К. Борисенко «Стандартизованная оценка жалоб и клинических симптомов у больных рецидивирующим генитальным герпесом» (1998). Суть модификации: вместо предложенного автором измерения площади поражения кожи в см², мы измеряли ее числом пораженных дерматомов. Выраженность жалоб пациентов, симптомов интоксикации, очага поражения (площадь и характер высыпания, наличие некроза, отека, регионального лимфаденита, геморрагий) определялась в баллах.

Результаты исследования и их обсуждение.

Статистический анализ проведен с использованием параметрического критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия с $p < 0,05$. Нами установлено, что у больных опоясывающим лишаем, составляющих группы исследования, субъективные ощущения в продромальном периоде возникали в 93,1% случаев за 24-48 часов до появления первых высыпаний. Пациенты отмечали боль, чувство жжения, покалывания в области поражения кожи. Следует отметить, что в группе с традиционной терапией у 8 больных (20,0%) сыпь появлялась в течение 8-10 дней отдельными группами. В группе пациентов, получавших в составе комплексной терапии ферровир, повторных герпетических эксфолиаций не отмечалось.

После проведенного лечения между группами появились существенные различия в регрессе местного воспалительного очага. У больных, получавших ферровир, отмечалась более быстрая эпителизация, уменьшение отечности,

болезненности, инфильтрации, размеров ранее увеличенных лимфатических узлов ($p < 0,05$). В большинстве случаев отчетливый клинический эффект наблюдали на 3-4 день после начала комплексного лечения с использованием препарата.

Регрессирование симптоматики подтверждалось и положительной динамикой изменения значений дерматологических индексов. До начала терапии показатели модифицированного нами индекса ДИШС применительно к статусу больных опоясывающим лишаем во всех исследуемых группах имели равные значения. К концу курса терапии в группе пациентов, получавших иммуномодулятор в составе комплексной терапии, ДИШС уменьшился и показатели его были достоверно ниже ($p < 0,05$), чем в группе больных со стандартной терапией. Так, например, в группе больных, получавших ферровир, показатель ДИШС уменьшился на 85,2% в сравнении с его значениями до начала лечения, тогда как в группе со стандартной терапией – на 58,8%.

При опоясывающем герпесе на первый план выступают нейротропные свойства вируса. Активация инфекционного процесса сопровождается развитием вирусного ганглионеврита с поражением межпозвоночных ганглиев или ганглиев черепных нервов, а также задних корешков. Болевой синдром в остром периоде – наиболее частое проявление опоясывающего герпеса. Не всегда интенсивность болевых проявлений соответствовала выраженности экзантемы. Так, из 58 пациентов с эрозивными и язвенно-эрозивными формами поражения кожных покровов у 11 человек болевой синдром был незначительный и кратковременный, а у 3 из 12 больных с эритематозной формой заболевания наблюдался длительный болевой синдром при минимальных клинических проявлениях.

Оценку болевого синдрома проводили на сроке 30 дней от начала заболевания. Установили, что исчезновение боли в группах с иммунокоррекцией ферровиром отметили 82,5% пациентов, что достоверно выше ($p < 0,05$), чем в группе со стандартной терапией – 57,5% больных.

Сохраняющийся болевой синдром свыше трех месяцев мы расценивали как осложнение заболевания в виде хронической зостерной невралгии. В наших исследованиях в группе больных со стандартной терапией на 90-92 день от начала заболевания хроническая зостерная невралгия отмечалась в 42,5% случаев, у пациентов с иммунокоррекцией ферровиром – в 17,7% случаев.

Также нами отмечено положительное влияние ферровира на частоту возникновения рецидивов заболевания. Динамическое наблюдение за пациентами проводилось на протяжении 3 лет с момента первичного эпизода опоясывающего герпеса. Так, в группе пациентов, получавших ферровир в составе комплексной терапии, рецидив заболевания был отмечен у 2 пациентов (5,0%), в группе со стандартной терапией – у 6 пациентов из группы (15,0%).

Таким образом, применение иммуномодулятора ферровир в составе комплексной фармакотерапии опоясывающего герпеса позволяет достичь существенного улучшения лечения данной патологии, повышает качество

жизни пациентов и способствует уменьшению числа рецидивов заболевания. Клиническая эффективность применения ферровира при лечении больных опоясывающим герпесом проявлялась не только более низкими показателями ДИШС после проведенного курса лечения, но и более быстрым исчезновением болевого синдрома и регрессом воспалительного процесса в пораженных дерматомах. Более быстрая трансформация локального статуса у больных, получавших ферровир, на наш взгляд, объясняется способностью препарата тормозить репликацию вируса в инфицированных клетках.

Список литературы

1. Носик, Д.Н. Ферровир: опыт применения в экспериментальной и лечебной практике / Д.Н. Носик, Э.Н. Каплина. – М.: Научная книга, 2005. – 79с.
2. Скрипкин, Ю.К. Новые подходы в лечении герпесвирусной инфекции / Скрипкин Ю.К., Матушевская Е.В., Сабирова Л.М. – М., 2006. – 43с.
3. VZV-инфекция: лечение и профилактика постгерпетической невралгии /Скрипкин Ю.К., Матушевская Е.В., Негматов Б.И., Литвин А.А. // Современные проблемы дерматологии, иммунологии и врачебной косметологии. – 2009. Т. 45, №1. – С.16-20.
4. Jackson, J.L. The effect of treating Herpes zoster with oral acyclovir in preventing posttherapeutic neuralgia. A meta-analysis / J.L. Jackson, R. Gibbons, G. Meyer et al. // Arch. Intern. Med. – 2007. - Vol . 157. – P.909-912.
5. John, W. Varicella-Zoster Virus: Atypical Presentations and Unusual Complications / W. John, Jr Gnann // Journ. of Infectious Diseases. – 2006. – Vol.186. – P.91 – 98.
6. Whitley, R. J. Herpes Zoster: Risk Categories for Persistent Pain /R. J. Whitley et al.// Journ. of Infectious Diseases. – 2007. – Vol.179. – P.9 – 15

СОМАТИЧЕСКАЯ И ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ ИЗ РАЗНЫХ В СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНЕ СЕМЕЙ

Романова М.А.

Омский Государственный Медицинский Университет
Омск, Россия

Аннотация. Проведено ретроспективное когортное исследование по оценке частоты и структуры сопутствующей туберкулезу патологии у детей раннего возраста в зависимости от социального статуса их семей, в которое включены 280 детей за период 1995-2015 гг.. Установлено, что сопутствующая патология встречалась у большинства детей раннего возраста с развившимся туберкулезом, ее частота не зависела от социального окружения ребенка, при этом сопутствующая инфекционная и паразитарная патология, анемии, болезни системы кровообращения достоверно чаще отмечены у детей из семей социального риска.

Ключевые слова: туберкулез, соматическая, инфекционная патология, дети, социальный статус.

The somatic and infectious diseases in children 0-3 years old with tuberculosis from different families in the social plan

Romanova M.A.

Omsk State Medical University
Omsk, Russia

Abstract. A retrospective cohort study to assess the frequency and structure of concomitant TB disease in infants, depending on the social status of their families, which included 280 children for the period 1995-2015. It was found that comorbidities common in the majority of infants who developed tuberculosis, its frequency does not depend on the social environment of the child, with accompanying infectious and parasitic diseases, anemia, diseases of the circulatory system were significantly more marked in children from families at social risk.

Key words: tuberculosis, somatic, infectious pathology, children, social status.

Актуальность: наличие активного туберкулёзного процесса уже является трагедией для пациента [2], особенно если это ребёнок, ограничивая его социальные возможности, меняя привычную среду общения [6]. Зачастую, после выявления очага контакта родители оказываются изолированы от детей [1,6,7], что на фоне стресса снижает защитные реакции организма ребёнка [5,7,10]. В дополнение развитие туберкулёзного процесса усугубляется и наличием различной сопутствующей патологии [4,5,9], в частности и ВИЧ-инфекции имеющей распространение и в детской среде [3,8]. Таким образом,

возникает потребность выявить степень влияния соматической и инфекционной патологии на формирование туберкулёзного процесса у детей в социуме.

Материалы и методы: В ретроспективном исследовании представлены результаты клинического наблюдения 280 детей 0-3 лет с туберкулезом за период 1995-2015 гг., находившихся на стационарном лечении. Сравнение проведено по социальному статусу семьи ребенка: 1-я группа - дети из социально дезадаптированных семей (n=122), 2-я группа - из социопатических (n=66) и 3-я группа - из социально сохранных семей (n=92). Среди детей преобладали мальчики (167 детей – 59,6%). В 1-й группе было 74 мальчика (60,7%), во 2-й - 41 (62,1%), а в 3-й - 52 (56,5%) ($\chi^2=0,593$; $p=0,744$).

Туберкулез органов дыхания диагностирован в 1-й группе у 113 детей (92,6%), во 2-й - у 49 детей (74,2%) и в 3-й - у 78 детей (84,8%) ($\chi^2=11,914$; $p=0,003$). ТВГЛУ был у детей 1-й в 72,1% случаев, 3-й – в 69,6%, 2-й - в 59,1% ($\chi^2=3,474$; $p=0,176$). ПТК в 1,3 раза чаще выявлен у детей 1-й группы (20,5%), чем у детей 2-й (15,2%) и 3-й (15,2%) групп ($\chi^2=1,341$; $p=0,512$). Внелегочный туберкулез зарегистрирован у 1 ребенка (0,8%) 1-й группы (туберкулез костей) и у 4 детей (4,3%) 3-й группы (туберкулез кожи, костей и периферических лимфоузлов) ($\chi^2=5,293$; $p=0,071$). Генерализация специфического процесса чаще возникала у детей 3-й группы (10,9%), реже 2-й (9,1%) и 1-й групп (6,6%) ($\chi^2=1,274$; $p=0,529$). Осложнения развивались в 1-й группе в 5,7% случаев, во 2-й в 12,1%, в 3-й – в 13% ($\chi^2=3,822$; $p=0,148$). Бактериовыделение зафиксировано в 1-й группе в 2,5%, во 2-й – в 1,5%, в 3-й – в 3,3% случаев ($\chi^2=0,482$; $p=0,786$).

Для статистического анализа использован пакет программ «Биостат 4.03». Качественные данные сопоставлялись с использованием χ^2 Пирсона. Различия принимались, как статистически достоверные при $p<0,05$.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта «Оценка роли социального риска и наличия соматической и инфекционной патологии у детей в развитии и течении туберкулеза» №16-16-55012 а(р).

Результаты исследования и их обсуждение. Сопутствующая туберкулезу патология диагностирована у 110 (90,1%) детей 1-й группы, у 56 детей (84,8%) 2-й группы и у 74 детей (80,4%) 3-й группы ($\chi^2=4,107$; $p=0,128$).

Инфекционные и паразитарные болезни фиксировались у детей 1-й группы в 30,3%, 2-й – в 30,3, 3-й – в 23,9% ($\chi^2=1,257$; $p=0,535$). Паразитозы являлись самой распространенной патологией данного класса для 1-й (24,6%), 2-й (22,7%) и 3-й (10,9%) групп ($\chi^2=6,776$; $p=0,034$). Они представлены энтеробиозом у 17,2% детей 1-й группы, у 16,7% 2-й и у 6,5% 3-й группы ($\chi^2=5,816$; $p=0,055$); лямблиозом у 8,2% 1-й группы, у 6,1% 2-й и у 5,4% 3-й ($\chi^2=0,704$; $p=0,703$); токсокарозом у 2 детей 1-й группы. ВИЧ-инфекция была только у детей из социопатических семей (3%). Гепатит имели 3 ребенка из 1-й группы и по 2 ребенка из 2-й и 3-й групп ($\chi^2=0,117$; $p=0,943$). Ветряную оспу в стационаре перенесли 4 ребенка (3,3%) 1-й и 10 детей (10,9%) 3-й группы. Латентное течение вирус Эбштейн Барр отмечено у 1 ребенка 3-й группы.

Болезни системы кровообращения выявлены в 1-й группе (26,2%) в 1,4 раза чаще, чем во 2-й (18,2%) и в 2,2 раза чаще, чем в 3-й группе (12,1%) ($\chi^2=9,277$; $p=0,010$). Вторичные миокардиодистрофии фиксировали и в 1-й (12,3%), во 2-й (10,6%), и в 3-й (4,3%) группах ($\chi^2=4,111$; $p=0,128$). Вторыми по распространенности были малые аномалии сердца отмеченные так же у детей 1-й (9,8%), 2-й (7,6%), и 3-й (6,5%) групп ($\chi^2=0,741$; $p=0,690$). Пороки сердца выявлены только в неблагополучных в социальном плане семьях, т.е. 1-й (4,9%) и 2-й (1,5%) группах. Нарушение ритма имели 3 ребенка (2,5%) в 1-й группе и по 1 ребенку во 2-й и 3-й группах (1,5% и 1,1%) ($\chi^2=0,599$; $p=0,741$).

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани чаще возникали у детей из социально дезадаптированных семей (25,4%), реже из социопатических (18,2%) и социально сохранных семей (17,4%) ($\chi^2=2,461$; $p=0,292$). Частым проявлением этого класса болезней является рахит, наблюдаемый в 1-й группе у 13,9% детей, во 2-й - у 13,6%, а в 3-й - у 6,5% детей ($\chi^2=3,263$; $p=0,196$). Дисплазией соединительной ткани обладали 8 детей (6,6%) 1-й группы, 3 ребенка (4,5%) 2-й и 5 детей (5,4%) 3-й группы ($\chi^2=0,342$; $p=0,843$). Нарушение осанки выявлено у 6 детей (4,9%) 1-й группы, у 2 (3%) 2-й и у 5 (5,4%) 3-й ($\chi^2=0,539$; $p=0,764$). Единично встречались в 1-й группе артрит и косолапость, а в 3-й группе артрит и полидактилия.

Болезни крови и некоторые иммунные нарушения зафиксированы в 1-й (35,2%), 2-й (27,3%) и 3-й (25%) группах ($\chi^2=2,928$; $p=0,231$). Представлены анемиями у 25,4% детей 1-й группы, у 15,2% 2-й, у 12% 3-й группы ($\chi^2=6,945$; $p=0,031$), и вторичными иммунодефицитными состояниями - у 10,7% детей 1-й группы, у 9,1% 2-й, у 16,3% 3-й группы ($\chi^2=2,323$; $p=0,313$).

Заболевания нервной системы и психические расстройства чаще возникали у детей 2-й группы (43,9%), реже 1-й (29,5%), 3-й (32,6%) ($\chi^2=4,085$; $p=0,130$). Чаще представлены задержкой психического развития: в 1-й группе в 17,2%, во 2-й - в 28,8% и в 3-й - в 25% ($\chi^2=3,782$; $p=0,151$). Энцефалопатия диагностирована у 3,3% детей 1-й группы у 9,1% 2-й и у 5,4% 3-й группы ($\chi^2=2,855$; $p=0,240$). Астено-невротический синдром возник у 7 детей 1-й группы, у 2 детей 2-й и 3-й групп (3% и 2,2%) ($\chi^2=1,950$; $p=0,377$). Энурез имели по 2 ребенка в каждой из групп. Гипертензионно-гидроцефалический синдром выявлен у детей 2-й группы в 4,5%, в 1-й в 0,8% и 3-й в 1,1% ($\chi^2=3,771$; $p=0,152$); нарушение сна - единично в 1-й и 3-й группах, эпилепсия и невроз навязчивых движений - единично в 2-й и 3-й группах. Только в 1-й группе у 3 детей возникло нарушение поведения, и в 3-й группе 1 ребенок был с ДЦП.

Значительно реже встречались болезни дыхательной системы, в 1-й группе - у 3,3% детей, во 2-й - у 7,6% и в 3-й - у 4,3% ($\chi^2=1,813$; $p=0,404$). В каждой группе по 1 ребенку имели бронхолегочную дисплазию и бронхиальную астму. Бронхит зарегистрирован в 1-й группе у 2,5% детей, во 2-й - у 6,1% и в 3-й - у 2,2% ($\chi^2=2,263$; $p=0,323$). Единично в 1-й и 2-й группах зафиксирован аллергический ринит.

Патология мочеполовой системы встречалась в 1-й группе в 11,5% случаев, во 2-й - в 8,6%, в 3-й - в 4,3% ($\chi^2=3,576$; $p=0,167$). Инфекции

мочевыводящей системы диагностированы у 8,2% детей 1-й группы, у 7,6% 2-й и у 2,2% 3-й группы ($\chi^2=3,679$; $p=0,159$). Аномалии почек имели по 1 ребенку в 1-й и 3-й группах и 2 ребенка во 2-й группе, фимоз - по 1 ребенку в 1-й и 2-й группах, синехии - 1 ребенок в 3-й группе.

Нарушения со стороны кожи зафиксированы в 1-й группе в 8,2%, во 2-й – в 9,1% и 3-й – в 7,6% ($\chi^2=0,112$; $p=0,946$). Атопический дерматит имели 5,7% детей 1-й группы и 7,6% и 5,4% - во 2-й и 3-й группах ($\chi^2=0,351$; $p=0,839$). В 1-й группе было 3 ребенка (2,5%) с диагнозом контагиозный моллюск, а в 3-й 1 ребенок (1,1%) ($\chi^2=1,953$; $p=0,377$). Единично во 2-й группе выявлена аллопеция, а в 3-й – панариций.

Болезни системы пищеварения имели в 1-й и 3-й группах по 2 ребенка (1,6% и 2,2%), во 2-й группе 1 ребенок (1,5%) ($\chi^2=0,122$; $p=0,941$). Дисфункцию билиарного тракта имели по 1 ребенку в каждой группе (0,8%, 1,5%, 1,1%). Аномалию кишечника по 1 ребенку в 1-й и 3-й группах.

Болезни эндокринной системы диагностированы в 1-й группе в 3,3%, во 2-й – в 1,5% и 3-й - 1,1% ($\chi^2=1,364$; $p=0,506$). Офтальмопатология возникала у детей из социопатических семей в 6,1%, из социально-сохранных – в 2,2%, из социально дезадаптированных – в 4,1% ($\chi^2=1,555$; $p=0,460$). Болезни глаз, по одному случаю во всех группах, представлены миопией, ангиопатией, конъюнктивитом, помутнением роговицы, амблиопией, дакриоциститом, косоглазием и астигматизмом. Болезни уха проявлялись тугоухостью и встречались единично у детей 1-й и 3-й групп.

Выводы: Сопутствующая патология характерна для детей раннего возраста с активным туберкулезом, ее распространенность не зависит от социального статуса их семьи. Ряду патологий, таких как паразитозы, анемии и болезни системы кровообращения, подвержены дети из социально дезадаптированных семей.

Список литературы

1. Брынцева Н.М. Объем противотуберкулезной помощи детям и подросткам: прогноз и интенсификация / Н.М. Брынцева, А.Ю. Черников, В.М. Коломиец // Туберкулез и болезни легких. -2014. - №8. – С. 25-26.
2. Брюханова Н.С. Диагностика и коррекция пограничных психических расстройств у больных впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких / Н.С. Брюханова, А.В. Мордык // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - Т. 88. - № 4. - С. 71-72.
3. Гусева В.А. ВИЧ-инфицированные как группа риска по развитию туберкулеза / В.А. Гусева, В.М. Коломиец, С.М. Кудинов, Ю.И. Шахова // туберкулез и болезни легких. – 2011. - № 4. – С. 114-115.
4. Мордык А.В. Выявление различных форм и локализаций туберкулеза у детей разного возраста: роль скринингового обследования / А.В. Мордык, А.А. Турица, А.Р. Ароян, Е.А. Цыганкова // Российский педиатрический журнал. – 2016. - № 3. – С.151-156.
5. Мордык А.В. Противотуберкулезный иммунитет и механизмы его формирования (обзор литературы) / А.В. Мордык, Е.А. Цыганкова, Л.В.

- Пузырева // Дальневосточный медицинский журнал. – 2014. - № 1. – С. 126-130.
6. Мордык А.В. Психологические нарушения у детей, находившихся на длительном лечении в противотуберкулезном стационаре, как проявление социальной депривации / А.В. Мордык, Е.В. Панина, А.В. Кондря, А.А. Турица, Ю.В. Руднева // Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье". - 2015. - № 4. - С. 116-121.
 7. Мордык А.В. Туберкулез у детей Российской Федерации на современном этапе / А.В. Мордык, Е.А. Цыганкова, Л.В. Пузырева // Педиатрическая фармакология. - 2014. – Т.11. - № 3. – С. 27-30.
 8. Мордык А.В. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Омской области с 1996 по 2013 год / А.В. Мордык, С.В. Ситникова, Л.В. Пузырева, В.В. Радул // Медицинский альманах. - 2014. - № 2 (32). - С. 62-64.
 9. Турица А.А. Медико-социальная характеристика семей у детей с урогенитальной патологией, в том числе связанной с инфицированием МБТ / А.А. Турица, А.В. Мордык, О.Г. Иванова, Л.В. Пузырева // Уральский медицинский журнал. – 2016. - №1. – С.25-30.
 10. Турица А.А. Факторы риска инфицирования микобактериями туберкулеза у детей и подростков в Омской области / А.А. Турица, О.Г. Иванова, Н.А. Валова, А.В. Мордык // Туберкулез и болезни легких. – 2015. - №7. – С. 141.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЮ

*Рублева Н.В.¹, Коломиец В.М.¹, Новикова С.Н.¹, Лебедев И.Ю.¹,
Шахова Ю.И.², Ледовская Т.И.², Ковтун В.Н.²,*

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет¹,
ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер"²
Курск, Россия**

Аннотация. 62 пациентов с ВИЧ ассоциированным ТБ были выявлены уровень соответствия согласно оригинального метода и стандартного многостороннего исследования личности (SMIL) в канале адаптации Л.Н. Собчек. Результаты были сопоставлены с аналогичными данными в контрольной группе. Было установлено, что больных туберкулезом и ВИЧ инфекции были выявлены низкий уровень соответствия по сравнению с группой больных туберкулезом без ВИЧ инфекции. Высокий курс (4, 6 и 8 шкал) SMIL были дополнительные риски маркеры низкого соответствия для лечения туберкулеза. Пациенты с высоким уровнем (2-й и 9-ой шкалы) было рекомендовано получить регулярную психологическую поддержку для того, чтобы уменьшить развитие пессимизма и депрессии.

Ключевые слова: ВИЧ ассоциированного ТБ, соблюдение, SMIL тест (MMPI).

Features of the psychological status of the TB patients and HIV-infection with low level of compliance

**Rubleva N.V., Kolomiets V.M., Novikova S.N., Lebedev I.Y.,
Shahova Y.I., Ledovskaya T.I., Kovtun V.N.**

**Kursk State Medical University ¹,
Regional clinical TB dispensary ²
Kursk, Russia**

Abstract. 62 patients with HIV-associated TB were identified the level of compliance according to original method and standard multilateral study of personality (SMIL) in adaption of L.N. Sobchek. Results were compared with similar data in the control group. It was found that TB patients and HIV-infection were revealed a low level of compliance in comparison to a group of TB patients without HIV-infection. High rates (4th, 6th and 8th scales) SMIL were additional risk markers of the low compliance to TB treatment. Patients with high levels (2nd and 9th scales) were recommended to get regular psychological support in order to reduce the development of pessimism and depression.

Key words: HIV-associated TB, compliance, SMIL test (MMPI).

Противотуберкулезная терапия ВИЧ-ассоциированного туберкулеза увеличивает продолжительность и качество жизни больных, но только при их согласии четко следовать назначениям врачей, то есть при высокой приверженности лечению. [1,2]. Низкая приверженность лечению ведет к нарушению пациентами современных режимов терапии и требует индивидуального подхода к организации их лечения. Такой адекватный подход возможен при учете особенностей психологического статуса пациентов, изучение которого в современных условиях имеет большой теоретический и практический интерес [2,3,4,6].

Данные литературы об изучении психологического статуса при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе немногочисленны [1,5]. Его особенности у таких пациентов требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования: особенности психологического статуса больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких с низкой приверженностью лечению.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 62 впервые выявленных больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (40 мужчин и 22 женщины), в возрасте от 20 до 60 лет, проходивших лечение в противотуберкулезном стационаре (1 группа). В качестве контроля обследована 2-я группа (62 человек) впервые выявленных больных туберкулезом легких без ВИЧ-инфекции, идентичная 1-й группе по полу возрасту и формам заболевания.

Больным обеих групп проводилось традиционное клинико-рентгенологическое и лабораторное исследование, которое включало оригинальную оценку приверженности лечению (авторская методика) и стандартизованное многостороннего исследования личности (СМИЛ) в адаптации Л.Н. Собчек [7]. СМИЛ, адаптированная к отечественной популяции методика Minnesota Multiphasic Personality Inventory, широко используется для диагностики личностных особенностей пациентов во многих странах мира, что позволяет уверенно применять ее в отечественной клинической сфере. Для интерпретации индивидуальных профилей мы учитывали преобладание высоких значений отдельных шкал в исследуемой группе. Показатели выше 75T свидетельствовали о нарушенной адаптации и об отклонении состояния индивида от нормального». «Коридором нормы» считался достаточно широкий диапазон от 30T до 70T. Избыточная степень выраженности той или иной личностной черты проявлялась в виде повышения или понижения показателя шкалы за пределы этого диапазона [5,7].

Оценку полученных данных проводили при помощи методов современной статистики.

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено, что больные ВИЧ-ассоциированным туберкулезом по показателям приверженности лечению существенно отличались от больных туберкулезом легких, неинфицированных ВИЧ. Так, у больных 1-й группы

средний показатель приверженности лечению до начала специфической терапии был ниже, чем у лиц 2-й группы (3,1 против 6,2 стенов; $P < 0,05$). Отмечен крайне низкий показатель (2 стена) у 2-х больных 1-й группы, который сочетался с систематическими нарушениями больничного режима. Низкая приверженность лечению у этих больных сочеталась с такими факторами социальной дезадаптации, как безработица – 46,6%, отсутствие семьи – 52,2%, пристрастие к алкоголю – 70%, миграция – 35%, пребывание в прошлом в местах лишения свободы (МЛС) – 28%.

Проанализированы ведущие шкалы СМИЛ у пациентов обеих групп с учетом максимального числа Т-баллов в каждом профиле. У 52 пациентов 1-й группы, чаще, чем у больных, неинфицированных ВИЧ, встречались высокие показатели по 4-й шкале. Разница между исследуемыми группами по этому показателю была достоверна ($p < 0,05$) и позволяет предположить, что у больных, страдающих ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, возникают трудности с социальной адаптацией, которые могут усугубляться благодаря их нетерпеливости, склонности к риску, неустойчивым, часто завышенным притязаниям. Мотив достижения успеха у этих больных сочетался с волей к реализации сильных желаний, которые не всегда подчинялись контролю рассудка.

Отмечены также высокие показатели по 6-й шкале – «ригидность». Это указывало на стеничность установок, стремление к опоре на собственный опыт и практичность. Таких больных раздражала неопределенность. По нашему мнению, этим пациентам следует уделять особое внимание для формирования у них установки на лечение туберкулеза, которое является для них жизненно важным. В беседах с этими пациентами им представлялись аргументы, доказывающие вредное влияние, гнева, враждебного настроения на здоровье. После 2-х месяцев неэффективной терапии у больных обеих групп отмечались фрустрированные потребности, о чем свидетельствовали также исследования с использованием собственной методики оценки приверженности лечению. У пациентов 1-й группы отмечались также повышенные показатели по 9-й шкале, определяющие акцентуацию по гипертимному и экзальтированному типу.

При сравнении по шкалам СМИЛ «слабого» регистра отмечены высокие показатели по 2-й шкале («пессимистичность»). Эта особенность была наиболее четко выражена у лиц, употребляющих наркотики. У них же зафиксирована потребность в понимании и любви со стороны окружающих, а также высокая психологическая уязвимость и повышенный суицидальный риск.

Пациенты с высокими показателями по 8-й шкале обнаруживались одинаково часто в обеих группах, демонстрируя трудно предсказуемые поступки и проблемы с адаптацией.

Заключение. Больные ВИЧ-ассоциированным туберкулезом демонстрируют более низкую приверженность лечению по сравнению с туберкулезными больными, неинфицированными ВИЧ. Высокие показатели по

4-й, 6-й и 8-й шкалам СМИЛ целесообразно рассматривать в качестве дополнительных маркеров риска низкой приверженности противотуберкулезной терапии. Пациентам с высокими показателями по 2-й и 9-й шкалам нужна регулярная психологическая поддержка, чтобы снизить пессимистичность, а также предупредить или ослабить развитие депрессии.

Список литературы

1. Беляков Н.А. Левина О.С., Рыбников В.Ю. Формирование приверженности к лечению у больных с ВИЧ-инфекцией // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2013. - № 1, Т.5. - С. 7–33.
2. Бондаренко В.Н., Рузанов Д.Ю. ВИЧ-ассоциированный туберкулез (литературный обзор) // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - №3 (17). – С.41-46.
3. Коломиец В.М., Гусева В.А., Рублева Н.В., Шахова Ю.И. Особенности клинического течения и лечения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. - №1. С.142-147.
4. Коломиец В.М., Коноркина Е.А., Шпак А.В. Социально-психо-логическая реабилитация психически больных как метод неспецифической профилактики туберкулеза.//Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2013. - №3. – С. 19-22
5. Кольцова О.В., Сафонова П.В., Рыбников В.Ю., Штерн М.А. Личностные особенности и поддержание непрерывности лечения у ВИЧ-инфицированных пациентов // Вестник СПбГУ Сер. 16. - 2013. – Вып. 4. - С.49-59.
6. Рублева Н.В, Коломиец В.М., Кочеткова Е.Я. Лечебно-реабилитационные мероприятия у больных туберкулезом легких с разной приверженностью лечению. //Антибиотики и химиотерапия. Т.61, №1-2,2016. С. 9-14.
7. Собчик Л. Н. СМЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. СПб.: Речь, 2009. - 224 с.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В
ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СТРАН СНГ**

Сафарян М.Д.¹, Азизян Н.Г.¹, Коломиец В.М.²

**Ереванский государственный медицинский университет¹,
г. Ереван, Армения**

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет²,
г. Курск, Россия**

Аннотация. Особенности распространения и течения ВИЧ ассоциированного ТБ в двух регионах стран СНГ. Различия были обнаружены в патогенезе и клинического течения в случаях сопутствующие заболевания. Усиление мер контроля является необходимых ТБ больных с ВИЧ инфекцией, особенно для раннего выявления и лечения больных с лекарственной устойчивостью.

Ключевые слова: ВИЧ ассоциированного ТБ, меры контроля

**COMPARATIVE CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL
CHARACTERISTIC OF HIV-ASSOCIATED TUBERCULOSIS IN SOME
REGIONS OF CIS COUNTRIES**

Safaryan M.D., Azizyan N.G., Kolomiets V.M.

Yerevan State Medical University¹,

Yerevan, Armenia,

Kursk State Medical University²,

Kursk, Russia

Abstract. Peculiarities of spread and current of HIV-associated TB in two regions of CIS countries. Differences were found in the pathogenesis and clinical current in cases of comorbidity. The intensification of control measures is needed TB patients with HIV-infection, especially for early detection and treatment of patients with drug-resistant.

Key words: HIV-associated TB, control measures

Туберкулез (ТБ) является одной из главных медицинских и социальных проблем во всем мире. По оценкам экспертов ВОЗ, в 2011 г. в мире было зарегистрировано 8.7 млн. новых случаев заболевания и 1.4 млн. смертей от туберкулеза (Global tuberculosis report 2012, WHO, 2013). В странах СНГ удается стабилизировать эпидемическую ситуацию, в отличие от которой не удается стабилизировать ситуацию по Вич-инфекции. Так, в России по данным В.В. Покровского, только в 2014 году было выявлено 85 252 впервые инфицированных человек (ВичИ). Именно поэтому ВичИ становятся приоритетной группой риска по ТБ среди населения, а особенности развития сочетанного заболевания - Вич- ассоциированного туберкулеза (ВичТБ)

необходимо постоянно изучать с целью разработки методов как своевременного выявления, так и реабилитации больных.

В порядке межвузовского сотрудничества стран СНГ, с целью изучения клинико-эпидемиологических особенностей развития и распространения ВичТБ проведены исследования в регионах стран СНГ (Армении и Курской области России) [1]. Материалом исследования служили истории болезни пациентов с различными формами ТБ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, находящиеся на лечении в республиканском (РПТД, Армения) и областном противотуберкулезных диспансерах (ОКПТД, Курск) в течение 5-10 лет. Все больные подвергались клинико-рентгенологическому, лабораторному обследованию с использованием молекулярно-генетических технологий для выявления возбудителя и туберкулиновых проб, включая диаскинтест.

За исследуемый период наблюдали более 280 пациентов в РПТД и 105 в ОКПТД с различными формами ВичТБ. Заметное различие в численности контингентов ВичТБ очевидно объяснимо разным уровнем заболеваемости – в Армении она колеблется в среднем на уровне 1.24 сравнительно с 0.35/100.000 в Курской области. Наименьший показатель заболеваемости 0.5 и 0.78 отмечены в 2006 и 2007гг, а наибольший показатель 2.11 на 10^5 населения в 2012 году. Конечно, такие различия и динамика роста показателей вряд ли возможно объяснить улучшением выявляемости и своевременной диагностикой сочетанной патологии.

Анализ гендерной структуры пациентов в РПТД выявил преобладание мужчин – 84.7%, что возможно объясняется частотой наркозависимости и миграции у данной когорты населения. По возрасту отмечено преобладание следующих возрастных групп 35-44 года (42.3%), 25-34 года (27.8%) и 45-54 года (22.4%). Согласно полученным данным 67.3% пациентов представители городского населения, 32.7% - жители сельского населения. Исследование территориального распределения пациентов по марзам Армении за 2012 год выявило их преобладание в Шираке – 3.19, Лори – 2.83 и Арагацотне – 2.8 на 10^5 населения. Зонами наименьшей заболеваемости являлись Гегаркуник 1.23, Тавуш – 1.48 и Ереван – 1.69 на 100 тыс. населения.

Почти все больные были трудоспособного возраста. Большая часть исследуемых (56.7%) имела среднее образование, 17.5% пациентов - высшее образование. Неработающих больных было более 70%.

Начало болезни было острым с выраженной интоксикацией, высокой температурой – у 53.7% больных. Среди клинических проявлений заболевания на первом месте наблюдались: общая слабость (79.5%), кашель с мокротой (73.2%), резкая потеря массы тела (57.0%). У большинства больных наблюдались различные функциональные нарушения со стороны органов и систем. Так, ЭКГ констатировала дистрофические изменения миокарда почти у каждого 3-го больного. Туберкулиновая чувствительность по пробе Манту с 2ТЕ PPD-L оказалась отрицательной в 91.6% случаев.

У 82.5% больных был установлен легочный процесс. Анализ клинической структуры показал, что туберкулез легких наблюдался в 82.5% случаев.

Причем чаще встречались инфильтративный (25.8%), диссеминированный (23.8%) и очаговый (10.4%) процессы в легких.

Деструкция легочной ткани отмечена в 36.2% случаев. В 20.1% случаев встречались генерализованные поражения с вовлечением нескольких органов и систем, в том числе туберкулезным менингитом - (12.5%), что соответствует данным ряда исследователей. Различные осложнения туберкулеза специфического и неспецифического характера встречались у 38 (12.8%) больных, среди которых в 57.9% случаев была установлена легочно-сердечная недостаточность.

Анализ лекарственной устойчивости (ЛУ) бактериовыделителей показал, что устойчивость к одному препарату наблюдалась в 14.3% случаев, устойчивость к трем и более химиопрепаратам выявлялась у половины пациентов – 51.6%. Полирезистентность регистрировалась в 26.8% случаев; множественная лекарственная устойчивость определялась в 71.4% случаев, в одном случае имелось широкая мультирезистентность.

В структуре среди больных ВичТБ ОКПТД также преобладают мужчины и городские жители, включая и мигрантов, возрастной состав коррелирует с возрастными группами заболевших туберкулезом.

В динамике (по годам наблюдения) у 38,5%- 43,4 % больных диагностирован вторичный ТБ, 46,8 % 52,4% - ВИЧ-инфекция и ТБ выявлены одновременно и в не более чем в 10% случаев ВИЧ-инфекция развилась на фоне туберкулеза. Больных с наиболее вероятным сроком первичного инфицирования ВИЧ до 3 лет было 72,5%.

В клинической структуре заболеваемости ВичТБ преобладание диссеминированной и инфильтративной форм (соответственно 42,3% и 41, 2%) и относительно высоким является выявление больных ВичТБ с фиброзно-кавернозным ТБ. Однако в отличие от структуры больных РПТД, лекарственная устойчивость МБТ выявлена у 12% больных, или в 21,8% случаев бактериовыделения.

При этом в преобладающем большинстве больные с запущенными и деструктивными формами выявляются среди мигрантов.

Из сопутствующих заболеваний хронический гепатит зарегистрирован у 65 %, анемия - 21,6 %, наркомания 2,5 % и дефицит массы тела у 10,9% больных Вич/ТБ. Злоупотребление алкоголем выявлено у 17,4 %, в 35,3 % случаев табакокурение было свыше 10 сигарет в день, а курение и злоупотребление алкоголем у 20,6 % больных.

В клинических проявлениях Вич ТБ сравнительно с ВИЧ-инфекции отмечается достоверно более выраженное проявление интоксикационно-токсического (ИТС), астено-вегетативного (АВС) и бронхолегочного (БЛС) синдромов на всех стадиях ВИЧ, кроме IVB и V.

Заключение. Таким образом, в сравниваемых регионах стран СНГ имеются значительные различия в распространении Вич-ассоциированного туберкулеза. В то же время имеются лишь некоторые различия как в патогенезе, так и в клиническом течении случаев сочетанной патологии, что

свидетельствует о необходимости интенсификации противоэпидемических мероприятий среди ВИЧ-инфицированных как приоритетной группе риска по туберкулезу. Очевидна приоритетная необходимость улучшения своевременного выявления и целенаправленного лечения больных с лекарственной устойчивостью возбудителя.

Список литературы

1. Коломиец В.М, Алексюк Е.Н., Буйневич И.В., Шевченко О.С. · Координация противоэпидемических мероприятий по ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в приграничных регионах СНГ. //Туберкулез и болезни легких.- 2015. -№5. – С.84-85.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РОЗАЦЕА

Силина Л.В., Поехало А., Солянина В.А.

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет
Курск, Россия**

Аннотация. Одной из актуальных проблем современной дерматологии является определение перспективных направлений лечения розацеа. Являясь мультифакторным заболеванием, розацеа предполагает дифференцированный подход к лечению ее клинических форм. В данной публикации представлена попытка анализа целевого сегмента российского фармацевтического рынка – лекарственных средств для лечения розацеа (по АТХ – классификации, в том числе в разрезе стран-производителей, видов лекарственных форм). Полученные результаты являются основой дальнейшего исследования фактических назначений лекарственных средств на различных этапах лечения розацеа.

Ключевые слова: розацеа, лекарственная терапия, ассортимент лекарственных средств.

ANALYSIS OF ASSORTMENT OF MEDICATION FOR THE TREATMENT OF ROSACEA

Silina L.V., Poekhalo A.N., Solyanina V.A.

**Kursk State Medical University,
Kursk, Russia**

Abstract. One of the most urgent problems of modern dermatology is the identification of perspective directions of treatment of rosacea. Being multifactorial disease, rosacea requires differentiated approach to the treatment of its clinical forms. Given publication represents an attempt of analysis of the target segment of the Russian pharmaceutical market of medicines for the treatment of rosacea (for the ATC-classification including in the context of producing countries, types of dosage forms). The obtained results are the basis for further research on actual drugs prescriptions on various phases of treatment of rosacea.

Key words: rosacea, drug therapy, an assortment of medicines.

Розацеа, определяемая как мультифакторное заболевание с хроническим рецидивирующим течением, преимущественно поражающее кожу лица [1], является одной из актуальных проблем современной дерматологии.

По данным российских авторов, розацеа имеет наибольший удельный вес в структуре акнеподобных дерматозов (36%). В Российской Федерации на долю розацеа приходится около 5% всех дерматологических диагнозов. Однако, по данным российских косметологов, реальная цифра достигает 21% [4].

Причины возникновения и развития угрей изучаются на протяжении многих лет и продолжают оставаться предметом исследований в настоящее время. Несмотря на их значительное количество, не существует единого представления об этиологии и патогенезе угрей.

National Rosacea Society (NRS) Expert Committee (США, 2002) выделяет следующие субтипы розацеа: эритематозно-телеангиэктатическую, папуло-пустулезную гипертрофическую и офтальморозацеа. Эти клинические субтипы отражают тяжесть болезни, они имеют переходные формы. Тяжесть болезни оценивается также по патофизиологическим, социальным и профессиональным критериям [3].

При назначении общего лечения наиболее часто используются антибиотики, метронидазол, изотретионин. До сих пор самыми эффективными антибактериальными препаратами в терапии розацеа остаются тетрациклины. На современном этапе наиболее перспективным методом является лазерная коррекция высокоинтенсивными лазерами, обладающими селективным действием на сосуды.

В последние годы стали отмечаться случаи неудач в лечении розацеа традиционными средствами. Не исключено, что неуспех терапии может быть связан с возникновением устойчивости бактериально-паразитарной флоры, возможной индивидуальной непереносимостью. Кроме того, такое лечение отличается длительностью, нередким развитием побочных эффектов [2].

Целью настоящего исследования явился анализ ассортимента лекарственных средств (ЛС) для лечения розацеа, представленных на российском фармацевтическом рынке.

Для формирования перечня лекарственных препаратов ассортимента был проведен контент-анализ учебной литературы, клинических рекомендаций, проекта стандарта лечения розацеа (официальный сайт ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации), научных публикаций.

В результате установлено, что общий ассортимент предложений ЛС для лечения розацеа составляет 12 международных непатентованных наименований (МНН), из которых больше половины приходится на лекарственные средства трех основных групп в т.ч. антибиотики - 33%, иммунодепрессанты – 20%, противопаразитарные препараты – 20%, остальные 27% составляют продукты других групп лекарственных средств.

Анализ ассортимента лекарственных средств, применяемых для лечения розацеа по группам АТС-классификации показал, что он включает 6 групп. Абсолютное большинство ЛС 33,4%, по количеству торговых наименований (ТН) принадлежат к группе J - противомикробные препараты для системного использования. Среди них преобладают макролиды (20,5% по количеству ТН, 16,6% по количеству МНН), линкозамиды (10,3% по количеству ТН), производные имидазола (10,3%). Препараты группы D - для лечения заболеваний кожи составляют 25% по количеству МНН и 8,6% по количеству торговых наименований, из них 66,6% занимают препараты для лечения

угревой сыпи, 33,3% - прочие препараты для лечения заболеваний кожи. Лекарственные средства, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ, составляют в структуре ассортимента 16,6%, по количеству торговых наименований. Среди них 100% наименований составляют противомикробные препараты для местного лечения заболеваний.

Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы (код С) составляют 8,3% от общего количества МНН, применяемых для лечения розацеа, и 5,7% - по количеству торговых наименований. Препараты, применяемые для лечения нервной системы (код N) и противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты составили 2,9% и 1,9% по количеству торговых названий соответственно.

В структуре ассортимента ЛС, применяемых для лечения розацеа, преобладают препараты отечественного производства 55,5%, остальные 45,5% - зарубежные ЛС.

Анализ предложений ассортимента ЛС, применяемых для лечения розацеа, по странам-производителям показал, что всего зарегистрированы предложения 17 зарубежных стран, первый рейтинг принадлежит Индии - 7,8%, второй - Нидерланды и Китай (по 4,4%), третий США, Германия, Турция – по 3,33%, четвертый - Белоруссия, Молдова, Польша, Сербия, пятый-Израиль, Дания, Канада, Франция, Чехия, Хорватия, Венгрия, Италия.

В структуре ассортимента присутствуют различные варианты лекарственных форм препаратов. Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки (37,7%) и капсулы (12,2%), остальные 13 % приходятся на суппозитории, гранулы, порошки. Среди жидких лекарственных форм присутствуют только растворы для инъекций. Из средств для наружного применения большинство представляют гели, остальные лекарственные формы представлены кремами, мазями, спиртовым раствором для наружного применения.

Таким образом, лечение розацеа представляет собой сложную задачу, должно быть комплексным с учетом вероятных этиологических факторов, патогенеза и симптоматики заболевания. Многообразие и сложность патогенетических факторов розацеа предполагают дифференцированный подход к лечению ее различных клинических форм. Современный российский рынок лекарственных средств предлагает достаточный выбор препаратов для медикаментозной терапии розацеа.

Список литературы

1. Кубанова А.А. Розацеа: распространенность, патогенез, особенности клинических проявлений / А.А. Кубанова, Ю.Б. Махакова // Вестник дерматологии и венерологии.- 2015.- №3.-С. 37-39.
2. Мареева Е.Б. Розамет в комплексной терапии розацеа / Е.Б. Мареева, С.В. Шкребец, Д.Е. Фирсова // Вестник дерматологии и венерологии.- 2006.- №3.- С. 46-48.
3. Родионов А.Н. Дерматовенерология: полное руководство для врачей.

4. Юцковская, Н.В. Кусая, С.Б. Ключник // Клиническая дерматология и венерология.- 2010. –№3. –С. 60-63.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ

Ситникова С.В.

**ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет,
Омск, Россия**

Аннотация. Проведена сравнительная характеристика клинических проявлений туберкулеза среди пациентов с ВИЧ-инфекцией в сравнении с больными изолированным туберкулезом легких. При развитии туберкулеза органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией чаще возникали признаки интоксикации и проявления легочного синдрома.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, заболеваемость, клиника туберкулеза.

Clinical manifestations of tuberculosis in patients with HIV / tuberculosis

Sitnikova S.V.

Omsk State Medical University,
Omsk, Russia

Abstract. The comparative characteristic of clinical manifestations of TB in patients with HIV infection compared with patients with isolated pulmonary tuberculosis. With the development of pulmonary tuberculosis in patients with HIV infection were more frequent signs and symptoms of pulmonary toxicity syndrome.

Key words: tuberculosis, HIV infection, the incidence of tuberculosis clinic.

В настоящее время ВИЧ-инфекция приобретает характер эпидемии на территории многих регионов России, в том числе и в Омской области [4, 10].

На территории Омской области с 2006 г. (4,6 на 100 тыс. населения) до 2014 г. (133,2 на 100 тыс. населения) заболеваемость ВИЧ-инфекцией увеличилась на 2795,0% [9].

Туберкулез является ведущей причиной смерти ВИЧ-инфицированных лиц [6, 8]. Несвоевременное выявление туберкулеза при наличии иммунодефицита приводит к быстрой диссеминации, генерализации процесса и, как следствие, высокой смертности больных [5, 7]. Однозначно мнение многих исследователей, что при наличии туберкулеза у пациента с иммунодефицитом обязательно назначение антиретровирусной терапии, что положительно сказывается на благоприятном исходе лечения специфического воспаления [1]. Также на результат лечения туберкулеза у данной группы пациентов оказывает их социальный статус, образ жизни и, соответственно, комплаентность [2, 3].

Цель: сравнить клинические проявления туберкулеза у пациентов в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализирована 200 Карт стационарного больного (Учетная форма 3) пациентов с туберкулезом легких проходивших лечение в КУЗОО «КПТД № 4» города Омска в период с 2012 по 06. 2016 год, среди которых 100 – пациентов были с сочетанной патологией туберкулез и ВИЧ-инфекция (основная группа). Выполненная работа не ущемляла права, не подвергала опасности обследованных пациентов и осуществлялась с их информированного предварительного согласия. Одобрена локальным этическим комитетом ОмГМУ. Статистическая обработка и анализ данных проводились на базе пакетов прикладных программ Microsoft Excel. В связи с наличием распределения отличного от нормального были применены методы описательной статистики с вычислением непараметрического критерия с2. Результаты считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Распределение пациентов, включенных в исследование по полу и возрасту, показало отсутствие достоверных различий между сравниваемыми группами. Клинические проявления наблюдались в каждой из групп у 96% пациентов. Анализ температурной реакции в основной группе показал: субфебрилитет в 42,0% и фебрильные цифры - в 13,0% случаев, против 54% и 11% пациентов контрольной группы ($p > 0,05$). В 18,0% случаев температура была гектического характера у пациентов в сочетании ВИЧ/ТБ (против 2% - в контрольной группе, $p < 0,01$). В основной группе на потливость жаловались 64,0% больных, преимущественно слабо (38,0%) и умеренно (18,0%) выраженную. В 8,0% случаев отмечались обильные ночные поты. В контрольной группе потливость имела место лишь в 36,0% случаев, при этом обильная - только у 1 (2,0%) больного ($p < 0,01$).

Снижение массы тела при сочетанной инфекции наблюдалось в 64,0% случаев. Чаще больные теряли от 5 до 10 кг (32,0%), или от 10 до 20 кг и более (20,0% случаев) в течение трех месяцев. В контрольной группе снижение массы тела наблюдалось несколько реже - у 54,0% больных, и не было случаев выраженной потери массы тела более 20 кг ($p < 0,01$). У больных ВИЧ/ТБ частой жалобой явилось снижение аппетита (72,0%), в том числе выраженное в 26,0% случаев. Больные ТБ отмечали снижение аппетита лишь в 26,0% случаев ($p < 0,01$).

Кашель беспокоил почти всех больных основной группы - 88,0% пациентов, причем у 28,0% он был интенсивный, а у 60,0% слабо выражен. В контрольной группе кашель наблюдался у 70,0% больных, и носил выраженный характер в 13,0% случаев ($p < 0,01$). Большая часть больных сочетанной инфекцией жаловалась на одышку - 74,0%, чаще умеренно - 44%. Больные ТБ без ВИЧ-инфекции отмечали одышку лишь в 33,0% случаев ($p < 0,01$).

В основной группе начало заболевания было преимущественно постепенным в 82,0%, острым - в 14,0%, бессимптомным - в 4,0% случаев. В контрольной группе постепенное начало отмечалось у 60,0%, бессимптомное и острое одинаково часто - по 20,0% в каждом случае.

Следовательно, у пациентов ВИЧ/ТБ достоверно чаще регистрировались высокая температура, потливость, снижение веса от 5 кг в течение трех

месяцев, снижение аппетита, а также жалобы на кашель и одышку. Полученные данные помогут дифференцировать клинические проявления туберкулеза легких у больных ВИЧ-инфекцией от других вторичных /оппортунистических заболеваний органов дыхания.

Список литературы

1. Мордык, А.В. Влияние иммунного статуса, стадии и терапии ВИЧ-инфекции на исход стационарного этапа лечения у пациентов с сочетанной патологией туберкулез / ВИЧ-инфекция / А.В. Мордык, С.В. Ситникова, Л.В. Пузырёва // Инфекция и иммунитет. – 2016. – № 1. – Т. 6. – С. 81-86.
2. Мордык, А.В. Современные международные и национальные концепции борьбы с туберкулезом / А.В. Мордык, Л.В. Пузырёва, Л.П. Аксютин // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2013. – № 22. – С. 92-98.
3. Мордык, А.В. Социальный статус пациентов противотуберкулезного диспансера и его влияние на отношение к лечению / А.В. Мордык, Л.В. Пузырёва, Т.Г. Подкопаева // Социология медицины. – 2011. – № 2. – С. 44-47.
4. Нечаева, О. Б. Ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции / О. Б. Нечаева // Туберкулез и болезни легких. – 2014. – № 6. – С. 9-15.
5. Структура и клинические особенности ВИЧ-ассоциированного туберкулеза при стабилизации эпидемической ситуации в регионе / Н.В. Рачина [и др.] // «Университетская наука: взгляд в будущее. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета. В 3-х томах. 2016. С. 177-182.
6. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией на территории Омской области за период с 2008 по 2012 год / А.В. Мордык [и др.] // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 106-109.
7. Факторы риска развития туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя / И.С. Гельберг [и др.] // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2015. – № 1. – С. 17-22.
8. Эпидемическая обстановка по туберкулезу в Омске за период с 1991 по 2009 год. / А.В. Мордык [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2011. – № 8. – С. 23-26.
9. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе в 2014 году / Е.С. Довгополук [и др.] // ЖМЭИ. – 2016. – № 2. – С. 37-41.
10. Эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Омской области с 1996 по 2013 гг. / А.В. Мордык [и др.] // Медицинский альманах. – 2014. – № 2 (32). – С. 62-64.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ташпулатова Ф.К., Абсадыкова Ф.Т.

Ташкентский Педиатрический медицинский институт,
Республиканский специализированный научно- практический
медицинский центр Фтизиатрии и пульмонологии,
г. Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Особенности клинического течения 54 детей с ТБ/ВИЧ, характеризуется преобладанием синдрома общей интоксикации. Показано мультицентровое исследование с использованием современных радиационных методов, главным образом компьютерная томография.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ.

CLINICAL FEATURES OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN WITH HIV INFECTION AT THE PRESENT STAGE

Tashpulatova F. K., Absadykovna F. T.

Tashkent Pediatric Medical Institute,
Republican specialized scientific-practical medical center of phthisiology and
Pulmonology,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Peculiarities of the clinical course of 54 children with TB/HIV, characterized by the predominance of General intoxication syndrome. Shown a multicenter survey using modern radiation techniques, primarily computed tomography.

Key words: tuberculosis, HIV.

Актуальность: В условиях эпидемиологического напряжения по туберкулезу риск заражения детей, особенно с ВИЧ инфекцией, нарастает (Аксенова В.И., 2004). Однако, у детей с наличием ВИЧ инфекции трудно диагностировать туберкулез, так как при наличии двух инфекционных процессов часто регистрируется отрицательная реакция на туберкулин и отсутствуют микобактерии туберкулеза (МБТ) в мокроте. При этом, в патологический процесс вовлекаются лимфатическая система, нарушается обмен веществ, наблюдается длительный субфебрилитет.

Цель: изучение особенности течения туберкулеза у детей с ВИЧ инфекцией.

Материалы и методы: были проанализированы истории болезни 54 детей, пролеченных в детском отделении Республиканского специализированного научно- практического медицинского центра Фтизиатрии и пульмонологии РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии за последние три года, с наличием ВИЧ инфекции и внутригрудного туберкулеза

(ВГТ). Возраст обследованных колебался от 1 года до 14 лет, 42 (77,7%) из них были в возрасте от 2 до 6 лет. Девочек было 19 (35,2%), мальчиков - 35 (64,8%).

Для диагностики ВИЧ инфекции наряду с иммуноферментным анализом (ИФА) использовали два показателя - концентрация вируса и число СД клеток в сыворотке. У 42 (77,7%) детей туберкулез был выявлен при профилактическом обследовании ВИЧ инфицированных детей, лишь у 12 (22,2%) - ВИЧ инфекция установлена в процессе противотуберкулезной терапии.

По уровню СД клеток больные были разделены на 2 группы. В 1 группу включены 18 детей с незначительным снижением уровня СД клеток, а во 2 – 36 детей с прогрессирующей тяжелой степенью иммунодефицита. Диагностическое обследование включало рентген–томографические, бактериологические, инструментальные и патоморфологические методы.

У большинства обследуемых детей был диагностирован диссеминированный (37%) и генерализованный (20,3%) первичный туберкулез, преимущественно во 2 группе детей с прогрессирующим тяжелым иммунодефицитом. При этом, генерализованный первичный туберкулез характеризовался диссеминированным процессом в легких, поражением периферических и мезентеральных лимфоузлов, а в 1 случае - менигоэнцефалитом.

Ограниченные формы ВГТ в 2 раза чаще регистрировались у детей в 1 группе с умеренным иммунодефицитом ($18,5 \pm 5,5$ и $9,3 \pm 3,8\%$). У всех детей с ТБ/ВИЧ, независимо от группы, установлено наличие генерализованной аденопатии и гепатомегалии.

Увеличение печени у обследуемых детей варьировало от 2 до 15 см. Более выраженная гепатомегалия с увеличением печени на 5 см и более в 5 раз чаще наблюдалась в группе детей с тяжелой иммуносупрессией.

Несмотря на выраженную гепатомегалию при биохимическом исследовании крови у большинства больных установлена активность ферментов печени на верхней границе нормы. Лишь у 7 (12,9%) детей отмечена ферментемия в умеренных пределах, которая нормализовалась через 2-3 месяца химиотерапии.

Дефицит веса наблюдался у 51 обследуемого ребенка (94,5%) и имел прямую зависимость от степени иммунодефицита (табл.2). Более тяжелая степень гипотрофии чаще наблюдалась у детей из 2 группы. Кардиопатия, отмечена у 38 детей (70,4%), которая проявлялась в виде увеличения размеров сердца, приглушения первого тона, систолического шума и тахикардии, которые возникали на фоне инфекционного или токсического миокардита.

Повышенная температура тела у 35 (64,8%) детей с ТБ/ВИЧ характеризовалась непостоянным, длительным фебрилитетом. Уровень повышения температуры также имел зависимость от объема специфического воспаления. При осложненных, распространенных формах заболевания отмечался подъём температуры до $38-40^{\circ}$, а при ограниченных – до 38°C . Данный симптом в 2 раза чаще регистрировался во 2 группе наблюдения. Катаральные изменения в легких отмечены у 21 ребенка (38,9%) при

поступлении и отмечались, в основном, у детей из 2 группы 17 (47,2%). Задержка роста в 1,4 раза чаще наблюдалась в группе детей с выраженным иммунодефицитом. У 20 обследуемых детей дошкольного возраста (3-5 лет) не была развита разговорная речь, отсутствовал навык самостоятельного хождения. Сдвиги в гемограмме в виде снижения уровня гемоглобина отмечены у 48 (88,9%) обследуемых детей; умеренный лейкоцитоз в пределах 8-12 тыс. - у 28 (51,8%); нейтрофильный сдвиг влево - у 35 (64,8%); ускоренная СОЭ в пределах 20–70 мм/час - у 96,2% детей. При этом, более выраженные сдвиги выявлены у детей из 2 группы обследования.

У 6 (11,1%) детей обнаружены микобактерии туберкулеза в мокроте. Результаты пробы Манту с 2ТЕ оказались отрицательными у 47 (87,1%) больных детей. Лишь у 7 детей из 1 группы наблюдалась реакция на туберкулин размером 5-10 мм. Рентгенологические сдвиги были тесно связаны с характером развившегося патологического процесса. Однако у детей из 2 группы объем поражения внутригрудных лимфоузлов был более обширным, и в 2 раза превышал объем поражения у детей 1 группы. У 33 (61,1%) детей установлено осложненное течение туберкулеза: у 11 (21,5%) больных – ателектаз отдельных сегментов легких, у 8 (15,7%) – плеврит, у 46 (90,1%) – очаги обсеменения в легочной ткани.

Заключение: Клиническое течение ТБ/ВИЧ у детей отличается многогранностью клинических признаков заболевания с преобладанием общего интоксикационного синдрома. В связи с высокой частотой обнаружения полилимфаденопатии на фоне интоксикационного синдрома дети с ВИЧ инфекцией требуют проведения тщательного рентгенологического и томографического исследования.

Список литературы

- 1.Аксенова В.А. Туберкулез у детей и подростков. Учебное пособие, М.2007.С. 302
- 2.Национальное руководство по диагностике и ведению случаев туберкулеза у детей в Республике Узбекистан, Т,2014, с.117
3. Нечаева О.Б., Эйсмонт Н.В. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ –инфекции в Российской Федерации. Социальные аспекты здоровья населения. 2012. №2. (24)<http://vestnik.mednet.ru/content/view/399/30/lang.ru>

**ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЯ
В ИММУННОМ СТАТУСЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ РОЖИ**

Титарева Л.В., Лищук Н.Г., Рогова Ю.А.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Курск, России**

Аннотация. В исследование включено 3 группы больных рожей с различными вариантами лечения в остром периоде заболевания. Каждая группа включала в себя 50 больных первичной и 50 больных рецидивирующей рожей. С целью регистрации рецидивов все пациенты наблюдались в течение двух последующих лет. Наилучшие результаты профилактики рецидивов рожи получены при комбинации антибактериальных средств с иммуномодуляторами.

Ключевые слова: рожа, иммуномодуляторы, ликолипид, циклоферон, профилактика рецидивов, γ -интерферон.

**THE THERAPEUTIC EFFICACY AND CHANGES
IN THE IMMUNE STATUS WHEN USING
IMMUNOMODULATORS IN THE TREATMENT OF ERYSIPELAS.**

Titareva L.V., Lishchuk N.G., Rogova Y.A.

Kursk State Medical University,
Kursk, Russia

Abstract. The research included 3 groups patients with erysipelas, which had undergone treatment alternatives in acute period of disease. In order to register the relapses all patients were being observed within two subsequent years. The best results of erysipelas relapses prophylaxis were received in combination of antibiotics with immunomodulators (licopid and cyclopheron).

Key words: erysipelas, immunomodulators, licopid, cikloferon, relapse prophylaxis, gamma-interferon.

Инфекционные болезни по-прежнему являются актуальной медико-социальной проблемой. Связано это, с одной стороны, с их ростом, а с другой — с появлением в последние годы новых и возвращающихся инфекций.

Стрептококковые инфекции принадлежат к числу наиболее распространенных заболеваний бактериального происхождения во всем мире. Рожа — вариант стрептококковой инфекции, характеризующийся особой склонностью к частому рецидивированию. Рожа является инфекционно-аллергическим заболеванием, занимающим по распространенности в современной структуре инфекционной патологии 4-е место после острых респираторных и кишечных инфекций, вирусных гепатитов. Частота рецидивов при роже неуклонно возрастает и, по данным разных авторов, варьирует от 25% до 50%.

Более чем в 60% случаев рожу переносят люди в возрасте 40 лет и старше. Огромную роль в возникновении этого заболевания отводят состоянию естественных защитных сил организма. Генотипическая предрасположенность к роже чаще всего реализуется в пожилом возрасте, на фоне повторной сенсибилизации к гемолитическому стрептококку и при наличии определенных патологических состояний.

Лечение больных рожей и профилактика ее рецидивов – сложная и актуальная задача практической медицины. Учитывая важную роль стрептококка в этиопатогенезе рожи, большое значение при лечении данного заболевания отводится средствам этиотропной терапии, хотя многие авторы отмечают недостаточную эффективность общепринятой этиотерапии в предотвращении возникновения последующих рецидивов. Многолетние наблюдения дают основание утверждать, что бициллинопрофилактика рожи действенна лишь при ее постоянном проведении.

Для успешного развития иммунного ответа необходимо двустороннее взаимодействие макрофагов с Т-лимфоцитами. В ходе представления антигена Т-лимфоцитам макрофаг активирует их своими цитокинами, но по мере появления активированных антигеном Т-лимфоцитов они в свою очередь начинают секретировать цитокины, воздействуя ими на макрофаги и другие антигенпредставляющие клетки. Среди многочисленных цитокинов, обладающих регуляторными функциями, особое место отводят γ -интерферону. Отсутствие повышения уровня интерферона при различных инфекциях может свидетельствовать о недостаточности иммунной системы. По современным представлениям, иммуномодуляторы циклоферон и ликолипид относятся к группе веществ, способных индуцировать в организме человека продукцию эндогенного интерферона.

При комбинированном применении с антибактериальными препаратами ликолипид и циклоферон повышают их эффективность, позволяет сократить продолжительность лечения, снизить дозу химиотерапевтических средств. Использование иммуномодулирующих средств в комплексной терапии рожи способствует уменьшению частоты рецидивов.

Целью наших исследований явилось изучение влияния иммуномодулирующих препаратов ликолипида и циклоферона на иммунологические и клинические показатели у больных первичной и рецидивирующей рожей.

Нами обследовано 3 группы больных рожей, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в Курской областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко и четырех поликлиниках г.Курска. Каждая группа включала в себя 50 больных первичной и 50 больных рецидивирующей рожей. Возраст больных колебался в пределах 28-76 лет, преобладали лица в группе 41-60 лет. Более чем у половины обследованных больных заболевание протекало в среднетяжелой форме.

Больные были разделены на 3 группы:

1 группа обследованных получала традиционную терапию – бензилпенициллина натриевую соль в дозе 1,5 млн ЕД 4 раза в сутки. 2 группа больных, получала традиционную терапию (пенициллин) и ликопид в дозе 2 мг 3 раза в день перорально; 3 группа пациентов на фоне традиционной терапии (пенициллин) получала циклоферон внутримышечно по 4 мл по схеме: 1,2,4,6,8,11 и 14-е сутки заболевания. Пенициллин назначался больным с первого дня их поступления на стационарное лечение, ликопид – на 3-й день после нормализации температуры, циклоферон – по схеме.

Группы обследованных нами пациентов вполне сопоставимы по полу, возрасту, сезонности заболевания, клиническим формам рожи, локализации местного воспалительного процесса, наличию сопутствующих заболеваний.

В своей работе мы определяли титры антител к ферментам стрептококка в сыворотке крови: гиалуронидазе, стрептолизину-О, дезоксирибонуклеазе В; уровень Ig A, Ig G, Ig M, ИЛ-6 и γ -интерферона, так как без анализа иммунного статуса больного не корректно применение иммуномодуляторов. Мы определяли содержание всех вышеперечисленных показателей на 2-4-й, 15-18-й и 28-31-й дни болезни. Количественная оценка уровня γ -интерферона в сыворотке крови проводилась с помощью набора реагентов «Вектор Бест» методом твердофазного иммуноферментного анализа, основанного на принципе «сендвича».

На 2-4-й дни болезни у большинства больных первичной и рецидивирующей рожей уровень γ -интерферона в крови не превышал 25 пг/мл. Проведение повторного иммунологического обследования на 15-18-й и 28-31-й дни болезни выявили значительное увеличение числа больных с повышенным уровнем γ -интерферона во всех трех обследованных группах. В динамике заболевания самый высокий уровень γ -интерферона во всех группах пациентов отмечался на 15-й – 18-й дни заболевания. Мы сравнили содержание в крови этого цитокина при эритематозной и эритематозно-буллезной формах у больных первичной рожей и при эритематозной, эритематозно-буллезной и эритематозно-геморрагической – у больных рецидивирующей рожей. Уровни γ -интерферона во всех группах, взятых по отдельности, при разных клинических формах инфекции достоверно не отличались ($p > 0,05$). У пациентов 1-й группы его значение увеличивалось на 15-18-й дни болезни у 66% больных первичной и у 58% рецидивирующей рожей и продолжались повышаться до 28-31-го дня (78% при первичной и 70% при рецидивирующей), то у больных, пролеченных ликопидом, при первичной роже на 15-18-й дни болезни уровни γ -интерферона повышались у 90%, а на 28-31-й дни – у 94%. В то же время у больных рецидивирующей рожей этот показатель был ниже – 78% и 88% соответственно. У больных, пролеченных циклофероном, повышение уровней γ -интерферона отмечено у всех пациентов в ранее перечисленные сроки заболевания при первичной роже, а при рецидивирующей – на 15-18-й дни болезни у 88%, на 28-31-й – у 94% обследованных.

Оценку местного воспалительного процесса у больных рожей проводили по выраженности таких симптомов как площадь гиперемии, отек, боль в области

очага, наличие булл, геморрагий, лимфаденита. Но так как ликопид назначался, согласно инструкции по его применению, только после 3-го дня нормализации температуры, то влияние препарата на выраженность местного очага мы могли выявить только после десятидневного его приема, когда у больных из указанных выше симптомов могли оставаться: отечность, инфильтрация, болезненность при пальпации. При применении циклоферон установлено достоверно более быстрое исчезновение основных клинических синдромов. Так как в формировании рецидивирующих форм рожи значительную роль играет недостаточность иммунного ответа, то это побудило нас к включению в комплексную терапию рожи иммуномодуляторов ликопида и циклоферона. Мы убедились в том, что данные иммуномодуляторы повышает неспецифическую резистентность организма и уменьшают проявления местного воспалительного процесса. Но в клинической практике при оценке того или иного метода лечения рожи важно также влияние этого метода на уменьшение числа рецидивов при данной инфекции. По нашим данным, число рецидивов (4 года наблюдений) в группах больных рожей с иммунокоррекцией ликопидом было достоверно ниже (6% при первичной роже и 8% при рецидивирующей), чем у пациентов с традиционной терапией (20% и 22%) и у пациентов с применением циклоферона (7% и 10%) ($p < 0,05$).

Более высокие уровни γ -интерферона ($p < 0,01$) у больных, принимавших ликопид и циклоферон, указывали на противовоспалительный эффект препаратов, что нашло свое подтверждение в меньшем числе больных с остаточными явлениями локального воспалительного процесса на 15-й – 18-й дни болезни (инфильтрация тканей, болезненность при пальпации, отечность) по сравнению с группами пациентов с традиционной терапией ($p < 0,05$).

Ликопид и циклоферон способствовали уменьшению числа рецидивов у больных рожей в течение четырех лет. Отмечено стимулирующее влияние циклоферона и ликопида на антительный ответ. Таким образом, циклоферон целесообразно назначать на ранних сроках острых форм заболевания.

Препарат ликопид показан для использования в комплексе терапии обострений и рецидивов рожи, что позволяет избегать повторных курсов антибактериальной терапии и хронизации процесса.

Список литературы

1. Андропова, Т.М. Ликопид - современный отечественный высокоэффективный иммуномодулятор / Т.М. Андропова, Б.В. Пинегин. – Россия 2005. – 26 с.
2. Лобзин, Ю.В. Руководство по инфекционным болезням / Ю.В. Лобзин. – СПб., 2009. – 931 с.
3. Лищук, Н.Г.. Уровень гамма-интерферона как индикатора эффективности иммуномодуляторов в терапии рожи / Н.Г. Лищук, Е.А. Белова с соав. // Здоровье семьи – XXI век онкология – XXI век Материалы XII Международной научной конференции и III Международной научной онкологической конференции 29 апреля – 07 мая 2008 года г. Эйлат, Израиль – 2008г. - часть 1 – С.422-424

4. Титарева, Л.В. Частота возникновения рецидивов рожи при различных схемах лечения /Титарева Л.В., Белоконова Л.В., Рогова Ю.А. // Университетская наука: взгляд в будущее Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета. В 3-х томах – Курск – 2016 г. – С. 444-446
5. Vasselon, T. Toll receptors: a central element in innate immune responses / T. Vasselon, P.A. Detmers // *Infec. Immun.* – 2002. – P. 1033-1041.
6. Peptidoglycan molecular requirements allowing detection by Nodi and Nod2 / S.E. Girardin, L.H. Travassos, M. Herve et al. // *J. Biol. Chem.* – 2003. – Vol. 278 (43). – P. 41702-41708.

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК УГРОЗА РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Торшина И.Е., Воробьева П.И.

**ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Смоленск, Россия**

Аннотация. В статье представлен сравнительный клинико-эпидемиологический анализ заболеваемости ИППП детей и подростков за 2009-2014 гг. в Смоленской области. Установлена ежегодная регистрация ИППП во всех возрастных группах детского и подросткового населения Смоленской области. Анализ результатов анонимного анкетирования информированности детей и подростков по вопросам ИППП свидетельствует об информационном неблагополучии в сфере профилактики ИППП уязвимой группы населения. Статистические данные анализа заболеваемости в сравнении с данными опроса обуславливают необходимость проведения обучающих программ по профилактике ИППП в молодежной среде Смоленского региона с привлечением специалистов дерматовенерологического профиля.

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем, эпидемиология, сексуальное поведение, профилактика инфекций

SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (STIS) AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS AS A THREAT TO THE REPRODUCTIVE HEALTH OF SMOLENSK OBLAST

Torshina I.E., Vorobieva P.I.

**Smolensk State Medical University,
Smolensk, Russia**

Abstract. 11982 cases of first diagnosed STDs for 2009-2014 were analyzed. Every year in all age groups of children and teen-ager population in Smolensk region cases of STDs were registered. Anonymous questionnaire survey about STD among children and teen-agers was conducted in Smolensk region. The survey data evidences about informational problems with children and teen-agers. Statistical data of STDs analysis received by us compared to the survey data stipulate a necessity to introduce educational programs concerning STDs prevention to environment of young people of Smolensk region with engagement dermatovenerology experts.

Key words: sexually transmitted infections, epidemiology, sexual behavior, prevention of infections

Актуальность. В течение последних десятилетий группа ИППП сохраняет высокий рейтинг в структуре причин бесплодия, преждевременных

родов, врожденной патологии, аномалий развития плода, значительно влияя на репродуктивное здоровье населения и в негативном смысле «регулируя» демографическую ситуацию. В Российской Федерации проблема ИППП является весьма актуальной, поскольку ежегодно регистрируются случаи ИППП среди детей и подростков. Использование метода социологического опроса наиболее уязвимой по риску передачи ИППП группы населения - детей и подростков - является основой адекватного анализа как распространения, так и эффективной профилактики ИППП.

Цель исследования - изучение распространенности и риска передачи ИППП среди детей и подростков в Смоленской области.

Материалы и методы. Проведен клинико-эпидемиологический анализ заболеваемости ИППП населения Смоленской области за 2009-2014 гг. на основе сплошной выборки экстренных извещений и амбулаторных карт больных ИППП: всего изучено 11982 первичных случаев заболевания ИППП.

Клинико-эпидемиологический анализ заболеваемости ИППП среди детей и подростков за анализируемый период выявил ежегодную регистрацию всех статистически учитываемых ИППП во всех возрастных группах детского и подросткового населения Смоленской области.

Путем выборочного анонимного анкетирования проведено исследование информированности детей и подростков средних учебных заведений (СУЗ) города Смоленска и Смоленской области по проблемам ИППП с использованием приоритетно разработанной анкеты, которая включала вопросы по:

1) информированности об ИППП, 2) наличии и отсутствии сексуального опыта респондента, 3) знаний вопросов профилактики ИППП и их последствий для здоровья, 4) источникам информации об ИППП; 5) оценке степени доверия к различным источникам информации об ИППП и их профилактики.

Результаты и обсуждение. Случаи ИППП ежегодно регистрировались у детей 0-14 лет, подростков 15-17 и 18-летних юношей и девушек. Общее число первичных случаев ИППП у детей и подростков за анализируемый период составило 654, а доля от общей заболеваемости ИППП населения Смоленской области - 5,46%.

Первое место в рейтинге из числа ИППП за анализируемый период занимает уrogenитальная трихомонадная инфекция (УТИ), которая была установлена у 246 детей и подростков. Анализ заболеваемости УТИ показал, что случаи инфекции выявлялись во всех возрастных группах. Соотношение больных УТИ по полу среди детей и подростков показало преобладание среди заболевших лиц женского пола: девочки/девушки : мальчики/юноши = 4,1:1.

Гонококковая инфекция (ГИ) выявлена у 114 детей и подростков (2-е место при ранжировании частоты встречаемости среди ИППП). Гендерная характеристика больных ГИ в возрастной группе 15-17 лет: соотношение мальчиков/юношей и девочек/девушек = 1:1.

Абсолютное число детей и подростков с впервые установленным диагнозом «сифилис» составило 102. Среди заболевших сифилисом в возрасте до 17 лет преобладали мальчики (70%), а в возрасте 18 лет – девушки (85,7%).

Урогенитальная папилломавирусная инфекция в виде остроконечных кондилом гениталий обнаружена у 72 детей и подростков; из них - 30% девочек/девушек и 70% - мальчиков/юношей.

Выявлены 15-17 летние подростки и лица 18 лет с урогенитальным хламидиозом (УГХ). В общей структуре заболеваемости УГХ населения Смоленской области доля инфицированных 15-17-летних подростков составила - 2,5% с увеличением частоты встречаемости среди 18-летних более чем в 2 раза (5,8%).

За анализируемый период урогенитальный герпес (УГГ) был выявлен у 51 ребенка и подростка. Удельный вес среди подростков 15-17 лет не превышал 0,5%; у 18-летних составил 8,2% из числа всех впервые выявленных случаев УГГ населения Смоленской области.

Учитывая результаты анализа заболеваемости ИППП среди детей и подростков в Смоленской области, которые подтверждают факт сохранения резервуара урогенитальных инфекций и достаточно высокий риск их передачи в молодежной среде с развитием известных осложнений, проведено анонимное добровольное анкетирование уязвимой возрастной группы населения по изучению территориальных факторов риска передачи ИППП.

Проведен опрос 1708 учащихся 19 средних учебных заведений (СУЗ) г. Смоленска и Смоленской области с использованием приоритетно разработанной анкеты. В опросе приняли участие 1142 мальчиков/юношей и 566 девочек/девушек. Среднее значение возраста начала половой жизни респондентов - 14,7 года.

В ходе опроса выделены группы:

- 1) девочек с сексуальным опытом (ДСО) - 45,5%;
- 2) девочек без опыта интимных отношений (ДБО) - 54,5%;
- 3) мальчиков с сексуальным опытом (МСО) - 70%;
- 4) мальчиков, не имеющих сексуального опыта (МБО) - 30%.

Нами установлена прямая корреляционная зависимость возрастания доли молодежи с сексуальным опытом от возраста: так, девочки/девушки указали возраст сексуального дебюта, удельный вес которого в 15 лет составил 24%, в 16 лет - 32% и в 17 лет - 24% (от общего числа респондентов женского пола). Дебют сексуального опыта у мальчиков отмечен в возрасте 14 лет – у 27% респондентов, в 15-летнем возрасте – у 23% и в 16 лет – у 24% опрошенных.

Большинства ДСО указали на наличие 1-2 половых партнеров (72,6%), на 3-5 партнеров - 20,74% и более 6 половых партнеров – 6,7% респондентов. МСО указали на наличие 1-2 партнеров в 41% случаев, на 3-5 сексуальных партнера - 28% и более 6 - 31%.

Систематически использовали презерватив в качестве средства защиты от ИППП 42% ДСО и 54% МСО.

Анализ данных о знании методов профилактики ИППП показал, что 22,96% ДСО и 27,16% ДБО, 48,5% МСО и 37% МБО предлагают в качестве защиты презервативы. Ошибочно считают средства гормональной контрацепции для профилактики ИППП 42,2% ДСО и 34,57% ДБО, а также 20,5% МСО и 25,3% МБО.

Изучение степени доверия подростков к ближайшему социальному окружению с возможностью обсуждения сексуальных отношений и проблем ИППП показало, что вопросы интимных отношений в семье обсуждали 60,7% ДСО и 54,3% ДБО; 45,9% МСО и 38,9% МБО. Однако, 48,5% подростков консультируются по проблемам сексуальных отношений со своими друзьями и сокурсниками. Обсудить вопросы сексуальных отношений, проблемы и методы защиты от ИППП ни с кем из социального окружения не могут 18,9% подростков. Степень доверия к врачам и учителям (как источников достоверной информации) находится на крайне низком уровне - не более 5% респондентов всех групп. Указывают на средства массовой информации и интернет-ресурсы в качестве основных источников информации об ИППП 62% респондентов.

Большинство респондентов всех групп указали на такие ИППП как ВИЧ-инфекция, сифилис и гонорея. Однако, 22% МСО и 17% ДСО не смогли указать ни одну из ИППП.

В результате анализа анкетирования нами были определены СУЗы, учащиеся которых продемонстрировали наиболее рискованное сексуальное поведение: «Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицина», ОГБПОУ «СмолАпо», ОГБПОУ «Смоленский машиностроительный техникум», «Шаталовский сельскохозяйственный техникум». При наличии сексуального опыта (до 100% опрошенных из этих средних учебных заведений), учащиеся показали крайне низкую степень информированности об ИППП: от 41% до 80% опрошенных вообще не знают о существовании ИППП, а 38% из них продемонстрировали полное отсутствие доверия к достоверным источникам информации об ИППП.

Заключение. Данные исследования позволили определить ряд проблем, связанных с сохранением и распространением ИППП в молодежной среде на территории Смоленского региона:

- 1) регистрация в возрастных группах 14-18 лет всех подлежащих учету ИППП без тенденции к их снижению свидетельствует о формировании уязвимой группы риска по передаче ИППП и сохранении эпидемических очагов инфекции в молодёжной среде;
- 2) недостаточный уровень информированности учащихся средних учебных заведений города Смоленска и Смоленской области в вопросах профилактики ИППП является потенциалом для дальнейшего распространения ИППП;
- 3) отсутствие доверия к достоверным источникам информации по проблемам ИППП среди детей и подростков ведет к их поздней обращаемости в случае заражения и развитию осложнений, в том числе, репродуктивной функции.

- 4) Информационное неблагополучие по вопросам ИППП среди детей и подростков в возрасте 15-18 лет свидетельствует о необходимости проведения санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики ИППП среди учащихся СУЗов г.Смоленска и Смоленской области.

На основании полученных нами статистических данных анализа заболеваемости в сравнении с данными опроса разработаны обучающие программы по профилактике ИППП в молодежной среде Смоленского региона, которые были применены на практике с привлечением специалистов дерматовенерологического профиля.

В результате проведенной санитарно-просветительской работы, информированность подростков по вопросам профилактики ИППП достоверно повысилась, что подтверждено данными повторного опроса, проведенного через 10 месяцев после курсов обучающих программ.

Нестабильность показателей заболеваемости ИППП диктует необходимость проведения систематического анкетирования населения для формирования и корректировки обучающих программ профилактики ИППП с учетом территориальных особенностей и потребностей уязвимых групп населения - детей и подростков.

Список литературы

1. Загртдинова Р.М., Димакова Е.В., Боголюбская А.Л. Репродуктивное здоровье подростков и факторы, способствующие распространению сексуально-трансмиссивных инфекций среди несовершеннолетних в Удмуртской Республике // Клиническая дерматология и венерология. – 2014. – №6. – С. 87-90.
2. Кубанова А.А., Мелехина Л.Е., Кубанов А.А., Богданова Е.В. Заболеваемость сифилисом в Российской Федерации за период 2004-2013 гг. // Вестник дерматологии и венерологии. – 2014. – №5. – С. 24-31.
3. Лосева О.К., Торшина И.Е., Пузенко Т.Л. Состояние информированности лиц допризывного возраста по проблемам инфекций, передаваемых половым путем // Военно-медицинский журнал. – 2010. – №8. – С. 29-32
4. Лордкипанидзе Б.А., Ломоносов К.М., Балюра Е.В. Проблема инфекций, передаваемых половым путем, в подростковой среде // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2007. – №6. – С. 45-48.
5. Портнова Н.И., Уварова Е.В. Состояние репродуктивного здоровья подростков – одна из задач диспансерного обследования // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2006. – №2. – С.10-15

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ТОКСИКОДЕРМИЕЙ

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Файзуллина Е.В.,¹ Давыдов Ю.В.,¹ Малеев М.В.²

Казанский Государственный Медицинский Университет¹,

Казанская Государственная Медицинская Академия²,

Казань, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного медико-социального исследования 5000 пациентов, прошедших лечение в дерматологическом отделении Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера. Определена клиническая картина острой токсико-аллергической реакции. Выделены факторы риска развития токсикодермии. Получены новые данные.

Ключевые слова: токсикодермия, лекарственная аллергия, острая токсико-аллергическая реакция, аллергическая реакция.

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TOXICODERMATOSIS BASED ON THE MATERIALS OF TATARSTAN REPUBLIC

Faizullina E.V., Davydov Y.V., Maleev M.V.

Kazan State Medical University ¹,

Kazan State Medical Academy ²,

Kazan, Russia

Abstract. The article presents the results of a comprehensive medical and social study of 5000 patients treated in the dermatology department of the Republican clinical dermatology and venereology dispensary. The clinical picture of acute toxic-allergic reaction was determined. Obtained risk factors of toxicodermatosis. The new data obtained.

Key words: toksicodermatosis, drug allergies, acute toxic-allergic reaction, allergic reaction.

Актуальность. Проблема осложнений лекарственной терапии становится все более актуальной во всем мире. Однако, по многим причинам внимание к побочным действиям лекарств проявлялось намного меньше, нежели к их лечебным свойствам. Тем не менее, такие сведения в медицинской литературе далеко не единичны [1,3].

По имеющимся данным, распространенность побочных реакций вследствие применения лекарственных средств в различных пределах зависит от многих факторов, одним из которых является появление на рынке генерических лекарственных средств с недостаточно изученными свойствами и недоказательной эквивалентностью оригинальным препаратам, широкой и

часто некорректной рекламы лекарств, применение некачественных и фальсифицированных препаратов, состояния окружающей среды, отсутствия должной системы фармаконадзора [2].

Особое место среди побочных реакций на лекарственные препараты занимает лекарственная аллергия. Так, она встречается в стационарах различного профиля (терапевтического, хирургического, гинекологического) и составляет более 50% всех случаев лекарственной непереносимости. Аллергические реакции на лекарства выявляли у 15% больных терапевтического профиля. Около 25% вызовов бригад скорой медицинской помощи выполняется к больным лекарственной аллергией. Анафилактический шок встречается в 1 случае на 50 тыс. больных, применявших лекарства [3].

Итак, до настоящего времени остаются неизученными вопросы, касающиеся влияния медико-социальных факторов развития токсикодермии у разных слоев населения, не разработаны мероприятия организационного характера для улучшения медицинской помощи при токсикодермии[4].

Цель исследования – проанализировать медико-социальные особенности пациентов с токсикодермией для последующей разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию организационных и лечебно-профилактических мероприятий при токсикодермии.

Материалы и методы исследования.

Исследование проводилось на базе ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» МЗ РТ. Сроки наблюдения - 2013-2015гг. Предметом исследования явилось состояние здоровья больных токсикодермией. Объектами исследования были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Основным результативным признаком, фиксируемым у каждой единицы наблюдения, служило наличие острой токсико-аллергической реакции (ОТАР). В качестве единицы наблюдения нами была выбрана история болезни пролеченного больного. Выкопировка данных проводилась из учетной формы 003/у – медицинская карта стационарного больного (история болезни). Расчет необходимого числа наблюдений проводился по общепринятой формуле и составил 5000 человек. При выявлении факторов, способствующих возникновению ОТАР из общего числа исследуемых нами пациентов было сформировано 3 группы. I группа (3730 человек) – пациенты без признаков ОТАР (обратившиеся по другому профилю заболевания); II группа (1140 человек) – пациенты с легкой степенью ОТАР; III группа (130 человек) – пациенты со средне-тяжелой степенью ОТАР. Оценку исходной тяжести кожного процесса производили с применением стандартной формы оценки тяжести - Дерматологического индекса шкалы симптомов (ДИШС), который вычисляется как сумма, рассчитанная в баллах (от 0 до 3) в зависимости от выраженности следующих симптомов заболевания: зуд, отек, везикуляция, эритематозные высыпания, папулезные высыпания, наличие эскориаций, шелушения, трещин и сухости кожи.

Интерпретируя результаты ДИШС были определены степени тяжести заболевания: где 0 = симптоматика отсутствует, 1 = слабо выражена, 2 = умеренно выражена, 3 = сильно выражена. Интерпретация значений: 0-9 - лёгкая степень, 10-18 - средняя степень, 19-27 - тяжёлая степень. В ходе предпринятого нами исследования факторов риска возникновения ОТАР была заполнена карта социально-гигиенического исследования, в которую заносились результаты выкопировки данных. При этом предусматривалось изучение 26 причинных признаков и 157 градаций. Некоторые пункты анкеты заполнялись по 2 градациям, другие пункты предусматривали заполнение по 15 градациям. Статистический анализ осуществлялся с использованием программы IBM SPSS Statistics 13.

Результаты исследования и их обсуждение

При исследовании возрастно-половой структуры обратившихся пациентов были выделены следующие особенности. В дерматовенерологические учреждения по поводу ОТАР обращаются чаще женщины, чем мужчины, что связано с более высокой заболеваемостью ОТАР женщин, отмечаемой многими исследователями [1,2,3,4]. Если в I группе количество женщин оказалось несколько больше (43,4% и 56,6%), то во II группе мужчин было зафиксировано меньше 1/3 - всего 26,3%, а в III группе их было больше половины - 61,5 % ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} < 0,001$).

При изучении возрастных характеристик исследуемых пациентов можно видеть, что почти половина пациентов III группы (44,6%) были моложе 30 лет ($P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,013$). Меньше всего «молодых» пациентов было в I группе – 29,8% ($P_{I-II} = 0,001$). Пациентов в возрасте 31-40 лет в III группе, практически, не было (1,5%, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} < 0,001$). При анализе аллергологического анамнеза выяснено, что у всех пациентов I группы аллергологический анамнез отягощен не был (99,5%). Среди пациентов двух других групп аллергическая реакция встречалась в 28,9% и 7,7% случаях, соответственно ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} < 0,001$). Аллергический ринит (поллинозы) в ходе клинического осмотра был выявлен у 7,9% пациентов II группы, у пациентов I и III групп аллергический ринит не был зафиксирован ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,001$). Аллергия на биологически активные вещества (домашняя пыль, шерсть животных, клещи) была обнаружена у 7,0% пациентов II группы. В I и III группах таких пациентов выявлено не было ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,002$). Медикаментозная токсикодермия была зафиксирована у 92,3% пациентов III группы и у 38,6% - II, среди пациентов I группы таких, практически, не было (0,3%) ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} < 0,001$). При этом парентеральный путь введения зафиксирован в 5,3% во II группе и 7,7% - в III ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,258$). По этому показателю группы статистически не отличаются. У пациентов I группы пищевая аллергия выявилась только в 0,3% случаев, в то время как у пациентов двух других групп она была обнаружена, практически, в 1/3 случаев – 32,5% и 23,1%, соответственно ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,029$).

Медикаментозный анафилактический шок, анафилактоидные реакции в аллергологическом анамнезе были обнаружены у 4,4% пациентов II группы и у

7,7% (10 чел.) - III группы. Среди пациентов I группы таких не было выявлено совсем ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,094$). Можно видеть, что по этому показателю II и III группы статистически друг от друга не отличаются. Чаще всего у пациентов II и III групп фиксировалась с, примерно, одинаковой частотой аллергологическая реакция на пенициллин – в 14,9% и 15,4% случаев ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,880$). Аллергологическая реакция на другие часто применяемые лекарственные препараты в анамнезе не была зафиксирована у 100,0% пациентов I группы ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$), в то время как среди пациентов других двух групп таких было всего 48,2% и 23,1%. Аллергологическая реакция на витамины чаще всего фиксировалась у пациентов III группы – в 23,1% случаев ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} < 0,001$).

Клиническая картина токсикодермий, как правило, неспецифична и может быть представлена любым первичным элементом кожной сыпи. Количественным проявлением токсикодермии можно считать длительность (в часах, сутках) кожных высыпаний. У пациентов I группы отсутствие высыпаний было зафиксировано у 92,5%, тогда как среди пациентов II и III групп таких было всего 13,2% и 0,0%, соответственно ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} < 0,001$). Длительность высыпаний в течение 2-3 часов было выявлено, практически, только у пациентов II группы – в 27,2% случаев ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} = 0,531$, $P_{II-III} < 0,001$). Высыпания длительностью до 1 суток обнаруживалось у пациентов II и III групп с, примерно, одинаковой частотой – в 12,3% и 15,4 % случаев ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$, $P_{II-III} = 0,313$).

Выводы 1. Употребление большего количества лекарственных средств повышает риск возникновения токсикодермии. В общей сложности лекарственные вещества являлись причиной токсикодермии в 92,3% пациентов III группы, в 38,6% - II, среди пациентов I 0,3%.; 2. Наиболее часто встречаемыми первичными элементами у пациентов с ОТАР являются уртикарные, эритематозные и папулезные высыпания; 3. Выделены основные факторы развития токсикодермии – аллергия в анамнезе, женский пол, профессиональные факторы риска, а также парентеральный путь введения. Потенциальный риск отсутствует у 13,9% пациентов I группы, в то время как среди пациентов II и III групп таких, практически, нет ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$). Аллергия на другие вещества в качестве потенциального риска зафиксирована у большинства пациентов II и III групп – 84,2% и 92,3% ($P_{I-II} < 0,001$, $P_{I-III} < 0,001$).

Список литературы

1. Пухлик Б.М., Викторов А.П., Зайков С.В. Лекарственная аллергия и побочные эффекты лекарственных средств в аллергологии. / Львов: «Медицина», 2008. – 267с.
2. Колхир П.В. Доказательная аллергология – иммунология / Москва: «Практическая медицина», 2010. – 185 с.
3. Ландышев Ю.С., Доровских В.А. Лекарственная аллергия / Москва:

«Нордмедиздат», 2010. – 178 с.

4. Викторов А.П. Контроль за безопасностью лекарств при их медицинском применении // Провизор.– 2007. – №24. – С.56–59.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ

Хомова Н.А., Султанов С.А., Ташпулатова Ф.К.

Ташкентский Педиатрический медицинский институт,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Результаты лечения 100 пациентов с ТБ-ВИЧ-инфекцией в 36% случаев, выявленных СПИДА определение заболеваний, множественной лекарственной устойчивости возбудителя была выявлена в 73% больных с хроническими заболеваниями. Потребность в лечении пациентов с ТБ-ВИЧ находится под контролем бактериологических диагностики сопротивления патогена.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ.

THE FREQUENCY AND NATURE OF DRUG RESISTANCE IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS AND HIV INFECTION

Homova N. A., Sultanov S. A., Tashpulatova F. K.

Tashkent Pediatric Medical Institute,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. The results of treatment of 100 patients with TB-HIV infection in 36% of cases identified AIDS-defining diseases, multi-drug resistance of the causative agent was identified in 73% of patients with chronic disease. The need for treatment of patients with TB-HIV be under the control of bacteriological diagnostics of resistance of the pathogen.

Key words: tuberculosis, HIV.

Цель работы: Изучить частоту и характер лекарственной устойчивости к химиопрепаратам у больных сочетанной инфекцией туберкулез и ВИЧ.

Материал и методы исследования.

Для решения поставленных задач проведено наблюдение и комплексное обследование 100 больных туберкулезом легких. Из общего числа обследованных мужчин было 66 (66%), женщин – 34 (34%) в возрасте от 17 до 65 лет. Среди обследованных чаще встречались женщины фертильного возраста от 21 года до 40 лет больных. Туберкулез выявлен впервые, а затем ВИЧ инфекция у 12% больных, у большинства 88% больных туберкулез выявлен после выявления ВИЧ инфекции. Из всего обследованных больных всего 24 (24%) поступили с данными о количестве CD - 4 клеток, из них у 15 (62,5±9,8%) CD колебался от 7 до 100 клеток/мкл, у 6 (25%) - от 100 до 200 клеток/мкл и у 3 (12,5%) больных -от 200 до 500 клеток/мкл. Из 24 больных только 11 (45,8%) получали АРВ терапию, 2(8,3%) больных прекратили прием АРВТ до поступления в стационар. Среди клинических форм туберкулеза у впервые выявленных больных преобладал инфильтративный

туберкулез легких ($45 \pm 5,0\%$) и диссеминированный туберкулез легких ($20 \pm 4,4\%$). У ранее леченных диссеминированный туберкулез встречался у $24,7 \pm 4,7\%$ больных, инфильтративный и фиброзно-кавернозный ТЛ установлен у $39,4 \pm 4,6\%$ и $16,5 \pm 3,5\%$ соответственно. Деструкция легочной ткани выявлено у $57,4 \pm 5,0\%$ впервые выявленных больных и у $66,0 \pm 4,5\%$ ранее леченых. Выделение МБТ установлено у $47,5 \pm 5,0\%$ впервые выявленных и $52,3 \pm 4,7\%$ ранее леченых пациентов. Основные варианты ВИЧ инфекции соответствовали 2,3 и 4 стадиям, согласно классификации ВОЗ. Из 100 ТЛ+ВИЧ больных у 36 ($36 \pm 2,5\%$) выявлены СПИД- индикаторные заболевания: у 32 ($88,0 \pm 5,4\%$) отмечено наличие проявлений кандидоза, у 4 ($11 \pm 5,4\%$) - явления герпеса и саркомы Капоши.

У $88,7 \pm 1,7\%$ больных давность заболевания составила до 1-го года, у $3,6 \pm 1,0\%$ - до 2-х лет, у $1,8 \pm 0,7\%$ - до 3-х лет, у $3,8 \pm 1,0\%$ - до 5-ти лет, у $2,1 \pm 0,78\%$ более 5 лет. У $29,8 \pm 3,1\%$ больных ВИЧ выявлен после поступления в противотуберкулезный стационар, в тоже время большинство $70,2 \pm 3,1\%$ пациентов до выявления туберкулеза легких состояли на диспансерном учете в СПИД центре. Сопутствующие заболевания выявлены у $70,0 \pm 2,4\%$ больных: чаще встречалась анемия ($80 \pm 5,3\%$). Все больные в клинике прошли клинико-лабораторное обследование, которое включало анализ мокроты на наличие микобактерий туберкулеза методом бактериоскопии и посев ее в питательные среды. У всех больных определяли чувствительность к химиопрепаратам методом пропорции по Canetti и GeneXpert.

Результаты: В процессе комплексного обследования из 100 больных с ТБ и ВИЧ инфекцией в динамике лекарственная устойчивость выявлена у 40 ($40 \pm 4,5\%$) больных. Среди пациентов с ЛУ преобладали первичные больные 25 ($62 \pm 4,3\%$), ранее леченные составили 15 ($38 \pm 4,3\%$). Установлено, что среди больных с ТБ и ВИЧ преобладали мужчины как среди первичных больных так и среди ранее леченых пациентов. Исходя из поставленных задач, нами было изучено частота и характер лекарственной устойчивости у больных ЛУТЛ и ВИЧ инфекцией. Монорезистентность среди впервые выявленных больных отмечено у 28% к изониазиду и у 32% рифампицину. Одновременно к двум препаратам изониазиду и рифампицину, так называемая мультирезистентная форма ЛУТЛ выявлено в этой группе у 40% больных. В тоже время, среди ранее леченных монорезистентность отмечено у 6% к изониазиду. Одновременно к двум препаратам изониазиду и рифампицину, выявлено в этой группе у 73% больного.

Вывод:

Таким образом, ЛУ является серьезной проблемой у больных с ТБ-ВИЧ инфекцией. Каждому пациенту, особенно у которого имеется сочетание ТБ-ВИЧ необходимо при наличии респираторных симптомов провести молекулярно генетический метод исследования мокроты на МБТ для выявления характера ЛУ. По характеру ЛУ у больных ТБ-ВИЧ преобладают мультирезистентные формы.

Список литературы

1. Алексеева Л.П. Особенности выявления, клинического течения и лечения больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/ Л.П. Алексеева: Автореф. дис. . канд. мед. наук. Москва, 2008. - 49 с.
2. Бабаева И.Ю., Демихова О.В., Кравченко А.В. Диссеминированный туберкулез легких у больных ВИЧ-инфекцией. Москва - НБЮ-ТЕРРА - 2010.-164 с.
3. Батыров Ф.А. Лечебно-диагностическая помощь больным туберкулезом с ВИЧ-инфекцией в условиях многопрофильной специализированной больницы. //Автореферат диссертации д-ра мед. наук. М. - 2005.
4. Долгова Е.А., Альварес Фигероа М.В., Лобашева Г.П. Определение лекарственной устойчивости к рифампицину у больных туберкулезом, находящихся на стадии вторичных заболеваний ВИЧ инфекции. //Туберкулез и болезни легких 2011. №4. С.129
5. Какорина Е.П., Фролова О.П., Шинкарева И.Г. Проблемы туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в России // Туберкулез в России год 2007: Материалы VIII Российского съезда фтизиатров. М., 2007. - С. 366-367.
6. Парпиева Н.Н, Белоцерковец В.Г., Тилляшайхов М.Н.Э., Тураев Л.Т. Характеристика лекарственной устойчивости у ВИЧ инфицированных // Туберкулез и болезни легких. — 2011. —№5. С. 101 -102.

РЕЦИДИВ САРКОИДОЗА, КАК КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Черников А.Ю.¹, Землянских Л.Г.²

ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»¹

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»²

Курск, России

Аннотация. Обобщение богатый клинический опыт, предоставляемые пациентам с рецидивирующей саркоидоза позволяет различать три типа повторов. Тип А характеризуется большей частью расширения intrathoracal лимфатических узлов, сезонная зависимость, доброкачественный ответ тактики не лекарства динамического диспансерного наблюдения. Тип В был отмечен обязательным участием лёгочной ткани, значительное дыхательная недостаточность с ограничением существующей, частая необходимость кортикостероидов. Тип С характеризуется extrathoracal волнениями, формирование остаточных изменений, также довольно более часто устойчивы к стандартной терапии. Выявление типов рецидивирования имеет практическую ценность за счет оптимизации расследования и план лечения во время обострения саркоидоз.

The Recurrency Of Sarcoidosis As A Clinical Problem

A.U. Chernikov., L.G. Zemlyanskih

Regional clinical protivotuberkuljoznyj clinic ¹,

Kursk State Medical University ²,

Kursk, Russia

Abstract. The generalization of the abundant clinical experience provided by the patients with recurrent sarcoidosis has enabled to distinguish three types of the recurrences. Type A is characterized by the predominant enlargement of the intrathoracal lymph nodes, seasonal dependence, benign response to the tactics of the non-medication dynamic dispensary observation. Type B was marked by an obligatory involvement of the pulmonal tissue, significant respiratory insufficiency with a restriction prevailing, frequent necessity of corticosteroids. Type C was characterized by extrathoracal disturbances, formation of the residual changes, also it was quite more frequently resistant to a standard therapy. Revealing the types of the recurrences possesses a practical value due to optimization of the investigation and treatment plan during the exacerbation of sarcoidosis.

Рецидив саркоидоза — это возобновление клинико-рентгенологических признаков активного процесса после регрессии, достигнутой в результате спонтанной инволюции или предшествующего лечения [3, 237]. Многие авторы называют «контрольной точкой» рецидива срок 4-6 месяцев после окончания лечения [4, 368], однако существует мнение, что в течение года после прекращения терапии возобновление активности саркоидоза следует считать

обострением, так как оно явилось следствием гипердиагностики регрессии первоначального процесса [3, 194]. Частота рецидивов варьирует от 17,2% до 28,1% у разных исследователей [1, 4-6; 5, 3-5]. При этом если первичное выявление саркоидоза, включая гистологическое подтверждение и подбор терапии, происходит в крупных диагностических и клинических центрах, то основное бремя выявления и лечения рецидива в основном ложится на плечи поликлинического терапевта или пульмонолога. Трудность последней задачи заключается в том, что критерии прогнозирования, верификации и терапии рецидива не систематизированы в руководствах и практических рекомендациях, а данные литературы подчас противоречат друг другу. Так, поиски генетической детерминанты рецидива не привели биологов к единому мнению, хотя были установлены статистически значимые ассоциации G аллели в локусе rs1891467 в TGF- β 2 и острого течения саркоидоза, однонуклеотидного полиморфизма TGF- β 3 (rs3917200) и фиброза лёгких, гаплотипа DRB*04-DQB1*0301 и риска развития манифестации саркоидоза [7, 207-215; 8,169]. Профессором Б.И.Дауровым, на материале 616 больных с реактивацией процесса были установлены следующие факторы риска развития рецидива: женский пол, возраст более 40 лет, генерализованный процесс, наличие тяжёлых сопутствующих заболеваний, большие остаточные изменения, вредные условия труда, короткий менее 4 месяцев курс гормонотерапии, гипотиреоз, низкий уровень кортизола (менее 200 н/моль) [3, 238]. Выявление данных факторов не объясняло причины рецидивирующего течения саркоидоза, но направляло внимание специалиста на отдельные категории пациентов в процессе определения срока диспансерного наблюдения и кратности обследования. В последствие бразильские учёные предложили выделять рецидив, как отдельный фенотип болезни, однако это не повлекло за собой выявление характерных особенностей течения процесса, имеющих значение для подбора тактики лечения [9, 34-43]. Предлагаемые принципы терапии весьма вариабельны: использование малых доз кортикостероидов, назначение больших доз на длительный срок, замена кортикостероидов на цитостатики или производные аминохинолина [1, 6-8; 3, 222-236; 4, 349-360]. Разброс тактических схем во многом объясняется отсутствием типизации клинических проявлений рецидива [2, 10-12; 6, 54-55]. Таким образом, скудные литературные данные о прогнозировании, клинических проявлениях, течении и лечении рецидива саркоидоза в поликлинической практике подтолкнули нас к обобщению собственного опыта решения данной проблемы.

Цель настоящего исследования: изучить и обобщить собственный опыт выявления и лечения рецидива саркоидоза в амбулаторной практике.

Материалы и методы. Анализировались клиничко-рентгенологические, лабораторные, инструментальные данные в амбулаторных картах больных саркоидозом, находящихся под диспансерным наблюдением на сроке от 2 до 10 лет. Всем пациентам проводились: субъективное и объективное обследование, обзорная рентгенография и компьютерная томография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование периферических лимфатических узлов и

внутренних органов, исследование функции внешнего дыхания, электрокардиография, общие анализы крови и мочи. Все исследования были рекомендованы для обследования больных саркоидозом соглашением Европейского респираторного общества (1999) и согласительными клиническими рекомендациями Российского респираторного общества (2014). Обследование назначалось с периодичностью 1 раз в 4-6 месяцев или при самообращении пациента с жалобами, подозрительными на рецидив заболевания. Использовалась классификация ЦНИИТ (1982), во многом соответствующая МКБ-10. В случае необходимости назначались безмедикаментозная тактика или рекомендованные вышеуказанными методическими документами препараты. Дизайн исследования: ретроспективное, сравнительное. Критерии включения в исследование: 1) изначальное гистологическое подтверждение саркоидоза; 2) согласие пациента. Критерии исключения: 1) отказ пациента от проведения обследования; 2) категорический отказ от амбулаторного диспансерного наблюдения. Все пациенты давали письменное согласие в амбулаторной карте на проведение обследования и лечения, а также письменное согласие на использование полученных данных в настоящем исследовании. Обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 16.0. Использовались следующие статистические величины: вероятность события P , 85%-й доверительный интервал для вероятности события 1β ; критерий z для сравнения качественных переменных (аналог t -критерия Стьюдента); кластерный анализ (метод К-средних); критерий Фишера-Снедекера (F), расчёт которого осуществлялся на основе методики ANOVA для биномиальных переменных; уровень значимости p (статистически значимым считался $p < 0,05$).

Результаты и обсуждение. Под нашим наблюдением находилось 178 больных с рецидивом морфологически подтверждённого саркоидоза, выявленных в Курске с 1997 по 2014 годы. Из них женщины – 125 (70,2%), мужчины – 53 (29,8%). Средний возраст 42 ± 3 года.

В медицинской литературе принято считать контрольной точкой рецидива – 4-6 месяц после прекращения терапии. Мы относили к рецидивам саркоидоза те случаи прогрессирования процесса, которые возникли через 6 месяцев и более после окончания лечения или динамического наблюдения. Большая часть рецидивов была выявлена при самообращении пациента – 126 ($70,7 \pm 4,9\%$), при контрольном осмотре – 52 ($29,3 \pm 4,9\%$). При первом выявлении саркоидоза у этих пациентов самообращение установлено в меньшем количестве случаев – 83 ($46,7 \pm 5,3\%$) ($p < 0,05$). Многие больные сами распознают предвестники реактивации своего заболевания и своевременно обращаются к врачу. Чаще всего отмечают появление грануляций в области старых рубцов, возникновение новых кожных элементов (в основном – бляшек), усиление одышки, болевые ощущения в грудной клетке неопределённой локализации, похудание, немотивированное снижение работоспособности и быстрое развитие усталости. Значительно реже встречаются другие симптомы, характерные для первичного выявления саркоидоза, а именно узловатая эритема, субфебрильная лихорадка,

кашель. Анализируя клинико-рентгенологические данные, варианты терапии и течения заболевания с помощью кластерного анализа (метод К-средних) мы выделили 3 типа рецидива саркоидоза: тип А – только увеличение ВГЛУ (1 кластер), тип В – появление очагов и конгломератов в лёгких (2 кластер), тип С – только внелёгочные проявления (3 кластер).

Тип рецидива А характеризуется увеличением внутригрудных лимфатических узлов. Чаще встречается у женщин – 48 (77,4±7,6%). При первичном выявлении встречался саркоидоз ВГЛУ – 51 (82,3±6,9%), саркоидоз ВГЛУ и лёгких – 11 (17,7±6,9%). У части пациентов рецидив был уже не первым, при этом выделялась группа пациентов, для которых появление рецидива типа А являлось привычным (2-5 эпизодов) – 13 (20,9±7,5%). В последнем случае с каждым новым эпизодом локализация поражений не отличалась вариабельностью. Наибольшее количество случаев выявлено в период с января по апрель – 39 (62,9±8,8%), то есть имеет место выраженная сезонность появления рецидивов типа А в период холодной погоды и следующим за ним потеплением. При профилактическом осмотре выявлено – 15 (24,2±7,8%), при самообращении – 47 (75,8±7,8%). Основные жалобы: появление предвестников рецидива – 43 (69,4±8,3%), нарастание общего недомогания – 39 (62,9±8,8%), наличие узловой эритемы – 18 (29,0±8,3%). При лучевой визуализации отмечалось увеличение бронхопульмональных лимфоузлов – 59 (95,1±3,9%), трахеобронхиальных – 42 (67,7±8,5%), паратрахеальных – 40 (64,5±8,8%). При этом после лечения впервые выявленной формы саркоидоза у этих пациентов сохранялись увеличенными внутригрудные лимфоузлы более 10 мм в диаметре – 17 (27,4±8,2%), имел место пневмосклероз – 30 (48,3±9,1%), грубые фиброзные изменения и деформация бронха – 7 (11,3±5,8%). При исследовании функции внешнего дыхания чаще встречалось незначительное снижение обструктивных показателей (колебания ОВФ1 в пределах 15%) – 9 (14,5±6,9%). Лабораторные показатели не отклонялись от нормальных значений. При наблюдении пациентов с типом рецидива А хорошо зарекомендовала себя безмедикаментозная тактика – 39 (62,9±8,8%), в случае её неэффективности применялись кортикостероиды в небольших дозах, препараты аминохинолина. Таким образом, типу рецидива саркоидоза А характерны определённые рентгенологические особенности, сезонность проявления, благоприятный ответ на безмедикаментозную тактику динамического диспансерного наблюдения.

Тип рецидива В характеризовался появлением очаговых изменений – 74 (81,3±5,9%), реже – инфильтративных изменений в лёгочной ткани – 17 (18,7±2,8%), при этом увеличение размеров внутригрудных лимфоузлов имело место лишь у 37 (40,7±7,3%). Большие остаточные изменения первоначального процесса наблюдали у 38 (41,8±7,9%). Среди пациентов преобладали женщины – 61 (67,0±7,1%), однако частота проявления у мужчин была достоверно выше, чем при рецидиве типа А ($p<0,05$). При первичном выявлении преобладал саркоидоз ВГЛУ и лёгких – 87 (95,6±3,0%), но встречался и саркоидоз ВГЛУ – 4 (4,4±3,0%). Доля пациентов, для которых этот

рецидив был уже не первым, значительно превышала по численности аналогичную группу при рецидиве А – 41 (45,1±7,5%) ($p<0,05$), хотя следует отметить, что при рецидиве типа В с каждым новым эпизодом в процесс вовлекались и новые участки лёгких. При профилактическом осмотре выявлено – 37 (40,7±7,3%), при самообращении – 54 (59,3±7,3%). Все случаи выявлялись равномерно в течение года, не создавая выраженной сезонности выявления. Основные жалобы: проявления дыхательной недостаточности (одышка от 3 до 5 баллов по шкале Борга) – 69 (75,8±6,5%), реже - появление предвестников рецидива – 31 (34,1±7,2%), узловатой эритемы – 6 (6,5±3,7%), нарастание общего недомогания – 24 (26,4±6,6%). Встречались внеторакальные проявления саркоидоза: поражение периферических лимфоузлов – 8 (8,8±4,3%), селезёнки – 4 (4,4±3,0%), кожи – 1 (1,1±1,4%), глаз – 1 (1,1±1,4%), сердца – 1 (1,1±1,4%). При исследовании функции внешнего дыхания чаще встречались рестриктивные нарушения в пределах дыхательной недостаточности I – II степени – 65 (71,4±6,8%), обструктивные нарушения – 17 (18,7±5,9%). При лабораторном исследовании имели место повышение острофазовых показателей крови и СОЭ – 85 (93,4±3,7%), лимфопения – 5 (5,5±3,5%), лимфоцитоз – 36 (39,6±7,3%), нейтрофилёз со сдвигом влево – 27 (29,7±6,9%), моноцитоз – 12 (13,2±5,0%), повышения уровня кальция крови – 10 (11,0±4,7%). При наблюдении пациентов с типом рецидива В безмедикаментозная тактика была эффективна только у 6 (6,6±3,7%), использовались кортикостероиды в первоначальной дозировке 0,5 мг/кг курсом не менее 6 месяцев – 80 (87,9±4,9%), а также производные аминохинолина – 5 (5,5±3,5%). Следовательно, типу рецидива саркоидоза В свойственны обязательное вовлечение в процесс лёгочной ткани, наличие дыхательной недостаточности с преобладанием рестрикции, частая необходимость в назначении кортикостероидов.

Тип рецидива С характеризовался появлением внеторакальных поражений саркоидоза без признаков прогрессирования в лёгких и внутригрудных лимфоузлах. В основном диагностировались кожные проявления – 15 (60±14,1%), и вовлечение в процесс периферических лимфоузлов – 9 (36±13,8%). Имел место 1 верифицированный случай поражения почек с летальным исходом. Этот тип рецидива значительно преобладал у женщин – 16 (64±13,8%). Выявлялся только при самообращении. При первичном выявлении встречался лишь саркоидоз ВГЛУ и лёгких. У подавляющего большинства пациентов случай рецидива был не первый, до этого были зафиксированы эпизоды рецидивов типа В – 20 (80±11,5%). Жалобы пациентов характеризовались симптоматикой со стороны поражённого органа, но также отмечены общая слабость – 4 (16±10,5%), одышка – 11 (44±14,2%). При лучевой визуализации определялись чаще выраженные остаточные изменения первоначального процесса (выраженный фиброз доли или сегмента, пакет стабильно увеличенных внутригрудных лимфоузлов преимущественно бронхопульмональной или трахеобронхиальной локализации) – 18 (72±2,2%), реже незначительные остаточные изменения – 7 (28±2,2%). При исследовании

функции внешнего дыхания рестриктивные нарушения установлены – 18 ($72\pm 2,2\%$), обструктивные – 5 ($20\pm 11,5\%$). Изменения лабораторных показателей не носили какой-либо специфический оттенок. При поражении почек имел место подъём креатинина крови в 4-5 раз от нормы. Назначение кортикостероидов в дозе 1 мг/кг веса приносило улучшение в 10 ($40\pm 14,1\%$) случаях. В анамнезе у 25% пациентов имелась кортикостероидрезистентность при лечении предыдущих случаев рецидива саркоидоза. Назначение производных аминохинолина приносило улучшение у 66,7% пациентов с кожной локализацией процесса. Таким образом, тип рецидива С характеризовался появлением внеторакальных поражений, имел место у пациентов с склонностью к хроническому течению процесса и формированию выраженных остаточных изменений, с большой частотой не поддавался общепринятой терапии.

Заключение. Обобщение длительного опыта работы с больными страдающими рецидивом саркоидоза привело к типизации рецидивов этого загадочного заболевания. Установлены три типа рецидивов саркоидоза. Тип А характеризуется преимущественным увеличением внутригрудных лимфоузлов, сезонностью проявлений, благоприятным ответом на безмедикаментозную тактику динамического диспансерного наблюдения. Тип В отличался обязательным вовлечением в патологический процесс лёгочной ткани, наличием выраженной дыхательной недостаточности с преобладанием рестрикции, частой необходимостью назначения кортикостероидов. Тип С характеризовался появлением внеторакальных поражений, имел место у пациентов с склонностью к хроническому течению процесса и формированию выраженных остаточных изменений, с большой частотой не поддавался общепринятой терапии. Выделение типов рецидива в практической деятельности способствует оптимизации объёма обследований и тактики лечения при активизации саркоидоза.

Список литературы

1. Борисов С.Е. Саркоидоз как биологическая и медицинская проблема//Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. – 2006. – № 4. – с.4–8.
2. Визель И.Ю., Шмелёв Е.И., Баранова О.П. и др. Состояние больных саркоидозом исходно и 10 лет спустя при различной тактике их ведения (мультицентровый анализ)//Пульмонология. – 2012. - №4. – с.10-12.
3. Дауров Б.И. Саркоидоз. М.: Оверлей, 2006. – с.193-209.
4. Саркоидоз /Под ред. А.А.Визеля. – М.: Атмосфера, 2010. – с. 349-359.
5. Черников А.Ю., Дауров Б.И. Эффективность диспансеризации больных саркоидозом в условиях общей лечебной сети // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. – 2007. – №8. – с.3-5.
6. Черников А.Ю., Землянских Л.Г. Фенотипы саркоидоза // Пульмонология. – 2012. - №5. – с.53-55.

7. Hiroe S., Felix A., Tarig A. et al. Sarcoidosis HLA class II genotyping distinguishes differences of clinical phenotype across ethnic groups // *Chest.* – 2005. – №128. – p.207-215.
8. Pabst S., Fränken T., Schönau J. et al. Transforming growth factor- β gene polymorphisms in different phenotypes of sarcoidosis // *Eur. Respir. J.* – 2011. - №38. – p.169.
9. Rodrigues S., Rocha N., Lima M. et al. Factor analysis of sarcoidosis phenotypes at two referral centers in Brazil // *Sarcoidosis Vasc. Diffuse Lung Dis.* – 2011. –№ 28. – p. 34-43.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шевень М.П.¹, Перевозчиков Б.Г.¹, Провоторов В.Я.¹, Эфендиева Н.Н.²

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»¹

Курск, России

**БУЗ Орловской Области "Орловский Областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД И Инфекционными Заболеваниями"²
Орел, Россия**

Аннотация. Проведен анализ развития эпидемического процесса при ВИЧ - инфекции по данным наблюдения населения региона на протяжении всего периода регистрации заболевания. С использованием методов эпидемиологического анализа, изучения условий и факторов риска, влияющих на формирования эпидемической ситуации. Ведущий путь заражения остается гематогенный, связанный с употреблением наркотиков, но при этом увеличивается доля полового пути передачи. Наиболее уязвимой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В проведении противоэпидемических мероприятий приоритетное значение должно иметь своевременное выявление источника инфекции – больного человека, а из групп риска среди населения необходимо выявление и наблюдение, прежде всего контактирующих с ВИЧ - инфицированным и употребляющих инъекционные наркотики.

Ключевые слова: ВИЧ - инфекция, СПИД, потребляющие инъекционные наркотики.

Features of the epidemic process of HIV-infection in the Oryol region.

Sheven M.P., Perevozchikov B.G., Provotorov V.J., N. Efendiyev N.N.

Kursk State Medical University ¹,

Kursk, Russia

**BOOZE of the Oryol region "Oryol regional center on preventive measures
and struggle with AIDS and infectious diseases "²**

Orel, Russia

Abstract. The analysis of development of epidemic process of HIV infection according to the observations of the population of the region throughout the registration period of the disease. Using the methods of epidemiological analysis, the study of conditions and risk factors that affect the formation of the epidemiological situation. The leading route of infection hematogenous remains associated with drug use, but this increases the share of sexual transmission. The most endangered species group on HIV infection remain young people aged 18 to 29 years. In conducting anti-epidemic measures priority must be the timely identification of the source of

infection – a sick man, and populations at risk need to identify and monitoring, especially in contact with HIV positive people and injecting drug users.

Key words: HIV, AIDS who inject drugs.

Несмотря на достигнутые успехи практического здравоохранения в вопросах выявления и профилактике ВИЧ-инфекции, проблема остаются актуальной как в целом для РФ, так и в для ее субъектов.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Орле и Орловской области формируется под влиянием неоднородных социально-экономических факторов. В создавшихся условиях приоритетное значение приобретают тщательное выявление и обследование лиц, входящих в группу риска и характер, и объем проведенных противоэпидемических мероприятий в них. Зарегистрированы случаи, когда человек инфицируется по независимым от него причинам (внутрибольничное инфицирование или инфицирование ребенка от матери), при этом в каждом регионе необходимо определять их приоритетность заражения при проведении противоэпидемических мероприятий.[1,2,3]

Целью исследования является изучения основных характеристик течения эпидемического процесса на уровне субъекта РФ Орловская область и корректировка, и детализация характера и объема противоэпидемических мероприятий с учетом определенных факторов риска.

В работе использовались методы эпидемиологической диагностики: отчетные материалы областной противоэпидемической комиссии "Об организации диагностических и профилактических мероприятий по разделу ВИЧ/СПИД, а также противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи в Орловской области"; методы ретроспективного, оперативного эпидемиологического анализ, эпидемиологического обследования; определения факторов риска и другие методы математического моделирования.

Собственно исследование: Орловская область относится к регионам со значительным уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией населения, но при этом показатели заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией ниже федеральных. По состоянию на 01.07.16 года среди местных жителей в Орловской области зарегистрировано 2347 случаев ВИЧ-инфекции, в т. ч. за 6 мес. 2016 г. – 163 случая (за 6 мес. 2015 г. – 117 случаев). Рост первичной выявляемости ВИЧ-инфекции в 2016 г. составил 39,3%.

Ведущим путём заражения ВИЧ до 2002 г. был преимущественно парентеральный, связанный с употреблением инъекционных наркотиков, затем стал последовательно увеличиваться половой путь передачи. Начиная с 2013 г. доля гетеросексуального пути передачи стала вновь уменьшаться и снизилась на 37% (2012 г. – 70,3%, 2015 г. - 44,3%).

При этом отмечается увеличение в 2,7 раза в структуре путей передачи доли парентерального пути, связанного с употреблением наркотиков, заражения ВИЧ (2012г. – 17,1%, 2015г. – 46,7%). По данным 6 месяцев 2016 г. на долю парентерального пути передачи ВИЧ-инфекции приходится 44,2%.

Меняющиеся тенденции наркопотребления привели к развитию нового подъема ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в Орловской области.

Наиболее уязвимой группой по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет составляющие 52,7% от общего числа выявленных на 01.07.2016 г.

Среди общего числа ВИЧ-инфицированных мужчины в 2016 г. составляют 63,8%, женщины – 36,2%. На фоне интенсификации парентерального пути, связанного с употреблением наркотиков, инфицирования ВИЧ среди впервые выявленных, доля женщин в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 10,8%.

За весь период наблюдения умерли 484 на 100 тыс. населения ВИЧ - инфицированных, в том числе на стадии ВИЧ-инфекции – 370 на 100 тыс. населения, на стадии СПИДа – 114 на 100 тыс. населения.

Отрицательной тенденцией является рост на 60,3% доли ВИЧ-инфицированных среди больных активным туберкулезом (2012 г. – 5,3%, 2015 г. – 8,5%), что требует оптимизации совместных усилий учреждений здравоохранения области по ранней диагностике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных и своевременному назначению средств химиопрофилактики туберкулеза.

Тревожной тенденцией в развитии эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Орловской области остается вовлечение в эпидемию женщин и детей. По данным на 01.07.16 г. родилось на территории Орловской области 353 ребенка, в т. ч в 2016 г. - 11. Частота перинатального пути передачи в области составляет 2,8 % (в РФ по итогам 2014 г. – 3,0%).

Средне областной показатель охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию по итогам 2015 г. составил 17,6% от всех обследований в области и является недостаточным для раннего выявления ВИЧ-инфекции, особенно в группах риска, что способствует росту выявляемости ВИЧ-инфекции на более поздних стадиях заболевания, и как следствие, увеличение смертности и летальности ВИЧ-инфицированных.

Негативной тенденцией является ежегодное снижение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию групп, уязвимых к заражению ВИЧ (ПИН, лица асоциального поведения с инфекциями, передаваемыми половым путем, работники коммерческого секса), что препятствует своевременному выявлению ВИЧ-инфекции среди данных категорий населения, являющихся «двигателями» эпидпроцесса.

В последние годы в Российской Федерации вновь актуализировалась проблема заражения ВИЧ-инфекцией пациентов в результате оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. В Орловской области 1 случай внутрибольничного инфицирования ВИЧ был зарегистрирован в 2008 г. при переливании компонента крови от донора, находящегося на момент сдачи крови в периоде серонегативного окна по ВИЧ-инфекции. Это требует постоянной ВИЧ настороженности и принятия дополнительных

организационных и противоэпидемических мероприятий в службе переливания крови.

Выводы. Орловская область относится к регионам со значительным уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией населения. Наиболее выраженными факторами риска развития эпидемического процесса и формирования эпидемической ситуации в регионе являются: употребление инъекционных наркотиков, незащищенный половой акт, гомосексуализм, беспорядочные половые связи, переливание крови, а так же заражение плода от матери.

Следовательно, приоритетное значение в проведении противоэпидемических мероприятий должно иметь своевременное выявление источников инфекции – больных людей, из групп риска среди населения региона.

Список литературы

1. Белоусова, А. К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии [Текст] : учеб. / А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева ; под ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2013 г., 20с. : ил. - (Медицина для Вас). - Библиогр.: с. 304-назв.).
2. ВИЧ-инфекция и СПИД [Текст] : клин. рек. / гл. ред. В. В. Покровский ; Федер. науч. - метод. центр по профилактике и борьбе со СПИДом. - М. : ГЕОТАР - Медиа, 2007г., 20с. : табл. - Библиогр. в конце глав. - Алф. указ.: с. 114.
3. Социально значимые заболевания населения России в 2014 году [Текст] : стат. мат. / Министерство здравоохранения Российской Федерации Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России - М. : [б. и.], 20с.
4. Решение областной противоэпидемической комиссии "Об организации диагностических и профилактических мероприятий по разделу ВИЧ/СПИД, а также противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи в Орловской области" от 23 августа 2016 года.
5. СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности) и возбудители паразитарных болезней"
6. МУ 1.3.2569-09 "Организация работы при исследованиях методом ПЦР материала, инфицированного патогенными биологическими агентами 3-4 групп патогенности".
7. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
8. МУ 3.1.3342-16 " Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией".

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Шевченко О.С.², Потейко П.И.¹

**Харьковский национальный медицинский университет²,
Харьковская академия последиplomного образования¹,
Харьков, Украина**

Аннотация. Сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулеза в Харьковской области в 2014 году эпидемиологический анализ показывает, что число мужчин преобладает по сравнению с женщинами в структуре сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулеза. Воцарилась туберкулеза у ВИЧ инфицированных лиц является туберкулез легких (73,4%). Туберкулез является основной вторичной болезни с ВИЧ инфекцией и основной причиной смерти в стадии СПИДА. Это требует взаимной координации усилий фтизиатрии и борьбе со СПИДОМ Услуги для времени профилактики и диагностики туберкулеза у ВИЧ инфицированных лиц.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ / СПИД, эпидемиология.

HIV-associated tuberculosis: epidemiology indexes in the Kharkov region.

Shevchenko O.S., Poteiko P.I.

Kharkiv National Medical University ²,
Kharkiv Academy of postdiploma education ¹,
Kharkov, Ukraine

Abstract. Co-infection tuberculosis/HIV in Kharkov region in 2014 epidemiological analysis shows that the number of males prevails comparing with females in the structure of co-infection tuberculosis/HIV. Prevailed site of tuberculosis in HIV-infected persons is pulmonary tuberculosis (73,4%). Tuberculosis is a main secondary disease with HIV-infection and the main cause of death in AIDS stage. This demands mutual coordinated efforts of Phthisiology and anti AIDS services for in time prophylaxis and diagnosis of tuberculosis in HIV-infected persons.

Key words: tuberculosis, HIV/ AIDS, epidemiology.

Распространение ВИЧ - инфекции внесло радикальное изменение в эпидемию туберкулеза во многих странах мира, в том числе и на Украине [3]. Наиболее распространенным СПИД - индикаторным заболеванием на Украине, как и раньше, остается туберкулез (ТБ). По статистическим данным, в 2014 г. туберкулез выявлен в 49,3% случаях из 9844 новых случаев СПИД и в 44,1% среди 33279 больных СПИД, которые находятся на учете службы СПИД, состоянием на 01.01.2015 г. [2].

В 2014 г. часть лиц с впервые диагностированным туберкулезом (ВДТБ) среди новых случаев СПИД остается высокой и имеет тенденцию к увеличению - 74,4% против 71,1% в 2013 году. Такое состояние нуждается в активном проведении скрининга ТБ у ВИЧ-инфицированных пациентов, которые находятся в поле зрения медицинских работников, что будет способствовать раннему выявлению туберкулеза, своевременному назначению лечения, уменьшению смертности от ТБ/ВИЧ и эффективной профилактике распространения туберкулеза среди общей популяции. Независимо от значительного прироста количества пациентов, которые получают антиретровирусную терапию (АРТ), - с 3056 лиц в 2005 году до 64405 лиц в 2014 году, темпы расширения программы АРТ отстают от темпов увеличения количества лиц, которые нуждаются в лечении [2].

Доказано, что риск туберкулеза значительно повышен уже в первый же год после сероконверсии к ВИЧ [4,5]. Причем, туберкулез может развиваться на любой стадии, при любом числе CD4 лимфоцитов, в отличие от оппортунистических инфекций. Так, больше 50% случаев туберкулеза легких возникают у пациентов с числом CD4 лимфоцитов больше 200 кл/мкл [3].

Основной причиной смерти у больных СПИД остается туберкулез. В 2014 г. часть летальных случаев, которые обусловлены сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ, среди общего количества умерших от СПИД составила 63,7% (в 2013 г. - 62,7%)). По статистическим данным, из 5014 лиц, которые нуждались в АРТ и умерли в 2014 г., 2316 лиц получали АРТ на момент смерти - 46,2% против 38,0% в 2013г., из них для 833 лиц антиретровирусное лечение длилось 12 месяцев и больше (36,0%) [2].

Целью работы было проанализировать эпидемические показатели по ВИЧ-ассоциированному туберкулезу (ВИЧ/ТБ) в Харьковской области за 2014 год. Нами проанализированы 64 истории болезней больных ВИЧ/ТБ впервые диагностированных в 2014 г. по Харьковской области, среди них в 68% случаев мужчины, средний возраст 40,3 (28 - 62) лет. Основным периодом клинических проявлений ВИЧ/ТБ приходится на средний возраст (25-44 года) как среди лиц мужского, так и женского пола. Чаще всего ВИЧ-инфекция и туберкулез были выявлены одновременно - в 59,2% случаев, дальше существенный процент приходится на первые два года после диагностики ВИЧ - 14,1% случаев, и после 8 лет заболевания - в 10,9% случаев. Мы наблюдаем два всплеска эпидемических показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ: первый - первые два года и второй - 8 и больше лет после диагностики ВИЧ.

Основной путь выявления туберкулеза органов дыхания на фоне ВИЧ был по обращению и составил 78,1% случаев, посмертно - один пациент (1,6%). Острое начало отмечено у 32% больных, синдром интоксикации характеризовался лихорадкой, с повышением температуры до фебрильных цифр, потливостью, которая сопровождалась прогрессирующей потерей массы тела в среднем на 5-8 кг за 2-3 месяца. Хронические вирусные гепатиты регистрировались в 40,7% случаев.

Преобладающей локализацией туберкулеза у лиц с ВИЧ/ТБ был туберкулез легких (73,4%). По клиническим формам: инфильтративный туберкулез (56,2%), диссеминированный туберкулез (14,0%), казеозная пневмония и очаговый туберкулез по одному случаю. Милиарный туберкулез диагностирован у 11 больных (17,1%), среди них милиарный туберкулез множественной локализации - у 2 больных, один из которых, случай посмертного гистологического подтверждения диагноза. Летальный исход зафиксирован у 3 пациентов (4,7%) милиарным туберкулезом, среди них двое пациентов с поражением ЦНС в виде менингоэнцефалита.

Бактериовыделение установлено у 36 больных (56,25%), деструктивные изменения в легких диагностированы в 49% случаев. Лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам выявлена у 23 больных (63,8% среди бактериовыделителей), среди них мультирезистентный туберкулез у 13 пациентов.

Внелегочный туберкулез выявлен у 6 больных (9,4% из 64 больных): среди них чаще встречался туберкулез внутригрудных лимфатических узлов и бронхов - 4 больных. Туберкулез кожи и туберкулезный плеврит по одному случаю.

В 2014 году прошли обследования на ВИЧ по направлениям противотуберкулезных учреждений г. Харькова и Харьковской области 2054 пациенты, что составляет 96,4% от потребности. Выявлены 38 ВИЧ-инфицированных больных, что составило 1,87% от обследованных.

Контингент больных ВИЧ/ТБ, которые находились под наблюдением ОПТД №1 на конец 2014 года составлял 132 человека (7,1% от контингента больных ТБ). Среди них 119 пациентов с активными формами туберкулеза легких (90,2%), 11 пациентов с внелегочным туберкулезом (8,3%) и 2 пациента с милиарным туберкулезом (1,5%). Зарегистрированы по первой категории 34 больных (25,6%), по второй категории - 23 больных (17,4%), среди них 4 случая рецидива ТБ, по третьей категории - 1 больной (0,8%), по четвертой категории - 74 пациенты (56,1%). Диспансерный контингент - пятая категория, группа 5.1 составила 193 пациенты.

Антиретровирусную терапию в интенсивной фазе получали 117 больных, что составило 88,6% случаев (от 132 пациента) и в поддерживающей фазе 10 больных.

Расширение доступа к АРТ для всех, кто в ней нуждается, и эффективное лечение больных ВИЧ-инфекцией влияет как на показатели заболеваемости и смертности от СПИД, так и на уровень распространенности ВИЧ среди населения. В соответствии с рекомендациями Европейского центра по контролю и профилактике заболеваемости (ECDC) и Европейского регионального бюро ВОЗ разработана унифицированная методология расчета индикатора охватывания ЛЖВ антиретровирусной терапией для стран Европейского региона. В контексте этих рекомендаций был рассчитан соответствующий показатель по Украине. Полученные данные

свидетельствуют, что уровень охвата АРТ тех, кто в ней нуждается, не достигает 80% и в 2014 г. составил лишь 50,5%[2].

В соответствии с приказом МОЗ Украины № 1039 [1], профилактическое лечение изониазидом проводят ЛЖВ, у которых исключен активный туберкулез. Химиопрофилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц проводится 6-ти месячным курсом изониазида 5мг/кг массы тела (не больше 0,3г) 1 раз в году до стойкого повышения уровня CD4 клеток выше 500 в мл.

Учитывая неуклонный рост больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, в целях своевременного выявления туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц целесообразно интеграция противотуберкулезной службы и службы по борьбе со СПИД. Для реализации поставленных заданий, необходимо усовершенствовать и широко применять единую информационную базу для мониторинга этих заболеваний. Анализ эпидемиологической ситуации относительно ВИЧ/ТБ в Харьковской области позволяет подтвердить [2,6] следующие положения:

1. Приоритетность группы ВИЧ-инфицированных лиц среди групп повышенного риска заболевания туберкулезом, обосновывает необходимость создания единой информационной базы для их мониторинга.

2. Совместные скоординированные усилия фтизиатрической службы и службы борьбы со СПИД с повсеместным внедрением молекулярно генетических методов диагностики позволят своевременно диагностировать туберкулез у ВИЧ-инфицированных.

3. Для снижения заболеваемости ВИЧ/ТБ необходимо обеспечить свободный доступ к антиретровирусной терапии и химиопрофилактике туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных лиц.

Список литературы

1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)» від 31.12.2014 р., № 1039.
2. Нізова Н.М., Щербінська А.М., Гетьман Л.І. та ін.. ВІЛ-інфекція в Україні // інформаційний бюлетень, № 43. - 2015. – 112с
3. Черенько С.О., Л.В.Щербакова Проблеми ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ в Україні // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2010. – № 1. – С.18-23.
4. Badri M., Ehrlich R, Wood R. [et al.]Association between tuberculosis and HIV disease progression in a high tuberculosis prevalence area. J. Tuberc.Lung.Dis 2001; 5; 225-232.
5. Sonnenberg P. How soon after infection with HIV does the risk of tuberculosis start to increase? A retrospective cohort study in South African gold miners / P. Sonnenberg, J.R. Glynn, K. Fielding [et al.]. J. Infect. Dis. 2005; 191; 150-158.

6. World Health Organization (WHO). Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing—WHO report 2011. Chapter 1, Epidemiology. Document WHO/HTM/TB/2011.- 411.

Страница преднамеренно оставлена пустой

Страница преднамеренно оставлена пустой