“КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

Материалы Всероссийского форума

29 ноября - 3 декабря

Курск, 2016

УДК 617-089(063)

ББК 54.5

К 93

Экспериментальная и клиническая хирургия: проблемы и решения: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Курск, 29 ноября - 3 декабря 2016 г.) / под редакцией В.А. Лазаренко, А.И. Бежин, Г.А. Бондарев, В.А. Липатов. – Курск: Изд-во КГМУ, 2016 г. – 166 с.

Сведения и материалы, изложенные в данных публикациях, не обязательно отражают точку зрения редакционной коллегии. За предоставленную информацию несут ответственность авторы.

Редакционная коллегия:

профессор, докт. мед. наук, ректор КГМУ **Лазаренко В.А.**

профессор, докт. мед. наук, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии **Бежин А.И.**

профессор, докт. мед. наук, заведующий кафедрой хирургических болезней ВПО КГМУ **Бондарев Г.А.**

профессор, докт. мед. наук **Липатов В.А.**

Формирование сборника **Шашков Е.Е., Наимзада М.Д.З.**

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Экспериментальная и клиническая хирургия: проблемы и решения», проходившей в Курском государственном медицинском университете с 29 ноября по 3 декабря 2016 года, и представляет научный и практический опыт ученых и аспирантов различных вузов, а также специалистов в области хирургии.

Также в сборнике представлены статьи студентов, рекомендованные к публикации по итогам работы Всероссийского форума «Курская неделя хирургии».

ISBN 978-5-9908565-1-6

ББК 54.5

DOI: 10.21626/cb.16.surgeryweek

© Коллектив авторов, КГМУ, 2016

© ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016

© ООО «МедТестИнфо», 2016

Оглавление

Программа проведения конференции.....	6
CHOOSING AN OPTIMAL METHOD OF ADHESIOLYSIS (<i>Alidu Osman Saturson, Yala shadad Buhari</i>)....	21
CORRELATION OF THE SEVERITY OF ABDOMINAL ADHESION AND THE DEGREE OF DAMAGE TO THE PERITONEUM (<i>Alidu Osman Saturson, Yala shadad Buhari</i>)	24
АКУШЕРСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ С МИОМОЙ МАТКИ (<i>Нуржанова Г.К., Сагиндикова Г.Н., Сапенова Д.К., Умарова Г.К.</i>).....	27
АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПРИВЫЧНЫМ ВЫВИХОМ ПЛЕЧА (<i>Длясин Н.Г.</i>)	29
АЛЛО- И АУТОПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (<i>Колесников С.А., Шестаков И.А., Волков Д.В., Захаров О.В., Пахлеванян В.Г.</i>).....	31
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО СТЕНОЗА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ (<i>Суковатых Б.С., Солянина В.А., Лопатьева А.Р.</i>) ...	33
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ (<i>Иванов С.В., Розберг Е.П., Ягубов Г.В.</i>).....	35
АНАЛИЗ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (<i>Тарасова Н.К., Лочехина Е.Б., Мирзоева Н.А.</i>)	37
АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ (<i>Мамошин А.В., Борсуков А.В., Мурадян В.Ф., Альянов А.Л., Аболмасов А.В., Данилова М.С.</i>)	39
АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (<i>Мамошин А.В., Борсуков А.В., Мурадян В.Ф., Аболмасов А.В., Альянов А.Л., Данилова М.С.</i>).....	41
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ (<i>Ефременков А.М.</i>)	43
БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) (<i>Белозерова А.В., Григорьян А.Ю.</i>).....	45
БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЛИНТЕКС-МЕЗОГЕЛЬ» (<i>Лазаренко В.А., Гамазинов И.Н., Липатов В.А., Привалова И.Л.</i>).....	45
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРИН-КОЛЛАГЕНОВОЙ СУБСТАНЦИИ (<i>Горский В.А., Воленко А.В., Поливода М.Д., Ованесян Э.Р., Череватенко А.М.</i>)	46
ДУОДЕНАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ (<i>Кригер А.Г.</i>)	48
ЗНАЧЕНИЕ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ (<i>Шестопалова А.Д.</i>).....	50
ИЗУЧЕНИЕ КРОВОЕСТАНАВЛИВАЮЩИХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ГУБКИ (<i>Солдатова Д.С., Бежин А.И., Липатов В.А., Майстренко А.Н.</i>)	51
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (<i>Жуковский В.А.</i>)	53
ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ АНТИСЕПТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (<i>Григорьян А.Ю., Белозерова А.В.</i>).....	55
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ (<i>Горин Д.С.</i>).....	57
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ПУНКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА (<i>Аблаев Э.Э.</i>)	59
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТКОВ ТОНКОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ (<i>Горпинич А.Б., Привалова И.Л., Мангилев С.В., Коростелева Е.В., Смольнякова К.В.</i>)	61
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСУДИСТЫХ ЗАПЛАТ ПОСЛЕ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ (<i>Жуковский В.А., Липатов В.А., Северинов Д.А., Абдель Джавад Н.М.</i>).....	63
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТКОВ ТОНКОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ (<i>Горпинич А.Б. и др.</i>)	
ИШЕМИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ НЕОАНГИОГЕНЕЗА В ИШЕМИЗИРОВАННОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ (<i>Колесник И.М.</i>).....	66
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ СВОБОДНЫМ АУТОВЕНОЗНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ НИЖЕ ЩЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (<i>Сидоров Д.В.</i>).....	68
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ ПЛЕНОЧНЫХ ИМПЛАНТОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛИНИИ ШВОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) (<i>Инархов М.А., Липатов В.А., Затолокина М.А., Жуковский В.А., Суковатых Б.С., Ярмamedов Д.М.</i>)	70
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ ВРОЖДЕННЫХ СВИЩЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ (<i>Мальцева А.В., Вишневская П.В.</i>).....	72
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ (<i>Сухаруков А.С.</i>)	74

ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СВИЩЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ (<i>Мальцева А.В., Вишинецкая П.В.</i>).....	76
МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СТРУКТУРЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (<i>Хвостовой В.В., Брежнев Д.Г.</i>).....	78
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОМЕТРИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ШВА НА МАТКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (<i>Перепелова Т.А., Газазян М.Г., Бежин А.И.</i>).....	80
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА И ЕГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ (<i>Кошанова А.А., Лялина Е.И., Елеукина А.А., Золотарёв В.А., Тулеубаев Б.Е.</i>).....	82
ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) (<i>Липатов В.А., Михеев Д.В., Фролова О.Г.</i>).....	84
ОПТИМАЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТОНКОКИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ (<i>Кригер А.Г.</i>).....	88
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (<i>Варжапетян А.М., Барсегян А.А., Хондкарян Р.А., Авакян Т.Г., Хачатрян А.С.</i>).....	90
ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ БРЫЖЕЙКИ (<i>Игнатъев Е.М., Ефременков А.М., Петрикова Н.И., Тома А.Н., Берёзка В.Н.</i>).....	92
ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ (<i>Хвостовой В.В., Романищев В.Е., Нетяга Р.А., Саинсус С.С.</i>).....	94
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РГП С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМ-АССИСТИРОВАННОЙ ЛАПАРОСТОМИ (<i>Шапкина В.А., Первова О.В., Черданцев Д.В., Дятлов В.Ю., Тахтобин Е.Г., Пирова А.Ш., Анохина А.Р., Амельченко А.А., Бусыгин Е.В.</i>).....	96
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛАГЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТОМ КОМПОНЕНТЕ ТКАНЕЙ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ И ГРЫЖЕВОГО МЕШКА ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ (<i>Деркач Н.Н., Кондратьев Э.Р., Гривенко С.Г.</i>).....	98
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ПЕЧЕНИ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (<i>Колесник И.М.</i>).....	100
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИИ ПОЧКИ РАСТВОРОМ «ПЕРФТОРАН» В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (<i>Клочков М.М., Рязанцев А.А.</i>).....	102
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗАДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА ТАЗА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНО НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (<i>Слиянков Л.Ю., Кавалерский Г.М., Прохоров А.А.</i>).....	104
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ДИССЕКЦИИ И КОАГУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ (<i>Варжапетян А.М., Барсегян А.А., Авакян Т.Г., Малхасян С.В.</i>).....	106
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПОРОШКА НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ОПЫТЕ IN VITRO (<i>Константинова Ю.Е., Абросимова Н.В.</i>).....	108
ПОЛИОРГАНАЯ ФОНОВАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОДОНТОГЕННОЙ И НЕОДОНТОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ (<i>Иванов С.В., Будаев А.П., Губин М.А., Громов А.Л.</i>).....	110
ФОНОВАЯ ПОЛИОРГАНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (<i>Иванов С.В., Будаев А.П., Губин М.А., Громов А.Л.</i>).....	112
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КИСТИ И СТОПЫ ПОСЛЕ ИХ РЕПЛАНТАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. (<i>Коротких С.А., Котов А.А., Бяков М.Н.</i>).....	114
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ КИСТИ И СТОПЫ ПОСЛЕ ИХ РЕПЛАНТАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ (<i>Коротких С.А., Котов А.А., Бяков М.Н.</i>).....	117
ПРОТИВОСПАЕЧНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ (<i>Жуковский В.А.⁽¹⁾, Немилев В.Е.⁽¹⁾, Ахметшина О.З., Едомина Н.А., Кубин Н.Д., Липатов В.А.</i>).....	119
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ МИНИ-ДОСТУПА (<i>Колесников С.А., Шестаков И.А., Волков Д.В., Пахлеванян В.Г., Захаров О.В.</i>).....	121
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПРЕД-И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ (<i>Ласков В.Б., Масалева И.О.</i>).....	123
ПУТИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (<i>Лазаренко В.А., Липатов В.А., Бежин А.И., Суковатых Б.С., Жуковский В.А., Наумзада М.Д.З.</i>).....	125

РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (Кригер А.Г.)	127
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ (Гостевич И.С., Галинская Н.С., Становенко В.В.).....	129
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА (Вакулин Г.В., Розин А.В.).....	131
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОРАЗРЕШЕНИЙ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ № 2, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА (Нуржанова Г.К., Сагиндикова Г.Н., Сапенова Д.К., Умарова Г.К.).....	133
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ АРРОЗИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ (Хвостовой В.В., Ворона Ю.С., Романищев В.Е.).....	135
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ЭХОСКЛЕРООБЛИТЕРАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ (Расулов Н.А.).....	136
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ ТКАНЕЙ И АЛЛОТРАНСПЛОНТАТОВ (Саляхутдинов Р.Р., Дайтбеков Д.Д.)	138
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ (Семенов А.В., Носков А.С.)...	140
ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЯХ (Кригер А.Г.)	141
ТРАВМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ И «ЗОЛОТЫЕ СТАНДАРТЫ» В ХИРУРГИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ (Колесников С.А., Шестаков И.А., Волков Д.В., Пахлеванян В.Г., Мигунов А.А.)	143
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЛУБ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ (Воробьев А.А., Литвина Е.В., Кондратьева Е.А., Насонов Н.Д.)	145
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАЗВИТИИ МЕДИАСТИНИТА ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (Анисимов А.Н., Дербенёв О.А.)	147
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ПИЛОРОСТЕНОЗА (Носков А.С. Семенов А.В.)	149
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Хвостовой В.В.).....	151
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ (Кригер А.Г.).....	153
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕГКИХ УСИЛЕННЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (Полевой Ю.Ю., Нетяга А.А., Блинков Ю.Ю., Жуковский В.А., Любичкая Ю.А.).....	155
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ КРОЛИКА (Воробьев А.А., Литвина Е.В., Насонов Н.Д., Кондратьева Е.А., Исмаилов И.Я.)	157
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ЗАСТАРЕЛЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ (Длясин Н.Г., Нам А.В., Фроленков А.В., Ирисханов И.Р., Зоткин В.В.)	159

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

**ПРИВЕТСТВИЕ
заслуженного врача
РФ, доктора
медицинских наук,
профессора, ректора
Курского
государственного
медицинского
университета
Виктора
Анатольевича
Лазаренко**

Дорогие коллеги!

Я искренне рад приветствовать вас в стенах нашей Alma Mater – Курском государственном медицинском университете!

Формат и тематика форума, который организовали кафедры хирургического и морфологического профиля, весьма актуальна. Перспективные и, безусловно, инновационные направления в работе ученых нашего университета вытекают из тематик большого числа межкафедральных, междисциплинарных исследований. Сотрудничество по многим вопросам уже давно вышло за стены Курского государственного медицинского университета.

В процессе разработки, апробации и внедрения новых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения исследователи сотрудничают не только с коллегами из других вузов Курска, но и с учеными из многих городов России. Намечаются проекты и с научными коллективами университетов дальнего зарубежья, с которыми были заключены договоры о сотрудничестве.

Сегодня в лабораториях и клиниках сотрудники КГМУ исследуют различные материалы для лечения больных с вентральными грыжами, сосудистой патологией, спаячной болезнью и прочими заболеваниями хирургического профиля.

В рамках данного мероприятия запланированы научные заседания, на которых будут обсуждены не только достижения ведущих хирургов, но и проблемы внедрения новых разработок.

Я надеюсь, что общение будет плодотворным и полезным, возникнут новые договоренности о сотрудничестве, а существующие контакты будут укреплены.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

**ПРИВЕТСТВИЕ
губернатора Курской
области, почетного
профессора Курского
государственного
медицинского
университета
Александра
Николаевича
Михайлова**

Дорогие участники форума!

Впервые мероприятие такого масштаба проходит на площадках нашей области! Мы благодарны за оказанное доверие в организации и проведении Всероссийского форума «Курская неделя хирургии». Курский государственный медицинский университет вот уже более 80 лет является кузницей высококвалифицированных медицинских кадров, поэтому вполне закономерно, что форум, в структуру которого входят как

научные, так и образовательные мероприятия, будет проходить на базе одной из старейших медицинских школ России, в КГМУ.

Тематика форума, организованного совместными усилиями кафедр хирургического профиля КГМУ, администрацией Курской области, руководством вуза, весьма актуальна. Хирургия на сегодняшний день является передовой отраслью медицинской науки и практики. Фактически ежедневно врачи-хирурги совершенствуют существующие методики лечения хирургических заболеваний для улучшения качества оказываемой помощи пациентам.

Курская хирургия на сегодняшний день является передовой, интенсивно развивающейся отраслью медицинской науки как на региональном, так и на всероссийском уровне, об этом говорит значительное количество оперативных вмешательств различной сложности, в том числе высокотехнологические операции с использованием самого современного оборудования, которым оснащены все клинические базы Курска.

Поэтому целью проведения форума мы определили повышение теоретического и практического уровня врачей хирургических специальностей посредством проведения образовательных и практических тренингов, обсуждения инновационных результатов научных исследований, а также интерактивного поиска решения актуальных проблем диагностики, профилактики и лечения пациентов хирургического профиля.

Я хотел бы пожелать всем участникам приятных дней работы в Курске, интересных новых знакомств и, как всегда (я абсолютно уверен, что так и будет), приятного свидания с нашим прекрасным городом.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

ПРИВЕТСТВИЕ
академика РАМН,
заведующего
кафедрой общей
хирургии Первого
Московского
государственного
медицинского
университета,
почетного
профессора Курского
государственного
медицинского
университета
Виктора Кузьмича
Гостищева

Уважаемые коллеги, участники форума, земляки!

Я чрезвычайно рад иметь возможность приветствовать участников столь масштабного мероприятия.

Проведение Всероссийского форума «Курская неделя хирургии» – знаменательное событие для всего сообщества практикующих врачей-хирургов, ученых, исследователей данной области медицинской науки, молодых специалистов, аспирантов, интернов и, конечно,

студентов-медиков.

Хирургия в КГМУ – это, безусловно, перспективное направление в работе ученых университета. Подобное утверждение вытекает из тематик большого числа межкафедральных, междисциплинарных диссертационных исследований. Сегодня в лабораториях и клиниках сотрудники КГМУ исследуют различные материалы для лечения больных с вентральными грыжами, сосудистой патологией, спаечной болезнью и прочей серьезной патологией. В процессе разработки, апробации и внедрения новых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения исследователи сотрудничают не только с коллегами из других вузов Курска, но и с учеными из многих городов России.

На площадках форума участникам дана возможность обмениваться актуальной информацией, доложить результаты собственных инновационных исследований и рассказать о разработанных методиках и способах лечения хирургической патологии. Также студенты-участники продемонстрируют свою практическую подготовку в более чем 10 номинациях в рамках XXVI Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана среди вузов Центрального федерального округа. Также немаловажным мы считаем установление новых точек соприкосновения между врачами и учеными, обмен научными результатами и исследовательским опытом между поколениями: специалистами и студентами, делающими свои первые шаги в науке.

В заключение мне хотелось бы пожелать успеха конференции, хотелось бы пожелать представителям неправительственных организаций интересных идей, доведения этих идей до стадии проекта, доведения проектов до стадии реализации и достижения в результате той цели, которую вы ставили в самом начале.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:

Виктор Анатольевич Лазаренко

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, ректор
Курского государственного медицинского университета,
заведующий кафедрой хирургических болезней ФПО

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Павел Владимирович Ткаченко

доцент, проректор по научной работе и инновационному развитию
Курского государственного медицинского университета

Роман Викторович Плотников

ведущий консультант управления организации и развития
медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области

Александр Иванович Бежин

заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Геннадий Алексеевич Бондарев

профессор кафедры хирургических болезней ФПО Курского
государственного медицинского университета

Вячеслав Александрович Липатов

профессор кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Андрей Алексеевич Нетяга

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Алла Николаевна Майстренко

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Арсен Юрьевич Григорьян

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

**Д.В. Михеев, М.Д.З. Наимзада, Д.М. Ярмамедов,
Д.А. Северинов, Н.М. Абдель Джавад, Н.И. Хмаро, Е.Е. Шашков,
А.А. Денисов, А.С. Рыжов**

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

ОРГАНИЗАТОРЫ

- Курский государственный медицинский университет
- Администрация Курской области
- Комитет здравоохранения Курской области
- Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
- Комитет по делам молодежи и туризму Курской области
- Комитет по развитию внешних связей Курской области
- Курская региональная общественная организация «Научно-практическое общество хирургов»
- ООО «МедТестИнфо» (малое инновационное предприятие при Курском государственном медицинском университете) – провайдер мероприятия

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

29 ноября – 3 декабря 2016 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

- г. Курск, улица Ямская, д. 18 (фармацевтический корпус Курского государственного медицинского университета)
- г. Курск, улица К. Маркса, д. 3 (главный корпус Курского государственного медицинского университета)

Схема проезда

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: ВЫДАЧА ПАКЕТОВ УЧАСТНИКА

29 ноября 2016 года

09.00 – 10.30

Фойе фармацевтического корпуса

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ"

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

**29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.**

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

Дата	Блок меро- приятий	Время	Наименование события	Место проведения	
29 ноября	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Экспериментальная и клиническая хирургия: проблемы и решения»	Образовательный блок	9.00-10.00	Регистрация участников. Выставка	Фойе фармацевтического корпуса
30 ноября			10.30-11.00	Открытие форума	Актный зал, фармацевтический корпус
			11.00-13.00	Дневное заседание	Актный зал, фармацевтический корпус
			13.00-14.00	Фуршет	Столовая КГМУ, фармацевтический корпус
			14.00-17.00	Вечернее заседание	Аудитория № 4, фармацевтический корпус
			9.00-10.45	Мастер-класс	Аудитория № 3, главный корпус
			11.00-14.00	Дневное заседание	Аудитория № 3, главный корпус
			14.00-15.00	Фуршет	Главный корпус, 4-й этаж
		15.00-17.00	Круглый стол	Конференц-зал, главный корпус	
1 декабря		Научный блок	В течение дня	Встреча команд олимпиады, размещение	Ж/д, вокзал, автовокзал, гостиницы
10.00-14.00			Секционное заседание	Аудитория № 3, главный корпус	
13.00-18.00			Регистрация команд олимпиады	Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, главный корпус	
14.00-15.00			Фуршет	Главный корпус, 4-й этаж	
15.00-17.00			Заседание секции молодых ученых и студентов	Аудитория № 3, главный корпус	
15.00-18.00			Тренировка участников олимпиады	Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, главный корпус	
18.00			Товарищеский ужин (для участников конференции)	Столовая КГМУ, фармацевтический корпус	
2 декабря	XXVI Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии имени академика М.И. Перельмана вузов ЦФО	8.30-10.00	Регистрация команд олимпиады	Аудитория 5, стоматологический корпус	
10.00-11.00		Открытие олимпиады. Приветствие. Интубация трахеи	Аудитория 5, стоматологический корпус Учебный класс 602А, стоматологический корпус		
11.00-13.00		Вязание хирургических узлов	Учебный класс 613, стоматологический корпус Учебный класс 602, стоматологический корпус		
12.00-14.30		Трахеостомия Обед	Столовая КГМУ, фармацевтический корпус		
		Эндовидеохирургия, I этап	Учебный класс 255, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, главный корпус		
		Кожный шов	Учебные классы 252, 254, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии		
		Микрососудистый шов	Учебный класс 257, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии		
		Сосудистый шов	Учебные классы 344, 346, кафедра физиологии, главный корпус		
15.00-18.00		Кишечный шов	Учебные классы 02, 03, кафедра анатомии человека, главный корпус		
3 декабря		Урологический конкурс	Учебные классы 432, 434, главный корпус		
		Шов сухожильный	Учебный класс 425, главный корпус		
		Эндовидеохирургия, II этап	Учебный класс 255, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, главный корпус		
		Остеосинтез	Спортивный зал № 2		
		9.30-13.00	Микрохирургический шов нерва	Учебный класс 257, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, главный корпус	
		Трансплантация почки	Учебные классы 02, 03, кафедра анатомии человека, главный корпус		
		12.00-15.00	Обед	Столовая КГМУ, фармацевтический корпус	
		16.00-19.00	Подведение итогов. Закрытие олимпиады	Актный зал, фармацевтический корпус

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ	29 ноября 2016 года 10.30 – 11.00 Актальный зал (фармацевтический корпус КГМУ)
	<p>Виктор Анатольевич Лазаренко заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, ректор Курского государственного медицинского университета</p> <p>ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ</p> <p>Петр Михайлович Назаренко председатель Курской региональной общественной организации «Научно-практическое общество хирургов», доктор медицинских наук, профессор</p> <p>Роман Викторович Плотников ведущий консультант управления организации и развития медицинской помощи комитета здравоохранения Курской области</p>
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ	29 ноября 2016 года 11.00 – 13.00 Актальный зал (фармацевтический корпус КГМУ)
	<p>ПРЕДСЕДАТЕЛИ: В.А. Лазаренко (Курск), П.М. Назаренко (Курск), А.И. Бежин (Курск), С.В. Иванов (Курск)</p> <p>Лекция 11.00 – 12.00 СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА Сергей Викторович Иванов заведующий кафедрой хирургических болезней № 1, Курский государственный медицинский университет, профессор</p> <p>Лекция 12.00 – 13.00 НЕВАСКУЛЯРНАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ РЕНТГЕНХИРУРГИЯ: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПЕРСПЕКТИВЫ Олег Иванович Охотников профессор кафедры лучевой диагностики и терапии КГМУ, заведующий отделением РХМДЛ № 2 Курской ОКБ</p>
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ	13.00 – 14.00

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

**29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.**

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

29 ноября 2016 года
14.00 – 17.00
АУДИТОРИЯ № 4 (фармацевтический корпус КГМУ)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

А.Г. Кригер (Москва), Г.А. Бондарев (Курск),
Б.С. Суковатых (Курск), А.И. Колесник (Курск)

Лекция
14.00 – 15.00

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ТОНКОКИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ Андрей Германович Кригер

заведующий отделением абдоминальной хирургии № 1
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, профессор

Лекция
15.00 – 16.00

НАШ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ Петр Михайлович Назаренко

заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 КГМУ,
профессор

Лекция
16.00 – 17.00

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Борис Семенович Суковатых
заведующий кафедрой общей хирургии КГМУ, профессор

МАСТЕР-КЛАСС

30 ноября 2016 года
9.00 – 10.45
АУДИТОРИЯ № 3 (главный корпус КГМУ, 4-й этаж)

ЭНДОСКОПИЯ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Юрий Васильевич Канищев
профессор кафедры хирургических болезней ФПО КГМУ,
заведующий отделением эндоскопии Курской отделенческой
железнодорожной больницы

ПЕРЕРЫВ

15 МИНУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

**29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.**

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

30 ноября 2016 года

11.00 – 14.00

АУДИТОРИЯ № 3 (главный корпус КГМУ, 4-й этаж)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

**А.И. Бежин (Курск), О.И. Охотников (Курск),
В.А. Горский (Москва), В.А. Липатов (Курск),
В.И. Темирбулатов (Курск)**

**Лекция
11.00 – 12.00**

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Виктор Александрович Горский

заведующий кафедрой экспериментальной и клинической
хирургии, Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва,
Россия, профессор

**Лекция
12.00 – 13.00**

ХИРУРГИЯ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО ПЕРЕХОДА Владимир Ибрагимович Темирбулатов

профессор кафедры хирургических болезней ФПО КГМУ,
заведующий отделением торакальной хирургии Курской ОКБ

**Лекция
13.00 – 14.00**

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО- РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Владимир Владимирович Хвостовой

заведующий кафедрой онкологии КГМУ, доцент

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

14.00-15.00

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek

**29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.**

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ»

30 ноября 2016 года

15.00 – 17.00

Конференц-зал (главный корпус КГМУ, 3-й этаж)

Модератор:

Андрей Германович Кригер

доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения абдоминальной хирургии № 1 ФГБУ «Институт
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Айрат Радикович Калдаров

врач-хирург отделения абдоминальной хирургии ФГБУ
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России

ДУОДЕНАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Александр Вячеславович Смирнов

врач-хирург отделения абдоминальной хирургии
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»
Минздрава России

ПРОТОКОЛ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Давид Семёнович Горин

научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»
Минздрава России

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1 декабря 2016 года

10.00 – 14.00

АУДИТОРИЯ № 3 (главный корпус КГМУ, 4-й этаж)

Регламент доклада 15 минут, презентация в Power point, ответы на вопросы после каждого доклада обязательны. Обсуждение по завершении выступлений.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

С.А. Колесников (Белгород), А.Л. Локтионов (Курск),
Ю.Ю. Блинков (Курск), И.С. Иванов (Курск)

1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ПЕЧЕНИ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Инга Михайловна Колесник

кандидат медицинских наук, докторант, Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

2. АНАЛИЗ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Надежда Константиновна Тарасова

кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Северного государственного медицинского университета, Архангельск, Россия

3. ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Виталий Борисович Ласков

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии, Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

4. ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ МИНИ-ДОСТУПА

Сергей Анатольевич Колесников

доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгород, Россия

5. ПУТИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Вячеслав Александрович Липатов

доктор медицинских наук, профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

6. К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ ПЛЕНОЧНЫХ ИМПЛАНТОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛИНИИ ШВОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Михаил Александрович Инархов

ассистент кафедры общей хирургии, Курский
государственный медицинский университет, врач
отделения сосудистой хирургии ОБУЗ «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи
г. Курска», Курск, Россия

7. ФОНОВАЯ ПОЛИОРГАННАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Александр Леонидович Громов

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
челюстно-лицевой хирургии КГМУ, врач челюстно-
лицевой хирург ОКБ г. Курска, Россия

8. К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ИМПЛАНТОВ

Сотников Константин Александрович

врач Белгородской городской клинической больницы № 1,
Белгород, Россия

9. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Ефременков Артём Михайлович

кандидат медицинских наук, врач детский хирург ОГБУЗ
«Детская областная клиническая больница», Белгород,
Россия

10. ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ АНТИСЕПТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Арсен Юрьевич Григорьян

кандидат медицинских наук, доцент кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии,
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия

11. ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Роман Алексеевич Нетяга

врач областного онкологического диспансера, Курск,
Россия

12. К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ СВОБОДНЫМ АУТОВЕНОЗНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ НИЖЕ ЩЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Дмитрий Владимирович Сидоров

врач сердечно-сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы, Орел, Россия

13. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ИНФИЦИРОВАННОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА

Елена Александровна Еленская

врач-хирург ОБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Курска», Курск, Россия

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 14.00-15.00

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

1 декабря 2016 года

15.00 – 17.00

АУДИТОРИЯ № 3 (главный корпус КГМУ, 3-й этаж)

Регламент доклада 10 минут, презентация в Power point, ответы на вопросы после каждого доклада обязательны. Обсуждение по завершении выступлений.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

**А.Ю. Григорьян (Курск), С.Н. Жабин (Курск),
Ю.П. Новомлинец (Курск), А.Ю. Орлова (Курск)**

1. АНТЕГРАДНЫЕ МИНИ-ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Мария Сергеевна Данилова

клинический интерн, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Медицинский институт, Орел, Россия

2. ЗНАЧЕНИЕ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Анастасия Дмитриевна Шестопалова

ординатор кафедры хирургии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, Донецк, ДНР

3. К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕСТИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ МАКРООРГАНИЗМА

Северинов Дмитрий Андреевич

студент, Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ЭХОСКЛЕРООБЛИТЕРАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Нафе Анвар-оглу Расулов

студент, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь,
Республика Крым, Россия

5. АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО СТЕНОЗА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Анна Романовна Лопатьева

студентка, Курский государственный медицинский
университет, Курск, Россия

6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАЗВИТИИ МЕДИАСТИНИТА ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Александр Николаевич Анисимов

студент, Кировская государственная медицинская
академия, Киров, Россия

7. ПОКАЗАТЕЛИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПОРОШКА НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ОПЫТЕ IN VITRO

Юлия Евгеньевна Константинова

студентка, Курский государственный медицинский
университет, Курск, Россия

8. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСУДИСТЫХ ЗАПЛАТ ПОСЛЕ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Абдель Джавад Нина Махеровна

студентка, Курский государственный медицинский
университет, Курск, Россия

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИТЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМ-АССИСТИРОВАННОЙ ЛАПАРОСТОМЫ НА БАЗЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Евгений Геннадьевич Тахтобин

студент, Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Красноярск, Россия

10. ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Артём Александрович Денисов

студент, Курский государственный медицинский
университет, Курск, Россия

11. БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Анастасия Валентиновна Белозерова

студентка, Курский государственный медицинский
университет, Курск, Россия

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА

Александр Витальевич Розин

студент, Тверской государственный медицинский
университет, Тверь, Россия

13. ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ КИСТИ И СТОПЫ ПОСЛЕ ИХ РЕПЛАНТАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Сергей Александрович Коротких

студент, Кировская государственная медицинская
академия, Киров, Россия

14. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ

Александр Вадимович Семенов

студент, Кировская государственная медицинская
академия, Киров, Россия

15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ ТКАНЕЙ И АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ

Раниль Рамильевич Саляхутдинов

студент, Кировская государственная медицинская
академия, Киров, Россия

16. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ПИЛОРОСТЕНОЗА

Алексей Сергеевич Носков

студент, Кировская государственная медицинская
академия, Киров, Россия

CHOOSING AN OPTIMAL METHOD OF ADHESIOLYSIS
Alidu Osman Saturson, Yala shadad Buhari
Dagestan State Medical University, Makhachkala, Russia

The aim of our study was to find out the optimal method of adhesiolysis. The first phase was carried out on the model, white intact male Wistar mice weighing 100 to 120 g. In a sterile environment under ether anesthesia, midline laparotomy was performed. The parietal peritoneum of the ventral wall and the surface facing the cecum were removed by using a device until there was a "bloody dew." . The second stage was performed after 14 days. A re-laparotomy was carried out and separation of adhesions using microsurgical technique under magnifying operating microscope (OM-2) in various ways. In the 1-group, a blunt adhesiolysis was used, in the 2nd - sharp, 3rd - electrotome and in the 4th group – a combination of blunt and sharp adhesiolysis.

Subjects were taken from the experiment on day 14. Severity of adhesions were assessed visually and with the help of semantic differential technique (VA Lipatov 2001). Parietal peritoneum and abdominal organs examined histologically by the usual method, the slices were stained with hematoxylin-eosin and Van Gison.

The 1-group in most cases, a conglomerate consisting of loops of small and large intestine, cecum, with little deformation were observed. In other places, it has been soldered to the greater omentum. A similar pattern was observed in the 4th group. In the 2nd group postoperative adhesion of the abdominal cavity was less pronounced, with a conglomerate composed of loops of the large intestine and cecum without apparent damage. In some cases, the 1st, 2nd and 4th series were noted to have conglomerate attachments to post operational scars. In the 3rd groups, conglomerate were observed in the greater omentum, loops of the small and the large intestine and cecum. In some cases, it involved the liver, stomach and spleen of which conglomerate has been soldered to the ventral wall with a marked damage to the organs.

Severity of adhesions by semantic differential in the 1st group was $2,15 \pm 0,24$ points in the 2nd group - $1,75 \pm 0,26$ points; 3rd group - $3,57 \pm 0,23$ points; the 4th group - 2.25 ± 0.25 points. Significant differences in the average values of all the group (p) is less than 0.0001.

Histologically, in the 1st group, immature connective tissue with foci of fibrous tissue were observed. In the 2nd group mild connective tissue fibers were observed, cell responses were absent. In the 3rd group, strong development of coarse fiber connective tissue was noted. In some places there were foci of necrosis demarcated from the surrounding tissue with inflammation. In the group 4, matured connective tissue with chronic

inflammation phenomena were noted. Also identified friable granulation tissue in patchy areas.

Therefore, the best way of removing an adhesion is with a sharp method in which the severity of adhesions was the smallest. Satisfactory results were obtained after the application of blunt and mixed methods. Based on this study, we observed that the use of electrotome to separate adhesions was impractical, because its application causes a pronounced postoperative adhesions of the abdominal cavity with foci of necrosis in internal organs.

Литература

1. Бебуришвили А.Г., Воробьев А.А., Михин И.В. и др. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова, № 6, 2007. – С. 27-28.
2. Гомон М.С., Конопля А.И., Липатов В.А., Бежин А.И., Локтионов А.Л., Суковатых Б.С., ... & Беседин А.В. (2008). Динамические изменения иммунологической реактивности при моделированном спаечном процессе в брюшной полости. Вестник новых медицинских технологий (1).
3. Женчевский, Р.А. Спаечная болезнь / Р.А. Женчевский. - М.: Медицина, 1989. – 186 с.
4. К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Липатов В.А. Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2002. – С. 256.
5. Лазаренко В.А. и др. Коррекция нарушений иммунитета при экспериментальном спаечном процессе брюшной полости с использованием дерината и лонгидазы // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2010, № 3.
6. Лазаренко В.А. и др. Современная семиотика острой спаечной кишечной непроходимости // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2016. – Т. 5. – № 2. – С. 292-296.
7. СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Липатов В.А., Бежин А.И., Мясников А.Д., Панкрушева Т.А., Веденьев Ю.И. Патент на изобретение RUS 2217801 18.10.2001.
8. СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕК СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ. Липатов В.А., Мясников А.Д., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Веденьев Ю.И. Патент на изобретение RUS 2225171 26.02.2002.
9. Суфияров И.Ф., Шафиков Р.М., Нигматзянов С.С. и др. Противоспаечные барьеры в абдоминальной хирургии // Казанский медицинский журнал, № 5, том 89, 2008. – С. 697-700.

10. Чекмазов И.А. Спаечная болезнь брюшины. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 160 с.

References

1. Beburishvili A.G., Vorobyov A.A., Mikhin I.V. and et al. // Surgical journal. N. I. Pirogov, No. 6, 2007. – 27-28 pp.
2. Gomon M.S., Konoplia A.I., Lipatov V.A., Bezhin A.I., Loktionov A.L., Sukovatikh B.S., ... & Besedin A.V. (2008). The dynamic changes of immunological reactivity in model-based adhesive process in the abdominal cavity. Bulletin of new medical technologies (1).
3. Janczewski R.A. Adhesive disease / R.A. Janczewski. - M.: Medicine, 1989. – 186 pp.
4. The ISSUE OF PREVENTION OF POSTOPERATIVE ADHESIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY. Lipatov V.A. the Journal of scientific articles Health and education in the XXI century. 2002. – 256 pp.
5. Lazarenko V.A. et al. The Correction of immunity infringements in experimental-adhesive of the abdominal cavity with the use of Derinat and longidaza //Kurskiy scientifically-practical Herald" Human and health". – 2010. – №. 3.
6. Lazarenko V. A., et al. the Modern semiotics of acute adhesive intestinal-obstruction //Bulletin of experimental and clinical surgery. – 2016. – T. 5. No 2. – 292-296 pp.
7. The method of MODELING ADHESIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY. Lipatov V.A., Bezhin A. I., Myasnikov A. D., Pankrusheva T.A., Vedeneev Y. I. Patent for invention RUS 2217801 18.10.2001.
8. A METHOD of PREVENTING THE FORMATION OF POSTOPERATIVE ADHESIONS OF SEROUS CAVITIES. Lipatov V.A., Myasnikov A.A., Bezhin A.I., Pankrusheva T.A., Vedeneev Y. I. Patent for invention RUS 2225171 26.02.2002.
9. Sufiyarov I.F., Shafikov R.M., Nigmatzyanov S.S. et al. Anti-adhesion barriers in abdominal surgery // Kazan medical journal, No. 5, vol 89, 2008. – 697-700 pp.
10. Chekmazov I.A. Adhesive disease of the peritoneum. – M.: GEOTAR-Media, 2008. – 160 p.

CORRELATION OF THE SEVERITY OF ABDOMINAL ADHESION AND THE DEGREE OF DAMAGE TO THE PERITONEUM

Alidu Osman Saturson, Yala shadad Buhari

Dagestan State Medical University, Makhachkala, Russia

Postoperative adhesions of the abdominal cavity remain as a big problem. There is no current literature consensus, whether the damage affects a particular layer of the peritoneum (mesothelial, basal, muscle). It remains unclear whether a more or less intensive prevention of postoperative adhesions is required depending on the type of abdominal surgery.

The aim of the study was to correlate the severity of abdominal adhesion and the degree of damage to the peritoneum.

We used five male white Wistar mice series, 6 rodents, each weighing 120 - 150g. First group after euthanasia with ether, a midline laparotomy was performed. The abdominal wall spread apart and a scarification made with a traumatic rough surface objects weighting 50, 100, 200, 500 or 1000 grams. After this mechanical trauma to the peritoneum, the injured areas were excised and subjected to histological examination by standard technique. We observed that, object weighing 200g did a significant damage to mesothelial layer, 500g damaged the basal membrane, 1000g object damage the deep layers of the peritoneum and the underlying tissues.

Then the subjects were divided into 4 study groups: 3 experimental and control. Under sterile conditions and under ether anesthesia a midline laparotomy was performed. The wall of the ventral surface of the cecum, has its serous membrane removed using a special device until the "bloody dew." In the experimental group described above, using traumatic surfaces of different masses, scarification of the peritoneum was made adjacent to the intestinal surface of the abdominal wall, which was not done in the control group. Subjects of all groups derived from the experiment at day 14. At the end of the experimental period, the general condition of the subjects were evaluated, blood was sampled for clinical analysis, mononuclear index and leukocytic index of intoxication were calculated. Then post-mortem examination was carried out, and the severity of adhesions was assessed visually by using an automated method of semantic differentiation. Abdominal organs were taken from the carcasses, were then placed in a neutral formalin solution. Through histological techniques slices were made. The data obtained were processed statistically.

In the first group, the severity of adhesions by semantic differential was - 1.7 points; second and third group - 1.8; in the control group - 1.3. Significant differences $P < 0.001$.

Thus, by studying the Correlation of severity of abdominal adhesion and the degree of damage to the peritoneum was found in the course of our experiment. Consequently, slight damage to the peritoneum can lead to the

formation of adhesions in the abdominal cavity. We believe that adequate preventive measures should be carried out in any case, regardless of the type and degree of abdominal injury in any surgical intervention.

Литература

1. Воробьев А.А. Хирургическая анатомия оперированного живота и лапароскопическая хирургия спаек / А.А. Воробьев, А.Г. Бебурашвили. – Волгоград.: Гос. учреждение «Издатель», 2001. – С. 11-12.
2. Гомон М.С., Конопля А.И., Липатов В.А., Бежин А.И., Локтионов А.Л., Суковатых Б.С., ... & Беседин А.В. (2008). Динамические изменения иммунологической реактивности при моделированном спаечном процессе в брюшной полости. Вестник новых медицинских технологий (1).
3. Женчевский Р.А. Спаечная болезнь / Р.А. Женчевский. - М.: Медицина, 1989. – 186 с.
4. К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Липатов В.А. Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2002. – С. 256.
5. Лазаренко В.А. и др. Коррекция нарушений иммунитета при экспериментальном спаечном процессе брюшной полости с использованием дерината и лонгидазы // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2010. – № 3.
6. Лазаренко В.А. и др. Современная семиотика острой спаечной кишечной непроходимости // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2016. – Т. 5. – №. 2. – С. 292-296.
7. СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Липатов В.А., Бежин А.И., Мясников А.Д., Панкрушева Т.А., Веденьев Ю.И. Патент на изобретение RUS 2217801 18.10.2001
8. Чекмазов И.А. Спаечная болезнь брюшины. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 160 с.
9. Mettler L., Hucke J., Bojahr B. et al. A safety and efficacy study of a resorbable hydrogel for reduction of post-operative adhesions following myomectomy // Human Reproduction – 2008. – Vol. 23. – P. 1039-1100.

References

1. Vorobyev A.A. Surgical anatomy of operated abdomen and laparoscopic surgery for adhesions / A.A. Vorobyov, A.G. Beburishvili. – Volgograd.: State. institution "Publisher", 2001. – 11-12 pp.
1. Gomon M.S., Hemp A.I., Lipatov V.A., Bezhin A.I., Loktionov A.L., Knotty B.S., ... & Besedin A.V. (2008). Dynamic changes in immunological

reactivity during the simulated commissural process in the abdominal cavity. Bulletin of new medical technologies (1).

3. Janczewski R.A. Adhesive disease / R.A. Janczewski. - M.: Medicine, 1989. – 186 pp.

4. THE ISSUE OF PREVENTION OF POSTOPERATIVE ADHESIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY. Lipatov V.A. the Journal of scientific articles Health and education in the twenty-first century. 2002. 256 pp.

5. Lazarenko V.A. Correction of immunity infringements in experimental adhesive process of the abdominal cavity with the use of Derinat and longidaza // Kurskiy scientifically-practical Herald «Persons and his health». – 2010. – № 3.

6. Lazarenko B.A. and others. the Modern semiotics of acute adhesive intestinal obstruction //Bulletin of experimental and clinical surgery. – 2016. – T. 5. No 2. – 292-296 pp.

7. THE METHOD OF MODELING THE ADHESIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY. Lipatov V.A., Bezhin A.I., Myasnikov A.D., Pankrusheva T.A., Vedeneev Y. I. 2217801 invention patent Rus 18.10.2001.

8. Chekmazov.. Adhesive disease of the peritoneum. – M.: GEOTAR-Media, 2008. – 160 p.

9. Mettler I., Hucke J., Bojahr B. et al. Safety and effectiveness study of a resorbable hydrogel for reduction of postoperative adhesions after myomectomy // reproduction. – 2008. – Vol. 23. – P. 1039-1100.

АКУШЕРСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ С МИОМОЙ МАТКИ *Нуржанова Г.К., Сагиндикова Г.Н., Сапенова Д.К., Умарова Г.К.* АО «Медицинский университет Астана», Астана, Республика Казахстан

Цель: сохранение репродуктивной функции беременным с миомой матки.

Задачи: изучить особенности анамнеза и течения беременности у беременных с миомой матки; разработать тактику родоразрешения данной беременности; изучить исход родов. Материалы и методы: Обследованы 2 группы: I группа - беременные с миомой матки (50 женщин). II группа (20 беременных) - контрольная группа, родильницы, у которых беременность протекала без миомы матки.

Использованные методы: клинико-лабораторный, инструментальный, статический. Результаты: Средний возраст пациентов I группы составил $30,5 \pm 4,0$ лет, что статистически значимо не отличалось от среднего возраста пациентов II группы ($29 \pm 2,0$ лет). Паритет беременностей также не имел статистически значимой разницы между группами.

При изучении гинекологического анамнеза выявлено, что у пациентов

I первой группы в 2 раза чаще встречались гинекологические заболевания (у 8-16%) в сравнении с пациентами II группы (у 3 женщин - 8%). 94% женщин из основной группы состояли на учете по поводу миомы матки у участкового гинеколога. Кроме того, что у пациентов I первой группы в 2 раза чаще обнаружено бесплодие (у 5-10% женщин) в сравнении с пациентами II группы, (у 1-5%) женщин. В анализе родов выявлено, что в I группе роды в большинстве случаев завершились через естественные родовые пути (у 36-72% родильниц). В 1 (2%) случае имело место атоническое кровотечение, из-за чего проводился хирургический гемостаз и миомэктомия (удалены 2 узла). Оперативное родоразрешение в 1,8 раза чаще отмечалось в основной группе, причем в 57% кесарево сечение проведено в плановом порядке. Показаниями явились: несостоятельность рубца на матке (3-37,5%), со стороны плода: неправильное положение, крупные размеры плода (3-37,5%), а также множественная миома матки (2=25%). Экстренное кесарево сечение в основной группе составило 43%, показания были аналогичны (контрольной группой: дистресс плода (33%), преэклампсия (в I – 16%, во II – 33%). В I группе имело место выпадение петель пуповины (1-17%). Объем операции был расширен до миомэктомии в 6 случаях (30%) при плановом кесаревом сечении. Новорожденные родились живыми, в удовлетворительном состоянии. Средняя оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте жизни в двух группах

статистически значимо не отличалась. Все новорожденные находились на грудном вскармливании. Период адаптации у новорожденных протекал без особенностей. Послеродовой период у обследованных протекал без осложнений, родильницы выписаны в соответствующие сроки (ранняя выписка).

Вывод: оперативное родоразрешение путем кесарева сечения в 1,8 раза чаще наблюдается у беременных, имеющих миому матки, в связи с сопутствующей акушерской патологией (возраст беременной, неправильное положение плода, рубец на матке и размер миомы). У каждой третьей операция кесарева сечения расширялась до миомэктомии, с сохранением репродуктивного органа. Гистерэктомии не проводились.

Таким образом, при вдумчивом подходе как со стороны пациента, так и медицинского сотрудника, наблюдавшего за беременной с миомой матки, соблюдении регионализации, правильном выборе тактики родоразрешения и оказании качественной помощи имеются все условия для сохранения репродуктивной функции женщинам с миомой матки.

Литература

1. Стратегический подход к улучшению выживания и здоровья матерей и новорожденных. ВОЗ. - Женева, 2006. - С. 31.
- 2.

АЛГОРИТМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПРИВЫЧНЫМ ВЫВИХОМ ПЛЕЧА

Длясин Н.Г.

**ФГБУ «Саратовский НИИ травматологии и ортопедии»
Министерства здравоохранения РФ, Саратов, Россия**

Вывихи плеча являются наиболее распространённой травмой среди всех вывихов костей. В большинстве случаев привычным вывихом плеча страдают лица наиболее активного трудоспособного возраста от 20 до 40 лет. Лечение больных с привычным вывихом плеча является актуальной проблемой, так как частота послеоперационных рецидивов вывихов достигает от 3,5-17% и более [1].

Цель: выработать алгоритм хирургического лечения больных с привычным вывихом плеча.

Материалы и методы. Обследовано и прооперировано 50 больных с привычным вывихом плеча, из них 44 пациента с посттравматическими привычными вывихами [2]. Проводилось клиническое обследование пациентов, лучевая диагностика (УЗИ, КТ, ЯМРТ, рентгенография). Самым информативным способом диагностики явилась компьютерная томография (отчётливо определялись костные дефекты или переломы суставного отростка лопатки и головки плечевой кости).

При дефекте переднего края суставного отростка лопатки производили модифицированные способы Bristow-Laterjet, разработанные в СарНИИТО [3, 4]. При дефекте заднего края суставного отростка лопатки производили пластику новым способом лечения заднего привычного вывиха плеча [5]. При повреждении ключично-акромиального сочленения первой степени дополнительно производили пластику данного сочленения предложенным нами новым способом лечения привычного вывиха плеча [6].

При отсутствии костных дефектов суставного отростка лопатки производили ЯМР томографию плечевого сустава. При имеющихся повреждениях Банкарта (переднего или заднего) производили артроскопическую стабилизацию по Банкарту, при перерастяннутом участке капсулы сустава производили её коблацию или создавали из капсулы дополнительную плечелопаточную связку [7].

Результаты. Отдалённые результаты лечения изучены у всех больных. Срок наблюдения составил от трёх до пяти лет. У больных с посттравматическими привычными вывихами плеча послеоперационных рецидивов вывихов плеча не отмечено. У всех пациентов отмечалась полная амплитуда движений в оперированном плечевом суставе.

У больных с диспластическими вывихами плеча также рецидивов вывихов не отмечено. У всех больных была полная амплитуда движений в плечевом суставе.

Заключение. Разработанный алгоритм хирургического лечения позволяет выбрать оптимальный способ операции для больных с привычным вывихом плеча в зависимости от локализации и степени поражений элементов плечевого сустава.

Литература

1. Выбор способа хирургического лечения привычного вывиха плеча. – Дзясин Н.Г. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. Санкт-Петербург, 2000. – 26 с.
2. Тактика хирургического лечения привычного вывиха плеча. Дзя-син Н.Г., Коршунова Г.А., Максюшина Т.Д., Ионова Т.А., Титова Ю.И., Сумин Д.Ю.
отчет о НИР № 02201350109 от 19.12.2012 (Минздрав России).
3. Модифицированные способы Bristow-Laterjet при лечении переднего привычного вывиха плеча. Дзясин Н.Г. Травматология и ортопедия России. 2008. № 4 (50). – С. 35-40.

АЛЛО- И АУТОПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
*Колесников С.А.⁽³⁾, Шестаков И.А.⁽²⁾, Волков Д.В.⁽¹⁾, Захаров О.В.⁽¹⁾,
Пахлеваян В.Г.⁽¹⁾*

**ФАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, кафедра факультетской хирургии,
г. Белгород, Россия⁽¹⁾;
кафедра общей хирургии, г. Белгород, Россия⁽²⁾;
ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» , г. Белгород,
Россия⁽³⁾**

Цель работы: оценить необходимость, достаточность и целесообразность некоторых вариантов аллопластики, также значение аутопластики в современной герниологии.

Материалы и методы. Нами было произведено 7013 оперативных вмешательств по поводу вентральных грыж. Грыж передней брюшной стенки было 6995, грыж тазового дна – 1, диафрагмальных – 17. В 221 случаях применена аутопластика. При паховых и бедренных грыжах применялись способы Кукуджанова-Shouldice, Колесникова, Postempsky. При пупочных, грыжах белой линии живота, послеоперационных малых размеров – простое сшивание краев дефекта. Показанием для аутопластики был молодой и старческий возраст. Для аллопластики использовались проленовые эксплантаты фирм «Линтекс» и «Ethicon». Фиксацию осуществляли проленовыми нитями № 3-0 и 2-0. При паховых грыжах применялся способ Lichtenstein; при бедренных – глубокая паховая аллопластика; при пупочных и послеоперационных – аллопластика sublay и оригинальный вариант onlay.

Результаты и их обсуждение. В отдаленном периоде у больных после аутопластики констатировано 3 рецидива, после аллопластики – 2 рецидива, 7 инфильтратов, 2 невралгии. Видеолапароскопические способы – не используем, предпочитаем глубокую паховую пластику из мини-доступа. После пупочной аллопластики – 2 рецидива. После аллопластики методом onlay констатировано частое скопление серозной жидкости в поверхностных слоях раны. В 6 случаях истинных и ложных диафрагмальных грыж дополнительные пластические материалы не использовали. При 4 параэзофагеальных грыжах ограничивались удалением грыжевого мешка и сшиванием ножек диафрагмы. При 7 аксиальных грыжах – СПВ и фундопликацию по Черноусову.

Заключение. Разницы в использовании различных эксплантатов на основе полипропилена не выявлено. Оптимальным вариантом аллопластики при паховых грыжах является метод Lichtenstein; при бедренных грыжах – глубокая паховая аллопластика; при пупочных, грыжах белой линии живота, послеоперационных – аллопластика sublay.

Для диафрагмальных грыж достаточной является аутопластика, при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы применение дополнительных пластических материалов нецелесообразно.

Литература

1. Жебровский В.В., Эльбашир М.Т. Хирургия грыж живота и эвентраций. Симферополь: Бизнес-Информ. 2002. – 440 с.
2. Емельянов С.И., Протасов А.В., Рутенбург Г.М. Эндохирургия паховых и бедренных грыж. - СПб.: Фолиант. 2000. – 220 с.
3. Колесников С.А. Концепция аутогерниопластики в лечении наружных брюшных грыж // Дис. док. мед. наук. Курск. 1999. – 377 с.

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО СТЕНОЗА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Суковатых Б.С., Солянина В.А., Лопатьева А.Р.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

Ишемия мозга атеросклеротического генеза – серьёзная проблема в связи с риском развития инсульта, высокой летальностью и полной или частичной утратой трудоспособности. Целью исследования является оценка качества жизни больных, прооперированных по поводу гемодинамически значимого стеноза внутренней сонной артерии (ВСА). Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезни 40 больных в возрасте от 44 до 76 лет с гемодинамически значимым атеросклеротическим стенозом ВСА. Больные первой группы перенесли каротидную эверсионную эндартерэктомию (КЭЭ), второй — стентирование ВСА. Было проведено сравнение жалоб, данных лабораторных и инструментальных методов исследования. Качество жизни оценивали с помощью опросника SF-36. Проведена статистическая обработка полученных данных с применением методик описательной и вариационной статистики. Из 22 больных, перенесших стентирование, 10 человек перенесли ишемический инсульт за 1-2 месяца до госпитализации по поводу стентирования. Большая часть (73,7%) больных 1 группы имели 2 степень нарушения мозгового кровообращения, 1 человек перенёс инсульт. По данным ультразвуковых методов исследования, в первой группе степень стеноза составила в среднем $64,2 \pm 1,16\%$, во второй — $85,1 \pm 2,4$. Полное исчезновение симптомов ишемии наблюдалось у 15,8% и 9,1% пациентов соответственно после КЭЭ и стентирования. 68,4% больных, перенесших КЭЭ, и 31,8% пациентов после стентирования отмечали появление кратковременных симптомов ишемии, которые исчезали самостоятельно. Симптомы ишемии требуют медикаментозной коррекции в 15,8% случаев у пациентов после КЭЭ и в 31,8% случаев после стентирования ВСА. КЭЭ и стентирование ВСА дают значительное улучшение качества жизни больных с нарушениями мозгового кровообращения. Показатели по всем шкалам опросника SF-36 после операции выше у больных после стентирования. Однако результаты лечения больных, которым была проведена КЭЭ, лучше, чем результаты стентирования, что может быть связано с более тяжелым течением болезни у больных 2 группы, а также с особенностью проведения открытой операции: удаление всей внутренней оболочки ВСА практически исключает остаточный стеноз, тогда как после стентирования неизбежен стеноз от 10 до 20%.

Литература

1. Авилова М.В. Непосредственные результаты хирургической коррекции стенозов внутренней сонной артерии у больных с мультифокальным атеросклерозом / М.В. Авилова, Е.Д. Космачева, В.К. Зафираки // Кубанский научный медицинский вестник. - 2013. - № 5. - С. 16-21.
2. Дуданов И.П. Хирургическое лечение сочетанного стеноза и извитости внутренней сонной артерии в остром периоде ишемического инсульта / И.П. Дуданов, С.В. Ордынец // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2013. - №3. - С. 1-8.
3. Дюба Д.Ш. Оценка отдаленных результатов хирургической коррекции внутренней сонной артерии у больных с ишемическим инсультом в анамнезе // Д.Ш. Дюба // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2011. - № 4. - С. 448-453.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Иванов С.В., Розберг Е.П., Язубов Г.В.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия

Современное состояние проблемы лечения хронического панкреатита (ХП), помимо разнообразных этиопатогенетических аспектов заболевания, отличается продолжающимся поиском рациональной лечебной тактики, что обусловлено недостаточной эффективностью консервативного лечения и неудовлетворенностью результатами хирургических вмешательств.

Цель работы: определить основные показания к хирургическому лечению ХП и улучшить результаты хирургического лечения больных ХП.

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 78 больных ХП, находившихся на лечении в клинике хирургических болезней № 1 на базе отделения общей хирургии БМУ Курской областной клинической больницы с 1998 по 2016 гг. Среди них мужчин было 65 (83,3%), женщин 13 (16,7%). Средний возраст пациентов = $45 \pm 0,6$ лет.

Диагностическая программа включала лабораторные анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови), а также инструментальные исследования: ультразвуковое исследование, спиральную компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию.

В послеоперационном периоде имели место следующие осложнения: кровотечение у 1 (1,3%) больного, несостоятельность гепатоеюнального анастомоза (НГЕА) у 3 (3,85%) пациентов, несостоятельность панкреатоеюнального анастомоза (НПЕА) у 1 (1,3%), распространенный перитонит – у 4 (5,1%), местный перитонит у 5 (6,4%) больных.

Летальные исходы отмечены у 7 больных. Причиной смерти у 3 пациентов явилась несостоятельность билиодигестивного анастомоза и в 1 случае панкреато-тонкокишечного. Один пациент погиб в результате тотального панкреонекроза хвоста и тела поджелудочной железы и 2 – от тромбоэмболии легочной артерии.

Следует отметить, что ПДР является более травматичным методом оперативного лечения ХП, связанным с развитием тяжелых осложнений. Более щадящим и достаточно эффективным методом является операция Фрея. Однако ее использование связано с

опасностью недиагностирования злокачественной опухоли ПЖ с последующей генерализацией процесса и гибелью пациента.

Литература

1. Буриев И.М., Вишневский В.А., Щеголев А.И., Тинькова И.О., Данилов М.В. Хронический панкреатит с преимущественным поражением головки поджелудочной железы // Анн. хир. гепатол.: Тез. докл. X Юбилейной международной конференции хирургов-гепатологов России и стран СНГ. – 2003. – Т. 8, № 2. – С. 188–189.
2. Блажитко Е.М., Добров С.Д., Штофин С.Г., Толстых Г.Н., Полякевич А.С. Выбор способа операции при хроническом панкреатите // Анн. хир. гепатол.: Тез. докл. X Юбилейной международной конференции хирургов-гепатологов России и стран СНГ. – 2003. – Т. 8, № 2. – С. 185–186.
3. Иванов С.В., Горбачева О.С., Розберг Е.П., Иванов И.С., Голиков А.В., Ягубов Г.В., Зубрицкий В.Ф., Звольская Н.М. Хирургическое лечение больных хроническим панкреатитом – панкреатодуоденальная резекция или операция Фрея // Вестник хирургической гастроэнтерологии. – 2015, № 4. – С. 84-87.
4. Иванов С.В. и др. Анализ результатов лечения больных хроническим панкреатитом //Innova. – 2016. – №. 1 (2).

АНАЛИЗ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Тарасова Н.К.^(1,2), Лочехина Е.Б.⁽²⁾, Мирзоева Н.А.⁽²⁾

ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.

Волосевич», Архангельск, Россия⁽¹⁾;

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Северный государственный
медицинский университет», Архангельск, Россия⁽²⁾**

Лечение грыж передней брюшной стенки до настоящего времени остается важной проблемой хирургии. Применение синтетических протезов при оперативном лечении грыж значительно снизило процент рецидивов, но реакция на имплантацию существенно повышает количество раневых послеоперационных осложнений (1, 2). В клинике факультетской хирургии, расположенной на базе ГБУЗ «Первая городская клиническая больница № 1», проведен ретроспективный анализ раневых осложнений хирургического лечения грыж передней брюшной стенки за период 2006-2015 годов. За данный период выполнено 4174 грыжесечения. В послеоперационном периоде развились раневые осложнения у 74 (1,8%) больных. Из них у 32 (0,8%) больных - гнойные осложнения, а у 42 (1,0%) образовались серомы. Средний возраст больных в группе с раневыми осложнениями составил 62,18 ($\pm 1,4$) года, что достоверно выше возраста больных в группе без раневых осложнений - 52,3 $\pm 1,2$ ($p < 0,05$). В структуре гнойных осложнений были установлены следующие осложнения: формирование абсцесса у 17 (53,1%) пациентов, нагноение раны у 5 (15,6%) больных, образование лигатурных свищей у 5 (15,6%) пациентов и некроз краев раны у 1 (3,1%) больного. Раневые осложнения развились преимущественно у больных с грыжевыми дефектами более 5 см - у 49 (66%) больных, которым была имплантирована сетка размерами более 15*15 см. В группе больных с раневыми осложнениями преобладали пациенты, которым выполнялась надапоневротическая пластика сетчатым протезом - у 64 (87%) больных и у пациентов, которым во время операции не проводилось дренирование раны - у 60 (81%). В послеоперационном периоде у пациентов с серомами использовали пункционное удаление экстравазата под УЗИ-навигацией. У пациентов с гнойными осложнениями проводили вскрытие гнойных очагов с бактериологическим исследованием содержимого раны и назначением антибиотиков по чувствительности.

Литература

1. Гостевской А.А. Нерешенные вопросы протезирования передней брюшной стенки при грыжах / А.А. Гостевской // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. – 2007. – № 6. – С. 93–95.
2. Мирзабемян Ю.Р. Прогноз и профилактика раневых осложнений после пластики передней брюшной стенки по поводу послеоперационной вентральной грыжи / Ю.Р. Мирзабемян, С.Р. Добровольский // Хирургия. – 2008. – № 1. – С. 66–71.

АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

*Мамошин А.В.⁽¹⁾, Борсуков А.В.⁽²⁾, Мурадян В.Ф.⁽¹⁾, Альянов А.Л.⁽¹⁾,
Аболмасов А.В.⁽¹⁾, Данилова М.С.⁽¹⁾*

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Медицинский институт, Орел, Россия⁽¹⁾;
Смоленский государственный медицинский университет,
Смоленск, Россия⁽²⁾

Актуальность. Вопросы диагностики и лечения злокачественного поражения проксимальных отделов желчных протоков являются одними из наиболее актуальных в билиарной хирургии. Данная опухоль составляет около 10-25% всех новообразований протоков печени.

Цель: проанализировать и оценить возможности антеградных миниинвазивных технологий в диагностике и лечении пациентов с злокачественным поражением проксимальных отделов желчных протоков.

Материал и методы. Проведен анализ диагностики и лечения 14 пациентов с холангиокарциномой проксимальных отделов желчных протоков, осложненной синдромом механической желтухи, которые находились под нашим наблюдением в период с января 2010 г. по декабрь

2015 г. Среди них женщин было 6 (43%), мужчин – 8 (57%). Возраст больных колебался в пределах от 43 до 82 лет. Всем больным выполнялось комплексное обследование, включающее УЗИ брюшной полости, ЭГДС, по показаниям ЭРХПГ и МСКТ. На первом этапе всем больным выполнялось антеградное наружное дренирование желчевыводящих путей с рентгенологическим исследованием желчевыводящей путей, уточнением уровня и степени блока. Вопрос о дальнейшем оперативном лечении ставился лишь после снижения уровня билирубина крови и стабилизации состояния пациентов. В ряде случаев проводимые чрескожные чреспеченочные вмешательства явились окончательным видом хирургического лечения, направленным на улучшение качества жизни.

Результаты исследования. Всего было выполнено 28 минимально инвазивных вмешательств. 19 больным (67,8%) наложена наружная холангиостомия, 3 больным (10,7%) выполнялось наружно-внутреннее дренирование протоков. В 1 случае (3,6%) имела место антеградная баллонная пластика. Антеградное эндобилиарное стентирование проводилось в 4-х случаях (14,3%), в 1 случае (3,6%) наложена чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия. Двум пациентам было выполнено билобарное стентирование с

предварительным раздельным наружным желчеотведением в связи с разобщением долевых протоков. Среди осложнений следует отметить: дислокацию холангиостомического дренажа - 5 случаев (35,7%), острый холецистит - 1 случай (7,1%), гидроторакс - 2 случая (14,2%); околопеченочную билому - 1 случай (7,1%). У 1 больного (7,1%) в отдаленные сроки после стентирования, в связи с прорастанием эндобилиарного стента имел место рецидив механической желтухи. Летальный исход возник в 1 (7,1%) случае.

Выводы. Ультразвуковое исследование дает нам возможность своевременно и эффективно определить уровень обструкции билиарного тракта, обосновать тактическую позицию в применении мини-инвазивных технологий. Антеградные мини-инвазивные вмешательства при опухолевом поражении проксимальных отделов желчных протоков позволяют своевременно купировать билиарную гипертензию, улучшить общее состояние пациентов и определить дальнейшую тактику лечения.

АНТЕГРАДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Мамошин А.В., Борсуков А.В., Мурадян В.Ф., Аболмасов А.В.,
Альянов А.Л., Данилова М.С.*

**ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет»
им. И.С. Тургенева, Орел, Россия**

Рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных типов онкологического поражения гепатопанкреатодуоденальной зоны и чаще поражает головку органа – 62,7-87%, реже – тело 11-28,9% и хвост 2,1-11%.

Цель: оценка возможностей антеградных миниинвазивных технологий в диагностике и лечении больных с опухолевым поражением поджелудочной железы, осложненным механической желтухой.

Материалы и методы. Проведен анализ эффективности диагностики и лечения 107 пациентов с опухолевым поражением головки поджелудочной железы, осложненным синдромом механической желтухи. Уровень билирубина при поступлении в исследуемой группе больных колебался от 92 до 783 мкмоль/л. По данным ультразвукового исследования у всех больных отмечались признаки актуальной билиарной гипертензии. Гипербилирубинемия и билиарная гипертензия требовали проведения срочных хирургических вмешательств, направленных на прогнозируемо эффективную и управляемую билиарную декомпрессию. Диагностированная билиарная гипертензия, являлась основанием для антеградного дренирования желчных путей под сонофлуороскопическим контролем. Во всех наблюдениях чрескожные чреспеченочные вмешательства включали в себя не только лечебную, но и диагностическую нагрузку.

Результаты. Чувствительность, специфичность, точность ультразвуковой диагностики рака поджелудочной железы, как причины механической желтухи, составили соответственно 88,9%, 85,4%, 83,7%. Чувствительность, специфичность и диагностическая точность рентгенологического исследования во время антеградного вмешательства при злокачественном поражении головки поджелудочной железы составила соответственно 91,2%, 80,1% и 85,3%. Выполнено 136 минимально инвазивных вмешательств. По характеру выполненных вмешательств в 81 случае (60,6%) выполняли наружную холангиостомию, наружно-внутреннее дренирование протоков в 15 случаях (10,6%), в 36 случаях (26,5%) - антеградное эндобилиарное стентирование, в оставшихся 4 случаях (2,3%) выполнена чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия. При антеградном эндобилиарном стентировании общего желчного протока использовали металлические нитиновые самораскрывающиеся

стенты. Неоперабельным больным с распространенным опухолевым процессом, или имеющим тяжелые сопутствующие заболевания, стентирование внепеченочных желчных протоков послужило альтернативой хирургическому лечению и окончательным паллиативным методом декомпрессии билиарного тракта. После проведенных минимально инвазивных вмешательств у 15 больных развились осложнения и были представлены в 9 случаях (8,7%) дислокацией холангиостомического дренажа; в 3 случаях (2,9%) – острым обтурационным холециститом; в 2 случаях (1,9%) - острым панкреатитом и у одного больного (0,97%) гидротораксом. Летальный исход произошел в 5 случаях (4,9%) и был связан с прогрессированием полиорганной недостаточности.

Выводы. Антеградные минимально инвазивные вмешательства, которые включают в себя методы лучевой диагностики, у больных с опухолевым поражением поджелудочной железы, осложненным синдромом механической желтухи, позволяют своевременно уточнить этиологический характер заболевания, купировать билиарную гипертензию, улучшить общее состояние пациентов и определить дальнейшую тактическую позицию в лечении данной категории больных.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Ефременков А.М.

Детская областная клиническая больница, Белгород, Россия

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) занимает одно из ведущих мест в структуре нозологических форм хирургической инфекции у детей, являясь одним из самых тяжёлых гнойно-септических заболеваний детского возраста. Согласно данным разных авторов, летальность при данном заболевании остаётся на высоком уровне и составляет 1,3%, достигая 2-11% при тяжёлых септических формах. Массивное поражение костной ткани, возможная хронизация процесса зачастую приводит к тяжелым ортопедическим осложнениям. Несмотря на продолжающиеся дискуссии о патогенезе ОГО, этиологическая характеристика очага остеомиелита является первостепенной задачей для своевременного назначения адекватной антибиотикотерапии у конкретного больного.

Целью нашего исследования послужило изучение современной микробиологической характеристики очага остеомиелита.

В нашем отделении за период с 2010-го по 2015 год включительно проходило лечение 59 детей с ОГО. Из них половина всех случаев пришлась на ранний возраст – 29 детей, и 30 пациентов – на возраст старше 3 лет. Большинство больных поступало в стационар с септикопиемической формой ОГО (И.С. Венгеровский, 1959) – 44 (74,6%), местно-очаговая форма имела место у 11 (18,6%) пациентов и у 4 детей (6,8%) – септико-токсическая форма заболевания.

Бактериологическое исследование проведено 42 пациентам. Забор материала не производился детям ранней возрастной группы с клиническими проявлениями ОГО без параоссальной флегмоны и артрита смежного сустава. Необходимо отметить, что в анамнезе заболевания этих детей практически у всех имелись гнойничковые поражения кожи, предшествующие развитию ОГО, что позволяет судить о кокковой природе возбудителя.

Из всех положительных посевов монокультура возбудителя имело место в 92% случаев. По нашим данным, в этиологии ОГО ведущее место занимает *S. aureus*, который присутствовал в 29 (69%) посевах, причем у 25 больных высевался в виде монокультуры и в 4 (9,2%) наблюдениях в ассоциации: с *Candida albicans* – 2 больных; с *E. Coli* – 1; *S. epidermidis* – 1. *S. epidermidis* являлся моновозбудителем ОГО у 2 детей. По нашим данным, не уступает своих позиций и *P. aeruginosa*, которая вызвала тяжелые ОГО у 3 пациентов, у двух из которых диагностирована септико-токсическая форма. Бактерии рода *Enterococcus* явились

причиной ОГО в 2 наблюдениях. У одного пациента раннего возраста причиной тяжелой формы ОГО явился *St. pyogenes*.

Идентифицировать возбудителя ОГО не всегда представляется возможным, так по данным 5 (11,9%) исследований не дали результата. Этот факт может говорить об анаэробном возбудителе, типировать которых в состоянии не все лаборатории.

Таким образом, наше исследование подтвердило ведущую роль стафилококковой этиологии ОГО у детей, что позволяет своевременно начинать стартовую эмпирическую антибактериальную терапию. При токсических формах ОГО необходимо думать о грамотрицательных микроорганизмах или их ассоциациях с золотистым стафилококком.

Литература

1. Патофизиологические и клинические аспекты острого гематогенного остеомиелита у детей / О.Л. Морозова, Н.П. Чеснокова, Д.А. Морозов, Ю.В. Филиппов. – Издательство Саратовского медицинского университета, 2005. – С. 78.
2. Притуло, Л.Ф., Ретроспективный анализ диагностики и лечения острого гематогенного остеомиелита у детей с учетом клинико-анамнестических и микробиологических характеристик. Л.Ф. Притуло // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 6 (75). – С 24-30.
3. Современные особенности этиопатогенеза острого гематогенного остеомиелита у детей и оптимизация лечения больных / С.Н. Гисак, А.А. Шестаков, Д.А. Баранов, Е.А. Скларова // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. XIX. – № 2. – С. 106-108.

БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Белозерова А.В., Григорьян А.Ю.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия
(Грант МК-5245.2016.7)**

В настоящее время гнойные осложнения являются основной причиной затяжного течения послеоперационного периода и существенного увеличения материальных затрат на лечение, что приобретает большую социально-экономическую значимость. Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте ранозаживляющие свойства левомеколя, бензалкония хлорида (БХ) с натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ), БХ с NaКМЦ и с метронидазолом, БХ с полиэтиленоксидом (ПЭО), БХ с ПЭО и с метронидазолом на

раневой процесс. Материалом для исследования послужили мази, составы которых разработаны совместно коллективами кафедр фармацевтической технологии и оперативной хирургии и топографической анатомии им. профессора А.Д. Мясникова КГМУ. Эксперимент выполнен на модели гнойной раны у 150 крыс породы Вистар, которые были разделены на 5 серий по 30 особей в каждой. Лечение различными составами препаратов проводили ежедневно в течение 15 дней. В процессе исследования были использованы планиметрический (динамика площади ран, динамика скорости заживления ран) и микробиологический методы (обсемененность ран). К 15 суткам в серии с БХ+NaKMЦ площадь ран уменьшалась на 2,8% больше, чем в серии с Левомеколем, а в серии с БХ+метронидазол+NaKMЦ – на 6,9%, БХ+ПЭО – на 7,2%, БХ+ПЭО+метронидазол – на 4,6%. В ходе сравнительного анализа полученных результатов было выяснено, что все комбинации, кроме БХ+NaKMЦ, показали максимальную скорость заживления ран в первую фазу раневого процесса, а во второй фазе максимальную скорость заживления показала только комбинация БХ+NaKMЦ. На основании микробиологического метода исследования было выявлено, что в опытных сериях обсемененность ран была в 1,5 раза ниже, чем в серии использования мази Левомеколь к 10 суткам наблюдения, среди которых комбинация БХ+ПЭО показала наилучший результат. Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что использование при лечении гнойных ран иммобилизованных препаратов с БХ на основе NaKMЦ и ПЭО способствует скорейшему уменьшению микробной обсемененности ран, площади раневой поверхности и увеличению скорости заживления ран по сравнению с использованием мази «Левомеколь».

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ЛИНТЕКС-МЕЗОГЕЛЬ»

Лазаренко В.А., Гамазинов И.Н., Липатов В.А., Привалова И.Л.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия

Выраженные клинические проявления дискогенных заболеваний позвоночника в 70% случаев ведут к временной утрате трудоспособности [1], и значительная часть пациентов (до 10 %) становятся инвалидами. На базе нейрохирургического отделения Курской областной клинической больницы ежегодно проводится более 500 операций по поводу «грыжи диска». Для повышения эффективности лечения грыж межпозвонковых дисков и предотвращения избыточного

рубцеобразования с компрессией нервных структур, эпидурального фиброза и развития синдрома фиксированного корешка, используем «Линтекс-Мезогель» - водную натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы. Данный препарат обладает высокой биологической инертностью и гидрофильностью, он препятствует адгезии фибробластов и избыточному рубцеобразованию. Материалы и методы: изучены результаты хирургического лечения 88 больных с поражением поясничного отдела позвоночника, грыжами дисков сегментов L4-L5 или L5-S1, диск-радикулярной компрессией. Наблюдения разделены на две группы. Первая группа (основная): выполнена операция микродискэктомия с помещением «линтекс мезогель» парорадикулярно и остаточную полость интерляминэктомии (44 наблюдения). Вторую (контрольную) группу составили больные (44 наблюдения), которым в остаточную полость вводился физиологический раствор. Группы идентичны по возрасту и клиническому проявлению заболевания. Септических осложнений в ближайшем и отдаленном периоде не выявлено. В первые 10 дней регресс болевого синдрома не обнаруживал значительных различий между основной и контрольной группами. Через 30 дней в контрольной группе регресс радикулярного болевого синдрома составил 90,2%, а в основной - 80,8%. Через год в основной группе регресс чувствительных и двигательных расстройств составил 84,1%, а в контрольной группе - 68,9%. ($p < 0,05$). Заключение. Применение водного геля карбоксиметилцеллюлозы («Линтекс-Мезогель») при поясничной микродискэктомии улучшает отдаленный результат хирургического лечения.

Список литературы

1. Белова А.Н. Нейрореабилитация: Руководство для врачей. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Антидор, 2002. - 736 с.
2. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (Вертеброневрология) : рук. для врачей / Я. Ю. Попелянский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : МЕДпресс-информ, 2003. — 627 с.
3. Хелимский А. М. Хронические дискогенные болевые синдромы шейного и поясничного остеохондроза / А. М. Хелимский. — Хабаровск : РИОТИП, 2000. — 256 с.

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРИН-КОЛЛАГЕНОВОЙ СУБСТАНЦИИ

*Горский В.А., Воленко А.В., Поливода М.Д., Ованесян Э.Р.,
Череватенко А.М.*

**Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия**

Фибрин-коллагеновая субстанция «ТахоКомб» (ФКС) используется нами с 1995 года для гемостаза, укрепления кишечного шва и закрытия перфоративных отверстий.

Материал. По всем разделам был выполнен эксперимент на 130 собаках, 60 крысах и 5 свиньях. В клинике ФКС использован у 475 больных.

Результаты. В эксперименте по гемостазу показано преимущество ФКС перед коллагеновой губкой, таботампом, гелласпоном, тромбином. ФКС останавливал кровотечение из ран паренхиматозных органов значительно быстрее и надежнее. Морфологически установлено, что ФКС стимулирует процессы ангиогенеза в подлежащей ткани.

Укрепление кишечного шва ФКС проводили в остром и хроническом опыте, а также при экспериментальном перитоните. Показано, что ФКС повышает механическую прочность кишечного шва в 3 раза и снижает его микробную обсемененность в 16 раз.

Экспериментально был обоснован метод закрытия перфоративных язв в области привратника без предварительного ушивания.

Клиника. В клинической практике гемостатический эффект ФКС был использован у 289 больных при традиционных и лапароскопических операциях. Аппликацией ФКС достигали полного гемостаза при повреждениях селезенки (75 больных), кровотечениях из ткани поджелудочной железы (49 больных), кровотечениях из ткани печени (28 больных), кровотечениях из ложа желчного пузыря (113 больных) и прочих (24 больных). Гемостаз был достигнут во всех случаях.

Укрепление кишечных швов на всех отделах желудочно-кишечного тракта в условиях перитонита и кишечной непроходимости выполнили у 181 пациента. Несостоятельность наблюдали в 2 случаях (1,1%).

В клинике нам удалось закрыть перфоративное отверстие ФКС без ушивания у 5 больных. Осложнений не наблюдали. Исходя из экспериментальных данных, мы сделали вывод, что закрытие перфоративных язв без ушивания целесообразно в следующих ситуациях: 1) перфоративное отверстие должно располагаться в зоне привратника, когда ушивание может привести к стенозу; 2) при выраженном перифокальном воспалении, когда имеется высокий риск прорезывания швов.

Заключение. Экспериментальное изучение и двадцатилетний клинический опыт использования ФКС показали ее универсальность и незаменимость в различных сложных интраоперационных ситуациях.

ДУОДЕНАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Кригер А.Г.

**ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, Москва, Россия**

Введение. Дуоденальная дистрофия (ДД) - неопухоловое воспалительное кистозное поражение стенки двенадцатиперстной кишки (ДПК) с характерной локализацией в нисходящей части кишки. При описании ДД в литературе используют различные термины: парадуоденальный панкреатит, “groove” (бороздчатый) панкреатит, миоаденоматоз ДПК, кистозная дистрофия гетеротопичной поджелудочной железы; панкреатическая гамартома ДПК; парадуоденальная киста; параампулярные кисты стенки ДПК. Патогенез изменений стенки ДПК при ДД до конца не ясен. Пока остается без ответа вопрос, является ли ДД отдельной нозологической формой или осложнением ХП. Лечебная тактика при ДД также далека от разрешения и варьирует от консервативной терапии и эндоскопических вмешательств до панкреатодуоденальной резекции (ПДР).

Цель. Изучение патогенеза кистозно-воспалительной трансформации стенки двенадцатиперстной кишки (ДПК) при хроническом панкреатите (ХП), описываемой как «дуоденальная дистрофия» (ДД), и повышение эффективности хирургического лечения при данном заболевании.

Материалы и методы. Обследовано 532 больных ХП, находившихся на лечении в Институте хирургии им. А.В. Вишневского с 2004 по февраль 2016 года. ДД была диагностирована у 82 (15,4%) больных. Диагноз установлен по данным УЗИ, КТ, МРТ и эндоУЗИ. Оперировано 74 пациента после консервативного лечения с медианой продолжительности 2 года. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) произведена 34 больным, органосохраняющие операции - 36 больным: различные резекции ДПК - 21, резекция головки поджелудочной железы (ПЖ) в различных модификациях - 15. Паллиативные операции выполнены 4 больным. Диагнозы ХП и ДД верифицированы при морфологическом исследовании операционного материала. Не оперированы и находятся под наблюдением 8 больных. Отдаленные результаты лечения изучены у 47 человек, медиана наблюдения составила 49,9 мес.

Результаты. При гистологическом исследовании ДД в 69,9% случаев ассоциирована с бороздчатым панкреатитом, эктопия ткани поджелудочной железы выявлена в 30,1% наблюдений. ДД сочеталась с ХП по результатам морфологического исследования в 92,6% случаев. Клинические проявления ДД не зависели от причины ее возникновения и манифестировали симптомокомплексом, характерным для ХП: боли были у 98,8% больных, потеря массы тела – 61,7%, нарушения проходимости ДПК – 35,8%, билиарная гипертензия – 34,1%. Осложнения развились у 26 (35,1%) оперированных больных: после ПДР - 32,4%, резекций ДПК – 66,7% (умер 1 больной). Общая послеоперационная летальность составила 1,37%. При оценке отдаленных результатов полное исчезновение симптоматики было у 66% человек, значительное улучшение – 32%, отсутствие эффекта – 2%.

Заключение. В большинстве наблюдений ДД ассоциирована с бороздчатым панкреатитом, реже – с эктопией ткани поджелудочной железы в стенку ДПК. В подавляющем большинстве случаев ДД возникает у больных ХП. Лечение больных, страдающих ХП и ДД, должно начинаться с консервативной терапии. Хирургическое лечение показано при сохраняющихся болях и наличии осложнений ХП, нарушении проходимости ДПК. Операциями выбора являются панкреатодуоденальная резекция и резекции головки ПЖ.

ЗНАЧЕНИЕ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Шестопалова А.Д.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.
Горького, Донецк, Украина (ДНР)

Обтурационная желтуха является осложнением большого количества заболеваний, тактика лечения которых не всегда одинакова. Учитывая высокую летальность среди больных с обтурационной желтухой, своевременная и рациональная коррекция эндогенной интоксикации при обтурационной желтухе дает возможность улучшить эффективность лечения. Цель: оптимизировать тактику лечения больных с обтурационной желтухой в зависимости от тяжести синдрома эндогенной интоксикации.

Материалы и методы. Работа выполнена на ретроспективном анализе 338 историй болезни пациентов в возрасте от 20 до 87 лет с механической желтухой, находившихся на обследовании и лечении в Центральной городской клинической больнице № 16 г. Донецка в 2012-2016 гг. В зависимости от способа декомпрессии желчевыводящих путей все исследуемые были распределены на две основные группы: 1 группа - 262 пациента (77,5%), которым билиарный блок был ликвидирован при помощи эндоскопических транспапиллярных вмешательств, 2-я - 76 больных (22,5%), у которых проведена традиционная открытая декомпрессия желчных путей. Проведено сравнение этих способов дренирования билиарного тракта у больных желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой разной степени тяжести. Была изучена динамика ряда показателей интоксикации, холестаза и цитолиза гепатоцитов после декомпрессии.

Выводы. Прямо-пропорциональная зависимость между степенью аутоинтоксикации и степенью тяжести ОЖ позволяет провести скрининг-диагностику патологического процесса и определить хирургическую тактику в кратчайшие сроки после госпитализации пациента. На основе полученных результатов предложена схема градации тяжести ОЖ по интегральным гематологическим показателям. При ОЖ легкой и средней тяжести рекомендовано внутреннее билиарное дренирование как первый или единственный этап лечения. При обтурационной желтухе тяжелой степени показано многоэтапное лечение, первым этапом которого является наружная билиарная декомпрессия.

**ИЗУЧЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ СВОЙСТВ НОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ГУБКИ**

***Солдатова Д.С.^(1, 2), Бежин А.И.⁽¹⁾, Липатов В.А.⁽¹⁾,
Майстренко А.Н.⁽¹⁾***

**ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽¹⁾;**

Курская областная детская больница № 2, Курск, Россия⁽²⁾

Несмотря на разнообразие гемостатических препаратов, вопрос выбора эффективного, биоинертного и недорогого остается актуальным в практической хирургии. Именно поэтому целью исследования явилось изучить в сравнительном аспекте кровоостанавливающие свойства новых препаратов на основе гемостатической губки с добавлением кровоостанавливающих агентов.

Материалы и методы: образцы на основе гемостатической губки с добавлением: гемоблока; гемоблока и транексамовой кислотой; с тромбоцитами и транексамовой кислотой; с криопреципитатом; с криопреципитатом и транексамовой кислотой; с хитозаном и капрофеном;

с транексамовой кислотой. Сравнительные образцы: губка коллагеновая «Белкозил»; гемостатическая губка «Зеленая дубрава». Для эксперимента *in vivo* (сравнительная оценка времени остановки кровотечения и величины кровопотери) использовали стандартную модель травмы печени и селезенки, исследования проведены на 100 крысах самцах. Животные были разделены на 10 групп: контрольную и с применением 9 экспериментальных препаратов. Под намеченную область травмы органа помещалась сухая стерильная салфетка с заведомо известной массой. Рану печени моделировали стандартным методом. После этого на кровоточащую область раны накладывали гемостатическое средство стандартных размеров. Одновременно с нанесением раны начинали отсчет времени с использованием секундомера для регистрации остановки кровотечения. Величину кровопотери измеряли по методу Е.М. Левитэ [1]. Результаты проведенных исследований *in vivo* показали, что все экспериментальные образцы обладают достоверными кровоостанавливающими свойствами. Однако выраженными в разной степени. Активность последних связана с входящими в состав губок кровоостанавливающими агентами. Вопреки ожидаемым результатам, более эффективными оказались монокомпонентные губки: лучше зарекомендовали себя губки гемостатические с транексамовой кислотой и с криопреципитатом, (сокращая время остановки кровотечения при травме печени соответственно на 83% и 78%; при травме селезенки - на 78% и 74%. Величину кровопотери при травме печени соответственно на 79% и 76%; при травме селезенки - на 66% и 58%. Данные достоверные ($p \leq$

0,05)). По-видимому, эти явления связаны с механизмом приготовления лекарственных средств, их взаимодействия (разрушения), характером пропитывания субстрата (послойное или сплошное). Низкие кровоостанавливающие свойства гемостатической губки с Хитозаном и Капрофером можно связать с абсорбционными свойствами входящего в состав полисахарида, которому нужно время для набухания волокон. Данные образцы могут применяться при операциях на паренхиматозных органах, превосходя имеющиеся на рынке аналоги, что значительно улучшит качество выполняемых пособий и снизит послеоперационные осложнения, связанные с наличием отсроченного кровотечения.

Литература

1. Бежин А.И., Майстренко А.Н., Липатов В.А. Гемостатическая активность новых аппликационных средств на основе карбоксиметилцеллюлозы // Вестник новых медицинских технологий. – 2011. – № 2. – С. 115-119.
2. Масляков В.В., Барсуков В.Г. Клинические проявления закрытой травмы селезенки // Анналы хирургии. – 2016. - № 5. – С. 41-43.
3. Чардаров Н.К., Багмет Н.Н., Скипенко О.Г. Местные гемостатики в хирургии печени // Хирургия. – 2016. - № 2. - С. 34-14.
4. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – №. 1 (2).
5. Липатов В.А. и др. Изучение скорости деградации кровоостанавливающих полимерных имплантатов на основе карбоксиметилцеллюлозы // Материалы Международной научно-практической конференции «Медицинские импланты». – 2016. – Курск.
6. Герасимов Д.А. и др. Экспериментальная оценка динамики и степени биodeградации новых образцов кровоостанавливающих имплантатов на основе карбоксиметилцеллюлозы // Забайкальский медицинский вестник. - 2016. - № 1. - С. 81-85.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Жуковский В.А.

**Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна**

Одним из направлений технического прогресса в производстве хирургических имплантатов является разработка новых и модификация существующих полимерных материалов с целью придания им особых свойств, необходимых в ряде специальных областей применения.

Целью данной работы является создание научно обоснованных и экономически целесообразных инновационных технологий промышленного производства медицинских полимеров и изделий из них, предназначенных для имплантации в организм на длительные сроки и обладающих высокими, в том числе новыми, медико-биологическими характеристиками [1-2].

В результате разработаны:

- научные основы и рациональные инновационные технологии промышленного производства биосовместимых и биологически активных хирургических шовных материалов (ХШМ) и сетчатых эндопротезов для реконструктивно-восстановительной хирургии, отличающиеся высокими медико-биологическими характеристиками;

- поликапроамидные (ПКА) и полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) плетеные и крученые нити с фторполимерным покрытием, обеспечивающим ХШМ биосовместимость, хорошие прочностные и манипуляционные свойства, высокую надежность хирургического узла и полное устранение фитильности;

- процессы формования и структурно-физической модификации биорезистентных полипропиленовых (ПП) хирургических мононитей, позволяющие снизить их жесткость на 30,2-65,5% и увеличить разрывную нагрузку в узле на 30,8-62,8%;

- технологические процессы получения рассасывающихся полигликолидных нитей с антимикробным полигликолид-лактидным биодеструктурируемым покрытием, содержащим отечественный антисептик – мирамистин. Изучение кинетики десорбции препарата из модифицированной нити выявило четкую тенденцию к росту антимикробной активности и продолжительности действия с увеличением количества нанесенного полимера, содержания в нем мирамистина и толщины нити;

- многофакторные взаимосвязи между составом, строением, структурой и функциональными свойствами биорезистентных и частично рассасывающихся сетчатых эндопротезов для герниопластики. Сравнительная оценка медико-биологических свойств показала, что

легкие и частично рассасывающиеся сетки в адекватных хирургических ситуациях вызывают меньше осложнений и рецидивов;

- оригинальные отечественные цельновязанные имплантаты из ПП и поливинилиденфторидных (ПВДФ) монопоней для хирургического лечения стрессового недержания мочи и коррекции генитального пролапса с оптимальными структурно-биомеханическими свойствами;

- ПП, ПКА и ПЭТФ полимерные материалы с широкой биологической активностью пролонгированного действия путем присоединения химиотерапевтических и радиоактивных препаратов с помощью химических связей различных типов при использовании для модификации методов привитой сополимеризации и полимераналогичных превращений. Изучены процессы придания имплантатам антимикробных и иммунодепрессантных свойств, противоопухолевой и ферментативной активности как индивидуально, так и в различных сочетаниях;

- кинетические и термодинамические закономерности десорбции и массопереноса антибиотиков из модифицированных полимеров в физиологических средах, предложены математические модели, позволяющие прогнозировать биологическое действие изделий. Показано, что наличие у полимерной матрицы и лекарственных препаратов ионогенных групп разной ионной силы обеспечивает возможность придания материалам биологической активности различной продолжительности и эффективности действия;

- нормативно-техническая документация на серийное производство инновационных изделий; найденные технические и технологические решения внедрены ООО «Линтекс» с высокими показателями социально-экономической эффективности, обусловленными улучшением результатов и сокращением сроков лечения, снижением расходов государства и населения за счет полноценного импортозамещения.

Литература

1. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики / В.А. Жуковский. – СПб.: Эскулап, 2011. – 104 с.
2. Жуковский В.А. Научное обоснование и разработка технологии волокнистых хирургических материалов со специальными свойствами: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.17.06 / Жуковский Валерий Анатольевич. – СПб. – 2013. – 32 с.
3. Иванов А. В. и др. Экспериментальное исследование зависимости между объёмом дефекта трахеи и реакцией тканей на лавсановый эндопротез при реконструктивных операциях //Innova. – 2015. – №. 4 (1).

ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ АНТИСЕПТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Григорьян А.Ю., Белозерова А.В.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия
(Грант МК-5245.2016.7)

Одной из проблем современной хирургии является проблема лечения гнойных ран [1]. За последние годы микрофлора ран и ее биологические свойства претерпели существенные изменения, проявляющиеся быстрой потерей чувствительности к современным антибактериальным препаратам [2].

Цель: изучить ранозаживляющую активность разработанных нами иммобилизованных препаратов с антисептиками Мирамистин и Хлоргексидина биглюконат в сравнительном аспекте с официальной мазью «Левомеколь».

Материалы и методы исследования. Состав 1 (серия А): Раствор Хлоргексидина биглюконат 0,5% – 30,0 грамм, Метилурацил – 2,0 грамма, Полиметилсилоксана полигидрат – 70,0 грамм; Состав 2 (серия В): Раствор Мирамистина 0,01% – 100,0 грамм, Метронидазол – 1,0 грамм, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы – 4,0 грамма. В экспериментах *in vitro* изучали антимикробный спектр мази «Левомеколь» и изучаемых составов 1 и 2. Было выполнено по 6 параллельных исследований методом диффузии в агар на плотных питательных средах с использованием тест-штаммов *St. aureus* ATCC 6538-P, *Bac. cereus* ATCC 10702, *E. coli* ATCC 25922, *Proteus vulgaris* и *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027, *Candida albicans* ATCC 885-653. Эксперименты *in vivo* выполнены на 120 белых крысах-самцах породы «Вистар». Животным моделировалась гнойная рана. Экспериментальные животные были разделены на 3 серии по 40 особей в каждой. Течение раневого процесса у экспериментальных животных оценивали гистологическим методом. Разработанные нами препараты обладали высоким противомикробным действием в отношении всех исследуемых тест-штаммов. При сравнении с мазью «Левомеколь» статистически значимых отличий с составом 1 выявлено не было, однако состав 2 статистически достоверно превосходил по зонам задержки роста и мазь «Левомеколь», и состав 1 в отношении *Bac. cereus* ATCC 10702 и *Candida albicans* ATCC 885-653. Морфометрия: статистически достоверное преобладание фибробластов над остальными клеточными элементами раньше всего отмечалось в опытной серии А (на 5 сутки), что свидетельствовало о высокой регенераторной активности препарата состава 1 в первую фазу

раневого процесса. Однако начиная с 8 суток максимальные значения фибробластов отмечались в опытной серии В по сравнению с остальными сериями. Кроме того, уменьшение количества макрофагов (по отношению к лимфоцитам) раньше всего происходило в опытной серии А (на 3 сутки), в опытной серии В – на 3-5 сутки, а в серии сравнения - на 8-10 сутки. Разработанные нами препараты обладают широким спектром антимикробной активности в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов. Отмечено, что максимальная активность препарата с Хлоргесидина биглюконатом приходилась на первую фазу раневого процесса и способствовала более раннему началу регенерации, а с Мирамистином был стабильно высокоактивен на всех фазах раневого процесса.

Литература

1. Жилина С.В., Миронов А.Ю., Поликарпова С.В. Стрептококки в этиологии гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей // Курский науч.-практ. вестн. «Человек и его здоровье». – 2009. - № 2. – С. 46-53.
2. Плотников Ф.В. Комплексное лечение пациентов с гнойными ранами в зависимости от способности микроорганизмов-возбудителей формировать биопленку // Новости хирургии. – 2014. - № 22(5). – С. 575-581.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ

Горин Д.С.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, Москва, Россия

Введение. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) – одна из наиболее сложных операций в хирургии поджелудочной железы. Несмотря на значимое снижение за последнее время показателей летальности, количество послеоперационных осложнений остается высоким, достигая 40-50% даже в специализированных учреждениях. Одним из путей улучшения результатов лечения больных, перенесших ПДР, является рациональное периоперационное ведение и стандартизация техники оперативного вмешательства.

Цель: улучшить результат лечения больных с заболеваниями поджелудочной железы.

Материалы и методы. На базе 1 абдоминального отделения ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» разработан протокол периоперационного ведения больных в рамках внедрения технологии ускоренной реабилитации (ERAS). В 2014-2015 гг. оперировано 87 пациентов. Показанием к операции служили опухоли головки поджелудочной железы, большого сосочка 12-перстной кишки, терминального отдела общего желчного протока, а также осложненные формы хронического панкреатита (дуоденальная дистрофия). Большинство операций – 72 (82,8%) – выполнено в традиционном открытом варианте, 15 (11,2%) – в робот-ассистированном. Ход мобилизационного этапа и объем лимфаденэктомии при двух способах оперирования не различался. Данные представлены в виде медианы, 25 и 75 перцентилей Me (25p;75p).

Результаты. Продолжительность роботических ПДР составила 408 (368;511) мин, открытых - несколько меньше 310 (265;387) мин; средняя интраоперационная кровопотеря практически не различалась для открытых и роботических вариантов операции и составила 250 (200;470) и 225 (138;500) мл соответственно; послеоперационный койко-день для больных, оперированных традиционным способом составил 15 (11;20) суток, в то время как роботических – 15,5 (14;21). Назначение опиоидных анальгетиков в роботической группе потребовалось не всем (73,3%) больным; средняя продолжительность их назначения была также ниже, чем в открытой группе – 0,9 суток и 1,7 суток соответственно. Специфические осложнения классифицированы по ISGPS: в послеоперационном периоде у 24 (27,6%) пациентов имелись наружные панкреатические свищи, из них большинство – типа А – 14 (58,3%) и 10 (41,7%) типа В; у 17 пациентов на фоне панкреатита и

панкреатического свища имелся гастростаз и у семерых больных – аррозионное внутрибрюшное кровотечение, которое потребовало повторного оперативного вмешательства. По возникновению специфических осложнений в двух группах достоверных различий не выявлено. У больных, перенесших традиционные вмешательства, отмечены характерные для «открытой» хирургии осложнения: нагноения п/о раны в 9 наблюдениях, подкожная эвентрация – 1, ранняя спаечная кишечная непроходимость – 1. Отмечен один летальный исход у пациента с тяжёлым послеоперационным панкреатитом.

Заключение. Рациональное периоперационное ведение больных и использование мини-инвазивных методик может стать одним из направлений в ранней реабилитации после тяжёлого хирургического вмешательства. Введение протокола периоперационного ведения больных и стандартизация техники вмешательства позволяет минимизировать количество неспецифических осложнений, а также адекватно оценить непосредственные и отдаленные результаты лечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ПУНКЦИОННО-ДРЕНИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Аблаев Э.Э.

Медицинская академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Симферополь, Россия

Введение. Острый панкреатит – полиэтиологическое заболевание поджелудочной железы, возникающее в результате аутолиза ее ткани линолитическими и активными протеолитическими ферментами, которое проявляется, как отеком органа, так и панкреонекрозом. Острый панкреатит является одной из самых тяжелых патологий пищеварительной системы и по частоте возникновения занимает второе место среди всех острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, уступая лишь острому аппендициту.

Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 121 пациента с острым деструктивным панкреатитом.

Основную группу составили 80 пациентов с острым деструктивным панкреатитом в хирургическом лечении которых использовались различные малоинвазивные пункционно-дренирующие и эндовидеохирургические вмешательства.

В состав контрольной группы вошли пациенты с острым деструктивным панкреатитом (41 человек). При хирургическом лечении больных этой группы выполнялись различные виды открытых оперативных вмешательств.

Показанием к оперативным вмешательствам у больных острым деструктивным панкреатитом в основной и контрольной группах являлось наличие как минимум двух из перечисленных ниже критериев:

- 1 - нарастание перитонеальной симптоматики,
- 2 - увеличение количества жидкости в свободной брюшной полости,
- 3 - формирование локального очага деструкции в брюшной полости или в забрюшинном пространстве,
- 4 - прогрессирование интоксикационного синдрома, подтверждаемого при оценке по шкале SAPS.

Санация и дренирование патологических очагов в основной группе выполнялось при помощи малоинвазивных методов; в контрольной – традиционными способами. На начальном этапе лечения больных основной группы в зависимости от варианта течения острого деструктивного панкреатита выполнялись два вида вмешательств: лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости или чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства под УЗ-

контролем по поводу ограниченных жидкостных образований брюшной полости и забрюшинного пространства

У больных обеих групп с острым деструктивным панкреатитом помимо динамики общего состояния были изучены послеоперационные хирургические осложнения, их характер и частота встречаемости. Наличие тех или иных осложнений во многом определяло тяжесть состояния больных после операций, влияло на длительность послеоперационного периода, исхода заболевания. Летальность больных с деструктивным панкреатитом составила 17,1% (7 пациентов) в контрольной и 3,8% (3 больных) в основной группе.

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ результатов лечения острого деструктивного панкреатита позволяет сделать вывод о более благоприятном течение послеоперационного периода у больных основной группы. Полученные результаты наглядно демонстрируют преимущества хирургического лечения с использованием малоинвазивных технологий по всем рассмотренным критериям. Вместе с тем при неэффективности малоинвазивных методов следует применять открытые вмешательства, которые являются операциями резерва.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТКОВ ТОНКОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Горпинич А.Б.⁽¹⁾, Привалова И.Л.⁽²⁾, Мангилев С.В.⁽¹⁾,

Коростелева Е.В.⁽²⁾, Смольнякова К.В.⁽²⁾

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет

им. И.С. Тургенева», Орел, Россия ⁽¹⁾;

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽²⁾**

Острая кишечная непроходимость (ОКН) является одной из самых сложных проблем в экстренной хирургии [3]. Развитие наиболее тяжёлой формы непроходимости – странгуляционной – сопровождается комплексом метаболических, микроциркуляторных и моторных нарушений деятельности тонкой кишки. С учетом их системного характера актуальным представляется исследование функциональных взаимоотношений между различными участками тонкой кишки в условиях экспериментального моделирования.

Цель работы: изучение изменений функциональных взаимоотношений приводящей, отводящей и странгулированной петель тонкой кишки после экспериментального моделирования ОКН.

Материалы и методы. Исследования выполнены в острых экспериментах на крысах в соответствии с требованиями «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 18 марта 1986 года). Наркотизированным крысам выполняли срединную лапаротомию, после чего фиксировали серебряные отводящие электроды к серозно-мышечной оболочке трех участков тонкой кишки: 1 – участку кишки, который в последующем оказывался центральной частью странгулированной петли; 2 – на 20 см проксимальнее зоны ишемии; 3 – на 10 см дистальнее зоны ишемии. В течение 20 мин производили одновременную запись электрической активности (ЭА) гладких мышц исследуемых участков тонкой кишки (контроль). Затем моделировали острую странгуляционную тонкокишечную непроходимость [2]. В постишемическом периоде (через 1 час после устранения странгуляции) вновь производили запись ЭА исследуемых участков кишки (модель). Полученные данные подвергали корреляционному анализу. Статистическая значимость различий оценивалась с помощью критерия Стьюдента для множественных сравнений. В контрольном исследовании было выявлено наличие положительных связей средней силы между частотными характеристиками (ЧХ) ЭА исследуемых участков тонкой кишки. После моделирования ОКН средние значения коэффициентов корреляции, отражающие взаимоотношения между ЧХ

ЭА ишемизированной зоны и участка, расположенного на 20 см проксимальнее нее, уменьшались на 39,7% ($p < 0,05$). Исследуемые участки тонкой кишки обнаруживали также положительные корреляционные связи и по амплитудным характеристикам (АХ) ЭА, что подтверждают контрольные значения коэффициентов корреляции от $0,443 \pm 0,05$ до $0,693 \pm 0,04$. Моделирование ОКН приводило к снижению показателей многосторонней скоррелированности АХ ЭА всех исследуемых участков кишечника, наиболее выраженных в зонах, расположенных проксимальнее и дистальнее зоны ишемии – на 30,7% ($p < 0,01$) и 72% ($p < 0,01$) соответственно.

Заключение. Проведенное исследование позволило установить изменения функциональных взаимоотношений между приводящей, отводящей и странгулированной петлями тонкой кишки после экспериментального моделирования ОКН и ее устранения. Количественной характеристикой этих изменений могут являться показатели скоррелированности частотных и амплитудных характеристик электрической активности.

Литература

1. Зашихин А.Л., Селин Я., Бармина А.О. Реактивные изменения гладкой мышечной ткани тонкой кишки крыс при экспериментальной кишечной непроходимости // Морфология 2010;137(2):48-53.
2. Шалимов С.А., Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В. Руководство по экспериментальной хирургии. – М.: Медицина, 1989.
3. Sperry J, Cohen MJ. Acute obstruction. Surg Clin North Am. 2014 Feb;94(1):77-96. doi: 10.1016/j.suc.2013.10.001.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСУДИСТЫХ ЗАПЛАТ ПОСЛЕ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Жуковский В.А.⁽¹⁾, Липатов В.А.⁽²⁾, Северинов Д.А.⁽²⁾, Абдель Джавад Н.М.⁽²⁾

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Санкт-Петербург, Россия⁽¹⁾;

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, Россия⁽²⁾

В настоящее время развитие медицинских технологий отличается прогрессивным ростом числа современных изделий медицинского назначения [3]. Модернизация не обошла стороной одну из наиболее интенсивно развивающихся в настоящее время отраслей медицины, а именно – хирургию. Хирургический имплант – это пластический материал (органического или неорганического (синтетического) происхождения), который вводят в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени, а также с целью замещения дефекта или укрепления поврежденных органов и тканей [2, 5]. Высокую функциональность полимерных имплантов в условиях макроорганизма обуславливает комплекс таких физико-механических характеристик протеза, как его эластичность, прочность, а также процент удлинения, которые в своей совокупности позволяют полотну импланта наилучшим образом выполнять его функции и избегать деформации окружающими тканями [1].

Целью исследования являлось изучение в условиях эксперимента изменений физико-механических свойств полотна сосудистой заплаты, её прочностных характеристик, а именно – разрывной нагрузки и удлинения при одноосном растяжении после подкожной имплантации в паравертебральную область лабораторным животным.

В качестве материалов для исследования были использованы образцы (№ 1 и 2 соответственно) сосудистых заплат (основовязанные полотна) на основе полиэтиленрефталата, отличающиеся только наличием желатиновой «пропитки» (образец № 2). Исследование проводили на 60 крысах линии Вистар массой 200-250 г. Животные содержались в условиях экспериментально-биологической клиники Курского государственного медицинского университета. Под общим наркозом с соблюдением международных норм гуманного обращения с животными [4]

профессора А.Д. Мясникова крысам производили рассечение кожного и подкожно-жирового слоёв по паравертебральной линии справа длиной до 7 см. Тупым путём в подкожной клетчатке формировали два кармана между

мышечным и кожным слоями по обе стороны от разреза, глубиной до 3,5 см на протяжении всего разреза. В каждый карман помещали образец сосудистой заплаты размером 5x1 см. Операционную рану ушивали наглухо с захватом мышечного слоя с целью изоляции карманов, содержащих экспериментальные образцы. Животные были выведены из эксперимента на 15 и 30 сутки после имплантации. В каждом случае производилась аутопсия с иссечением участка справа и слева от паравертебральной линии в местах размещения имплантов, которые в дальнейшем были отсепарированы от окружающих их тканей. Прочностные характеристики пророщенных соединительнотканными волокнами имплантов исследовали с помощью разрывной машины РТ-250М согласно методикам, описанным в ГОСТ 8847-85. Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением методик описательной и вариационной статистики. Статистически достоверными считались различия средних величин при $p \leq 0,05$. В качестве программной среды для обработки данных использовали лицензионную версию Biostatistics 4.03.

Наилучшие результаты показали образцы сосудистых заплат из полиэтиленрефталата, не имеющие дополнительной обработки желатином в процессе производства. Такие образцы выдержали разрывную нагрузку в 142 Н (15 сутки эксперимента) и 150 Н (30 сутки эксперимента) соответственно. Полученные данные свидетельствуют о высокой прочности изученных эндопротезов, также следует отметить и то, что процент их удлинения колебался от 6% до 52% как на 15 сутки после эксперимента, так и на 30. Минимальную разрывную нагрузку 60 Н (15, 30 сутки эксперимента) выдержали образцы № 2, которые дополнительно обрабатывают желатином в процессе производства с целью уменьшения хирургической порозности. Данное технологическое решение привело к снижению и биологической пористости эндопротезов. Что, в свою очередь, вызывает определённые сложности в процессе инкорпорации импланта в организм лабораторных животных. Это проявляется некоторым отличием механических характеристик исследуемых образцов вследствие замедленного прорастания полотна образца № 2 рубцовой тканью, а именно снижением прочностных свойств данных эндопротезов по сравнению с образцами № 1. Также следует отметить и то, что процент удлинения образцов № 2 заключается в диапазоне от 6% до 50% как на 15, так и на 30 сутки.

Выводы:

1. Исследуемые протезы не деформируются в условиях подкожной имплантации в макроорганизм и сохраняют свои изначальные параметры на 15 и 30 сутках эксперимента.
2. Снижение прочностных характеристик образцов, пропитанных желатином, по-нашему мнению, связано с минимальной биологической

порозностью таких имплантов, которая достигается за счёт заполнения промежутков между волокнами протеза желатином.

3. Значения показателей исследуемых параметров эндопротезов, пророщенных волокнами соединительной ткани, выше в сравнении с таковыми у нативных образцов имплантов.

Литература

1. Алуханян О.А. Сравнительная характеристика новых образцов сосудистых заплат из политетрафторэтилена в эксперименте / О.А. Алуханян, А.А. Винокур, Л.В. Горбов // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2012. –

№ 2. – С. 45–51.

2. Иванов А.В., Липатов В.А., Лазаренко С.В., Жердев Н.Н., Северинов Д.А. Исследование реакции тканей лабораторных животных на имплантацию новых образцов сосудистых эндопротезов. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2016;20(2):87-94. DOI: 10.21688-1681-3472-2016-2-87-94

3. Влияние механических характеристик сосудистой заплаты на формирование перипротезной капсулы / А.В. Иванов, В.А. Липатов, С.В. Лазаренко, Н.Н. Жердев, Д.А. Северинов // Клиническая и экспериментальная хирургия: журнал имени академика Б.В. Петровского – № 1, 2016. – С. 51-57.

4. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики / П.В. Ткаченко, В.А. Липатов, И.Л. Привалова, Д.А. Северинов, Н.И. Хмаро // Электронный научный журнал «Innova» – 2016. – № 1 (2) – С. 29-35.

5. The effects of porosity on endothelialization of ePTFE implanted in subcutaneous and adipose tissue / D.L. Salzman, L.B. Kleinert, S.S. Berman, S. K. Williams // J. Biomed. Mater. Res. – 2016. – Vol. 34. – P. 463-476.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТКОВ ТОНКОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

*Горпинич А.Б. (1), Привалова И.Л., (2), Мангилев С.В.(1),
Коростелева Е.В. (2), Смольнякова К.В. (2).*

**ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С.
Тургенева», Орел, Россия (1)**

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
университет», Курск, Россия (2)**

Острая кишечная непроходимость (ОКН) является одной из самых сложных проблем в экстренной хирургии [3]. Развитие наиболее

тяжёлой формы непроходимости – странгуляционной – сопровождается комплексом метаболических, микроциркуляторных и моторных нарушений деятельности тонкой кишки. С учетом их системного характера актуальным представляется исследование функциональных взаимоотношений между различными участками тонкой кишки в условиях экспериментального моделирования. Цель работы: изучение изменений функциональных взаимоотношений приводящей, отводящей и странгулированной петель тонкой кишки после экспериментального моделирования ОКН. Материалы и методы. Исследования выполнены в острых экспериментах на крысах в соответствии с требованиями «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 18 марта 1986 года). Наркотизированным крысам выполняли срединную лапаротомию, после чего фиксировали серебряные отводящие электроды к серозно-мышечной оболочке трех участков тонкой кишки: 1 - участку кишки, который в последующем оказывался центральной частью странгулированной петли; 2 – на 20 см проксимальнее зоны ишемии; 3 – на 10 см дистальнее зоны ишемии. В течение 20 мин производили одновременную запись электрической активности (ЭА) гладких мышц исследуемых участков тонкой кишки (контроль). Затем моделировали острую странгуляционную тонкокишечную непроходимость [2]. В постишемическом периоде (через 1 час после устранения странгуляции) вновь производили запись ЭА исследуемых участков кишки (модель). Полученные данные подвергали корреляционному анализу. Статистическая значимость различий оценивалась с помощью критерия Стьюдента для множественных сравнений. В контрольном исследовании было выявлено наличие положительных связей средней силы между частотными характеристиками (ЧХ) ЭА исследуемых участков тонкой кишки. После моделирования ОКН средние значения коэффициентов корреляции, отражающие взаимоотношения между ЧХ ЭА ишемизированной зоны и участка, расположенного на 20 см проксимальнее нее, уменьшались на 39,7% ($p < 0,05$). Исследуемые участки тонкой кишки обнаруживали также положительные корреляционные связи и по амплитудным характеристикам (АХ) ЭА, что подтверждают контрольные значения коэффициентов корреляции от $0,443 \pm 0,05$ до $0,693 \pm 0,04$. Моделирование ОКН приводило к снижению показателей многосторонней скоррелированности АХ ЭА всех исследуемых участков кишечника, наиболее выраженных в зонах, расположенных проксимальнее и дистальнее зоны ишемии - на 30,7% ($p < 0,01$) и 72% ($p < 0,01$) соответственно. Заключение. Проведенное

исследование позволило установить изменения функциональных взаимоотношений между приводящей, отводящей и strangulированной петлями тонкой кишки после экспериментального моделирования ОКН и ее устранения. Количественной характеристикой этих изменений могут являться показатели скоррелированности частотных и амплитудных характеристик электрической активности.

Список литературы

1. Зашихин А.Л., Селин Я., Бармина А.О. Реактивные изменения гладкой мышечной ткани тонкой кишки крыс при экспериментальной кишечной непроходимости//Морфология 2010;137(2):48-53.
2. Шалимов С.А., Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В. Руководство по экспериментальной хирургии. М.: Медицина, 1989.
3. Sperry J, Cohen MJ. Acute obstruction. Surg Clin North Am. 2014 Feb;94(1):77-96. doi: 10.1016/j.suc.2013.10.001. Epub 2013 Oct 30. – 2014

ИШЕМИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ НЕОАНГИОГЕНЕЗА В ИШЕМИЗИРОВАННОЙ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ

Колесник И.М.

**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия**

Цель работы: установить влияние поздней фазы дистантного ишемического preconditionирования и фармакологического preconditionирования рекомбинантным эритропоэтином в субэритропоэтической дозе на neoangiogenesis в ишемизированных мышцах голени крысы.

Материалы и методы. Исследование проведено на 100 крысах Wistar. Ишемию мышц голени воспроизводили оперативным удалением участка магистральных сосудов, включающего бедренную, подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые артерии правой задней конечности на вторые сутки эксперимента. Дистантное ишемическое preconditionирование (ДИП) проводили 10-минутным пережатием левой бедренной артерии, в первые семь суток эксперимента каждые 48 часов. Рекомбинантный эритропоэтин (ЕРО) вводили внутривентрально в субэритропоэтической дозе 2,5 МЕ/кг по той же схеме. Состояния микроциркуляторного русла в мышце оценивали на 10, 21 и 28 сутки после операции по уровню микроциркуляции посредством лазерной

доплеровской флоуметрии (ЛДФ) и данным морфологического исследования.

Результаты. Среднее значение уровня микроциркуляции в группе интактных животных составляет 526 ± 34 ПЕ. В группе ложнооперированных животных на всех сроках показатель не меняется. При гистологическом исследовании отличий от строения интактных мышц также не выявлено. В контрольной группе на 10 сутки снижение уровня микроциркуляции на 60% затем начинает восстанавливаться, однако на 28 сутки достигает лишь 69% от исходного. На 21 сутки в ишемизированной мышце – крупные очаги организующегося некроза с резорбцией некротических волокон и разрастанием грануляционной ткани. На 28 сутки участки резорбируемого некроза были значительно мельче, а в микроциркуляторном русле отмечались полнокровие и новообразование единичных капилляров. Проведение дистантного ишемического прекондиционирования и введение рекомбинантного эритропоэтина способствовали эффективному и равнозначному повышению уровня регионарного кровотока в ишемизированной мышце голени крыс. Показатели ЛДФ в этих группах на 10 сутки снижаются на 32%, на 21 составляют 92% от исходного, полностью восстанавливаются до 28 суток после операции. Некротические изменения в ишемизированных мышцах опытных групп не обнаружены, однако в некоторых участках встречались мелкие очаги атрофирующихся миоцитов с пролиферацией клеток перимизия. Кроме того, отмечено усиленное новообразование капилляров, более выраженное на 21 сутки ишемии.

Выводы: дистантное ишемическое прекондиционирование и фармакологическое прекондиционирование рекомбинантным эритропоэтином в субэритропоэтической дозе оказывает равноценное стимулирующее влияние на неоангиогенез в ишемизированных мышцах голени крысы.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ СВОБОДНЫМ АУТОВЕНОЗНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ НИЖЕ ЩЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Сидоров Д.В.

**БУЗ Орловской области Орловская областная клиническая
больница, Орел, Россия**

Цель: улучшить результаты лечения больных с критической ишемией нижних конечностей на почве окклюзионно-стенотических

поражений бедренно-подколенно-берцового сегмента путем оптимизации методики бедренно-подколенного шунтирования.

Материалы и методы. Проведен анализ комплексного обследования и лечения 60 больных с критической ишемией нижних конечностей на почве атеросклеротического поражения бедренно-подколенно-берцового сегмента. Мужчин было 55, женщин – 5, возраст больных колебался от 52 до 78 лет. Диагностическая программа включала реовазографию, доплерографию, фотоплетизмографию, ангиографию нижних конечностей. Кроме этого в предоперационном и в раннем послеоперационном периодах оценивался диаметр большой подкожной вены и объемный кровоток по шунту. Пациенты по технологии бедренно-подколенного шунтирования были разделены на 2 статистически однородные группы по 30 человек в каждой.

Пациентам первой (контрольной) группы проводилось типичное традиционное аутовенозное шунтирование реверсированной большой подкожной веной. Недостатками известного способа являются:

1. Развитие гемодинамически значимого стеноза в месте проксимального анастомоза бедренной артерии, диаметром 8 мм с дистальным концом аутовенозного трансплантата со средним диаметром 4 мм. На выходе из стеноза возникает зона разделения потока крови с его замедлением, что приводит к развитию низкого напряжения силы сдвига между слоями крови и стенкой сосуда. Низкое напряжение силы сдвига стимулирует секреторную активность миоцитов и провоцирует адгезию тромбоцитов, что вызывает дальнейшее сужение просвета аутовенозного трансплантата и приводит к его тромбозу.

2. Подкожная вена, используемая при бедренно-подколенной реконструкции, имеет клапаны, которые уменьшают площадь поперечного сечения вены на 60%.

3. Низкое пропускная способность аутовенозного трансплантата, которая обычно не достигает удовлетворительного уровня – 500 мл/мин, что не позволяет достичь адекватной перфузии тканей ишемизированной конечности.

Во второй группе операция проводилась по оригинальной технологии – свободным аутовенозным трансплантатом с разрушенными клапанами без реверсии вены.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде специфических осложнений в обеих группах больных не выявлено. Применение оригинальной технологии лечения позволило в ближайшем послеоперационном периоде увеличить объемный кровоток в конечности в 1,5 раза, магистральный кровоток – в 1,6 раза, уровень

микроциркуляции – в 1,3 раза, объемный кровоток по шунту – в 4,75 раза. В отдаленном послеоперационном периоде снизить количество поздних тромбозов шунта на 40%, улучшить отдаленную проходимость шунтов в 2,6 раза, повысить физический компонент здоровья – на 10,6%, а психический – на 4,3%.

Заключение. Применение свободного аутовенозного трансплантата с разрушенными клапанами патогенетически обосновано и позволяет улучшить результаты лечения больных.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ РАССАСЫВАЮЩИХСЯ ПЛЕНОЧНЫХ ИМПЛАНТОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛИНИИ ШВОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Инархов М.А.⁽¹⁾, Липатов В.А.⁽¹⁾, Затолокина М.А.⁽¹⁾, Жуковский В.А.⁽²⁾, Суковатых Б.С.⁽¹⁾, Ярмamedов Д.М.⁽¹⁾

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽¹⁾;**

**Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия⁽²⁾**

В раннем послеоперационном периоде количество осложнений при операциях на органах брюшной полости достигает 19-25%, среди них 11% относятся к несостоятельности кишечных швов. До настоящего времени остается актуальным поиск и разработка способов и средств укрепления линии швов и повышения герметичности межкишечных анастомозов. Одним из ведущих направлений в решении этой задачи является полимерная имплантология. Помимо различных гелей, губок, порошков и клеевых средств в полимерной имплантологии используются биodeградируемые мембраны. Использование полимерных пленочных материалов позволяет усилить прочность и герметичность анастомозов. Цель настоящего исследования состояла в изучении эффективности использования новых образцов полимерных пленочных имплантов для повышения биологической герметичности и механической прочности толстокишечных анастомозов в эксперименте на животных. В результате исследования было доказано, что использование полимерных мембран подобно второму ряду швов при формировании межкишечного анастомоза повышает степень его механической прочности и биологической герметичности, тем самым снижая риск несостоятельности анастомоза в раннем послеоперационном периоде. Полимерные мембраны в момент

наложения анастомоза и на 1-е сутки после операции в 2 раза статистически значимо увеличивают степень герметичности однорядного шва толстокишечного анастомоза (герметичность анастомоза в опытной группе выше ($109 \pm 1,28$ мм рт.ст.) в сравнении с контрольными группами 1 и 2 ($64,3 \pm 2,18$ мм рт. ст. и $82,7 \pm 1,75$ мм рт.ст. соответственно). Эффективность применения полимерных пленочных имплантов достигается за счет бесшовного способа фиксации мембраны к стенке органа (благодаря высокой степени адгезии) и временного барьерного эффекта между раневой поверхностью толстой кишки и окружающими его тканями брюшной полости.

Полученные данные позволяют рекомендовать к использованию предложенные полимерные пленочные импланты в качестве средств, повышающих герметичность анастомозов.

Литература

1. Агаев Э.К. Несостоятельность швов кишечных анастомозов у больных после экстренной и неотложной резекции кишки / Э.К. Агаев // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2012. – № 1. – С. 34-37.
2. Липатов В.А., Инархов М.А., Ярмamedов Д.М., Мосолова А.В., Головлева А.А. Динамика деградации бикомпонентных пленчатых имплантатов на основе полимеров целлюлозы с заданными физическими и манипуляционными свойствами / В.А. Липатов, М.А. Инархов, Д.М. Ярмamedов, А.В. Мосолова, А.А. Головлева // Забайкальский медицинский вестник. – 2015. – № 2. – С. 142-146.
3. Хоменко Т.И. Осложнение после лапаротомии на фоне послеоперационного спаечного процесса / Т.И. Хоменко // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2014. – Т.4. № 4. – С. 260.
4. Bebu I., Luta G., Mathew Th., Agan B. Generalized Confidence Intervals and Fiducial Intervals for Some Epidemiological Measures / I. Bedu, G. Luta, Th. Mathew, B. Agan // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2016. – 13(6).

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОТЕРАПИЯ ВРОЖДЁННЫХ СВИЩЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Мальцева А.В., Вишниецкая П.В.

**ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Челябинск, Россия**

Лазер – генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного излучения, в котором активные среды под действием внешних факторов могут переходить в состояние, при котором они способны усиливать ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение.

В настоящее время разработаны различные способы лечения врожденных свищей, однако частота рецидивов остается достаточно высокой и достигает 10%. В связи с этим поиск новых эффективных и малоинвазивных методов лечения свищей является актуальным.

Цель работы: изучение эффективности лазерного излучения в лечении врождённых свищей головы и шеи.

Материалы и методы исследования. Методом лазерной термотерапии профессором И.А. Абушкиным были прооперированы пациенты с врожденными свищами и кистами околоушной слюнной железы, срединными кистами и свищами, боковыми свищами. Использовались лазеры: диодный – длина волны 970 нм, оптоволоконный – длина волны 1900 нм. Доставка энергии излучения к очагу осуществлялась чрескожно посредством кварц- кварцевого световода диаметром 0,4-0,6 мм. После проведения лазерной термотерапии по удалению свищей и кист слюнных желёз и боковых свищей было осуществлено резиновым выпускником, как профилактика развития рецидивов и возникновения гнойно-септических осложнений. Проводился УЗИ-контроль с линейным датчиком, с частотой 5-12 мГц. Лечение проводилось амбулаторно под ингаляционным масочным или ларингеально-масочным севорановым наркозом.

Результаты исследования. Лечили 5 больных мужского пола в возрасте от 4 мес. до 23 лет. Свищ в области околоушной слюнной железы – у двоих пациентов. Рудименты 1 и 2 жаберных щелей – у троих пациентов. Пациенты со свищами в области околоушной слюнной железы 15 и 23 лет до лазерной термотерапии 3 и 4 раза соответственно безуспешно лечились хирургически (иссечение). Отдаленные результаты прослежены в срок от 4 месяцев до 1 года. У всех пациентов после однократной лазерной термотерапии свищ зажил в течение 2-3 недель.

Заключение. Лазерная термотерапия является современным, ранее неприменяемым способом лечения врожденных свищей головы и шеи, позволяющим сократить развитие рецидивов и гнойно-септических осложнений. Данный способ является малоинвазивным, амбулаторным, при котором достигается отличный косметический эффект.

Литература

1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению воспалительных и дистрофических заболеваний, а также повреждений слюнных желез / Ассоциация челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов. – М.: Профильная комиссия по специальности «челюстно-лицевая хирургия» МЗ РФ 2015. – 58 с.
2. Smita P., Fessell D. P., Jacobson J. A. Artifacts, Anatomic Variants, and Pitfalls in Sonography of the Foot and Ankle // AJR. – 2002. – Vol. 178. – P. 1247–1254.
3. Sisley A.C., Bonar J.P. Ultrasound in the Acute Seffing // Ultrasound for Surgeons: Second edition. – Lippincott: Williams & Wilkins, 2005. – P. 1015; P. 1179–1191.
4. Turetschek K., Hospodka H., Steiner E. Case report: epidermoid cyst of the floor of the mouth: diagnostic imaging by sonography, computed tomography and magnetic resonance imaging // Br. J. Radiol. – 1995. – Vol. 68, № 806. – P. 205–207.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ

Сухаруков А.С.

Смоленский государственный медицинский университет,
Смоленск, Россия

Введение. Грыженосителями являются 3-4% всего населения нашей планеты. Пупочная грыжа у взрослых является третьим по популярности видом грыж передней брюшной стенки и развивается в основном у женщин после 35 лет. В настоящее время существует только один метод лечения грыж – оперативный [2, 3]. Герниопластика может осуществляться открытым доступом и с помощью эндовидеохирургического оборудования (лапароскопическая герниопластика) [1].

Цель исследования: оценка лапароскопической герниопластики пупочных грыж, проводимых в хирургическом отделении.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карточек пациентов, находившихся в хирургическом отделении ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» за период 2013-2015 гг. Было выявлено 34 (n=34) прооперированных пациента с неосложненными пупочными грыжами. Средний возраст пациентов составил 42,4 года (от 29 до 74 лет). Размеры грыжевых ворот при пупочных грыжах составили в среднем 3,6 см (от 2 до 6 см) (малые, средние и большие, EHS, 2009).

Результаты Все операции (n=34) выполнены из лапароскопического доступа, случаев конверсии не наблюдалось. Интраоперационных осложнений также не наблюдалось. Средний срок госпитализации составил 7-8 суток, хотя необходимо отметить, что пациенты уже 2-3 день не нуждались в сильных анальгетиках и могли быть выписаны. Выраженность послеоперационного болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале составила 2-3 балла. Из послеоперационных осложнений отмечалось 2 случая образования сером лапароскопических проколов. Отдаленные результаты наблюдали в сроки от 1 до 2 лет. Рецидивов не выявлено. Достоверного снижения качества жизни больных по комбинации опросников SF-36 и GIQLI не выявлено.

Заключение. Герниопластика пупочных грыж, проведенная с помощью лапароскопического оборудования, предпочтительнее перед открытым способом лечения грыж.

Литература

1. Сажин В.П., Федоров А.В., Сажин А.В.; под ред. В.П. Сажина / Эндоскопическая абдоминальная хирургия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – С. 312-347.
2. Егиев В.Н., Воскресенский П.К. и др.; под ред. В.Н. Егиева / Грыжи. Монография. – М.: Медпрактика, 2010. – С. 5-7.
3. Колесников С.А., Коваленко Б.С., Горелик С.Г., Косовский Ю.А., Волков Д.В. Принципиальные вопросы лечения пупочных грыж. Український журнал хірургії, 2011, 5 (14), 43-44.

ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СВИЩЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ

Мальцева А.В., Вишниецкая П.В.

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск, Россия

Свищ – узкий канал, выстланный грануляциями или эпителием, соединяющий орган, полость или глубоко лежащие ткани с поверхностью тела. В настоящее время разработаны различные способы лечения врожденных свищей, однако частота рецидивов остается достаточно высокой и достигает 10%. В связи с этим поиск новых эффективных и малоинвазивных методов лечения свищей является актуальным.

Цель работы: изучение эффективности лазерного излучения в лечении врожденных свищей головы и шеи.

Материалы и методы исследования. Методом лазерной термотерапии профессором И.А. Абушкиным были прооперированы пациенты с врожденными свищами и кистами околоушной слюнной железы, срединными кистами и свищами, боковыми свищами. Использовались лазеры: диодный – длина волны 970 нм, оптоволоконный – длина волны 1900 нм. Доставка энергии излучения к очагу осуществлялась чрезкожно посредством кварц- кварцевого световода диаметром 0,4-0,6 мм. После проведения лазерной термотерапии по удалению свищей и кист слюнных желез и боковых свищей было осуществлено резиновым выпускником, как профилактика развития гнойно-септических осложнений. Проводился УЗИ контроль с линейным датчиком, с частотой 5-12 мГц. Лечение проводилось амбулаторно под ингаляционным масочным или ларингеально-масочным севорановым наркозом.

Результаты исследования. Лечили 5 больных мужского пола в возрасте от 4 мес. до 23 лет. Свищ в области околоушной слюнной железы – у двоих пациентов. Рудименты 1 и 2 жаберных щелей - у троих пациентов. Пациенты со свищами в области околоушной слюнной железы 15 и 23 лет до лазерной термотерапии 3 и 4 раза, соответственно, безуспешно лечились хирургически (иссечение). Отдаленные результаты прослежены в срок от 4 месяцев до 1 года. У всех пациентов после однократной лазерной термотерапии свищ зажил в течение 2-3 недель.

Заключение. Лазерная термотерапия является современным, ранее неприменяемым способом лечения врожденных свищей головы и шеи, позволяющим сократить развитие рецидивов и гнойно-септических осложнений. Данный способ является малоинвазивным, амбулаторным, при котором достигается отличный косметический эффект.

Литература

1. «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению воспалительных и дистрофических заболеваний, а также повреждений слюнных желез.» / «Ассоциация челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов.» – Москва: Профильная комиссия по специальности «челюстно-лицевая хирургия» МЗ РФ 2015. – 58 с .
2. Smita P., Fessell D.P., Jacobson J.A. Artifacts, Anatomic Variants, and Pitfalls in Sonography of the Foot and Ankle // AJR. – 2002. – Vol. 178. – P. 1247–1254.
3. Sisley A.C., Bonar J.P. Ultrasound in the Acute Seffing // Ultrasound for Surgeons: Second edition. – Lippincott: Williams & Wilkins, 2005. – P. 1015; P. 1179–1191.
4. Turetschek K., Hospodka H., Steiner E. Case report: epidermoid cyst of the floor of the mouth: diagnostic imaging by sonography, computed tomography and magnetic resonance imaging // Br. J. Radiol. – 1995. – Vol. 68, № 806. – P. 205–207.

МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СТРУКТУРЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Хвостовой В.В., Брежнев Д.Г.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия

Цель исследования. Изучение заболеваемости медуллярным раком щитовидной железы (МРЩЖ) в Курской области и проведение сравнительного анализа РЩЖ с другими онкологическими новообразованиями с учетом данных РФ.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе БМУ «Курская областная клиническая больница», ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер», ОГУЗ «Областное патологоанатомическое бюро». Нами были проанализированы данные историй болезни отделения эндокринологии, хирургического отделения онкологии, архив гистологических и цитологических заключений. Теоретический анализ состояния исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной практике. Эмпирические методы: логический анализ, статистическая обработка полученных данных.

Результаты. Заболеваемость РЩЖ в Курской области за период с 2009-го по 2013 год колебалась от 4,9 (в 2010 г.) до 7,6 (в 2011 г.).

Нами была проанализирована динамика смертности от злокачественных новообразований по нозологическим группам в Курской области за 2011-2013 гг. Наибольшее число умерших отмечено у больных раком легкого, желудка, молочной железы, толстого кишечника.

РЩЖ занимает 17-е место в структуре причин онкологической смертности в области. Смертность от РЩЖ в 22-70 раз ниже, чем от лидирующих пяти злокачественных опухолей. За анализируемый период смертность от РЩЖ в нашей области снизилась с 0,9 до 0,6 на 100 тыс. населения (в 1,5 раза), что существенно ниже среднероссийского уровня.

За это время мы наблюдали всего 25 больных медуллярным РЩЖ, что составляет 9,9% от общего числа выявленных пациентов с РЩЖ, проанализировать детально удалось группу из 16 чел. Все эти пациенты в настоящее время состоят в III клинической группе. В анализируемой группе было 12 женщин и 4 мужчины (соотношение 3:1). Средний возраст реализации РЩЖ по области составил $66 \pm 16,5$ лет. В соответствии с классификацией TNM, анализируемые нами больные распределились по стадиям примерно равномерно, тем не менее на I и II стадии приходится суммарно 56,3%.

Средний размер первичной опухоли составил - 24,1 мм (max. - 50 мм в III ст., min. - 5 мм в III ст.). Правая доля ЩЖ поражалась

медуллярным раком гораздо чаще (75,0%), левая доля - 16,6%, вовлечение обеих долей отмечено нами в 8,4% случаев. Морфологический диагноз в 56,3% был поставлен на основании сочетания гистологического и цитологического исследований.

Выводы. 1) Заболеваемость раком щитовидной железы в Курской области за 5 лет (2009 - 2013) достаточно стабильна и колеблется от 4,9 до 7,6 на 100 тыс. населения, составляя в среднем $6,1 \pm 1,2$, что примерно соответствует среднероссийскому уровню. 2) За 2011 - 2013 годы смертность от рака щитовидной железы в регионе снизилась с 0,9 до 0,6 на 100 тыс. человек (в 1,5 раза), что ниже среднероссийского уровня. 3) Медуллярный рак щитовидной железы диагностируется в нашей области в 3 раза чаще у женщин, средний возраст этих больных составляет $66 \pm 16,5$ лет, что превышает соответствующие среднестатистические данные литературы. 4) Среди больных медуллярным раком щитовидной железы пациенты с I и II стадиями составили суммарно 56,3%, что свидетельствует о достаточно ранней диагностике.

Литература

1. Румянцев П.О. Рак щитовидной железы: современные подходы к диагностике и лечению. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 447 с.: ил. - (Б-ка врача-специалиста. Онкология. Эндокринология).
2. Симоненко В.Б. Нейроэндокринные опухоли: (клиника, диагностика, лечение): монография. М.: 2000. - 289 с.
3. Савельева В.С., Кириенко А.И. Клиническая хирургия: национальное руководство: учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей: в 3 т. М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2008. Т. 2. - 2009. - 825 с.
4. Кононенко С.Н. Ранняя диагностика и дифференцированное лечение рака щитовидной железы. Хирургия. - 2000. - № 3. - С. 38-41.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОМЕТРИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ШВА НА МАТКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

Перепелова Т.А., Газазян М.Г., Бежин А.И.

**ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

В связи с увеличением частоты абдоминального родоразрешения, вопросы, связанные с регенерацией миометрия, являются актуальными в акушерстве. В литературе представлены данные о различных методиках ушивания раны матки, однако отсутствуют исследования, посвященные изучению укрепления шва.

Цель: изучить морфологические изменения в миометрии при использовании частично рассасывающихся полипропиленовых эндопротезов для укрепления шва на матке в эксперименте.

Материалы и методы: экспериментальное исследование выполнено на 27 самках кроликов. В контрольной серии рану матки ушивали однорядным обвивным швом. В серии «Профлекс» укрепление обвивного шва на матке проводили фиксацией сетчатого эндопротеза «Proflex» фирмы Линтекс (г. Санкт-Петербург) отдельными узловыми швами. Оперативное вмешательство выполнялось в стерильных условиях операционного блока по разработанной методике (патент РФ № 2559281). При морфологическом исследовании для оценки изменений миометрия использовали такие критерии, как степень разобщенности гладких миоцитов, степень дезорганизации миометрия, интенсивность и распространенность гидропической дистрофии. Выраженность каждого критерия оценивали в баллах (от 0 до 3). После определения типа распределения данных был выбран метод оценки достоверности отличий Манна-Уитни, при $P \leq 0,05$.

Результаты: при морфологическом исследовании выявлено, что у животных контрольной серии на 7 сутки эксперимента наблюдался отек тканей, дистрофические и воспалительные изменения. В серии «Профлекс» на 7 сутки по периферии эндопротеза наблюдался узкий валик макрофагов, нейтрофилов, незначительное количество лимфоцитов. В миометрии отмечалась гидропическая дистрофия. У животных контрольной серии на 30 сутки вокруг шва наблюдалась формирующаяся клеточная капсула с плотным расположением фибробластов и макрофагов. На 30 сутки эндопротез «Профлекс» окружен соединительнотканной капсулой. В миометрии отмечали появление гиалинизированной соединительной ткани. В контрольной серии на 60 сутки в миометрии выявлена гиалинизированная соединительная ткань в виде широких полей, вытесняющая

гладкомышечную ткань, дезорганизация мышечных пучков в миометрии. В серии «Профлекс» на 60 сутки в миометрии отмечали хорошо сформированную капсулу из плотной соединительной ткани вокруг эндопротеза. Степень дезорганизации мышечных волокон достоверно ниже, чем в контрольной серии ($p=0,04$).

Заключение: при укреплении шва на матке эндопротезом «Proflex» не возникает выраженных дистрофических и воспалительных изменений, а степень дезорганизации мышечных волокон ниже, чем в контрольной серии, что свидетельствует о хорошей биосовместимости для миометрия при укреплении шва.

Литература

1. Айламазян Э.К., Кузьминых Т.У. Особенности репарации миометрия после операции кесарева сечения // Акушерство и гинекология. – 2008. – № 1. – С. 34-36.
2. Поленов Н.И. Морфофункциональная оценка репаративных процессов в нижнем сегменте оперированной матки в конце беременности // Журнал акушерства и женских болезней. – 2007. – Т. LVII. спецвып. – С. 50-51.
3. Реакция миометрия на имплантацию сетчатых полипропиленовых эндопротезов / Т.А. Перепелова [и др.], А.И. Бежин, М.Г. Газазян, М.А. Затолокина // Вестн. новых мед. технологий. – 2015. – Т. 22. № 3. – С. 62-66.
4. Газазян М. Г. и др. Экспериментальное обоснование применения имплантата Мезогель для профилактики внутриматочной адгезии //Курский научно-практический вестник" Человек и его здоровье". – 2012. – №. 1.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА И ЕГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

*Кошанова А.А., Лялина Е.И., Елеукина А.А., Золотарёв В.А.,
Тулеубаев Б.Е.*

Карагандинский государственный медицинский университет,
Караганда, Республика Казахстан

На сегодняшний день проблема лечения хронического остеомиелита является весьма актуальной. Это связано со значительной распространённостью заболевания, которая достигает 7-12% в структуре заболеваний, относящихся к гнойно-хирургической инфекции и до 6% среди патологии опорно-двигательного аппарата. Недостаточная эффективность лечения приводит к инвалидизации в 50-90% случаев [1, 3, 4]. Осложняет ситуацию и постоянно меняющаяся микрофлора остеомиелитического очага.

Цель работы: определить наиболее часто встречающегося возбудителя хронического остеомиелита и антибактериальный препарат для его лечения.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезней 101 пациента с хроническим остеомиелитом, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной травматологии ОЦТиО имени профессора Х.Ж. Макажанова. Из них мужчины составили 74,3% (75 человек), женщины – 25,7% (26 человек). Средний возраст составил 45,5 лет.

Результаты и обсуждения: в ходе анализа представленных историй болезней выявили, что наиболее часто встречающимся возбудителем хронического остеомиелита является золотистый стафилококк (*staphylococcus aureus*), что подтверждают литературные данные [2, 5]. Он был выявлен у 50 пациентов и составляет 49,5% от общего количества пациентов. Анализируя антибиотикочувствительность выделенной микрофлоры у больных с хроническим посттравматическим остеомиелитом, следует отметить, что наибольшая резистентность выявлена к следующим антибактериальным препаратам: бензилпенициллин (82%), ампициллин (80%), цефазолин (74%). Чувствительность выявлена к следующим антибактериальным препаратам: цефотаксим (48%), цефтриаксон (46%), цефтазидим (40%), ванкомицин (38%), цефуроксим (32%), ципрофлоксацин (28%).

Заключение. Таким образом, выявлено, что на сегодняшний день при лечении хронического остеомиелита, вызванного золотистым стафилококком, препаратами выбора оказались цефалоспорины III поколения: цефотаксим (48%), цефтриаксон (46%) и цефтазидим (40%).

Представленные результаты служили не только объективным критерием оценки состояния пациентов с хроническим посттравматическим остеомиелитом, но и позволяли выбрать наиболее оптимальные методики лечения с учетом индивидуальных особенностей каждого больного.

Литература

1. Амирасланов Ю.А. Выбор хирургической тактики при лечении больных остеомиелитом длинных костей в зависимости от характера поражения / Ю.А. Амирасланов, А.М. Светухин, И.В. Борисов, А.А. Ушаков // Хирургия. – 2008. – № 9. – С. 46-50.
2. Божкова С.А., Тихилов Р.М., Краснова М.В., Рукина А.Н. Ортопедическая имплантат-ассоциированная инфекция: ведущие возбудители, локальная резистентность и рекомендации по антибактериальной терапии. Травматология и ортопедия России. 2013; 4 (70): 5 – 15.
3. Ишутов И.В. Основные принципы озонотерапии в лечении пациентов с хроническим остеомиелитом / И.В. Ишутов, Д.Г. Алексеев // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – Т. 4, № 2. – 2011. – С. 314-320.
4. Никитин Г.Д. Хирургическое лечение остеомиелита / Г.Д. Никитин, А.В. Рак, С.А. Линник – СПб, 2000. – С. 286.
5. Zimmerli W., Trampuz A., Ochsner P.E. Prosthetic-joint infections. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 1645-1654.

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Липатов В.А., Михеев Д.В., Фролова О.Г.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

Спаечная болезнь брюшины остается одним из распространенных хирургических заболеваний живота. По поводу спаечной болезни ежегодно в хирургических отделениях оперируется до 1% ранее прооперированных больных, у 50% из которых развивается спаечная кишечная непроходимость с летальностью от 10 до 15%. С учетом неоспоримого факта, что в процессе спайкообразования основная роль отводится прорастанию соединительной ткани фибрином, пациенты с онкопатологией, находящиеся в состоянии гиперкоагуляции из-за основного заболевания, более подвержены формированию спаек брюшной полости [1].

Канцероматоз брюшины является одной из основных причин смерти пациентов с онкологическими заболеваниями брюшной полости. Зачастую это связано с развитием метастатической (канцероматозной) кишечной непроходимости в сочетании со спайками брюшной полости. Средний период между резекцией опухоли и развитием кишечной непроходимости, вызванной перитонеальными метастазами, составляет 19 месяцев [3].

Цель исследования. Изучить влияние применения депонированных в полимерном средстве «Мезогель» препаратов с цитостатическим действием и препарата «Мексикор®» на вероятность послеоперационного СПБП в эксперименте.

Задачи исследования.

1. Оценить в эксперименте *in vitro* инертность компонентов системы, депонированных в противоспаечном «Мезогеле».
2. Оценить в ходе эксперимента *in vivo* эффективность противоспаечных свойств «Мезогеля» с иммобилизованными в нем цитостатическими препаратами.
3. Оценить в эксперименте на животных противоспаечную эффективность препарата «Мексикор®» на фоне применения цитостатических препаратов, депонированных в «Мезогеле».

Исследование носило экспериментальный характер и было выполнено на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии научно-исследовательского института экологической медицины ГБОУ ВПО «Курского государственного медицинского

университета» Минздрава РФ и на кафедре высокомолекулярных соединений и коллоидов Воронежского государственного университета.

С целью установления возможных изменений физико-химических свойств основного компонента «Мезогеля» - карбоксиметилцеллюлозы - с исследуемыми препаратами (цисплатин, циклофосфан) проведено исследование смесей «Мезогеля» с цитостатиками методами ультрафиолетовой (УФ) и инфракрасной (ИК) спектроскопии. Предварительно регистрировали УФ- и ИК-спектры исследуемых препаратов, а затем их смесей. Проведены 2 серии физико-химических исследований *in vitro*.

Поочередно смешивали 100 мл «Мезогеля» с исследуемыми препаратами. Препарат «Циклофосфан-ЛЭНС быстрорастворимый» (производство «Верофарм», Россия) перед смешиванием растворяли в 3 мл воды для инъекций.

Для регистрации ИК-спектров исследуемые препараты и полученные *extempore* смеси помещали поочередно в ячейку прибора BrukerVertex 70 (Германия) с приставкой DIKEMiracle с Фурье преобразователем методом НПВО. Условия сканирования: 64 сканирования, разрешение 4 см⁻¹, в интервале 4000-550 см⁻¹.

Для снятия УФ-спектров исходные «Мезогель», Цисплатин и Циклофосфан и их смеси разбавляли в 100-1000 раз и поочередно помещали в кварцевую кювету толщиной 1 см. Степень разбавления подбирали таким образом, чтобы оптическая плотность растворов изменялась в пределах 0,1-1,0 относительных единиц. Данные УФ-спектроскопии получали на приборе «Suimadzy» (Япония) в кварцевых кюветах толщиной 1 см, в диапазоне 190-300 нм. Параметры регистрации: ширина щели 0,5 мм, режим slow, интервал регистрации 0,5 нм.

При разработке способов моделирования СПБП животным производилось травмирование висцеральной и париетальной брюшины. Брюшина вентральной стенки в правой подвздошной области после предварительной гидравлической препаровки с помощью 3 мл 0,9% раствора хлорида натрия отсепаровывалась и иссекалась на площади 1 см². Слепая кишка на всей поверхности подвергалась скарификации до появления на ее поверхности «кровоавой росы». Для осуществления щадящей скарификации тонкостенной слепой кишки предложено специальное устройство.

После моделирования СПБП выполнялось введение противовоспалительного средства «Мезогель» с исследуемыми цитостатиками.

Расчет дозировки «Мезогеля» производился из расчета 200 мл на пациента 70 кг. Таким образом, на 1 кг взрослого пациента приходится 2,8 мл/кг. С учетом коэффициента перерасчета на площадь поверхности тела человека (39,0) и коэффициента для крысы (7,0) доза вводимого «Мезогеля» составляет 10,7 мл/кг животного.

Эффективность препарата «Мексикор®» исследовалась в дозе 60 мг/кг. Максимальная суточная доза препарата «Мексикор®» для человека массой 70 кг не должна превышать 800 мг, т.е. 11,43 мг/кг; коэффициент пересчета на площадь поверхности тела человека - 39,0, коэффициент для крысы массой 250 г равен 7,0. В результате максимальная терапевтическая доза для крыс с данной массой тела равнялась 63,7 мг/кг. Таким образом, исследования проводились на крысах линии Wistar при внутримышечном введении 1 раз в сутки в течение 14 сут. в дозе, приближенной к максимальной суточной. Доза вводимого препарата была рассчитана с учетом коэффициента пересчета с использованием коэффициента доз для животных, в частности крыс (Freireich et al., 1966; Уланова И.П. и др., 1968).

Аналогично произведен перерасчет введения цисплатина (из расчета максимальной дозы введения 100 мг/сут и 1,43 мг/кг) и циклофосфан (из расчета 150 мг/сутки и 2,1 мг/кг) при массе человека 70 кг. Коэффициент пересчета на площадь поверхности тела человека – 39,0, коэффициент для крысы массой 250 г равен 7,0. В результате максимальная терапевтическая доза при однократном внутрибрюшном введении для цисплатина составила 7,96 мг/кг; для циклофосфана – 11,7 мг/кг.

Общий объем вводимого внутрибрюшинно субстрата не превышал 4,0 мл.

Животные выводились из экспериментов на 5 и 14 сутки. Выбор данного срока нами обусловлен следующими соображениями. Несмотря на то, что к 14 суткам новообразованная соединительная ткань полностью не сформировалась, и учитывая концепцию морфогенеза спаек на более поздних сроках, выраженность СПБП может уменьшиться или увеличиться, их морфологическое изучение на данном сроке позволяет оценить степень зрелости и тенденции эволюции новообразованной соединительной ткани. Особенно это ценно при проведении исследований с применением различных профилактических средств и способов в сравнительном аспекте.

После оценки общего состояния животных производилось их выведение из эксперимента путем передозировки эфирного наркоза.

Срединным разрезом вскрывались грудная и брюшная полости с изучением морфологии их органов. СПБП оценивался визуально с

учетом предложенной нами «Макроморфологической классификации спаек брюшной полости» и с помощью собственного метода семантического дифференциала [2] .

Заключение.

1. Отсутствие формирования стойких химических соединений при взаимодействии 3% водного раствора Na-КМЦ с циклофосфаном и цисплатином, доказанное методом как УФ- и ИК-спектроскопии, подтверждает физико-химическую инертность «Мезогеля» так и введенных в его основу препаратов.

2. Как «Мезогель», так и «Мезогель» с депонированными в нем цитостатиками обладают статистически значимым противоспаечным действием (снижают вероятность спаечных процессов в брюшной полости от 8,2 до 11,4 раз).

3. Депонирование препаратов с цитотоксическим действием в полимерном геле не вызвало увеличения послеоперационной СПБП (статистически значимые отличия между группами не выявлены).

4. Применение «Мексикора®» на фоне локальной химиотерапии цитостатиков, депонированных в полимерном геле, не вызвало статистически значимых изменений выраженности СПБП у экспериментальных животных .

Литература

1. Каприн, А.Д. Злокачественные новообразования в России в 2012 году: (заболеваемость и смертность) / А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Г.В. Петрова. – М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России, 2014. – 250 с.

2. Липатов В. А. Обоснование применения геля метилцеллюлозы для профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной полости : дис. – Курск : [Курс. гос. мед. ун-т], 2004.

3. Sugarbaker, P.H. Management of peritoneal-surface malignancy: the surgeon's role / P. H. Sugarbaker // Langenbecks Arch. Surg. – 1999. – Vol. 384, № 6. – P. 576–587.

4. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – №. 1 (2).

ОПТИМАЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТОНКОКИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ

Кригер А.Г.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, Москва, Россия

Введение. Возникновение кишечного свища после операций на органах брюшной полости является тяжелым осложнением, несущим реальную угрозу для жизни больного. Правильное тактическое решение при определении действий, направленных на устранение свищей, определяет успех лечения. Каждый больной требует индивидуального решения возникшей проблемы, однако существуют и общие принципы лечения.

Цель работы. Улучшение результатов лечения больных кишечными свищами.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 35 больных с тонкокишечными свищами. Несформированные тонкокишечные свищи были у 10 больных. В гнойную (брюшную) полость свищи открывались у 5 больных, из них флегмона передней брюшной стенки была у 3; в гранулирующую рану свищи открывались у 2 больных. Сформированные кишечные свищи были у 25 больных. Резекции кишки различной протяженности ранее были выполнены у 29 больных. При этом длина оставшейся тонкой кишки, включая сегмент со свищом, у этих больных составляла от 110 до 340 см. При поступлении больных объем потерь кишечного содержимого по свищу составлял от 50 до 7000 мл, но в большинстве случаев (26 больных) потери составляли 900 - 1100 мл в сутки.

В основу предоперационного обследования входило динамическое рентгенологическое исследование кишечника. Использовались как фистулоскопия с фистулографией, так и рентгеноскопия кишечника с пероральным приемом контрастного препарата. При исследовании оценивали длину кишки от дуоденоюнального перехода до свища и протяженность отводящей части кишки. Целенаправленно оценивали возможность наличия внутренних патологических соустьев тонкой кишки с другими полыми органами.

Основой консервативного лечения, направленного на подготовку больного к операции, являлось полное парентеральное питание без любой оральной стимуляции пищеварения; коррекция белкового и водно-электролитного баланса. За счет полного исключения перорального приема пищи и жидкости объем потерь кишечного содержимого сокращался в среднем до $330,4 \pm 85,1$ мл в сутки.

Местное лечение раны являлось неотъемлемым компонентом подготовки к оперативному вмешательству. В зависимости от ситуации

использовали активную либо пассивную аспирацию кишечного отделяемого в комбинации с мерами, направленными на защиту кожи. Для активной аспирации применяли неприсасывающиеся дренажи: двухпросветные и двухканальные трубки ТММК (трубки медицинские многоканальные кремнийорганические) или У-образный дренаж по Чаффину. Для защиты кожи от агрессивного воздействия кишечного содержимого в комбинации с дренированием использовали антимикробные разрезаемые пленки.

Результаты. Радикальное одномоментное хирургическое лечение произведено 30 больным; двухэтапное хирургическое лечение - 3 больным. Не удалось устранить несформировавшиеся свищи, открывавшиеся в гранулирующую рану, – у 2 больных.

Среднее время оперативных вмешательств составило $173,9 \pm 118,9$ минут. При этом интраоперационная кровопотеря была $242,59 \pm 387,23$ мл. Средний койко-день составил 28 ± 19 суток, средний койко-день после операций $18,11 \pm 16,85$ сут.

Послеоперационные осложнения возникли у 10 больных. В послеоперационном периоде 7 пациентам потребовалось повторное оперативное вмешательство. В 2 случаях выполнялись пункции и дренирование затеков под УЗИ-контролем (по поводу тонкокишечного затека и по поводу гнойного затека). Повторные оперативные вмешательства потребовались 3 больным: в одном случае по поводу частичной несостоятельности межкишечного анастомоза, двум больным релапаротомия выполнялась по поводу внутрибрюшного кровотечения. Летальных исходов не было.

Заключение. Залог успеха хирургического лечения во многом определяется правильно выбранным сроком операции. На момент операции воспалительная инфильтрация кишечной стенки должна отсутствовать или быть минимальной. Оптимальный срок для операции составляет от 3 до 4 месяцев с момента формирования свища. Преждевременное оперативное вмешательство закономерно оканчивается неудачей и усугубляет ситуацию.

Радикальная операция по поводу кишечных свищей всегда требует выполнения пластики брюшной стенки. Бактериальная обсемененность раны ограничивает возможность применения эндопротезов, поэтому предпочтение следует отдавать различным методам пластики собственными тканями.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Варжапетян А.М.^(1,2), Барсегян А.А.^(1,2), Хондкарян Р.А.^(1,2),
Авакян Т.Г.⁽¹⁾, Хачатрян А.С.⁽¹⁾*

**Ереванский государственный медицинский университет⁽¹⁾;
Медицинский центр “Астгик”, Ереван, Армения⁽²⁾**

Вот уже несколько лет в клиническую практику внедрен новый более совершенный метод ARFI-эластографии при диагностике узлов щитовидной железы. Степень ее диагностической точности сегодня находится на этапе бурного обсуждения в научных публикациях с предоставлением резко противоречивых результатов.

Материал и методы. Произведен ретроспективный и проспективный анализ клинических данных исследования и результатов лечения 116 больных. Пациенты разделены на 3 группы. Во всех группах результаты предположительного предоперационного диагноза сравнивали с данными заключения послеоперационного гистологического исследования препарата. Первую группу (n=36) составили больные, у которых предоперационный диагноз основывался на заключении цитологического исследования после тонкоигольной аспирационной биопсии. Эластография в этой группе не была произведена. Вторая группа представлена пациентами (n=28), которые отказались от ТАБ, и операция произведена после исследования щитовидной железы методом количественной ARFI эластографии. При этом злокачественный процесс в узле предполагался при максимальной плотности узла 4.00м/сек и более. В вышеотмеченных первых двух группах произведен ретроспективный анализ данных. В третьей группе (n=58) произведено проспективное исследование. Больным данной группы в предоперационном периоде производилась ARFI эластография, определялись максимально плотные участки ткани узла, из которых преимущественно прицельно производилась пункционная биопсия. В первой группе диагностическая точность составила 77.8%. В этой группе основная проблема возникает при дооперационном морфологическом диагнозе фолликулярных структур (фолликулярная аденома и карцинома), что снижает диагностическую специфичность ТАБ и это вынуждает к поиску дополнительных приемов и методов повышения информативности данного исследования. При анализе данных второй группы особое внимание обращает на себя высокая эластографическая плотность в узлах при тиреоидите Хашимото. Последний факт резко снижает показатель диагностической точности эластографии, который составил 57% (16/28). В третьей группе диагностическая точность составила 95%. При этом считаем важным отметить, что из заключений гистологического исследования данной группы в одном случае папиллярный рак и в одном случае медуллярный

рак диагностированы на стадии in situ. Из 24 случаев цитологического диагноза фолликулярной опухоли у 2 пациентов эластографические показатели плотности узлов превышали 5м/сек. И именно у этих больных диагностирован фолликулярный рак щитовидной железы.

Заключение. Таким образом, комбинированное применение ARFI эластографии и ТАБ приводит к оптимизации и повышению диагностической точности, информативности и специфичности при исследовании узлов щитовидной железы. Эффективность ТАБ можно повысить при производстве прицельной пункции по возможности с наиболее плотных участков узла, которые выявляются методом ARFI эластографии.

Литература

1. Васильев Д.А. и соавт. Пути улучшения диагностической значимости соноэластографии при дифференциальной диагностике узловых заболеваний щитовидной железы. Клиническая и экспериментальная тиреодология. 2014; 1:38-43.
2. Rivo Vazquez A., Rodriguez Lorenzo A., Rivo Vazquez J.E. et al. The use of ultrasound elastography in the assessment of malignancy risk in thyroid nodules and multinodular goitres. Clin Endocrinol. 2013; 79(6):887-891.
3. Russ G., Royer B., Bigorgne C. et al. Prospective evaluation of thyroid imaging reporting and data system on 4550 nodules with and without elastography. Eur J Endocrin. 2013;168(5):649-655.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С КИСТОЗНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ БРЫЖЕЙКИ

*Игнатьев Е.М., Ефременков А.М., Петрикова Н.И., Тома А.Н.,
Берёзка В.Н.*

Детская областная клиническая больница, Белгород, Россия

Кистозные образования брыжейки кишечника являются довольно редкой патологией, по данным разных авторов частота их колеблется от 1:2000 до 1:100 000. Данные образования зачастую представлены лимфангиомами и кистозными удвоениями пищеварительного тракта. Большинство данных образований бессимптомны, медленно увеличиваются с возрастом и в большинстве случаев диагностируются случайно. Лишь некоторая часть этих образований приводит к кишечной непроходимости, болевому синдрому, визуальному увеличению живота. Кроме этого, энтерокистомы могут осложняться воспалением, кровотечением, перитонитом.

За последние 5 лет в областной детской клинической больнице г. Белгорода прооперировано 9 детей в возрасте от 2-х месяцев до 16 лет с кистозными образованиями брыжейки различных размеров и локализаций. У двух пациентов заболевание проявилось клиникой острой кишечной непроходимости и диагноз установлен интраоперационно, у одного – единственной жалобой явилось увеличение живота, у остальных шести – заболевание протекало бессимптомно и выявлено случайно, у одного из них – на внутриутробной скрининговой сонографии, у одного – при ЭВХ-аппендэктомии. Предоперационное обследование включало УЗИ, в ряде случаев СКТ брюшной полости.

Дети с клиникой непроходимости оперированы лапаротомным доступом. Все плановые операции мы начинали с лапароскопии, оценивали характер, размеры и локализацию кистозного образования, а также возможность его удаления через мини-доступ. У 7 пациентов в качестве минилапаротомного доступа использовали поперечную лапаротомию в правой или левой подвздошных областях. У двух детей в связи с большими размерами образований проведена срединная лапаротомия.

В наших наблюдениях в случае лимфангиом брыжейки удалить образования с сохранением мезентериальных сосудов не представлялось возможным, в связи с чем выполнена резекция петель кишки, несущих лимфангиому с наложением прямого анастомоза. Энтерокистомы удалены без резекции. Гистологические данные подтвердили диагноз лимфангиомы. Мы не отметили осложнений во время операции и в послеоперационном периоде. Катамнез более года прослежен у 7 больных – рецидивов не возникло.

Выводы. Учитывая относительную редкость кистозных образований брыжейки, каждый клинический случай представляет безусловный интерес и требует индивидуального подхода к оперативному лечению, которое, считаем, во всех случаях целесообразно начинать с лапароскопии, активно используя видеоассистированные техники, которые позволяют добиться выздоровления и удовлетворительного косметического результата.

Литература

1. Ашкрафт К.У., Холдер Т.М. Детская хирургия. – СПб., 1997. Т. 1-3.
2. Хирургические вмешательства у детей с интраабдоминальными лимфангиомами / Ю.Ю. Соколов, Д.В. Донской, А.В. Вилесов и др. // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2014. Т. IV, № 1. – С. 20–24.
3. de Lagausie P., Bonnard A., Berrebi D. et al. Abdominal lymphangiomas in children: interest of the laparoscopic approach // Surgical Endoscopy. 2007. Vol. 21. P. 1153–1157.

ОПЫТ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Хвостовой В.В.⁽¹⁾, Романищев В.Е.⁽²⁾, Нетьяга Р.А.⁽²⁾, Саинсус С.С.⁽²⁾

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
университет»⁽¹⁾;**

**Курский областной клинический онкологический диспансер⁽²⁾,
Курск, Россия**

В настоящее время общепринятыми методами лечения злокачественных опухолей головы и шеи является комбинированный и комплексный с приоритетом хирургического этапа. Топографо-анатомические особенности органов головы и шеи диктуют необходимость выполнения расширенных комбинированных хирургических вмешательств даже при небольшом объеме опухоли. Применение методов пластической хирургии дает возможность восполнить как объем удаленных тканей, так и восстановить адекватный прием пищи, артикуляцию. Свободная микрохирургическая трансплантация комплекса тканей возможна с формированием лоскутов любых объемов и форм, включением нескольких типов тканей. В период марта – августа 2016 г в отделении опухолей головы и шеи Курского областного клинического онкодиспансера было выполнено 5 микрохирургических реконструкций тканей полости рта, губы. Микрохирургический этап выполнялся с использованием операционного микроскопа Carl Zeiss при 4-10-кратном увеличении. Микрососудистые анастомозы накладывались отдельными узловыми швами полиамидной нитью 9/0-10/0. В трех случаях после расширенной комбинированной глоссэктомии реконструкция диафрагмы полости рта и языка выполнялась одномоментно с использованием свободного торакодорзального лоскута. Микрососудистые анастомозы накладывались между сосудами лоскута и лицевыми сосудами. В одном случае ввиду анатомических особенностей в качестве донорской была выбрана наружная сонная артерия. В двух случаях был восстановлен прием пищи и артикуляция. В одном на 7-е сутки произошел венозный тромбоз с последующим некрозом лоскута. В двух случаях была выполнена отсроченная реконструкция нижней губы и тканей щеки с применением свободного лучевого лоскута предплечья в виде дубликатуры. Артериальные анастомозы накладывались между лучевой артерией лоскута и лицевой артерией. Трансплантация лучевого лоскута требует наложения 2-венозным анастомозом – между лицевой веной и комитантной веной лоскута и между зачелюстной веной и подкожной веной лоскута. В обоих случаях была восстановлена запирающая функция губ и адекватный прием пищи.

Таким образом, использование микрохирургической реконструкции значительно расширяет возможности восстановления тканей и органов после операций по поводу опухолей головы и шеи.

Литература

1. Обыденнов С.А., Фраучи И.В. Основы реконструктивной пластической микрохирургии. – СПб.: Человек, 2001. – 144 с.
2. Chen Wei Fu, Mardini Samir. Flaps and reconstructive surgery, 2009. – 623 p.
3. Wolff K.-D., Holzle F. Raising of microvascular flaps, 2005. – 185 p.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РГП С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМ-АССИСТИРОВАННОЙ ЛАПАРОСТОМЫ

*Шапкина В.А.⁽¹⁾, Первова О.В.⁽¹⁾, Черданцев Д.В.⁽¹⁾, Дятлов В.Ю.⁽²⁾,
Тахтобин Е.Г.⁽³⁾, Пирова А.Ш.⁽³⁾, Анохина А.Р.⁽³⁾, Амельченко А.А.⁽³⁾,
Бусыгин Е.В.⁽³⁾*

**ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России⁽¹⁾;**

Научно-образовательный центр «Хирургия»⁽²⁾;

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»⁽³⁾, Красноярск, Россия

Актуальность. Распространенный гнойный перитонит (РГП) занимает лидирующие позиции среди всей хирургической патологии. Летальность от РГП, по результатам различных исследований, колеблется от 40% до 70%. Имеющиеся традиционные хирургические методики лечения пациентов с РГП несовершенны и имеют массу осложнений, в связи с чем актуальным на сегодняшний день является поиск новых технологий лечения РГП. Перспективным направлением в решении этой проблемы является применение вакуум-ассистированной лапаростомы.

Цель: оценить уровень летальности и динамику индекса брюшной полости у пациентов с РГП с использованием традиционной лапаростомы (ТЛ) и вакуум-ассистированной лапаростомы (ВЛ).

Материалы и методы: объектом исследования стали 50 пациентов с диагнозом РГП, находившиеся на лечении в Красноярском краевом гнойно-септическом центре (КК ГСЦ) с 2013 по 2015 год. Проводились оценка степени тяжести пациентов с использованием интегральных шкал SAPS II, SOFA, определением MPI, индекса брюшной полости (ИБП), сравнительный анализ показателей летальности, частоты развития осложнений. Для статистической обработки данных использовалась программа STATISTICA 8.0.

ТЛ наложена 32 пациентам, из них средняя степень тяжести (СТ) у 23 (68,7%), тяжелое течение (ТТ) у 6 (18,7%), крайне-тяжелое течение (КТ) у 3 (9,4%); ВЛ применена 18 пациентам, из них СТ у 11 пациентов (61%), ТТ у 5 (28%), КТ у 2 (11%).

С использованием ТЛ наибольшая летальность наблюдалась у пациентов в группе ТТ и КТ - 66,7% и 66,7% соответственно, здесь же динамика ИБП после первой saniрующей операции составила 0,8. При использовании ВЛ летальность у пациентов в группе ТТ составила 40%, КТ - 50% . Динамика ИБП после первой saniрующей операции составила 2,8 и 4,8 соответственно.

Выводы: при использовании ВЛ в лечении больных с РГП выявлена тенденция к более выраженному снижению ИБП после первой saniрующей операции в сравнении с ТЛ. Также наблюдается значимое

снижение процента летальных исходов, что позволяет считать ВЛ перспективной методикой и является основанием для проведения дальнейших исследований в этом направлении.

Литература

1. Абдоминальный сепсис, возможности антибактериальной терапии и иммунокорригирующей терапии / Б.С. Брискин, Н.Н. Хачатрян, З.И. Савченко и др. // Хирургия. – 2002. – № 4. – С. 69–74.
2. Современные возможности санации брюшной полости при распространенном гнойном перитоните / Д.В. Черданцев, О.В. Первова, В.Ю. Дятлов и др. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2013. – № 10. – С. 32-37.

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛАГЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТОМ КОМПОНЕНТЕ ТКАНЕЙ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ И ГРЫЖЕВОГО МЕШКА ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Деркач Н.Н., Кондратюк Э.Р., Гривенко С.Г.

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Симферополь, Россия

Анализ исследований последних лет показал, что одна из главных причин образования грыжи – это врожденная дисплазия соединительной ткани (Чай-кин Д.А., 2015). Ряд исследователей пришли к выводу о низком количественном соотношении зрелого коллагена I типа и незрелого коллагена III типа у больных с грыжевым анамнезом, тем самым продемонстрировав связь генерализованного нарушения созревания коллагена с образованием грыжи (Федосеев А. В., 2010).

Цель работы: установить характер нарушений коллагенообразования в стромально-сосудистом компоненте тканей грыжевых ворот и грыжевого мешка при послеоперационных вентральных грыжах.

Материалы и методы. Изучен биопсийный материал, полученный интраоперационно у 16 больных с послеоперационными вентральными грыжами (60 гистологических препаратов), с использованием иммуногистохимических методик. Последние проводили непрямым методом Кунса по методике Brosman M. (1979). Препараты изучали в микроскопе ЛЮАМ-ИЛ2. Оптическую плотность иммунофлюоресценции определяли по методу Губиной-Вакулик Г.И. и соавт., 2009 с помощью микроскопа «Olympus» BX-41.

Результаты. При оценке интенсивности свечения коллагенов в грубоволокнистом компоненте обнаружено преобладание коллагена I типа. При этом в грыжевом мешке этот показатель был достоверно выше, чем в зоне грыжевых ворот. Тогда как в отношении коллагена III типа отмечается обратная картина. В зоне грануляционной ткани также выявлены оба коллагена с заметным преобладанием III типа. В то же время интенсивность свечения коллагена I типа была достоверно выше в грануляциях грыжевого мешка, а коллагена III типа – в грануляционной ткани грыжевых ворот. Оба коллагена выявлены и в составе мышечного компонента. При этом обнаружено, что количество коллагена I типа в мышечной ткани грыжевых ворот было меньшим, по сравнению с мышечной тканью грыжевого мешка. Интенсивность свечения коллагена III типа также оказалась меньшей в зоне грыжевых ворот. В сосудистых стенках выявлено свечение коллагена IV типа в

составе базальных мембран сосудов. В то же время в стенках некоторых сосудов выявлялось очаговое свечение коллагена III типа, интерстициального коллагена, не характерного в норме для сосудистых стенок.

Таким образом, обнаружены нарушения процессов созревания коллагена III типа в коллаген I типа, тогда как синтез фибробластами коллагена I типа усилен. Активизация коллагенообразования I типа приводит к развитию склеротических процессов как в зоне грыжевых ворот, так и особенно в зоне грыжевого мешка, что приводит к структурной недостаточности соединительной ткани, а, следовательно, и к ее функциональной неполноценности.

Литература

1. Чайкин Д.А. Новые данные о патогенезе паховых грыж (обзор литературы) / Д.А. Чайкин, Д.В. Черданцев // Медицина и образование в Сибири. – 2015. - № 3. – С. 23.
2. Федосеев А.В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани как один из возможных механизмов образования наружных вентральных грыж / А.В. Федосеев, А.А. Чекушин // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. - 2010. - № 3. – С.125-130.

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО
И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ РЕЗЕЦИРОВАННОЙ ПЕЧЕНИ КРЫС
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

Колесник И.М.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

Регенерация печени – сложный процесс, который необходимо рассматривать не только как пролиферацию зрелых клеток, но и как дифференцировку стволовых клеток, то есть их способность под действием определенных сигналов, исходящих из специфического окружения, приобретать свойства клеток поврежденного органа. Значимую роль в процессе регенерации печени играет ангиогенез. Следовательно, воздействие на печень с целью инициации регенерации должно быть глобальным. В этой связи нельзя не вспомнить о феномене прекондиционирования.

Цель исследования: изучить влияние дистантного ишемического прекондиционирования (ДИП) и фармакологического прекондиционирования рекомбинантным эритропоэтином (РЭП) и L-аргинином (АРГ) на состояние резецированной печени крыс.

Материалы и методы: исследование выполнено на 270 белых крысах линии Wistar массой 210-220 г. Резекцию печени осуществляли на вторые сутки эксперимента в объеме 70%. ДИП проводили 10-минутным пережатием левой бедренной артерии каждые 48 часов первые семь суток эксперимента. Фармакологическое прекондиционирование осуществляли введением РЭП в суточной дозе 2,5 МЕ/кг, АРГ - 200 МЕ/кг по аналогичной схеме. Состояние печени оценивали по показателю летальности, уровню микроциркуляции в печени, выраженности цитолиза, синтетической функции печени и результатам морфологического исследования.

Результаты: в контрольной группе показатель летальности 40%. Уровень микроциркуляции снижается на 50% и начинает восстанавливаться лишь после 14 суток, однако к 90 суткам ниже показателя в интактной группе. АлАТ и АсАТ на 2-е сутки 108 ± 4 МЕ/л и 184 ± 7 МЕ/л, восстанавливаются к 21 суткам. МНО на 7-е сутки – $2,4 \pm 0,2$, на 21-е – $1,6 \pm 0,1$, на 28-е – $1,4 \pm 0,1$. Масса печени на 2-е сутки увеличивается в 2 раза, к 7-м несколько уменьшается, затем увеличивается, однако на 28-е сутки достоверно меньше массы печени интактных крыс. При микроскопии – на отдаленных сроках сохраняется неравномерное кровенаполнение сосудов, очаги зернистой дистрофии гепатоцитов, очаги склерозирования и воспалительной инфильтрации портальных трактов. В группе с ДИП летальность 15%, с РЭП и АРГ -

0%. Уровень микроциркуляции в опытных группах снижается на 15% и восстанавливается до 21-х суток. АлАТ нормализуется на 7-е сутки, АсАТ на 14-е. МНО незначительно повышается к 7-м суткам, восстанавливается к 14-м суткам. Масса печени на 2-е сутки увеличивается в 2 раза, продолжая расти и достигая показателя интактной группы до 14 суток. При микроскопии резецированной печени на отдаленных сроках нарушений микроциркуляции и признаков повреждения гепатоцитов в группах с ДИП, РЭП и АРГ не выявлено.

Заключение: дистантное ишемическое прекондиционирование, фармакологическое прекондиционирование рекомбинантным эритропоэтином и L- аргинином стимулируют регенерацию резецированной печени крыс.

Литература:

1. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – №. 1 (2).

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИИ ПОЧКИ РАСТВОРОМ «ПЕРФТОРАН» В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Клочков М.М., Рязанцев А.А.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.
Горького; Республиканский онкологический центр им. проф. Г.В.
Бондаря,
г. Донецк, Украина (ДНР)

Наиболее распространенным методом резекции почки является ее мобилизация с наложением клеммы на почечную артерию после чего производится резекция. Но даже среди больных с электроактивными показаниями к резекции почки прогнозируемая функциональная несостоятельность «здоровой почки» в послеоперационном периоде, по данным М. Marberger, достигает 18%, по данным Ю.Г. Аляева и А.А. Крапивина - 20,7%. Ведущим патогенетическим фактором, обуславливающим разнообразные нарушения функции почек, является гипоксия.

Цель работы: разработать методику, снижающую ишемическое повреждение почек и сохраняющую их функцию в послеоперационном периоде.

Материалы и методы: в эксперименте участвовало 10 животных. В контрольной группе животным выполнена резекция почки в условиях классической «тепловой ишемии» (n=5). В опытной группе (n=5) резекция выполнялась в условиях гипотермической перфузии через почечную артерию во время выполнения центральной «тепловой ишемии»; далее проводилась перфузия охлажденного до 4°C раствора «Перфторан» в течении всей операции с помощью инфузомата со скоростью 2,5 мл/минуту. Катетеризация производилась на выделенной почечной артерии набором для катетеризации центральной вены, впоследствии дефект сосуда был ушит узловыми швами. Для объективной оценки лабораторных и морфологических исследований двум группам животных была выполнена предварительно нефрэктомия. Через 40 дней животным проводилась резекция нижнего полюса почки с использованием зажима генератора высокочастотной биологической сварки ЕК300М1. На 14 сутки была выполнена повторная резекция почки. Материал отдан на гистологическое исследование. Функциональные пробы производились до ишемии, после ишемии, на 3 и 7 сутки.

В контрольной группе из 5 животных выжило 3. Гибель 2-х животных наступила в течении первых трех суток от ОПН, развившейся вследствие распространенных некротических изменений канальцев. У животных выявили нарушение азотовыделительной функции, падение диуреза и клубочковой фильтрации. При гистологическом исследовании

у погибших и выживших животных гистологическая картина соответствовала ОПН: наблюдалось повреждение канальцев в виде тубулонекроза, местами повреждена и базальная мембрана клубочков.

В опытной группе животных функция почки была удовлетворительной. Падения диуреза у животных не было, наблюдалось достоверное снижение клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, которые на 3-е сутки достигли дооперационных цифр. Выраженные нарушения азотовыделительной функции ликвидировались к 7-м суткам. Гистологически подтверждено, что структура коркового и мозгового вещества имела обычное строение, клеточной инфильтрации не выявлялось, уротелий викарно гипертрофирован, установлено снижение средней высоты эпителиоцитов извитых канальцев на 13% по сравнению с контрольной группой.

Предложенная методика способствует снижению проявления реперфузионного синдрома и может использоваться для профилактики ОПН.

Литература

1) FACTORS OF ISCHEMIC LESIONS IN THE KIDNEY AND ITS RESECTION Авторы: Дряженков Игорь Геннадьевич, Комлев Дмитрий Леонидович, Лось Марина Сергеевна. Журнал «Клиническая медицина», выпуск № 6, том 91. – 2013.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗАДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА ТАЗА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНО НЕСТАБИЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Слияков Л.Ю., Кавалерский Г.М., Прохоров А.А.

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России,
Москва, Россия

Вступление: применение ТПФ в лечении синдрома травматического позвоночно-тазового разобщения соответствует травматолого-ортопедическим критериям: анатомическая репозиция, восстановление опороспособности, ранняя вертикализация, возможность декомпрессии стенозированного сакрального канала.

Цель: оценка комплаэнтности транспедикулярной фиксации и её влияние на биомеханику позвоночника при синдроме позвоночно-тазового разобщения.

Материалы и методы: 17 пациентам с травматической нестабильностью тазового кольца и пояснично-подвздошного перехода (11 пациентов имели неврологические осложнения) была проведена илео-люмбальная стабилизация с восстановлением целостности костей таза. Повреждения КПС, лонного симфиза устранялись низведением гемипельвинса с помощью установленных транспедикулярных фиксаторов, находящихся на уровне L4-5 – Ala ossis illi. Переломы крестца фиксировались поперечным коннектором. При наличии неврологического дефицита выполнялась декомпрессия сакрального канала. Заключительный этап – наkostный или чрескостный остеосинтез лобкового сочленения. Верхний уровень стабилизации зависел от места повреждения поясничного отдела позвоночника. Нижний уровень – сегмент L5-S1- Ala ossis illi. Активизация пациентов осуществлялась на 1-2 сутки после операции. Объем лекарственной терапии определялся симптоматически.

Результаты: Эффективность лечения оценивалась по отсутствию вторичного смещения, стабильности поврежденных сегментов; комплаэнтность – по результатам опросов ODI, ВАШ боли. Срок наблюдения – 1,5 года. Результаты рентген-контроля удовлетворительные, через 9 месяцев вторичные смещения отсутствовали. У 4 пациентов сохранялись нарушения функций тазовых органов. Через год у пациентов с двигательными и чувствительными нарушениями отмечалась положительная динамика, потребности в удалении ТПФ не возникло. По результатам индивидуального опроса пациентов до операции и спустя 1,5 года получены следующие данные: ODI $63,48 \pm 3,26$ и $28,74 \pm 0,84$, ВАШ боли $7,6 \pm 1,7$ и $1,9 \pm 0,6$ соответственно. Полученные результаты по литературным данным*

сопоставимы с традиционными методами фиксации костей таза и не приводят к значимым статико-динамическим нарушениям поясничного отдела позвоночника.

Заключение: Транспедикулярную пояснично-тазовую фиксацию возможно отнести к высокоэффективным и прогрессивным методам лечения вертикально нестабильных повреждений таза.

Литература

1. 2013 | Volume : 36 | Issue : 6 | Page : 289-294 Outcome analysis of unstable posterior ring injury of the pelvis: Comparison between percutaneous iliosacral screw fixation and conservative treatment Po-Han Chen, Wei-Hsiu Hsu, Yen-Yao Li, Tsan-Wen Huang, Tsung-Jen Huang, Kuo-Ti Peng.
2. International Journal of Orthopedics and Rehabilitation, 2014, 1, 25-29 E-ISSN: 2313-0954/14 © 2014 Savvy Science Publisher Chronic Pain Due to Pelvis Fracture and Perceptive Rehabilitation G. Morone^{1,*}, T. Paolucci², A. Fusco¹, M. Iosa, V.M. Saraceni², E. Spadini³ and S. Paolucci¹.
3. Zindrick MR, Wiltse LL, Widell EH, Thomas JC, Holland WR, Field BT, et al. A biomechanical study of intrapeduncular screw fixation in the lumbosacral spine. Clin Orthop Relat Res 1986;203:99-112
4. Lykomitros V.A., Papavasiliou K.A., Alzeer Z.M., Sayegh F.E., Kirkos J.M., Kapetanios GA. Management of traumatic sacral fractures: a retrospective case-series study and review of the literature. Injury 2010;4:266-72.

**ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ДИССЕКЦИИ
И КОАГУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ТИРЕОИДЭКТОМИИ**

**Варжапетян А.М.^(1,2), Барсегян А.А.^(1,2), Авакян Т.Г.⁽¹⁾,
Малхасян С.В.^(1,2)**

**Ереванский государственный медицинский университет⁽¹⁾;
Медицинский центр “Астгик”, Ереван, Армения⁽²⁾**

В эндокринной хирургии одной из наиболее часто производимых оперативных вмешательств является тиреоидэктомия. Учитывая тот факт, что щитовидная железа имеет очень интенсивную васкуляризацию, то бескровность тиреоидэктомии важна не только для предотвращения кровопотери, но и возможного развития таких характерных осложнений, как повреждение и удаление паращитовидных желез, травмы верхнего и возвратного гортанных нервов. Мы задались целью проанализировать наши клинические данные по применению ультразвукового скальпеля Harmonic (Ethicon) и электрохирургического блока LigaSure (Covidien) при операциях на щитовидной железе.

Материалы и методы. Произведено изучение клинических данных 268 пациентов. Больные разделены на три сравниваемые между собой группы. Первая группа составлена 82 пациентами, которые были прооперированы с применением традиционной методики наложения зажимов с последующим прошиванием или лигированием тканей и сосудов. 102 пациентам второй группы операции производились с применением ультразвукового скальпеля Harmonic. А при операциях на 84 пациентах третьей группы применялась установка LigaSure компании Covidien. Все три группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу и патологии, по поводу которой производилась операция. Сравнительному анализу подвергались следующие признаки: продолжительность операции (в минутах), интраоперационная кровопотеря (мл), продолжительность послеоперационного госпитального периода (в койко/днях), послеоперационный парез голосовых связок, послеоперационная гипокальциемия. Результаты. Продолжительность операции в первой группе составила 138 ± 24 минут, во второй группе - 68 ± 22 минуты, а в третьей группе данный показатель был минимальным и составил 56 ± 15 . Интраоперационная кровопотеря превалировала в первой группе, достигая 66 ± 18 мл. Вторая и третья группы по показателю этого признака почти не отличались (22 ± 12 и 18 ± 14 соответственно). Количественные показатели послеоперационной гипокальциемии и пареза голосовых связок во всех трех группах практически не отличались, в то время, как отмечается очевидное уменьшение продолжительности послеоперационного госпитального периода во второй и третьей группах исследования.

Заключение. Таким образом, благодаря использованию ультразвукового скальпеля Harmonic и установки LigaSure при тиреоидэктомии достигается значительное снижение продолжительности операции, количества интраоперационной кровопотери и сроков госпитализации. При этом не увеличивается риск развития послеоперационных осложнений.

Литература

1. Kirdok T. et al. Use of Ligasure in thyroidectomy procedures: results of prospective comparative study. Wourld J Surg. 2005; 29: 771-774.
2. Marchesi M. Ultrasonic scalpel in thyroid surgery / [M. Marchesi, M. Biffoni, R. Cresti et al.] // Chir. Ital. – 2003. - № 55(2). – P. 299-308.
3. Papavramis T. et al. Ultracision harmonic scalpel versus clamp-and-tie total thyroidectomy: a clinical trial. Head. Neck 2010; 32: 723-727.
4. Santori P. et al. Ligasure versus ultracision in Thyroid surgery: a prospective randomized study. Langerbecks Arch. Surg. 2008; 393: 655-658.

**ПОКАЗАТЕЛИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
ПОРОШКА НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В ОПЫТЕ IN VITRO**

Константинова Ю.Е., Абросимова Н.В.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

В абдоминальной хирургии травмы печени встречаются в 7,6-23,3% случаев, селезенки – в 15-50% [1, 2, 3]. При сочетанной травме летальность достигает 33,3% [1, 3]. Проблема разработки кровоостанавливающих материалов и методик их бесшовного применения при кровотечении из паренхиматозных органов остается актуальной до сих пор.

Цель: проанализировать показатели кровоостанавливающей активности порошка на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в условиях эксперимента in vitro.

Материалы и методы. В качестве материала для эксперимента был использован исследуемый нами кровоостанавливающий порошок на основе КМЦ, разработанный совместно с ООО «Линтекс», г. Санкт-Петербург (научный руководитель В.А. Жуковский) – группа № 1; как образец для сравнения применяли присыпку гемостатическую «Статин» (производитель ООО «Группа Компаний Пальма», г. Москва) – группа № 2. В качестве контроля были использованы показатели крови, полученные без применения кровоостанавливающих средств (группа № 3).

Нативная кровь бралась у 10 здоровых доноров-добровольцев (мужского пола в возрасте от 20 до 24 лет) в количестве 5 мл в каждую пробирку при комнатной температуре, с соблюдением всех норм асептики. Измерение времени свертывания крови проводили по методу Ли-Уайта.

Для определения массы и объема кровяного сгустка использовали пробирки с градуированной шкалой объема. В течение 3 минут их инкубировали в термостате при температуре 37°C. Центрифугирование 10 минут при 1500 оборотах в минуту. Отделившуюся сыворотку удаляли, оставшийся сгусток взвешивали. По делениям пробирки измеряли объем кровяного сгустка. Для подтверждения достоверности исследований использовался U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования нами было установлено, что использование любых образцов кровоостанавливающих имплантатов уменьшает время свертывания крови, объем и массу кровяного сгустка.

Наименьшая продолжительность времени свертывания крови (сек) в группе № 1 – $264,12 \pm 16,9$. Это на 58,1% меньше, чем в контроле ($630,61 \pm 25,41$), и в 1,84 раза меньше, чем в группе № 2 ($485,73 \pm 19,32$).

Объем кровяного сгустка (мл) в пробирке группы № 1 ($2,52 \pm 0,12$) оказался на 20,8% меньше, чем в группе № 3 ($3,18 \pm 0,13$) и в 1,1 раза меньше (10%), чем в пробирке 2 группы ($2,8 \pm 0,17$).

Масса кровяного сгустка (мг) в группе № 1 ($3,3 \pm 0,15$) на 25% меньше, чем в группе № 3 ($4,4 \pm 0,2$) и в 1,17 раз меньше (6,25%), чем в группе № 2 ($3,52 \pm 0,12$).

Заключение. Наиболее выраженной кровоостанавливающей активностью обладает образец кровоостанавливающего порошка на основе карбоксиметилцеллюлозы (группа № 1).

Литература

1. Выбор способа гемостаза при повреждениях и очаговых поражениях селезенки / Г.С. Рагимов, Х.А. Абдурашидов, Д.П. Гаджиев, Р.И. Рагимова // Хирургия. – 2006. - № 5. – С. 42-45.

2. Гемостатическая активность новых аппликационных средств на основе карбоксиметилцеллюлозы / А.И. Бежин, А.Н. Майстренко, В.А. Липатов и др. // Вестник новых медицинских технологий. – № 3. – Тула, 2011. – С. 152-154.

3. Чирков, Р.Н. Диагностика и хирургическое лечение повреждений печени / Р.Н. Чирков, В.Я. Васютков, Ю.А. Шабанов // Хирургия. – 2006. - № 4. – С. 42-45.

**ПОЛИОРГАННАЯ ФОНОВАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ВТОРИЧНЫМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ОДОНТОГЕННОЙ И НЕОДОНТОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ**

Иванов С.В.⁽¹⁾, Будаев А.П.⁽¹⁾, Губин М.А.⁽²⁾, Громов А.Л.⁽¹⁾

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽¹⁾;**

**Воронежская государственная медицинская академия им.
Н.Н.Бурденко, Воронеж, Россия⁽²⁾**

Одним из наиболее значимых осложнений гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области являются вторичные внутричерепные осложнения. В доступной литературе не обнаружено сведений, посвященных проблеме, обусловленной наличием полиорганной фоновой патологии у пациентов с вторичными внутричерепными осложнениями одонтогенного и неодонтогенного характера. Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 11 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Курской областной больницы с 2000-го по 2010 г. Женщин – 7, мужчин – 4 человека. Средний возраст пациентов – $40,3 \pm 5,2$ года. Все вторичные внутричерепные осложнения протекали на фоне сепсиса.

У восьми пациентов в данной группе диагностирована множественная фоновая патология, отягощающая течение воспалительного процесса. Характерно поражение нескольких систем и внутренних органов одновременно. У трех больных сахарный диабет второго типа сочетался с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, ожирением, синдромом Пиквика, хроническим бронхитом. Также у пациента с карбункулом челюстно-лицевой области, осложненным гнойным менингитом диагностировано сочетанное поражение органов мочевыделительной системы: хроническая почечная недостаточность, хронический пиелонефрит, цистит, артериальная гипертензия. В одном случае у пациентки множественные абсцессы головного мозга, тромбоз кавернозного синуса, гнойный менингоэнцефалит (источник – карбункул скуловой области) развились на фоне беременности. У двух больных диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия), а также несахарный диабет. Среди пациентов с неудовлетворительными результатами лечения сопутствующая патология встречалась в 100%, а в группе с положительными результатами – только в 25% случаев. Выявлена выраженная

зависимость исхода лечения больных с вторичными внутричерепными осложнениями от характера процесса и наличия фоновой патологии.

Литература

1. Козлов В.А. Особенности течения воспалительных заболеваний одонтогенной этиологии у больных сахарным диабетом // В.А. Козлов / Медицинский академический журнал. - Т. 8, № 1. – 2008. - С. 242-247.
2. Фомичев Е.В. Современная концепция лечения гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи у больных сахарным диабетом // Е.В. Фомичев, С.В. Поройский, М.В. Кирпичников, Е.Н. Ярыгина / Волгоградский научно-медицинский журнал. - Волгоград, 2014. - № 3. - С. 35-39.
3. Dellinger R.P. Cardiovascular management of septic shock/ R.P.Dellinger // Crit. Care Med. – 2003. – Vol. 31. – P. 946-955.

ФОНОВАЯ ПОЛИОРГАННАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Иванов С.В.⁽¹⁾, Будаев А.П.⁽¹⁾, Губин М.А.⁽²⁾, Громов А.Л.⁽¹⁾

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽¹⁾;

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.
Бурденко, Воронеж, Россия⁽²⁾

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в вопросах диагностики и лечения хирургических осложнений одонтогенной инфекции (повышение эффективности ранней диагностики, снижение частоты послеоперационных осложнений), в последние годы сохраняется прирост количества пациентов, поступающих в стационары с гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи и синдромом взаимного отягощения, связанным с наличием фоновой полиорганной патологии. Наличие у пациента одного или нескольких фоновых заболеваний обуславливает утяжеление течения воспалительного процесса множественными патофизиологическими изменениями, что в свою очередь определяет изменения функционирования взаимосвязанных систем жизнеобеспечения, гомеостаза и иммунитета.

Цель работы: исследовать распространенность фоновой полиорганной патологии у больных одонтогенным сепсисом и местной формой гнойной инфекции одонтогенного характера. Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 137 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Курской областной больницы с 2000 по 2010 гг. Пациенты разделены на 3 группы: с сепсисом без органной недостаточности (49,6%), с тяжелым сепсисом (28,5%) и с септическим шоком (21,9%). Дополнительно обследована группа пациентов с местной формой гнойной инфекции (38 человек), у которых не выявлены признаки синдрома системного воспалительного процесса. Фоновая патология чаще всего встречается у пациентов с септическим шоком (86,7%). В структуре фоновых заболеваний преобладает патология сердечно-сосудистой системы (до 46,7%), пищеварительной (до 33,3%) и дыхательной (до 23,3%) систем. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы диагностированы артериальная гипертензия, врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения, мерцательная аритмия, постинфарктный кардиосклероз). Отмечается зависимость между тяжестью септического процесса и наличием фоновых заболеваний сердечно-сосудистой,

пищеварительной, эндокринной, мочевыделительной систем, хроническим алкоголизмом. У пациентов с более тяжелым септическим процессом вероятность наличия сочетанной сопутствующей патологии (наличие нескольких сопутствующих заболеваний одновременно) также выше.

Литература

1. Абдоминальная хирургическая инфекция: национальные рекомендации /В.С. Савельев [и др.] // РАСХИ. – М., 2011. – 99 с.
2. Харитонов Ю.М. Острый одонтогенный сепсис: ранняя диагностика прогнозирование и лечение: автореф. дис***. д-ра мед.наук / Ю.М.Харитонов. – Воронеж, 1999. – 48 с.
3. Incidence, risk factors and outcome of severe sepsis and septic shock in adults / C. Brun-Buisson [et al.] // JAMA. – 1995. – Vol. 274. – P. 968-974.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КИСТИ И СТОПЫ ПОСЛЕ ИХ РЕПЛАНТАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.

Коротких С.А., Котов А.А., Бяков М.Н.

**ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская академия»,
Киров, Россия**

Оперативные вмешательства при травматизации дистальных сегментов конечности трудновыполнимы технически с точки зрения современной хирургии в районах. Важно применить верную тактику при полных и неполных ампутациях дистальных отделов конечности хирургу. Необходимо учитывать сроки жизнеспособности тканей, характер получения травмы, тяжелое состояние больного, связанное с тяжелыми сочетанными травмами. При реплантации нескольких пальцев или крупных сегментов конечностей необходим тотальный внутривенный наркоз, интубирование больного. Выраженная кровопотеря (до 25% ОЦК), развитие шока отражаются на тяжелом состоянии больного. Недостаток временного фактора, в течение которого кровоток в отчленённой конечности должен быть восстановлен. Хорошая проходимость артерий и отсутствие блока венозного анастомоза зависит от умений хирурга, его техники, биологической целостности стенок сосуда в районе пластики, точное сопоставление краев сухожилий и прецизионность эпи-периневрального шва. Пролонгированный фактор времени от момента получения травмы до доставки и госпитализации больного в отделение «хирургии кисти и микрохирургии» может быть результатом длительной комбинированной антибиотикотерапии, и как следствие – длительных рубцеваний и эпителизации раны. В настоящем сообщении представлен анализ двух наблюдений, в одном из которых с целью замещения первого пальца правой кисти использована полицизация второго пальца правой стопы, в другом – классическая реплантация голени.

1. Больной Н., 29 лет, сделана операция: полицизация по Николадони-Кларксону – перенесение II пальца стопы. Тильные 2/3 окружности донорного пальца перерезаны вместе с сухожилием и костями. Освеженную верхушку ампутационной культи кисти пришивают к образованной ране. Рассекают кожный мостик, освобождают доступ к подошвенным сосудам донорского пальца. Соблюдается принцип: 1 артерия, 2 вены. После остеосинтеза конце-концевой артериальный анастомоз выполнен по технике двухдержалочного узлового шва (Chase-180 град.) В пластике нервов использован эпипериневральный непрерывноузловой шов (J. Smith). Сухожилия ушиты в

последовательности: разгибатели-сгибатели. Донорский дефект зашит первичноузловым швом. Пластика кожи выполнена по Донати. Течение раневого процесса – без осложнений. Кровоток в конечности не нарушен, достигнуто полное восстановление кожного покрова в ране. Пациент выписан на амбулаторное лечение через 28 дней.

2. Больной С., 40 лет, травму получил на пилораме, выполнена реплантация голени в нижней трети. Проведено очищение костных структур ампутированной конечности от элементов мягких тканей и надкостницы и маркировка сосудисто-нервных пучков и пхо раны. Сделан остеосинтез для репозиции костных отломков двумя пересекающимися спицами Киршнера. После костной стабилизации получен прямоугольный доступ к сосудам и нервам достаточный для хорошего обзора. Для быстрого кровенаполнения и оттока ампутированной конечности сформирован конце-концевой артериальный, а затем два венозных анастомоза. Сосудистые анастомозы выполнены непрерывным эвертирующим швом. Сделана эпи-периневральная пластика малоберцового нерва. Сухожильный шов в последовательности: разгибатели-сгибатели. Шов Ахиллов тяжа выполнен по методике (Cuneo) монофиламентным шовным материалом 3/0 с адаптирующим швом 6/0 (H.Kleinert-Bunnel). Раневой деффе́кт закрыт без натяжения собственной тканью по Донати. Поставлен перчаточный дренаж. Пациент направлен из ОРИТ на 7-е сутки в отделение. Больной выписан на реабилитационное лечение на 47 сутки.

Любая информация о травме имеет большое значение и ускоряет подготовку к реплантации. Оптимальные сроки для реплантации по данным отделения «Микрохирургии кисти» КОЦТОиН г. Кирова составляет 6 часов. Длительный временной промежуток вызывает необратимую дистрофию и гипоксию клеточных структур мягких тканей ампутированной конечности, что ведет к стазу, ликворее и некрозу конечности. При тотальных ампутациях частота приживления составила от 90,1% до 93,6%, в группе субтотальных ампутаций до 95,1%. Комбинированные травмы являются фактором низкой приживляемости. Основную проблему составляет неполная реиннервация и снижение функции.

Вывод: хирургу специализированного учреждения для успешно выполненной реплантации нужно учитывать: временной фактор, реиннервацию конечности, адекватный артериальный и венозный кровоток, косметический эффект, психологический настрой больного и поэтапную реабилитацию. И как подтверждает статистика, при

выполнении всех этих элементов своевременно результат при отсутствии сопутствующих патологий, эффект заживления и функция дистальных отделов максимальные.

Литература

1. Геворков А.Р., Мартиросян Н.Л, Дыдыкин С.С. Основы микрохирургии . – М. ГЭОТАР-Медиа. - 2009.
2. J. Brian Boyd, Neil F. Jones. Operative microsurgery, 2015.
3. Thomas Hunt, John M.Flynn. Operative techniques in hand, wrist, and forearm surgery, 2011.
4. Белоусов А.Е. Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия. 1988.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ КИСТИ И СТОПЫ ПОСЛЕ ИХ РЕПЛАНТАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Коротких С.А.⁽²⁾, Котов А.А.⁽¹⁾, Бяков М.Н.⁽¹⁾

Кировский областной центр травматологии, ортопедии,
нейрохирургии⁽¹⁾; Кировская государственная медицинская
академия⁽²⁾, Киров, Россия

Оперативные вмешательства при повреждении сосудов, нервов, сухожилий кисти трудновыполнимы вне специализированных травматологических центров. Особое значение несут характер и вид травмы, от этого зависит тактика лечения при полных и частичных ампутациях. Нужно учитывать сроки жизнеспособности тканей, характер получения травмы, тяжелое состояние больного.

При реплантации нескольких пальцев или крупных сегментов конечностей выражена кровопотеря (до 25% ОЦК), а развитие шока из-за недостатка времени отражается на тяжелом состоянии больного. Проходимость артерий и отсутствие блока венозного анастомоза зависит от умений хирурга, техники, биологической целостности стенок сосуда, точное сопоставление краев сухожилий и прецизионность эпипериневрального шва. Продление от момента получения травмы до оперативного вмешательства больного в отделение может быть результатом длительной приживляемости, и как следствие – длительных рубцеваний и эпителизации раны.

В настоящем сообщении представлен анализ двух наблюдений, в одном из которых использована классическая реплантация голени, в другом - с целью замещения первого пальца правой кисти полицизация второго пальца правой стопы.

1. Больной С., 40 лет, травму получил на пилораме, выполнена реплантация голени в нижней трети. Проведено пхо раны. Сделаны репозиция и остеосинтез костных отломков четырьмя пересекающимися спицами Киршнера. Получен доступ к СНП. Для быстрого кровенаполнения и оттока ампутированной конечности сформирован артериальный, а затем два венозных анастомоза (конец-в-конец). Сосудистые анастомозы выполнены непрерывным эвертирующим швом. Сделана эпи-периневральная пластика малоберцового нерва. Ахиллов тяж выполнен по методике (Cuneo) монофиламентным шовным материалом 2/0 с адаптирующим швом 6/0 (H.Kleinert-Bunnel). Раневой дефект закрыт без натяжения собственной тканью по Донати. Поставлен перчаточный дренаж. Пациент направлен из ОРИТ на 7-е сутки в отделение, выписан на реабилитацию на 47 сутки.

2. Больной Н., 29 лет, сделана операция: полицизация по Николадони-Кларксону – транспозиция II пальца стопы. Тильные 2/3 окружности донорного пальца перерезаны вместе с сухожилием и костями. Освеженную верхушку ампутационной культи кисти пришивают к образованной ране. Рассекают кожный мостик, освобождают доступ к подошвенным сосудам донорского пальца. Соблюдается принцип: 1 артерия, 2 вены. После остеосинтеза артериальный анастомоз конец-в-конец выполнен по технике двухдержалочного узлового шва (Chase-180град.) В пластике нервов использован эпи-периневральный непрерывно-узловой шов (J.Smith). Сухожилия ушиты по Розову. Донорский дефект сделан узловым швом. Шов кожи кисти выполнен по Донати. Кровоток в кисти не нарушен, достигнуто полное восстановление кожного покрова в ране. Пациент выписан на амбулаторное лечение через 17 дней.

Оптимальные сроки для реплантации по данным отделения «Микрохирургии кисти» КОЦТОиН г. Кирова составляет 6 часов. Длительный временной промежуток вызывает необратимую дистрофию и гипоксию клеточных структур мягких тканей ампутированной конечности, что ведет к стазу, ликворее и некрозу конечности. При тотальных ампутациях частота приживления составила от 90,1% до 93,6%, в группе субтотальных ампутаций до 95,1%. Основную проблему составляет неполная реиннервация и снижение функции.

Вывод. Хирургу для успешно выполненной реплантации нужно учитывать: временной фактор, реиннервацию конечности, адекватный артериальный и венозный кровоток, косметический эффект, психологический настрой больного и поэтапная реабилитация. При выполнении всех этих элементов своевременно результат при отсутствии сопутствующих патологий, эффект заживления и функция дистальных отделов максимальные.

Литература

1. Osnovy microsurgery. - M. GEOTAR-Media. - 2009. Gevorkov A.R., Martirosyan N.L., Dydykin S.S.
2. Operative microsurgery J. Brian B., MD Professor and Chief of Plastic Surgery Harbor-UCLA Medical Center Torrance. – 2015.
3. Operative techniques in hand, wrist, and forearm surgery. Thomas Hunt, 2011.
4. Fundamentals of Microsurgery - AE Belousov, 1988.
5. Photo-video - report with the operations of the department of microsurgery 2012-2013god. - KOTCN. - Kirov.
6. Fundamental of microsurgery O. Brian, 1988.

ПРОТИВОСПАЕЧНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ

*Жуковский В.А.⁽¹⁾, Немилев В.Е.⁽¹⁾, Ахметшина О.З.⁽²⁾,
Едомина Н.А.⁽²⁾, Кубин Н.Д.⁽²⁾, Липатов В.А.⁽³⁾*

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия⁽¹⁾;
Общество с ограниченной ответственностью «Линтекс»,
Санкт-Петербург, Россия⁽²⁾;
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽³⁾

Разработка и производство новых «барьерных» противоспаечных средств для реконструктивной хирургии продолжает оставаться актуальной задачей в области полимерной химии и технологии медицинских материалов. Известны пленочные противоспаечные материалы на основе карбоксиметилцеллюлозы [1-3]. Однако вследствие того, что водорастворима только натриевая форма данного полимера, возникают определенные технологические проблемы при получении таких имплантатов.

Целью данной работы является изучение возможности получения аналогичных материалов на основе неионогенной гидроксиэтилцеллюлозы с использованием в качестве сшивающего агента водорастворимых бифункциональных соединений – глутаровой кислоты или диглутарового эфира 1,6-гександиола. По показателю величины набухания были оптимизированы параметры получения пленочных материалов, такие как: соотношение полимера и сшивающего агента в водных растворах, температура и продолжительность последующей термообработки высушенных пленок.

Полученные в оптимальных режимах образцы проходили экспериментальные испытания на животных для определения величины противоспаечного эффекта в баллах и времени пребывания пленки в зоне постоперационного восстановления [4]. Серия экспериментов заключалась в моделировании спаечного процесса в брюшной полости у крыс линии Вистар массой 170-190 г. Животные были разделены на опытную и контрольную группы (по 20 в каждой). Под наркозом производилась срединная лапаротомия, в рану выводили слепую кишку и десерозировали ее купол марлевой салфеткой. Животным контрольной группы ничего не вводили в брюшную полость, животным опытной группы на десерозированный участок помещалась пленка на основе гидроксиэтилцеллюлозы, содержащая структурирующий агент в количестве 30 % от массы полимера, термообработанная при температуре 100 °С в течение 320 мин. Слепая кишка погружалась

обратно в брюшную полость, и рана послойно ушивалась. Процесс деструкции пленки контролировался на каждом сроке выведения животных. Время пребывания твердого «барьера» (пленки) в брюшной полости до полного растворения составило 21-29 суток. В контрольной группе спайкообразование отмечалось у всех животных и составило 18,2 балла, а в опытной группе до – 1,05 балла. В контрольной группе в области купола слепой кишки происходило тотальное запаивание органа, в опытной группе на закрытой пленкой десерозированной поверхности спаек практически не наблюдалось (при этом следов пленки в брюшной полости после указанного срока имплантации не обнаружено). Гистологические исследования внутренних органов животных обеих групп патологических изменений не выявили. Морфологическая структура спаек в контрольной группе соответствует нормальным срокам созревания сращений, в опытной группе брюшной покров в области слепой кишки практически не отличался от здоровой брюшины.

Таким образом, показана перспективность дальнейшего изучения полученного пленочного материала в качестве противоспаечного «барьерного» средства в абдоминальной хирургии.

Литература

1. Патент № 2509784 РФ Способ получения пористых, пленочных материалов на основе карбоксиметилцеллюлозы / В.А. Жуковский, В.Е. Немилов, О.З. Ахметшина и др.; заявитель ООО «Линтекс». – опубл. 20.03.2014. Бюл. № 8.
2. В.Е. Немилов, О.З. Ахметшина, Л.В. Нижельская, В.А. Жуковский. Структурирование пленочных материалов на основе карбоксиметилцеллюлозы // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 2013. – № 3. – С. 32-35.
3. А.В. Полянский, В.Е. Немилов, В.А. Жуковский Получение и исследование противоспаечных рассасывающихся пленок на основе производных целлюлозы / Тезисы докл. III Международной научной конференции «Современные тенденции развития химии и технологии полимерных материалов». – СПб., СПГУТД, 2015. - С. 106-107.
4. В.А. Липатов Концепция профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной полости с применением барьерных средств: автореф. дис. док. мед. наук: 14.01.17 / Липатов Вячеслав Александрович. – Курск, 2013. – 45 с.
5. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – №. 1 (2).
6. Лазаренко В. А. и др. Первый опыт применения противоспаечного рассасывающегося полимерного средства «Мезогель» при остром аппендиците //Курский научно-практический вестник" Человек и его здоровье". – 2011. – №. 1.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ МИНИ-ДОСТУПА

Колесников С.А.⁽³⁾, Шестаков И.А.⁽²⁾, Волков Д.В.⁽¹⁾,

Пахлеваян В.Г.⁽¹⁾, Захаров О.В.⁽¹⁾

**ФАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, кафедра факультетской хирургии,
г. Белгород, Россия⁽¹⁾;**

кафедра общей хирургии, г. Белгород, Россия⁽²⁾;

**ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», г. Белгород,
Россия⁽³⁾**

Цель. Значимое место среди малоинвазивных способов лечения заболеваний органов брюшной полости занимает метод открытой лапароскопии из мини-доступа с использованием нового поколения инструментов «мини-ассистент».

Материал и методы. За период за 2005-2015 гг. в ОГБУЗ ГКБ №1 г. Белгорода было выполнено 19673 оперативных вмешательства на органах брюшной полости (плановых – 6457; экстренных - 13216). Холецистэктомий из мини-доступа (ХЭМД) – 2047 больным. С хроническим холециститом был 741 больной, из них с холедохолитиазом 16. Острый холецистит был у 473 больных. Флегмонозный у – 233, гангренозный у – 202, острый гангренозный в инфильтрате с парапузырным абсцессом у 58, острый холецистит с холедохолитиазом у 34, острый холецистит с пузырнохоледохеальным и пузырнодуоденальным свищем у 5, острый холецистит со стриктурой большого дуоденального соска и вколоченным камнем у 3, поствидеолапароскопический холецистэктомический синдром у 4 (длинная культя пузырного протока – 2; оставленная часть желчного пузыря с пузырным протоком и конкрементом - 2). Полипоз желчного пузыря имелся у 12 больных, рак желчного пузыря у 3 больных.

Результаты. С целью преодоления технических трудностей при выполнении оперативных вмешательств из мини-доступа нами внедрены несколько хирургических инструментов, в том числе оригинальных (4 государственных патента). Основными являются многолепестковый ретрактор, ранорасширитель, клипапликатор, кровоостанавливающий зажим, адаптированные к операциям методом открытой лапароскопии из мини лапаротомного доступа.

Из 2047 холецистэктомий из мини доступа в 176 объективно «трудных», не стандартных (сложных) случаях были использованы дополнительные инструменты. В 1 случае был наложен холедоходуоденоанастомоз, 1 – холедохолитотомия дополнена трансдуоденальной папиллосфинктеротомией, 2 – устранены пузырнохоледохеальные свищи, 2 – поствидеолапароскопических

синдрома, 3 – холецистэктомии по поводу рака желчного пузыря. Получены 8 интраоперационных осложнения, 6- раневых, 18- общесоматических.

В 12 случаях больные были прооперированы по поводу осложнений панкреонекроза, 41 больной - по поводу перфоративных дуоденальных язв, в 8 случаях - наложены подвесные еюностомы, 21 больной оперирован из мини- доступа по поводу паховых (в том числе рецидивных) грыж, 3 - пупочных.

Литература

1. Тимошин А.Д., Шестаков А.Л., Юрасов А.В. Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии. – М.: Триада-Х, 2003. – 216 с.
2. Гальперин Э.И., Дедерер Ю.М. Нестандартные ситуации при операциях на печени и желчных путях. – М.: Медицина, 1987. – 160 с.

**ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПРЕД-И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ**

Ласков В.Б., Масалева И.О.

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

Негативные последствия послеоперационной когнитивной дисфункции хорошо известны, однако предикторы тревожно-депрессивных и когнитивных нарушений известны в меньшей степени. Лечебно-профилактические мероприятия в этом плане носят обычно эпизодический характер, что может отражаться на качестве жизни и трудоспособности пациентов.

Цель работы: изучение динамики состояния психоэмоциональной и когнитивной сферы под влиянием эндоскопической холецистэктомии.

Материалы и методы. В хирургическом и гастроэнтерологическом отделениях Курской областной клинической больницы обследован неврологический статус 136 больных женщин в возрасте от 20 до 59 лет с хроническим холециститом; из них 106 женщин - до и после эндоскопической холецистэктомии и 30 – лечившихся консервативно. Также применялись визуально-аналоговые шкалы для оценки тревожности, специальные опросники, анкеты для оценки вегетативной дисфункции, краткая шкала исследования психического статуса, тест десяти слов, батарея исследования лобных функций, шкала исследования общего ухудшения, шкала депрессии центра эпидемиологических исследований CED-S. Показатели подвергнуты статистической обработке. Для коррекции

Результаты: определен спектр психоэмоциональных расстройств и когнитивные нарушения в пред- и послеоперационном периодах, выявлены их некоторые предикторы. Показана эффективность использования кальция гопантената для профилактики и лечения когнитивной дисфункции и тревоги.

Выводы: целесообразно дополнить стандартный перечень обследования больных перед эндоскопической холецистэктомией оценкой психоэмоциональных и когнитивных функций как до, так и после операции, а также поиском предикторов их нарушений. Это позволит оказывать адресную (персонализированную) помощь по медикаментозной профилактике и коррекции послеоперационных расстройств, уменьшая негативное влияние токсико-сосудистых и психогенных факторов оперативного вмешательства.

Литература

1. Давыдов В.В., Неймарк М.И. Влияние тотальной внутривенной анестезии с применением кетамина на состояние высших психических функций в послеоперационном периоде // Анестезиология и реаниматология, 2004. – № 4. – С. 37-40.
2. Ласков В.Б., Масалева И.О. В // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013. Т. 113. № 3. – С. 9-14.
3. Ласков В.Б., Нечипуренко Н.И., Ходулев В.И., Масалева И.О. // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2014. № 2. – С. 50-55.

ПУТИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

*Лазаренко В.А.⁽¹⁾, Липатов В.А.⁽¹⁾, Бежин А.И.⁽¹⁾, Суковатых Б.С.⁽¹⁾,
Жуковский В.А.⁽²⁾, Наумзада М.Д.З.⁽¹⁾*

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽¹⁾;**

**Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия⁽²⁾**

Послеоперационная спаечная болезнь брюшины (СББ) - часто встречающееся тяжелое заболевание органов брюшной полости. В практике хирурга встречается множество больных, которые страдают от спайкообразования после различных операций на органах брюшной полости. До настоящего времени вопрос профилактики СББ нельзя считать решенным. Продолжает оставаться высоким процент заболеваемости как после экстренных, так и после плановых вмешательств на органах брюшной полости. Заболевание способно осложниться таким жизненно опасным состоянием, как спаечная кишечная непроходимость. При спаечной кишечной непроходимости летальность составляет от 13 до 55%. Болезнь поражает преимущественно молодой, трудоспособный возраст. Отмечается низкая эффективность как консервативного, так и хирургического методов лечения, высокий процент рецидивов адгезивного процесса. Единой концепции этиопатогенеза послеоперационного спаечного процесса брюшной полости (СПБП) и надежных средств профилактики послеоперационного спайкообразования не существует. Это обуславливает высокий интерес исследователей к данной проблеме. Основой патогенеза избыточного спайкообразования после операций на органах брюшной полости считается прорастание соединительнотканными волокнами, а в последствии сосудами и нервами, выпавшего из перитонеального выпота фибрина, который «склеивает» поверхности органов. Применение вязких биологически инертных рассасывающихся барьерных средств является одним из перспективных направлений в изучении способов предотвращения внутрибрюшной адгезии. [6] Гель способен разобщить десерозированные поверхности на время, необходимое для их ремезотелизации. Целью исследования явилось экспериментально-клиническое обоснование эффективности применения противоспаечных гелей с целью предотвращения рецидивов адгезивного процесса и ранних послеоперационных осложнений. Эксперименты проводили на здоровых половозрелых крысах-самцах линии Вистар, массой 250-300 г с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986). В стерильных условиях под рамитаровым наркозом проводилось моделирование СПБП. Животные выводились из эксперимента путем передозировки наркоза на 14 сутки. Оценивались морфологические изменения в брюшной полости с использованием визуально-описательного метода и оценкой выраженности СПБП методом семантического дифференциала. Органы, вовлеченные в СПБП изымались из трупов, фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина с последующим изготовлением парафиновых срезов и их окраской гематоксилин-эозином, пикросириус-ред и по Маллори. Экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности противоспаечного рассасывающегося геля в ближайшем послеоперационном периоде и перспективах его внутрибрюшного применения с целью профилактики послеоперационной спаечной болезни брюшины и ее осложнений.

Литература

1. 80 лекций по хирургии / под ред. С.В. Савельева. – М.: Литтера, 2008. – 456 с.
2. Морфология формирования послеоперационных брюшинных спаек / В.И. Петлах, В.А. Липатов, Е.С. Елецкая [и др.] // Детская хирургия. – 2014. – Т. 18, № 1. – С. 42-46.
3. Современные технологии профилактики послеоперационного спайкообразования / Б.С. Суковатых, В.А. Жуковский, В.А. Липатов [и др.] // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. – 2014. – Т. 173, № 5. – С. 98-104.
4. Суфияров И. Ф., Хасанов А. Г. Возможности применения видеолапароскопии в ранней диагностике и лечении острой спаечной кишечной непроходимости // Эндоскопическая хирургия. – 2006. – Т. 12. – № 2. – С. 134а-134.
5. Хасанов А. Г., Суфияров И. Ф. Хирургические барьеры в профилактике послеоперационных спаек // Анналы хирургии. – 2008. – № 2. – С. 22-24.
6. Лазаренко В. А. и др. Первый опыт применения противоспаечного рассасывающегося полимерного средства «Мезогель» при остром аппендиците // Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье". – 2011. – № 1.
7. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – № 1 (2).

РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Кригер А.Г.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, Москва, Россия

Введение: миниинвазивные операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства выполняются в ограниченном количестве клиник. Это связано со сложностью вмешательств и техническим несовершенством современных лапароскопических инструментов. Роботический комплекс (РК) позволяет решить ряд проблем лапароскопической техники и расширить возможности абдоминальной хирургии.

Цель работы: создание концепции адекватного применения роботического комплекса при операциях на органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

Материал и методы: проведено ретроспективное исследование результатов 173 больных, которым выполнены РА вмешательства. В 80 (46,2%) случаях больным выполнены операции по поводу заболеваний поджелудочной железы, в 42 (24,3%) случаях – по поводу заболеваний печени, в 17 (9,8%) выполнены РА адреналэктомии; по поводу неорганных забрюшинных опухолей выполнено 34 (19,7%). Средний возраст пациентов составил 51,6 (38-56) лет, большинство из них были женщины 147 (85%). В предоперационном периоде больным выполнялся весь спектр необходимых обследований, в каждом случае диагноз подтверждён минимум двумя методами лучевой диагностики.

Результаты: средняя продолжительность роботических ПДР составила 408 (368;511) мин. В двух случаях была выполнена конверсия на традиционное вмешательство. Интраоперационная кровопотеря составила в среднем 225 (138;500) мл. Длительность дистальной резекции составила 210 (180;240) минут, средняя интраоперационная кровопотеря составила 100 (50;325) мл. Продолжительность энуклеаций опухоли и срединной резекции составила 142 (115;175) и 225 (220;290) минут и сопровождалась минимальной кровопотерей до 100 мл. Среднее время РА вмешательств на печени составило 202,7 (102;261) мин, с объёмом интраоперационной кровопотери 257,6 (50;480) мл. Конверсия потребовалась в одном случае. Тяжёлые послеоперационные осложнения возникли в 3 (7,1%) случаях. Среднее время адреналэктомии составило 187 (100; 250), удаления неорганных опухолей 140 (120;195) мин. При РА операциях по поводу заболеваний

надпочечников и неорганных опухолей значимой кровопотери не наблюдалось. Тяжёлые послеоперационные осложнения после операций на поджелудочной железе наблюдались в 19 (23,8%) случаях, в 3 (7,1%) случаях после операций на печени, в 2 (5,9%) после удаления неорганной опухоли, после адреналэктомии тяжелых осложнений не было.

Заключение: показаниями к РА операциям являются злокачественные опухоли ПЖ, стадируемые как T1-T2, а также доброкачественные и погранично злокачественные опухоли диаметром до 5 см. РА вариант операций на печени целесообразен при выполнении малых анатомических (до трех сегментов) резекций, а также операции на «технически трудных» задне-латеральных сегментах печени. Адреналэктомия может успешно выполняться с использованием роботического комплекса при размере опухоли не более 100 мм. РА операции обеспечивают прецизионность удаления лимфатических узлов и формирования анастомозов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ

Гостевич И.С., Галинская Н.С., Становенко В.В.

**Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет, Витебск, Беларусь**

В настоящее время грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) считается одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта и по частоте занимает 2-3-е место после хронического холецистита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Вместе с тем, статистика показывает, что примерно 5% людей в молодом возрасте так же могут столкнуться с грыжевыми образованиями пищеводного отверстия. У 50% пациентов наличие ГПОД протекает бессимптомно и часто случайно обнаруживается при рентгеноскопии. К сожалению, в настоящее время четко не определена наиболее безопасная методика хирургического лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, что свидетельствует о бесспорной актуальности данной проблемы. Цель работы: изучить отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Материалы и методы. За период с 2010-го по 2015 год на лечении в хирургических отделениях БСМП г. Витебска с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы находились 12 пациентов в возрасте от 45 до 73 лет. Средний возраст пациентов составлял 56,3 лет. Исследование показало, что число женщин составило – 8, мужчин – 4. В трудоспособном возрасте было 5 человек. В ходе обследования обнаружена скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы у 11 пациентов и параэзофагеальная грыжа у 1 пациента. Сочетание ГПОД с другими заболеваниями органов брюшной полости (язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – у 4 пациентов, острый калькулезный холецистит, ЖКБ – у 5 пациентов, острый гастродуоденит – у 2 пациентов, эрозивный эзофагит – у 2 пациентов, эрозивный гастрит – у 1 пациента). Всем пациентам была выполнена СПВ, фундопликация по Ниссену и хиатопластика по Харрингтону. Анализ медицинских карт пациентов показал, что среднее количество проведенных койко-дней в стационаре равняется 14,5 дней. Главная задача в период реабилитации – это быстрое выздоровление и возвращение к обычной жизнедеятельности, избежание возможности рецидива. Для этого хирургам необходимо подобрать оптимальное лечение в период после операции, назначить комплекс профилактических мероприятий, направленных на облегчение состояния пациента. Для того, чтобы оценить результаты хирургического лечения пациентов с ГПОД за

последние 5 лет, мы разработали анкету и отправили ее пациентам. При скользящей ГПОД хороший результат был получен у 11, удовлетворительный – у 1. Заключение. Проведенное исследование показало, что среди пациентов с ГПОД чаще всего встречается скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Подавляющее большинство пациентов (66,7%) составляют лица женского пола. Из всех обследованных пациентов 33,3% трудоспособного возраста. При диагностике ГПОД следует учитывать их возможное сочетание с другими заболеваниями, описанными в триадах (Сента, Кастена, Лорта-Жакоба, Клеменгтона), так и сочетание этих заболеваний с ГПОД, что увеличивает процент обнаружения скрыто протекающих ГПОД. Удовлетворены результатами операции 11 (91,7%), частично удовлетворены – 1 (8,3%) пациентов.

Литература

1. Гришин, И.Н. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюксная гастроэзофагеальная болезнь / И.Н. Гришин [и др.]. – Минск : Выш. шк., 2007. – 221 с.
2. Кубышкин, В.А. Качество жизни больных после антирефлюксных операций / В.А. Кубышкин [и др.] // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2003. – № 5. – С. 80-86.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ПАНКРЕАТИТА

Вакулин Г.В., Розин А.В.

ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Министерства здравоохранения России,
Тверь, Россия

Заболеваемость острым панкреатитом (ОП) занимает 2-е место в хирургической патологии и составляет в РФ 36-40 случаев на 100 тыс. населения. Летальность при гнойном панкреатите достигает 30-40%. Наиболее опасной является тяжёлая форма, проявляющаяся деструктивным поражением железы с выраженным эндотоксикозом, полиорганной недостаточностью.

Цель исследования: оценить возможности и результаты лечения деструктивного панкреатита в условиях общегородской хирургической клиники.

Материалы и методы. С 2011-го по 2016 г. на лечении в хирургическом отделении ГKB № 6 г. Твери с диагнозом ОП находилось 464 человек, из них 50 случаев (10,7%) с тяжелой формой. Общая летальность 5,8% (27 человек). Средний возраст больных составил 50 ± 29 лет. Преобладали мужчины 18 человек (60%). У 11 (36,8%) был выявлен билиарный панкреатит, алкогольный панкреатит переносили 17 человек (56,6%). В 30 случаях (60%) потребовалось оперативное вмешательство. Гнойные осложнения сформировались у 15 (88%). Тяжесть течения у 12 пациентов (40%) усугубляли сопутствующие заболевания: у 4 (13%) сердечно-сосудистая патология, у 4 (13%) гастродуоденопатии, у 3 (10%) сахарный диабет. У 4 в первые сутки развивался ферментативный асцит-перитонит. Распространенный гнойный перитонит был у 12 (80%), забрюшинная флегмона у 8 (53%), сепсис (3), толстокишечный свищ (2). В 3 случаях диагностирован вялотекущий длительный перитонит (20%). Два и более осложнения наблюдались у 12 больных (80%). Гнойные осложнения сочетались с эндотоксикозом у восьми пациентов: панкреатогенный шок (2), полиорганная недостаточность (3), энцефалопатия (3). Сахарный диабет развился у 4 больных (23,5%). Большинство пациентов оперированы позднее 10 суток от госпитализации. Вследствие прогрессирующего течения гнойного ОП умерло 5 (16,6%), при этом у 3-х было зафиксировано более 3-х гнойных осложнений. Остальные двое умерли от прогрессирующего синдрома полиорганной недостаточности. Летальный исход отмечен на 15-25 сутки. Летальность при гнойном ОП составила 16,6%.

Литература

1. С.И. Ситкин, В.Н. Силаев, Е.Ю. Бозова, С.И. Токорева. Современные подходы к лечению острого панкреатита (обзор международных рекомендаций). Верхневолжский медицинский журнал. Том 13, выпуск 1, 2015. – С. 44-47.
2. Проф. С.А. Алиев, Э.С. Алиев. Нерешённые вопросы хирургической тактики при инфицированном панкреонекрозе. Хирургия 8 ,2015. – С. 64-67.
3. Проф. П.Я. Сандюков, В.А. Самарцев, Д.А. Минеев. Хирургическое и консервативное лечение больных острым панкреатитом. Хирургия 10, 2014. – С. 56-63.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОРАЗРЕШЕНИЙ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ № 2, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА

Нуржанова Г.К., Сагиндикова Г.Н., Сапенова Д.К., Умарова Г.К.
АО «Медицинский университет Астана», Астана, Республика
Казахстан

Целью данного исследования явилось изучение частоты оперативных родоразрешений в клинической базе АОБ № 2, сравнительный анализ за 2010-го и 2015 год, а также сохранение репродуктивной функции женщин.

Методы: клинико-лабораторные, инструментальные, статистические (взяты истории за 2010 и 2015 годы).

Результаты исследования: Структура причин оперативных родов за 2010-го и 2015 г. представлена следующим образом:

Рубец на матке – 92 (46,5%) / 138 (45,7%); Тазовое и лицевое предлежание - 32 (16,2%) / 47 (15,5%); Миопия оперированная, заболевания глаз – 11 (5,5%) / 16 (5,3%); Дистресс плода – 17 (8,5%) / 21 (7,2%); Преждевременная отслойка плаценты – 9 (4,5%)/15(4,8%); Первичное бесплодие – 4 (2,0%) / 7 (2,2%); Преждевременный разрыв плодных оболочек с сочетанными показаниями – 10 (5,1%) / 16 (5,2%); Аномалии родовых сил – 10 (5,1%) / 18 (6,0%); Клинически узкий таз – 6 (3,0%) / 14 (4,6%); Состояние после ампутации шейки матки и аномалии развития половых органов – 4 (2,0%) / 6 (2,0%); Поперечное положение плода – 3 (1,5%) / 4 (1,5%).

Процент оперативных родов уменьшился в 1,0 раз: количество операций кесарево сечения 198 – 17,2% (в 2010 году) до 302 – 16,8% (в 2015 году) за счет внедрения рекомендаций ВОЗ, выхода нового протокола по кесаревому сечению за 2014 год МЗ РК, а также повышение квалификации медицинского персонала, ежегодные мастер-классы, проводимые сотрудниками кафедры. Число родов с наложением акушерских щипцов за 2015 г. – 26 (1,5%), а за 2010 г. в 12 случаях (0,7%). Метод незаменим, когда продвижение малыша по родовым путям встречает серьезные затруднения, в то время как требуется (острое кислородное голодание плода, осложнения со стороны матери и т.д) скорейшее завершение родов. В руках профессионалов практически безопасен, и тем не менее всякий раз необходимость применения акушерских щипцов тщательно взвешивается. Для этого надо обучать медперсонал наложению акушерских щипцов. Так как этот метод

родоразрешения хоть и старый, но играет важную роль в современном акушерстве, и его не надо забывать.

На нашей клинической базе мы стремимся к мировым стандартам (в мире 15%) оперативных родов, у нас 16,8%. Несмотря на преимущества операции кесарево сечения при некоторых акушерских ситуациях, значительно возросшая частота ее применения вызывает беспокойство во всем мире. С увеличением частоты кесарево сечения повышаются показатели материнской заболеваемости и смертности, удлиняется срок пребывания родильниц в стационаре, а также идет дополнительная нагрузка на экономику страны. Таким образом, при вдумчивом подходе как со стороны пациента, так и медицинского сотрудника, наблюдавшего за беременной, соблюдении регионализации, правильном выборе тактики родоразрешения и оказании качественной медицинской помощи имеются все условия для сохранения репродуктивной функции женщины.

Литература

1. Клинический протокол МЗ.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ АРРОЗИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ

Хвостовой В.В.⁽¹⁾, Ворона Ю.С.⁽²⁾, Романищев В.Е.⁽²⁾

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия⁽¹⁾;

Курский областной клинический онкологический диспансер,
Курск, Россия⁽²⁾

Аррозивные кровотечения – это наиболее тяжелые осложнения, являющиеся одной из основных причин летальных исходов в послеоперационном периоде пациентов с опухолями шеи. Риск их развития возрастает при несостоятельности глоточных швов и иссечении адвентициальной оболочки сонной артерии при ее опухолевой инфильтрации.

Цель работы: оценка результатов применения мембран аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (ОТП), в области измененной сосудистой стенки.

Материалы и методы. За период с 2011-го по 2015 г. в отделении опухолей головы и шеи ОБУЗ «КОКОД» 12 пациентам с раком орофарингеальной области, после перенесенной лучевой терапии, по поводу метастазов в шейные лимфоузлы (индекс N2-3) выполнено 12 радикальных шейных лимфодиссекций с денудацией сонных артерий. На участки сосудов, лишенных адвентиции, укладывали мембраны аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Обследование, ведение в пред- и послеоперационном периодах для всех пациентов было стандартным.

Результаты. У пяти пациентов заживление ран произошло первичным натяжением. В семи случаях были отмечены гнойно-некротические изменения со стороны кожных лоскутов различной протяженности в проекции сонных артерий. У всех больных с осложненным течением раневого процесса удалось добиться полного заживления раны на фоне консервативного лечения.

Заключение. Применение мембран ОТП является эффективным, удобным, дешевым способом профилактики аррозивных кровотечений из сосудов шеи.

Литература

1. Лечение повреждений магистральных сосудов шеи / Е. М. Трунин, А. П. Михайлов, А. М. Данилов [и др.] // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. – 2007. – сер. 11, вып. 4. – С. 82-88.
2. Cohen, J. Contemporary management of carotid blowout, current opinion / J. Cohen, I. Rad // Arch. otolaryngol. head neck surg. – 2004. – Vol. 12. – P. 110-115.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И ЭХОСКЛЕРООБЛИТЕРАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Расулов Н.А.

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Введение. Лечение венозных язв нижних конечностей остается одной из самых сложных проблем сосудистой хирургии. По литературным данным венозные трофические язвы (ТЯ) составляют более 70% от всех язв нижних конечностей, из них частота варикозных ТЯ достигает 52%. Недостаточно изученным и не окончательно решенным является вопрос о применении миниинвазивных методов, таких как эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) и стволовая катетерная эхосклерооблитерация (СКЭ) ствола большой подкожной вены (БПВ) в комплексном лечении осложненных форм варикозной болезни (ВБ).

Цель. Проведение сравнительного анализа эффективности ЭВЛК и СКЭ в комплексном лечении осложненных форм ВБ клинических классов С4-С6.

Материалы и методы. Всем пациентам выполнялось комплексное хирургическое лечение осложненных форм ВБ с клиническими классами С4-С6 в период 2014-2015 г.г. Больные были распределены на 2 группы, идентичные по возрастно-половому составу, в зависимости от объема оперативного вмешательства В I группе (n=31) выполнялась ЭВЛК ствола БПВ, во II группе пациентов (n=32) проводилась паховая кроссэктомия (ПК) с последующей СКЭ ствола БПВ, в обеих группах основное вмешательство дополнялось минифлебэктомией (МФ) и резекцией перфорантов (РП) на пораженной конечности. Для оценки результатов лечения проводилось ультразвуковое дуплексное флебосканирование (УЗДФС) через 2 и 6 месяцев после лечения и физикальное обследование. Произведена оценка болевого синдрома в послеоперационном периоде по цифровой рейтинговой шкале NRS. Анализ результатов проводился с помощью статистических стандартных программ Excel Microsoft Office 2007, Statistica for Windows v.6.0.

Результаты исследований. По данным УЗДФС в I группе удалось достичь полной облитерации ствола БПВ у 100 % пациентов (n=31), во II группе у 84,3% пациентов (n=27). Реканализация в просвете ствола БПВ с наличием низкоинтенсивного кровотока была выявлена во II группе у 2 пациентов через 2 месяца и у 3 пациентов через 6 месяцев после СКЭ.

Средний диаметр облитерированной БПВ на бедре через 6 месяцев в I группе составил $1,87 \pm 0,19$ мм, во II группе $3,36 \pm 0,15$ мм ($p < 0,001$). Появление неовариксов и клинический рецидив были выявлены у 6,2% (2) пациентов во II группе через 6 месяцев. Болевой синдром по NRS у больных I группы был ниже по сравнению со II группой и составил соответственно $0,66 \pm 0,23$ и $4,03 \pm 0,26$ ($p < 0,001$). Полного заживления ТЯ удалось достичь через $35,78 \pm 6,14$ суток в I группе и $41,25 \pm 4,90$ суток во II группе ($p > 0,05$, разница не достоверна). Ни в одной группе послеоперационный тромбозов глубоких вен и нагноений не наблюдалось.

Выводы. Применение ЭВЛК ствола БПВ при сравнительном анализе продемонстрировало большую эффективность по сравнению с СКЭ в комплексном лечении осложненных форм ВБ. ЭВЛК позволяет эффективно устранять вертикальный рефлюкс как основную причину трофических нарушений и венозных трофических язв, а также может являться альтернативой комбинированному лечению, которое включает кроссэктомию и СКЭ ввиду минимализации травматичности, редкой реканализации БПВ и соответственно – более низким процентом рецидивов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ ТКАНЕЙ И АЛЛОТРАНСПЛОНТАТОВ

Саляхутдинов Р.Р., Дайтбеков Д.Д.

ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская академия»,
Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО
«РЖД», Киров, Россия

За период с января 2012-го по август 2016 года в Отделенческой больнице на ст. Киров ненатяжная герниопластика применена у 320 пациентов с различными видами грыж. Распределение по видам грыж следующее:

256 (80%) паховые, 34 (11%) – пупочные, 30 (9%) – послеоперационные грыжи.

Цель работы: анализ результатов применения ненатяжной герниопластики при паховых грыжах в хирургическом отделении за три года.

Материал и методы: Изучены истории 256 пациентов с паховыми грыжами, которым выполнена ненатяжная герниопластика. Среди них оперированных больных с паховыми грыжами мужчин было 240 (93,7%), женщин – 16 (6,3%). Возраст варьировал от 17 до 87 лет, при этом 223 (87,1%) оперированных больных имели трудоспособный возраст (До 60 лет). Пластика по Лихтенштейну с использованием сетчатого эндопротеза фирмы «Этикон» применена у 242 (94,5%), бесшовная пластика по Трабукко с эндопротезами «Herniamesh» - у 14 (5,5%). При пластике по Лихтенштейну в первом случае сетку фиксировали нитью пролен 2-0. Применялась спинальная анестезия.

Для сравнения результатов изучено 96 историй пациентов, у которых выполнены различные виды натяжной пластики.

Результаты применения ненатяжной герниопластики у больных с паховыми грыжами: среднее пребывание на койке в основной группе составило 7 дней, тогда как в группе сравнения – 12 дней. Средняя длительность нетрудоспособности после операции в основной группе – 20 дней, в группе сравнения – 35 дней. Послеоперационные осложнения (серомы послеоперационных ран) отмечены в основной группе у 3-х больных (1,1%), в группе сравнений 6 осложнений (6,2%).

Выводы: Ненатяжная герниопластика улучшает результаты оперативного лечения паховых грыж, снижает средний койко-день и время нетрудоспособности после операции, уменьшает количество препаратов в послеоперационном периоде. Поэтому, она должна быть методом выбора лечения паховых грыж.

Литература

1. Егиев В.Н. Ненатяжная герниопластика. – М.: Медпрактика, 2002. – 148 с.
2. Аверьянов М.Ю., Мухин А.С. Хирургия абдоминальных грыж: Монография. – Киров, 2015. – С. 159-168.
3. Славин Л.Е., Федоров И.В., Сигал Е.И. Осложнения хирургии грыж живота. – М.: Профиль, 2005. – 176 с.
4. Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.Л. Хирургическое лечение паховых и послеоперационных грыж брюшной стенки. – М.: Триада-Х, 2003. – 144 с.
5. Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Грыжи брюшной стенки. – М.: Медицина, 1990. – 272 с.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ИНВАГИНАЦИИ У ДЕТЕЙ

Семенов А.В., Носков А.С.

**ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская академия»,
кафедра детской хирургии, Киров, Россия**

Инвагинация кишечника – частая патология детского возраста. Нами проведен анализ лечения 123 больных этой категории от 0 до 13 лет с 1993 по 2015 г.; из них мальчиков 65%, девочек 35%; новорожденных 2 (1,6%), от месяца до года 69 (56,1%), 1-3 года 33 (26,9%), >3 лет 19 (15,4%)

В 95% приходилось сталкиваться с илеоцекальной инвагинацией. Диагноз верифицировался с помощью ирригографии под экраном. В период 1993-2003 консервативная дезинвагинация с успехом выполнена 84%, открытая оперативная дезинвагинация – 7,3%, резекция кишечника с наложением анастомоза – 3,7% больных. У 4 (5%) диагноз инвагинации установлен интраоперационно (тонко-тонкокишечная инвагинация). В периоде 2004-2015 инвагинация расправлена консервативно 37,2 % больных, лапароскопическая дезинвагинация – 34,9%, открытая оперативная дезинвагинация – 18,6%, резекция кишечника с анастомозом – 9,3%

Средний койко-день составил 7,9 (при лапароскопии 8,2, при лапаротомии 12,2). Независимо от вида операции, рецидивов не было. Послеоперационная летальность составила 0,8 % (1 больная с множественными инвагинациями, тотальным полипозом кишечника обусловленное опухолью Вильмса).

Таким образом, лапароскопическое лечение детей с инвагинацией кишечника является современным перспективным методом лечения детей, который во многих случаях может заменить традиционные.

Литература

1. Детская хирургия: национальное руководство/под редакцией Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1168 с.
2. Неотложная хирургия детского возраста. Учебное пособие: Разин М.П., Минаев С.В., Скобелев В.А., Стрелков Н.С. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 328 с.

ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЯХ

Кригер А.Г.

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, Москва, Россия

Введение: неорганные забрюшинные опухоли (НЗО) - собирательная классификационная единица, объединяющая доброкачественные и злокачественные мезенхимальные новообразования, исходящие из забрюшинного пространства и не имеющие определенной органной принадлежности. Частота встречаемости этих опухолей невелика и составляет 0,03 – 1,1 % от всего числа опухолей. Хирургическое лечение является основным в выборе тактики лечения.

Цель: улучшить результат лечения больных с неорганными забрюшинными опухолями

Материал и методы: оперировано 83 больных с неорганными забрюшинными опухолями. Доброкачественные опухоли были у 57 больных, злокачественные – у 26. Традиционным лапаротомным методом (Тр) оперировано 35, робот-ассистированным (РА) – 34, лапароскопическим (Л) – 14 больных. Медиана размера опухоли в наибольшем измерении при Тр составила 102 мм, РА – 75 мм, Л – 81,5 мм.

Результаты: длительность операции (медиана) при Тр составила 112,5 мин, РА – 140 мин, Л – 125 мин. Медиана объема кровопотери при Тр составила 125 мл, РА – 50 мл, Л – 50 мл. Конверсия при РА потребовалась 1 раз, при Л – 7. Послеоперационные осложнения возникли у 6 больных при Тр и у 5 больных при РА. Летальных исходов не было.

Заключение: для достижения успешного хирургического лечения НЗО необходима оценка возможностей различных методов выполнения операции. Показанием к традиционному методу удаления НЗО является размер опухоли более 10 см, миниинвазивные методы оправданы и позволяют получить хорошие результаты при опухолях менее 10 см. Робот – ассистированный вариант вмешательства существенно облегчает выполнение операции при расположении опухоли в трудных для манипуляций областях и малых анатомических пространствах, прилежании опухоли к магистральным сосудам. Оперативное лечение НЗО должно выполняться в многопрофильных учреждениях командой

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek.proc

опытных специалистов для выбора оптимальной тактики лечения этой группы больных.

**ТРАВМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
И «ЗОЛОТЫЕ СТАНДАРТЫ» В ХИРУРГИИ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ**

*Колесников С.А.⁽³⁾, Шестаков И.А.⁽²⁾, Волков Д.В.⁽¹⁾,
Пахлеванян В.Г.⁽¹⁾, Мизунов А.А.⁽¹⁾*

**ФАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»,
кафедра факультетской хирургии, г. Белгород, Россия⁽¹⁾;
кафедра общей хирургии, г. Белгород, Россия⁽²⁾;
ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», г. Белгород,
Россия⁽³⁾**

Цель работы. Оптимизировать хирургическую тактику при повреждениях магистральных желчных протоков в результате малоинвазивной холецистэктомии.

Материалы и методы. За 2008-2016 гг. видеолапароскопическая холецистэктомия произведена у 1336 больных (52,9%), холецистэктомия из мини-доступа – у 805 (31,9%). Повреждения магистральных желчных протоков произошли в 13 случаях. При ВЛХЭ - 6 (0,45%), при ХЭМД – 7 (0,87%).

Результаты. 13 больных разделены на три группы: 1 – у которых факт повреждения обнаружен интраоперационно, что потребовало конверсии или расширения доступа; 2 – у которых факт повреждения обнаружен в раннем послеоперационном периоде; 3 – у которых повреждения устранены в позднем послеоперационном периоде. Первая группа - 6 случаев: в трех – после ВЛХЭ выполнены конверсии, в 1-м - ушивание раны холедоха, во 2-м - гепатикоеюностомия по Ру, в 3-м – наружное дренирование общего печеночного протока. После холецистэктомии из мини доступа - в 1 случае выполнено ушивание раны общего желчного протока, в двух - гепатикоеюностомия по Ру. Во второй группе, у трех больных после ВЛХЭ выполнено следующее: у 1-го – папиллосфинктеротомия; у 2-го – чрескожная чреспеченочная холангиостомия и отсроченная гепатикоеюностомия по РУ; у 3-го – правосторонняя гемигепатэктомия. После мини доступа – одному больному выполнена реминилапа-ротомия и ушивание раны общего желчного протока; второму - ЭПСТ со стентированием правого долевого протока; третьему – лапаротомия, наружное дренирование общего желчного протока, в от-даленном периоде – бигепатикоеюностомия по Ру. В третьей группе - после ХЭМД, через 1 месяц после операции выполнена ЧЧХС и бигепатикоеюностомия по Ру.

Летальных исходов, осложнений в послеоперационном периоде не было. У одной больной в течение 2-х лет имели место эпизоды холангита.

Заключение. Малоинвазивные методы лечения заболеваний желчного пузыря нередко осложняются повреждениями магистральных желчных протоков. Восстановительные операции допустимы при малых повреждениях и раннем их выявлении, в остальных случаях показано наружное дренирование внепеченочных желчных протоков. При коротких стриктурах допустима восстановительная пластика гепатикохоледоха или его резекция. В отдаленном периоде рекомендуется реконструктивная гепатикоеюностомия.

Литература

1. Борисов А.Е. Руководство по хирургии печени и желчевыводящих путей. – В двух томах. – СПб: Скифия, 2003. – 488 с.
2. Нечай А.И. Причины и предрасполагающие обстоятельства случайных повреждений желчных протоков при холецистэктомии // Вест. хир., 1991. – № 1. – С. 15-21.

**ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЛУБ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ**

***Воробьев А.А. (1), Литвина Е.В. (1), Кондратьева Е.А. (1),
Насонов Н.Д. (1)***

**Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия**

Введение. На данный момент во многих российских медицинских вузах при кафедрах созданы кружки, которые успешно ведут научную и практическую деятельность среди студентов. На базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ со времени ее образования так же традиционно существовал студенческий кружок, но с 2010 года он реорганизован в хирургический клуб. Хирургический клуб – это особое подразделение: в отличие от кафедрального кружка, целью которого является освоение практических хирургических навыков, углубленных знаний по дисциплине, приобретение опыта в научной деятельности. Заседания и мастер-классы, проводимые в рамках клуба, могут посещать только его члены, что придает ему оттенок элитарности, ведь вступить в него можно, только сдав специальный экзамен.

Цель. Дать возможность студентам медицинских вузов приобрести необходимые научно-практические навыки в области хирургии.

Материалы и методы. Материально-технической базой для хирургического клуба ВолгГМУ является кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, на которой находится все необходимое оборудование, экспериментальная операционная для приобретения научных и практических умений. Мастер-классы, проводимые ведущими специалистами в области хирургии, клубные занятия, участие в научной деятельности кафедры стали выбором метода освоения данных навыков. Проверка практических, теоретических и научных навыков по хирургии у студентов клуба осуществляется на олимпиадах по хирургии различного уровня: от внутривузовских до всероссийских и по итогам участия студентов клуба в научных студенческих форумах.

Обсуждение. В результате 6-летнего функционирования хирургического клуба ВолгГМУ студенты овладели навыками различных видов кишечных анастомозов, сосудистого шва, шва нерва и сухожилия, самостоятельно производят аорто-коронарное шунтирование на биологическом материале, трансплантацию почки и печени, выполняют различные операции по пластике мочеточника и мочевого пузыря, кожную пластику, владеют микрохирургической техникой, демонстрируют навыки работы с эндоскопическими инструментами и

техники на тренажере «LapMentor», овладели навыками десмургии, интубации трахеи на тренажере, отлично знают хирургические инструменты (2). Студенческая сборная олимпийская команда ВолгГМУ неоднократно являлась победителем и призером Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии в регионе ЮФО. Студенты хирургического клуба ВолгГМУ также являются участниками и победителями различных студенческих научных форумов. Выпускники хирургического клуба в настоящее время уже самостоятельно работают в ведущих хирургических центрах России и за рубежом. Исходя из результатов можно сделать вывод, что хирургический клуб позволяет решить вопрос освоения научно-практических навыков у студентов, должен продолжать действовать и развиваться с целью выпуска не только теоретически, но и уже практически подготовленных будущих хирургов (1).

Литература

1. Мануальные навыки как составная часть анатомо-физиологической основы российского высшего медицинского образования / А.А. Воробьев, С.С. Дыдыкин, И.И. Каган и др. // Новые технологии в экспериментальной и клинической хирургии: Мат-лы межрегиональной научной конференции. 9-10 июня 2011 г. / Под общ. ред. проф. В.В. Алимова. – Саратов: Изд-во Саратовского мед. ун-та, 2011. – С. 41-44.
2. Олимпийское движение как способ овладения мануальными навыками по хирургии / А.А. Воробьев, О.И. Галушкина, Е.В. Литвина. В сборнике: Проблемы андрагогики высшей медицинской школы Сборник материалов учебно-научно-методической конференции ВолгГМУ. Министерство здравоохранения и социального развития РФ, ВолгГМУ. 2011. – С. 44-48.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАЗВИТИИ МЕДИАСТИНИТА ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Анисимов А.Н., Дербенёв О.А.

Кировская государственная медицинская академия, Киров, Россия

Актуальность. Из инфекционных осложнений у пациентов кардио-хирургического профиля наиболее часто встречаются: инфекция в области хирургического вмешательства – 0,7-10%, инфекция мочевыводящих путей – 2,1-7,9%, нозокомиальная пневмония – 1-6,5%, сепсис – 2,3%, медиастинит-1,5 – 5,8%. Лечение медиастинита окончательно не разработано, и летальность при медиастинитах достигает от 3,5 до 58,3%.

Цель. Анализ микробной флоры и чувствительности к антибиотикам, определение тактики хирургического лечения.

Материалы и методы. В Кировской областной клинической больнице в кардиохирургическом отделении в период с 2014-го по 2015 год выполнено 687 операций в условиях искусственного кровообращения по поводу приобретенных пороков и ишемической болезни сердца. В послеоперационном периоде медиастинит развился у 9 пациентов (мужчины 5, женщины 4). Результаты и обсуждение. Медиастинит развился после следующих видов оперативных вмешательств: АКШ, протезирование клапанов сердца, комбинированное оперативное вмешательство. Все пациенты оперированы. У всех пациентов применялся закрытый метод. Рестернотомия, кюретаж грудины, некрэктомия, промывание перикарда и средостения раствором антисептика, дренирование средостения (перикарда), ушивание грудины, послойное ушивание стернотомной раны с дренированием до 7-10 сут. Антибиотикотерапия. Интраоперационно у всех пациентов бралось отделяемое из раны на посев и чувствительность к антибиотикам. Всего посеяно 29,8% посевов, стерильных посевов 70,2%. В структуре посевов была выделена следующая микрофлора: эпидермальный стафилококк – 53%; сапрофитный стафилококк – 12%; золотистый стафилококк – 11%; кишечная палочка, энтеробактер, псевдомонас, стрептококк вириданс по 6% соответственно. Оценивалась чувствительность к антибиотикам. К ципрофлоксацину микробная флора была чувствительна в 47%, к ванкомицину – 35%, к цефатоксиму – 12%, к имепенему в 6% случаев. Длительность стационарного лечения зависела от сроков рестернотомии, дренирования средостения. В случае выполнения в ранние сроки, до 10 сут., длительность стационарного лечения не превышала 30 дней. При выполнении рестернотомии, дренирования

средостения свыше 10 сут. длительность стационарного лечения резко возрастает и превышает 30-40 дней.

Выводы. 1. Поскольку в большинстве случаев определялся staph.epidermidis, то имеет смысл назначать эмпирическую антибиотикотерапию этого возбудителя. 2. 70% посевов были стерильны, что делает необходимым применение высокочувствительных методов (ПЦР) для ранней диагностики инфекции. 3. В посевах преобладает условно патогенная микрофлора (эпидермальный стафилококк, золотистый стафилококк, сапрофитный стафилококк, кишечная палочка) - грам+, грам- флора, чувствительная к фторхинолонам (ципрофлоксацин), гликопептидам (ванкомицин) 4. Адекватным методом лечения является закрытый (санация, дренирование переднего средостения с оставлением дренажа до 7-10сут, рациональная антибиотикотерапия). 5. Раннее оперативное лечение медиастинита значительно уменьшает сроки пребывания пациента в стационаре и снижает материальные затраты.

Литература

1. Патология кровообращения и кардиохирургия / В.А. Белов. – 2005. – № 2.
2. Хирургия сердца / Ю.П. Островский. – 2007.
3. Бокерия, Л.А. Хирургическое лечение заболеваний сердца у больных пожилого возраста : современные подходы к лечению, качество жизни и прогноз / Бокерия Л.А. – 2012.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ПИЛОРОСТЕНОЗА

Носков А.С. Семенов А.В.

**ФГБОУ ВО «Кировская государственная медицинская академия»,
Киров, Россия**

Врожденный пилоростеноз (ВП) является одним из наиболее часто встречающихся заболеваний у детей грудного возраста, которое требует оперативного лечения немедленно после соответствующей предоперационной подготовки.

В Кировской областной детской клинической больнице (КОДКБ) за период с 2003 по 2015 год было прооперировано 112 детей с данной патологией. Из них 95 мальчиков (84,8%) и 17 девочек (15,2%) в возрасте от 8 суток до 3 месяцев.

В возрастном аспекте дети распределились следующим образом: новорожденные – 16 пациентов (14,3%); от 1 до 2 месяцев – 80 пациентов (71,4%); от 2 до 3 месяцев – 15 пациентов (13,4%); и в возрасте 3 месяца – 1 пациент (0,9%). Обследование больных данной категории включало в себя рентгеноконтрастные методы исследования и ФГС (начальный временной период), физикальную и ультразвуковую диагностику (в настоящее время). Мы сравнили лечение детей с пилоростенозом в двух временных периодах. За период с 1994 по 2003 год в ОДКБ было пролечено 62 пациента, всем была выполнена классическая пилоромиотомия по Фреде-Рамштедту. Рецидивов не было, зафиксирован 1 летальный исход у больного с тяжелой сопутствующей патологией (0,6%). В связи с внедрением в клиническую практику современных малоинвазивных технологий, за период 2004-2015 годы было пролечено 50 пациентов. Всем выполнялась лапароскопическая внеслизистая пилоромиотомия по тому же принципу. Рецидивов и летальных исходов не было.

Среднее время пребывания в хирургическом отделении ОДКБ 112 пациентов составил 10,6 койко-дней. Из них минимальное время нахождения в стационаре составило 3 дня; максимальное – 31 день. Средний койко-день пациентов, которым была выполнена эндоскопическая пилоромиотомия по Фреде-Рамштедту, составил 7,46. При полостной пилоротомии время нахождения в хирургическом отделении составило 11,79 койко-дней.

Выводы: 1) ВП – распространенное заболевание, которое не теряет своей актуальности с годами; 2) ВП имеет выраженную половую

дифференциацию (мальчики болеют в 5,6 раз чаще девочек); 3) чаще всего выявление ВП обнаруживается у детей в возрасте от 1 до 2 месяцев; 4) лапароскопическая внеслизистая пилоромиотомия по Фреде-Рамштеду обладает неоспоримыми преимуществами по сравнению с классической операцией и в настоящее время стала золотым стандартом в лечении больных данной категории.

Литература

1. Детская хирургия: национальное руководство/ под редакцией Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1168 с.
2. Детская хирургия в лекциях: Учебник для медицинских вузов, Кудрявцев В.А, издание 2-е, перераб. – Архангельск: Издательский центр СГМУ, 2007. – 468 с.
3. Атлас детской оперативной хирургии / под редакцией П. Пури, М. Гольварта; перевод с англ. яз.; под общ. ред. проф. Т.К. Немиловой. – М.: – МЕДпресс-информ, 2009 . – 648 с.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Хвостовой В.В.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия

Цель исследования: проанализировать результаты лечения местно-распространенного рака щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 770 больных РЩЖ, находившихся на лечении в 1997-2010 годах. Тиреоидэктомии производились при мультицентрических раках, медуллярной карциноме, во всех случаях распространения опухолей за пределы органа. Местное распространение карцином отмечалось у 157 больных, что составило 20,38%. Было выполнено 32 комбинированные и 110 расширенных операций. В 15 случаях выполнены расширенно-комбинированные вмешательства. 64 операции выполнялись повторно в сроки от 3 месяцев до 15 лет от первичной.

Среди пациентов с местно-распространенным РЩЖ было 38 мужчин (24,2 %) и 119 женщин (75,8 %). Средний возраст больных $56,1 \pm 4,5$. Гистологическая структура: папиллярный рак у 141 больного (89,80%); фолликулярный рак у 12 (7,64%); медуллярный рак – у 4 (2,56%) больных. Послеоперационная летальность составила 1,28% (2 пациента).

Результаты. При выполнении операций нами реализован комплекс разработанных и внедренных в клинику методик. Применялась усовершенствованная методика экстрафасциальных операций с визуальным выделением и сохранением возвратных гортанных нервов. При массивных конгломератах шейных метастазов удаление внутренней яремной вены с одной стороны выполнена в 12 случаях из всех 125 случаев боковых лимфодиссекций (9,60%). В остальных случаях выполнялась боковая шейная лимфодиссекция с одной и /или двух сторон, а при ограниченном прорастании внутренней яремной вены метастазом рака с пристеночной резекцией и сосудистым швом внутренней яремной вены.

Комбинированная тиреоидэктомия с «бреющей» резекцией трахеи и гортани выполнена нами в 14 случаях. В 3 случаях выполнена комбинированная тиреоидэктомия с окончатой резекцией 4-6 колец трахеи. В 2 случаях выполнялась комбинированная тиреоидэктомия с циркулярной резекцией 5 колец трахеи. В 2 случаях выполнена комбинированная тиреоидэктомия с ларингэктомией, в одном случае – комбинированная тиреоидэктомия с ларингэктомией и резекцией шейного отдела пищевода. Повторные оперативные вмешательства,

носящие характер расширенных и комбинированных по поводу рецидивов выполнялись в 64 наблюдениях, то есть в 40,76% всех случаев хирургического лечения местно-распространенного РЩЖ, 5 пациентов оперированы трижды.

При наблюдении в сроки от 3 до 10 лет возникновение гематогенных метастазов наблюдалось у 8 пациентов из 155 выживших после операции (5,1%), двое из них погибли от генерализации процесса. Резектабельный местный рецидив в зоне оперативного вмешательства имел место у 6 пациентов (3,87%), они повторно прооперированы и живы без признаков рецидива. Нерезектабельный рецидив в зоне оперативного вмешательства через 1-2 года после операции стал причиной смерти двух больных (1,29%). Оставшиеся под наблюдением пациенты живы в сроки от 3 до 15 лет после операции.

Выводы. Комбинированные, расширенные и повторные операции при дифференцированном РЩЖ обеспечили выздоровление или значительное продление жизни большинству больных, которые нередко рассматриваются как инкурабельные. В случае рецидивирования дифференцированных форм РЩЖ наиболее эффективным является хирургическое лечение, которое обеспечивает выздоровление большинства пациентов. Несмотря на травматичность, не вызывает сомнений целесообразность выполнения расширенных операций при вращении рецидивов в трахею и гортань.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ

Кригер А.Г.

**ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава
России, Москва, Россия**

Хирургическое лечение больных ХП более 30 лет является приоритетным направлением отдела абдоминальной хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского. За период 2000-2015 гг. оперированы 795 больных хроническим панкреатитом.

Дренирующие операции произведены 298 больным: цистоеюностомия с отключенной по Ру петле тощей кишки – 106, продольная панкреатоеюностомия – 95, наружное дренирование абсцедирующих постнекротических кист – 62. Эндоскопическое внутреннее дренирование производили с 2011 г., оно выполнено 35 больным. Показанием к эндоскопическому лечению являлось прилежание кист к стенке ДПК или желудка, отсутствие крупных секвестров, эндоскопическое внутреннее дренирование.

Резекционные хирургические вмешательства произведены 444 больным. При наличии панкреатической гипертензии и фиброзного перерождения головки поджелудочной железы (ПЖ) 147 больным выполнена ее резекция с формированием продольного панкреатоеюноанастомоза (операция Фрея). При сочетании панкреатической и желчной гипертензии бернский вариант резекции головки ПЖ использован в 87 наблюдениях. Субтотальная резекция головки ПЖ (операция Бегера) производилась при наличии портальной гипертензии

64 больным. Панкреатодуоденальная резекция выполнена 82 больным. Дистальная резекция ПЖ произведена 55 больным, срединная резекция – 9 при панкреатических свищах и подозрении на опухоль ПЖ.

При ложных аневризмах комбинированное лечение (эндоваскулярное и хирургическое) произведено 31 больному, эндоваскулярное – 22.

Послеоперационные осложнения возникли у 159 (20,3%) больных. Умерли 8 (1%) человек.

Хирургическое лечение осложнений хронического панкреатита является непростой задачей. Для определения характера предстоящей операции необходимо детальное обследование, при котором нужно установить состояние паренхимы поджелудочной железы, наличие панкреатической, билиарной и портальной гипертензии, изучить сосудистую архитектуру бассейна чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, состояние стенки ДПК. Только комплексная

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek.proc

оценка перечисленных параметров позволяет остановиться на оптимальном виде оперативного вмешательства. Показания к операции должны быть веско аргументированы, а ее объем — иметь разумный органосохраняющий характер с минимальной угрозой возникновения послеоперационных осложнений.

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕГКИХ
УСИЛЕННЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ**

*Полевой Ю.Ю., Нетяга А.А., Блинков Ю.Ю., Жуковский В.А.,
Любичкая Ю.А.*

**ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия**

В настоящее время доказано преимущество герниопластики «без натяжения» с применением для закрытия дефекта брюшной стенки эндопротезов [1]. При этом известно, что стандартные полипропиленовые эндопротезы имеют избыточную прочность, а соответственно и массу, в результате чего у пациентов развиваются осложнения в виде болей в области послеоперационного рубца, парестезий, чувства инородного тела [3]. Легкие материалы, обладают меньшей прочностью, что делает затруднительным их применение для более надежного укрепления брюшной стенки [2]. Вариантом решения этой проблемы может быть использование легких усиленных материалов, прочность которых повышается за счёт введения в структуру легкого эндопротеза более толстой и прочной усиливающей нити.

Цель исследования: оценить эффективность применения легких усиленных эндопротезов на основании изучения тканевой реакции на их имплантацию в сравнении с легким полипропиленовым эндопротезом Эсфил при различных методах имплантации (onlay и sublay).

Материалы и методы. В качестве материала был использован легкий усиленный полипропиленовый эндопротез «Эсфил». Экспериментальные исследования были проведены на 30 кроликах породы «Шиншилла». В 1 серии экспериментов было проведена имплантация легких эндопротезов. Во 2 серии было проведена имплантация легких усиленных эндопротезов. На каждом животном моделировалась пластика по методике (onlay и sublay). Изучение тканевой реакции проводили на основании гистологического и морфометрического исследований.

По данным гистологического исследования, проведенного в ходе эксперимента, было установлено, что более раннее купирование воспалительных изменений и наиболее быстрое образование соединительнотканной капсулы отмечается вокруг легкого усиленного эндопротеза в положении sublay. Данные гистологического исследования были подтверждены морфометрически: более благоприятное течение раневого процесса, определяемое более

низкими показателями площадей инфильтратов, площадей капсул и более высокими показателями клеточных индексов, отмечалось в группе «легкий усиленный эндопротез» в положении sublay (достоверные отличия были установлены на 7, 30 и 60 сутки эксперимента в сравнении с группой onlay). Кроме этого, усиленная сетка в положении sublay по указанным показателям превосходила легкую (достоверные отличия были установлены на 7, 30 и 60 сутки эксперимента).

Таким образом, проведенные исследования показали, что усиление легкого эндопротеза более прочной нитью не ухудшает его биосовместимых свойств, что делает перспективным применение этого материала в герниологии.

Литература

1. Егиев В.Н. Взаимодействие полипропиленовых эндопротезов с тканями передней брюшной стенки / В.Н. Егиев, Д.В. Чижов, Н.В. Филаткина // Герниология. – 2005. – № 2.
2. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики / В.А. Жуковский. – СПб.: Изд-во Эскулап, 2011.
3. Нетяга А.А. Легкие или композитные эндопротезы для герниопластики: выбор материала на основании экспериментального изучения их биосовместимых свойств / А.О. Парфенов, Г.М. Нутфуллина, В.А. Жуковский // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 5.
4. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – №. 1 (2).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ КРОЛИКА

*Воробьев А.А., Литвина Е.В., Насонов Н.Д., Кондратьева Е.А.,
Исмаилов И.Я.*

**Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия**

Большинство современных оперативных методик нуждается в экспериментальной апробации на биологических объектах. Основными задачами экспериментальной хирургии является изучение систем органов животных и сравнение их с человеческим организмом, моделирование патологических процессов, отработка новых методов лечения. Для успешного хирургического эксперимента необходим ряд условий, в том числе и знание анатомического строения экспериментального животного.

Цель: дать характеристику топографических особенностей брюшной полости кролика *Oryctolagus cuniculus* для нужд экспериментальной хирургии и определить диапазон экспериментальных операций на органах брюшной полости кролика.

Материалы и методы. Объект исследования – здоровые кролики массой от 3,5 до 5 кг. Особенности топографической анатомии кроликов изучались во время секции и по литературным источникам. Исследование проводилось в соответствии с этическими нормами обращения с экспериментальными животными. Методы экспериментального получения патологических процессов изучались по материалам научных публикаций и собственных данных.

Результаты и обсуждение. На секции были обнаружены следующие анатомические особенности. Передняя брюшная стенка имеет два слоя мышц. В брюшную полость пищевод проникает толстостенной трубкой и проходит через пищеводную вырезку левее прохождения каудальной полой вены. Желудок подковообразно-изогнутой формы. Кишечник длинный (315,5-469,5 см), наиболее развит толстый отдел, лимфатические образования иногда формируют мощные агрегаты. Поджелудочная железа небольших размеров, расположена в брыжейке кишечника, интраперитонеально. Аппендикс является важнейшим органом желудочно-кишечного тракта, принимающим участие в пищеварении. Печень имеет особенности в долевогой структуре (1, 2).

На органах брюшной полости кролика возможна имитация следующих патологических процессов. Экспериментальное получение вентральной грыжи, пластика грыжевого дефекта. Моделирование острого деструктивного панкреатита. В эксперименте на кроликах возможно выполнение ушивания ран (продольных и поперечных) и

создание анастомозов (по типу конец-в-конец, конец-в-бок) ободочной кишки. Моделирование гастростомии, спаечного процесса ранения паренхиматозного органа, острого холецистита, лобэктомия печени.

Выводы. Как представитель класса млекопитающих, кролик имеет типичное строение и расположение внутренних органов в брюшной полости. Особенности топографической анатомии кроликов во многом определяются их стереотипом питания (травоядные) и способом передвижения, в частности, значительная протяженность желудочно-кишечного тракта с наибольшим развитием слепой кишки и аппендикса, высокая желчепродуцирующая деятельность печени, незначительная выраженность поджелудочной железы. В результате изучения анатомических и физиологических особенностей организма кролика как экспериментального животного можно сделать вывод о большом спектре моделируемых патологических процессов и возможности апробации методов их оперативного лечения.

Литература

1. Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Федин А.Н. Анатомия кролика. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2009. – 353 с.
2. Большаков О.П., Воробьев А.А., Дыдыкин С.С., Каган И.И., Колсанов А.В., Литвина Е.В., Поройский С.В., Чемезов С.В., Чукичев А.В. Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам / под ред.
3. А.А. Воробьева, И.И. Кагана. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 688 с.: ил.
4. Ткаченко П.В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики // Innova. – 2016. – №. 1 (2).

**ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ
С ЗАСТАРЕЛЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ**

Длясин Н.Г., Нам А.В., Фроленков А.В., Ирисханов И.Р., Зоткин В.В.
**ФГБУ «Саратовский НИИ травматологии и ортопедии» Минздрава
РФ, Саратов, Россия**

Повреждения верхней трети плечевой кости являются распространённой патологией. Особенности топографической анатомии плечевого сустава, нарушение кровообращения головки плеча в результате травмы, наличие остеопороза, особенно у лиц пожилого возраста, обуславливают сложность лечения данных переломов, в том числе и хирургических. Лечение застарелых повреждений проксимального отдела плечевой кости крайне затруднительно из-за наличия обширных рубцовых изменений мягких тканей, ретрагированности мышц плеча и лопатки.

В последние годы перспективным направлением в лечении переломов проксимального отдела плечевой кости является эндопротезирование плечевого сустава [1].

Цель: улучшение результатов лечения у больных с застарелыми травмами проксимального отдела плечевой кости.

Материал и методы. Проведён анализ результатов лечения 61 больного с застарелыми повреждениями проксимального отдела плечевой кости, которым было выполнено эндопротезирование плечевого сустава конструкциями Орто П, ЭСИ, Ceraver, Prospon, De Ryu Delta.

Застарелые перелома-вывихи были у 28 больных, неправильно сросшиеся переломы (в том числе и после хирургических вмешательств) у 30 пациентов, отсутствие проксимального отдела плечевой кости у 3 больных.

Давность травмы была от трех месяцев до 11 лет.

Операция эндопротезирования осуществлялась под эндотрахеальным наркозом, в полусидящем положении больного. Использовались различные варианты передних и наружных доступов. Пассивные упражнения в плечевом суставе начинали на 2-3 день после операции; активные упражнения в суставе начинали через 3-6 недель после операции.

Результаты. Анализ результатов эндопротезирования плечевого сустава при застарелых травматических повреждениях проксимального отдела плечевой кости показал, что лучшие результаты эндопротезирования возможны при применении реверсивных

(обратных) конструкций, исключаящих влияние коротких ротаторов плеча при поднятии руки. Также результаты операций были лучше у больных с менее выраженной ретракцией мышц плеча и лопатки.

Выводы. Эндопротезирование плечевого сустава при повреждениях проксимального отдела плечевой кости является перспективным направлением в современной травматологии-ортопедии. Лучшие результаты лечения достигаются при применении реверсивных конструкций.

Литература

1. Длясин Н.Г. Результат тотального эндопротезирования плечевого сустава реверсивной конструкцией delta xtend™. Травматология и ортопедия России. – 2011. № 4 (62). – С. 105-107.
2. Современные методы лечения привычного вывиха плеча (обзор литературы). Длясин Н.Г., Норкин А.И., Грамма С.А., Горшков В.Ю., Деревянов А.В. Саратовский научно-медицинский журнал. – 2010. Т. 6. № 3. – С. 687-692.
3. Патент на изобретение РФ № 2445037 от 18.11.2010 г. Способ лечения заднего привычного вывиха плеча. Длясин Н.Г., Норкин И.А., Норкин А.И., Анисимов Д.И., Длясин Г.Н.
4. Патент на изобретение РФ № 2430697 от 27.05.2010 г. Способ лечения привычного вывиха плеча. Длясин Н.Г., Норкин А.И., Горшков В.Ю., Деревянов А.В., Длясин Г.Н.
5. Патент на изобретение РФ № 2168316 от 27.05.1997 г. Способ хирургического лечения привычного вывиха плеча. Семенов В.И., Длясин Н.Г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ “КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ”

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek.proc

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

При поддержке

Фармацевтическая компания
«Фармстандарт»
Тел.: (495)970-0030
info@pharmstd.ru
pharmstd.ru

Администрация Курской области
Тел.: (4712) 55-68-21
Тел./факс: (4712) 70-82-03
e-mail: glava@rkursk.ru
adm.rkursk.ru

Комитет по делам молодежи и туризму
Курской области
Тел./факс: (4712) 521-621
e-mail: kdmt@rkursk.ru
www.kdmt46.ru

Производство хирургических материалов
«ЛИНТЕКС»
Тел./факс: (812) 313-39-19
e-mail: info@lintex.ru
www.lintex.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ"

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek.proc

**29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.**

Электронный научный журнал «INNOVA»
e-mail: www.innomagazine.ru
main@innomagazine.ru

«ОПТЭК»
Тел.: (383) 363-76-74
www.optecgroup.com

Торговая сеть «Европа»
Тел.: (4712) 391-991
Факс: (4712) 391-991 доб. 2169
e-mail: a.kasatkin@ptpgroup.ru
www.europa-ts.ru

Медицинский центр «Матис»
Тел.: (47148) 43584
e-mail: mail@medcentr-matis.ru
medcentr-matis.ru

Поставка шовного материала
«Микрохирургия глаза и контур»
Тел.: (8352) 31-12-24
e-mail: mgik@gc-kontur.ru
www.medarticle.ru

Хирургические инструменты «HILBRO»
Тел.: (831) 716-62-49
e-mail: hilbro@ya.ru
www.hilbro.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "КУРСКАЯ НЕДЕЛЯ ХИРУРГИИ"

doi: 10.21626/cb.16.surgeryweek.proc

29 НОЯБРЯ -
3 ДЕКАБРЯ
2016 г.

Медицинское оборудование, тренажеры и инструменты «SuperMedSquad»

Тел.: (495) 795-58-35

e-mail: info@supermedsquad.ru

supermedsquad.ru

Медицинское оборудование
«COVIDIEN»

Тел.: 7 (495) 933-64-68

e-mail: rus@covidien.com

www.covidien.com

«ГОТЭК Северо-Запад»

Тел.: (4712) 391-991

Факс: (4712) 391-991 доб. 2169

e-mail: a.kasatkin@ptpgroup.ru

www.europa-ts.ru

«Konti»

Тел.: (4712) 73 02 20

Факс: (4712) 70 82 85

E-mail: refer@ru.konti.com

www.konti.com

Производство имплантов «ЭКОФЛОН»

Тел.: (812) 764 02 59;

Факс: (812) 764 55 42;

e-mail: ecoflone@mail.wplus.net

www.ecoflone.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ВЫБОРУ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР	ДОПУСТИМЫЙ ВЫБОР	НЕРЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЫБОР
Фиксация сетчатых эндопротезов КИШЕЧНЫЙ ШОВ:	ФТОРЭКС¹ 3/0-2/0, УНИФЛЕКС² 3/0-2/0, МОНОФИЛ³ 3/0-2/0		КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК
тонкая кишка	УЛЬТРАСОРБ⁴ 4/0-3/0 – однорядный непрерывный шов	ПГА⁵ 3/0 – однорядный узловой шов, МОНОСОРБ⁶ 4/0 – однорядный непрерывный шов	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, КЕТГУТ
	УЛЬТРАСОРБ 4/0-3/0 – первый ряд непрерывный + ПГА 3/0 – второй ряд узловой	ПГА 3/0 – первый ряд непрерывный, второй ряд узловой; МОНОСОРБ 4/0 – первый ряд непрерывный + ПГА 3/0 – второй ряд узловой	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, КЕТГУТ
	УЛЬТРАСОРБ 4/0-3/0 – первый ряд + ПГА 3/0 – второй ряд узловой	ПГА 3/0 – первый ряд непрерывный, МОНОСОРБ 4/0 – первый ряд непрерывный + ПГА 3/0 – второй ряд узловой	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, КЕТГУТ
Желчные пути	УЛЬТРАСОРБ 5/0-4/0	ПГА 5/0-4/0, МОНОСОРБ 5/0	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, КЕТГУТ
Апаневроз белой линии живота (после срединной лапаротомии)	МОНОСОРБ, МОНОФИЛ, УНИФЛЕКС 0-1	ФТОРЭКС 0-1-2	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, ПГА, УЛЬТРАСОРБ
Опорные мягкие ткани (фасции, мышцы)	на фиксации с выраженной механической нагрузкой – ФТОРЭКС 3/0-2/0; на остальные фасции – ПГА 3/0-2/0; на мышцы – ПГА-рапид⁷ 3/0-2/0	ФТОРЭКС 3/0-2/0	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, КЕТГУТ
КОЖА:			
обычные узловые швы	ФТОРЭКС 3/0 (съёмный шов)	ЛАВСАН, КАПРОН 3/0 (съёмный шов)	ПГА
косметический шов	УЛЬТРАСОРБ 3/0 (несъёмный шов); УНИФЛЕКС или МОНОФИЛ 3/0 с фиксаторами (съёмный шов)	ПГА-рапид 4/0 (несъёмный шов); ФТОРЭКС 3/0 (съёмный шов)	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК, КЕТГУТ
МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ:			
чашечно-лоханочная система, мочеточники	УЛЬТРАСОРБ 5/0-4/0	ПГА 5/0-3/0	КЕТГУТ
мочевой пузырь	ПГА 2/0, УЛЬТРАСОРБ 3/0	ПГА 2/0, УЛЬТРАСОРБ 3/0	КЕТГУТ
мочеиспускательный канал	УЛЬТРАСОРБ 4/0	ПГА 4/0-3/0, МОНОСОРБ 4/0	КЕТГУТ
СОСУДИСТЫЙ ШОВ	УНИФЛЕКС 5/0, МОНОФИЛ 5/0	ФТОРЭКС 5/0	КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК

	1 ФТОРЭКС	Нить лавсановая (полиэфирная) плетёная с фторполимерным покрытием. Покрытие увеличивает биосовместимость, полностью устраняет капиллярность, фитильность, повышает надёжность хирургического узла, обеспечивает атравматическое проведение через ткани. Аналоги: Ethibond, Synthofil, Polyester-S
	2 УНИФЛЕКС	Мононить поливинилиденфторидная (ПВДФ). Отличается высокими биосовместимостью и биорезистентностью, прочностью, атравматичностью, хорошими манипуляционными свойствами, отсутствием фитильности. Аналоги: Resopren, Pronova, Coralen
	3 МОНОФИЛ	Мононить полипропиленовая (ПП). Аналоги: Prolene, Surgilene, Premilene, Surgipro
	4 УЛЬТРАСОРБ	Мононить полиглекапроновая со средним сроком рассасывания. Срок рассасывания: потеря 50 % прочности – через 14 суток; полное рассасывание – 60-90 суток. Аналоги: Monocryl, Monosyn
	5 ПГА	Нить полигликолидная плетёная с покрытием со средним сроком рассасывания. Срок рассасывания: потеря 50 % прочности – через 14 суток; полное рассасывание – 60-90 суток. Аналоги: Vicryl, Safil, Polisorb, PGA-Resorba
	6 МОНОСОРБ	Мононить полидиоксаноновая с длительным сроком рассасывания. Срок рассасывания: потеря 50 % прочности – через 30 суток; полное рассасывание – 6 месяцев. Аналоги: PDS II, MonoPlus
		Срок рассасывания: потеря 50 % прочности – через 7 суток; полное рассасывание – 30-40 суток. Аналоги: Vicryl-rapid, Safil-quick, PGA-Resoquick

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ www.lintex.ru.

190020, Россия г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литера К
Почтовый адрес: 190068, Санкт-Петербург, а/я 582

Многоканальный тел./факс: (812) 385-44-30
Тел./факс: (812) 313-39-19
e-mail: info@lintex.ru
www.lintex.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ НЕКОТОРЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

Клиническая ситуация		Наилучший выбор	Допустимый выбор
Общие рекомендации			
Оперативное вмешательство по экстренным показаниям		УНИФЛЕКС ¹ стандартный	ЭСФИЛ ² стандартный
Предполагаемый высокий риск послеоперационных осложнений		УНИФЛЕКС стандартный	ЭСФИЛ стандартный
Избыточная масса тела пациента		УНИФЛЕКС тяжелый	ЭСФИЛ тяжелый
Превентивная герниопластика		ФЛЕКСИЛЕН ³ , ЭСФИЛ легкий	ЭСФИЛ стандартный
Рекомендаций в зависимости от вида грыжи			
Паховые грыжи	Молодые пациенты	ФЛЕКСИЛЕН, ЭСФИЛ легкий	ЭСФИЛ стандартный, ФТОРЭКС ⁴
	Пациенты средней возрастной группы	УНИФЛЕКС стандартный	
	Пожилые пациенты		
Бедренные грыжи		ФЛЕКСИЛЕН, ЭСФИЛ легкий	ФТОРЭКС
Грыжи белой линии живота и пупочные грыжи		УНИФЛЕКС стандартный	ЭСФИЛ стандартный
Послеоперационные вентральные грыжи	Размеры грыжевых ворот менее 20 см	УНИФЛЕКС стандартный	ЭСФИЛ стандартный
	Размеры грыжевых ворот более 20 см	УНИФЛЕКС тяжелый	ЭСФИЛ тяжелый
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы		ФЛЕКСИЛЕН	ФТОРЭКС
Парастомальные грыжи		УНИФЛЕКС стандартный	ЭСФИЛ стандартный

¹ УНИФЛЕКС	Сетчатый эндопротез из поливинилиденфторидных мононитей. Отличается высокой биосовместимостью, устойчивостью к инфекции, прочностью, мягкостью и отсутствием фтильности. Применение эндопротеза сопровождается формированием тонкой, эластичной и прочной соединительнотканной капсулы при минимальном количестве послеоперационных осложнений.
² ЭСФИЛ	Классический сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена. Эндопротез сочетает в себе высокие показатели биологической инертности, устойчивости к инфекции и механической прочности.
³ ФЛЕКСИЛЕН	Сетчатый эндопротез из полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей. Обладает высокими показателями гибкости в сочетании со стабильностью структуры (сохранение формы), что делает его очень удобным в манипуляциях.
⁴ ФТОРЭКС	Сетчатый эндопротез ФТОРЭКС изготовлен из биологически инертных лавсановых (полиэфирных) комплексных нитей с фторполимерным покрытием, в течение длительного периода не резорбирующихся и не теряющих прочность и эластичность под действием тканевых жидкостей. Основовязанная структура сетчатого эндопротеза обеспечивает нераспускаемость краев при разрезании, а специальное переплетение - стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ
www.lintex.ru

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ

ПГА

ПГА-рапид

МОНОСОРБ

УЛЬТРАСОРБ

КЕТГУТ

НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ

УНИФЛЕКС

МОНОФИЛ

МОНАМИД

ФТОРЭКС

ФТОРЛИН

КАПРОГЕНТ

КАПРОН

ЛАВСАН

ШЕЛК

ПОЛИМЕРНЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

ЭСФИЛ
СТАНДАРТНЫЙ

ЭСФИЛ
ТЯЖЕЛЫЙ

ЭСФИЛ
ЛЕГКИЙ

УНИФЛЕКС
СТАНДАРТНЫЙ

УНИФЛЕКС
ТЯЖЕЛЫЙ

УНИФЛЕКС
ЛЕГКИЙ

ФЛЕКСИЛЕН

ЭСЛАН

ФТОРЭКС

УРОГИНЕКОЛОГИЯ

УроСлинг

УроСлинг
мужской

УроСлинг 1

ПЕЛВИКС
полный

ПЕЛВИКС
передний

ПЕЛВИКС
задний

ГИНЕФЛЕКС

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ ООО «ЛИНТЕКС»

МЕЗОГЕЛЬ
гель противоспаечный

БИАТРАВМ
раневое покрытие

Урофикс ПЛ
Урофикс ТО
проводники для установки
эндопротезов