СБОРНИК

трудов и материалов

Научно-практической конференции

Эксперимент в хирургии и онкологии

Курск, КГМУ, 18 сентября 2020 года

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НИИ Экспериментальной медицины
НИИ Физиологии**

**СБОРНИК
трудов и материалов
Научно-практической конференции
«Эксперимент в хирургии и онкологии»**

Курск, КГМУ, 18 сентября 2020 года

УДК 617:616-006-092.9(063)

ББК 54.5:55.6я43

Э 50

Эксперимент в хирургии и онкологии : сборник научных трудов и материалов научно-практической конференции с международным участием (Курск, 18 сентября 2020 г.) / Курский гос. мед. ун-т, НИИ экспериментальной медицины, НИИ физиологии. – Курск : КГМУ, 2020. – 47 с.

ISBN 978-5-6041180-9-2

DOI: 10.21626/cb.20.surgeryexperiment-sept

Коллектив авторов © 2020

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России © 2020

ООО «МедТестИнфо» © 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветствие участникам конференции.....	6
ПРОГРАММА	7
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ И ОНКОЛОГИИ НИИ ЭМ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	10
ПОРОШОК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА	12
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ	14
МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН ОРИГИНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ	15
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ АНТИСЕПТИКОВ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН	17
МОНОПОРТОВЫЙ ДОСТУП В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ РАННЕМ РАКЕ ЛЕГКОГО	18
РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – ПРОТОВАЯ АДЕНОКАРЦИНОМА, С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОНКОХИРУРГИИ.....	20
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРЬЕРНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РУБЦОВОЙ КОМПРЕССИИ НЕРВОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ	21
ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ МЕСТНЫХ ГУБЧАТЫХ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ	22
ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИИ СОСУДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПЕРОСМОЛЯРНОГО РАССТВОРА.....	24
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	25
ВЛИЯНИЕ СТРОНЦИЯ ХЛОРИДА НА КОНСОЛИДАЦИЮ ОСТЕОПОРТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.....	27
НЕОБЫЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ МИКСОМЫ	29
ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА СОКРАТИМОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ	31
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИВОТНОГО И РЫБНОГО КОЛЛАГЕНА. СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЫБНОГО КОЛЛАГЕНА	33
ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРОМБОЛИЗИСА У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	35
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ С ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТОЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ	36
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ.....	37
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНАНАТОМИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ.....	39

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА	41
ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ИММУННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА.....	43
ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРОМБОЛИЗИСА У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	44
РЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БИЛИАРНОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА В ХИРУРГИИ	46

Приветствие участникам конференции

Заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, ректора Курского государственного медицинского университета, председателя оргкомитета конференции
Виктора Анатольевича Лазаренко

Дорогие участники Научно-практической конференции «Эксперимент в хирургии и онкологии»!

От лица ректората, преподавательской корпорации, я рад приветствовать вас и поблагодарить за решение принять участие в нашем мероприятии, которое уже носит регулярный характер и не только информирует научное сообщество о достижениях ученых, передовых практиках, но и приглашает к междисциплинарному сотрудничеству.

Замечательным и перспективным, на мой взгляд, является подход организаторов: использование гибридных технологий, позволяющих комбинировать и очную и дистанционную работу на разных площадках в рамках одного мероприятия. Да, это продиктовано эпидемической ситуацией, но вместе с этим, это возможность внедрения новых организационных и технологических решений в процесс научной коммуникации.

По сути, эксперимент, как ведущий метод, является наиболее смелым и достоверным путем подтверждения возникающих в голове ученого и практикующего врача гипотез. Именно эксперимент является первым этапом подтверждения эффективности и безопасности предлагаемых для клиники диагностических, лечебных и профилактических новшеств. Именно в эксперименте, особенно, если исследования проводятся на стыке дисциплин, могут рождаться наиболее оригинальные решения существующих в клинике проблем.

Я желаю участникам конференции успехов на нелегком пути исследователя и будущих прорывных достижений на благо медицины, на благо пациента!

ПРОГРАММА

Региональной научно-практической конференции «Эксперимент в хирургии и онкологии»

Курск, КГМУ, 18 сентября 2020 г.

К участию в научно-практической конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты медицинских и немедицинских университетов, представители медицинского и фармацевтического бизнеса.

Цель конференции: освещение современных достижений экспериментальной медицины; освещение проводящихся на базе научно-исследовательских институтов КГМУ экспериментальных исследований, приглашение к сотрудничеству в реализации инновационных проектов.

Конференция проводится в дистанционном формате. Для подключения к ней необходимо зарегистрироваться по ссылке:

<https://forms.gle/rvL75uSLkr4pgyXC8>

Регистрационная форма позволяет получить доступ к конференции, и выслать тезис, который будет опубликован в сборнике материалов конференции, а также сертификат участника.

Время начала: 17.00.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

РЕГЛАМЕНТ: формат выступлений [Elevator pitch](#), ответы на вопросы сразу после доклада – 3 минуты, обсуждение докладов после всех выступлений.

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ

17:00-19:00 – Пленарное заседание конференции: приветствия, награждения, доклады, обсуждение.

Приветственное слово проректора по научной работе и инновационному развитию доцента В.П. Гаврилюка, руководителей научно-исследовательских институтов и лабораторий КГМУ, структурных подразделений университета, гостей.

Награждение победителей конкурса научных проектов.

Виртуальная экскурсия. Демонстрация научной базы лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии НИИ экспериментальной медицины КГМУ.

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Особенности организации и проведения доклинических исследований фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения

Елена Борисовна Артюшкова

д.ф.н., профессор, директор НИИ ЭМ КГМУ

Сочетание научных и образовательных процессов, как компонентов современного развивающегося университета

Вячеслав Александрович Липатов

д.м.н., профессор, зав. лабораторией экспериментальной хирургии и онкологии
НИИ ЭМ КГМУ

Презентация научных направлений студенческой научной лаборатории КГМУ

Ирина Леонидовна Привалова

д.м.н., профессор, руководитель студенческой научной лаборатории НИИ ЭМ КГМУ

Пластические материалы с гемостатическим эффектом в хирургии почки

Вячеслав Романович Ветров

Врач-уролог ОБУЗ КГБ СМП (г. Курск)

Методы оценки выраженности спаечной процесса брюшной полости в эксперименте

М. Давид Зияуддин Наимзада

младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии НИИ ЭМ КГМУ

Пути совершенствования шовных материалов

Артем Александрович Денисов

ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ

Разработка, апробация и коррекция устройства для прецизионного применения кровоостанавливающих средств в виде порошка

Константин Александрович Циленко

Врач-детский хирург Европейского медицинского центра (г. Москва)

Порошок как инновационная форма кровоостанавливающего средства

Сергей Анатольевич Николаев

студент 5 курса педиатрического факультета КГМУ

Разработка и апробация губчатых гемостатических средств на основе натрий-крабоксиметилцеллюлозы

Дмитрий Андреевич Северинов

ассистент кафедры детской хирургии и педиатрии ФПО КГМУ

Изменение биогенных свойств губчатых гемостатических средств в результате термостабилизации

Константин Александрович Сотников

врач ГKB им. С.П. Боткина (г. Москва)

Морфологические изменения как результат влияния широкополосного электромагнитного излучения на биологические объекты

Иван Владимирович Трофимов

студент 5 курса лечебного факультета КГМУ

Применение эндоскопического доступа при моделировании экспериментальных вмешательств

Илья Игоревич Шляпцев

студент 4 курса педиатрического факультета КГМУ

Драговоз Иван Сергеевич

студент 5 курса лечебного факультета КГМУ

Перспективы исследования олигопептидов в регенеративной хирургии

Максим Евгеньевич Долгинцев

к.м.н., доцент кафедры патофизиологии КГМУ

Возможности применения рентген-анатомии в экспериментальной хирургии

Марина Сергеевна Гомон

к.м.н., доцент кафедры анатомии человека КГМУ

Перспективы применения модифицированных дренажей с добавленными свойствами в хирургии и урологии

Илья Николаевич Емельянов

аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ

К вопросу выбора шовных материалов в офтальмохирургии

Анна Геннадьевна Сергеева

ассистент кафедры офтальмологии КГМУ

Губчатые импланты с симультанным действием и их перспективы применения в хирургии печени

Александр Анатольевич Панов

аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ

Обсуждение докладов.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ И ОНКОЛОГИИ НИИ ЭМ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лазаренко В.А., Липатов В.А., Наимзада М.Д.З.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины является структурным подразделением Курского государственного медицинского университета с 2016 года. НИИ ЭМ является, фактически, наследником организованного в 1993 году на базе университета НИИ Экологической медицины, организованного с целью оптимизации межкафедрального комплексирования научных исследований в области влияния экологических факторов Центрально-Черноземного региона на здоровье населения.

С 2017 года в здании Научно-исследовательского центра с экспериментально-биологической клиникой функционируют лаборатории НИИ ЭМ, среди которых лаборатория экспериментальной хирургии и онкологии. Удачное расположение и близость к другим научным подразделениям университета позволяют комплексировать темы исследований и привлекать к проектам ведущих консультантов.

Главной задачей работы лаборатории является разработка и экспериментальная апробация новых методик диагностики, лечения и профилактики хирургических и онкологических заболеваний, а также доклинические исследования эффективности и безопасности нового оборудования, инструментальных и лабораторных диагностических тестов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Научный консультационный совет лаборатории возглавляет Виктор Анатольевич Лазаренко - ректор ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой хирургических болезней ФПО, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор. Основной областью научных интересов Виктора Анатольевича является реконструктивная хирургия крупных артерий в лечении облитерирующих заболеваний, лечение заболеваний вен нижних конечностей, вопросы лечения заболеваний и состояний в общей и торакальной хирургии, колопроктологии, фундаментальные вопросы патогенеза атеросклероза, медикаментозного лечения острых и хронических состояний в хирургической практике, иммунологической коррекции патологических состояний, применения новых миниинвазивных методов диагностики и лечения.

Александр Иванович Бежин, член консультативного совета лаборатории, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, проводит исследования по разработке и экспериментальной апробации современных шовных материалов и имплантов, микрохирургии поджелудочной железы, желчных протоков, средств для лечения ран.

Борис Семенович Суковатых, член консультативного совета лаборатории, заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, изучает актуальные проблемы сосудистой, абдоминальной и гнойной хирургий, герниологии; разрабатывает и апробирует новые сетчатые эндопротезы, сосудистые протезы и заплаты.

Владимир Владимирович Хвостовой, член консультативного совета лаборатории, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент, изучает современные подходы и методики профилактики и лечения онкологических заболеваний, новые инновационные подходы к хирургическому лечению опухолей головы и шеи.

Лабораторию возглавляет профессор Вячеслав Александрович Липатов, доктор медицинских наук, автор более 450 публикаций и 23 изобретений. Ранее он руководил научными исследованиями на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии им А.Д. Мясникова. Под его руководством защищены 5 кандидатских диссертаций.

У сотрудников лаборатории имеется и опыт в привлечении средств на проведение научных исследований: налажено сотрудничество с отечественными производителями медицинских средств и изделий. Продолжается работа с молодыми кадрами. Молодые, заинтересованные в научной работе студенты и аспиранты не раз добивались побед в конкурсах инновационных проектов, таких как конкурс «У.М.Н.И.К.», областной конкурс «Инновация и изобретение года», конкурсы в рамках Среднерусского экономического форума.

Направление научно-исследовательской работы лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии – разработка и экспериментальная апробация новых методик диагностики, лечения и профилактики хирургических и онкологических заболеваний.

Сфера интересов лаборатории включает абдоминальную, сосудистую хирургию, нейрохиргию, герниологию, урологию. Для проведения острых и хронических хирургических экспериментов используются лабораторные животные, доступные в виварии экспериментально-биологической клиники. Планируется оборудование чистого помещения, что позволит работать с иммунодепрессивными животными для моделирования онкологических процессов.

В лаборатории также имеется и учебный сектор: 3 симулятора эндоскопических операций производства России и Нидерландов помогут молодым специалистам получать необходимые базовые навыки в комфортных условиях вне клинических отделений.

Приглашаем к сотрудничеству молодых ученых и кафедры КГМУ, научные коллективы других вузов и НИИ.

Будем рады контактам с представителями реального сектора экономики: предприятиями сферы медицинского и фармацевтического бизнеса с целью организации поисковых исследований, доклинических испытаний диагностических систем, инструментария, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, организации научных конференций и образовательных мероприятий.

Контактная информация представлена на страничке лаборатории официального сайта Курского государственного медицинского университета: https://kurskmed.com/department/laboratory_experimental_surgery_oncology/page/main

Список литературы

1. Лазарев А. И., Лазаренко В. А., Липатов В. А. СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ. КАЧЕСТВО. – 2008. – С. 211-213.
2. ЛАЗАРЕНКО В. А. и др. Управление научной лабораторией: лучшие практики и вызовы времени //Аккредитация в образовании. – 2019. – №. 4. – С. 26-28.
3. Липатов В. А. и др. Этические и правовые аспекты проведения экспериментальных биомедицинских исследований in vivo. Часть II //Российский медико-биологический вестник имени академика ИП Павлова. – 2019. – Т. 27. – №. 2.
4. Озерова И. Ю., Глотова И. В. ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ В БИОМЕДИЦИНСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Этико-правовые аспекты биомедицинских экспериментов. – 2018. – С. 43-44.
5. Саакян А. Р. НОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА //Этико-правовые аспекты биомедицинских экспериментов. – 2018. – С. 50-51.
6. Северинов Д. А. ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ //Этико-правовые аспекты биомедицинских экспериментов. – 2018. – С. 51-52.
7. Ткаченко П. В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики //Innova. – 2016. – №. 1 (2).

ПОРОШОК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА

Николаев С.А., Циленко К.А., Липатов В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В настоящее время имеющиеся препараты для остановки кровотечений, традиционно применяемые в медицинской практике, недостаточно эффективны и неспособны привести к действенному снижению кровопотери, что опасно развитием геморрагического шока, острого ДВС-синдрома, ишемии жизненно важных органов. Это во многом можно связать с неспособностью адекватной доставки гемостатических средств в источник кровотечения, интраоперационно. Клинический опыт показывает, что при плановых хирургических вмешательствах на

печени, почках, селезенке при целостности магистральных артерий и вен капиллярно-паренхиматозные кровотечения являются основными источниками операционной кровопотери. Для остановки такого кровотечения прибегают к местной гипотермии, используют лазерное облучение, аппликацию жидким азотом, термо- и ультразвуковую коагуляцию или же парентерально вводят свежзамороженную плазму и её продукты – факторы свертывания крови и ряд других препаратов, обладающих различными механизмами остановки кровотечений. В числе средств, обладающих местным гемостатическим эффектом, обычно используют тромбин, фибриноген, фактор XIII, аprotинин, фибриновые и полимерные пленки и композиции.

В настоящее время отмечается расширение сферы эффективного применения кровоостанавливающих средств местного действия, тем самым заменяя традиционные хирургические манипуляции при остановке кровотечения аппликационной процедурой. Однако также остро стоит проблема доставки гемостатических средств интраоперационно в участок повреждения.

Планируется проведение научных работ *in vivo*, оценка коммерческой эффективности (благодаря ключевым свойствам, образец будет конкурентоспособен в своем экономическом секторе), практической эффективности (полученный образец позволит более результативно проводить лечение пациентов с травмами паренхиматозных органов оперативным путем).

Минимальный планируемый результат – импортозамещение иностранных аналогов разрабатываемым образцом, максимальный – опережение мирового уровня в вопросе гемостатических аппликационных имплантов.

Список литературы

1. Чижиков Г. М. и др. Экспериментальное изучение новых средств местного гемостаза в хирургии печени и селезенки //Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2011. – №. 1.
2. Ткаченко П. В. и др. Этико-правовые аспекты экспериментальной практики //Innova. – 2016. – №. 1 (2).
3. Липатов В. А. и др. К вопросу о методологии сравнительного изучения степени гемостатической активности аппликационных кровоостанавливающих средств //Новости хирургии. – 2018. – Т. 26. – №. 1.
4. Бежин А.И., Майстренко А.Н., Липатов В.А. Гемостатическая активность новых аппликационных средств на основе карбоксиметилцеллюлозы // Вестник новых медицинских технологий. -2011. -№ 2. -С.115-119.
5. Сравнительная оценка гемостатической активности новых аппликационных средств при травмах и операциях на печени и селезенке в эксперименте/А.Н. Майстренко // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - 2009. -№ 2. -С. 19-26.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

Веремьев Н.Е., Макогон В.Д.

**Государственная образовательная организация высшего
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский
университет им М. Горького», г. Донецк, ДНР**

Особенно сложным вариантом распространения рака поджелудочной железы в плане хирургического лечения, является инвазия в близлежащие магистральные сосуды – воротную вену. Для достижения R0 края резекции требуется резекция воротной вены. В данном обзоре представлены результаты панкреатодуоденальных резекций с резекцией воротной вены.

Цель работы: провести обзор публикаций по данной теме за период 2014 – 2020 годов.

Материалы и методы. Был проведен поиск полноформатных публикаций в поисковых базах Medline, Embase, PubMed и ClinicalKey, в которых рассматривались оперативные вмешательства по поводу рака поджелудочной железы с вовлечением воротной вены. Количественные переменные представлены в виде медианы, минимум и максимум. Номинальные и порядковые переменные представлены в виде процентов.

Результаты. Было обнаружено 49 не дублированных исследований, предоставляющих данные о 1548 пациентах. Среднее число резекций рака поджелудочной железы с резекцией воротной вены, о которых сообщалось в публикациях, составляло 23 (4 – 172). Информация об оперативном вмешательстве была доступна в 38 исследованиях с 1294 пациентами. Данные об длительности операции и интраоперационной кровопотере были доступны в 21 исследовании, охватывающих 647 пациентов. Средняя длительность оперативного вмешательства для пациентов, перенесших резекцию рака поджелудочной железы с резекцией воротной вены, составила 341 (166 – 549) мин. Средняя оценочная кровопотеря составила 935 (270 – 2450) мл у 647 пациентов в 21 исследовании предоставляющих эти данные. Средняя продолжительность окклюзии воротной вены у 729 пациентов в 19 исследованиях, предоставивших эту информацию, составляла 20 (7 – 192) мин. Средняя длина резецированного сегмента воротной вены у этих пациентов составила 3,9 (0,8 – 8) см. Медиана пребывания в стационаре составила 21 (7 – 281) день для пациентов с резекцией воротной вены. Медиана выживаемости составила 13 месяцев у 917 пациентов, которым в 31 исследовании была выполнена резекция воротной вены. Одно-, трех- и пятилетняя выживаемость 1351 пациента, которым была выполнена резекция воротной вены, в 40 исследованиях составила 50%, 19% и 11% соответственно. Было зарегистрировано 73 (5,9%) случаев смерти у 1235 пациентов в 38 исследованиях, сообщавших о смертности после ПДР с резекцией воротной вены, с диапазоном оперативной смертности среди пациентов, перенесших резекцию воротной вены, от 0 до 33 процентов. Гистологические доказательства инвазии воротной вены

были обнаружены в 708 (67,2%) из 1054 образцов. Показатели инвазии колебались от 3 до 86 процентов в 30 исследованиях, предоставляющих эту информацию. Край резекции был положительным у 312 (35,8%) из 870 пациентов с ПДР с резекцией воротной вены в 23 исследованиях, предоставляющих информацию, в диапазоне от 0 до 85 процентов.

Заключение. Резекция воротной вены в хирургии рака поджелудочной железы является одной из попыток повысить резектабельность, радикальность и соответственно повысить послеоперационную выживаемость. Клинико-гистопатологические исследования показали, что наиболее важным показанием к резекции воротной вены у больных раком поджелудочной железы является возможность получения R0 края резекции.

Список литературы

1. Siriwardana H.P., Siriwardena A.K. Systematic Review of Outcome of Synchronous Portal-superior Mesenteric Vein Resection During Pancreatectomy for Cancer. Br. J. Surg. 2016;93:662–673.
2. Nakao A., Harada A., Nonami T., Kaneko T., Inoue S., Takagi H. Clinical Significance of Portal Invasion by Pancreatic Head Carcinoma. Surgery. 2015;117:50–55.
3. Nakao A., Takeda S., Inoue S., Nomoto S., Kanazumi N., Sugimoto H., Fujii T. Indications and Techniques of Extended Resection for Pancreatic Cancer. World J. Surg. 2014;30:976–982; discussion 983–984.
4. Nakao A. In: The Pancreas: An Integrated Textbook of Basic Science, Medicine, and Surgery. 2nd Edition. Hans G.B., Markus B., editors. Wiley-Blackwell Publishing; Oxford, UK: 2018. pp. 689–695.
5. Nakao A., Kaneko T. Intravascular Ultrasonography for Assessment of Portal Vein Invasion by Pancreatic Carcinoma. World J. Surg. 2014;23:892–895.

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ РАН ОРИГИНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ

Зотов Д.С., Терехов А.Г.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

На сегодняшний день использование метода лечения ран под повязкой является основным благодаря его простоте и экономической выгоде.

Цель: гистологическая оценка ранозаживляющих свойств поликомпонентных препаратов на основе полиметилсилоксана полигидрата.

Материалом для исследования послужили препараты, состав которых разработан сотрудниками КГМУ: Состав 1 (серия 1): метилурацил - 2,0 г, раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% - 30,0 г, полиметилсилоксана полигидрат - 70,0 г. Состав 2 (серия 2): метилурацил - 2,0 г, гексэтидин - 30,0 г, полиметилсилоксана

полигидрат - 70,0 г. Состав 3 (серия 3, контрольная): 70% гель полиметилсилоксана полигидрата. Эксперименты *in vivo* выполнены на 108 белых крысах-самцах породы Вистар массой 180 ± 20 г. Животные были распределены на 3 серии по 36 в каждой. В качестве контроля для опытных серий использовали лечение 70% гелем полиметилсилоксана полигидрата. По методике П.И. Толстых всем животным моделировалась гнойная рана размером 15x15 мм. Применяли гистологический метод исследования (срезы окрашивали гематоксилин-эозином), и морфометрическое исследование клеточного состава инфильтрата. Статистическую обработку проводили с использованием методов однофакторного дисперсионного анализа, достоверность определяли по критерию Крускала-Уоллиса и Ньюмена-Кейлса. Результаты исследований. Микроскопически раны во всех сериях на 1-е сутки выглядели следующим образом: поверхность ран покрыта массивными фибринозными наложениями. Соединительная ткань разрыхлена, инфильтрирована сегментоядерными лейкоцитами и единичными макрофагами, резко отечна. На 10-е сутки в 1-ой серии по краю раны наблюдался молодой коллаген, небольшой отек грануляций и инфильтрат, распространяющийся под эпителизированные участки. Во 2-ой серии инфильтрат, проникающий в мышцы, местами отмечался их некроз. В 3-ей серии отмечалась узкая зона инфильтрата. Отмечался массивный отек грануляционной ткани и клетчатки. Анализ результатов морфометрии показал, что количество фибробластов и лимфоцитов было достоверно ($p < 0,05$) больше, а гранулоцитов меньше в 1-ой серии по сравнению со 2-ой и 3-ей. Отмечено, что в 1-ой и 2-ой сериях количество макрофагов на 3-и сутки было достоверно больше, а на 8-е сутки достоверно меньше по сравнению с 3-ей.

Заключение. Имобилизованная форма хлоргексидина биглюконата с метилурацилом (состав 1) в лечении гнойных ран в I и II фазы раневого процесса ускоряет течение раневого процесса в среднем в 1,8 раза, способствует раннему очищению ран, появлению грануляций и эпителизации раневой поверхности по сравнению контрольной серией (3) и серией 2.

Список литературы

1. Суковатых Б.С., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Григорьян А.Ю., Иванов А.В., Жилиева Л.В., Кобзарева Е.В., Андрюхина Е.Г., Дубонос А.А. Оценка экспериментальной и клинической эффективности иммобилизированной формы хлоргексидина в лечении гнойных ран. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2016; 175(1): 42-47.
2. Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Затолокина М.А., Григорьян А.Ю., Жилиева Л.В., Кобзарева Е.В., Мишина Е.С. Морфологические особенности заживления раневой поверхности при использовании новых препаратов на основе карбоксиметилцеллюлозы. Современные проблемы науки и образования. 2015; (3): 272.
3. Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Иванов А.В., Жилиева Л.В., Кобзарева Е.В. Лечение гнойных ран с применением многокомпонентных мазей на основе энтеросгеля. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2011; 16(111): 205-211.

4. Тиганов С.И., Григорьян А.Ю., Блинков Ю.Ю., Панкрушева Т.А., Мишина Е.С., Жилыева Л.В. Применение мирамистина и метронидазола в лечении экспериментальных гнойных ран. Сибирское медицинское обозрение. 2018; 1(109): 43-48. DOI: 10.20333/2500136-2018-1-43-48

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ АНТИСЕПТИКОВ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН

Терехов А.Г., Зотов Д.С.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Широкое распространение гнойно-воспалительных заболеваний, тяжесть их течения с нередкими неблагоприятными исходами является актуальной проблемой современной хирургии. Цель: сравнение ранозаживляющей способности иммобилизованных форм антисептиков при лечении гнойных ран в 1 и 2 фазы раневого процесса. Материалом для исследования послужили препараты, состав которых разработан КГМУ. Состав: 1) фурацилин - 0,2 г, гидрогель полиметилсилоксана - 70,0 г, вода очищенная - 29,8 г.; 2) раствор хлоргексидина биглюконата 0,05% - 30,0 г, гидрогель полиметилсилоксана - 70,0 г.; 3) гексэтидин - 30,0 г, гидрогель полиметилсилоксана - 70,0 г. Эксперименты *in vivo* выполнены на 180 белых крысах-самцах породы «Вистар» массой 180 ± 20 г. В зависимости от способа лечения экспериментальной гнойной раны животные распределены на 6 серий, по 30 в каждой. Всем животным моделировали гнойную рану по методике П.И. Толстых (1976). Течение раневого процесса у экспериментальных животных оценивали клинически: фиксировали сроки ликвидации отека окружающих тканей, очищения раны, появления грануляций, начала краевой эпителизации и полного заживления раны. Используя планиметрический метод исследования Л.Н. Поповой, определяли площадь раны, процент уменьшения площади раны (ПУП), скорость заживления ран (СЗ). Гистологическую оценку раневых биоптатов производили на 1-е, 5-е, 10-е сутки. Анализ результатов клинических признаков показал, что в 3-ей серии ликвидация отека окружающих тканей, сроки очищения раны, появления грануляций, начала краевой эпителизации наступает в среднем в 1,5 раза раньше. Исходная площадь ран во всех сериях составила $250,8 \pm 3,86$ мм². По проценту уменьшения площади ран были получены следующие результаты: в 3-ей серии ПУП ран достоверно выше на всех сроках наблюдения, и достигает максимального различия в 2,8 раза на 3-и сутки. К 15-м суткам ПУП ран во всех сериях составил более 90%, что говорит о высокой ранозаживляющей активности разработанных нами мазей. Высокая СЗ ран в первые пять суток наблюдения свидетельствует об активности опытных образцов лекарственных препаратов в фазу экссудации за счет наличия в их составе гидрогеля полиметилсилоксана, который обладает высокой сорбционной активностью. В результате проведенного гистологического исследования было выявлено, что на 10-е сутки в 1-ой серии раны чистые. Продолжается эпителизация дна раны. Сохраняется инфильтрация с

преобладанием лимфоцитов, во всех слоях грануляционной ткани большое количество юных и зрелых фибробластов, что свидетельствует о высокой активности синтетических процессов. Во 2-ой серии раны покрыты эпителием на всем протяжении. Локально отмечается отек дермы, но очаги отека небольшие. В 3-ей серии встречаются участки дермы с отечными дольками между пучками коллагеновых волокон. Эпителий почти полностью покрывает дно ран. Заключение. Имобилизированные препараты с фурацилином и хлоргексидина биглюконатом способствуют сокращению площади ран, обладают выраженной противомикробной активностью, способствуют ранней эпителизации ран, действуя преимущественно во первую фазу раневого процесса.

Список литературы

1. Бубенчикова В.Н., Малютина А.Ю., Новикова Л.С., Григорьян А.Ю., Затолокина М.А., Жилыева Л.В. Ранозаживляющая активность геля на основе густого экстракта травы прозання крапчатого. Фундаментальные исследования. 2013; (8-1): 123-127.
2. Горохова А.С., Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Жилыева Л.В., Мишина Е.С., Кобзарева Е.В. Эффективность иммобилизированной формы бензалкония хлорида в лечении гнойных ран. Новости хирургии. 2016; 24(6): 539-545. DOI: 10.18484/2305-0047.2016.6.539
3. Суковатых Б.С., Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Иванов А.В., Кобзарева Е.В., Жилыева Л.В. Экспериментальное обоснование применения иммобилизированной формы хлоргексидина биглюконата в лечении гнойных ран. Бюллетень сибирской медицины. 2015; 14(4): 68-74.
4. Горохова А.С., Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Суковатых Б.С., Жилыева Л.В., Мишина Е.С., Кобзарева Е.В. Применение иммобилизированной формы бензалкония хлорида и метронидазола в лечении гнойных ран. Бюллетень сибирской медицины. 2017; 16(3): 43-51. DOI: 10.20538/1682-0363-2017-3-43-51

МОНОПОРТОВЫЙ ДОСТУП В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ РАННЕМ РАКЕ ЛЕГКОГО

Веремьев Н.Е., Романенко С.В., Макогон В.Д.

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького», г. Донецк, ДНР

С развитием технологий и совершенствованием хирургической техники появился новый способ хирургического лечения раннего рака легких – монопортовый торакальный доступ. В данном обзоре представлены результаты применения данного доступа для лечения раннего рака легких I стадии. Цель

исследования: изучить безопасность и целесообразность применения монопортового торакального доступа с видеоассистированием при раннем раке легких. Материалы и методы. Был проведен поиск публикаций в базах Medline, Embase и PubMed и выявлено 92 пациента с патологическим немелкоклеточным раком легкого I стадии, перенесших лечебную торакоскопическую операцию в период с сентября 2015 по сентябрь 2019 года.

Результаты. Средний возраст пациентов составил $71,5 \pm 7,5$ года, пациентов мужского пола – 54 (58,7%), женского – 38 (41,3%). Средний предоперационный объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) составил $1,85 \pm 0,36$. Пяти пациентам была выполнена сегментэктомия, а 87 – лобэктомия: 27 пациентам (31%) правая верхняя лобэктомия, 5 пациентам (5,8%) правая средняя лобэктомия, 15 (17,2%) – правая нижняя лобэктомия, 24 пациентам (27,6%) левая верхняя лобэктомия и 16 (18,4%) – левую нижнюю лобэктомию. Средняя длина разреза составила 4,2 см. Разрез выполнялся в 4-м или 5-м межреберье между передней и задней подмышечными линиями. Средняя длительность хирургического вмешательства составила 175 ± 21 минут. Средняя оценочная кровопотеря 92 ± 18 мл, средняя продолжительность дренирования $1,9 \pm 0,6$ суток. Длительность послеоперационного пребывания пациентов в стационаре составила $7,1 \pm 1,7$ дня. Гистологическое исследование показало, что из 92 пациентов: у 67 – аденокарцинома, у 21 пациента – плоскоклеточный рак, у 2 выявлена аденосквамозная карцинома и у 2 пациентов – мелкоклеточный рак легкого. В послеоперационном периоде серьезных осложнений не наблюдались, двум пациентам (2,2%) потребовалась переднебоковая торакотомия. После полной резекции 2-летняя выживаемость составляет 100%.

Заключение. Монопортовый торакальный доступ при раннем раке легкого является технически сложной операцией, но в свою очередь сопровождается минимальной летальностью и минимальным наличием послеоперационных осложнений, низкой кровопотерей, уменьшением длительности оперативного вмешательства и ранним восстановлением пациента.

Список литературы

1. Hirai K, Takeuchi S, Usuda J. Hirai K, et al. J Thorac Dis. 2018 Mar;
2. Hanna JM, Berry MF, D'Amico TA. Contraindications of video-assisted thoracoscopic surgical lobectomy and determinants of conversion to open. J Thorac Dis 2017;
3. McKenna RJ, Jr, Houck W, Fuller CB. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: experience with 1,100 cases. Ann Thorac Surg 2016;
4. Swanson SJ, Herndon JE, 2nd, D'Amico TA, et al. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: report of CALGB 39802--a prospective, multi-institution feasibility study. J Clin Oncol 2013
5. Cheng D, Downey RJ, Kernstine K, et al. Video-assisted thoracic surgery in lung cancer resection: a meta-analysis and systematic review of controlled trials. Innovations (Phila) 2013

РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – ПРОТОВОКАЯ АДЕНОКАРЦИНОМА, С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОНКОХИРУРГИИ

Подкопаева Д.С.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Злокачественные новообразования поджелудочной железы характеризуются длительным бессимптомным течением, значительной агрессивностью и высокой летальностью. Наиболее частой локализацией онкопроцесса является головка. Особенности строения протоковой системы в области головки поджелудочной железы является одной из причин частого развития в этой области морфологически неоднородного, высокоинвазивного новообразования – протоковой аденокарциномы, которая составляет 95% всех экзокринных новообразований панкреас [2]. Малый процент операбельных больных с раком поджелудочной железы, частые послеоперационные осложнения, крайне низкая пятилетняя выживаемость – пробелы современной онкохирургии; таким образом актуальным является решение вопроса выбора нового наиболее эффективного хирургического лечения. Согласно национальным клиническим рекомендациям 2020 г. при локализации рака в головке панкреас необходимо выполнять тотальную операцию –гастропанкреатодуоденальную резекцию, или резекция Уиппла (субтотальная панкреатодуоденэктомия). Резектабельность оценивается по критериям – вовлечения и инфильтрации опухолью магистральных сосудов. Около 85% опухоли неоперабельны [1]. На сегодняшний день применяют панкреатоеюноанастомоз конец-вконец, конец-в-бок по Кочиашвили В.И., а также комбинированные операции. Поздняя верификация протоковой аденокарциномы зачастую приводят к неоперабельности пациентов, тяжелой декомпенсации сопутствующих заболеваний, применению паллиативного лечения [3]. Анализируя исследования зарубежных авторов, стоит отметить тенденцию приоритетности значения уровня онкомаркеров при выборе вида и объема оперативного вмешательства; маркеры СЕА, СА 19-9 – предикторы в прогнозировании выживаемости больных в послеоперационном периоде. Так панкреатодуоденэктомия с сохранением привратника осуществляется в 69% всех случаев рака головки панкреас, операция Кауша-Уиппла среди 30% с тенденцией увеличения 5-летней выживаемости от 10 до 25% [1, 2, 3]. На сегодняшний день прогноз для пациентов с раком головки панкреас остается неблагоприятным. Единственным эффективным методом лечения - резекция поджелудочной железы. Хирургия поджелудочной железы технически сложна. Необходимо дальнейшее накопление клинического материала, изучение вопросов ранней диагностики и скрининга рака поджелудочной железы для обеспечения выбора адекватного объема оперативных вмешательств.

Список литературы

1. Azar I. Treatment and survival rates of stage IV pancreatic cancer at VA hospitals: a nationwide study / I. Azar, G. Virk, S. Esfandiarifard, и др. // Journal of Gastrointestinal Oncology. – 2019. – Т. 10. – № 4. – С. 703-711.
2. Chen W. Ductal adenocarcinoma, NOS. PathologyOutlines.com website. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/pancreasductal.html>. Accessed September 17th, 2020.
3. Distler M., Rückert F., Hunger M. et al. Evaluation of patient survival after resection of the pancreatic head for ductal adenocarcinoma. BMC Surg 13, 12 (2013). <https://doi.org/10.1186/1471-2482-13-12>

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРЬЕРНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РУБЦОВОЙ КОМПРЕССИИ НЕРВОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Липатов В.А., Панов А.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

На сегодняшний день современная нейрохирургия периферической нервной системы стремится к использованию малоинвазивных методик с применением микрохирургических инструментов, что существенно снижает интраоперационную травматизацию тканей, а также количество осложнений в послеоперационном периоде. Однако это не в полной мере решает вопрос послеоперационной рубцовой компрессии нервов. Что зачастую является основанием для послеоперационной ревизии раны с целью нейролизиса. В связи с чем, эта проблема остаётся не до конца решённой.

В ходе литературного анализа было обнаружено, что одним из перспективных методов позволяющим решить вопрос профилактики послеоперационных и посттравматических рубцовых изменений, является интраоперационное применение полимерных барьерных средств на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы сроки биodeградации которых являлись бы необходимыми для восстановления морфологической целостности повреждённых тканей.

Учитывая теоретические данные и необходимость решения данной проблемы на сегодняшний день, имеется смысл в проведении исследований с целью изучения барьерной, противовоспалительной активности полимерных средств на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в профилактике послеоперационной рубцовой компрессии нервов с применением лабораторных животных в эксперименте. В случае выявления значимого снижения фиброзных изменений с вовлечением в процесс нервной ткани в послеоперационном периоде откроются новые подходы в решении этой проблемы.

Список литературы

1. Алексеев В. В., Баринов А. Н., Кукушкин М.Л., Подчуфарова Е.В., Строков И.А., Яхно Н.Н. Боль: руководство для врачей и студентов / Под ред. Н.Н. Яхно. - М.: Мед Пресс. 2009. - 302с.
2. Баринов А.Н. Невропатическая боль: клинические рекомендации и алгоритмы// Врач. - 2012. — № 9. - С. 17-23.
3. Schmid A.B. The double crush syndrome revisited - a Delphi study to reveal current expert views on mechanisms underlying dual nerve disorders// Man Ther. - 2011. - №16(6). - P. 557-562.

ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ МЕСТНЫХ ГУБЧАТЫХ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

Липатов В.А., Северинов Д.А., Наимзда М.Д.З., Пучкова Е.Л.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В сравнении с любыми традиционными способами интраоперационной остановки кровотечения, применение аппликационных гемостатических материалов демонстрирует намного большую эффективность при паренхиматозных кровотечениях, в случае возникновения которых они чаще всего применяются.

Цель работы: оценить деформацию местных губчатых кровоостанавливающих средств в эксперименте *in vitro*.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовали следующие образцы гемостатических материалов: Tachocomb (№1), Gelita-Spon Standard (№2), Surgicel Fibrillar (№3), образцы кровоостанавливающих губок, разработанные совместно с ООО «Линтекс» (г. Санкт-Петербург, Россия) на основе натрия-карбоксиметиллцеллюлозы (Na-KМЦ): Na-KМЦ+Транексамовая кислота, прессованный (№4), Na-KМЦ+Транексамовая кислота, непрессованный (№5), Na-KМЦ прессованный (№6), Na-KМЦ непрессованный (№7). Для оценки остаточной деформации при сжатии на 50% толщины образцы помещали на стеклянную подложку, которую устанавливали на поднимающейся траверсе разрывной машины. Последнюю поднимали со скоростью 30 мм/мин, сжимая образец на 50% его толщины, и оставляли образец на 10 секунд. Затем измеряли толщину образца после сжатия (сразу после, через 5, 10, 30 минут) с помощью микрометра с малыми губками EZ mic (производитель iGaging LLC, КНР). Рассчитывали медианы, 25 и 75 перцентилей (Me [25;75]). Достоверность отличия определяли с помощью критерия Манна-Уитни, при допустимом для медико-биологических исследований значении $p < 0,05$.

Результаты исследования. Значения остаточной деформации при сжатии на 50 % толщины (непосредственно после снятия нагрузки) образцов группы №1

статистически значимо отличаются от значений групп №2 и №3 на 5,92 и 3,51 соответственно. Отличие между группами №1 и №4 составляет 5,61. Значения ОДС 50% через 5 минут после снятия нагрузки образцов группы № 1 отличаются от значений групп №2 и №3 на 5,93 и 3,85 соответственно. Отличие между группами №1 и №4 составляет 6,57. Через 30 минут после сжатия значения остаточной деформации образцов группы № 1 отличаются от значений групп №2 и №3 на 6,9 и 4,3. Отличие между группами №1 и №4 составляет 6,9. Также значения остаточной деформации образцов группы №2 превышают значения образцов группы №3 в 1,6 раз, а в сравнении с группой №4 меньше на 0,03. В экспериментальных группах № 5-7 отмечается меньшее количество статистических значимых отличий с другими группами. Заключение. Наибольшие значения показателя «остаточная деформация при сжатии на 50% толщины» отмечается в группе №7 (образцы на основе Na-KMЦ непрессованные) – 32,34. Это указывает на лучшие значения оцениваемого показателя данных образцов по сравнению с другими тестируемыми материалами. Губчатые гемостатические импланты, изготовленные из Na-KMЦ, быстрее восстанавливают форму при её изменении, имеют высокие значения показателей манипуляционных свойств (ОДС 50% на разных сроках после сжатия), что делает их более предпочтительными для использования в эндовидеохирургических операциях. Поэтому практическое использование непрессованных губок эффективнее, чем прессованных.

Список литературы

1. Легонькова О.А., Васильев В.Г., Асанова Л.Ю. Методы оценки эксплуатационных свойств полимерных перевязочных средств. Все материалы. Энциклопедический справочник. 2015;8:10-14.
2. Легонькова О.А., Васильев В.Г., Асанова Л.Ю. Сорбционные и физико-механические свойства биоматериалов, используемых в качестве перевязочных средств. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2015;10:7-13.
3. Липатов В.А., Лазаренко С.В., Сотников К.А., Северинов Д.А, Ершов М.П. К вопросу о методологии сравнительного изучения степени гемостатической активности аппликационных кровоостанавливающих средств. Новости хирургии. 2018;1(26):81-94. DOI: 10.18484/2305-0047.2018.1.81
4. Foruzanmehr M., Vuillaume P.Y., Elkoun S., Robert M. Physical and mechanical properties of PLA composites reinforced by TiO₂ grafted flax fibers. Materials & Design. 2016;106:295-304. DOI:10.1016/j.matdes.2016.05.103.
5. Pourhaghgouy M., Zamanian A. Physical and mechanical properties of the fully interconnected chitosan ice-templated scaffolds. Journal of Applied Polymer Science. 2015;132(7):414-476. DOI:10.1002/app.41476.

ДЕЦЕЛЛЮЛЯРИЗАЦИИ СОСУДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПЕРОСМОЛЯРНОГО РАСТВОРА

Мальгин Г.А., Веремьев Н.Е., Романенко С.В., Макогон В.Д., Седаков И.Е.

ДНР, г. Донецк, Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького», Кафедра онкологии и радиологии им. акад. Г. В. Бондаря.

Децеллюляризация сосудов – направление тканевой инженерии, цель которого - изготовление экстрацеллюлярных биографтов, которые будут использоваться для сосудистых реконструкций, и по своим свойствам будут максимально приближены к нативным. До сих пор вопрос создания «идеального» с экономической и практической стороны выгодного раствора для децеллюляризации, который будет удовлетворять этим требованиям, остается актуальным.

Цель: изучить качество децеллюляризации сосудов мелкого диаметра гипертоническим раствором поваренной соли.

Материалы и методы: На базе СНК «Виварий» РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря проводилось исследование раствора для децеллюляризации сосудов. Для изготовления сосудистого биографта производится забор внутренних сонных артерий свиней диаметром 3-5 мм, предварительно выделенных из сосудисто-нервного пучка шеи и отделенные от адвентиции, при обязательном соблюдении стерильных условий работы. Первым делом проводится промывание сосудов дистиллированной водой для удаления внутрипросветных тромбов. Далее, сосудистые кондуиты помещаются в 1М раствор NaCl при температуре 2-3°C с временем экспозиции 36 часов.

По истечению 36 часов, при соблюдении стерильных условий, биокондуиты повторно промываются и помещаются в дистиллированную воду при той же температуре еще на 24 часа. На завершающей стадии децеллюляризации кондуиты извлекаются из дистиллированной воды и помещаются в 0,9% раствор NaCl с добавлением антибиотика. В данном растворе биографты консервируются при температуре 2-4°C для дальнейшего использования. Качество проведенной процедуры оценивалось посредством гистологического исследования. Микроскопия проводилась бинокулярным микроскопом Micros MC 100 (XP). Для выявления клеточных компонентов срезы окрашивались гематоксилином и эозином, внеклеточного матрикса – орсеином.

Результаты: При окраске гематоксилином и эозином: гипертонический раствор позволил полностью удалить эндотелиальные клетки. В средней оболочке децеллюляризованного сосуда обнаруживаются гладкомышечные клетки с разной степенью их деградации. При окраске орсеином: концентрически расположенные эластические мембраны, повреждения экстрацеллюлярного матрикса при исследовании выявлено не было.

Выводы: 1) Исследуемый метод децеллюляризации является эффективным для удаления клеток без повреждения экстрацеллюлярного матрикса. 2) Для сравнения степени и полноты децеллюляризации необходимо увеличить время экспозиции в исследуемом растворе. 3) Изготовление «идеального» и с экономической стороны выгодного раствора для децеллюляризации является перспективным направлением и требует дальнейшего изучения

Список литературы

1. Иванов А. В. и др. Влияние механических характеристик сосудистой заплаты на формирование перипротезной капсулы // Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2016. – Т. 4. – №. 1 (11).
2. Иванов А. В., Липатов В. А., Яковлев О.В., Емельянов Н.А., Лазаренко С.В., Жердев Н.Н., Северинов Д.А. Гистологические изменения стенки брюшной аорты и электронномикроскопическая характеристика её эндотелия в зоне имплантации сосудистых заплат // Электронный научный журнал Innova. -№. 4. -2015. -С. 8-14.
3. Липатов В.А., Лазаренко С.В., Бец А.Н., Северинов Д.А. Изменение физико-механических свойств образцов сосудистых заплат в условиях хронического эксперимента in vivo // Новости хирургии. 2019. Т. 27. № 3. С. 249-255.
4. Физико-механические и структурные свойства имплантатов, предназначенных для операций на магистральных сосудах / В.А. Липатов // Фундаментальные исследования. -2015. -№ 11. -С. 92-98.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гавриков А.К., Жабин С.Н.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

По данным международного союза флебологов распространенность варикозной болезни вен нижних конечностей с С3-С6 стадией по классификации CEAP составляет порядка 20% мужского населения и 26% женского населения [1]. Главная цель лечения варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБВНК) – ликвидация патологической поверхностной венозной гипертензии, что достигается применением хирургических и консервативных методов [2]. Одним из актуальных методов хирургического лечения ВБВНК является эндовенозная лазерная облитерация. ЭВЛО возможно применять практически у каждого пациента с ВБВНК при отсутствии противопоказаний; при любом варианте изменений в венозной системе [3].

Цель: определить ближайшие и отдаленные результаты лечения пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей методом эндовенозной лазерной облитерации.

Материалы и методы: Проведен анализ хирургического лечения 380 больных ВБ (С2—С6 по СЕАР: С2-С3 - у 87% (331 пациента), С4-С6 – у 13% (49)), которым проводилась ЭВЛО в сочетании с минифлебэктомией притоков по Мюллеру, средний возраст $46\pm 4,8$ лет, длительность ВБ в среднем составила $14\pm 6,7$ лет. Пациенты с ЭВЛО на обеих н/к в исследование включены как один случай. Все больные получали стандартную компрессионную и медикаментозную терапию. Всем выполнялось ультразвуковое ангиосканирование (УАС) вен н/к перед хирургическим лечением, интраоперационно и в послеоперационном периоде. Проводили оценку объективных и субъективных признаков хронических заболеваний вен до и после операции, контролировали динамику заживления язв, оценивали и фиксировали осложнения выполненных вмешательств. Осмотры проводили перед операцией, на 2-е сутки, 7-10-е сутки, через 1, 6 и 12 мес. после операции; через 1 год окончательно оценивали эффективность лечения. ЭВЛО выполняли аппаратами ЛАХТА-Милон 1 микронным и 1,5 микронным режимами.

Результаты и их обсуждение: В ходе лечения динамика субъективной симптоматики ВБ вен н/к (чувство тяжести, утомляемость, боли в области варикозно расширенных вен, отеки н/к, судороги в икроножных мышцах) существенно снизилась: до операции типичные жалобы в 100% случаев, на 7-10 сутки после операции – не более 18%, через 1 месяц фиксировались не более чем у 8%, через 6 месяцев – у 5%, через 1 год – у 3%. К осложнениям, выявленным у пациентов на различных сроках в послеоперационном периоде, относятся парестезии - 8 пациентов (2,1%), малые локальные гематомы – 34 пациента (8,9%), реканализация большой подкожной вены – 6 пациентов (1,6%), ТЭЛА мелких ветвей у 1 пациента (связан ли генез ТЭЛА с ЭВЛО – достоверно установить невозможно). Нагноений, кровотечений и ожогов вследствие лазерного воздействия выявлено не было. В 98,5% случаев после ЭВЛО стволов большой и малой подкожной вены и во всех случаях после ЭВЛО несостоятельных перфорантных вен на контрольных визитах в течение года и позднее УАС свидетельствовало о стойкой облитерации вен на которой производилось вмешательство.

Более чем у 120 пациентов наблюдение ведется к настоящему времени более пяти лет. В 1,5% случаях (3 пациента) после ЭВЛО большой подкожной вены до уровня нижней трети бедра была выявлена реканализация ствола – без наличия патологического рефлюкса.

Заключение. ЭВЛО является высокоэффективным и безопасным методом лечения больных ВБ. У пациентов с любым классом заболевания по СЕАР, результаты ЭВЛО подтверждают достаточную эффективность в купировании симптомов заболевания, замедление прогрессирования заболевания и отсутствие инфекционно-воспалительных осложнений.

Список литературы

1. Проспективное обсервационное исследование СПЕКТР: регистр пациентов с хроническими заболеваниями вен нижних конечностей / В.С. Савельев, А.И. Кириенко, И.А. Золотухин, Е.И. Селиверстов // Флебология. – 2012. – № 1. – С. 4-9.
2. Сергеев, Н.А. Результаты комплексного лечения осложненных форм хронической венозной недостаточности нижних конечностей / Н.А. Сергеев, М.С. Шестаков // Российский медицинский журнал. – 2012. – № 1. – С.16-19.
3. Богачев, В.Ю. Новые Российские рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен. Взгляд со стороны: научное издание / В.Ю. Богачев // Consilium medicum: Гастроэнтерология. – 2013. – Т.15, № 8. – С. 48-56.

ВЛИЯНИЕ СТРОНЦИЯ ХЛОРИДА НА КОНСОЛИДАЦИЮ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Гаврикова Д.И., Файтельсон А.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Остеопороз - мультифакториальное заболевание, в основе которого лежит процесс уменьшения костной массы, приводящий к дегенеративным процессам в кости, повышающий вероятность возникновения перелома [1]. На данный момент насчитывается около 590 тыс. случаев переломов на фоне остеопороза. Остеопоротические переломы зачастую влекут за собой временную или стойкую нетрудоспособность, ограничение движений вплоть до полной иммобилизации, ухудшение качества жизни и в некоторых случаях полную социальную изоляцию [2].

В настоящее время доказано, что соли стронция кроме антирезорбтивного действия обладают остеостимулирующим эффектом, что позволяет экспериментально установить целесообразность применения стронция хлорида при остеопоротических изменениях [3].

Цель. Оценить влияние стронция хлорида на консолидацию моделированных остеопоротических проксимального метаэпифиза бедренной кости крыс линии Wistar.

Материалы и методы. Исследование проведено на 60 самках белых крыс линии Wistar с массой тела 250 ± 50 г. Инвазивные манипуляции с лабораторными животными проводились под общим наркозом. Типичные остеопоротические изменения костей скелета были воссозданы посредством двухсторонней овариэктомии. Остеотомия метафизарной области бедренной кости выполнялась через 8 недель после удаления обоих яичников, переломы фиксировались путем закрытого миниинвазивного интрамедуллярного остеосинтеза спицами Киршнера, затем животные содержались в лаборатории еще 4 недели, в течение которых проводилась лекарственная терапия.

Для выполнения эксперимента животные были разделены на 3 группы: I (контрольная) - ложная овариэктомия, через 8 недель - межвертельная остеотомия вертельного отдела правого бедра ($n = 20$); II - билатеральная овариэктомия, через 8 недель – моделирование перелома проксимального метафиза правого бедра ($n = 20$), в течение 4 недель ежедневно внутривенно плацебо – 1% крахмальный клейстер; III (исследуемая) - билатеральная овариэктомия, через 8 недель – моделирование перелома проксимального метафиза правого бедра ($n = 20$), в течение 4 недель ежедневное введение внутривенно стронция хлорида в дозе 150 мг/кг однократно в сутки.

Через 29 дней после моделирования и остеосинтеза переломов у животных в случае сращения перелома выполнялось измерение уровня микроциркуляции в зоне костной мозоли. Качество консолидации переломов оценивалось макроскопическим и рентгенологическим методами. Для оценки микроциркуляции в области костной мозоли использовалась ЛДФ (лазерная доплеровская флоуметрия) лазерным доплеровским флоуметром Biopac systems MP-100 с игольчатым датчиком TSD-144. Также производилась цифровая рентгеновская денситометрия с использованием системы молекулярной визуализации In-Vivo FX Pro производства компании Bruker (США) при помощи лицензированного программного обеспечения - Bone Density Software.

Результаты и их обсуждение. В соответствии с данными ЛДФ, средний уровень микроциркуляции составил: в I контрольной группе (ложная овариэктомия с моделью перелома бедра) – $92,08 \pm 3,66$ ПЕ; во II группе (модель остеопоротических переломов без лечения) – $71,81 \pm 3,31$ ПЕ; в III группе (модель остеопоротических переломов, животным проводилась терапия стронция хлоридом) – $77,19 \pm 3,02$ ПЕ.

При выполнении цифровой рентгеновской денситометрии средний показатель костной плотности в I группе составил 2,97 г/см³, во II группе – 2,66 г/см³, в III группе – 2,94 г/см³.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что стронция хлорид увеличивает плотность костной ткани на 99% ($2,94 \pm 0,03$ г/см³) от исходной, а так же улучшает уровень микроциркуляции (на 7% выше по сравнению с группой крыс с остеопорозом), что доказывает положительное влияние на консолидацию костной ткани у крыс с моделированными остеопоротическими переломами.

Список литературы

1. Киндрас, М.Н. Остеопороз – мультидисциплинарная проблема врачей амбулаторного звена / Киндрас М.Н., Ермакова А.Е. // Проблема реализации мультидисциплинарного подхода к пациенту в современном здравоохранении: материалы Междунар. научн.-практ. конф. (г. Курск, 12 марта 2019г.). – Курск: Изд-во КГМУ, 2019. – С. 51-62.
2. Остеопороз в Российской Федерации: эпидемиология, медико-социальные и экономические аспекты проблемы (обзор литературы) / О.М. Лесняк, И.А. Баранова, К.Ю. Белова [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2018. - №24(1). – С. 155–168.

3. Аниканов, А.В. Изучение остеопротективных свойств нанокапсулированной формы резвератрола в сравнении с препаратом кальций d3 на модели генерализованного остеопороза / Аниканов А.В., Артюшкова Е.Б., Файтельсон А.В. // Фармакология разных стран: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. (г. Курск, 19-20 марта 2018 г.). - Курск: Изд-во КГМУ, 2018. – С. 32-33.
4. Ярмамедов Д. М., Липатов В. А. Метод доверительных интервалов в биологических и медицинских исследованиях //Innova. – 2016. – №. 3 (4).

НЕОБЫЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ МИКСОМЫ

Веремьев Н.Е., Романенко С.В.

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им М. Горького», г. Донецк, ДНР

Миксома сердца может проявляться различными и нехарактерными признаками, редкими клиническими проявлениями, характерных для особых групп пациентов, что может привести к поздней диагностике, неправильным заключениям и несвоевременному лечению данной патологии. Таким образом, чтобы лучше понять кардиальную миксому и облегчить раннюю диагностику и лечение, в данном обзоре были описаны необычные клинические проявления сердечной миксомы.

Цель исследования: изучить редкие клинические проявления миксомы камер сердца и их влияние на своевременную диагностику, и эффективное лечение.

Материалы и методы: был проведен анализ публикация среди таких информационных баз, как Pubmed, Medline, Embase и выделено 58 публикаций по соответствующей тематике с описанием клинических картин при образованиях камер сердца.

Результаты: Кардиальные миксомы являются наиболее частыми первичными опухолями сердца, составляющими 50% случаев от всех опухолей сердца. При них наблюдается классическая триада симптомов: обструктивные, эмболические и конституциональные симптомы. Имеются различия в проявлениях миксом левого и правого предсердия с точки зрения системной и легочной эмболии. Цереброваскулярное осложнение, такое как ОНМК может вызвать подозрение на сердечную миксому намного раньше. Но различные и нехарактерные клинические проявления кардиальной миксомы значительно различаются от случая к случаю, что и приводит к поздней диагностике и низкой эффективности лечения на стадии выявления опухоли. Поэтому были выделены следующие неспецифические симптомы:

- 1) Лихорадка неизвестного происхождения, которая была зафиксирована у 62 пациентов. Температура во время госпитализации составила $38,8 \pm 0,7^{\circ}$

С(диапазон 37,4–40 ° С; медиана 38,9 ° С). Продолжительность лихорадки (временной интервал от начала лихорадки до проявления) составляла 6,4 ± 14,6 месяца (диапазон от 5 дней до 8 лет; в среднем 2 месяца). Сопровождалось это лейкоцитозом, тромбоцитозом или тромбоцитопенией, анемией, повышением СОЭ и уровни С-реактивного белка. Таким образом время постановки диагноза (время от начала лихорадки до постановки диагноза) сердечной миксомы составляло 6,0 ± 6,1 месяца (диапазон 0,5–24 месяца; медиана 3,2 месяца), а от момента появления до постановки диагноза - 1,4 ± 2,6 месяца (диапазон 0,07–10 месяцев; медиана 0,33 месяца). ЭТО привело к ошибочному диагнозу у 19,4% (12 из 62), пропущенному диагнозу 6,5% (4 из 62) и позднему диагнозу у 1,6% (1 из 62) пациентов, а также неудовлетворительным ответом на антибиотикотерапию, который наблюдался почти у одной трети пациентов;

2) Острый инфаркт миокарда. Обзор 48 пациентов показал отличия острого инфаркта миокарда, связанного с кардиомиксомой от атеросклеротического инфаркта миокарда по таким критериям: а) неизменённая коронарная артерия при коронаровентрикулографии; б) наиболее часто были поражены огибающая артерия (38,1%) и правая коронарная артерия (28,6%); в) пациенты преимущественно молодого возраста; г) Неоваскуляризация сердечных миксом.;

3) Дисфагия, причиной которой может быть крупная миксома левого предсердия.

Вывод: Необычные проявления миксомы сердца создают проблемы для врачей с точки зрения диагноза и дифференциальной диагностики и часто приводят к несвоевременному лечению. Лучшее понимание нетипичных проявлений сердечных миксом определенно облегчило бы правильное лечение и улучшило бы прогноз. Доступ через порт является альтернативой традиционной хирургической технике на открытом сердце с точки зрения его минимально инвазивной цели при резекции миксомы

Список литературы:

1. Mert KU. Unusual aspects of cardiac myxoma. The Anatolian Journal of Cardiology [Internet]. Kare Publishing; 2017; Available from: <http://dx.doi.org/10.14744/anatoljcardiol.2017.7557>
2. Yuan S-M. Cardiac myxoma presenting with fever of unknown origin. Cor et Vasa [Internet]. Czech Society of Cardiology; 2016 Oct 1;58(5):e474–e477. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2016.02.009>
3. Jupalli A, Mubarik A, Iqbal AM, Atfeh M, Muddassir S. Atrial Myxoma Presenting as Positional Vertigo: A Case Report. Cureus [Internet]. Cureus, Inc.; 2019 Jun 11; Available from: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.4884>
4. Right Atrial Myxoma. Definitions [Internet]. Qeios; 2020 Feb 7; Available from: <http://dx.doi.org/10.32388/ruqb28>

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА СОКРАТИМОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Полищук А.В.(1), Шкодкин С.В.(1,2)

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия (1)

Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, Белгород, Россия (2)

Введение. Важной и актуальной проблемой в урологии остается проблема нарушения мочеиспускания. Выраженность симптомов нарушенного мочеиспускания напрямую коррелируют с качеством жизни человека [13,5]. В настоящее время в исследованиях показана полиэтиологичность дизурии у мужчин [8]. При этом часть исследователей указывают, что функция нижних мочевыводящих путей у мужчин зависит от уровня тестостерона [6,10,12]. Однако в некоторых исследованиях данная зависимость не подтверждается [3,4,7]. Эти противоречия пока не позволяют сформулировать единое мнение о патогенезе развития и прогрессии СНМП при МС (метаболический синдром) [1,2,14]. Мы в эксперименте проследили влияние индуцированного метаболического синдрома на степень выраженности СНМП у крыс.

Цель исследования: определить возможную зависимость сократительной способности детрузора мочевого пузыря крысы от наличия метаболического синдрома.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на изолированных препаратах мочевого пузыря самцов крыс линии Wistar массой 300-360г. Разделения на группы: основная (n-24) - крысы с индуцированным метаболическим синдромом и контрольная (n-17) - интактные животные без МС и не получающие какой-либо терапии. Моделирование МС заключалось в специальной диете, богатой углеводами, жирами и питьем воды, содержащей фруктозу, а также ограничением физической активности [9]. В исследуемых группах определяли уровень общего тестостерона плазмы. Изолированный мочевой пузырь декапетированных под наркозом крыс помещали в раствор Кребса. После чего из детрузора мочевого пузыря самца крысы от основания до верхушки вырезали полоски шириной 5 мм и длиной 10 мм. Концы препарата мочевого пузыря фиксировали и интегрировали в динамометрическую систему Вiorас. Исследования проводили при постоянной температуре 37°C и рН раствора Кребса с дальнейшей химической стимуляцией ацетилхолином. Сокращения фиксировали и анализировали в автоматизированном режиме программным комплексом AcqKnowledge 4.4.

В эксперименте изучали спонтанную и стимулированную ацетилхолином (АХ) концентрацией 100 мкмоль/л сократимость полосок изолированного детрузора. Достоверность различий оценивали непараметрическим критерием Манна-Уитни, статистически значимыми считали различия при вероятности больше 95%.

Результаты. У самцов с МС (основная группа) уровень общего тестостерона плазмы был достоверно ниже контроля и составил $7,9 \pm 0,7$ нмоль/л, в контрольной - $11,6 \pm 0,6$ нмоль/л ($p < 0,05$). Сокращений полоски мочевого пузыря в 1 минуту у крыс в основной группе достигало $13 \pm 1,8$, что так же статистически значимо превосходило аналогичный показатель контрольной группы ($7 \pm 0,4$ сокращений, $p < 0,05$). Зарегистрированная спонтанная сила сокращений детрузора мочевого пузыря крыс в основной группе $1,4 \pm 0,2$ г при амплитуде $0,7 \pm 0,24$ г, в контрольной группе аналогичные показатели составили $0,85 \pm 0,2$ г при амплитуде $0,4 \pm 0,07$ г. После стимуляции ацетилхолином в основной группе количество сокращений составило $16 \pm 1,3$, в то время как в контроле $11 \pm 0,9$. Сила сокращений и амплитуда так же возросли и достигли в основной группе $1,8 \pm 0,2$ г и $0,8 \pm 0,6$ г. В контрольной группе регистрировали рост силы сокращений и амплитуды ($1,25 \pm 0,09$ г и $0,62 \pm 0,05$ г), что, однако, достоверно меньше основной группы наблюдения ($p < 0,05$).

Обсуждение. В выполненном эксперименте показано прямое влияние МС и вторичного гипогонадизма на рост частоты и сократительной способности мочевого пузыря не только спонтанной, но индуцированной ацетилхолином.

Список литературы

1. Berges R, Oelke M. Age-stratified normal values for prostate volume, PSA, maximum urinary flow rate, IPSS, and other LUTS/BPH indicators in the German male communitydwelling population aged 50 years or older. // World J Urol. 2011. Vol. 29, N 2. P.171-178.
2. Dekker M, Girman C, Rhodes T. et al. Metabolic Syndrome and 10-Year Cardiovascular Disease Risk in the Hoorn Study. Circulation 2005; doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.104.516948;112:666-673.
3. Jannini EA, Gravina GL, Morgentaler A, Morales A, Incrocci L, Hellstrom WJ. Is testosterone a friend or a foe of the prostate? // J Sex Med. 2011. Vol. 8, N 4. P. 946-955.
4. Jang H, Ha US, Kim SJ, Yoon BI, Han DS, Yuk SM, Kim SW. Anthocyanin extracted from black soybean reduces prostate weight and promotes apoptosis in the prostatic hyperplasia-induced rat model. // J Agric Food Chem. 2010. Vol. 58, N 24. P.12686-12691.
5. Kim MK, Zhao C, Kim SD, Kim DG, Park JK. Relationship of sex hormones and nocturia in lower urinary tract symptoms induced by benign prostatic hyperplasia. // Aging Male. 2012. Vol. 15, N 2. P. 90-95.
6. Kirby R. Improving lower urinary tract symptoms in BPH. // Practitioner. 2011 Vol. 255, N 1739. P. 15-19.
7. Mevorach R.A., Bogaert G.A., Kogan B.A. Role of nitric oxide in fetal lower urinary tract function. // J. Urology 1994. Vol 152. P.510-514.
8. Oelke M, Bachmann A, Descalzo A, Emberton M, Grivas S et al. Guidelines on the Management of Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). EAU, 2013 75p.

9. Panchal S.K., Poudyal H., Iyer A. et al. Highcarbohydrate, high-fat diet-induced metabolic syndrome and cardiovascular remodeling in rats // J. Cardiovasc. Pharmacol. – 2011. – V. 57, № 5. – P. 611–624./doi: 10.1097/FJC.0b013e3181feb90a
10. Pytel YA, Vinarov AZ. Etiology and pathogenesis of benign prostatic hyperplasia. // Benign prostatic hyperplasia [Lopatkin NA]. M. 1999. P 21-36.
12. Shkodkin S, Idashkin Y, Shaderkin I, Shaderkina V, Polishchuk A, Chirkov S. Transurethral resection of benign prostatic hyperplasia and urination disorder. J. Experimental and clinical Urology. 2017. №2.P 68-72.
13. Stewart W, Herzog R, Wein AJ. Prevalence and impact of overactive bladder in the US: Results from the NOBLE program. // Neurol Urodyn, 2001. Vol 20, N 4. P. 403-422.
14. Ziramet P, Shaw J, Alberti G. Preventing type 2 diabetes and the dysmetabolic syndrome in the real world: a realistic view. Diabetic medicine 2003; 20(9): 693-702. doi: 10.1464-5491.2003.01052.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИВОТНОГО И РЫБНОГО КОЛЛАГЕНА. СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЫБНОГО КОЛЛАГЕНА

Сопромадзе С.Ш.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Введение. В наше время очень востребованы медицинские изделия на основе коллагена: средства местного гемостаза, губки, пленки, гели, хирургические шовные материалы и др. Основой для данных продуктов является животный коллаген, источником которого является крупный рогатый скот. Ввиду определенных недостатков животного коллагена, с учетом объективных причин (болезни крупного рогатого скота, сокращение поголовья, плохая биосовместимость с коллагеном человека и др.) возникает необходимость в создании новых, более эффективных, экологически чистых, асептических медицинских изделий на основе рыбного коллагена.

Цель работы: сравнительная характеристика животного и рыбного коллагена; обоснование создания отечественного производства средств медицинского назначения на основе рыбного коллагена.

Коллаген представляется собой фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма человека и придающий ей прочность и эластичность. В соединительной ткани содержится от 1 до 9 % коллагена. Основным источником животного коллагена является спилкок шкур крупного рогатого скота. Источником рыбного коллагена является, в основном спилкок шкуры толстолобика.

Установлено, что рыбный коллаген, в отличие от животного, очень близок по структуре и биохимическим свойствам к коллагену человека. Предположительно,

что при введении такого коллагена в организм аллергическая реакция будет намного ниже, или вообще отсутствовать. Такой коллаген может стать основой для создания искусственной кожи, при лечении людей с глубокими ожогами большой площади.

По мнению некоторых специалистов, у рыбного коллагена отмечается больше полезных свойств, чем у коллагена животных. Объясняют они это тем, что животный коллаген имеет большие размеры молекул, из-за которых он не может проникать в более глубокие слои кожи.

На отечественном рынке реализуется коллаген животного происхождения. Он же и является основой для создающихся средств медицинского назначения. Производство рыбного коллагена отсутствует, данная разработка находится на этапе НИОКР.

Открываются возможности для создания медицинских изделий на основе рыбного коллагена: гемостатические губки, перевязочные материалы, специальные пластыри, пленки, средства местного гемостаза, имплантаты, а также применение в фармацевтической промышленности: гели, мази, пленки, комбинация средств на основе коллагена в качестве депо с лекарственными препаратами пролонгированного действия, антибиотиками.

Список литературы

1. Антипова Л.В. Создание коллагеновых продуктов из рыбного сырья / Л.В.Антипова, С.А.Сторублевцев, С.Б.Болгова // Журнал «Вестник ВГУИТ».-2015.- №1.-С.130-133.
2. Бежин А.И., Иванов А.В., Липатов В.А., Григорьян А.Ю. Морфологическая оценка течения раневого процесса при применении хитозан-коллагенового комплекса с серебром // Морфология. 2019. Т. 155. № 2. С. 37.
3. Бежин А.И., Липатов В.А., Фрончек Э.В., Григорьян А.Ю., Наимзада М.Д.З. Лечение инфицированных ран хитозан-коллагеновым комплексом с диоксидином и лидокаином в условиях эксперимента // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019. Т. 14. № 1-2. С. 159-164.
4. Карасев М.М. Новейшие достижения фармацевтической разработки, основанные на использовании коллагена / М.М.Карасев, М.А.Редина, О.В.Белоусова // Журнал «Фармация и фармакология».- 2015.-№ 5.-С.12-17.
5. Липатов В.А., Инархов М.А., Ярмамедов Д.М., Лысанская К.В. Морфологические и физико-механические свойства полимерных пленчатых имплантатов в опытах *in vitro* // Забайкальский медицинский вестник. 2015. № 1. С. 129-133.

ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРОМБОЛИЗИСА У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Смоляков М.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей является одним из наиболее распространенных видов неинфекционной патологии. Данное заболевание наиболее распространено у лиц пожилого возраста, однако из-за меняющихся условий жизни, происходит смещение в возрастной категории риска в сторону лиц более молодого, трудоспособного возраста. ТГВ способен приводить нередко к более опасному осложнению – тромбозамболии легочных артерий (ТЭЛА), летальность которой превышает 30% [1].

Цель работы: оценить эффективность катетер-управляемого тромболизиса в лечении ТГВ и профилактики ТЭЛА. Материалы и методы.

Производился анализ современных хирургических методов и техник малоинвазивного лечения ТГВ, также была сделана выкипировка и анализ статистических данных, материалов статей по вопросам данной проблематики. На основе понимания патогенеза ТГВ, ангиохирургами и флебологами было предложено введение тромболитического препарата непосредственно в тромб, что позволяет стимулировать плазмин и обеспечить протекцию активаторов плазминогена от антиплазминов. Для осуществления данной технологии было предложено использовать метод катетер-управляемого тромболизиса, где специальный эндоваскулярный катетер под рентген-контролем внутривенно доставляет тромболитик в область тромбированного участка. Согласно материалам Национального регистра острых тромбозов вен США, в качестве препарата для инфузии методом катетер-управляемого тромболизиса применялась урокиназа, которую вводили пациентам с ТГВ. У более чем 60% пациентов с впервые выявленным ТГВ наблюдалось полное растворение тромботических масс. При динамическом наблюдении в течение полугода у 62% пациентов наблюдалась проходимость ранее тромбированных участков вен. Спустя год проходимость вен сохранилась у 76% пациентов.

.

Список литературы

1. Иванов А.В., Липатов В.А., Лазаренко С.В., Жуковский В.А. К вопросу о биосовместимости новых образцов заплат для коррекции дефектов магистральных сосудов // Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 6. -С. 682.
2. Золотухин И. А. и др. Отдаленные результаты лечения пациентов, перенесших тромбоз глубоких вен нижних конечностей //Флебология. – 2011. – Т. 5. – №. 1. – С. 27-33.
3. Лебедев А.К., Кузнецова О.Ю. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей // Российский семейный врач. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tromboz-glubokih-ven-nizhnih-konechnostey> (дата обращения: 23.09.2020).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ С ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТОЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Солдатова Д.С.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Разработка и выбор эффективного гемостатического средства для остановки паренхиматозного кровотечения при операциях на печени остаётся актуальным и открытым. В настоящее время большой интерес вызывают местные гемостатические препараты содержащие транексамовую кислоту, из-за высокой эффективности и безопасности применения.

Целью работы стала сравнительная оценка гемостатических свойств гемостатических губок с транексамовой кислотой и ее комбинации с криопреципитатом и гемоблоком.

Исследование выполнено на 40 крысах самцах линии Вистар. Животные были разделены на 4 группы: 3 исследуемые и контрольную. Оценку гемостатических свойств оценивали по времени остановки кровотечения. Под масочным изофлюрановым наркозом крысам выполняли срединную лапаротомию, затем производили краевую резекцию печени, стандартным способом. После чего на область раны наносили исследуемые образцы: губку гемостатическую с 9% транексамовой кислотой, 9% транексамовой кислотой и гемоблоком ; 9%транексамовой кислотой и криопреципитатом. Опытные образцы предоставлены фирмой «Зеленая дубрава» ОАО г. Москва. Контролем служила методика без применения гемостатиков. Время от момента нанесения раны до прекращения истечения крови из раны – оценили, как время остановки кровотечения.

Результаты показали, что все образцы обладают гемостатическим эффектом относительно контрольной группы, однако наиболее эффективной оказался моно препарат (гемостатическая губка с 9% транексамовой кислотой). Время остановки кровотечения составило $50,7 \pm 1,9$ с ($p < 0,001$). Комбинация кислоты и криопреципитата оказалась менее действенной - $65,8 \pm 1,5$ с ($p < 0,001$).; транексамовой кислоты и гемоблока оказалась менее эффективной, время остановки кровотечения $64,3 \pm 7,9$ с ($p < 0,001$). Время остановки кровотечения в контрольной группе было $302,1 \pm 4,5$ с.

Анализ, результатов показал, что не всегда комбинация эффективных гемостатических препаратов в сумме является более эффективной, чем их отдельные компоненты. Это связано с химическим взаимодействием и антагонистическим действием составляющих. Гемостатическая губка с транексамовой кислотой может быть применена при операциях на печени, в качестве эффективного гемостатического препарата.

Список литературы

1. Бежин А.И., Майстренко А.Н., Липатов В.А. Гемостатическая активность новых аппликационных средств на основе карбоксиметилцеллюлозы // Вестник новых медицинских технологий. -2011. -№ 2. -С.115-119.
2. Герасимов Д.А.и др. Экспериментальная оценка динамики и степени биodeградации новых образцов кровоостанавливающих имплантатов на основе карбоксиметилцеллюлозы // Забайкальский медицинский вестник. -2016. -№ 1. -С. 81-85.
3. Иванов А. В. и др. Влияние механических характеристик сосудистой заплаты на формирование перипротезной капсулы //Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2016. – Т. 4. – №. 1 (11).
4. Липатов В. А. и др. К вопросу о методологии сравнительного изучения степени гемостатической активности аппликационных кровоостанавливающих средств //Новости хирургии. – 2018. – Т. 26. – №. 1.
5. Сравнительная оценка гемостатической активности новых аппликационных средств при травмах и операциях на печени и селезенке в эксперименте/А.Н. Майстренко // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - 2009. -№ 2. -С. 19-26.
6. Чижиков Г. М. и др. Экспериментальное изучение новых средств местного гемостаза в хирургии печени и селезенки //Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2011. – №. 1.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Липатов В.А., Трофимов И.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Тема исследования воздействия окружающего нас повсюду электромагнитного излучения на живой организм не нова. В ходе литературного анализа были найдены научные работы Георгия Лаховского, в одной из которых выдвигалась гипотеза о клеточной осцилляции, согласно которой разные виды клеток имеют разные резонансные частоты, а именно отвечают по-разному при воздействии волнами с одинаковыми длинами, следовательно, разные виды клеток имеют разные электрические свойства. Так же упоминался изобретенный им излучатель электромагнитных волн разной длины, названный «мультиосциллятор», для воздействия на исследуемые предметы и организмы. Результаты его экспериментов показали, что воздействие широкополосных электромагнитных полей в определённых диапазонах может стимулировать реакции живого организма: реакции противомикробной и противоопухолевой защиты, оптимального течения процессов регенерации, а также успешной

адаптации организма к неблагоприятным условиям среды. Благодаря воссозданию изобретения ученого мы получили возможность провести эксперимент с целью проследить, какое влияние оказывает облучение широкополосным электромагнитным полем на живой организм, в частности на иммунную систему.

Материалы и методы. Эксперимент проводился на базе НИИ Экспериментальной хирургии и онкологии. В эксперименте участвовало 30 мышей-самцов, которые были разделены на три группы по 10 животных в каждой. Экспериментальная группа подвергалась облучению каждый день в течении 10 дней по 15 мин минут с напряжением источника – 2 кВ, несущей частотой – 940 кГц, модулирующей частотой – 125 кГц и частотами элементов антенны – 0,153 – 6,09 ГГц. Контрольная группа помещалась в установку для облучения так же, как и экспериментальная, но установка не включалась. Группа интактных животных подвергались изучению всех параметров для определения нормальных показателей. По прошествии 10 дней животные выводились из эксперимента посредством эвтаназии с использованием CO₂, для проведения гистологического исследования. При вскрытии, забирались селезенка, тимус и брыжеечные лимфатические узлы. Материал фиксировали 10 %-м раствором нейтрального формалина. После стандартной гистологической проводки материал заливали в парафин. Серийные срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. С целью получения сравнительных характеристик и фиксации основных тенденций изучались срезы посредством световой микроскопии, фотографирования гистологических препаратов и измерений гистологических структур с соблюдением масштаба. Программной средой для микроморфометрических исследований служила программа ImageScope. В результате гистологического исследования селезенки пришли к следующим результатам: в опытной и интактной группе площадь среза была наибольшей, при этом значительную её часть занимала красная пульпа. Количество активированных лимфоидных узелков, расположенных в белой пульпе было наименьшим в опытной группе, по сравнению с контрольными и интактными животными. При изучении соотношения суммарной площади реактивного центра к общей площади лимфоидного фолликула наименьший коэффициент отмечается в опытной группе. При гистологическом изучении тимуса во всех группах морфологическая картина была представлена как корковым, так и мозговым веществом. Корковое вещество состояло из Т-бластных клеток, мозговое вещество – из зрелых Т-лимфоцитов и небольшого количества ретикулоэпителиального компонента. Жирового метаморфоза не выявлено. При сравнительном анализе проведенного морфометрического исследования соотношения коркового и мозгового вещества было достоверно выявлено увеличение площади коркового вещества в опытной группе по сравнению с контролем. Данный факт может говорить об активации деления низкодифференцированных Т-лимфоцитов. Следует также отметить наличие в мозговом веществе тимуса контрольной и интактной групп слоистых эпителиальных телец. При гистологическом изучении препаратов лимфатических узлов в опытной и контрольной группах было выявлено, что большая часть площади среза представлена корковым веществом, в котором располагаются лимфоидные фолликулы. В интактной группе мозговое вещество незначительно преобладало, представленное мозговыми тяжами и системой капилляров. Паракортикальная зона выражена незначительно, представлена зрелыми Т-

лимфоцитами. Краевые синусы свободные. При изучении опытной группы гистологические срезы представлены корковым веществом с большим количеством лимфоидных фолликулов. Мантийно-маргинальная зона их слегка расширена. Следует отметить, что большую часть структуры фолликула занимает реактивный центр, который также является центром размножения В-клеток. При морфометрическом исследовании было достоверно получено увеличение суммарной площади реактивных центров к суммарной площади лимфоидного фолликула в опытной группе по сравнению с интактной. Данная зона в основном представлена центроцитами и центробластами.

Заключение. Сопоставляя морфологические изменения в лимфатических узлах и изменения в селезенках, можно сделать вывод об активации стрессового приспособительного механизма, Т- и В-клеточного иммунитета при действии широкополосных электромагнитных полей.

Список литературы

1. Косов А.А., Баранов А.А., Ярославцев И.А. Роль электромагнитных полей и излучений в системе обеспечения безопасности человека//Академический вестник уралниипроект РААСН, №1, 2010. - С.84-90.
2. Монич В.А., Малиновская С.Л., Махрова Т.В., Малиновский Д.С. Особенности воздействия низкоинтенсивных ЭМИ различных диапазонов на микроорганизмы// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, №2, 2010, с.435-438
3. Субботина Т.И., Яшин М.А., Яшин А.А. Повреждающее воздействие на организм ЭМИ с длиной волны 30см//Вестник новых медицинских технологий. Т.8, №1 С. 149-151

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНАНАТОМИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Ребров Д.А., Ашихмина А. И., Стольная Д. А., Гомон М.С.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В настоящее время рентгенологический метод является одним из распространённых способов для диагностики заболеваний. К сожалению, в экспериментальной медицине он применяется не так часто. Хотя имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами исследования: отсутствие расходных материалов, небольшая цена обслуживания, качественные цифровые рентгеновские снимки. Наличие аппарата в научной лаборатории Курского Государственного Медицинского Университета дает возможность использовать его во всевозможных опытах.

Исследования проводятся на многофункциональной передвижной рентгеновской установке ПРДУ. Считывание снимка происходит с помощью дигитайзера. А обработка и сохранение изображения выполняется с помощью компьютерного приложения Quantor VET. Программное обеспечение позволяет изменять параметры снимка для наилучшего распознавания проблемных зон и изучаемых мельчайших объектов.

Для полноценного использования всех возможностей аппарата, а именно получения снимков с высоким разрешением и увеличением, ПРДУ не отвечает некоторым требованиям, которые заявлены для экспериментов. Именно поэтому была разработана установка с подвижным стеклянным столиком для перемещения объекта исследования по вертикали.

Изучение процессов жизнедеятельности, как физиологических, так и патологических в живых организмах с помощью рентгеновского аппарата является перспективным направлением в экспериментальной хирургии.

Список литературы

1. Бежин А.И., Липатов В.А., Майстренко А.Н., Нетяга А.А., Рыжов А.С., Северинов Д.А. РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ: ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Д. МЯСНИКОВА КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 2.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=28680> (дата обращения: 31.03.2019).
2. Васильев А. Ю., Буланова И. М. Сравнительная характеристика микрофокусной рентгенографии и рентгеновской компьютерной томографии в эксперименте на животных // Образовательный вестник «Сознание». 2007. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-mikrofokusnoy-rentgenografii-i-rentgenovskoy-kompyuternoy-tomografii-v-eksperimente-na-zhivotnyh> (дата обращения: 23.09.2020).
3. Липатов В.А., Северинов Д.А., Крюков А.А., Саакян А.Р. Этические и правовые аспекты проведения экспериментальных биомедицинских исследований in vivo. Часть I // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2019. Т. 27, №1. С. 80-92. doi:10.23888/PAVLOVJ201927180-92

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Гавриков А.К., Гаврикова Д.И.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В структуре общей заболеваемости желчнокаменная болезнь (или холелитиаз) в Российской Федерации занимает третье место (после заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета) [1]. Кроме того, хронический калькулезный холецистит и холедохолитиаз в нашей стране являются наиболее распространенными причинами острой хирургической патологии. Обострение калькулезного холецистита служит причиной порядка 30% всех вызовов скорой медицинской помощи в связи с острой болью в животе [2].

Холедохолитиаз осложняет течение 8–20% ЖКБ, при этом в 60–70% случаев развивается механическая желтуха различной степени выраженности [3]. Современная хирургия располагает многочисленными подходами к лечению холедохолитиаза, однако каждый метод имеет определенные недостатки, требующие поиска новых техник экстракции конкрементов их желчных путей.

Цель. Определить наиболее эффективную методику лечения калькулезного холецистита и холедохолитиаза на основании сравнительного анализа традиционной и эндоскопической холедохолитотрипсии.

Материалы и методы. Объектом для данного исследования послужила выборка из 44 пациентов с калькулезным холециститом и холедохолитиазом на базе хирургического отделения Брянской областной больницы за 2019 год. Были обработаны истории болезни, протоколы операций и карты диспансерного наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде. Были сформированы 2 группы больных в зависимости от оперативного вмешательства. В первую группу вошли 24 пациентов (54,5%); им была проведена традиционная холецистэктомия с холедохолитоэкстракцией из стандартного лапаротомного доступа в правом подреберье. Средний возраст составил $54 \pm 4,8$ лет (от 36 до 79 лет). Вторую группу пациентов составили 20 больных (45,5%), которым выполнялось комбинированное вмешательство: после выполнения эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) проводилась холедохолитоэкстракция; затем пациентам проводилась стандартная лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Средний возраст - $48 \pm 4,4$ лет (от 26 до 81 года).

Результаты и их обсуждение. В I группе – группе лапаротомии у 18 больных операция была завершена наружным дренированием холедоха, у 6 пациентов ввиду сомнительной проходимости был наложен холедоходуоденоанастомоз. Осложнения возникли у 5 пациентов (20,8%) и имели следующий характер: нагноение раны (2), резидуальные конкременты (1), желчеистечение (1), инфаркт миокарда (1). Средняя длительность болевого синдрома составила 8,1 день. Время госпитализации 20 дней. Среди пациентов данной группы был один летальный

исход, связанный с развитием у пациентки острого инфаркта миокарда. Таким образом, летальность в данной группе составила 4,2%.

Во II группе – группе эндоскопической папиллосфинктеротомии осложнения наблюдались у 5 больных. У 3 больных развился острый панкреатит с амилаземией выше 500 ЕД/л и диастазурией выше 5000 ЕД/л. В 2 случаях комплексное лечение острого панкреатита было успешным, однако у 1 пациента развился панкреонекроз, это привело к тому, что на фоне развития гнойно-септических осложнений пациент погиб. У 1 больного возникло кровотечение из места рассечения большого дуоденального сосочка. Проведение эндоскопического гомеостаза в комплексе с медикаментозным лечением в данном случае было успешным. В раннем послеоперационном периоде у одного больного имело место внутрибрюшное кровотечение, в связи с чем была выполнена повторная операция и остановка кровотечения. Средняя длительность болевого синдрома составила 3,6 дней. Время госпитализации 13,1 дней. Общая летальность в данной группе составила 5 %.

Заключение. Традиционные методики сопровождаются большей травматичностью, более выраженным болевым синдромом и приводят к поздней активации пациента. Двухэтапное лечение с проведением ЭПСТ и ЛХЭ малотравматично, с менее выраженным болевым синдромом, однако сопровождается большим количеством послеоперационных осложнений, также данный метод лечения сопряжен с более высокой летальностью.

Список литературы

1. Губергриц Н.Б. Желчекаменная болезнь: от классики к современности // Гастроэнтерология. Прил. к журналу Consilium Medicum. 2010. № 1. С. 83–95.
2. Аралова М.В., Глухов А.А. Характер оперативных вмешательств при холедохолитиазе и его осложнениях // Вестн. новых мед. технологий. 2010. Т. 17, № 2. С. 101– 102.
3. Королёв М.П., Федотов Л.Е. и др. Холедохолитиаз в нестандартных ситуациях: возможности комбинированных методов малоинвазивного вмешательства // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 2012. № 4. С. 74–78.
4. Сравнительная оценка гемостатической активности новых аппликационных средств при травмах и операциях на печени и селезенке в эксперименте/А.Н. Майстренко // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - 2009. -№ 2. -С. 19-26.
5. Ярмамедов Д. М., Липатов В. А. Метод доверительных интервалов в биологических и медицинских исследованиях //Innova. – 2016. – №. 3 (4).

ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ ИММУННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА

Липатов В.А., Денисов А.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Одним из основных показателей степени активности иммунной системы организма является уровень концентрации лейкоцитов в крови. Одной из основных причин развития лейкоцитоза является эндогенная интоксикация, которая может быть вызвана различными причинами. Для того, чтобы косвенно определить степень активности иммунных комплексов, выброс которых провоцирует процесс интоксикации применяются лейкоцитарные индексы (ЛИ). ЛИ - интегральные показатели лейкограммы, позволяющие оценить тяжесть воспалительного процесса, степень активности компенсаторных механизмов.

Существует большое число лейкоцитарных индексов, однако лишь небольшое их количество позволяют получить наиболее точные и объективные данные. Согласно анализу научной литературы к ним относятся: индекс Гаркави, индекс иммунореактивности по Д.О. Иванову с соавт., лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс, индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов, индекс сдвига лейкоцитов крови.

Индекс Гаркави - отношение процента лимфоцитов к проценту сегментоядерных нейтрофилов. Норма: 0,3 - 0,5. Индекс Гаркави отображает взаимоотношение гуморального и клеточного звеньев иммунитета, оценку стрессового состояния, а также оценку адаптационных реакций тренировки и активации с помощью которой реализуется лечебный эффект воздействия различных физиологических факторов. Индекс иммунореактивности по Д.О. Иванову с соавт. позволяет провести оценку активности клеток-продуцентов цитокинов, является отношением суммы лимфоцитов с эозинофилами к моноцитам. В норме показатели индекса находятся в пределе от 5,71 до 30,18. Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ) позволяет дифференцировать аутоинтоксикацию и инфекционную интоксикацию. Норма составляет $4,56 \pm 0,37$. Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) отражает взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунологического процесса. Норма равняется 1,96. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) — отношение суммы эозинофилов, базофилов и нейтрофилов к сумме моноцитов и лимфоцитов. В норме ИСЛК составляет 1,56 и не зависит от общего числа лейкоцитов крови. Повышение ИСЛК свидетельствует об активном воспалительном процессе и нарушении иммунологической реактивности.

Таким образом, при получении данных о лейкоцитарной формуле, с помощью ЛИ можно судить о степени эндогенной интоксикации, и активности компенсаторных механизмов организма, что значительно упрощает выбор тактики лечения.

Список литературы

1. Шумская Е.И., Ефименко И.А. Изменение показателей лейкоцитарного индекса интоксикации и лейкоцитоза при тромбофлебитах в зависимости от тяжести заболевания//Астраханский медицинский журнал. 2011. Т. 6. № 2. С. 271-272.
2. Лазаренко В.А., Бежин А.И., Липатов В.А. и др. Коррекция нарушений иммунитета при экспериментальном спаечном процессе брюшной полости с использованием дерината и лонгидазы//Человек и его здоровье. -2010. -№ 3. -С. 37-43.
3. Лазаренко В.А., Конопля А.И., Бежин А.И., Липатов В.А. и др. Морфологические изменения брюшной полости при использовании иммуномодуляторов для профилактики спаечного процесса//Вестн. новых мед. технологий. 2010. Т. 17, № 3. С. 9-13.
4. Островский В.К., Алимов Р.Р., Мащенко А.В., Семенова О.П., Курапова М.И. Некоторые данные о показателях нормы лейкоцитарного индекса интоксикации//Клиническая лабораторная диагностика. 2003. № 1. С. 45.
5. Рыбдылов Д.Д. Лейкоцитарный индекс воспаления//Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2010. № 2 (72). С. 84-85.

ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОМЕХАНИЧЕСКОГО ТРОМБОЛИЗИСА У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Смоляков М. В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей является одним из наиболее распространенных видов неинфекционной патологии. Данное заболевание наиболее распространено у лиц пожилого возраста, однако из-за меняющихся условий жизни, происходит смещение в возрастной категории риска в сторону лиц более молодого, трудоспособного возраста. ТГВ способен приводить нередко к более опасному осложнению – тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА), летальность которой превышает 30%.

Цель работы: оценить эффективность катетер-управляемого тромболизиса в лечении ТГВ и профилактики ТЭЛА. Материалы и методы. Производился анализ современных хирургических методов и техник малоинвазивного лечения ТГВ, также была сделана выкипировка и анализ статистических данных, материалов статей по вопросам данной проблематики. На основе понимания патогенеза ТГВ, ангиохирургами и флебологами было предложено введение тромболитического препарата непосредственно в тромб, что позволяет стимулировать плазмин и обеспечить протекцию активаторов пламиногена от антиплазминов. Для осуществления данной технологии было предложено использовать метод катетер-управляемого тромболизиса, где специальный эндоваскулярный катетер под рентген-контролем внутривенно доставляет тромболитик в область

тромбированного участка. Согласно материалам Национального регистра острых тромбозов вен США, в качестве препарата для инфузии методом катетер-управляемого тромболизиса применялась урокиназа, которую вводили пациентам с ТГВ. У более чем 60% пациентов с впервые выявленным ТГВ наблюдалось полное растворение тромботических масс. При динамическом наблюдении в течении полугода у 62% пациентов наблюдалась проходимость ранее тромбированных участков вен. Спустя год проходимость вен сохранилась у 76% пациентов, полностью функционировал клапанный аппарат вен. Более эффективным является метод пульсирующего распыления факторов активации плазминогена, что способствует уменьшению количества и размеров эмболов которые образуются в процессе лизиса тромботических масс. Дополнительно для профилактики ТЭЛА к данным, описанным выше вариантам тромболизиса, можно присоединить ультразвуковой компонент. Воздействие ультразвука позволяет фрагментировать сгустки тромбоземболов до более мелких фракций, что с одной стороны позволяет механически уменьшить вероятность возникновения тяжелых последствий от попадания в малый круг кровообращения, а с другой стороны обеспечивает большую площадь соприкосновения эмболов с активаторами плазминогена ткани. Эффективность данного комплексного воздействия на тромботические массы на 27-32% выше чем у других методов. Заключение. На данный момент катетер-управляемый тромболизис является одним из перспективных методов лечения ТГВ, после которого имеется большая вероятность восстановления трудоспособности пациентов и улучшения прогноза для жизни. Комбинирование различных технических, фармакологических технологий тромболизиса позволяют давать клинически значимый результат

Список литературы

1. Домашенко М.А., Максимова М.Ю., Танашян М.М. Системный тромболизис при ишемическом инсульте: клинические факторы персонифицированной эффективности и безопасности // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2019 Том 13, №1. С. 5-14
2. Оклеј Д.В., Современная хирургическая тактика у больных с острыми тромбозами глубоких вен нижних конечностей и таза // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2015. № 3-1 (51). С. 343-350

Смоляков М. В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Билиарный панкреонекроз является одним из самых тяжелых воспалительных процессов локализующихся в поджелудочной железе с которым привозят ургентных пациентов. Запущенный механизм воспаления приводит к автокатализу паренхимы органа, некротизации ткани и дальнейшему прогрессированию процесса, что способствует повышению риска летального исхода. Летальность запущенного распространенного процесса 20-28%, при присоединении инфекционного агента, данный показатель может составить более 45%.

Цель работы: оценить эффективность реологической терапии билиарного панкреонекроза.

Материалы и методы. Производился анализ современных хирургических методов и техник малоинвазивного лечения панкреонекроза, также была сделана выкипировка и анализ статистических данных, материалов статей по вопросам данной проблематики. Нарушения кровоснабжения и трофики ткани поджелудочной железы создают условия для гибели клеток и участков ткани, что и приводит к развитию панкреонекроза. Для уменьшения последствий и прекращения развертывания звеньев патогенеза можно использовать лекарственные вещества восстанавливающие кровоток в органе. В качестве такого препарата могут выступать простагландин Е1 и его синтетические аналоги, которые обладают вазодилатирующим эффектом, оказывая ангиопротекторное воздействие на эндотелий и гладкую мускулатуру сосудов, уменьшая тромбирование кровяного русла за счет нарушения активации факторов адгезии тромбоцитов. Гладкие миоциты сосудов обладают наибольшей чувствительностью к алпростадилу, который способствует нарушению адренергических влияний, что приводит к расслаблению и расширению просвета артерий. При локальной регионарной терапии отмечался наибольший эффект, в первые три дня у 43% пациентов отмечался значимый клинический результат, уменьшалась симптоматика болевого синдрома, интоксикация, менялось эмоциональное состояние пациентов. В последующие пять дней уже 64% пациентов принимавших почувствовали результат от проводимой терапии. Снизилось количество койко-дней в стационаре с 32,5 до 21,7. При ангиографическом исследовании в области гастродуоденальной артерии отмечалось восстановление кровотока, улучшение реологии, увеличение диаметра сосуда, уменьшение времени задержки рентгеноконтрастного средства. Также было снижено количество случаев попадания ферментов в окружающую клетчатку, в том числе ретроперитонеальную, и вовлечения ее в воспалительный процесс на 23%. Данный вид терапии оказался более действенным в сравнении комбинирования антиагрегантной, антикоагулянтной и противомикробной тактикой лечения, хотя оба подхода оказывали клинически ощутимый эффект. Заключение. Использование сосудорасширяющих препаратов в терапии билиарного

панкреонекроза способствует локализации и отграничиванию воспалительного очага и омертвевшей ткани, что дает высокие шансы для протекания заболевания по более благоприятному сценарию с более быстрой реабилитацией.

Список литературы

1. Алехнович А.В., Иванов Ю.В., Панченков Д.Н., Таймаскина М.Т. Современные подходы к хирургическому лечению больных панкреонекрозом // Доктор.Ру. 2015. S1. С. 9-14
2. Алюков А.Ш., Носков И.Ю. Принципы интенсивной терапии панкреонекроза // Казанский медицинский журнал. 2012. Т. 93. № 2. С. 341-342.
3. Смоляков М.В., Левыкина Е.С., Мосолова А.В. Тотальный билиарный панкреонекроз: клинический случай // В книге: Сборник тезисов 52-й Межрегиональной ежегодной научно-практической конференции студентов и молодых ученых по итогам производственной практики. Сборник тезисов. Под общей редакцией Л.В. Вдовиной. 2020. С. 65-67.